Universidad de Valladolid

FACULTAD DE MEDICINA

DEPARTAMENTO DE MEDICINA

TESIS DOCTORAL:

**Hiponatremia en nutrición parenteral: Etiología,
tratamiento y morbimortalidad asociada. Estudio
multicéntrico**

Presentada por ANA ORTOLÁ BUIGUES para optar al grado
de doctor por la Universidad de Valladolid

Dirigida por:

DR. DANIEL ANTONIO DE LUIS ROMÁN

DRA. EMILIA GÓMEZ HOYOS

Valladolid, 2017

Universidad de Valladolid

FACULTAD DE MEDICINA

DEPARTAMENTO DE MEDICINA

TESIS DOCTORAL:

**Hiponatremia en nutrición parenteral: Etiología,
tratamiento y morbimortalidad asociada. Estudio
multicéntrico**

Presentada por ANA ORTOLÁ BUIGUES para optar al grado
de doctor por la Universidad de Valladolid

Dirigida por:

DR. DANIEL ANTONIO DE LUIS ROMÁN

DRA. EMILIA GÓMEZ HOYOS

Valladolid, 2017

AGRADECIMIENTOS

A mis directores de tesis, Daniel De Luis Román y Emilia Gómez Hoyos, por haber confiado en mí para formar parte de este proyecto, por su apoyo incondicional y toda la ayuda que me han brindado. Sin ellos este trabajo no saldría a la luz, por lo que mi gratitud será eterna.

Al Área de Nutrición de la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición, y en especial a todos aquellos profesionales de los 19 centros hospitalarios que han participado en el trabajo de campo de este estudio, por su indispensable colaboración, por la ilusión y compromiso con la que apoyaron inicialmente el proyecto y por la meticulosidad en la recogida de datos.

A mi compañera y amiga Emilia, por estar presente en todo momento, tanto a nivel personal como profesional, por todo lo que he aprendido y sigo aprendiendo cada día de tí. No creo que pueda llegar a agradecerte todo lo que estás haciendo por mí.

A mi actual Servicio de Endocrinología y Nutrición del Hospital Clínico de Valladolid, desde mis compañeros médicos hasta el equipo de enfermería y auxiliares, así como a las residentes, por el apoyo y comprensión que he recibido por todos y cada uno de vosotros. Solo espero seguir formando parte de este equipo durante muchos años.

A la Dra. Isabelle Runkle, por toda la ayuda y por tantos conocimientos que me trasladaste durante mi residencia, en especial sobre el tema de la presente tesis.

A todo el Servicio de Endocrinología y Nutrición del Hospital Clínico San Carlos, en especial a mi tutora durante la residencia, Paz de Miguel, por la ayuda incommensurable y todo lo que aprendí de ti. También a mis compañeros durante la residencia, por la amistad que perdurará y por sentirme tan querida por vosotros.

Y por último a mi familia, a mis padres, mis hermanos y sobrinos, por acompañarme durante mi vida, por darme tanto y apoyarme sin medida.

Muchas gracias.

ÍNDICE GENERAL

Abreviaturas	17
Índice de tablas	19
Índice de figuras	21
Resumen.....	23
Introducción	29
I. ANTECEDENTES Y ESTADO ACTUAL DEL TEMA	33
1. Fisiopatología de la hiponatremia	35
1.1. Regulación del balance del agua y del sodio	35
1.1.1. Distribución del agua corporal total	35
1.1.2. Ósmosis, osmoles, osmolalidad y tonicidad.....	36
1.1.3. Regulación del balance del agua	37
1.1.4. Regulación del balance del sodio	37
1.2. Papel del riñón en el equilibrio hídrico.....	38
1.3. Papel de la arginina-vasopresina u hormona antidiurética	39
1.3.1. Mecanismo de síntesis y liberación de la AVP	39
1.3.2. Regulación de la secreción de la AVP	41
1.3.2.1. Regulación osmótica de la secreción de la AVP	41
1.3.2.2. Regulación no osmótica de la secreción de la AVP	44
1.4. Fisiopatología del síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética (SIADH).....	47
1.4.1. Patrones de secreción de arginina vasopresina: tipos de SIADH.....	47
2. Epidemiología de la hiponatremia	50
2.1. Epidemiología de la hiponatremia a nivel ambulatorio.....	50
2.2. Epidemiología de la hiponatremia a nivel hospitalario	50
2.3. Factores de riesgo de desarrollo de hiponatremia	52
3. Morbimortalidad asociada a hiponatremia.....	54

3.1. Mortalidad asociada a hiponatremia a nivel ambulatorio	54
3.2. Mortalidad intrahospitalaria asociada a hiponatremia	54
3.3. Papel de la hiponatremia en la estancia hospitalaria	59
4. Manifestaciones clínicas de la hiponatremia.....	62
5. Diagnóstico diferencial y etiología de la hiponatremia.....	65
5.1. Otras causas de hiponatremia: hiponatremia no hipotónica	65
5.2. Diagnóstico diferencial y etiología de la hiponatremia hipotónica	66
5.2.1. Etiología de la hiponatremia hipovolémica	68
5.2.2. Etiología de la hiponatremia euvolémica	70
5.2.3. Etiología de la hiponatremia hipervolémica.....	75
6. Tratamiento de la hiponatremia	77
6.1. Límites de corrección de la hiponatremia	77
6.2. Tratamiento de la hiponatremia grave	80
6.3. Tratamiento de la hiponatremia no grave	81
6.3.1. Tratamiento de la hiponatremia hipovolémica	81
6.3.2. Tratamiento de la hiponatremia euvolémica	82
6.3.2.1. Tratamiento de la hiponatremia euvolémica mediada por AVP	83
6.3.2.2. Tratamiento del SIADH	83
6.3.2.3. Tratamiento de la hiponatremia euvolémica no mediada por AVP.....	87
6.3.3. Tratamiento de la hiponatremia hipervolémica	88
6.4. Tratamiento de la hiponatremia en nutrición parenteral	89
7. Nutrición artificial por vía parenteral.....	91
7.1. Definición	91
7.2. Tipos de nutrición parenteral (NP). Vías de administración	91
7.3. Indicaciones y contraindicaciones	92
7.4. Cálculo de requerimientos y composición de la NP	93
7.4.1. Requerimientos energéticos	93
7.4.2. Composición de la NP.....	94
7.5. Seguimiento y monitorización del paciente con NP	97

7.6. Complicaciones de la NP	98
7.6.1. Complicaciones relacionadas con el catéter	98
7.6.2. Complicaciones metabólicas	99
8. Valoración del estado nutricional	102
8.1. Definición de desnutrición	102
8.2. Test de valoración nutricional.....	103
8.3. Valoración del estado nutricional	105
8.3.1. Datos antropométricos.....	105
8.3.2. Parámetros analíticos	106
9. Justificación de la tesis doctoral	108
 II. HIPÓTESIS Y OBJETIVOS	 109
 III. MATERIAL Y MÉTODOS	 113
1. Diseño del estudio.....	115
2. Población a estudio	115
2.1. Criterios de inclusión	115
2.2. Criterios de exclusión	115
2.3. Cálculo del tamaño muestral.....	116
3. Protocolo del estudio	116
3.1. Proceso de selección	116
3.2. Consideraciones éticas	116
3.3. Recogida de datos	116
3.4. Protocolo de inicio de la nutrición parenteral	117
3.5. Seguimiento.....	119
4. Variables incluidas.....	121
4.1. Variables principales (relacionadas con la natremia)	121
4.2. Variables secundarias	127
4.3. Variables terciarias	133
5. Estudio estadístico	134

IV. RESULTADOS	137
1. Descripción de la población a estudio.....	139
1.1. Características demográficas: sexo, edad, hospital	139
1.2. Características clínicas previas al inicio de la NP	139
1.2.1. Patologías asociadas al inicio de la NP	139
1.2.2. Valoración del estado nutricional al inicio de la NP	140
1.3. Datos clínicos al inicio y/o durante la administración de la NP que puedan influir en la natremia.....	141
1.3.1. Fármacos al inicio y/o durante la administración de la NP	141
1.3.2. Otros cuadros clínicos al inicio y durante la administración de la NP ..	141
1.4. Variables relacionadas con la NP y el aporte de sueroterapia.....	142
1.4.1. Indicación del inicio de la NP y motivo de retirada	142
1.4.2. Duración de la NP	143
1.4.3. Composición de la NP	144
1.4.4. Aporte de líquidos extras a la NP	145
1.4.5. Aporte total de volumen y sodio durante la NP	146
1.4.6. Otras complicaciones asociadas a la NP	146
2. Descripción del tipo y etiología de la hiponatremia	148
2.1. Natremia e hiponatremia al inicio de la NP	148
2.2. Natremia y frecuencia de hiponatremia durante la administración de la NP.....	148
2.3. Hiponatremia global en la administración de la NP	150
2.4. Tipo de hiponatremia	151
2.4.1. Valoración de la volemia	151
2.4.2. Estudio bioquímico de hiponatremia	151
2.5. Etiología de la hiponatremia.....	153
2.5.1. Etiología de la hiponatremia hipovolémica	153
2.5.2. Etiología de la hiponatremia euvolémica	153
2.5.3. Etiología de la hiponatremia hipervolémica.....	154
3. Factores de riesgo de desarrollo de hiponatremia durante la NP	155

3.1. Influencia de variables demográficas, comorbilidades previas y de la valoración nutricional en el desarrollo de hiponatremia	155
3.2. Influencia del tratamiento quirúrgico y otros cuadros clínicos durante el periodo de la NP en el desarrollo de hiponatremia	156
3.3. Influencia del uso de fármacos en el desarrollo de hiponatremia	157
3.4. Influencia de la osmolaridad de la fórmula de NP, y del aporte total de volumen, sodio y osmoles en el desarrollo de hiponatremia.....	158
3.5. Factores de riesgo asociados al desarrollo de hiponatremia en pacientes con NP: análisis de regresión logística multivariante	159
4. Tratamiento pautado y eficacia en los pacientes con hiponatremia	160
4.1. Tipo de tratamiento administrado de la hiponatremia	160
4.1.1. Tratamientos en función del tipo de hiponatremia	161
4.1.2. Tratamiento adecuado ajustado al tipo de hiponatremia	161
4.1.3. Tipo de tratamiento administrado en el SIADH.....	162
4.1.4. Factores predictores de respuesta al tratamiento adecuado en el SIADH	163
4.2. Eficacia del tratamiento pautado a los pacientes con hiponatremia.....	164
4.2.1. Incremento de natremia y porcentaje de eunatremia a las 48-72 horas del inicio del tratamiento.....	164
4.2.2. Eficacia del tratamiento adecuado	167
5. Morbimortalidad asociada a la hiponatremia en pacientes con NP.....	172
5.1. Relación de la natremia y la hiponatremia en la mortalidad intrahospitalaria	172
5.1.1. Influencia de variables demográficas, clínicas y relacionadas con la NP en la mortalidad intrahospitalaria	172
5.1.2. Mortalidad intrahospitalaria en función de la natremia	174
5.1.3. Mortalidad intrahospitalaria en función de la presencia de hiponatremia	175
5.1.4. Mortalidad intrahospitalaria en función de la presencia de hiponatremia: análisis de regresión logística multivariante	176

5.2. Relación de la natremia y la hiponatremia en la estancia hospitalaria	178
5.2.1. Influencia de variables demográficas, clínicas y relacionadas con la NP en la estancia hospitalaria	178
5.2.2. Estancia hospitalaria en función de la natremia	180
5.2.3. Estancia hospitalaria en función de la presencia de hiponatremia	181
5.2.4. Estancia hospitalaria en función de la presencia de hiponatremia: análisis de regresión logística multivariante.....	182
V. DISCUSIÓN	185
1. Discusión general	187
2. Descripción de la población a estudio.....	190
3. Objetivo principal: Descripción del tipo y etiología de la hiponatremia	194
4. Primer objetivo secundario: Factores de riesgo de desarrollo de hiponatremia durante la administración de nutrición parenteral	200
5. Segundo objetivo secundario: Tratamiento pautado y efectividad en los pacientes con hiponatremia	206
6. Tercer objetivo secundario: Papel de la hiponatremia en la morbimortalidad asociada en pacientes con nutrición parenteral	211
7. Fortalezas y limitaciones del estudio.....	217
VI. CONCLUSIONES	219
VII. BIBLIOGRAFÍA	223
Anexos	237

ABREVIATURAS:

AAs: Aminoácidos	MNA: Mini-Nutritional Assessment
ACTH: Hormona adrenocorticotropa	MUST: Malnutrition Universal Screening Tool
ADH: Hormona antidiurética	Na: Sodio
AINEs: Antiinflamatorios no esteroideos	NaIn: Natremia intraindividual
AVP: Arginina-vasopresina	NaS: Natremia sérica
BilT: Bilirrubina total	NaU: Sodio urinario
Ca: Calcio	NE: Nutrición enteral
Cl: Cloro	NP: Nutrición parenteral
CRH: Hormona liberadora de corticotropina	NPT: Nutrición parenteral total
FA: Fosfatasa alcalina	OR: Odds Ratio
FC: Frecuencia cardiaca	OsmP: Osmolalidad plasmática
GEB: Gasto energético basal	OsmU: Osmolalidad urinaria
GET: Gasto energético total	P: Fósforo
GOT: Glutamato-piruvato transaminasa	PA: Presión arterial
GPT: Glutamato piruvato transaminasa	PCR: Proteína C reactiva
GGT: Gamma glutamil transpeptidasa	PVY: Presión venosa yugular
GTTK: Gradiente transtubular de potasio	RR: Riesgo Relativo
HC: Hidratos de carbono	RH: Restricción hídrica
HCUV: Hospital Clínico Universitario de Valladolid	RIQ: Rango intercuartílico
HR: Hazard Ratio	SDO: Síndrome de desmielinización osmótica
IC: Intervalo de confianza	SEEN: Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición
IECAs: Inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina	SIADH: Síndrome de secreción inadecuada de ADH
IMC: Índice de masa corporal	SSF: Suero salino fisiológico
ISP: Insuficiencia suprarrenal	SRAA: Sistema renina-angiotensina-aldosterona
ISRS: Inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina	TSH: Hormona estimulante del tiroides
K: Potasio	VCE: Volumen circulante efectivo
KS: Potasio sérico	VGS: Valoración global subjetiv
KU: Potasio urinario	

INDICE DE TABLAS

1. Diferencia entre los mecanismos que regulan el agua y el sodio.....	38
2. Subtipos y función de los receptores de arginina-vasopresina	43
3. Principales estudios sobre prevalencia de hiponatremia a nivel hospitalario.....	51
4. Principales estudios sobre mortalidad intrahospitalaria	54
5. Clasificación de la hiponatremia según las manifestaciones clínicas	62
6. Tipo de hiponatremia hipotónica según los signos de la exploración física y los hallazgos analíticos	67
7. Criterios diagnósticos del SIADH	72
8. Etiología del SIADH	73
9. Factores de riesgo de desarrollo de síndrome de desmielinización osmótica con la corrección de una hiponatremia crónica	79
10. Límites y objetivos de corrección de la hiponatremia en las primeras 24-48 horas del inicio de tratamiento	79
11. Estimación de la duración del SIADH según su etiología	84
12. Recomendaciones de tratamiento de la hiponatremia no grave por SIADH	87
13. Principales patologías que indican la nutrición parenteral	92
14. Controles bioquímicos recomendados durante la administración de la NP.....	98
15. Criterios diagnósticos de desnutrición	103
16. Factor de estrés de la enfermedad, por el cual se multiplica el gasto energético basal (GEB) para obtener el gasto energético total (GET)	118
17. Grado de estrés de enfermedad a partir del cual se obtienen los requerimientos de aminoácidos	118
18. Tipo de hiponatremia y etiologías de cada tipo de hiponatremia	125
19. Opciones de tratamientos adecuados para cada tipo de hiponatremia	126
20. Patologías asociadas al inicio de la nutrición parenteral	139
21. Características relacionadas con la valoración nutricional.....	140
22. Fármacos administrados al inicio y/o durante la administración de la NP	141
23. Características de la composición de la nutrición parenteral	144
24. Complicaciones asociadas a la nutrición parenteral	147

25. Determinaciones bioquímicas del estudio de hiponatremia estratificado por tipo de volemia clínica.....	152
26. Variables demográficas, comorbilidades previas y valoración nutricional en pacientes con y sin desarrollo de hiponatremia durante la NP	156
27. Tratamiento quirúrgico y otros cuadros clínicos en pacientes con y sin desarrollo de hiponatremia durante la administración de NP	157
28. Uso de fármacos en los pacientes con y sin desarrollo de hiponatremia durante la administración de la NP	158
29. Aporte total de volumen, sodio y osmoles y osmolaridad de la fórmula de la NP en pacientes con y desarrollo de hiponatremia durante la administración de NP	158
30. Factores de riesgo asociados al desarrollo de hiponatremia durante la administración de la NP	159
31. Tratamientos en función del tipo de hiponatremia	161
32. Factores predictores de ausencia de respuesta a la restricción de líquidos menor de 1 litro/día	164
33. Características demográficas, clínicas y relacionadas con la nutrición parenteral según la presencia de mortalidad intrahospitalaria.....	173
34. Mortalidad intrahospitalaria en función de la presencia de hiponatremia en la natremia intraindividual mínima, percentiles 25, 50 y 75, y máxima.....	176
35. Análisis de regresión logística multivariante: riesgo ajustado de mortalidad intrahospitalaria	177
36. Análisis de regresión logística multivariante: riesgo ajustado de mortalidad intrahospitalaria según la presencia de hiponatremia en los percentiles 25,50 y 75 de la natremia intraindividual	178
37. Características demográficas, clínicas y relacionadas con la nutrición parenteral según la estancia hospitalaria	179
38. Estancia hospitalaria mayor de 22 días en función de la presencia de hiponatremia en la natremia intraindividual mínima, percentiles 25, 50 y 75, y máxima.....	182
39. Análisis de regresión logística multivariante: riesgo ajustado de estancia hospitalaria mayor de 22 días	183
40. Análisis de regresión logística multivariante: riesgo ajustado de estancia hospitalaria mayor de 22 días según la presencia de hiponatremia en los percentiles 25,50 y 75 de la natremia intraindividual.....	184

INDICE DE FIGURAS

1. Corte transversal del eje hipotálamo-hipofisario	40
2. Relación de la osmolalidad plasmática respecto a la arginina - vasopresina plasmática, la osmolalidad urinaria y el volumen de diuresis	42
3. Comparación de la liberación de AVP en respuesta a los cambios percentuales de la osmolalidad (aumento) y la presión o el volumen (disminución).....	45
4. Relación entre la osmolalidad plasmática y la secreción de vasopresina, en base al estado de la volemia.....	46
5. Tipos de SIADH (A, B, C y D) en función de la respuesta de niveles circulantes de AVP a la infusión de suero salino hipertónico.....	49
6. Asociación entre el nivel de natremia y la mortalidad intrahospitalaria (Chawla et al. Clin J Am Soc Nephrol 2011).....	56
7. Asociación entre el nivel de natremia y la mortalidad intrahospitalaria, ajustada por edad, sexo y diabetes (Corona et al. PLoS One 2013)	57
8. Relación entre nivel de natremia sérica y duración de hospitalización (Corona et al. Am J Med 2016).....	61
9. Algoritmo diagnóstico de la hiponatremia	76
10. Patología que indica el inicio de la nutrición parenteral	142
11. Causa última que indica el inicio de la nutrición parenteral	143
12. Duración de la nutrición parenteral según rangos	143
13. Tipo de suero terapia administrada	145
14. Natremia al inicio de la nutrición parenteral	148
15. Natremia mínima, máxima, mediana, percentiles 25 y 75 durante la administración de la nutrición parenteral.....	149
16. Porcentaje de hiponatremia en la natremia mínima, percentiles y máxima de todas las determinaciones de natremia de cada uno de los pacientes.....	150
17. Frecuencia de hiponatremia global durante la administración de la NP, subdividida en hiponatremia al inicio y desarrollada durante la NP	150
18. Volemia clínica en los pacientes con hiponatremia	151
19. Etiología de la hiponatremia hipovolémica	153
20. Etiología de la hiponatremia euvolémica	153

21. Etiología de la hiponatremia hipervolémica.....	154
22. Tipos de tratamiento de la hiponatremia	160
23. Distribución de pacientes con tratamiento adecuado según el tipo de hiponatremia.....	162
24. Tipo de tratamiento adecuado recibido en los pacientes con SIADH.....	163
25. Incremento de natremia a las 48-72h en los pacientes con hiponatremia que recibieron tratamiento.....	165
26. Incrementos de natremia a las 48-72h en los pacientes con hiponatremia que recibieron tratamiento, según tipo de hiponatremia	166
27. Incrementos de natremia a las 48-72h en los pacientes con hiponatremia euvolémica que recibieron tratamiento, según su etiología	166
28. Incremento de natremia a las 48-72h en los pacientes que recibieron tratamiento adecuado ajustado al tipo de hiponatremia	167
29. Incrementos de natremia a las 48-72h en los pacientes con hiponatremia que recibieron tratamiento adecuado, según tipo de hiponatremia	168
30. Incrementos de natremia a las 48-72h en los pacientes con hiponatremia euvolémica que recibieron tratamiento adecuado, según su etiología	168
31. Porcentaje de pacientes que alcanzaron la eunatremia a las 48-72 horas con o sin el tratamiento adecuado.....	169
32. Porcentaje de tratamiento eficaz en función de la aplicación o no de un tratamiento adecuado según tipo de hiponatremia	170
33. Frecuencia de eunatremia en pacientes con y sin tratamiento adecuado de la hiponatremia, tanto en SIADH como en elevación fisiológica de la ADH.....	171
34. Natremia intraindividual mínima, máxima y en percentiles 25,50 y 75 según la presencia de mortalidad intrahospitalaria	174
35. Mortalidad intrahospitalaria en función del tipo de hiponatremia.....	175
36. Natremia intraindividual mínima, máxima y en percentiles 25,50 y 75 según la estancia hospitalaria	180
37. Estancia hospitalaria en función del tipo de hiponatremia	181

RESUMEN

RESUMEN

Introducción:

La hiponatremia, definida como la disminución de la concentración sérica de sodio o natremia (NaS), es el trastorno iónico más frecuente en la práctica clínica. Se trata fundamentalmente de un trastorno de la regulación del balance del agua, sin implicar una mayor o menor cantidad corporal de sodio. En general suele haber una alteración en la secreción de la arginina-vasopresina (AVP) u hormona antidiurética (ADH), que es la hormona que regula el metabolismo hídrico. Su prevalencia se estima en un 15-30% de los pacientes hospitalizados. Además de su elevada frecuencia, esta alteración se asocia con una mayor morbilidad, que puede disminuir tras la administración de un tratamiento que consiga la corrección de la hiponatremia. La respuesta eficaz al tratamiento sólo se suele lograr si éste se pauta en base al tipo y etiología de la hiponatremia (tratamiento adecuado). Por tanto, es importante identificar y realizar un correcto diagnóstico de la hiponatremia.

En pacientes con nutrición parenteral (NP) se ha descrito una mayor frecuencia de hiponatremia respecto al resto de pacientes hospitalizados. Aunque se haya justificado por la presencia de un mayor número de factores de riesgo que generan antidiuresis (náuseas, vómitos, dolor, cirugía, SIADH...), y de otros que provocan pérdidas extrarrenales de sodio (fístulas, diarrea, drenajes...), no hay estudios que hayan valorado la etiología de la hiponatremia en esta población específica. El tratamiento recomendado sigue las mismas premisas que el de la población general, pero por las particularidades del ajuste de sodio, osmoles y líquidos que conlleva, se considera necesaria una evaluación del mismo.

Objetivos:

El objetivo principal del estudio es conocer el tipo y la etiología de la hiponatremia en pacientes no críticos con NP de los hospitales españoles. Los objetivos secundarios son: 1) identificar los factores de riesgo de desarrollo de hiponatremia; 2) describir el tipo de tratamiento pautado y la eficacia del mismo; 3) valorar la morbilidad asociada

a la presencia de hiponatremia.

Material y métodos:

Estudio observacional, prospectivo y multicéntrico. Los pacientes fueron reclutados en las Unidades de Nutrición Clínica de 19 centros hospitalarios a nivel nacional, coordinados desde el Hospital Clínico Universitario de Valladolid (HCUV), con la colaboración del Área de Nutrición de la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición (SEEN). El proyecto fue aprobado por el Comité de Ética del HCUV. La estimación del tamaño muestral fue de 484 pacientes. Se incluyeron pacientes de planta de hospitalización durante la práctica clínica habitual, a los que se iniciaba NP total, durante un periodo de nueve meses (desde el 1 de junio de 2015 al 29 de febrero de 2016). La administración de la NP y el seguimiento clínico-analítico debía seguir el protocolo de estudio. En todos los pacientes se recogieron datos demográficos, de patologías previas, variables antropométricas y de valoración nutricional, composición de la NP, uso de fármacos, datos clínicos relacionados con la hiponatremia y datos analíticos. Se registró la cifra de natremia al inicio de la NP y todas las determinadas durante su administración. En los pacientes con hiponatremia ($\text{NaS} < 135 \text{ mmol/L}$) se valoró la volemia clínica (hipovolémia, euvolemia o hipervolemia) y se solicitó el estudio analítico de la misma (función renal, iones-osmolalidad en plasma y orina, cortisol basal y hormonas tiroideas). El tratamiento de la hiponatremia se pautó en función de la práctica clínica habitual de cada centro y también se especificó en el cuaderno de recogida de datos. Se realizó un análisis estadístico descriptivo de la incidencia, tipo y etiología de la hiponatremia, así como del tipo de tratamiento pautado y la respuesta al mismo. También se identificaron en modelos de regresión múltiple los principales factores de riesgo de hiponatremia, así como la asociación de hiponatremia con la morbimortalidad tras el ajuste por factores de confusión.

Resultados:

Se reclutaron 543 pacientes (39,8% mujeres) con una mediana de edad de 65 [57-76] años. El 56,4% de los pacientes presentaban patología neoplásica y recibieron tratamiento quirúrgico un 58,4%. Respecto al estado nutricional previo al inicio de la

NP, en un 36,2% se objetivó desnutrición grave y en un 33,3% desnutrición moderada. Las principales indicaciones de la NP fueron el reposo intestinal post-cirugía (36,5%), seguido del ileo paralítico (21,2%). La duración de la NP fue de 8 [6-12] días.

Entre las complicaciones metabólicas relacionadas con la NP, la hiponatremia (29,8%) fue la segunda más frecuente tras la hiperglucemia (43,8%). Un 14,2% de los pacientes presentaban hiponatremia al inicio de la NP y un 18,2% la desarrollaron durante la administración de la misma. La frecuencia de hiponatremia grave (<125 mmol/L) fue de 0,4%. Al comparar los pacientes con y sin desarrollo de hiponatremia con la NP, no se encontraron diferencias significativas en cuanto al volumen total de líquidos aportados, aporte total de sodio, osmoles ni osmolaridad de la fórmula de NP. En el análisis multivariante ajustado, se identificaron como factores de riesgo independientes para el desarrollo de hiponatremia: el sexo (mujer), la desnutrición grave, la presencia de náuseas y vómitos y el uso de opiáceos.

El tipo de hiponatremia más frecuente fue la euvolémica (67,9%), seguido de la hipervolémica (17,5%) y la hipovolémica (14,6%). Respecto a la etiología de la misma, entre los pacientes con hiponatremia hipovolémica, el 77% fue secundaria a pérdidas digestivas y en los pacientes con hiponatremia hipervolémica el 82,6% fue por insuficiencia cardíaca. En pacientes con hiponatremia euvolémica, el 37,6% fue a consecuencia de una elevación fisiológica de la AVP (dolor, náusea, estrés post-cirugía) y el resto (62,7%) por secreción inadecuada de ADH (SIADH). De este modo, el SIADH fue la etiología más frecuente de hiponatremia en los pacientes con NP.

De los 162 pacientes con hiponatremia, 111 (68,5%) recibieron tratamiento. De ellos, 94 pacientes disponían de una determinación de natremia a las 48-72 horas del inicio del tratamiento, momento en el que se alcanzó la eunatremia en un 61,7% (tratamiento eficaz). No se encontraron diferencias significativas en la eficacia del tratamiento al comparar los tres tipos de hiponatremia. Sin embargo, en el grupo de pacientes con hiponatremia euvolémica, el porcentaje de eunatremia fue significativamente superior en los pacientes con elevación fisiológica de la AVP respecto a los SIADH, 87,5% vs 42,2% ($p=0,002$). Sobre el tipo de terapia, el 78,4% de

pacientes recibió un incremento del aporte de sodio en la NP, bien de forma aislada o combinado con otro tratamiento. Únicamente, recibieron tratamiento adecuado (ajustado al tipo y etiología de la hiponatremia) un 55% de los pacientes. Respecto a su eficacia, el porcentaje de eunatremia fue significativamente superior en los pacientes con tratamiento adecuado (70,9%) frente a aquellos sin el mismo (29,1%). Como excepción, en los sujetos con SIADH, el porcentaje de eunatremia fue similar entre aquellos con (45%) y sin tratamiento adecuado (38,9%).

Un 13,6% de los pacientes fallecieron durante el periodo de hospitalización. En los sujetos que fallecieron se objetivó una mayor frecuencia de hiponatremia respecto a los no fallecidos, 49,3% vs 26,7% ($p < 0,001$). En el análisis multivariante ajustado, la hiponatremia se identificó como factor de riesgo independiente de mortalidad (OR 1,83 [1,03-3,24], $p = 0,039$). Este mayor riesgo de mortalidad, se incrementó más con la hiponatremia mantenida (75% de las natremias < 135 mmol/L) durante la administración de la NP (OR 3,99 [1,52-10,4], $p = 0,005$).

Respecto a la estancia hospitalaria, la mediana fue de 22 [15-36] días. La frecuencia de hiponatremia fue significativamente superior en los pacientes con mayor estancia hospitalaria (> 22 días) frente a los de menor estancia media (≤ 22 días), 39% vs 22% ($p < 0,001$). En el análisis multivariante ajustado, la hiponatremia se asoció de forma independiente a una mayor estancia hospitalaria (OR 1,83 [1,15-2,91], $p = 0,010$).

Conclusiones:

Aproximadamente un tercio de los pacientes con NP presentaron hiponatremia. La hiponatremia eurolémica fue el tipo de hiponatremia más frecuente y el SIADH la etiología principal. Los factores de riesgo más importantes de desarrollo de hiponatremia fueron el sexo femenino, la presencia de náuseas o vómitos, el uso de opiáceos y la desnutrición. En cuanto a su tratamiento, éste debe ajustarse al tipo y etiología de la hiponatremia, con el que se alcanzó una mayor eficacia, excepto en los pacientes con SIADH. Por otra parte, la hiponatremia se ha identificado como factor de riesgo independiente de mortalidad y mayor estancia hospitalaria.

INTRODUCCIÓN

La hiponatremia es el trastorno electrolítico más frecuente en la práctica clínica. A parte de su elevada prevalencia, su importancia radica en su asociación a un incremento de morbilidad y mortalidad. La realización de un correcto diagnóstico del tipo y etiología de la hiponatremia es esencial en la indicación del tratamiento de la misma. Con un tratamiento adecuado (ajustado al tipo y etiología de la hiponatremia) se han descrito mayores tasas de corrección de la hiponatremia, lo cual se puede relacionar a un descenso de morbilidad y mortalidad.

En pacientes con nutrición parenteral (NP), el abordaje diagnóstico-terapéutico de la hiponatremia recomendado por las guías de práctica clínica de las principales sociedades es similar al de población general, con las particularidades del ajuste de líquidos, sodio y osmoles que permite la NP. Sin embargo, hasta hace pocos años carecíamos de estudios al respecto. Gómez Hoyos et al. realizaron un primer análisis retrospectivo, en el que observaron que la hiponatremia era hasta dos veces más frecuente en los pacientes con NP respecto a sus controles, independientemente de la edad, el sexo, y el índice de comorbilidad de Charlson. Además, confirmaron la asociación entre la presencia de hiponatremia y el aumento de morbilidad y mortalidad en pacientes con NP. Entre las limitaciones del estudio que promovían la continuación en la investigación del tema, se señalaba la ausencia de la valoración del tipo y etiología de la hiponatremia. Al tener un carácter retrospectivo, no se realizó una valoración de la volemia, ni se pudieron recoger los factores de riesgo relacionados con el desarrollo de la hiponatremia, ni tampoco había un estudio analítico específico de la misma. Por otra parte, tampoco se pudo analizar la respuesta a los tratamientos administrados.

A raíz de este trabajo y los múltiples interrogantes e hipótesis que desencadenó, se promovió la realización del presente estudio prospectivo multicéntrico. Desde el Hospital Clínico Universitario de Valladolid (HCUV), con el liderazgo del Dr. Daniel de Luis y la Dra. Gómez Hoyos, se realizó el protocolo del estudio, que fue presentado al Área de Nutrición de la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición, celebrada en mayo de 2015. Allí se obtuvo la colaboración de otros 18 centros hospitalarios.

Inicié la colaboración en este estudio durante mi residencia en Endocrinología y

Nutrición, con el trabajo de campo de uno de los centros colaboradores, el Hospital Clínico San Carlos de Madrid. En este hospital me promovieron la inquietud en la investigación en estos campo. Posteriormente, con la confianza que depositaron en mí el Dr. Daniel de Luis y la Dra. Gómez Hoyos, continué con el trabajo de campo ya en el HCUV, así como con el análisis de los datos y la elaboración de la presente tesis doctoral.

La presente tesis doctoral ha dado lugar, hasta el momento, de dos comunicaciones orales a congresos nacionales:

Título: Etiología de la hiponatremia en pacientes con nutrición parenteral: estudio multicéntrico

Autores: Ana Ortolá Buigues, Emilia Gómez Hoyos, María Dolores del Olmo García, Ana Herrero Ruiz, Julia Álvarez Hernández, Diego Bellido Guerrero, Sandra Herranz Antolín, Carmen Tenorio Jiménez, María García Zafra, Daniel A. de Luis Román.

Congreso: 32 Congreso Nacional de la Sociedad Española de Nutrición Parenteral y Enteral (SENPE). Valladolid, 2017.

Tipo de comunicación: oral (CO.002)

Título: Incidencia y factores de riesgo de desarrollo de hiponatremia en pacientes con nutrición parenteral: estudio multicéntrico

Autores: Emilia Gómez Hoyos, Ana Ortolá Buigues, Alfonso Vidal Casariego, Yaiza García Delgado, María Julia Ocón Bretón, Ángel Luis Abad González, Luis Miguel Luengo Pérez, Pilar Matía Martín, María José Tapia Guerrero, Daniel A. de Luis Román.

Congreso: 32 Congreso Nacional de la Sociedad Española de Nutrición Parenteral y Enteral (SENPE). Valladolid, 2017.

Tipo de comunicación: oral (CO.003)

Por otra parte, también ha recibido el reconocimiento nacional con la obtención de la Beca Fundación SEEN en Nutrición Clínica, durante el 58º Congreso de la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición (SEEN) en Málaga (octubre 2016).

I. ANTECEDENTES Y ESTADO ACTUAL DEL TEMA

1. FISIOPATOLOGÍA DE LA HIPONATREMIA

La hiponatremia se define como la concentración sérica de sodio por debajo del límite de la normalidad (< 135 mmol/L). Se trata fundamentalmente de un trastorno de la regulación del balance del agua, sin implicar una mayor o menor cantidad corporal de sodio. En general suele haber una alteración en la secreción de la arginina-vasopresina (AVP) u hormona antidiurética (ADH), que es la hormona que regula el metabolismo hídrico.

Para entender los mecanismos fisiopatológicos que intervienen en el desarrollo de hiponatremia, es preciso revisar las bases fisiológicas que regulan el metabolismo del agua y del sodio.

1.1. Regulación del balance del agua y del sodio

Los mecanismos que regulan el agua y el sodio tienen algún punto en común, pero al presentar varias diferencias, se explicarán de manera independiente.

1.1.1. Distribución del agua corporal total

Aproximadamente el 50-60% del cuerpo humano del adulto es agua. Este porcentaje puede variar según la edad, el sexo y el porcentaje de masa grasa corporal. A mayor edad, el porcentaje de agua corporal total se reduce debido al aumento de la masa grasa. Por esta misma razón, las mujeres presentan alrededor de un 10% menos de agua corporal total respecto a los hombres (1).

El agua corporal total se distribuye en dos compartimentos: líquido intracelular (dos tercios; 40% del peso corporal) y líquido extracelular (un tercio; 20% del peso corporal). El líquido intracelular está separado del extracelular por una membrana celular que tiene una permeabilidad selectiva (muy permeable al agua y prácticamente nula a la mayoría de los electrolitos) (1).

A su vez, los compartimentos más importantes en los que se divide el líquido

extracelular son: líquido intersticial (dos tercios del agua extracelular) y plasma sanguíneo (un tercio del agua extracelular). Estos compartimentos tienen prácticamente la misma composición, excepto una mayor concentración de proteínas en el plasma sanguíneo. Ello se debe a que están separados por membranas capilares con poros permeables a casi todos los solutos excepto a las proteínas. (1).

1.1.2. Ósmosis, osmoles, osmolalidad y tonicidad

La ósmosis es la difusión neta de agua a través de una membrana con una permeabilidad selectiva, desde una región con mayor concentración de soluto a una con menor. En el cuerpo humano, la distribución del líquido entre los compartimentos intracelular y extracelular se debe al efecto osmótico de los solutos, en especial del sodio (Na). El agua se desplaza a través de la membrana celular por este mecanismo, siempre hacia el medio más osmótico, hasta que su concentración a ambos lados se iguala (1,2).

Los osmoles de una solución son el número total de solutos con actividad osmótica. El sodio es el principal electrolito y osmol del compartimento extracelular, mientras que el potasio (K) lo es del compartimento intracelular. La distribución diferencial del sodio y potasio se regula por la bomba Na-K ATPasa de la membrana celular. En el caso del plasma, a parte del sodio, otros solutos importantes son la glucosa y la urea. La osmolalidad (cantidad de osmoles por litro) plasmática se puede calcular mediante la fórmula: $2 \times \text{sodio (mmol/L)} + \text{glucosa (mg/dl)}/18 + \text{urea (mg/dl)}/6$. La concentración de osmoles eficaces (capaces de movilizar el agua a través de una membrana con permeabilidad selectiva) se denomina tonicidad (u osmolaridad efectiva). La tonicidad plasmática se estima con la fórmula: $2 \times \text{sodio (mmol/L)} + \text{glucosa (mg/dl)}/18$; y es que la urea se considera un osmol ineficaz al difundir libremente entre las membranas y no crear gradiente osmótico (no desplaza el agua) (1,2).

Por todo ello se entiende que el sodio es el principal componente de la osmolalidad y tonicidad plasmática. Cambios en la tonicidad plasmática conllevan modificaciones en la concentración de agua intracelular. Si baja la osmolalidad del plasma (hiponatremia),

entrará agua en el compartimento intracelular y si sube (hipernatremia), saldrá agua del compartimento intracelular al espacio extracelular (2).

1.1.3. Regulación del balance del agua

El objetivo de la regulación del balance del agua es mantener constante la tonicidad plasmática y su distribución relativa de agua en los distintos compartimentos (tabla nº 1) (3). Dado que el sodio es el principal componente de la osmolalidad y tonicidad plasmática, su concentración nos permite conocer la osmolalidad del líquido extracelular, y por tanto del intracelular, siendo ambas idénticas al separarse por una membrana permeable al agua.

Los cambios de osmolalidad plasmática (rango normal 280-295 mOsmol/kg) son detectados por los osmorreceptores situados en el hipotálamo. En caso de hiperosmolalidad (menor proporción de agua que de sodio), los osmorreceptores estimularán el centro de la sed y la secreción de AVP para la reabsorción de agua a nivel renal. Por contra, en caso de hiposmolalidad (mayor proporción de agua que de sodio), se suprime la secreción de AVP, con la consecuente excreción renal de agua (2,3).

1.1.4. Regulación del balance del sodio

Por su parte, el objetivo de la regulación del balance del sodio es mantener el volumen extracelular (tabla nº 1), el cual depende de la cantidad total de sodio y no de su concentración plasmática (3).

Las modificaciones del volumen extracelular son detectadas por los barorreceptores, que se estimulan ante cambios de presión en el árbol arterial, es decir, cambios en el volumen circulante efectivo (VCE). En general, un incremento o descenso de VCE indica un cambio de volumen intersticial en el mismo sentido, a excepción de la insuficiencia cardíaca y la descompensación hidrópica por insuficiencia hepática donde puede haber VCE disminuido y un volumen intersticial aumentado. Tras un descenso del VCE (hemorragia, pérdidas digestivas,...), los barorreceptores estimulan el sistema renina-

angiotensina-aldosterona (SRAA) y el sistema nervioso simpático, generándose un incremento de la reabsorción renal de sodio, y al mismo tiempo hay un aumento de secreción de AVP, con la correspondiente reabsorción renal de agua. Por el contrario, ante un aumento del VCE (sobrecarga de volumen,...), los barorreceptores situados en la aurícula incrementan la síntesis de péptidos natriuréticos, aumentando la excreción renal de sodio (y agua por efecto osmótico) (2,3).

Tabla nº 1. Diferencia entre los mecanismos que regulan el metabolismo del agua y el sodio.

	Mecanismos que regulan el sodio	Mecanismos que regulan el agua
Objetivo	Regular el volumen extracelular	Regular la tonicidad plasmática
¿Qué miden?	Volumen circulante efectivo	Osmolalidad plasmática
Sensores aferentes	Detectan cambios en el volumen circulante eficaz: barorreceptores en seno carotídeo auricular y arteriola renal aferente	Detectan cambios en la osmolalidad: osmorreceptores hipotalámicos
Acciones eferentes	Modifican la excreción renal de sodio: - Filtrado glomerular - Tono simpático - Sistema renina-angiotensina-aldosterona - Prostaglandinas - Péptidos natriuréticos - AVP	Modifican: - Ingesta de agua por la sed - Excreción de agua por la AVP

Adaptado de Alcázar R et al. Nefrología 2011

AVP = Arginina-vasopresina

1.2. Papel del riñón en el equilibrio hídrico

En condiciones fisiológicas, en un paciente de edad media sin ningún tipo de disfunción renal, el riñón filtra 180 litros de plasma al día, de los que reabsorbe más del 80% a lo largo de la nefrona proximal. El túbulo proximal reabsorbe agua y sodio de forma isotónica, lo que permite que a la curvatura del asa de Henle lleguen 20 litros de fluido, punto a partir del cual la nefrona se hace impermeable al agua hasta llegar al túbulo

colector regulado por la AVP. A lo largo del asa ascendente de Henle se produce una reabsorción selectiva sólo de electrolitos, lo que tiene como resultado un aumento de la osmolalidad del intersticio medular hasta 900 mOsm/kg y una disminución progresiva de la osmolalidad urinaria. Al llegar al túbulo colector hay 20 litros de orina, con una osmolalidad urinaria en torno a 50 mOsm/kg. Cuando la orina atraviesa el túbulo colector, una buena parte de la urea que contiene se equilibra con el intersticio medular, lo que aumenta la osmolalidad del mismo desde 900 hasta 1500 mOsm/kg. Para esto es necesario ingerir suficientes proteínas que generen urea (3,4). Además, según el grado de secreción de AVP, a nivel del túbulo colector se provocará una mayor o menor eliminación de agua libre.

Por lo tanto, aunque un riñón sano tenga capacidad para eliminar una ingesta diaria de 20 litros de agua, no puede realizarlo sin un mínimo aporte de soluto. Para que funcionen correctamente los mecanismos de concentración y dilución de la orina, es necesario que a la horquilla de Henle llegue sodio y sea absorbido por los segmentos distales, así como cierta ingesta proteica que aporte urea para aumentar la osmolalidad del intersticio medular. Por cada litro de líquido que elimina, necesita como mínimo 50-60 mOsm de soluto. Cada mmol de sodio, potasio, cloro y urea contribuye a 1 mOsm. La urea se genera a partir del metabolismo de las proteínas; cada 10 gramos de proteínas dan lugar a 50 mmol de urea. En ausencia de un consumo suficiente de proteínas y sal, todos los líquidos ingeridos no se excretan adecuadamente y se originará una hiponatremia (4).

Por el contrario, ante una ingesta exclusiva de soluto, el riñón concentrará al máximo la orina para mantener constante la osmolalidad plasmática, y si persiste la ausencia de ingesta de agua se producirá hipernatremia (5).

1.3. Papel de la arginina-vasopresina u hormona antidiurética

1.3.1. Mecanismo de síntesis y liberación de arginina-vasopresina

La AVP es un nonapéptido formado por un anillo de seis aminoácidos, con un enlace

cisteína-cisteína y una cola de tres aminoácidos. Se sintetiza en el cuerpo de las neuronas de los núcleos supraóptico y paraventricular del hipotálamo, cuyos axones distales alcanzan la neurohipófisis, donde se almacena en gránulos neurosecretores hasta su secreción (6) (figura nº 1).

Figura nº 1: Corte transversal del eje hipotálamo-hipofisario. Se visualiza la terminación de las neuronas magnocelulares en la neurohipófisis y la terminación de las neuronas parvocelulares del núcleo paraventricular, en el plexo de la eminencia media o en otras partes del cerebro.

El núcleo supraóptico del hipotálamo está compuesto principalmente por neuronas magnocelulares; el 80-90% sintetizan AVP (el resto oxitocina) y todos los axones se proyectan hacia la neurohipófisis. Por su parte, solo un 15-20% de las neuronas del núcleo paraventricular sintetizan AVP, y su composición es más compleja, estando dividido en 2 partes: parte dorsolateral, formada por neuronas magnocelulares que sintetizan sobretodo AVP y oxitocina; y parte dorsomedial constituida por neuronas parvocelulares que sintetizan además otros péptidos, como la hormona liberadora de

corticotropina (CRH), de tirotropina (TRH), somatostatina, y opioides. Las neuronas parvocelulares se proyectan hacia la eminencia media, tronco cerebral y médula espinal, donde ejercen su función (6). El déficit de hormona adrenocorticotropa (ACTH), al producir un descenso de la cortisolemia, induce una elevación de la secreción de CRH, acompañado por un incremento de la AVP sintetizada en la porción parvocelular del núcleo paraventricular (7,8).

Cuando un estímulo de secreción de la AVP, actúa sobre el cuerpo de la neurona magnocelular, se genera una respuesta rápida mediante un potencial de acción que se propaga por el axón hasta terminar en la neurohipófisis. El potencial de acción provoca un flujo de entrada de calcio que induce el movimiento de los gránulos neurosecretores hasta fundirse con la membrana celular y secretar todo su contenido hacia el espacio perivascular y posteriormente hacia el sistema capilar de la neurohipófisis. Los estímulos de secreción de la AVP también aumentan su síntesis a través de la activación de la transcripción, con un incremento del contenido de ARN mensajero en las neuronas magnocelulares. Sin embargo, la síntesis de AVP es más lenta que su secreción. De hecho, en animales de experimentación se ha observado que los gránulos neurosecretores de la neurohipófisis tardan unos 7-14 días en recuperar su contenido tras una liberación importante de AVP (9).

1.3.2. Regulación de la secreción de la arginina-vasopresina

La osmolalidad plasmática es el principal estímulo para la secreción de AVP. Otros estímulos fisiológicos no osmóticos son: el descenso del volumen circulante efectivo, las náuseas o vómitos, el dolor, algunos fármacos...

1.3.2.1. Regulación osmótica de la secreción de arginina-vasopresina

En condiciones basales, el nivel plasmático de AVP oscila entre 0,5 y 2 pg/uL. Un aumento de la osmolalidad plasmática de tan sólo el 1% provoca un incremento rápido de la AVP en plasma. Este aumento es secundario a la liberación de ésta a partir de su reserva en la neurohipófisis. En general, cada incremento de 1 mOsm/kg en la

osmolalidad produce un aumento plasmático de AVP de 0,4 a 0,8 pg/ml, manteniéndose una relación lineal incluso por encima de los valores normales (10) (figura nº 2). El aumento de la osmolalidad urinaria también es directamente proporcional al incremento de AVP, en niveles plasmáticos de AVP entre 0,5 y 4-5 pg/ml. Por encima de este rango, la osmolalidad urinaria no aumenta más, siendo su máximo de 1000 – 1200 mOsm/kg. Esto es debido a la influencia de la osmolalidad de la zona interna de la médula renal (11) (figura nº 2). En la figura nº 2 también se muestra la relación de la osmolaridad urinaria y los niveles de AVP con el volumen de orina. Suponiendo la presencia de una sobrecarga osmolar constante, se observa una relación logarítmica (a mayor osmolalidad urinaria y niveles de AVP, disminuye el volumen de diuresis)

Figura nº 2: Relación de la osmolalidad plasmática (mOsm/kg) respecto a la arginina - vasopresina plasmática (pg/ml), la osmolalidad urinaria (mOsm/kg) y el volumen de diuresis (L/día).

En la zona sombreada se muestra la interrelación de las tres gráficas en el intervalo normal. El volumen de orina se modifica relativamente poco hasta que la ausencia de AVP es casi completa

Adaptado de Robinson AG. Williams tratado de Endocrinología, 2009.

*POsm = Osmolalidad plasmática; OOsm = Osmolalidad urinaria;
O Volumen = volumen de orina; PAVP = arginina-vasopresina plasmática*

Ante un incremento de osmolalidad plasmática, en las células osmorreceptoras se produce una salida de agua por efecto osmótico, con una retracción secundaria, lo cual desencadena su activación. Estos osmorreceptores están situados en varias áreas del cerebro (núcleo supraóptico hipotalámico, el órgano subfornical y el plexo vascular de la lámina terminalis) (12). Tras su activación, envían señales nerviosas a las neuronas del núcleo supraóptico y paraventricular, desencadenando así el incremento de síntesis y secreción de AVP por la neurohipófisis.

Una vez en plasma, la AVP circula libremente, con una semivida de tan solo unos 15 minutos, y puede unirse a 3 tipos de receptores acoplados a proteína G: V1a, V1b ó V3, y V2 (tabla nº 2).

Tabla nº 2: Subtipos y función de los receptores de arginina-vasopresina.

	Localización	Función
V1a	Músculo liso vascular	Vasoconstricción, hipertrofia miocárdica
	Plaquetas	Agregación plaquetaria
	Hepatocitos	Glucogenolisis
	Miometrio	Contracción uterina
V1b (V3)	Adenohipófisis	Osmolalidad plasmática
V2	Membrana basolateral del túbulo colector	Inserción de los canales de agua (acuaporinas 2) en la membrana apical del túbulo colector; inducción de síntesis de acuaporinas 2
	Endotelio vascular	Estimulación de la producción del factor VIII y Von Willebrand de la coagulación
	Músculo liso vascular	Vasodilatación

La AVP ejerce su principal función a nivel renal, a través de su unión al receptor V2 situado en la membrana basolateral del túbulo colector. Tras ello se activa una cascada de señalización intracelular (adenosin monofosfato cíclico (AMPc)/proteína kinasa A), que provoca un incremento de AMPc y la fusión de las vesículas intracitoplásmicas que contienen los canales de agua (acuaporinas tipo 2) con la membrana apical, originando así un incremento de la permeabilidad al agua y por tanto su reabsorción hacia el intersticio renal (disminución volumen de diuresis e incremento de osmolalidad

urinaria). A parte de la mayor expresión de acuaporinas 2, la AVP actúa sobre el cotransportador Na-K-Cl en el asa ascendente de Henle, incrementando la reabsorción de sodio al intersticio medular (13). También aumenta la permeabilidad a la urea en el túbulo colector, activando sus transportadores (UTA-1 y 3). Estas dos últimas acciones mantienen un gradiente osmótico entre el espacio intersticial y la luz intraluminal, necesario para la absorción de agua. A parte de la acuaporina tipo 2 de la membrana apical del túbulo colector, hay otras acuaporinas descritas a nivel renal, no reguladas por la AVP, como la acuaporina tipo 1 de la membrana apical y basolateral del túbulo proximal y asa descendente de Henle, y las acuaporinas tipo 3 y 4 de la membrana basolateral del túbulo colector (14).

1.3.2.2. Regulación no osmótica de la secreción de arginina-vasopresina

El estímulo no osmótico de la secreción de AVP suele ser el responsable del desarrollo de hiponatremia en la gran mayoría de los casos. El incremento de AVP disminuye la eliminación de agua libre, con lo que se produce una dilución del sodio plasmático (15). A continuación se van a describir los principales estímulos no osmóticos y sus mecanismos fisiopatológicos:

- A. Descenso del volumen circulante efectivo: el descenso del VCE es captado por los barorreceptores que, además de activar el SRAA, también promueven el aumento de AVP. Se postula que el descenso de VCE disminuye la inhibición que ejercen los barorreceptores sobre las neuronas magnocelulares, provocando así la liberación de AVP (6). La secreción de AVP que generan los barorreceptores es mucho menos sensible que la de los osmorreceptores. Se necesita un descenso del VCE de hasta un 10-15% para generar un incremento de AVP. Mientras el nivel de presión arterial se mantenga por los reflejos simpáticos, las variaciones de volumen plasmático ejercen un efecto escaso en la secreción de la AVP. Cuando la hipovolemia es de mayor magnitud y se acompaña de un descenso significativo de la presión arterial, se produce un aumento brusco y exponencial de la AVP (16), tal y como se observa en la figura nº 3.

Figura nº 3: Comparación de la liberación de AVP en respuesta a los cambios porcentuales de la osmolalidad (aumento) y la presión o el volumen (disminución).

También se ha descrito que con el descenso del VCE, se produce un aumento de la sensibilidad de los osmorreceptores y del potencial de acción en las neuronas del núcleo supraóptico, por la angiotenina II. De tal manera que la respuesta a los cambios de osmolalidad en pacientes con déficit de volumen plasmático es mucho mayor que en pacientes con volumen plasmático normal (17,18) (figura nº 4).

Figura nº 4: Relación entre la osmolalidad plasmática y la secreción de vasopresina, en base al estado de la volemia. La línea denominada “N”, representa la asociación lineal de ambas variables en euvolemia. Cada número al final de línea, indica el porcentaje de cambio de volumen.

- B. Otros estímulos (náuseas, vómitos, dolor, estrés, cirugía): la sensación de náusea, con o sin vómito, es el estímulo de secreción de AVP más potente conocido. Puede provocar un ascenso de AVP de hasta 200 – 400 pg/ml. El mecanismo no es bien conocido, pero se sospecha un estímulo de la AVP por la contracción del músculo liso abdominal (19). Por otra parte, situaciones de estrés, como por ejemplo el dolor, la hipoglucemia y la cirugía estimulan la liberación de noradrenalina dentro de los núcleos hipotalámicos, acompañada de una secreción de AVP, principalmente por neuronas parvocelulares.

1.4. Fisiopatología del síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética (SIADH)

El SIADH se debe a la producción endógena de AVP, sin un estímulo fisiológico que lo justifique. Esta producción puede ser ectópica (desde tejido tumoral) o eutópica (desde la neurohipófisis). Los niveles de AVP se encuentran dentro de unos intervalos normales en la mayor parte de los casos, pero se consideran anormales en relación con la osmolalidad plasmática (20).

Aunque los pacientes con SIADH presenten una euvolemia clínica (ausencia de signos de tercer espacio ni de hipovolemia), fisiopatológicamente se caracterizan por un exceso de agua en el compartimento extracelular (aumento del VCE), lo cual provoca la dilución del sodio plasmático. El grado de hiponatremia será proporcional al exceso de agua extracelular. Por otra parte, el aumento del VCE es detectado por los barorreceptores, produciéndose una supresión del SRAA y un aumento del péptido natriurético atrial, con el efecto natriurético que generan ambos. La finalidad de ésta eliminación renal de sodio es contrarrestar el aumento del volumen extracelular. De esta manera empeora la hiponatremia, agravándose aún más ante un bajo consumo de sodio (21,22).

Afortunadamente, existe un mecanismo de defensa (“escape a la ADH”) para limitar el descenso progresivo de natremia cuando los niveles de AVP persisten elevados y el aporte de líquidos es continuo. Se ha descrito que a nivel renal se inhiben los canales de acuaporina 2 (a través de la internalización del receptor V2, con disminución de la transcripción y transporte de las acuaporinas) y de los transportadores de sodio y urea, contribuyendo al aumento de excreción de soluto y arrastre de agua (23).

1.4.1. Patrones de secreción de arginina vasopresina: tipos de SIADH

Mediante estudios de los niveles plasmáticos de AVP en respuesta a aumentos graduales de la osmolalidad con la administración de suero salino hipertónico en pacientes con SIADH, se han identificado 4 patrones de secreción de AVP (figura nº 5) (10):

- Tipo A: hipersecreción de AVP aleatoria, sin ninguna regulación. Es el patrón de secreción anormal de AVP más frecuente (40%), siendo especialmente importante en la secreción ectópica tumoral.
- Tipo B: liberación basal mantenida de AVP, inadecuada y no suprimible, aunque con secreción normal en respuesta a unas variaciones osmolares superiores a la osmolalidad plasmática normal. Puede verse en la secreción ectópica, en el SIADH de causa farmacológica y en el SIADH de diversas etiologías.
- Tipo C: también denominado “reset osmostat”; secreción de AVP a un umbral anormalmente bajo de osmolalidad plasmática, aunque con respuesta normal y relación lineal con aumentos de osmolalidad superiores a este umbral. Como la secreción de AVP se suprime por debajo de un límite de osmolalidad, estos pacientes no desarrollan hiponatremias severas, permaneciendo la natremia entre 125-135 mmol/L. Puede ser de causa genética, tumoral, farmacológica y por enfermedad del sistema nervioso central, aunque es muy poco frecuente.
- Tipo D: niveles de AVP plasmáticos bajos o indetectables, con las características clínicas del SIADH. Se denomina también síndrome nefrogénico de antidiuresis inadecuada. Se ha atribuido a la presencia de mutaciones activadoras del receptor V2 o a un aumento de la sensibilidad a los efectos de la AVP.

Recientemente esta clasificación del SIADH ha sido reevaluada por Fenske et al. mediante la determinación de copeptina tras infusión de suero salino hipertónico en pacientes con SIADH. El paciente con “reset osmostat” parece excepcional, siendo más frecuente una especie de combinación del mismo con el tipo B. El tipo D no sería siempre por una mutación del receptor V2, y podría responder a vaptanes. Además, habría un tipo E, o “reset barostat”, caracterizado por alteración en la inhibición no osmótica de la AVP, probablemente acompañado por un defecto en la osmorregulación (24).

Figura nº 5: Tipos de SIADH (A, B, C y D) en función de la respuesta de niveles circulantes de AVP a la infusión de suero salino hipertónico. La zona sombreada representa los niveles de AVP en personas normales.

2. EPIDEMIOLOGÍA DE LA HIPONATREMIA

La hiponatremia es el trastorno electrolítico más frecuente, tanto en el medio hospitalario como en el ambulatorio (25). Su prevalencia e incidencia varían según la definición de hiponatremia y la población estudiada. Los principales estudios realizados han sido en el contexto hospitalario, y en determinadas patologías (por ejemplo, en cuidados intensivos, servicios quirúrgicos, insuficiencia cardíaca...).

2.1. Epidemiología de la hiponatremia a nivel ambulatorio

A nivel ambulatorio los estudios son limitados, pero la prevalencia de natremia menor de 135 mmol/L se estima entre el 2% y 8% (26–28). Los principales estudios son el de Hawkins et al, que encontraron una prevalencia de hiponatremia de un 4,3% (a partir de determinaciones analíticas de Centros de Salud) (27), y el de Gankam-Kengne de 2013, con una prevalencia del 6% (a partir del Dallas Health Study, de 3500 sujetos de todas las edades y etnias) (26).

2.2. Epidemiología de la hiponatremia a nivel hospitalario

En el ámbito hospitalario la frecuencia de hiponatremia es mayor que en el ambulatorio. De hecho, se ha observado que la media de natremia en pacientes hospitalizados es hasta 5-6 mmol/L menos que en pacientes sanos ambulatorios (29). La prevalencia de hiponatremia a nivel hospitalario se estima entre el 15 % y el 30% (27,30–33). En la tabla nº 3 se describen los principales estudios publicados. En un metanálisis posterior de Corona et al, donde se incluyeron 81 (850222 pacientes), la prevalencia obtenida fue de 17,4% (34). En general, dos tercios de los pacientes con hiponatremia ya la presentan al ingreso, y el tercio restante la adquiere durante la hospitalización (27,31,32). Esta relación no se mantiene en los casos de hiponatremia moderada-grave, siendo más frecuente su desarrollo o empeoramiento tras el ingreso (27,30).

Tabla nº 3: Principales estudios sobre prevalencia de hiponatremia a nivel hospitalario.

	Natremia (mmol/L)	Tamaño muestral	Frecuencia total (%)	Frecuencia hiponatremia ingreso (%)	Frecuencia hiponatremia adquirida (%)
Hawkins et al (2003) (27)	<136	43249	42,6	28,2	14,4
	<126		6,2	2,5	3,7
	<116		1,2	0,5	0,7
Hoorn et al (2006) (30)	<136	5437	30,0	(-)	(-)
	<126		2,6	1,8	1,8
Waikar et al (2009) (31)	<135	98411	19,7	14,5	5,2
	<130		(-)	2,5	(-)
	<125		(-)	0,6	(-)
	<120		(-)	0,2	(-)
Wald et al (2010) (32)	<138	53236	57,9	37,9	20,0

En algunas patologías, por diferentes factores fisiopatogénicos y etiológicos, la incidencia de hiponatremia es mayor. Es el caso de la insuficiencia cardíaca, cuya prevalencia a nivel hospitalario se estima entre un 20% y 30% (35) o de la cirrosis hepática, que puede afectar hasta al 50-60%, siendo más frecuente en aquellos con una insuficiencia hepática con ascitis (36). En pacientes con neoplasia, especialmente con cáncer de pulmón y cabeza-cuello, se ha encontrado una prevalencia de hiponatremia al ingreso del 23%, y hasta un 24% la desarrollan durante la hospitalización (37). En determinadas enfermedades neurológicas, como la hemorragia subaracnoidea, la incidencia de hiponatremia se estima entre el 30% y 60% (38,39), en el traumatismo craneoencefálico entre 14 y 17% (40,41), y en la meningitis tuberculosa entre el 64-85% (42,43). En pacientes neuroquirúrgicos se ha comunicado hiponatremia hasta en un 50% de los casos (44). Y por su parte, en patología pulmonar, en pacientes hospitalizados por neumonía se ha observado una prevalencia de hiponatremia entorno a un 28% (45) y una frecuencia similar durante una agudización de una enfermedad pulmonar obstructiva crónica (46).

En pacientes con nutrición parenteral (NP), en un reciente estudio de Gómez-Hoyos et al. se obtuvo una frecuencia de hiponatremia (natremia < 135 mmol/L) al inicio de la NP del 19,8%, desarrollándose durante su administración en el 28% de los sujetos sin hiponatremia inicial. Al comparar estos datos con un grupo control, la frecuencia de

hiponatremia fue próxima al doble en pacientes con vs sin NP, independientemente de la edad, sexo y el índice de comorbilidad de Charlson (Odds Ratio (OR) 1,8 [IC 95%: 1,1-2,9], $p=0,006$) (47).

2.3. Factores de riesgo de desarrollo de hiponatremia

La elevada frecuencia de hiponatremia hospitalaria se debe al aumento de factores que influyen en su desarrollo. En general, el mecanismo considerado más importante por el que estos factores causan hiponatremia es el incremento de la secreción de la AVP, con la consiguiente dificultad en la eliminación de agua libre. También pueden sumarse las pérdidas renales o extra-renales de sodio, exacerbando el cuadro de hiponatremia. Los principales factores de riesgo recogidos en la literatura son:

- Sexo femenino: se han descrito diferencias en el mecanismo de transporte celular de sodio y en la distribución del agua corporal total (48). Por otra parte, el riesgo relativo de encefalopatía hiponatrémica es 28 veces superior al de los hombres (49).
- Edad avanzada: se relaciona a la menor capacidad renal para eliminar agua libre de electrolitos, una mayor excreción de sodio y a la alteración de la composición corporal (aumento del agua corporal total) (50). Además, los pacientes ancianos pueden presentar otros factores de riesgo añadidos: uso de fármacos, enfermedades asociadas a la hiponatremia (insuficiencia cardíaca, enfermedades neurológicas, neoplasia...), baja ingesta de solutos... En general, la incidencia de hiponatremia, así como su gravedad neurológica, incrementa conforme se aumenta la edad (27,51).
- Náuseas, vómitos o dolor: estímulos no osmóticos que aumentan la secreción de AVP, con descenso secundario de la acuarexis (19).
- Cirugía: tras la misma se genera una situación de antidiuresis debido a una serie de factores: la dieta absoluta; el uso de soluciones hipotónicas para la preparación del intestino; la vasoplejía asociada a la inducción de la anestesia que obliga a infundir soluciones intravenosas; la apertura de la piel y la tracción

de las vísceras desencadenan reflejos simpáticos y parasimpáticos; el catabolismo aumentado asociado a la activación adrenérgica aumenta la producción de agua libre; los anestésicos derivados de la morfina estimulan la AVP; las náuseas y el dolor (52). En un estudio prospectivo de Cheung et al, un 4,4% de los pacientes quirúrgicos desarrollaron hiponatremia (natremia < 130 mmol/L) en la primera semana de la intervención quirúrgica (53).

- Fármacos: múltiples fármacos pueden favorecer el desarrollo de hiponatremia por diferentes mecanismos. Entre ellos destacan los diuréticos (sobre todo los tiazídicos), los que estimulan la secreción no osmótica de AVP (antiepilépticos, antidepresivos tricíclicos o inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, quimioterápicos, gabapentina/pregabalina, inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina...) (tabla nº 8), o los que pueden generar hipoaldosteronismo (inhibidores del SRAA, heparina, cotrimoxazol...) (54).
- Pérdidas renales o extrarrenales de sodio: vómitos, diarrea, obstrucción intestinal, hemorragia, uso de diuréticos, hipoaldosteronismo... Todos ellos pueden provocar una hiponatremia con descenso del VCE.
- Uso de líquidos hipotónicos: en pacientes hospitalizados, por la presencia de múltiples factores que dificultan la acuarexis, el uso de soluciones hipotónicas es previsible que genere un descenso de la natremia. De hecho, se sugiere que es la principal causa de hiponatremia adquirida en el hospital (55). En el estudio prospectivo de Cheung et al. de hiponatremia postquirúrgica, un 94% de los pacientes recibían líquidos hipotónicos en el momento del diagnóstico de la hiponatremia (53). En niños, en ensayos clínicos que compararon la administración de líquidos isotónicos frente a hipotónicos en Unidades de Cuidados Intensivos y en el periodo postoperatorio, se confirmó el incremento de riesgo de hiponatremia con la administración de soluciones hipotónicas (56).
- Inflamación: por sí misma también parece aumentar el riesgo de hiponatremia. El mecanismo por el que se produce es desconocido, pero se sugieren varias hipótesis. Una de las más estudiadas es el efecto del incremento de la interleucina 6, que puede estimular la secreción de AVP por diversas vías (57).

3. MORBIMORTALIDAD ASOCIADA A HIPONATREMIA

La relación entre la hiponatremia con el aumento de mortalidad y morbilidad está ampliamente descrita, aunque es difícil establecer la causalidad.

3.1 Mortalidad asociada a hiponatremia a nivel ambulatorio

En población general se ha observado un incremento de mortalidad en sujetos con hiponatremia, aunque el número de estudios es más limitado que a nivel hospitalario o en determinadas patologías. Ejemplo de ello es el estudio de Gankam-Kengne et al. en el que se obtuvo una mayor mortalidad en pacientes con hiponatremia respecto a eunatrémicos tras una media de seguimiento de 8,4 años, ajustando por edad, sexo, etnia, índice de masa corporal (IMC), diabetes, hipertensión, dislipemia, hábito tabáquico y enólico, función renal, proteína C reactiva, insuficiencia cardiaca, cirrosis hepática y cáncer, con una HR de 1,75 [IC 95%: 1,08-2,81] (26).

3.2. Mortalidad intrahospitalaria asociada a hiponatremia

En la tabla nº 4 se describen los principales estudios que asocian un aumento de mortalidad intrahospitalaria en pacientes con hiponatremia en diferentes grados.

Tabla nº 4. Principales estudios sobre mortalidad intrahospitalaria en pacientes con hiponatremia.

	Definición de hiponatremia (mmol/L)	Tamaño muestral	Tasa de mortalidad (%)	OR Mortalidad hiponatremia vs eunatremia
Tierney et al (1986) (58)	< 130	763	4,1	3,24 [IC 95%: 2,36-4,44]
Natkunam et al (1991) (59)	< 125	202	2,6	19,9 [IC 95%: 12,8-30,9]
Nzerue et al (2003) (60)	< 115	168	20	(-)
Clayton et al (2006) (61)	≤ 125	108	20	(-)
Gill et al (2006) (62)	< 125	104	27	3,73 [IC 95%: 1,66-8,38]
Hoorn et al (2006) (30)	< 125	74	19	(-)
Waikar et al (2009) (31)	< 135	98411	5,4	1,47 [IC 95%: 1,33-1,62]
Wald et al (2010) (32)	< 138	53236	3,4	1,72 [IC 95%: 1,51-1,97]
Chawla et al (2011) (63)	< 135	45693	6,1	2,76 [IC 95%: 2,62-2,90]

En la hiponatremia grave ($\text{Na}^+ < 120\text{-}125 \text{ mmol/L}$), el aumento de mortalidad observada (30,59–62) puede deberse tanto al edema cerebral (64,65) como al síndrome de desmielinización osmótica (SDO) que puede aparecer tras una corrección rápida de la hiponatremia crónica (63). Un incremento mínimo de 6 mmol/L y menor de $8\text{-}10 \text{ mmol/L}$ en las primeras 24 horas de la corrección de una hiponatremia grave, ha demostrado una disminución de la mortalidad (60,66). Para conseguirlo, es necesario aplicar de forma precoz el tratamiento adecuado y monitorizar la respuesta al mismo. En relación a ello, Hoorn et al, encontraron una menor mortalidad en los pacientes con hiponatremia grave tratados de manera correcta frente a aquellos que no recibieron el tratamiento adecuado, $14\% \text{ vs } 36\% \text{ (} p=0,04 \text{)}$ (30). Ayus et al, en 53 mujeres postmenopáusicas con hiponatremia crónica y encefalopatía hiponatrémica, observaron una disminución significativa de la mortalidad y secuelas neurológicas en el grupo que recibió el tratamiento adecuado, frente al resto (49).

En pacientes con hiponatremia no grave ($\text{Na}^+ > 125 \text{ mmol/L}$) e incluso en aquellos con hiponatremia leve ($130\text{-}134 \text{ mmol/L}$), también se ha observado una mayor mortalidad, aunque con tasas inferiores a las de la hiponatremia grave. Waikar et al, en su estudio prospectivo, encontraron un mayor riesgo de mortalidad en los pacientes con hiponatremia leve frente a los pacientes eunatrémicos ajustando por edad, género y puntuación en el índice de comorbilidad de Charlson ($\text{OR } 1,37 \text{ [IC } 95\%: 1,23\text{-}1,52]$). Incluso observaron como este incremento de mortalidad se mantenía al año del alta hospitalaria ($\text{Hazard Ratio (HR) } 1,35 \text{ [IC } 95\%: 1,28\text{-}1,43]$) y a los cinco años del alta ($\text{HR } 1,24 \text{ [IC } 95\%: 1,19\text{-}1,29]$). En los pacientes en los que persistía la hiponatremia al alta, el riesgo de mortalidad fue mayor respecto a los sujetos que la corrigieron con una $\text{OR de } 2,37 \text{ [IC } 95\%: 2,03\text{-}2,77]$ vs $\text{OR de } 1,26 \text{ [IC } 95\%: 1,03\text{-}1,52]$ respectivamente (31).

Wald et al, en su estudio de cohortes, obtuvieron un incremento del riesgo de mortalidad ajustado por edad, sexo, servicio de hospitalización y comorbilidades, tanto en los pacientes con hiponatremia al ingreso ($\text{OR } 1,52 \text{ [IC } 95\%: 1,36\text{-}1,69]$) como en aquellos con hiponatremia adquirida en la hospitalización ($\text{OR } 1,66 \text{ [IC } 95\%: 1,39\text{-}1,98]$). Además encontraron una menor mortalidad en los pacientes con Na^+ entre $138\text{-}142 \text{ mmol/L}$, intervalo que consideraron el nuevo rango de normonatremia (32).

Posteriormente, con hiponatremia definida como natremia inferior a 137 mmol/L, Balling et al. en un estudio retrospectivo con seguimiento durante 5 años, encontraron una tasa de mortalidad significativamente superior en los pacientes con hiponatremia frente a los eunatrémicos (27,5% vs 17,7% al año y 79,3% vs 67,4% a los 5 años, $p < 0,001$). La hiponatremia se asoció a un mayor riesgo de mortalidad al año (HR 1,4 [IC 95%: 1,2-1,8]) y a los 5 años (HR 1,2 [IC 95%: 1,1-1,3]), independientemente de la edad, el género y otras comorbilidades (67).

Chawla et al, además de objetivar una mayor tasa de mortalidad en los pacientes con hiponatremia, observaron un incremento progresivo a medida que descendía la natremia desde 134 a 120 mmol/L. Sin embargo, ese aumento de mortalidad desaparecía con cifras inferiores a 120 mmol/L, llegando a invertirse la relación (figura nº 6). En los pacientes con natremia inferior a 120 mmol/L, se observó mayor presencia de encefalopatía hiponatrémica en los vivos frente a los fallecidos, así como una menor puntuación en el índice de comorbilidad de Charlson. No se objetivó ningún caso de SDO y el 75% de los pacientes de ambos grupos recibieron el tratamiento correcto. Por estos motivos, los autores concluyeron que la mortalidad en presencia de hiponatremia estaba más influenciada por la enfermedad de base que por la gravedad de la alteración electrolítica (63).

Figura nº 6: Asociación entre el nivel de natremia y la mortalidad intrahospitalaria.

También se ha demostrado una relación entre la presencia de hiponatremia preoperatoria y la morbilidad perioperatoria, con un incremento significativo del riesgo de mortalidad a los 30 días, eventos coronarios, infecciones de la herida quirúrgica, neumonías y prolongación promedio de 1 día de la estancia hospitalaria (68).

Por último, en el metanálisis de Corona et al, se objetivó que la hiponatremia se asociaba a un incremento significativo del riesgo de mortalidad (Riesgo Relativo (RR) 2,60 [IC 95%: 2,31-2,93], ($p < 0,0001$)) ajustado por edad, sexo y diabetes. Este incremento de mortalidad fue más pronunciado en pacientes con hiponatremia que estaban diagnosticados de infarto agudo de miocardio, cirrosis hepática e infección pulmonar. En el análisis de regresión múltiple encontraron una correlación negativa entre la natremia y la mortalidad, una vez ajustado por edad, sexo y diabetes (figura nº 7) (34).

Figura nº 7. Asociación entre el nivel de natremia y la mortalidad intrahospitalaria, ajustada por edad, sexo y diabetes.

Para intentar determinar el papel de la hiponatremia en la mortalidad, Tzoulis et al. diseñaron un estudio de casos controles apareados. Al comparar los casos (pacientes con natremia < 128 mmol/L) con los controles normonatremicos, la tasa de mortalidad

fue significativamente superior, 17,3% vs 1,7% ($p < 0,01$), con una OR de 11,89 [IC 95%: 2,75-51,51]. En ninguno de los 24 casos de pacientes fallecidos se encontraron datos clínicos de encefalopatía hiponatrémica ni SDO, mientras que sí se constató una mayor gravedad de su enfermedad de base (69).

En sujetos con patologías asociadas a una mayor frecuencia de hiponatremia, también se ha observado un incremento independiente del riesgo de mortalidad intrahospitalaria. Entre ellas se encuentran la insuficiencia cardíaca (35,70,71), la cirrosis hepática (72), enfermedades neurológicas (73,74), o la neumonía (75). Sin embargo, la presencia de hiponatremia no se ha asociado a una mayor mortalidad en la reagudización de una enfermedad pulmonar obstructiva crónica (46). Por otra parte, en pacientes con nutrición parenteral, en el estudio retrospectivo de Gómez Hoyos et al, la presencia de hiponatremia frente a eunatremia se relacionó a mayor tasa de mortalidad (23,2% vs 11,8%), aunque solo la hiponatremia mantenida (al menos el 75% de las determinaciones de natremia sérica < 135 mmol/L) lo hizo de manera independiente tras el ajuste por edad, sexo, IMC e índice de comorbilidad de Charlson (OR 7,38 [IC 95%: 1,07 – 50,8], $p=0,042$) (47).

Tras todos los estudios previamente descritos, se puede concluir que la hiponatremia se asocia a un incremento de mortalidad, pero sigue habiendo dudas respecto a su papel (factor de riesgo independiente vs marcador de gravedad de enfermedad subyacente). Para explicarlo, Hoorn et al. han postulado tres hipótesis no excluyentes entre sí (76,77):

1. La hiponatremia refleja la gravedad de la enfermedad de base, contribuyendo menos en la mortalidad.
2. La hiponatremia podría ser la causa directa de muerte.
3. La hiponatremia contribuye indirectamente al exceso de mortalidad a través de la disfunción orgánica que puede llegar a originar.

Hoorn et al. sugieren que en algunos pacientes la hiponatremia puede ser un simple marcador de gravedad y de alteración hemodinámica, como en el caso de la cirrosis hepática y de la insuficiencia cardíaca. Por el contrario, en otros pacientes puede ser la

causa principal de la muerte, como en la hiponatremia aguda con edema cerebral (76,77). Sin embargo, la tercera hipótesis es la más apoyada por diferentes autores, explicando así los numerosos estudios donde se obtiene la hiponatremia como factor de riesgo independiente de mortalidad (26,31,32,63,67,69). Los mecanismos fisiopatológicos permanecen aún desconocidos, aunque estudios experimentales arrojan algún indicio. En modelos animales, la presencia de hiponatremia puede disminuir la contractilidad cardíaca mediante la inhibición de los canales de calcio del miocito (78), causar cardiomiopatía con fibrosis perivascular e intersticial (79) y empeorar la tolerancia a la isquemia miocárdica por el incremento del estrés oxidativo (80). Otro estudio ha observado que con niveles bajos de natremia se da una alteración de la función mitocondrial y de la regulación del metabolismo del adenosin trifosfato (ATP), con afectación a nivel cerebral (81). Además, se ha visto que niveles elevados de AVP en animales de experimentación inducen descenso de mediadores proinflamatorios y reclutamiento de neutrófilos, provocando cierto grado de inmunosupresión (82).

Por último, se desconoce el efecto de la corrección de la hiponatremia no grave en la mortalidad. A falta de estudios controlados aleatorizados, disponemos de un metanálisis publicado en 2015 en el que se incluyeron 15 estudios (13816 pacientes). En él se obtuvo un descenso del riesgo de mortalidad en los pacientes con mejoría de la natremia respecto a aquellos sin mejoría, con una OR de 0,57 [IC 95% 0,40-0,81]. Esta asociación fue más fuerte al incluirse solo los pacientes de 8 estudios en los que se definía la mejoría en la natremia como el alcanzar cifras mayores de 130 mmol/L (OR 0,51 [IC 95%: 0,31-0,86]). La reducción de la mortalidad fue más evidente en sujetos de edad avanzada y con menores cifras de natremia (83).

3.3. Papel de la hiponatremia en la estancia hospitalaria

En varios estudios sobre la morbimortalidad asociada a la hiponatremia, se ha objetivado una mayor estancia hospitalaria en los pacientes con esta alteración electrolítica (32,67,69,84–86).

Zilberberg et al, observaron una estancia hospitalaria significativamente superior en pacientes con hiponatremia al ingreso frente a aquellos eunatrémicos, $8,6 \pm 8,0$ vs $7,2 \pm 8,2$ días ($p < 0,001$). En el análisis multivariante ajustado por otros factores de confusión, encontraron un incremento de 1 día extra de hospitalización en los pacientes con hiponatremia ($p < 0,001$) (84). Posteriormente, Wald et al, también obtuvieron una estancia hospitalaria mayor en pacientes natremia menor de 138 mmol/L frente a eunatrémicos, con una OR de 1,64 [IC 95%: 1,60-1,68] ajustada por edad, género, raza e índice de comorbilidad de Charlson. Además objetivaron que a medida que empeoraba la natremia, incrementaba la estancia hospitalaria, obteniendo una OR ajustada de 3,46 [IC 95%: 3,01-3,98] para natremias inferiores a 127 mmol/L (32). Sin embargo, Callahan et al, a pesar de encontrar mayor duración del ingreso al comparar los hiponatrémicos con los eunatrémicos (8 vs 6 días; $p < 0,001$), no hallaron diferencias entre hiponatremia al ingreso leve (129-134 mmol/L) y moderada (< 129 mmol/L) (86). Por su parte, Amin et al, tras una regresión multivariante obtuvieron un incremento significativo de la estancia hospitalaria en pacientes hiponatrémicos del 10,9% (85). Más recientemente, Tzoulis P et al. y Balling et al, también han objetivado un incremento significativo de la estancia media en los pacientes con hiponatremia frente a los normonatrémicos, de 4 y 2 días, respectivamente (67,69).

Finalmente, los resultados de todos estos estudios se han confirmado en un metanálisis publicado en 2016, que ha incluido 46 artículos con 3940042 pacientes. En él se ha obtenido que la presencia de hiponatremia se asocia con una mayor duración de la hospitalización: 3,30 [IC 95%: 2,90-3,71] días de media, siendo mayor en hombres y en edad avanzada. Además se encontró una asociación negativa entre la natremia sérica y la duración de la hospitalización (figura nº 8) (87)

Figura nº 8: Relación entre nivel de natremia sérica y duración de hospitalización.

4. MANIFESTACIONES CLÍNICAS DE LA HIPONATREMIA

Las manifestaciones clínicas de la hiponatremia son principalmente neurológicas, como consecuencia del edema cerebral inducido por el movimiento de agua al espacio intracelular (25). La clínica neurológica oscila desde síntomas inespecíficos como cefalea, letargia y confusión hasta manifestaciones más graves como disminución del nivel de consciencia, coma, convulsiones y muerte (tabla nº 5).

Tabla nº 5: Clasificación de la hiponatremia según las manifestaciones clínicas.

Gravedad de los síntomas	Síntomas
Leves <i>NaS 130 – 134 mmol/l*</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Cefalea - Irritabilidad - Déficit de atención - Alteraciones de la memoria - Inestabilidad de la marcha, caídas - Depresión
Moderados <i>NaS 120 – 129 mmol/L*</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Náuseas o vómitos - Bradipsiquia, somnolencia - Desorientación, confusión
Graves <i>NaS < 120 mmol/L*</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Estupor - Coma - Convulsiones - Distrés respiratorio

Adaptada de Alcázar R, et al. Nefrología 2011

* Las cifras de natremia son orientativas, ya que la sintomatología también depende de la velocidad de instauración de la hiponatremia.

La gravedad de la clínica neurológica depende del grado de hiponatremia y la velocidad de instauración de la misma. El descenso rápido (en menos de 24-48 horas) y moderado de la natremia (>10 mEq/L), produce un edema cerebral con un incremento significativo del volumen neuronal (hasta un 180%). Dicho aumento de volumen puede producir herniación cerebral y muerte, debido a la incapacidad de expansión cerebral en la cavidad craneal. Por ello, se activan rápidamente mecanismos de defensa para

disminuir el edema cerebral. Inicialmente (1-3 horas) se disminuye la formación y aumenta la reabsorción del líquido cefalorraquídeo, así como se incrementa la extrusión de iones (cloro, sodio y potasio) por parte de los astrocitos que arrastran agua al espacio extracelular. Pasadas las primeras 48 horas se produce también la salida de otros osmolitos orgánicos intracelulares (inositol, glutamato, ácido gamma-aminobutírico (GABA)...) (88).

Por lo tanto, la hiponatremia aguda, definida por una duración menor de 48 horas, implica una mayor gravedad de la clínica neurológica a causa del edema cerebral. Dicha gravedad neurológica puede verse exacerbada en niños o patología craneal expansiva (menor capacidad craneal) y mujeres en edad fértil (la actividad estrogénica disminuye la adaptación cerebral) (49). También empeora en pacientes con hipoxemia (considerado el factor de riesgo más importante de mortalidad en hiponatremia grave, con un RR de 13,5 [IC 95%: 4,7-38,4]) (60). Algunas de las causas más frecuentes de hiponatremia aguda son: periodo postquirúrgico, post-resección prostática, polidipsia, preparación para colonoscopia, ejercicio, inicio reciente de tratamiento con tiazidas, ciclofosfamida intravenosa, oxitocina, inicio reciente de tratamiento con desmopresina o terlipresina.

En la hiponatremia crónica, definida por una duración superior a 48 horas (o desconocimiento de su inicio), la clínica neurológica suele ser más leve e inespecífica. En las últimas décadas, múltiples estudios han desbancado el término “hiponatremia leve crónica asintomática”. Entre ellos, Renneboog et al. observaron que los pacientes con hiponatremia crónica leve/moderada, considerada asintomática, presentaban mayor deterioro cognitivo, así como mayor frecuencia de inestabilidad y caídas (hasta 67 veces más) respecto a controles eunatrémicos. Objetivaron también una mejoría significativa de la inestabilidad de la marcha tras la corrección de la hiponatremia (89).

La hiponatremia crónica además se ha asociado a otras complicaciones como la osteoporosis. Verbalis et al. demostraron en modelos animales de experimentación que la hiponatremia grave mantenida inducía una marcada osteoporosis, con un incremento en el número de osteoclastos y una mayor actividad resorptiva (90). En

humanos, un meta-análisis reciente de 12 estudios observacionales, obtuvo una asociación significativa de fracturas y osteoporosis en pacientes con hiponatremia, con una OR de 1,99 (IC 95%: 1,5-2,63) (91). Por otra parte, en el Rotterdam Study, un estudio de cohortes prospectivo, se observó un incremento de riesgo de fractura vertebral y no vertebral, aunque sin relación con la densidad mineral ósea. El aumento de riesgo de fractura era independiente de las caídas recientes, lo cual sugiere un defecto de la calidad del hueso relacionado con la hiponatremia (92).

5. DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL Y ETIOLOGÍA DE LA HIPONATREMIA

5.1. Otras causas de hiponatremia: hiponatremia no hipotónica

Solo la hiponatremia hipotónica conlleva una relevancia clínica y precisa tratamiento. Por tanto, el primer paso del diagnóstico de la hiponatremia es descartar causas de hiponatremia no hipotónica. Para ello nos podemos ayudar de la cifra de osmolalidad plasmática, determinada mediante osmómetro. Las dos principales causas de hiponatremia no hipotónica son:

- **Hiponatremia translocacional** (habitualmente hipertónica, osmolalidad plasmática (OsmP) > 295 mOsm/kg): se debe a la presencia de otros solutos efectivos diferentes al sodio que aumentan la osmolalidad plasmática y provocan una salida de agua al VEC, y por tanto un descenso de la natremia por dilución (93). El principal ejemplo es la originada por la hiperglucemia, por lo que siempre se debe corregir la natremia por la glucosa plasmática. El ajuste se debe realizar de tal manera que por cada 100 mg/dl de glucemia superior a 100 mg/dl, se suman 1,6 mmol/L a la natremia determinada, y si las cifras de glucemia superan 400 mg/dl, se añaden 4 mmol/L por cada 100 mg/dl adicionales de glucemia. Otra alternativa, aunque menos precisa, es utilizar 2,4 mmol/L como factor de corrección (94). Otros solutos efectivos que pueden provocar hiponatremia traslocacional serían el manitol y los contrastes radiológicos hiperosmolares.
- **Pseudohiponatremia** (isotónica, OsmP entre 280-295 mOsm/kg): causada por elevaciones marcadas de lípidos o de proteínas (gammapatías, infusión de inmunoglobulinas iv...) que provocan descensos artefactados de natremia por el aumento relativo de proporción de volumen plasmático ocupado por su exceso (93). En este caso, habrá que excluir las determinaciones de natremia realizadas con hiperproteinemia o con niveles de triglicéridos superiores a 400 mg/dl.

5.2. Diagnóstico diferencial y etiología de la hiponatremia hipotónica

Se considera hiponatremia hipotónica cuando la osmolalidad plasmática medida con osmómetro es inferior a 275-280 mOsm/kg. También se acepta como tal, cualquier hiponatremia sin evidencia de causas de hiponatremia no hipotónicas nombradas anteriormente.

El estado de la volemia clínica del paciente determina la clasificación de la hiponatremia según su fisiopatología y etiología. De este modo el paciente puede presentar: hipervolemia (mala distribución del agua corporal total; VCE bajo), hipovolemia (disminución del agua corporal total; VCE bajo) o euvolemia (incremento del agua corporal total; VCE normal o elevado).

La exploración física es el pilar fundamental para determinar la volemia clínica (tabla nº 6). Los signos que se han de valorar son: la presión arterial (PA), frecuencia cardíaca (FC), presión venosa yugular (PVY), tensión ocular (95) y signos de tercer espacio (ascitis, edema pulmonar, edemas periféricos). Sin embargo, en algunas ocasiones el estado de la volemia es difícil de diferenciar, sobretodo entre hipovolemia y euvolemia (93). En estos casos nos podemos ayudar de los patrones de hemodilución o hemoconcentración en la bioquímica sanguínea. En la hipovolemia, al haber una disminución del agua corporal total, suele haber hemoconcentración (incremento de urea, creatinina, ácido úrico y hematocrito). Por el contrario, en la hipervolemia, secundariamente al aumento del agua corporal total, se produce hemodilución (descenso de urea, creatinina, ácido úrico y hematocrito).

Tanto la hiponatremia hipovolémica como la hipervolémica tienen en común un bajo VCE, que estimula la secreción de AVP vía barorreceptores, y que se acompaña de una disminución de la perfusión renal, con una elevación en la activación del SRAA, una reducción en el flujo por las asas de Henle y, por tanto, una reabsorción renal de sodio. Además, la AVP también provoca un incremento en la reabsorción de agua libre a nivel del túbulo colector (14). Ello provoca que a nivel analítico se suela presentar un incremento de urea, creatinina y ácido úrico a medida que desciende la natremia y que el sodio urinario (NaU) esté habitualmente por debajo de 20 mmol/L, excepto en los

casos de pérdidas renales de sodio (uso de diuréticos, hipoaldosteronismo, insuficiencia suprarrenal, síndrome pierde sal) (93).

En el caso de la hiponatremia euvolémica, el VCE es normal o elevado, y la perfusión renal está incrementada, con inhibición del SRAA (reducción de la reabsorción proximal y distal de sodio), y disminución de la reabsorción de sodio flujo-dependiente de las asas de Henle, con incremento en la reabsorción de agua libre inducida por AVP en el túbulo colector (96). En este caso, se suele objetivar un descenso de la urea, creatinina y ácido úrico conforme disminuye la natremia, y el sodio urinario es superior a 40 mmol/L si el aporte de solutos del paciente es suficiente. (93)

Tabla nº 6: Tipo de hiponatremia hipotónica según los signos de la exploración física y los hallazgos analíticos.

TIPO de hiponatremia	Signos de la exploración física	Hallazgos analíticos
Hiponatremia hipovolémica	<ul style="list-style-type: none"> - Presión arterial disminuida - Frecuencia cardíaca elevada - Tensión ocular - PVY bajas (onda de pulso por debajo ángulo del esternón) 	<ul style="list-style-type: none"> - Incremento de creatinina, urea y ácido úrico conforme disminuye la natremia - NaU < 20 mmol/L (excepto pérdidas renales de Na)
Hiponatremia euvolémica	<ul style="list-style-type: none"> - Tensión ocular normal o elevada - PVY normal - Ausencia de signos de hipovolemia y de tercer espacio. 	<ul style="list-style-type: none"> - Descenso de creatinina, urea y ácido úrico conforme disminuye la natremia - NaU > 20 mmol/L
Hiponatremia hipervolémica	<ul style="list-style-type: none"> - Signos de tercer espacio (ascitis, edemas periféricos, edema pulmonar, ...) 	<ul style="list-style-type: none"> - Incremento de creatinina, urea y ácido úrico conforme disminuye la natremia - NaU variable

NaU = sodio urinario, PVY = presión venosa yugular.

5.2.1. Etiología de la hiponatremia hipovolémica

En la hiponatremia hipovolémica, donde hay una pérdida de sodio con un incremento secundario del agua corporal total, las causas se diferencian según el origen de la pérdida de sodio renal o extrarrenal.

- **Hiponatremia hipovolémica con pérdidas extrarrenales de sodio:** se produce por la pérdida de sodio a nivel extrarrenal, asociada al aumento de secreción de AVP en respuesta al descenso del VCE. En la mayoría de las ocasiones, en su desarrollo influye la reposición de volumen con líquidos hipotónicos. Las principales etiologías son:
 - i. **Pérdidas gastrointestinales:**
 - Diarrea
 - Vómitos
 - Fístulas intestinales
 - Obstrucción intestinal
 - Íleo paralítico
 - Pancreatitis
 - ii. **Hemorragia**
 - iii. **Quemaduras**
- **Hiponatremia hipovolémica con pérdidas renales de sodio:**
 - iv. **Uso de diuréticos:**
 - Tiazidas: son los diuréticos que con mayor frecuencia inducen hiponatremia. Su desarrollo se ha relacionado con la disminución de la capacidad de dilución del túbulo distal, el aumento de la secreción no osmótica de AVP vía barorreceptor por la depleción de volumen, y la entrada de sodio al interior de las células secundaria a la pérdida de potasio (97). Se ha estimado que hasta un 30% de los pacientes con tiazidas desarrollan hiponatremia (98), con un tiempo variable desde el inicio del tratamiento (99), siendo en general más frecuente

en mujeres de edad avanzada (100).

- Diuréticos de asa: se considera una causa infrecuente al bloquear la reabsorción de sodio en la rama ascendente del asa de Henle, facilitando así la eliminación de agua y sin interferir con el mecanismo de dilución renal en los segmentos distales de la nefrona. Por otra parte, ante un estado de hipovolemia, permite la reabsorción de sodio en el túbulo distal y de agua en el túbulo colector. En una revisión de hiponatremias asociadas a diuréticos, solo en un 8% estaba presente un diurético de asa, sin establecerse causalidad (no se descartaban otras causas como la insuficiencia cardíaca...). Se suele desarrollar tras varios meses de tratamiento (99).
- v. **Hipoaldosteronismo (acidosis tubular renal tipo IV)**: se acompaña de hiperpotasemia o niveles de potasio en el límite alto de la normalidad, junto a acidosis metabólica. Aunque se considera una causa poco frecuente, puede que esté infradiagnosticada. Se ha detectado en un 3,8% de los pacientes hospitalizados (101). Para su diagnóstico, tras descartar insuficiencia suprarrenal primaria (ISP 1ª), se debe calcular el gradiente transtubular de potasio (GTTK), aplicando la fórmula: $(\text{potasio urinario (KU)} \times \text{OsmP}) / (\text{osmolalidad urinario (OsmU)} \times \text{potasio sérico (KS)})$. Una cifra inferior a 5 confirma la disfunción del receptor mineralocorticoide. La ausencia de incremento del GTTK tras la administración de 0,05 mg de fludrocortisona sugiere una resistencia del receptor mineralocorticoide y el aumento del GTTK indica un déficit de aldosterona (102). Este hipoaldosteronismo podrá ser primario con renina elevada (fármacos inhibidores del SRAA, heparina...) o secundario con cifras de renina bajas (AINEs, nefropatía diabética...).
- vi. **Insuficiencia suprarrenal primaria**: al asociarse un déficit glucocorticoide y mineralocorticoide, la ISP 1ª se presenta con hiponatremia hipovolémica, hiperpotasemia y acidosis metabólica. Se diagnostica con un cortisol basal $< 5 \text{ mcg/dl}$ y/o $< 18 \text{ mcg/dl}$ tras

estímulo con ACTH, junto a una ACTH elevada.

- vii. **Síndrome pierde sal cerebral:** se ha descrito en hemorragias subaracnoideas, procedimientos neuroquirúrgicos, daño cerebral. El evento inicial se ha atribuido a un descenso de reabsorción renal de sodio en el túbulo proximal, acompañado de un aumento de excreción de ácido úrico y urea. La depleción de volumen asociada a la pérdida renal de sodio, estimularía la secreción de AVP. Actualmente se considera una causa muy infrecuente de hiponatremia hipovolémica (errores diagnósticos con hiponatremia euvolémica por SIADH). En un estudio prospectivo de 100 pacientes con hemorragia subaracnoidea e hiponatremia, no se detectó ningún caso (103).

5.2.2. Etiología de la hiponatremia euvolémica

En la hiponatremia euvolémica siempre hay un exceso absoluto o relativo de agua corporal total. La gran mayoría de casos se deben a la hipersecreción de la AVP no mediada por estímulo de barorreceptores ni osmoreceptores ("familia ADH"). También son causa de hiponatremia euvolémica: polidipsia primaria, intoxicación aguda de agua, baja ingesta de sal, hipotiroidismo grave, tiazidas.

- **Hiponatremia euvolémica mediada por AVP:** se caracteriza por una insuficiente inhibición de la AVP por la hipoosmolalidad plasmática. Niveles elevados de AVP, a través de su unión al receptor V2, originan un incremento de canales de acuaporina 2 en la membrana apical del túbulo colector, con la correspondiente reabsorción de agua. Cuando se alcanza un suficiente número de canales de acuaporina 2, la osmolalidad del túbulo colector distal (la de la orina) entra en equilibrio con la de la médula renal (104). Por lo tanto, la osmolalidad urinaria refleja directamente la osmolalidad de la médula renal, e indirectamente informa de los niveles de AVP circulantes. De tal manera que la hiponatremia euvolémica mediada por AVP se caracteriza por una osmolalidad urinaria inapropiadamente elevada (>100 mOsm/kg) para la hipoosmolalidad plasmática, junto a un sodio urinario > 40 mEq/L (con aporte de sal suficiente)

(105,106). Dentro de este grupo se incluyen:

- i. **Hiponatremia inducida por estímulos fisiológicos de la AVP (postcirugía, dolor, náuseas/vómitos, estrés):** son potentes estímulos de la secreción de AVP. En el caso del dolor, este incremento de secreción se realiza sobretodo a través de la porción parvocelular (107).
- ii. **Déficit de ACTH (insuficiencia suprarrenal secundaria):** a diferencia de la ISP 1ª, la secreción de aldosterona, controlada por el SRAA, no se altera, permaneciendo el VCE normal. Al reducirse el feedback negativo del cortisol sobre el hipotálamo, se induce una elevación de la secreción de la CRH (y también de la AVP) en la porción parvocelular del núcleo paraventricular medial del hipotálamo (7,8). Es por ello que el cuadro clínico que se genera es idéntico al SIADH y puede infradiagnosticarse. En un reciente estudio prospectivo en un hospital irlandés, se diagnosticaron de déficit de ACTH el 3.8% de hiponatremias euvolémicas inicialmente consideradas SIADH (108). En el caso que el déficit de ACTH se acompañe también de un déficit parvocelular hipotalámico, no se originará hiponatremia. Se diagnostica con un cortisol basal < 5 mcg/dl y/o < 18 mcg/dl tras estímulo con ACTH o hipoglucemia insulínica, junto a una ACTH baja o inadecuadamente normal. En pacientes con sospecha de déficit de ACTH agudo (hemorragia subaracnoidea, traumatismo craneo-encefálico, neurocirugía...), la hipoglucemia insulínica está contraindicada y el test de ACTH no es valorable ante la ausencia de atrofia cortical. En estos casos ya se podría considerar un posible déficit de ACTH la presencia de un cortisol basal < 10 ug/dl al considerarse infrafisiológico con la situación de estrés (109).
- iii. **Hiponatremia euvolémica por tiazidas:** se produce en aquellos casos en los que predomina la acción de la AVP por estímulo de la tiazida, sobre el déficit de VCE causado por la pérdida renal de sodio (110). Además, pacientes con diuréticos pueden tener un SIADH de base, el cual no se podrá diagnosticar hasta que se suspenda el tratamiento (93).

- iv. **Hipotiroidismo grave:** se considera una causa muy rara de hiponatremia, sólo posible en pacientes con hipotiroidismo grave y criterios de coma mixedematoso, por la dificultad de excreción de agua (116,117). Este descenso en la excreción de agua parece deberse a la alteración de la perfusión renal secundaria al descenso de volumen de eyección cardíaco y la resistencia vascular periférica, con el estímulo secundario de la AVP. En un estudio se observó que por cada aumento de 1 mUI de TSH, el descenso del NaS solo era de 0,14 mmol/l (118).
- v. **Secreción Inadecuada de ADH (SIADH):** es la causa más frecuente de hiponatremia eurolémica (111) y la etiología más frecuente de hiponatremia en población general hospitalaria (112). Se considera un diagnóstico de exclusión, tras descartar la toma de diuréticos en las 48 horas previas, la presencia de estímulos de liberación no osmótica de AVP (náuseas, vómitos y/o dolor no controlados), la insuficiencia renal, un déficit de ACTH y un hipotiroidismo grave. En la tabla nº 7 se detallan los criterios diagnósticos (93), descritos clásicamente por Bartter y Schwartz (113). El SIADH además tiene múltiples causas, que se resumen en la tabla nº 8.

Tabla nº 7: Criterios diagnósticos del SIADH

Osmolalidad plasmática < 275 mOsm/kg
Osmolalidad urinaria inapropiadamente elevada (> 100 mOsm/kg con función renal normal)
Eurolémica clínica (ausencia de signos de hipovolemia o hipervolemia)
Sodio urinario > 20-30 mmol/L (si ingesta adecuada de sal)
Ausencia de otras causas de hiponatremia eurolémica: déficit de ACTH, hipotiroidismo
Función renal normal, con ausencia de uso de diuréticos, particularmente de tiazidas

Adaptado de Verbalis et al, American J Med, 2013

Tabla nº 8: Etiología del SIADH

Neoplásico	<ul style="list-style-type: none"> - Pulmonares y mediastínicos (carcinoma broncogénico, timoma, mesotelioma) - Extratorácicos (tracto gastrointestinal, páncreas, genitourinario, orofaringe, leucemia/linfoma, sarcoma)
Pulmonar	<ul style="list-style-type: none"> - Infecciones (neumonía, absceso, tuberculosis, aspergilosis) - Trastornos mecánicos y ventilatorios (insuficiencia respiratoria, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, fibrosis quística, asma, ventilación mecánica a presión positiva, aumento presión intraabdominal)
Neurológico	<ul style="list-style-type: none"> - Masas (tumores, abscesos, hematomas) - Enfermedades inflamatorias (encefalitis, meningitis, lupus, porfiria aguda intermitente) - Enfermedades degenerativas desmielinizantes (Guillain-Barré, lesiones medulares, esclerosis múltiple) - Otros (hemorragia subaracnoidea, traumatismo craneal, psicosis aguda, delirium tremens, hidrocefalia, lesión tallo hipofisario)
Farmacológico	<ul style="list-style-type: none"> - Estimulación de la liberación de AVP (fenotiazinas, antidepresivos tricíclicos) - Efectos renales y/o potenciación efectos antidiuréticos de la AVP (desmopresina, oxitocina, inhibidores síntesis de prostaglandinas) - Acciones mixtas o inciertas (inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina, cloropropamida, carbamacepina y oxcarbazepina, anti-psicóticos, inhibidores de la recaptación de serotonina, ciclofosfamida, omeprazol, vincristina)
Otros	<ul style="list-style-type: none"> - Síndrome de inmunodeficiencia adquirida - Senil - Idiopático

- v. **Síndrome nefrogénico de antidiuresis inapropiada (NSIAD):** trastorno genético causado por una mutación en el gen del receptor de la AVP tipo 2 (AVPR2), lo cual produce una activación constante del V2 en las células del túbulo colector renal. Se debe sospechar ante criterios diagnósticos de SIADH en pacientes jóvenes, de origen idiopático, con niveles de AVP bajos o indetectables. El hallazgo de una mutación en el gen AVPR2 confirma el diagnóstico (114).

- **Otras causas de hiponatremia euvolémica:**

- vi. **Polidipsia primaria:** la excesiva ingesta de agua es infrecuente que sea causa única de hiponatremia cuando la función renal es normal. Los pacientes con polidipsia suelen presentar natremia en el rango bajo de la normalidad, ó discretamente inferior a 135 mmol/L, mientras la hipoosmolaridad plasmática inhiba la secreción de AVP y se compense con poliuria. Sin embargo, estos pacientes pueden desarrollar hiponatremia marcada si la polidipsia se acompaña de baja ingesta de solutos (sal, proteínas...) (4) o de hipersecreción de AVP secundaria a estímulos no osmóticos (dolor, náusea, estrés, fármacos, psicosis aguda, tiazidas...). Otro factor que puede provocar hiponatremia transitoria es la polidipsia de grandes cantidades de líquido (> 1000 ml/hora) en un tiempo limitado ya que, aunque la capacidad de excreción renal de agua pueda alcanzar los 20 litros/día, no suele poder exceder de 800-1000 ml. En general, en los pacientes con polidipsia primaria el NaU es menor de 20 mmol/L, incluso de 10 mmol/L, y la OsmU menor de 100 mOsm/kg (93).
- vii. **Intoxicación aguda de agua:** se puede presentar por ejemplo en preparaciones para colonoscopia o una intoxicación enólica por excesivo consumo de litros de cerveza. El desarrollo de hiponatremia es idéntico al descrito en la poliuria primaria. Para valorar la gravedad de la hiponatremia, es importante tener en cuenta la velocidad de descenso de la natremia, así como la persistencia de agua en el tracto gastrointestinal que pueda provocar un empeoramiento. En estos casos es más preciso la natremia de una gasometría arterial (el sodio se diluye primero en sangre arterial) (115). Aunque el NaU suele ser menor de 20 mmol/L y la OsmU inferior a 100 mOsm/kg, por estímulo de AVP inducido por náusea o distensión gástrico, ambos parámetros pueden estar más elevados.
- viii. **Baja ingesta de sal:** en ausencia de pérdidas corporales de sodio o una elevación no osmótica de la AVP, un paciente con bajo aporte de sal sólo

desarrolla hiponatremia si no dispone del suficiente soluto en la médula renal para eliminar todo el líquido aportado. La nefrona precisa al menos 60 mOsm de soluto para eliminar un litro de agua en un riñón normal (4). El NaU también suele ser < 20 mmol/L y la OsmU < 100 mOsm/kg.

5.2.3. Etiología de la hiponatremia hipervolémica

Las posibles causas de hiponatremia hipervolémica son:

- i. **Insuficiencia cardíaca:** el factor principal que provoca la retención hídrica y la hiponatremia en la insuficiencia cardíaca es el aumento de secreción no osmótica de AVP secundario al descenso de VCE y al estímulo adrenérgico (119). Además, hay un aumento de reabsorción renal de sodio y agua por la actividad del SRAA y sistema nervioso simpático vía barorreceptores.
- ii. **Cirrosis hepática:** la hiponatremia es frecuente en cirrosis avanzada, pero no suele aparecer en ausencia de ascitis (72). La fisiopatología se asocia a la hipertensión portal y a la vasodilatación de la circulación esplácnica (120). Como resultado de ello se produce un descenso del VCE, y por tanto, un aumento de la actividad del SRAA, del sistema nervioso simpático, y de la liberación no osmótica de AVP (considerado también principal mediador en la aparición de hiponatremia).
- iii. **Insuficiencia renal aguda, enfermedad renal crónica y síndrome nefrótico:** aunque la hiponatremia también se relaciona al descenso del VCE y su fisiopatología, el papel de la secreción no osmótica de AVP no está tan documentado. En el síndrome nefrótico la incidencia de hiponatremia es baja, en probable relación a la función renal conservada. Aunque la sobrecarga de volumen inhibe la secreción de AVP, con un descenso de albúmina marcado se puede provocar un descenso del VCE.

Figura nº 9: Algoritmo diagnóstico de la hiponatremia

NaS = natremia sérica; OsmP = Osmolalidad plasmática; NaU = sodio urinario; OsmU = osmolalidad urinaria; AVP = arginina vasopresina; SIADH = síndrome de secreción inadecuada de la hormona antidiurética

6. TRATAMIENTO DE LA HIPONATREMIA

El objetivo de tratamiento de la hiponatremia varía en función de la gravedad neurológica de la misma, describiéndose dos tipos de abordajes según la presencia o ausencia de clínica neurológica grave. Por ello, el primer paso es valorar la clínica neurológica del paciente (ver tabla nº 5). Además, hay que tener en cuenta otros factores que por sí solos aumentan la gravedad de la hiponatremia, es decir, su presencia hace que una hiponatremia con clínica neurológica leve pase a considerarse moderada, y de moderada a grave: hiponatremia aguda (duración < 48 horas), hipoxemia, lesión cerebral expansiva, $\text{NaS} < 120 \text{ mmol/L}$ (95,106). En pacientes con hiponatremia grave (disminución del nivel consciencia, convulsiones...), el principal objetivo es revertir la clínica neurológica del paciente. Sin embargo, en pacientes sin clínica neurológica grave, el objetivo es corregir la hiponatremia (93,95).

Para lograr una corrección eficaz de la hiponatremia, el tratamiento debe ser administrado en base al tipo (hipovolémica, euvolémica o hipervolémica) y etiología de la misma (93,95). Por tanto, el segundo paso para elegir la terapia más adecuada, es valorar la volemia del paciente, así como los datos de la anamnesis y las determinaciones del estudio analítico (función renal, iones y osmolalidad en sangre y orina, cortisol, TSH).

La utilización de fórmulas de cálculo de déficit de sodio para el tratamiento de la hiponatremia no es recomendable, ya que pueden inducir errores terapéuticos. Esto tiene sentido ya que, en la gran mayoría de los casos la hiponatremia es debida a una alteración del metabolismo del agua (121,122).

6.1. Límites de corrección de la hiponatremia

Otro punto a tener en cuenta al iniciar el tratamiento de la hiponatremia es el objetivo de corrección del sodio en las primeras 24 – 48 horas, que será diferente en función de la velocidad de instauración de la misma y de la presencia de factores de riesgo para el síndrome de desmielinización osmótica (SDO).

En los pacientes con hiponatremia aguda (duración < 24-48 horas), no hay límite de corrección de natremia (93).

Sin embargo, en los de casos de hiponatremia crónica (duración < 48 horas o desconocida), por el riesgo de SDO, dicho incremento debe limitarse.

El desarrollo de SDO se ha relacionado con la disminución de la capacidad de adaptación cerebral ante un aumento marcado de osmolalidad. Como se ha nombrado en apartados previos, como mecanismo para reducir el edema cerebral en una hiponatremia hipotónica, se produce la salida de electrolitos y osmolitos orgánicos de las células (minositol, glutamato, taurina...) que arrastran el agua. Ante una posterior elevación rápida de la osmolalidad, los electrolitos son capaces de movilizarse para compensarla, pero los osmolitos (principalmente mioinositol) precisan de entre 5 y 7 días para su recaptación intracelular (123). Por ello, este cambio rápido hacia la hipertonicidad del plasma puede provocar deshidratación y muerte celular de los oligodendrocitos, con rotura funcional de la barrera hematoencefálica y entrada de proteínas activadas del complemento que generan un daño celular secundario con mielinolisis (124). En modelos animales se ha observado que las regiones cerebrales con mayor lentitud para recuperar osmolitos son las que con mayor frecuencia se afectan por SDO (como por ejemplo la protuberancia) (125). Entre el 80-90% de los SDO presentan una localización pontina, considerándose el resto extrapontinos. El diagnóstico del SDO es clínico ya que las lesiones desmielinizantes tardan hasta 4 semanas en observarse en la resonancia magnética. El cuadro típico es la aparición de clínica neurológica (tetraparesia, parálisis pseudobulbar, ataxia, confusión, disfagia, disartria, alteraciones pupilares, crisis comiciales...) a los 2-6 días de la corrección excesiva de natremia, tras un periodo inicial de mejoría. Las lesiones son habitualmente irreversibles.

El límite de corrección de una hiponatremia crónica debe establecerse en base a la presencia de factores de riesgo que se han asociado a mayor incidencia de SDO (ver tabla 9) (126).

Tabla nº 9: Factores de riesgo de desarrollo de síndrome de desmielinización osmótica con la corrección de una hiponatremia crónica.

-
- Natremia sérica < 105 mmol/L
 - Hipopotasemia (potasio sérico < 3.5 mmol/L)
 - Alcoholismo
 - Malnutrición
 - Insuficiencia hepática avanzada
-

El riesgo de SDO se relaciona con el incremento de natremia a las 24 y 48 horas, y no se ha asociado al incremento en las primeras 6 horas, ni al tipo de tratamiento utilizado. En una revisión de los casos de SDO publicados, en el 50% el aumento de natremia fue mayor de 25 mmol/L en 48 horas y en la mayoría, superior a 12 mmol/L, en las primeras 24 horas (127), aunque se han llegado a documentar casos con incrementos de 9-10 mmol/l en 24 horas (126). En la tabla nº 10 se resumen las recomendaciones más recientes de los límites de corrección a partir de los cuales se considera “hipercorrección de la hiponatremia” (93).

Tabla nº 10: Límites y objetivos de corrección de la hiponatremia en las primeras 24-48 horas del inicio de tratamiento

Tipo de hiponatremia	Objetivos de corrección	Límites de corrección
Hiponatremia aguda (duración < 24-48 horas)	Reducir clínica neurológica (mínimo 4-6 mmol)	No hay límite
Hiponatremia crónica (duración > 24-48 horas o desconocida) CON algún factor de riesgo de SDO	4 – 6 mmol cada 24 horas	8 mmol cada 24 horas
Hiponatremia crónica (duración > 24-48 horas o desconocida) SIN factores de riesgo de SDO	4 – 8 mmol cada 24 horas	10 – 12 mmol cada 24 horas 18 mmol cada 48 horas

SDO = síndrome de desmielinización osmótica

Si se produce una hipercorrección, está indicado inducir un redescenso de la natremia hasta el límite preestablecido, al objetivarse prevención de SDO en estudios experimentales con animales (128). Se recomienda administrar suero glucosado al 5% (3 ml/kg/hora) y desmopresina (2-4 mcg cada 8 horas), hasta conseguir el descenso buscado, con controles de natremia cada 2 horas (93).

Como prevención de la hipercorrección, también se recomienda suspender temporalmente el tratamiento activo de la hiponatremia cuando se hayan alcanzado los objetivos de ascenso diarios (ver tabla nº 10) en las primeras 24 horas, asociando incluso desmopresina cada 6-8 horas para disminuir la acuaresis y frenar el ascenso (93).

6.2. Tratamiento de la hiponatremia grave

El tratamiento de la hiponatremia grave (clínica neurológica grave ó clínica moderada + NaS < 120 mmol/L, duración < 48 horas, hipoxemia o lesión cerebral expansiva) debe ser precoz, y su principal objetivo es mejorar la sintomatología neurológica a través de la reducción del edema cerebral. Se ha demostrado que un incremento discreto de natremia, entorno a 4-6 mmol/L, disminuye un 50% el edema cerebral. Para ello es necesario administrar una solución con la suficiente osmolaridad (solución salina hipertónica al 3%) para desplazar el agua del espacio intracelular al extracelular (66). Esta solución hipertónica, se puede indicar en forma de bolos (100 ml cada 10 min con un máximo de 3 bolos) o en perfusión continua (ritmo de 0,5 a 2 ml/kg/h, en función de la gravedad) (93,106,129). Durante su administración se debe monitorizar la clínica neurológica y los niveles de natremia cada 2 horas, suspendiéndose tras obtener una mejoría significativa de la clínica neurológica y/o un incremento en la natremia igual o superior a 6 mmol/L. Posteriormente es recomendable realizar una natremia cada 6-8 horas y a las 24 horas post-retirada para detectar un redescenso o hipercorrección.

No se debe iniciar ninguna terapia susceptible de elevar aún más la natremia durante la administración de la solución salina hipertónica al 3% ni en las primeras 24 horas

post-retirada (106). Se señalan como excepciones los pacientes con hiponatremia hipervolémica, en los que se deberá administrar furosemida durante y tras la retirada de la solución salina hipertónica; así como la presencia de una hipopotasemia moderada, donde será necesario reponer el potasio.

Una vez pasadas las primeras 24 horas, tras disminuir la clínica neurológica y alcanzar los objetivos de ascenso (ver tabla nº 10), se iniciará el manejo de la hiponatremia no grave, como se detalla a continuación.

6.3. Tratamiento de la hiponatremia no grave

En pacientes sin clínica neurológica grave, el tratamiento debe enfocarse en base al tipo de hiponatremia (hipovolémica, hipervolémica y euvolémica), con los límites y objetivos de incremento de natremia citados previamente (93,95) (tabla nº 10). En todos los casos se deben adoptar las medidas de prevención y tratamiento de la hipercorrección si se precisa, tal y como se explica en el *apartado 7.1*. El objetivo principal de esta terapia es alcanzar y mantener la eunatremia, y si no es posible, evitar al menos el empeoramiento o el desarrollo de hiponatremia grave.

6.3.1. Tratamiento de la hiponatremia hipovolémica

El tratamiento principal de la hiponatremia hipovolémica es reponer la volemia con solución salina isotónica, expansores de plasma y hemoconcentrados si hemorragia. De esta forma se consigue inhibir la secreción de AVP inducida por el estímulo barorreceptor, y el exceso relativo de agua se corrige por si mismo mediante aumento espontáneo de acuarexis. La pauta elegida de expansión de volumen se debe reajustar cada 24-48 horas según la restauración de la volemia y la elevación de la natremia (93).

Además, se ha de tener en cuenta la etiología por si se requiere una terapia específica (93), por ejemplo:

- i. **Pérdidas gastrointestinales:** si se asocia hipopotasemia, se ha de añadir cloruro potásico. La suplementación con cloruro potásico corrige la natremia de

manera similar al cloruro sódico, ya que el potasio se intercambia con el sodio intracelular. También pueden ser necesarios antieméticos, antidiarreicos...

- ii. **Uso de diuréticos** (principalmente tiazidas): se debe retirar el fármaco, teniendo presente la frecuente rápida corrección de la natremia (mayor en hidroclorotiazida que con clortalidona). También ha de asociarse suplementación con cloruro potásico en caso de hipopotasemia. Si la hiponatremia persiste tras suspender el diurético, se deben plantear otros diagnósticos, con reevaluación de la volemia y pruebas bioquímicas (por ejemplo: SIADH en paciente en tratamiento con tiazidas).
- iii. **Hipoaldosteronismo**: si es de origen farmacológico, se debe retirar el fármaco relacionado siempre que sea posible (IECAs, AINEs, espironolactona, amiloride, heparina, cotrimoxazol...). En algunos pacientes puede ser necesario asociar fludrocortisona (0,05 a 0,10 mg/día), sobre todo si no hay respuesta al tratamiento inicial, o si no se puede suspender el fármaco (ej: heparina, tacrolimus...) (95).
- iv. **Insuficiencia suprarrenal primaria**: es esencial asociar hidro cortisona a dosis de estrés (hasta 50 mg cada 8 horas intravenosa), la cual ya activa los receptores mineralocorticoides, con descenso progresivo hasta la dosis sustitutiva fisiológica (20 mg al día aproximadamente), valorando en ese momento la adición de fludocortisona si se precisa.
- v. **Síndrome pierde sal cerebral**: el suero salino isotónico es la base de su tratamiento en hiponatremias no graves.

6.3.2. Tratamiento de la hiponatremia euvolémica

El objetivo principal del tratamiento de la hiponatremia euvolémica es favorecer la eliminación de agua libre. En la mediada por AVP, también se debe asegurar un aporte adecuado de sodio para compensar las pérdidas renales.

A continuación se detallan las opciones terapéuticas según la etiología de la hiponatremia euvolémica (93), con especial énfasis al apartado 6.3.2.2 (tratamiento del SIADH).

6.3.2.1. Tratamiento de la hiponatremia euvolémica mediada por AVP

- i. **Hiponatremia inducida por estímulos fisiológicos de la AVP (postcirugía, dolor, náuseas/vómitos):** en todos los pacientes con hiponatremia hay que controlar el dolor y las náuseas con antieméticos y analgesia respectivamente (aunque no sea la única etiología de la hiponatremia). Con ello se disminuye la secreción parvocelular de AVP y aumenta la acuarexis.
- ii. **Déficit de ACTH:** se debe indicar hidrocortisona por vía oral (20 mg/ 8 horas) o intravenosa (20-50 mg/ 8 horas), con descenso progresivo hasta la dosis sustitutiva fisiológica (15-20 mg al día). Al inicio no hay que asociar otra terapia para la corrección de la natremia ya que con solo los corticoides ya suele producirse un incremento significativo en las primeras 24 horas. Por ello, se deben hacer controles de natremia, al menos a las 12 y 24 horas del inicio, añadiendo medidas de redescenso si se precisa (apartado 6.1). Si tras 72 horas del inicio de la hidrocortisona persiste la hiponatremia, hay que reevaluar el diagnóstico del paciente, como por ejemplo, la coexistencia de un SIADH.
- iii. **Síndrome nefrogénico de antidiuresis inapropiada (NSIAD):** en general se trata como el SIADH, tal y como se describe en el siguiente apartado. Cabe señalar que los vaptanes no parecen ser efectivos, mientras que con la urea se han observado mejores resultados (130).

6.3.2.2. Tratamiento del SIADH

Según los últimos consensos de manejo de la hiponatremia, el tratamiento del SIADH debe ser individualizado (93,95,106). La terapia se selecciona en base a los siguientes criterios: la capacidad renal para eliminar agua libre (según la fórmula de Furst), la osmolalidad urinaria, las limitaciones del paciente para cumplir la restricción hídrica y la duración estimada de la causa de SIADH (transitoria o crónica) (tabla nº 11) (93,95,106). En una serie de 43 pacientes con SIADH, se objetivó la eficacia del tratamiento pautado en función de los criterios previamente citados (131). Independientemente del tratamiento seleccionado, hay que asegurar un aporte mínimo de sodio (8 gr de sal o 136 mEq de sodio) para compensar las pérdidas renales

de sodio, secundarias a la inhibición del SRAA.

Tabla nº 11: Estimación de la duración del SIADH según su etiología.

Etiología del SIADH	Estimación de la duración del SIADH	Riesgo relativo de SIADH crónico
Tumores productores de AVP ectópicos	Indefinida, según evolución del tumor	1
Inducido por fármacos con continuación de su uso	Según la duración del tratamiento	1
Hemorragia subaracnoidea	1-4 semanas	0,8
Tumores cerebrales	Según la evolución del tumor	0,8
Idiopático (senil)	Indefinida	0,6
Accidente cerebrovascular	1-4 semanas	0,5
Insuficiencia respiratoria (EPOC)	Según respuesta a su tratamiento	0,5
Lesiones cerebrales inflamatorias	Según respuesta a su tratamiento	0,4
Infección VIH	Según respuesta a su tratamiento	0,2
Traumatismo craneoencefálico	2-7 días a indefinido	0,2
Inducido por fármacos con suspensión de su uso	Según la duración del tratamiento	0
Neumonía	2-5 días	0
Náuseas, dolor, ejercicio prolongado	Variable, según la causa	0
Hiponatremia postoperatoria	2-3 días	0

Adaptado de Verbalis et al, J Endocrinol Nutr, 2010

SIADH = Síndrome de secreción inadecuada de ADH; AVP = arginina-vasopresina; EPOC = enfermedad pulmonar obstructiva crónica; VIH = virus de la inmunodeficiencia humana

Las opciones terapéuticas para el SIADH son las siguientes (tabla nº 12):

- Restricción hídrica (RH):** se considera RH a la limitación del aporte de todos los líquidos (sueroterapia, diluciones de la medicación intravenosa, NP y líquidos orales) a menos de 0,5 – 1 litros al día. Únicamente es válida en los pacientes que mantienen una mínima capacidad renal de eliminar agua libre, la cual se estima a través del cálculo de la fórmula de Furst $[(NaU + KU) / NaS]$ (132), la medición de la osmolalidad urinaria y el volumen de diuresis. Los pacientes con una índice de Furst inferior a 0,5 responderán a una RH de 1 litro/día, mientras que aquellos con un valor entre 0,5 y 1 pueden responder a una RH igual o

menor a 0,5 litros. Sin embargo, en los casos en los que el resultado sea superior a 1 no va a haber una respuesta eficaz a la RH ya que su nefrona no está eliminando agua libre de electrolitos. En este caso se evitan los líquidos no necesarios para que no empeore la hiponatremia, pero no para corregirla. A parte de un índice de Furst > 1 , otros predictores de ausencia de respuesta a la restricción de fluidos < 1 litro al día son una osmolalidad urinaria elevada (> 500 mOsm/kg) y una diuresis < 1500 ml al día. Se considera una respuesta eficaz a la RH cuando la elevación de la natremia sea de un mínimo de 2 mmol/l cada día durante 2 días seguidos (106).

La RH aun se considera la primera línea del tratamiento del SIADH. Sin embargo, se estima que más del 60% de los pacientes con SIADH tienen al menos un predictor de ausencia de respuesta a la RH (133). Además, la RH puede no ser viable en algunos pacientes (medicación intravenosa necesaria, nutrición artificial...). Por otra parte, si precisa una restricción de menos de 0,5 litros al día, se reduce la palatabilidad de la comida y puede empeorar el estado nutricional del paciente en caso de prolongarse varios días (95).

- b) Urea: incrementa la eliminación renal de agua libre y disminuye la natriuresis, lo que se traduce en una elevación de la natremia sérica. Dosis de 15-60 gramos suelen ser suficientes. Aunque hay varios estudios retrospectivos donde se observa la eficiencia del tratamiento (130,134,135), han de tenerse en cuenta varias desventajas: mala palatabilidad que presenta, desarrollo de azotemia con dosis altas, tasa elevada de hipercorrección de la natremia en su uso inicial (134), riesgo de deshidratación con hipernatremia en pacientes que no puedan beber agua libremente (134,136).
- c) Furosemina: en pacientes con SIADH y OsmU superior a 350 mOsm/kg, favorece la eliminación de agua libre modificando el gradiente osmótico entre la médula renal y el túbulo colector (137,138). Esta acción terapéutica se produce, siempre y cuando se garantice un correcto aporte de sodio a la médula renal (mínimo 7-8 gramos de sal al día). Las dosis de furosemina

administradas pueden ser de 20 mg cada 8 a 24 horas intravenosa, o 40 mg cada 8 a 24 horas oral (137,138). La furosemida es especialmente útil en pacientes hospitalizados, en los que el SIADH se prevé transitorio (por ejemplo, el SIADH secundario a neumonía) (106). Su eficacia se reduce tras su administración varios días consecutivos. Entre los efectos adversos más frecuentes destaca la hipopotasemia, que se puede tratar con suplementación de potasio y se normaliza tras la retirada del fármaco.

- d) Antagonistas del receptor de vasopresina (vaptanes): bloquean de manera competitiva el receptor V2 en el túbulo colector, provocando así la eliminación renal de agua libre. Tanto el conivaptán (uso intravenoso) como el tolvaptán (uso oral) han demostrado, en ensayos clínicos randomizados, seguridad y eficacia en el tratamiento de la hiponatremia secundaria a SIADH y en la hipervolémica (122,139,140). También se ha demostrado seguridad y eficacia del tolvaptán en el tratamiento prolongado de los cuadros crónicos de SIADH (141). En Europa sólo disponemos de tolvaptán y únicamente está aprobado su uso en hiponatremia asociada a SIADH. Siguiendo las recomendaciones del algoritmo multidisciplinar español de manejo de la hiponatremia secundaria a SIADH, el tolvaptán estaría indicado en pacientes: no candidatos al tratamiento con RH y furosemida, ausencia de respuesta a dichos tratamientos y cuyo cuadro previsiblemente pueda durar varias semanas o más, como el caso del SIADH crónico (tabla nº) (106). Algunos autores del algoritmo multidisciplinar recomiendan una dosis inicial de 7,5 mg por su mayor seguridad (142), con determinación de natremia a las 6 y a las 24 horas del inicio, sin describirse así ningún caso de hipercorrección (95,143). Los mayores incrementos de natremia se han documentado en pacientes con natremias de partida más bajas, entorno a 120 mmol/L, por lo que su control debe ser más estrecho. A su inicio no se han de asociar a otros tratamientos que incrementen la natremia. Tampoco deben administrarse justo después de la suspensión de suero salino hipertónico. Además, es importante la ingesta libre de agua para compensar la

acuarexis inicial. Tras las primeras 24 horas del comienzo, la dosis de tolvaptan se debe ajustar según los controles diarios de natremia hasta alcanzar la eunatremia (natremia > 135 mmol/L), siendo poco frecuente la necesidad de dosis de mantenimiento mayores de 30 mg al día. El principal efecto secundario documentado en pacientes con SIADH es el aumento de la sed, sin objetivarse en ningún paciente incremento de las transaminasas (141) como se ha descrito en algún pacientes con poliquistosis renal tratado con dosis de 120 mg/día.

Tabla nº 12: Recomendaciones de tratamiento de la hiponatremia no grave por SIADH

Terapia	Indicaciones
Restricción hídrica	<ul style="list-style-type: none"> - Índice de Furst* < 1 (si Furst < 0,5: RH < 1 litro/día; si Furst 0,5-1: RH < 0,5 litro/día) - OsmU < 500 mOsm/kg - Diuresis > 1500 ml/día - Capacidad de cumplimiento (tener en cuenta el resto de fluidos y el estado nutricional)
Furosemida	<ul style="list-style-type: none"> - OsmU > 350 mOsm/kg - SIADH transitorio
Tolvaptán	<ul style="list-style-type: none"> - Ausencia de respuesta a RH o incapacidad para su cumplimiento - Ausencia de respuesta a furosemida - Índice de Furst* > 1 - OsmU < 350 mOsm/kg
Urea	- Síndrome nefrogénico de antidiuresis inapropiada

* Índice de Furst = $[(NaU + KU) / NaS]$

RH = restricción hídrica; SIADH = síndrome de secreción inadecuada de ADH; OsmU = osmolalidad urinaria; NaU = sodio urinario; KU = potasio urinario; NaS = natremia sérica.

6.3.2.3. Tratamiento de la hiponatremia euvolémica no mediada por AVP

- i. **Polidipsia primaria:** idealmente la hiponatremia se corrige con la disminución de la ingesta de líquidos. Sin embargo, esto no es fácil en los pacientes con patología psiquiátrica, cuyo centro de la sed además se ha ajustado, activándose con menores osmolalidades. El antipsicótico con mejores resultados observados en casos clínicos es la clozapina (144).
- ii. **Intoxicación aguda de agua:** al tratarse de una hiponatremia aguda, se tratará

con suero salino hipertónico al 3% (ver apartado 6.2), siendo más recomendable el uso de bolos por su mayor experiencia y eficacia documentada (145).

- iii. **Baja ingesta de sal:** se corrige con aumento de ingesta de soluto, tanto de electrolitos como de proteínas.
- iv. **Hipotiroidismo grave:** el tratamiento es la terapia sustitutiva con hormona tiroidea. Como solo puede ser causa de hiponatremia leve, la restricción hídrica puede ser útil para una corrección de natremia más rápida.

6.3.3. Tratamiento de la hiponatremia hipervolémica

La presencia de hiponatremia en pacientes con insuficiencia cardíaca o cirrosis hepática está considerada un marcador de mal pronóstico al relacionarse con mayor morbimortalidad (36,146). Se ha descrito que la hiponatremia podría ser la causa de estas complicaciones, ya que el edema celular puede provocar una disfunción miocárdica o hepática.

En los pacientes con hiponatremia hipervolémica, el tratamiento inicial recomendado es la restricción de líquidos asociada a diuréticos. Sin embargo, pierde eficacia con el tiempo, al incrementarse la antidiuresis secundaria a un incremento no osmótico de la AVP, en respuesta a descensos del volumen plasmático. En este marco, otra opción terapéutica son los antagonistas del receptor V2 de la vasopresina, como se detalla a continuación.

Según la etiología, hay que tener en cuenta algunas puntualizaciones (93):

- i. **Insuficiencia cardíaca:** la terapia convencional incluye la disminución del consumo de sal, restricción de fluidos, diuréticos (sobretudo diuréticos de asa), betabloqueantes y bloqueo del SRAA. La finalidad de este tratamiento es aumentar el VCE (disminución de la post-carga con el bloqueo del SRAA y la precarga con los diuréticos) inhibiendo así el estímulo barorreceptor de la AVP. Pero en los pacientes con hiponatremia es difícil alcanzar la eunatremia, en parte por la resistencia a la acción de la furosemida en presencia del bajo

aporte de sodio (147). Se debe asegurar un mínimo de aporte de 7,5-8 gramos de sal al día. De hecho, una alternativa terapéutica que ha demostrado una repuesta eficaz y segura, tanto en hiponatremias graves como no graves, es la perfusión con solución salina hipertónica junto a dosis altas de furosemida (148). Los antagonistas del receptor V2 de la vasopresina también se han estudiado para el tratamiento en la insuficiencia cardiaca aguda. Su uso junto a diuréticos de asa es seguro. En pacientes con natremia < 130 mmol/l, el uso se tolvaptán se ha asociado a una mayor corrección de la hiponatremia, con una mejoría significativa de la clínica, disminución de la mortalidad y disminución de la tasa de reingreso (149).

- ii. **Cirrosis hepática:** la terapia convencional consiste en la disminución del consumo de sal, restricción de fluidos, diuréticos (diuréticos de asa junto a espironolactona), paracentesis evacuadora y albúmina. La restricción de fluidos necesaria para mejorar la natremia aun suele más intensa, y por tanto, aun más difícil de mantener. Los vaptanes también parecen ser una alternativa en pacientes con hiponatremia, sobretudo en ascitis refractaria, si la restricción y los diuréticos no son suficientes (150). Sin embargo, en el momento actual se ha retirado la indicación en esta patología, tras documentarse un incremento de la incidencia de hemorragia digestiva alta en pacientes tratados con tolvaptán.
- iii. **Insuficiencia renal aguda, enfermedad renal crónica y síndrome nefrótico:** la restricción de fluidos también es el pilar fundamental del tratamiento. La eficacia de los vaptanes aun no se ha demostrado, aunque parece ser una alternativa siempre que no haya un deterioro grave de la función renal.

6.4. Tratamiento de la hiponatremia en nutrición parenteral

El tratamiento de la hiponatremia en los pacientes con nutrición parenteral (NP) debe seguir los mismas bases que las explicadas anteriormente, teniendo en cuenta la gravedad y el tipo de hiponatremia (hipovolémica, euvolémica, hipervolémica). La

Sociedad Americana de Nutrición Parenteral y Enteral (ASPEN), recomienda aumentar el volumen de la fórmula de NP en pacientes con hiponatremia hipovolémica, y concentrarlo en aquellos con hiponatremia euvolémica e hipervolémica, añadiendo si es necesario furosemida y/o antagonistas del receptor V2 (conivaptán o tolvaptán) (151).

En un estudio prospectivo realizado en 20 pacientes con hiponatremia y NP, se observó un incremento significativo de la natremia a la 72 horas de la administración del tratamiento ajustado al tipo y etiología de la hiponatremia, alcanzando la eunatremia hasta el 75% de los pacientes (152).

7. NUTRICIÓN ARTIFICIAL POR VÍA PARENTERAL

7.1. Definición

La nutrición parenteral (NP) es una modalidad de soporte nutricional que consiste en la administración de nutrientes vía endovenosa, en pacientes que son incapaces de alcanzar los requerimientos nutricionales por la vía enteral y en los que el tracto gastrointestinal está excluido.

7.2. Tipos de nutrición parenteral. Vías de administración

Según los requerimientos nutricionales cubiertos por la NP, se diferencia entre:

- NP total (NPT): suplementación de al menos un 75% de los requerimientos nutricionales de los pacientes por vía parenteral.
- NP parcial: administración de los nutrientes cubriendo sólo parcialmente los requerimientos del paciente.

Por otro lado, teniendo en cuenta la vía de administración de la NP, los tipos de NP son:

- NP central: infusión de nutrientes por una vía venosa central. Es la más frecuente. Puede ser NP total o parcial. Se administra en un vaso de gran calibre, generalmente la vena cava superior o aurícula derecha, accediendo por (según orden de preferencia): vena subclavia, vena yugular, catéter central de inserción periférica (basílica, braquial, cefálica). Para una NP a largo plazo (mayor de 3 meses), se suele utilizar un catéter tunelizado o un porth-a-cath implantado (153).
- NP periférica: infusión de nutrientes por una vía venosa periférica, habitualmente en antebrazo. Suele ser una NP parcial. Esta localización tiene como condicionante la osmolaridad de la preparación parenteral, la cual no debe superar los 800 - 850 mOsm/L (153). La duración prevista de la NP debe ser menor de 7 días.

7.3. Indicaciones y contraindicaciones

La indicación general de la NP se resume en la inaccesibilidad o afectación grave del tracto gastrointestinal, siendo imposible utilizarlo para cubrir los requerimientos nutricionales de los pacientes, siempre que esta situación se prevea que pueda prolongarse durante más de 7-10 días en pacientes normonutridos o más de 3-7 días en pacientes desnutridos severos y/o con importante estrés metabólico (153). Los principales ejemplos de indicaciones de la NP se recogen en la tabla nº 13 (154). La patología más frecuente que motiva el inicio de la NP suele ser el íleo postquirúrgico (155).

Tabla nº 13: Principales patologías que indican la nutrición parenteral.

Disfunción	Ejemplos de posibles patologías
Vómitos intratables	- Pancreatitis aguda grave con intolerancia a NE
Diarrea intratable	- Brote grave de enfermedad inflamatoria intestinal
Mucositis severa	- Quimioterapia - Radioterapia - Trasplante de precursores hematopoyéticos
Íleo paralítico	- Peritonitis - Postquirúrgico de cirugía del tracto gastrointestinal
Estrés severo, hipermetabolismo e hipercatabolismo, necesidades aumentadas no cubiertas con NE	- Sepsis - Politraumatismo - Traumatismo craneoencefálico grave - Quemaduras graves
Obstrucción intestinal	- Cáncer - Bridas
Malabsorción severa	- Síndrome de intestino corto - Enteritis por radiación
Necesidad de reposo intestinal	- Fístula de alto débito
Terapia de soporte o en aumento de necesidades no cubiertas mediante NE	- Insuficiencia renal aguda - Insuficiencia hepática con encefalopatía con intolerancia a la NE - Grandes quemados

NE = nutrición enteral

Entre las principales contraindicaciones de la NP, se encuentran:

- Tracto gastrointestinal funcionante y accesible (a los que se puede nutrir adecuadamente por vía digestiva vía oral o enteral por sonda)
- Duración prevista de cubrir los requerimientos por vía digestiva menor de 3-5 días en pacientes desnutridos y menor de 7 días en pacientes con buena situación nutricional previa.
- Inestabilidad hemodinámica.
- Pronóstico no mejorable con soporte nutricional agresivo o pacientes terminales con expectativas de vida menor a 2 meses.

7.4. Cálculo de los requerimientos y composición de la nutrición parenteral

7.4.1. Requerimientos energéticos

Para el cálculo de los requerimientos energéticos totales en pacientes hospitalizados, se recomienda utilizar la fórmula de Harris-Benedict (cálculo del gasto energético basal), multiplicando por un factor de estrés entre 1,1 y 1,3 según la patología que motiva la indicación de la nutrición artificial (156). Otra alternativa es el cálculo de los requerimientos diarios en función del peso, entre 20-30 kcal/kg peso/día, teniendo en cuenta también el factor de estrés de la enfermedad para elegir el intervalo más adecuado (153). Para cualquiera de estas fórmulas se usa el peso real, exceptuando los pacientes obesos, en los que se recomienda el peso ajustado.

Una vez estimados los requerimientos energéticos totales, se deben calcular los requerimientos de aminoácidos (AAs), restando las calorías resultantes (procedentes de los AAs) al total. Posteriormente, las calorías no proteicas se dividen entre hidratos de carbono y lípidos en porcentajes que pueden oscilar desde un 60% de hidratos de carbono y 40% de lípidos hasta un máximo de 60% de lípidos y 40% de hidratos de carbono.

7.4.2. Composición de la nutrición parenteral

La NP puede contener más de 40 componentes diferentes, incluyendo agua, macronutrientes (carbohidratos, lípidos, aminoácidos), electrolitos, micronutrientes (electrolitos, minerales, vitaminas, oligoelementos) y otros aditivos. Las bolsas de NP pueden elaborarse en la propia Farmacia del hospital o se pueden adquirir en forma de bolsas comerciales ya preparadas. Estas últimas incluyen formulaciones con y sin electrolitos; los macronutrientes vienen separados en compartimentos diferentes y se mezclan cuando van a ser administrados al paciente. Las fórmulas de NP elaboradas en los servicios de Farmacia hospitalarios pueden ser estandarizadas o individualizadas para pacientes cuya situación clínica requiere la modificación de las cantidades de nutrientes normalmente recomendadas.

Agua:

Los requerimientos de agua son muy variables, pero pueden estimarse en adultos entre 30 y 40 ml/kg/día o entre 1 y 1,5 ml de agua por cada kcal de alimentación (156). Además, deben individualizarse según varios factores: el balance hídrico diario teniendo en cuenta el volumen total de líquidos que recibe el paciente y las pérdidas por diuresis, sondajes, drenajes y pérdidas insensibles (aproximadamente 800 ml/día); la volemia clínica del paciente; la presencia de situaciones que conlleven elevación no osmótica de la AVP, es decir, que provoquen antidiuresis (postquirúrgico, náuseas, dolor, fármacos...); la presencia de fiebre (aumento 10% adicional por cada 1°C de incremento de temperatura corporal); las variaciones de la natremia sérica (157).

Tanto el déficit como el exceso de aporte de agua en pacientes hospitalizados pueden implicar complicaciones, entre las que se encuentra la hiponatremia por sobrecarga de fluidos hipotónicos (30). En pacientes quirúrgicos malnutridos, se ha observado un peor pronóstico con el aporte elevado de agua (>45 ml/kg peso/día) por la NP, durante el periodo perioperatorio (158).

Aminoácidos:

La principal función de los aminoácidos (AAs) es la síntesis proteica. Aportan 4 Kcal/g

de energía al oxidarse.

Aunque las recomendaciones de ingesta proteica en sujetos sanos son de 0,8 g/kg/día, en pacientes hospitalizados son mayores los requerimientos según su nivel de estrés: leve (1g/kg/día), moderado (1,3 g/kg/día), grave (1,5 g/kg/día) y muy grave (2g/kg/día) (156). Se debe disminuir el aporte en casos de insuficiencia renal crónica (sin diálisis) o encefalopatía hepática. La enfermedad incrementa el catabolismo proteico y produce una pérdida del mecanismo de adaptación al ayuno. En pacientes con estrés severo, el catabolismo no es revertido con el aporte de dosis de 1,5-2 g/kg/día, pero sí se disminuye al máximo su degradación.

La fuente de AAs en la NP suelen ser soluciones de AAs puros cristalizados en su forma levógira (metabólicamente activa). Estas soluciones aportan los 3 tipos de AAs: esenciales, no esenciales y condicionalmente esenciales (como ej. la glutamina). Existen diferentes soluciones de aminoácidos, pero habitualmente se utiliza una solución estándar que aporta entre un 25-45% de aminoácidos esenciales, y casi todos los aminoácidos proteicos en proporciones adecuadas.

Hidratos de carbono:

Los carbohidratos son la fuente principal de energía de la mayoría de soluciones de NP (153). Generalmente aportan entre el 50-60% de las calorías no proteicas.

Los requerimientos de hidratos de carbono son similares para los sujetos sanos y enfermos, aproximadamente 4-5 g/kg/día (156). Se recomienda aportar un mínimo de 100-150 g/día (2 g/kg/día) para evitar la gluconeogénesis a partir de aminoácidos musculares y la cetosis por degradación de grasas. Por otra parte, no se deben sobrepasar los 6 g/kg/día al existir una tasa máxima de oxidación de glucosa, que en adultos es de 4-5 mg/kg/min, y que por encima de ella provocaría una intolerancia con efectos secundarios: hiperglucemia, hiperosmolalidad, hipertrigliceridemia, esteatosis hepática, hipofosfatemia. También se produciría un aumento de anhídrido carbónico, lo que podría contribuir al inicio o empeoramiento de una insuficiencia respiratoria (153).

Como fuente de hidrato de carbono, se utilizan soluciones de monosacáridos, fundamentalmente D- glucosa, por ser el más fisiológico. Existen soluciones de glucosa de distintas concentraciones, desde un 5 al 70%. Se expresa habitualmente como glucosa anhidra y aporta 4 kcal/g. Si se expresa como glucosa monohidratada, el valor energético es de 3,4 kcal/g.

Lípidos:

Las emulsiones lipídicas se utilizan en NP como sustrato energético y como fuente de ácidos grasos esenciales. Se recomienda una cantidad mínima del 5% de las calorías totales para evitar el riesgo de déficit de ácidos grasos esenciales. El aporte habitual de lípidos en la NP es del 40-50% de las calorías no proteicas.

La cantidad diaria de lípidos recomendada es entre 1-1,5 g/kg/día, sin superar nunca los 2,5 g/kg/día, y en muchos casos, especialmente en el paciente crítico, no se recomiendan cantidades superiores a 1 g/kg/día (156).

Las emulsiones lipídicas utilizadas son liposomas constituidos por una fase acuosa (rica en glicerol), un estabilizador de la emulsión (lecitina) y una fase lipídica en forma de triglicéridos. Son parecidos a los quilomicrones pero sin apoproteínas. Existen diferentes emulsiones según su composición en: aceite de soja (ácidos grasos de cadena larga, triglicéridos de cadena media (MCT), aceite de oliva (ácido oleico), aceite de pescado (ácidos grasos omega 3).

Electrolitos:

Los requerimientos diarios de electrolitos en adultos dependen de las pérdidas que puedan existir de los mismos y de la presencia de un déficit previo. Las recomendaciones generales son 1-2 mEq/kg de sodio y potasio, 10-20 mEq de calcio, 8-20 mEq de magnesio, 20-40 mEq de fosfato y las cantidades de cloro y acetato precisas para mantener el equilibrio ácido-base (156). Los electrolitos pueden añadirse a la mezcla de NP de forma individual o en forma de solución multielectrolítica. Esta última facilita la elaboración de la NP, pero puede ser inadecuada por no adaptarse las necesidades individuales de cada paciente.

Vitaminas y Oligoelementos:

Las vitaminas se añaden en forma de viales multivitamínicos preparados de acuerdo con la recomendación de necesidades de vitaminas por vía intravenosa, al igual que los oligoelementos (156). No existe la posibilidad, cómo en otros países, de individualizar los aportes de las distintas vitaminas y oligoelementos según la patología del paciente; salvo para el zinc (en fístulas, diarreas...) y para el hierro (anemia ferropénica previa).

7.5. Seguimiento y monitorización del paciente con nutrición parenteral

Para prevenir las posibles complicaciones de la NP, es importante realizar un seguimiento de los pacientes por una Unidad de Nutrición, llevando a cabo una monitorización y registro según el protocolo de cada centro (159). La seguridad y eficacia de la NP deben valorarse monitorizando regularmente algunos datos clínicos y bioquímicos de manera sistemática.

Clínicamente, se debe valorar:

- Peso y otros parámetros antropométricos: al menos al inicio de la NP.
- Balance hídrico y valoración de la volemia diarios.
- Constantes vitales (temperatura, presión arterial, frecuencia cardiaca) cada 8 horas.
- Control y cura de la vía venosa central 1 o 2 veces por semana.

En la tabla nº 14 se resumen los controles analíticos que se deben realizar durante la administración de la NP.

Tabla nº 14: Controles bioquímicos recomendados durante la administración de la NP.

Determinación analítica	Periodicidad del control
Glucosa	Glucemia capilar cada 8 horas hasta normoglucemia Al inicio y cada 3-4 días. Diario en pacientes inestables
Sodio, potasio, cloro	Al inicio y cada 3-4 días. Diario en pacientes inestables
Hemograma	Al inicio y semanal
Proteínas totales, albúmina, prealbúmina, transferrina	Al inicio y semanal
Función hepática	Al inicio y semanal. Diario en pacientes inestables
Colesterol y triglicéridos	Al inicio y semanal
Urea y creatinina	Al inicio y semanal
Calcio, fósforo, magnesio, zinc	Al inicio y semanal
Vitaminas y oligoelementos	NP de larga evolución o déficit

7.6. Complicaciones de la nutrición parenteral

Entre las principales complicaciones de la administración de la NP se encuentran las relacionadas con el catéter (mecánicas e infecciosas) y las complicaciones metabólicas. Su incidencia no está clara dada la falta de definiciones y criterios diagnósticos homogéneos, lo que implica un gran heterogeneidad en los estudios (160).

7.6.1. Complicaciones relacionadas con el catéter

a) Complicaciones mecánicas:

- Malposición del catéter: es la complicación mecánica más frecuente y puede ocasionar perforación vascular. La posición óptima de la punta del catéter debe ser a 3-5 cm de la unión entre la vena cava superior y la aurícula derecha: más arriba aumenta el riesgo de trombosis y más abajo de arritmias.
- Neumotórax: es la segunda complicación mecánica más frecuente. Hay mayor riesgo en pacientes delgados, deshidratados o con ventilación mecánica.
- Oclusión del catéter: la causa más frecuente es la trombosis, aunque también puede deberse a la precipitación de sustancias contenidas en la NP: Ca/P, lípidos, fármacos. Se manifiesta por dificultad en la extracción y/o infusión a

través del catéter.

- Trombosis venosa: puede originarse en la luz del catéter impidiendo el paso de los líquidos, o alrededor del mismo originando desde síntomas locales hasta un tromboembolismo. Con frecuencia pasa inadvertida por la ausencia de síntomas locales (edema local, circulación colateral...).
- Otras, menos frecuentes: lesión de la arteria subclavia, embolia gaseosa, rotura con embolismo distal, lesión del plexo braquial, punción del conducto torácico.

b) Complicaciones infecciosas

Se considera la complicación más grave de la NP. El origen de la infección puede ser extraluminal a partir de microorganismos de la piel, intraluminal por contaminación de la conexión, hematógeno a partir de la diseminación desde otro foco infeccioso a través del torrente circulatorio o por contaminación a partir de la solución de la NP. La infección vía extraluminal es más frecuente en catéteres de tipo no tunelizado, mientras que la intraluminal es más frecuente en los tunelizados (159).

El uso de NP aumenta el riesgo de infección por catéter. La incidencia descrita en la literatura es variable en distintas series, por ejemplo: quemados de Cuidados Intensivos (14,7/1000 días de cateterización), médico-quirúrgicos (4,5/1000 días de cateterización) y más baja en los pacientes domiciliarios. Una tasa máxima de 0,45-1 episodios infecciosos/año de cateterización para NP hospitalaria y 0,1-0,5 en NP domiciliaria es aceptable e inevitable aún bajo óptimas condiciones. Lo importante es la prevención, el diagnóstico y el tratamiento precoz (161).

7.6.2. Complicaciones metabólicas

Entre las complicaciones metabólicas más frecuentes se encuentran:

- Hiperglucemia: es la complicación metabólica más frecuente en pacientes con NP. Definida como la presencia de al menos una glucemia capilar > 180 mg/dl, se presenta en aproximadamente el 50% de los pacientes no críticos con NP

(162). Su incidencia aumenta con la alteración del metabolismo hidrocarbonado de base, situaciones de estrés (sepsis, cirugía...), aporte excesivo de glucosa intravenosa... Se asocia a mayor mortalidad y estancia hospitalaria (163).

- Alteración electrolíticas: se desconoce su prevalencia real en pacientes con NP, considerándose las más frecuentes las alteraciones del metabolismo del sodio y la hipopotasemia. En el estudio de Gómez Hoyos et al, los pacientes con NP presentaron dos veces más hiponatremia que sus controles sin NP, independientemente de la edad, sexo e índice de comorbilidad de Charlson. Por otra parte, en este mismo estudio, en los pacientes con NP se objetivó una mayor mortalidad en los pacientes con hiponatremia mantenida (75% de todas las determinaciones de natremia en rango de hiponatremia) tras ajustar por factores de comorbilidad (47). En la gran mayoría de las ocasiones, la hiponatremia se debe a una hipersecreción no osmótica de la AVP que evita la eliminación renal de agua libre (antidiuresis), con la consecuente dilución del sodio plasmático. Las principales causas de esta elevación de la AVP son: el descenso del VCE (con hipovolemia o hipervolemia), estímulos fisiológicos (dolor, náusea, estrés y cirugía) y el SIADH. Estas situaciones son frecuentes en los pacientes hospitalizados, y más aún en los pacientes con indicación de NP (postcirugía mayor abdominal, vómitos intratables, íleo paralítico, obstrucción intestinal,...), en los cuales se puede sumar un mayor aporte de líquidos y un aumento de pérdidas de sodio.
- Hipertrigliceridemia: se considera una complicación frecuente, pero al tener múltiples definiciones (incremento de los niveles de triglicéridos un 150% sobre el límite superior de la normalidad, triglicéridos > 400-500 mg/dl...), su incidencia en la literatura es variable. Se consideran factores de riesgo: dosis elevadas o ritmo de infusión acelerado de lípidos, sepsis, uso de corticoides, hiperglucemia, obesidad, alcoholismo...
- Alteraciones hepatobiliares: observadas entre el 15-40% de los adultos que reciben NP. Pueden aparecer a las pocas semanas de iniciada la NP, aunque es más frecuente en pacientes con NP prolongada. Entre los factores

etiopatogénicos descritos se encuentran: exceso de carbohidratos y lípidos, ausencia de circulación enterohepática y de estímulo del tracto digestivo por los nutrientes intraluminales, déficits nutrientes esenciales (taurina, carnitina, colina), patología inflamatoria o fístulas, infecciones, sobrecrecimiento bacteriano...

- Síndrome de realimentación: se produce en pacientes muy desnutridos (metabolismo energético basado en la utilización de ácidos grasos) cuando reciben un aporte elevado de glucosa. El incremento concomitante de la secreción de insulina promueve la entrada al interior de las células de potasio y fosfato, reduciéndose sus concentraciones plasmáticas. Por lo tanto se caracteriza por hipofosfatemia, hipopotasemia e hipomagnesemia; acompañadas de alteraciones cardíacas, sobrecarga de volumen. Puede asociar alteraciones neurológicas en relación con el déficit de tiamina (164).

8. VALORACIÓN DEL ESTADO NUTRICIONAL

8.1. Definición de desnutrición

La desnutrición puede definirse como un estado de falta de ingesta o absorción de nutrientes que conlleva una alteración de la composición corporal (disminución de la masa libre de grasa) y de la masa celular, provocando un descenso de la función física y mental. Además puede generar un deterioro de la evolución de la enfermedad (165).

Se ha propuesto una clasificación etiológica en el adulto en función del estado de inflamación:

- Desnutrición relacionada con el ayuno, sin inflamación (ej. anorexia nerviosa).
- Desnutrición relacionada con la enfermedad crónica, con inflamación leve-moderada (ej. cáncer, artritis reumatoide).
- Desnutrición relacionada con la enfermedad aguda, con inflamación aguda y grave (ej. sepsis, traumatismo).

Su prevalencia actual es muy elevada. En el estudio nacional multicéntrico PREDYCES (Prevalencia de la Desnutrición Hospitalaria en España y sus Costes Asociados) se ha obtenido una prevalencia de desnutrición hospitalaria en España del 23.7%, utilizando como método de cribado el Nutritional Risk Screening Test (NRS-2002) (166). En cuanto a los pacientes con NP, en un estudio multicéntrico español se ha observado la presencia de desnutrición según el índice de masa corporal (IMC) (si $IMC < 20$ en pacientes menores de 65 años, y si $IMC < 22 \text{ kg/m}^2$ en sujetos con o mayores de 65 años) en un 18.4%, y según la valoración global subjetiva (VGS) en un 64,6%. En este mismo estudio, el mejor índice de valoración nutricional para la predicción de mortalidad intrahospitalaria fue la VGS (167).

Se han descrito múltiples criterios diagnósticos de desnutrición. La ESPEN (Sociedad Europea de Nutrición Parenteral y Enteral) ha publicado recientemente un consenso, con dos alternativas para el diagnóstico de desnutrición (tabla nº 15). En éste se recomienda hacer previamente un test de cribado nutricional para identificar los pacientes en riesgo (168):

Tabla nº 15: Criterios diagnósticos de desnutrición

Alternativa 1	Alternativa 2
	Pérdida de peso (no intencionada) > 10% en cualquier periodo de tiempo, o > 5% en los últimos 3 meses
	+
IMC < 18,5 kg/m ²	IMC < 20 kg/m ² si edad < 70 años o IMC < 22 kg/m ² si edad ≥ 70 años
	ó
	Índice de masa libre de grasa < 15 kg/m ² en mujeres y < 17 kg/m ² en hombres

Adaptado de Cederholm et al, Clin Nutr 2015.

IMC = Índice de masa corporal

8.2. Test de valoración nutricional

El cribado nutricional permite identificar los pacientes desnutridos o en riesgo de desnutrición, determinando así si se precisa de una evaluación nutricional completa. Uno de los test de cribado nutricional más aceptado en la práctica clínica es el Malnutrition Universal Screening Tool o Screening para la valoración de la malnutrición para adultos (MUST).

Dentro de los test de valoración del estado nutricional, entre los más utilizados se encuentran:

Valoración global subjetiva (VGS)

La valoración global subjetiva (VGS) fue descrita por primera vez por Detsky en 1987 (169). En su inicio se desarrolló para valorar el estado nutricional en pacientes quirúrgicos preoperatorios.

Es un cuestionario que combina datos de la historia clínica (peso y cambios en el peso, cambios en la ingesta, presencia de síntomas gastrointestinales, capacidad funcional y presencia de enfermedad o estrés), con datos de la exploración física (pérdida de masa muscular o grasa y presencia de edemas o ascitis). Mediante la evaluación subjetiva de los anteriores aspectos, permite clasificar los pacientes en tres categorías:

normonutridos (A), moderadamente desnutridos (B) y gravemente desnutridos (C) (169). Su uso está ampliamente generalizado en la práctica clínica habitual y en ensayos clínicos. La desnutrición identificada mediante VSG se ha asociado con un incremento de las complicaciones y mortalidad en pacientes hospitalizados, tanto a corto plazo como a largo plazo (170).

Mini-Nutritional Assessment (MNA) o evaluación del estado nutricional

Diseñado específicamente para valorar el estado nutricional de la población geriátrica en diversas situaciones como son los pacientes hospitalizados, en instituciones geriátricas o en domicilio. Es un cuestionario con 18 preguntas distribuidas en dos apartados, uno inicial de cribado (6 preguntas, forma abreviada – MNA short form) y uno posterior de valoración (12 preguntas). Cuando el paciente obtiene una puntuación ≤ 11 en la sección de cribado, debe cumplimentar la segunda parte. Las áreas valoradas en el MNA son: evaluación global (estilo de vida, medicación y situación funcional), medidas antropométricas, cuestionario dietético y autopercepción del estado de salud (171). Clasifica al paciente en desnutrido, riesgo de desnutrición o en estado nutricional normal. El MNA es un método que trata sobre todo de ser práctico, no invasivo y rápido. Se caracteriza principalmente por no requerir datos analíticos de laboratorio y a pesar de ello, tener una adecuada correlación con marcadores bioquímicos de malnutrición.

Nutritional Risk Screening (NRS- 2002)

Está validado y es útil sobretodo en adultos hospitalizados. Consta de una parte inicial que evalúa cuatro aspectos; la presencia de un IMC $< 20,5 \text{ kg/m}^2$, la pérdida de peso en los últimos 3 meses, la reducción en la ingesta y la existencia de enfermedad grave. En caso de respuesta positiva a alguno de los anteriores puntos, se pasa al cuestionario completo, en el que se valora de forma más detallada el estado nutricional y la gravedad de la enfermedad (172).

8.3. Valoración del estado nutricional

La valoración del estado nutricional permite el diagnóstico adecuado de los problemas nutricionales. Precisa un abordaje integral, incluyendo datos de la historia clínica, nutricional y farmacológica, así como una exploración física, datos antropométricos, pruebas de laboratorio y métodos de composición corporal (154).

8.3.1. Datos antropométricos

La antropometría comprende una serie de medidas corporales que contribuyen a la valoración nutricional del paciente y aportan información sobre las reservas de proteínas y grasa del organismo. Los parámetros antropométricos más usados son:

Peso corporal, talla e índice de masa corporal:

En estos parámetros se basa el cálculo de los requerimientos energéticos.

El índice de masa corporal (IMC) se calcula mediante la fórmula: $\text{peso (kg)}/\text{talla}^2 \text{ (m)}$. La OMS 1998 determinó como rango deseable en adultos hasta los 65 años un IMC de 18,5 a 24,9 kg/m^2 . Aunque la desnutrición puede ocurrir con cualquier IMC, los individuos con un IMC extremadamente bajo tienen un mayor riesgo. Un $\text{IMC} < 20 \text{ kg/m}^2$ también se relaciona con mayores complicaciones en pacientes hospitalizados (173). De igual manera, los ancianos con $\text{IMC} < 22 \text{ kg/m}^2$ tienen mayor riesgo de morbilidad, por lo que el punto de corte de riesgo de desnutrición se debe establecer en 22 kg/m^2 en pacientes mayores de 65 años (174) o 70 años (168).

Peso habitual y porcentaje de pérdida de peso:

Es muy importante conocer la pérdida de peso respecto del habitual, en relación con un período de tiempo determinado. El porcentaje de pérdida de peso se calcula con la siguiente fórmula: $\% \text{ pérdida de peso} = [\text{peso habitual (kg)} - \text{peso actual (kg)}] / \text{peso habitual} \times 100$

Según la clasificación de Blackburn, se considera una pérdida peso grave cuando se pierde $> 5 \%$ del peso en 1 mes ó $> 7,5 \%$ del peso en 3 meses o $> 10 \%$ del peso

habitual en 6 meses (154).

Mediciones y pliegues subcutáneos:

Existen una serie de medidas como la circunferencia del brazo o los pliegues cutáneos (tricipital, bicipital, suprailíaco y subescapular), que pueden aportarnos información sobre los compartimentos muscular y graso. El más utilizado en la clínica es la medida del espesor del pliegue cutáneo del tríceps (154).

8.3.2. Parámetros analíticos

La valoración nutricional completa debe incluir, además de un hemograma y una bioquímica general, algunos marcadores nutricionales como proteínas viscerales y marcadores de inflamación:

Proteínas viscerales

Evalúan de forma indirecta la masa proteica corporal. Las más habituales son la albúmina, la prealbúmina, la proteína ligada al retinol (RBP, *retinol binding protein*) y la transferrina. Presentan la ventaja de su amplia disponibilidad, pero, en general, son poco sensibles y específicas en el diagnóstico de desnutrición. La larga vida media de la albúmina (14-21 días) y la gran cantidad de situaciones en que puede verse afectada (inflamación, postcirugía, pérdidas gastrointestinales, insuficiencia hepática...) limitan su valor como parámetro nutricional, aunque presenta una buena correlación con el pronóstico de los pacientes (175,176). La vida media más corta de las otras tres proteínas permite su utilización como marcadores más rápidos y sus cambios son más sensibles para valorar el estado proteico visceral.

Marcadores inflamatorios:

Como la actividad inflamatoria puede contribuir al estado de desnutrición, es importante incluir la determinación de marcadores de inflamación en la valoración nutricional. La propia albúmina plasmática, no sólo actúa como marcador de la reserva proteica visceral, sino como reactante de fase aguda negativo. En situación de

inflamación aguda, se produce hipoalbuminemia, que se irá recuperando a medida que mejore la actividad inflamatoria. Otro de los indicadores de inflamación a evaluar es la proteína C reactiva (PCR), así como la leucocitosis y la hiperglucemia.

9. JUSTIFICACIÓN DE LA TESIS DOCTORAL

La hiponatremia es el trastorno electrolítico más frecuente en la práctica clínica. Los pacientes con nutrición parenteral (NP) pueden presentar numerosas circunstancias que predisponen a la aparición de hiponatremia, como son: situaciones que generan antidiuresis (náuseas, dolor, cirugía, SIADH...), incremento de aporte de líquidos, pérdidas extrarrenales de sodio (fístulas, diarrea, drenajes...). De hecho, en un reciente estudio retrospectivo se ha descrito aproximadamente el doble de frecuencia de hiponatremia en pacientes con NP respecto a un grupo control de pacientes hospitalizados (47). Sin embargo, no hay estudios en la literatura que describan la etiología de la hiponatremia en los sujetos con NP, ni los principales factores de riesgo de su desarrollo a tener en cuenta. Para ello, se precisa de un estudio donde se evalúe correctamente la volemia de los pacientes, todos los factores de riesgo, así como un estudio analítico completo específico de hiponatremia (iones y osmolalidad en plasma y orina, función renal, hormonas tiroideas y cortisol).

A parte de su elevada frecuencia, la hiponatremia es importante por su asociación a mayor morbimortalidad, también observada en pacientes con NP (47). Esta elevada morbimortalidad puede disminuir si se aplica un tratamiento eficaz en la corrección de la hiponatremia. Para conseguirlo, el tratamiento se debe indicar en base al tipo y etiología de la hiponatremia (tratamiento adecuado) tras un correcto diagnóstico. Aunque en guías de práctica clínica se describan las principales recomendaciones del tratamiento de la hiponatremia en NP, no hay estudios que valoren su eficacia ni tampoco su cumplimiento.

Dada la notable ausencia de conocimientos en este campo, se ha realizado el presente trabajo, cuyas hipótesis y objetivos se describen a continuación.

II. HIPÓTESIS Y OBJETIVOS

1. HIPÓTESIS

- 1) La prevalencia de hiponatremia en pacientes que reciben nutrición parenteral total en plantas de hospitalización en España es muy elevada y existen factores que contribuyen a su aparición, como son la náusea y el estímulo doloroso de la AVP (arginina vasopresina), administración de fluidos hipotónicos, pérdidas de sodio (drenajes, fístulas, diarrea) y administración de fármacos que estimulan la AVP.
- 2) La hiponatremia euvolémica es el tipo más frecuente de hiponatremia en pacientes con nutrición parenteral, al igual que en población general hospitalaria. Las etiologías principales son la elevación fisiológica de la AVP y el Síndrome de Secreción Inadecuada de ADH (SIADH).
- 3) La administración de un tratamiento adecuado (en base al tipo y etiología de la hiponatremia), se relaciona a mayor eficacia en la corrección de la hiponatremia.
- 4) La presencia de hiponatremia en pacientes con nutrición parenteral se asocia a mayor mortalidad y estancia hospitalaria.

2. OBJETIVOS

2.1. Objetivo principal

Conocer el tipo y etiología de la hiponatremia en pacientes no críticos que reciben nutrición parenteral total en las plantas de hospitalización de los hospitales españoles.

2.2. Objetivos secundarios

- 1) Conocer los principales factores de riesgo asociados al desarrollo de hiponatremia en pacientes que reciben NP.
- 2) Descripción del tipo de tratamiento pautado a los pacientes con hiponatremia que reciben NP en las plantas de hospitalización de los hospitales españoles, y análisis de la eficacia del mismo.
- 3) Valorar la relación entre la natremia y la hiponatremia durante la administración de NP, con la estancia media y mortalidad intrahospitalaria.

III. MATERIAL Y MÉTODOS

1. DISEÑO DEL ESTUDIO

Estudio observacional, analítico, prospectivo y multicéntrico. Los pacientes fueron reclutados en las Unidades de Nutrición Clínica de 19 centros hospitalarios a nivel nacional, coordinados desde el Hospital Clínico Universitario de Valladolid (HCUV), con la colaboración del Área de Nutrición de la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición (SEEN) y del Grupo del Metabolismo del Agua de la SEEN.

2. POBLACIÓN A ESTUDIO

2.1. Criterios de inclusión

- Pacientes ingresados en plantas de hospitalización (no críticos), con inicio de NP total (definida esta como aquella situación en la que el aporte parenteral representa más del 70% de los requerimientos energéticos estimados diarios por vía parenteral).
- Edad mayor de 14 años.
- Haber firmado el consentimiento informado. En el caso de menores de edad, se firmó un consentimiento informado adaptado por parte de los padres.

2.2. Criterios de exclusión

- Pacientes de la Unidad de Cuidados Intensivos.
- Pacientes con NP iniciada en la Unidad de Cuidados Intensivos.
- Pacientes con NP domiciliaria ingresados.
- NPT de duración igual o menor a 48 horas.
- Nutrición parenteral intradialítica.
- Nutrición parenteral suplementaria.
- Pacientes menores de 14 años o gestantes.

2.3. Cálculo tamaño muestral

Para el cálculo del tamaño muestral, estimamos la incidencia de hiponatremia tras el inicio de NP del 28%, con lo que se debían reclutar 484 sujetos, asumiendo una precisión del 5% y un intervalo de confianza asintótico normal del 95% bilateral.

3. PROTOCOLO DEL ESTUDIO

3.1. Proceso de selección

Las Unidades de Nutrición Clínica de los 19 centros hospitalarios que aceptaron participar en el estudio, incluyeron a pacientes de planta de hospitalización durante su práctica clínica habitual, a los que se iniciaba NP total y cumplían criterios de inclusión, durante un periodo de nueve meses (desde el 1 de junio de 2015 al 29 de febrero de 2016).

Se adjunta en el anexo 1 la lista de los centros hospitalarios e investigadores participantes, así como el número de pacientes incluidos por cada uno.

3.2. Consideraciones éticas

El estudio fue aprobado por el Comité de Ética del HCUV (anexo 2) y todos los sujetos incluidos firmaron previamente el Consentimiento Informado (anexo 3).

3.3. Recogida de datos

En la Unidad de Nutrición Clínica y Dietética del HCUV se elaboró un cuaderno de recogida de datos que fue enviado a cada uno de los centros reclutadores antes del inicio del estudio (anexo 4).

Los pacientes fueron valorados por un miembro de la Unidad de Nutrición de cada hospital al inicio de la NP y durante la administración de la misma. Este facultativo se encargó además del registro de todos los datos especificados en el formulario.

Tras finalizar la cumplimentación de los cuadernos de recogida de datos, se enviaron al HCUV, donde se trasladaron a una base de datos diseñada a tal efecto.

3.4. Protocolo de inicio de la nutrición parenteral

Los facultativos de las Unidades de Nutrición de cada centro formularon la NP según su práctica clínica habitual (154,156), teniendo en cuenta las recomendaciones del protocolo de estudio, que se detallan a continuación:

Requerimientos calóricos:

Para el cálculo de los requerimientos calóricos basales (gasto energético basal – GEB) se empleó la fórmula de Harris-Benedict:

- Si varón: $GEB = 6,47 + (13,75 \times \text{peso en kg}) + (5 \times \text{talla en cm}) - (6,76 \times \text{edad})$
- Si mujer: $GEB = 665,1 + (9,6 \times \text{peso en kg}) + (1,85 \times \text{talla en cm}) - (4,68 \times \text{edad})$

En esta fórmula se utilizó el peso real hasta IMC de 27 kg/m^2 y el peso ajustado para IMC mayor a 27 kg/m^2 . El peso ajustado se calcula a partir de la fórmula:

- $\text{Peso ajustado} = ((\text{peso real} - \text{peso ideal}) \times 0,25) + \text{peso ideal}$

Para estimar el peso ideal se podían consultar las tablas de peso ideal para la población española o utilizar la siguiente fórmula

- Si varón: $\text{Peso ideal} = 22 \times \text{talla}^2 \text{ en metros}$
- Si mujer: $\text{Peso ideal} = 21 \times \text{talla}^2 \text{ en metros}$

Para el cálculo de los requerimientos calóricos totales (gasto energético total – GET) se multiplicó por un factor de estrés único dependiendo de la severidad de la enfermedad y del grado de estrés metabólico, que en general oscila entre 1,1 y 1,3 (tabla nº16).

Tabla nº 16: Factor de estrés de la enfermedad, por el cual se multiplica el gasto energético basal (GEB) para obtener el gasto energético total (GET).

	Factor de estrés
Desnutridos	1,1
Enfermedad hepática	1,1
Cirugía	
- No complicada	1,2
- Complicada	1,3
Tumores sólidos	1,2
Leucemia/linfoma	1,2
Infecciones	1,2
Enfermedad inflamatoria intestinal	1,2
Sepsis	1,3
Transplante	1,3
Pancreatitis	1,3

Requerimientos de aminoácidos:

Para estimar las necesidades de aminoácidos se tuvo en cuenta el grado de estrés de la enfermedad según la tabla nº 17.

Tabla nº 17: Grado de estrés de enfermedad a partir del cual se obtienen los requerimientos de aminoácidos.

Grado de estrés		g de AAs/kg/día
Muy leve	Desnutrición, coma	1
Leve	Cirugía y trasplante no complicados, pancreatitis, hepatopatía, cáncer, sepsis	1,1 – 1,3
Moderado-Grave	Cirugía y pancreatitis complicadas, respuesta inflamatoria sistémica, fístula de alto débito	1,3 – 1,5
Muy grave con pérdidas extras	Grandes quemados	1,5 - 2

AAs = aminoácidos

Requerimientos de hidratos de carbono (HC) y lípidos:

Una vez estimados los requerimientos calóricos totales y de AAs, se calcularon los requerimientos no proteicos (GET – Kcal proteicas), distribuyéndose entre HC y de lípidos siguiendo los procedimientos locales de cada centro. En general se dividieron con una horquilla entre el 40% y el 60% para cada macronutriente, sin superar un aporte de HC mayor de 5 g/kg/día, ni de lípidos mayor a 1,5 g/kg/día.

Requerimientos de electrolitos y agua:

En pacientes con función renal conservada, y en ausencia de pérdidas renales y extrarrenales, se recomendaba iniciar con 1 mEq/Kg/día de sodio, 1 mEq/kg/día de potasio, 10-15 mEq/día de calcio, 8-20 mEq/día de magnesio, 20-40 mmol/día de fosfato, y las cantidades de cloro y acetato precisas para mantener el equilibrio ácido-base.

Respecto a los requerimientos de agua, se estimaban entre 30-40 ml/kg/día, teniendo en cuenta la volemia del paciente y el aporte de fluidos extras.

3.5. Seguimiento

Seguimiento clínico:

Los pacientes incluidos fueron valorados diariamente por los facultativos de las Unidades de Nutrición Clínica de cada hospital (de lunes a viernes, excepto festivos).

En todos los sujetos, el seguimiento incluía:

- Medición de peso (en kg) y talla (en metros) al inicio de la NP.
- Cálculo de balance hídrico diario (en ml) con recogida de: diuresis, débito de líquidos corporales (drenajes, fístulas, sonda nasogástrica,...), aporte extra de líquidos (sueroterapia, diluciones de medicación intravenosa).
- Recogida de datos de constantes vitales: temperatura, presión arterial y frecuencia cardíaca.

En los pacientes en los que se detectaba hiponatremia ($\text{NaS} < 135 \text{ mmol/L}$, tras corrección por glucemia) tanto al inicio como durante la administración de la NP, se debía evaluar la volemia clínica del paciente mediante la exploración física. Para ello se recomendaba valorar:

- La presión venosa yugular, diferenciando entre: baja (onda del pulso venoso por debajo del ángulo del esternón), elevada (onda del pulso venoso 3 cm por encima del ángulo del esternón) o normal.
- La tensión ocular (presión con un dedo sobre cada uno de los globos oculares por parte del explorador), diferenciando entre: baja (muy depresible), elevada (poco depresible), y normal.
- Presencia o ausencia de edemas y/o ascitis.

Además, en estos sujetos se debía valorar la indicación de inicio de tratamiento dirigido a la corrección de la hiponatremia, según la práctica clínica habitual de cada centro.

Seguimiento analítico:

Cada Unidad de Nutrición siguió sus protocolos locales para los controles analíticos habituales de todos los pacientes con NP. En general se recomendaba:

- Al inicio y cada 24-48 horas hasta estabilización clínica, y posteriormente al menos una vez a la semana: glucosa, creatinina, urea, proteínas totales, sodio, potasio, magnesio y fósforo.
- Al inicio y semanalmente: hemograma, coagulación, pruebas de función hepática, perfil lipídico (triglicéridos y colesterol), albúmina, prealbúmina y PCR.

En los pacientes identificados con hiponatremia, se debía solicitar una analítica sanguínea para su estudio, con determinación de sodio, potasio, creatinina, urea, osmolalidad plasmática, ácido úrico, cortisol basal (si no recibían tratamiento corticoideo), TSH y T4L; así como una muestra aislada de orina con determinación de sodio, potasio y osmolalidad urinaria.

4. VARIABLES INCLUIDAS

4.1. Variables principales (relacionadas con la natremia e hiponatremia)

Datos analíticos generales en relación a la natremia e hiponatremia (en todos los pacientes):

Todas las natremias (NaS) se corrigieron por la glucemia de la misma analítica mediante el incremento de 1,6 mmol/L de sodio por cada 100 mg/dl de glucemia por encima de 100 hasta 400 mg/dl, y posteriormente con el incremento de 4 mmol/L por cada 100 mg/dl. Se desestimaron las natremias en caso de niveles de triglicéridos mayores de 400 mg/dl.

En todos los centros las determinaciones de natremia sérica fueron analizadas por potenciometría indirecta con electrodos selectivos (ISE).

Las variables analíticas en relación a la natremia fueron:

- **Natremia basal** (cuantitativa continua; en mmol/L): calculada a partir de las determinaciones de sodio y glucosa de la analítica previa más cercana al inicio de la NP.
- **Natremias durante la NP** (cuantitativas continuas; en mmol/L): calculadas a partir de todas las determinaciones de sodio y glucosa realizadas durante la administración de la NP.
- **Natremias intraindividuales (Naln)** (cuantitativas continuas; en mmol/L): todas las determinaciones de natremia durante la NP de un paciente. A partir de ellas se calcularon en cada sujeto:
 - Naln mínima
 - Naln en percentil 25
 - Naln en percentil 50
 - Naln en percentil 75
 - Naln máxima
- **Hiponatremia inicio NP** (categórica binaria; si o no): natremia basal < 135 mmol/L en la analítica previa más cercana al inicio de la NP.

- **Hiponatremia durante NP** (categórica binaria; si o no): natremia < 135 mmol/L en cualquiera de las natremias durante la NP.
- **Hiponatremia global** (categórica binaria; si o no): natremia < 135 mmol/L en la natremia basal o en cualquiera de las natremias durante la NP.
- **Hiponatremia grave** (categórica binaria; si o no): definida como natremia sérica < 125 mmol/L.
- **Fecha de aparición de hiponatremia** (día, mes y año): primera fecha con natremia sérica < 135 mmol/L. En el caso de presentar hiponatremia en la natremia basal, se consideró la fecha de inicio de la NP.
- **Tiempo hasta aparición de hiponatremia** (cuantitativa discreta; en días): calculado a partir de la fecha de inicio de la NP y la fecha de aparición de hiponatremia.

Datos para la valoración de la persistencia de la hiponatremia (en todos los pacientes):

Para determinar el grado de persistencia de la hiponatremia se valoró la presencia de NaS < 135 mmol/L en los percentiles 25, 50 y 75 de todas las determinaciones de natremia de cada uno de los pacientes (natremias intraindividuales - NaIn), así como la presencia de NaS < 135 mmol/L en la NaIn máxima. De este modo se define en cada paciente:

- **Hiponatremia en el percentil 25 de la NaIn** (categórica binaria; si o no): natremia < 135 mmol/L en al menos el 25% de todas las determinaciones.
- **Hiponatremia en el percentil 50 de la NaIn** (categórica binaria; si o no): natremia < 135 mmol/L en al menos el 50% de todas las determinaciones.
- **Hiponatremia en el percentil 75 de la NaIn ó hiponatremia mantenida** (categórica binaria; si o no): natremia < 135 mmol/L en al menos el 75% de todas las determinaciones.
- **Hiponatremia en el máximo de la NaIn ~~máxima~~** (categórica binaria; si o no): natremia < 135 mmol/L en todas las determinaciones.

Datos analíticos para la valoración del tipo de hiponatremia y su etiología:

Datos obtenidos a partir de la analítica solicitada en los casos identificados con hiponatremia, lo más cerca posible de la fecha de aparición. No se tuvieron en cuenta los resultados en los que la natremia de esta analítica diagnóstica ya fuera igual o superior a 135 mmol/L. Los métodos de laboratorio utilizados fueron los de referencia de cada centro, siendo la potenciometría indirecta con electrodos selectivos (ISE) la usada en todos los centros para la determinación de natremia.

- **Natremia diagnóstica** (cuantitativa continua; en mmol/L).
- **Potasio diagnóstico** (KS) (cuantitativa continua; en mmol/L).
- **Creatinina diagnóstica** (cuantitativa continua; en mg/dl).
- **Urea diagnóstica** (cuantitativa continua; en mg/dl).
- **Osmolalidad plasmática** (OsmP) (cuantitativa continua; en mOsm/kg).
- **Ácido úrico** (cuantitativa continua; en mg/dl).
- **Sodio urinario** (NaU) (cuantitativa continua; en mmol/L): determinación de sodio en muestra aislada de orina.
- **Potasio urinario** (KU) (cuantitativa continua; en mmol/L): determinación de potasio en muestra aislada de orina.
- **Osmolalidad urinaria** (OsmU) (cuantitativa continua; en mOsm/kg): determinación de osmolalidad en muestra aislada de orina.
- **Hipotiroidismo primario grave** (categórica binaria; si o no): definido como TSH > 50 µIU/ml y T4L por debajo del límite de la normalidad.
- **Insuficiencia suprarrenal** (categórica binaria; si o no): diagnóstico realizado por el facultativo de Endocrinología y Nutrición de cada centro, tras solicitud del cortisol basal (en los casos sin tratamiento corticoideo) y test de estímulo con ACTH si precisaba.
- **Gradiente transtubular de potasio** (GTTK) (cuantitativa continua; en %): calculado a partir de la fórmula $GTTK = (KU \times OsmP) / (OsmU \times KS)$. Se considera diagnóstico de hipoaldosteronismo un GTTK menor de 5.

Datos clínicos para la valoración del tipo de hiponatremia y su etiología:

- **Tipo de hiponatremia** (categórica, de tres categorías; hipovolémica, euvolémica e hipervolémica): especificada por el facultativo de cada centro tras la valoración de la volemia clínica y los datos analíticos del estudio de hiponatremia (Tabla nº 18).
- **Etiología de la hiponatremia hipovolémica, euvolémica e hipervolémica** (categóricas; ver tabla nº 18): determinada tras la valoración en cada paciente de todos los siguientes datos (no se pudo determinar en ausencia de cualquiera de ellos, como por ejemplo, en ausencia de la analítica diagnóstica de hiponatremia):
 - a) Comorbilidades previas (insuficiencia renal, insuficiencia hepática, insuficiencia respiratoria, insuficiencia cardiaca, neoplasia).
 - b) Otros cuadros clínicos antes y durante la administración de la NP (dolor, náuseas o vómitos, diarrea, fístulas, obstrucción intestinal, íleo paralítico, ascitis o edemas).
 - c) Intervención quirúrgica previa a de la aparición de hiponatremia (< 48 horas)
 - d) Administración de fármacos (diuréticos, AINEs, IECAs, antiepilépticos, gabapentina/pregabalina, antidepresivos, cotrimoxazol, opiáceos).
 - e) Media del aporte total de sodio/día y del aporte total de volumen/día, teniendo en cuenta la NP y la sueroterapia extra.
 - f) Evolución de las natremias séricas durante la administración de la NP.
 - g) Analítica diagnóstica de hiponatremia (iones y osmolalidad en suero y orina, función renal, ácido úrico, GTTK, cortisol basal, hormonas tiroideas).

Tabla nº 18: Tipo de hiponatremia y etiologías de cada tipo de hiponatremia

TIPO de hiponatremia	Datos clínicos y analíticos específicos de cada tipo de hiponatremia	ETIOLOGÍA de la hiponatremia
Hiponatremia hipovolémica	- Hipotensión y frecuencia cardíaca elevada - Tensión ocular y PVY bajas. - NaU < 20 mmol/L, salvo pérdidas renales (diuréticos...)	1. Pérdidas renales por diuréticos o hipoaldosteronismo
		2. Pérdidas digestivas
		3. Hemorragia
		4. Insuficiencia suprarrenal
Hiponatremia euvolémica	- Tensión ocular normal o elevada, PVY normal - Ausencia de signos de hipovolemia y de tercer espacio. - NaU > 40 mmol/L	1. SIADH
		2. Elevación fisiológica de la AVP por náuseas, dolor o estrés postquirúrgico
Hiponatremia hipervolémica	- Signos de tercer espacio (ascitis, edemas periféricos, edema pulmonar, ...) - NaU variable	1. Insuficiencia cardíaca
		2. Cirrosis hepática con descompensación hidrópica

NaU = sodio urinario, PVY = presión venosa yugular; AVP = arginina-vasopresina; SIADH = secreción inadecuada de hormona antidiurética.

Datos clínicos del tratamiento de la hiponatremia durante la NP:

- **Tratamiento de la hiponatremia** (categórica binaria; si o no): indicación o no de tratamiento en los pacientes con hiponatremia, tanto al inicio como durante la NP.
- **Tipo de tratamiento de la hiponatremia** (categórica de 11 categorías; incremento de Na en la NP, aumento de volumen de la NP, SSF 0,9%, reducción de volumen de la NP, reducción de fluidos extra, retirada de diurético, furosemida, tolvaptán, incremento de Na + reducción de volumen de la NP, incremento de Na + aumento de volumen de la NP, otros).
- **Fecha de inicio del tratamiento de la hiponatremia** (día, mes y año).

- **Tratamiento adecuado** (categórica binaria; si o no): definido como tratamiento ajustado al tipo de hiponatremia, determinado tras la valoración del tratamiento administrado y su correspondencia con la volemia clínica. En la tabla nº 19 se especifican las opciones terapéuticas consideradas adecuadas para cada tipo de hiponatremia.
- **Tratamiento eficaz** (categórica binaria; si o no): se consideró tratamiento eficaz el alcanzar la eunatremia ($\text{Na} \geq 135 \text{ mmol/L}$) a las 48-72 horas de la fecha de inicio de la terapia.

Tabla nº 19: Opciones de tratamientos adecuados para cada tipo de hiponatremia

TIPO de hiponatremia	Opciones de tratamientos adecuados
Hiponatremia hipovolémica	- Expansión de volumen (aumento de volumen de la NP o SSF 0.9%) - Retirada de diurético
Hiponatremia euvolémica	- Incremento de Na en la NP + reducción de volumen (de la NP o de fluidos extra) - Furosemida - Tolvaptán - Tratamiento sintomático para reducir los estímulos fisiológicos de la ADH (analgesia, antieméticos)
Hiponatremia hipervolémica	- Reducción de volumen (de la NP o de fluidos extra) - Furosemida

NP = nutrición parenteral, Na = sodio, SSF = suero salino fisiológico.

Datos del tratamiento de la hiponatremia en relación a la NP y la fluidoterapia extra
(solo SI tratamiento de la hiponatremia):

- **Media del aporte total de volumen/día durante el tratamiento de la hiponatremia** (cuantitativa continua; en mililitros): calculada a partir de la suma de la media del aporte de volumen/día en la NP y la media del aporte de

líquidos extra/día durante los días tras el inicio del tratamiento de la hiponatremia.

- **Media del aporte de sodio/día en la NP durante el tratamiento de la hiponatremia** (cuantitativa continua; en miliequivalentes).

Datos en relación a los factores predictores de respuesta al tratamiento adecuado en el SIADH (solo SI hiponatremia euvolémica por SIADH):

1. Factores predictores de ausencia de respuesta a la restricción de fluidos < 1 litro/día:
 - **Osmolalidad urinaria > 500 mOsm/kg** (categórica binaria; si o no).
 - **Diuresis < 1500 ml/24h** (categórica binaria; si o no).
 - **Índice de Furst > 1** (cuantitativa continua): calculado a partir de la fórmula de Furst $[(NaU + KU) / NaS]$.
2. Factores predictores de respuesta a la furosemida:
 - **Osmolalidad urinaria > 350 mOsm/kg** (categórica binaria; si o no).

4.2. Variables secundarias

Datos sociodemográficos:

- **Edad** (cuantitativa discreta; en años): edad al inicio de la NP.
- **Género** (categórica binaria; hombre o mujer).
- Hospital de procedencia.

Datos clínicos de la historia médica y del ingreso actual:

- **Comorbilidades previas** (categóricas binarias; si o no): patologías asociadas al inicio de la NP, incluyendo la insuficiencia renal aguda y/o crónica, insuficiencia hepática aguda y/o crónica, insuficiencia respiratoria crónica y/o aguda, insuficiencia cardíaca aguda y/o crónica.
- **Diabetes mellitus** (categórica binaria; si o no).

- **Neoplasia** (categórica binaria; si o no): determinado a partir de la descripción del motivo del ingreso y de la patología que indicaba el inicio de la NP. Por tanto se consideró como neoplasia activa.
- **Intervención quirúrgica durante el ingreso** (categórica binaria; si o no) y la **fecha de la cirugía** en su caso (día, mes y año).
- **Fecha de ingreso** (día, mes y año).
- **Fecha de alta** (día, mes y año): fecha del alta hospitalaria o de la defunción en su caso.
- **Destino al alta hospitalaria** (categórica de 3 categorías: a domicilio, a residencia/centro de continuidad de cuidados, o defunción).

Datos antropométricos y de valoración nutricional:

- **Peso** (cuantitativa continua, en kg): peso medido o estimado.
- **Talla** (cuantitativa continua; en m): talla medida o estimada.
- **Índice de masa corporal (IMC)** (cuantitativa continua; en kg/m^2): calculado a partir de la fórmula del “peso (kg) / talla² (m)”.
- **Diagnóstico de desnutrición por IMC** (categórica binaria; si o no): se consideró desnutrición en el medio hospitalario si $\text{IMC} < 20$ en pacientes menores de 65 años, y si $\text{IMC} < 22 \text{ kg/m}^2$ en sujetos con igual o más de 65 años (173,174).
- **Valoración global subjetiva (VGS)** (categórica de 3 categorías; A, B o C): cuestionario estructurado para la evaluación del estado nutricional que tiene en cuenta la pérdida de peso, la modificación en la dieta, la presencia de síntomas digestivos, la capacidad funcional, el estrés metabólico por enfermedad y una exploración física básica. La puntuación final permitió clasificar a los pacientes en: A (normonutrido), B (desnutrición moderada) y C (desnutrición grave).
- **Gasto energético basal (GEB)** (cuantitativa continua; en kcal).
- **Gasto energético total (GET)** (cuantitativa continua, en kcal).

Datos relacionados con la administración de la nutrición parenteral:

- **Fecha de inicio de la NP** (día, mes y año).
- **Fecha de retirada de la NP** (día, mes y año).
- **Duración de la NP** (cuantitativa discreta; en días): calculada a partir de la fecha de inicio y la fecha de retirada de la NP.
- **Patología que indica el inicio de la NP** (categórica de 10 categorías; desnutrición grave preoperatoriamente, postoperatorio de cirugía mayor del tracto gastrointestinal, sepsis, tumor sólido con radioterapia y/o quimioterapia, tumor sólido con carcinomatosis, leucemia/linfoma/mieloma y/o trasplante de médula ósea, enfermedad inflamatoria intestinal, pancreatitis, fístula intestinal de alto débito, otros).
- **Causa última del inicio de la NP** (categórica de 7 categorías; vómitos intratables, diarrea intratable, mucositis grave, íleo paralítico, obstrucción intestinal, necesidad de reposo intestinal, otros).
- **Motivo de la retirada de la NP:** (categórica de 6 categorías; paso a nutrición oral, paso a NE por sonda nasogástrica (SNG), paso nutrición oral y NE por SNG, pérdida de vía, éxitus, u otros).

Datos de la composición de la nutrición parenteral:

- **Media del aporte de lípidos/día, hidratos de carbono/día y aminoácidos/día** (cuantitativas continuas; en gramos).
- **Media del aporte de lípidos/kg/día, hidratos de carbono/kg/día y aminoácidos/kg/día** (cuantitativas continuas; en g/kg): calculadas a partir de las medias de los aportes al día divididas por el peso del paciente (peso real si $IMC \leq 27 \text{ kg/m}^2$ y peso ajustado si $IMC > 27 \text{ kg/m}^2$).
- **Media del aporte calórico al día** (cuantitativa continua; en kcal): calculada a partir de la suma de kcal aportadas por cada macronutriente. Cada gramo de lípidos infundido por la NP equivale a 10, cada gramo de hidratos de carbono a 4 kcal y cada gramo de aminoácidos a 4 kcal.

- **Media del aporte calórico/kg/día** (cuantitativa continua, en kcal/kg): calculada a partir del aporte calórico al día dividido por el peso del paciente (peso real si $IMC \leq 27 \text{ kg/m}^2$ y peso ajustado si $IMC > 27 \text{ kg/m}^2$).
- **Porcentaje de kcal/día respecto al GET calculado** (cuantitativa continua; en %): calculado a partir del aporte calórico al día dividido por el GET.
- **Media del aporte de sodio/día y de potasio/día en la NP** (cuantitativas continuas; en miliequivalentes).
- **Media del aporte de sodio/kg/día y de potasio/kg/día en la NP** (cuantitativas continuas; en mEq/kg): calculadas a partir de las medias de los aportes al día divididos por el peso del paciente (peso real si $IMC \leq 27 \text{ kg/m}^2$ y peso ajustado si $IMC > 27 \text{ kg/m}^2$).
- **Media del aporte de volumen/día en la NP** (cuantitativa continua; en mililitros): media de volumen infundido por la NP al día.
- **Media del aporte de volumen/kg/día en la NP** (cuantitativa continua; en ml/kg): calculada a partir del aporte del volumen/día dividido por el peso del paciente (peso real si $IMC \leq 27 \text{ kg/m}^2$ y peso ajustado si $IMC > 27 \text{ kg/m}^2$).
- **Media de la osmolaridad/día de la NP** (cuantitativa continua; en mOsm/L).
- **Media de aporte de osmoles/día de la NP** (cuantitativa continua; en miliosmoles): calculada a partir de la suma de los osmoles de los iones y de la urea generada por el metabolismo de las proteínas. Cada mmol de sodio y de potasio corresponden a 2 mOsmol, ya que el aporte se realiza en forma de cloruro sódico y cloruro potásico respectivamente (1 mOsmol por cada mmol de Na o K y 1 mOsmol por cada mmol de Cl). Y por su parte, cada 10 g de proteínas generan 50 mmol de urea, y cada mmol de urea equivale a 1 mOsmol.
- **Media de aporte de osmoles/kg/día** (cuantitativa continua; en mOsm/kg): calculada a partir del aporte de osmoles/día dividido por el peso del paciente (peso real si $IMC \leq 27 \text{ kg/m}^2$ y peso ajustado si $IMC > 27 \text{ kg/m}^2$).

Datos del aporte extra de líquidos:

- **Aporte de líquidos extra** (categórica binaria; si o no).
- **Media de aporte líquidos extra al día durante la NP** (cuantitativa continua; en mililitros): incluía la sueroterapia, las diluciones para medicación intravenosa y la ingesta oral en el caso que se hayan registrado.
- **Tipo de líquido extra administrado** (categórica de tres categorías; solución isotónica, solución hipotónica, ambas): en base a la osmolaridad de la solución, el tipo de sueroterapia administrada se clasificó en: solución isotónica (suero salino fisiológico) solución hipotónica (suero glucosalino, suero glucosado, suero hiposalino).
- **Media del aporte de sodio al día por la fluidoterapia extra** (cuantitativa; en miliequivalentes): calculado a partir de los mEq de sodio administrados por la solución isotónica (154 mEq de Na por cada litro). En los casos en los que se usaban ambas soluciones (isotónica e hipotónica), se consideraba la mitad del volumen para cada tipo de solución.
- **Media del aporte total de volumen/día** (cuantitativa continua; en mililitros): calculada a partir de la suma de la media del aporte de volumen/día en la NP y la media del aporte de líquidos extra/día.
- **Media del aporte total de volumen/kg peso/día** (cuantitativa continua; en ml/kg) calculada a partir del aporte del volumen/día dividido por el peso del paciente (peso real si $IMC \leq 27 \text{ kg/m}^2$ y peso ajustado si $IMC > 27 \text{ kg/m}^2$).
- **Media del aporte total de sodio/día** (cuantitativa continua; en miliequivalentes): calculada a partir de la suma de la media del aporte de sodio/día en la NP y la media del aporte de sodio por la fluidoterapia extra/día.
- **Media del aporte total de sodio/kg peso/día** (cuantitativas continua; en mEq/kg): calculada a partir de la media del aporte total de sodio/día dividido por el peso del paciente (peso real si $IMC \leq 27 \text{ kg/m}^2$ y peso ajustado si $IMC > 27 \text{ kg/m}^2$).

Datos de factores que puedan influir en el desarrollo de hiponatremia:

- **Uso de diuréticos** (categórica binaria; si o no).
- **Uso de fármacos que estimulen la secreción de ADH** (categóricas binarias; si o no): AINEs, IECAs, carbamazepina o oxcarbacepina, gabapentina o pregabalina, antidepresivos (amitriptilina, ISRSs...), opiáceos.
- **Uso de fármacos que inducen hipoaldosteronismo** (categórica binaria; si o no): uso de cotrimoxazol.
- **Otros cuadros clínicos que influyen en el desarrollo de hiponatremia** (categóricas binarias; si o no): dolor, náuseas o vómitos, pérdidas digestivas (diarrea, fístulas, obstrucción intestinal o íleo paralítico), ascitis o edemas.

Datos de otras complicaciones relacionadas con la administración de la NP:

- **Alteraciones hepatobiliares** (categórica binaria; si o no): si tras el inicio de la NP alguno de los siguientes valores, que estaban previamente normales, y en ausencia de patología de base, se elevaban por encima de GOT, GPT y GGT > 90 u/l, FA > 400 u/l, bilirrubina total > 2.5 mg/dl.
- **Complicaciones infecciosas** (categórica binaria; si o no)
- **Tipo de complicación infecciosa** (categórica de 5 categorías; infección relacionada con catéter, sepsis, neumonía, infección herida quirúrgica, otras).
- **Complicaciones mecánicas** (categórica binaria; si o no).
- **Tipo de complicación mecánica** (categórica de 3 categorías; neumotórax, trombosis, sin especificar).
- **Hipertrigliceridemia** (categórica binaria; si o no): si determinación de triglicéridos > 500 mg/dl.
- **Uremia** (categórica binaria; si o no): si determinación de urea > 80 mg/dl, descartando concomitancia de sangrado digestivo agudo.
- **Hipernatremia** (categórica binaria; si o no): si determinación de NaS > 150 mEq/L.
- **Hiperpotasemia** (categórica binaria; si o no): si determinación de KS > 5,5 mEq/L.

- **Hipopotasemia** (categórica binaria; si o no): si determinación de KS < 3 mEq/L.
- **Hipofosforemia** (categórica binaria; si o no): si determinación de P < 2 mg/dl.
- **Hipomagnesemia** (categórica binaria; si o no): si determinación de Mg < 1,2 mg/dl.
- **Hipocalcemia** (categórica binaria; si o no): si determinación de Ca corregido por PT < 8 mg/dl. Para el cálculo del calcio corregido se recomendó la fórmula $\text{Ca corregido} = \text{Ca medido} - (0,676 \times \text{PT}) + 4,87$
- **Hiperglucemia** (categórica binaria; si o no): si determinación de glucemia plasmática > 200 mg/dl y/o glucemia capilar > 180 en una determinación y/o glucemia capilar > 140 en dos determinaciones.

Datos analíticos generales (en las primeras 24-48 horas de infusión de la NP)

Todas las determinaciones analíticas se realizaron según los métodos de laboratorio habituales de cada centro hospitalario, en las primeras 24-48 horas del inicio de la administración de la NP.

- Proteína C reactiva (cuantitativa; en mg/dl)
- Albúmina (cuantitativa; en g/dl)
- Prealbúmina (cuantitativa; en mg/dl)
- Leucocitos (cuantitativa; en número $\times 10^3/\mu\text{l}$)
- Triglicéridos (cuantitativa; en mg/dl)
- Colesterol total (cuantitativa; en mg/dl)
- Urea (cuantitativa; en mg/dl)
- Creatinina (cuantitativa; en mg/dl)

4.3. Variables terciarias

- **Estancia hospitalaria** (cuantitativa discreta; en días): calculada a partir de la fecha de ingreso y la fecha del alta hospitalaria.
- **Mortalidad intrahospitalaria** (categórica binaria; si o no): mortalidad durante el periodo de hospitalización.

5. ESTUDIO ESTADÍSTICO

El análisis de datos se llevó a cabo utilizando el programa SPSS 15.0 (SPSS Inc., Chicago, IL, 2006).

Las variables cualitativas se describieron mediante frecuencias absolutas y porcentajes. Para la descripción de las variables cuantitativas continuas se realizó previamente el test de Kolmogorov-Smirnov a fin de determinar la normalidad de las distribuciones. En los casos en los que la distribución fue normal, las variables se expresaron como media $\pm$ desviación estándar, y en los que la distribución fue no normal como mediana [rango intercuartílico P25-P75].

La comparación entre variables se realizó según la naturaleza de las mismas. En las variables cuantitativas también se realizó el test de Kolmogorov-Smirnov. Las diferencias entre variables cuantitativas de distribución normal se analizaron mediante tests paramétricos: prueba t de Student en caso de dos categorías independientes; prueba t de Student para muestras relacionadas en caso de dos categorías apareadas; ANOVA con prueba post-hoc de Bonferroni si más de dos categorías. En las variables cuantitativas de distribución no normal se utilizaron tests no paramétricos: U de Mann-Whitney en caso de dos categorías independientes; Wilcoxon en caso de dos categorías apareadas; Kruskal-Wallis si más de dos categorías. Por su parte, la comparación entre variables cualitativas se realizó mediante la prueba de Chi-cuadrado o test exacto de Fisher cuando fue necesario.

Para valorar el nivel de influencia de los factores que puedan influir en el probablemente implicados en desarrollo de hiponatremia durante la administración de la NP se realizó, para cada uno de ellos, un análisis de regresión logística univariante. Se excluyó del análisis los pacientes con *hiponatremia al inicio NP* y se consideró como variable dependiente la *hiponatremia durante NP*. Posteriormente se ajustó un modelo de regresión logística multivariante para la misma variable dependiente, incluyendo las variables con asociación estadísticamente significativa o en el límite de la asociación en el análisis univariante, variables clínicamente relevantes, la edad y el sexo.

En el estudio de las variables asociadas a riesgo de mortalidad intrahospitalaria o estancia hospitalaria por encima de la mediana (22 días), las asociaciones significativas en el análisis univariante fueron posteriormente analizadas en modelos de regresión logística multivariante, ajustando además por otras variables clínicamente relevantes como la edad, el sexo, las comorbilidades previas, la valoración global subjetiva, el IMC y las complicaciones metabólicas. La variable incluida en relación a la hiponatremia fue la *hiponatremia global*. Para valorar el papel de la persistencia de hiponatremia en la mortalidad intrahospitalaria y en la estancia hospitalaria, se utilizaron los mismos modelos de regresión logística multivariante previamente citados, pero con la variables: *Hiponatremia en NaIn del percentil 25*, *hiponatremia en NaIn del percentil 50* e *hiponatremia en NaIn del percentil 75*.

El nivel de significación para todas las pruebas del estudio fue del 5% ($\alpha=0,05$) y se utilizaron en todos los casos tests bilaterales.

IV. RESULTADOS

1. DESCRIPCIÓN DE LA POBLACIÓN A ESTUDIO

1.1. Características demográficas: sexo, edad, hospital de procedencia

Se incluyeron 543 pacientes, procedentes de 19 hospitales de ámbito nacional, aportando cada hospital una mediana de 19 [RIQ 10-45] pacientes. En el anexo 1 se detalla el número de sujetos de cada centro. De ellos, 327 (60,2%) eran hombres y 216 (39,8%) eran mujeres. La mediana de edad fue de 65 [RIQ 57 - 76] años.

1.2. Características clínicas previas al inicio de la nutrición parenteral

Un 58,4% de los pacientes recibieron tratamiento quirúrgico durante el ingreso.

1.2.1. Patologías asociadas al inicio de la nutrición parenteral

Las comorbilidades asociadas previas al inicio de la NP (nutrición parenteral) se describen en la Tabla nº 20, siendo la más frecuente la patología neoplásica (56,4%).

Tabla nº 20: Patologías asociadas al inicio de la nutrición parenteral

Variable	n=543 (%)
Comorbilidades previas (*)	
Enfermedad renal crónica	32 (5,9)
Insuficiencia renal aguda	19 (3,5)
Insuficiencia hepática crónica	11 (2)
Insuficiencia hepática aguda	11 (2)
Insuficiencia respiratoria crónica	21 (3,9)
Insuficiencia respiratoria crónica reagudizada	4 (0,7)
Insuficiencia cardíaca crónica	17 (3,1)
Insuficiencia cardíaca aguda	13 (2,4)
Diabetes Mellitus	88 (16,2)
Neoplasia	306 (56,4)

Los datos se expresan como n (%). () Las comorbilidades previas incluyen: enfermedad renal crónica, insuficiencia renal aguda, insuficiencia crónica o aguda, insuficiencia respiratoria crónica o crónica reagudizada, insuficiencia cardíaca crónica o aguda.*

1.2.2. Valoración del estado nutricional al inicio de la nutrición parenteral

Según el IMC (índice de masa corporal), considerando desnutrición si IMC < 20 en < 65 años, y si IMC < 22 en ≥ 65 años, aproximadamente un cuarto de los pacientes presentaba desnutrición. Sin embargo, según la VGS, realizada en el 97,8% de los sujetos, el porcentaje asciende al 69,5%. En la tabla nº 21 se detallan los resultados relacionados con la valoración nutricional.

Por su parte, la mediana del gasto energético basal calculado fue de 1296 [RIQ 1183 - 1452] kcal/día, y el gasto energético total de 1620 [RIQ 1472,0 - 1829,5] kcal/día.

Tabla nº 21: Características relacionadas con la valoración nutricional

Variable	n	
Datos antropométricos		
Peso (kg)		67,7 ± 10,6
Talla (cm)		165 [159-171]
IMC (Kg/m ²)	543	24,7 ± 5,0
Peso ajustado (kg) (*)		62,4 ± 10,6
Valoración del estado nutricional		
Desnutrición según IMC (**)		
No		418 (77)
Si	543	125 (23)
Desnutrición según VGS		
A (normonutrido)		162 (30,5)
B (desnutrición moderada)	531	177 (33,3)
C (desnutrición grave)		192 (36,2)
Parámetros analíticos		
Albúmina (g/dl)		2,7 ± 0,6
Albúmina (<3,5 g/dl)	497	429 (86,3)
Prealbúmina (mg/dl)		13,7 [9,6-19,1]
Prealbúmina (<20 mg/dl)	390	296 (75,9)
PCR (mg/dl)	441	6,7 [2,4-14,8]

Los datos se expresan como n (%), en mediana [RIQ] ó en media ± DE. IMC = Índice de masa corporal; VGS = Valoración global subjetiva; PCR = Proteína C reactiva.

* Peso incluyendo el peso real si IMC ≤ 27 kg/m² y el peso ajustado si IMC > 27 kg/m².

** Se considera desnutrición si IMC < 20 en < 65 años y si IMC < 22 kg/m² en ≥ 65 años.

1.3. Datos clínicos al inicio y/o durante la administración de la nutrición parenteral que puedan influir en la natremia

1.3.1. Fármacos administrados al inicio y/o durante la administración de la nutrición parenteral

En la tabla nº 22 se especifica el uso de los fármacos que con mayor frecuencia se han relacionado con el desarrollo de hiponatremia.

Tabla nº 22: Fármacos administrados al inicio y/o durante la administración de la NP

Fármacos	n = 543 (%)
Diuréticos	230 (42,4)
Tiazidas	7 (1,3)
Furosemida	226 (41,6)
Torasemida	2 (0,4)
Espironolactona	4 (0,7)
Opiáceos	169 (31,1)
Antidepresivos	31 (5,7)
Antiepilépticos (carbamazepina/oxcarbazepina)	2 (0,4)
Gabapentina/pregabalina	14 (2,6)
Antiinflamatorios no esteroideos	115 (21,2)
Inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina	68 (12,5)
Cotrimoxazol	4 (0,7)
Corticoides	92 (16,9)

Los datos están expresados como n (%).

1.3.2. Otros cuadros clínicos al inicio y durante la administración de la nutrición parenteral

En cuanto a los cuadros clínicos que pueden influir en el desarrollo de hiponatremia, un elevado porcentaje, hasta un 60,6% tenían dolor, y un 47,5% presentó náuseas o vómitos. En un 21 % se objetivaron signos de tercer espacio (ascitis o edemas) . Y por otro lado, un 54,7% presentaron pérdidas digestivas (16,8% diarrea, 7,9% fístulas intestinales, 20,8% obstrucción intestinal, 21,2% íleo paralítico).

1.4. Variables relacionadas con la nutrición parenteral y el aporte de sueroterapia

1.4.1. Indicación del inicio de la nutrición parenteral y motivo de retirada

La principal patología que motivó el inicio de la NP fue el postoperatorio de cirugía mayor del tracto gastrointestinal (40,7%), y en segundo lugar los tumores sólidos con radioterapia y/o quimioterapia y la leucemia/linfoma/mieloma y/o trasplante de médula ósea (figura nº 10).

Figura nº 10: Patología que indica el inicio de la nutrición parenteral

TGI = tracto gastrointestinal; RT = radioterapia; QT = quimioterapia; TMO = trasplante médula ósea.

Y por su parte, como se muestra en la figura nº 11, la causa última del inicio de la NP más frecuente fue la necesidad de reposo intestinal (36,5%), seguida por el íleo paralítico (21,2%).

Figura nº 11: Causa última que indica el inicio de la nutrición parenteral

El motivo de retirada de la NP más frecuente fue el paso a vía oral (75,5%), seguido del tránsito a nutrición enteral (8,3%), la pérdida de vía central (4,6%) y por último la defunción durante la administración de la NP (5,7%).

1.4.2. Duración de la nutrición parenteral

La mediana de duración de la NP fue de 8 [RIQ 6 – 12]. Como se muestra en la figura nº 12, la mayoría de pacientes recibieron NP de 2 a 7 días, en segundo lugar de 8 a 14 días, y menos de un 20% permanecieron con ella más de 15 días.

Figura nº 12: Duración de la nutrición parenteral según rangos

1.4.3. Composición de la nutrición parenteral

En la tabla nº 23 se describen las características de la composición de la NP, en cuanto a la media/mediana de aporte diario de energía, macronutrientes, iones, volumen, osmolaridad y osmoles.

Tabla nº 23: Características de la composición de la nutrición parenteral

Variable	n = 543
Aporte calórico	
Kcal/día	1592,2 [1429,4-1749,6]
Kcal/kg peso/día	25,9 [23,5-28,4]
% kcal/día respecto GET calculado	98,5 [91,4-105,1]
<80%	47 (9,6)
80-100%	259 (47,8)
>100%	231 (42,6)
Aminoácidos	
g/día	77,0 [67,9-91]
g/kg peso/día	1,3 ± 0,5
Hidratos de carbono	
g/día	187,0 [165,7-201,2]
g/kg peso/día	3,0 [2,7-3,3]
Lípidos	
g/día	51,3 [48-60]
g/kg peso/día	0,9 [0,7-1]
Sodio	
mEq/día	77,5 [70,5-95,1]
mEq/kg peso/día	1,3 [1,1-1,5]
Potasio	
mEq/día	60 [53,7-70]
mEq/kg peso/día	1,0 [0,8-1,2]
Volumen	
ml/día	1967,2 [1669-2167,7]
ml/kg peso/día	31,2 [26,4-35,6]
Osmoles	
mOsm/día	687,7 ± 115,4
Osmolaridad	
mOsm/L	1134,1 ± 236,3

Los datos se expresan como n (%), en mediana [RIQ] ó en media ± DE. En la variable peso se utiliza el peso real si IMC≤27 y peso ajustado si IMC>27. GET= gasto energético total.

El aporte calórico diario administrado por la NP se ajusta en un amplio porcentaje al GET calculado según las indicaciones del protocolo de estudio, y se encuentra dentro del rango de kcal recomendado para pacientes hospitalizados no críticos (20-30 kcal/kg peso/día). La media de gramos de proteínas aportados corresponden de manera adecuada a un grado de estrés moderado (1,3 g prot/kg peso/día) y la distribución del resto de macronutrientes también cumple las indicaciones previas facilitadas (entre 40-60% de las kcal no proteicas). Así mismo, los mEq de potasio se encuentran dentro de las recomendaciones del protocolo (1 mEq/kg peso/día). Los aportes de sodio y volumen se comentarán posteriormente, teniendo en cuenta los líquidos extras a la NP.

1.4.4. Aporte de líquidos extras a la nutrición parenteral

De los 533 pacientes a los que se documentó si recibieron aporte de líquidos extra a la NP (sueroterapia y diluciones de medicación intravenosa), a 479 (90,6%) sí se les administró. Estos sujetos recibieron una mediana de 800 [RIQ 500 - 1203] ml, sobre todo a expensas de suero salino fisiológico. En la figura nº 13 se especifica el tipo de sueroterapia administrada en base a la osmolaridad: isotónica (suero salino fisiológico), hipotónica (suero glucosalino, suero glucosado o suero hiposalino) o ambas.

Figura nº 13: Tipo de sueroterapia administrada

La cantidad de sodio aportada por la sueroterapia en los pacientes que la recibieron, únicamente a expensas de la solución salina isótónica, fue de 101,3 [RIQ 65,4 - 149,8] mEq/día.

1.4.5. Aporte total de volumen y sodio durante el periodo con nutrición parenteral

El volumen total de líquido administrado, considerándose la suma del volumen de la NP y de líquidos extra, fue de 2649,0 [RIQ 2239,5 - 3150,6] ml. Tras el ajuste por peso fue de 42,5 [RIQ 36,0 – 52,6] ml/kg peso/día, cifra discretamente superior a los 30-40 ml/kg peso/día recomendados en el protocolo de estudio.

Por otra parte, el aporte total de sodio, teniendo en cuenta el de la NP y el de la solución isotónica, fue de 172,4 [RIQ 117,4 - 229,3] mEq/día y de 2,8 [RIQ 1,9 - 3,7] mEq/kg peso/día. Ésta última cifra también sobrepasa levemente la cantidad recomendada en el protocolo.

1.4.6. Otras complicaciones asociadas a la nutrición parenteral.

El 78,1% de los sujetos (n 424) presentaron otras complicaciones relacionadas con la administración de la NP. La complicación más frecuente fue la hiperglucemia (43,8%), seguida de las alteraciones hepatobiliares (27,1%) y las complicaciones infecciosas. En la tabla nº 24 se especifica de forma detallada el porcentaje de cada una de las complicaciones evaluadas.

Tabla nº 24: Complicaciones asociadas a la nutrición parenteral

Variable	n = 543 (%)
Complicaciones infecciosas	129 (23,8)
Infección relacionada con catéter	50 (9,2)
Sepsis	43 (7,9)
Neumonía	15 (2,8)
Infección herida quirúrgica	20 (3,7)
Otras	1 (0,2)
Complicaciones mecánicas	4 (0,7)
Neumotórax	1 (0,2)
Trombosis	2 (0,4)
No especificado	1 (0,2)
Complicaciones metabólicas	
Alteraciones hepatobiliares (GOT, GPT o GGT > 90 U/L, FA > 400 mg/dl, BilT > 2,5 mg/dl)	147 (27,1)
Hipertrigliceridemia (Tg > 500 mg/dl)	11 (2,0)
Hiperglucemia (Glucosa capilar > 180 mg/dl ó > 140 mg/dl en 2 determinaciones)	238 (43,8)
Hiperpotasemia (K > 5,5 mmol/L)	9 (1,7)
Hipopotasemia (K < 3 mmol/L)	45 (8,3)
Hipocalcemia (Ca corregido < 8 mg/dl)	10 (1,8)
Hipomagnesemia (Mg < 1,2 mg/dl)	3 (0,6)
Hipofosforemia (P < 2 mg/dl)	98 (18)
Hipernatremia (NaS > 150 mmol/L)	12 (2,2)

Los datos están expresados como n (%). GOT = glutamato-oxalacetato transaminasa, GPT = glutamato-piruvato transaminasa, GGT = gamma glutamil transpeptidasa, FA = fosfatasa alcalina, BilT = bilirrubina total.

RESULTADOS DEL OBJETIVO PRINCIPAL

- Conocer el tipo y etiología de la hiponatremia en pacientes no críticos que reciben nutrición parenteral en las plantas de hospitalización de los hospitales españoles.

2. Descripción del tipo y etiología de la hiponatremia

2.1. Natremia e hiponatremia al inicio de la nutrición parenteral

La mediana de natremia al inicio de la NP fue de 138 [RIQ 136 - 141] mmol/L (figura nº 14).

Figura nº 14: Natremia al inicio de la nutrición parenteral

77 pacientes (14,2%) tenían hiponatremia ($\text{NaS} < 135$ mmol/L), siendo grave ($\text{NaS} < 125$ mmol/L) en 2 pacientes (2,6% de los sujetos con hiponatremia).

2.2. Natremia e frecuencia de hiponatremia durante la administración de la nutrición parenteral

La mediana de natremia de todos los pacientes durante la administración de la NP fue de 138,8 [RIQ 136,8 - 140,6] mEq/L. En la figura nº 15 se especifican el mínimo, el

máximo, la mediana y los percentiles 25 y 75 de todas las natremias determinadas de cada paciente.

Figura nº 15: Natremia mínima, máxima, mediana, percentiles 25 y 75 durante la administración de la nutrición parenteral.

Tras el inicio de la NP, 85 pacientes (18,2%) desarrollaron hiponatremia, alcanzando cifras de gravedad en 2 de ellos (2,4%). La mediana de tiempo transcurrido desde el inicio de la NP hasta la aparición de hiponatremia fue de 4 [RIQ 2 - 7] días.

En cuanto a la persistencia de hiponatremia, en la figura nº 16 se muestra su frecuencia en el percentil 25, 50 y 75 de todas las natremias de cada uno de los pacientes (Naln – natremias intraindividuales). También se han añadido la frecuencia de hiponatremia en el mínimo y máximo de las Naln. Como se puede observar, hasta un 16% de los pacientes presentaban al menos un 25% de sus natremias en rango de hiponatremia, descendiendo progresivamente el porcentaje hasta un 4,8% de sujetos

con hiponatremia mantenida (al menos 75% de las natremias < 135 mmol/L) y un 3,1% con hiponatremia en el 100% de las natremias.

Figura nº 16: Porcentaje de hiponatremia en la natremia mínima, percentiles y máxima de todas las determinaciones de natremia de cada uno de los pacientes.

Naln = natremia intraindividual

2.3. Hiponatremia global en la administración de la NP

Teniendo en cuenta las cifras de natremia del inicio y durante la administración de la NP, un total de 162 pacientes (29,8%) presentaron hiponatremia (figura nº 17).

Figura nº 17: Frecuencia de hiponatremia global durante la administración de la NP, subdividida en hiponatremia al inicio y desarrollada durante la NP.

2.4. Tipo de hiponatremia

2.4.1. Valoración de la volemia

De los 162 pacientes diagnosticados de hiponatremia, a 137 (84,6%) se les valoró la volemia clínica según la exploración física (hipovolemia, euvolemia, hipervolemia). En la figura nº 18 se describe la distribución de estos pacientes en base al tipo de volemia clínica, destacando el mayor porcentaje de hiponatremia euvolémica (67,9%).

Figura nº 18: Volemia clínica de los pacientes con hiponatremia

2.4.2. Estudio bioquímico de hiponatremia

Se solicitó estudio bioquímico completo de hiponatremia (función renal, iones y osmolalidad en sangre y orina, hormonas tiroideas y cortisol) en el 56,8% (n 92) de los pacientes.

En la tabla nº 25 se describen las principales determinaciones analíticas del estudio completo de hiponatremia, estratificado por tipo de volemia clínica. Se encontraron diferencias significativas en los resultados bioquímicos estratificados por volemia en el sodio urinario y en la urea. Estas diferencias se mantenían en el sodio urinario al comparar los pacientes hipovolémicos vs euvolémicos (21,0 [13,0-33,0] vs 78,0 [53,0-95,4] mmol/L; $p < 0,001$) y los pacientes hipovolémicos vs hipervolémicos (21,0 [13,0-33,0] vs 58,0 [18,4-82,0]; $p = 0,011$).

Tabla nº 25: Determinaciones bioquímicas del estudio de hiponatremia estratificado por tipo de volemia clínica

	<i>n</i>	Resultado	<i>p</i> valor
NaS (mmol/L)			
Total	119	133 [132-134]	0,643
Hipovolemia	17	134 [131,9-134]	
Euolemia	82	133 [131,7-134]	
Hipervolemia	19	133 [131-134]	
KS (mmol/L)			
Total	116	4,3 [3,9-4,6]	0,061
Hipovolemia	16	4,3 [3,9-4,6]	
Euolemia	81	4,4 [4,0-4,7]	
Hipervolemia	18	4,1 [3,5-4,6]	
OsmP (mOsm/kg)			
Total	115	279,0 [274,0-285,0]	0,743
Hipovolemia	17	278,0 [269,5-284,5]	
Euolemia	79	279,0 [274,0-285,0]	
Hipervolemia	19	279,0 [272,0-293,0]	
Creatinina (mg/dl)			
Total	116	0,61 [0,48-0,80]	0,153
Hipovolemia	17	0,75 [0,48-0,95]	
Euolemia	79	0,60 [0,47-0,73]	
Hipervolemia	19	0,65 [0,48-1,04]	
Urea (mg/dl)			
Total	116	40,0 [30,0-50,7]	0,005
Hipovolemia	17	50,0 [35,5-76,0]	
Euolemia	79	37,0 [30,0-47,0]	
Hipervolemia	19	50,0 [30,0-50,7]	
Ácido úrico (mg/dl)			
Total	88	2,5 [1,7-3,5]	0,362
Hipovolemia	13	3,2 [1,6-4,3]	
Euolemia	61	2,3 [1,6-3,3]	
Hipervolemia	13	2,2 [1,8-3,6]	
NaU (mmol/L)			
Total	103	66,0 [37,0-89,0]	<0,001
Hipovolemia	13	21,0 [13,0-33,0]	
Euolemia	71	78,0 [53,0-95,4]	
Hipervolemia	19	58,0 [18,4-82,0]	
KU (mmol/L)			
Total	99	29,6 [17,1-44,0]	0,897
Hipovolemia	12	26,5 [14,0-42,6]	
Euolemia	70	29,3 [16,5-44,1]	
Hipervolemia	17	31,0 [23,8-43,5]	
OsmU (mOsm/kg)			
Total	102	434,0 [322,0-544,5]	0,941
Hipovolemia	14	459,0 [309,2-567,5]	
Euolemia	71	429,0 [316,0-559,0]	
Hipervolemia	17	439,0 [321,0-507,0]	
Hipotiroidismo grave (TSH>50;%)	114	2 (1,8%)	
Insuficiencia suprarrenal (%)	107	0	

Los datos están expresados como mediana [RIQ] en referencia a *n* (número de pacientes a los que se realizó la determinación analítica). NaS = natremia sérica; KS = potasio sérico; OsmP = osmolalidad plasmática; NaU = sodio urinario; KU = potasio urinario; OsmU = osmolaridad urinaria; TSH = hormona estimulante del tiroides.

2.5. Etiología de la hiponatremia

En un total de 111 pacientes con hiponatremia se pudo valorar la etiología de la misma al disponer de todos los datos clínicos y analíticos necesarios. La etiología más frecuente fue el SIADH (42,3%), seguida de la elevación fisiológica de la AVP (25,2%) y de la insuficiencia cardiaca (17,1%). A continuación se describen las diferentes etiologías según el tipo de hiponatremia.

2.5.1. Etiología de la hiponatremia hipovolémica

En un total de 16 pacientes se valoró la etiología de la hiponatremia hipovolémica. Las pérdidas digestivas fueron la etiología más frecuente (figura nº 19).

Figura nº 19: Etiología de la hiponatremia hipovolémica

2.5.2. Etiología de la hiponatremia euvolémica

En el caso de la etiología de la hiponatremia euvolémica, se pudo evaluar en 75 pacientes, siendo la causa más frecuente el SIADH (figura nº 20).

Figura nº 20: Etiología de la hiponatremia euvolémica

2.5.3. Etiología de la hiponatremia hipervolémica

En la hiponatremia hipervolémica, la etiología se pudo valorar en 23 pacientes. La causa más importante fue la insuficiencia cardiaca (figura nº 21).

Figura nº 21: Etiología de la hiponatremia hipervolémica

RESULTADOS DEL PRIMER OBJETIVO SECUNDARIO

- Conocer los principales factores de riesgo asociados al desarrollo de hiponatremia en pacientes con nutrición parenteral.

3. Factores de riesgo de desarrollo de hiponatremia durante la administración de la nutrición parenteral

Como se ha detallado en el apartado previo 2.2, el 18,2% de los pacientes desarrollaron hiponatremia tras el inicio de la administración de la NP. A continuación se van a describir las diferentes variables para valorar su influencia en la incidencia de esta alteración hidroelectrolítica.

3.1. Influencia de variables demográficas, comorbilidades previas y de la valoración nutricional en el desarrollo de hiponatremia

En la tabla nº 26 se especifican las diferencias en el análisis univariante entre los pacientes con y sin desarrollo de hiponatremia respecto a variables demográficas, comorbilidades previas y valoración nutricional. En el análisis de regresión logística univariante se identificaron únicamente como factores de riesgo: el sexo femenino (OR 2,21 [IC 95%: 1,37-3,5]; $p=0,001$), la desnutrición grave por VGS (OR 2,59 [IC 95%: 1,39-4,82], $p=0,003$), y un menor IMC (OR 1,05 [IC 95%: 1,01-1,11], $p=0,033$). También se detectó la asociación del fallo hepático agudo, aunque los resultados no son valorables por la baja cantidad de pacientes.

Tabla nº 26: Variables demográficas, comorbilidades previas y valoración nutricional en pacientes con y sin desarrollo de hiponatremia durante la NP.

	Desarrollo de Hiponatremia durante NP		p valor
	SI N=85 (%)	NO N=381 (%)	
Sexo femenino	48 (56,5)	141 (37)	0,001
Edad (años)	69 [58,5-76,5]	66,5 [57-75]	0,182
Comorbilidades previas	20 (23,5)	67 (17,6)	0,203
Enfermedad renal crónica	4 (4,7)	27 (7,1)	0,426
Fracaso renal agudo	5 (5,9)	13 (3,4)	0,345
Insuficiencia hepática crónica	2 (2,4)	6 (1,6)	0,642
Insuficiencia hepática aguda	7 (8,2)	1 (0,3)	<0,001
Insuficiencia respiratoria crónica	2 (2,4)	12 (3,1)	1
Insuficiencia respiratoria aguda	0	3 (0,8)	1
Insuficiencia cardíaca crónica	2 (2,4)	12 (3,1)	1
Insuficiencia cardíaca aguda	2 (2,4)	7 (1,8)	0,671
Diabetes Mellitus	15 (17,6)	63 (16,5)	0,804
Neoplasia	52 (61,2)	204 (53,5)	0,201
Valoración Global Subjetiva			
A (normonutrido)	17 (20)	132 (35,6)	
B (desnutrición moderada)	29 (34,1)	122 (32,9)	0,009
C (desnutrición grave)	39 (45,9)	117 (31,5)	
IMC	24,0 ± 5,1	25,2 ± 4,9	0,033
PCR (mg/dl)	6,0 [2,7-12,2]	6,9 [2,7-15,8]	0,119

Los datos se expresan como n (%) ó en mediana [RIQ]. IMC = Índice de masa corporal; VGS = Valoración global subjetiva; PCR = Proteína C reactiva.

3.2. Influencia del tratamiento quirúrgico y otros cuadros clínicos durante el periodo de la nutrición parenteral en el desarrollo de hiponatremia

En la tabla 27 se detallan las diferencias en el análisis univariante entre los pacientes con y sin desarrollo de hiponatremia respecto al tratamiento quirúrgico durante el ingreso, y a la presencia de dolor, náuseas o vómitos, pérdidas digestivas (fístulas, obstrucción intestinal, íleo paralítico, diarrea) y signos de tercer espacio (ascitis o edemas). En este caso, la presencia de náuseas o vómitos (OR 2,18 [IC 95%: 1,34-3,55]; p=0,002), pérdidas digestivas (OR 1,99 [IC 95%: 1,16-3,12]; p=0,011) y ascitis o edemas

(OR 1,95 [IC 95%: 1,14-3,34]; $p=0,014$) se asociaron a mayor riesgo de desarrollo de hiponatremia durante la administración de NP en el análisis de regresión logística.

Tabla nº 27: Tratamiento quirúrgico y otros cuadros clínicos en pacientes con y sin desarrollo de hiponatremia durante la administración de NP.

	Desarrollo de Hiponatremia durante NP		<i>p</i> valor
	SI N=85 (%)	NO N=381 (%)	
Cirugía durante el ingreso	45 (52,9)	204 (53,5)	0,149
Dolor	56 (65,9)	230 (60,4)	0,345
Náuseas o vómitos	54 (63,5)	169 (44,4)	0,001
Pérdidas digestivas	57 (67,1)	197 (51,7)	0,010
Fístulas	9 (10,6)	33 (8,7)	0,575
Obstrucción intestinal	19 (22,4)	70 (18,4)	0,399
Íleo paralítico	21 (24,7)	79 (20,7)	0,399
Diarrea	21 (24,7)	59 (15,5)	0,042
Ascitis o edemas	25 (29,4)	67 (17,6)	0,013

Los datos se expresan como n (%).

3.3. Influencia del uso de fármacos en el desarrollo de hiponatremia

Los fármacos que se asociaron a mayor riesgo de desarrollo de hiponatremia en el análisis de regresión logística fueron los antidepresivos (OR 2,70 [IC 95%: 1,15-6,34]; $p=0,022$) y los opiáceos (OR 2,21 [IC 95%: 1,36-3,59]; $p=0,001$) (tabla nº 28).

Tabla nº 28: Uso de fármacos en los pacientes con y sin desarrollo de hiponatremia durante la administración de la NP.

	Desarrollo de Hiponatremia durante NP		p valor
	SI N=85 (%)	NO N=381 (%)	
Opiáceos	38 (44,7)	102 (26,8)	0,001
Antidepresivos	9 (10,6)	16 (4,2)	0,029
Gabapentina/pregabalina	2 (2,4)	12 (3,1)	1
AINes	15 (17,6)	87 (22,8)	0,296
IECAs	13 (15,3)	45 (11,8)	0,379
Diuréticos	43 (50,6)	149 (39,1)	0,053

Los datos se expresan como n (%). AINes = antiinflamatorios no esteroideos, IECAs = inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina.

3.4. Influencia de la osmolaridad de la fórmula de NP, y del aporte total de volumen, sodio y osmoles en el desarrollo de hiponatremia.

En la tabla nº 29 se describe el aporte total de volumen, de sodio y de osmoles (en los tres casos incluyendo la NP y los líquidos extras), así como la osmolaridad de la NP, en los pacientes con y sin desarrollo de hiponatremia durante la NP. En el análisis univariante no se obtuvieron asociaciones significativas en ninguna de estas variables.

Tabla nº 29: Aporte total de volumen, sodio y osmoles y osmolaridad de la fórmula de la NP en pacientes con y desarrollo de hiponatremia durante la administración de NP.

	Desarrollo de Hiponatremia durante NP		p valor
	SI	NO	
Aporte de volumen total (ml)	2632,4 [2246,7-3159,4]	2650,0 [2250,0-3158,4]	0,642
Aporte de sodio total (mEq)	174,3 [118,1-225,1]	161,7 [100,0-218,0]	0,275
Aporte de osmoles total (mOsmol)	848,9 [731,1-975,5]	860,5 [746,2-989,7]	0,507
Osmolaridad de la NP (mOsm/L)	1100,5 ± 255,5	1125,0 ± 221,5	0,398

Los datos se expresan como media ± DE ó en mediana [RIQ].

3.5. Factores de riesgo asociados al desarrollo de hiponatremia en pacientes con nutrición parenteral: análisis de regresión logística multivariante

Tras realizar el análisis de regresión logística ajustado, se mantuvieron como factores de riesgo de desarrollo de hiponatremia durante la infusión de la NP: el sexo femenino (OR 1,74 [IC 95%: 1,04-2,92]; $p=0,036$), la desnutrición grave por VGS (OR 2,15 [IC 95%: 1,06-4,35]; $p=0,033$), la presencia de náuseas o vómitos (OR 1,75 [IC 95%: 1,04-2,94]; $p=0,036$) y la toma de opiáceos (OR 2,20 [IC 95%: 1,30-3,73]; $p=0,003$) (tabla nº 30).

Tabla nº 30: Factores de riesgo asociados al desarrollo de hiponatremia durante la administración de la NP.

	B	Odds Ratio	IC 95%		p valor
			Inferior	Superior	
Edad	0,01	1,01	0,99	1,03	0,333
Sexo femenino	0,53	1,74	1,04	2,92	0,036
Desnutrición por VGS					
A (normonutrido)					0,103
B (desnutrición moderada)	0,51	1,66	0,83	3,32	0,153
C (desnutrición grave)	0,76	2,15	1,06	4,35	0,033
IMC*	0,45	1,56	0,85	2,88	0,153
Náuseas o vómitos	0,56	1,75	1,04	2,94	0,036
Pérdidas digestivas	0,44	1,55	0,90	2,63	0,108
Ascitis o edemas	0,32	1,38	0,73	2,59	0,315
Opiáceos	0,79	2,20	1,30	3,73	0,003
Antidepresivos	0,83	2,30	0,88	5,98	0,087
Diuréticos	0,38	1,46	0,84	2,57	0,183

Análisis de regresión logística multivariante. VGS = Valoración global subjetiva; IMC = Índice de masa corporal.

** IMC como variable categórica, en base a la definición de desnutrición: si $IMC < 20$ en < 65 años y si $IMC < 22 \text{ kg/m}^2$ en ≥ 65 años.*

RESULTADOS DEL SEGUNDO OBJETIVO SECUNDARIO

- Describir las pautas de tratamiento habituales de la hiponatremia y su eficacia en los pacientes que reciben NP en las plantas de hospitalización de los hospitales españoles.

4. Tratamiento pautado y eficacia en los pacientes con hiponatremia

De los 162 pacientes que presentaron hiponatremia (tanto al inicio como durante la infusión de la NP), a 111 (68,5%) se les pautó tratamiento según la práctica clínica habitual de las Unidades de Nutrición Clínica de cada hospital.

4.1. Tipo de tratamiento administrado a los pacientes con hiponatremia

El tratamiento más utilizado fue el incremento de sodio en la NP, pautado en 87 pacientes (78,4%). De ellos, a 59 (53,2%) se les administró sin modificación del volumen de la NP, a 27 (23,3%) se asoció una reducción de volumen de la NP, y a 1 se asoció un aumento de volumen de la NP. Por otra parte, en cuanto al volumen, a 46 pacientes (41,4%) se les redujo la cantidad de volumen total, y a 10 (9,0%) se les aumentó, incluyendo la NP y los líquidos extras. En la figura nº 22 se detallan los diferentes tipos de tratamiento, incluyendo la modificación de la composición de la NP y de los líquidos extras, así como la retirada de diurético, la furosemida, el tolvaptán y otros (a destacar 3 pacientes a los que se administró solución salina al 2%).

Figura nº 22: Tipos de tratamiento de la hiponatremia

4.1.1. Tratamientos en función del tipo de la hiponatremia

Respecto a los tratamientos recibidos en cada tipo de hiponatremia, en los pacientes hipovolémicos, el más frecuente fue el aumento de volumen (50,0%); en los euvolémicos, el incremento de sodio en la NP (49,3%); y en los hipervolémicos, la furosemida (61,1%). En la tabla nº 31, se reflejan las frecuencias de los distintos tratamientos según el tipo de hiponatremia.

Tabla nº 31: Tratamientos en función del tipo de hiponatremia.

	Hipovolemia N=16 (%)	Euvolemia N=75 (%)	Hipervolemia N=18 (%)
Incremento Na NP	4 (25)	37 (49,3)	3 (16,7)
Aumento volumen (NP o fluidos extra) +/- Na NP	8 (50)	2 (2,7)	
Con incremento Na NP	3 (18,8)	2 (2,7)	0
Sin incremento Na NP	5 (31,2)	0	
Reducción volumen (NP o fluidos extra) +/- Na NP		26 (34,7)	4 (22,2)
Con incremento Na NP	0	19 (25,3)	2 (11,1)
Sin incremento Na NP		7 (9,3)	1 (11,1)
Retirada de diurético +/- Na NP	4 (25)	1 (1,3)	
Con incremento Na NP	2 (12,5)	1 (1,3)	0
Sin incremento Na NP	2 (12,5)	0	
Furosemida +/- Na NP +/- reducción volumen		5 (6,6)	11 (61,1)
Con reducción volumen + incremento Na NP	0	4 (5,3)	3 (16,7)
Con reducción volumen		0	6 (33,3)
Con incremento Na		1 (1,3)	2 (11,1)
Tolvaptan	0	2 (2,7)	0
Otros (SS 2%)	0	3 (4,0)	0

* Los datos se expresan como n (%). Na = sodio; NP = nutrición parenteral; SS = solución salina

4.1.2. Tratamiento adecuado ajustado al tipo de hiponatremia

La corrección de la hiponatremia sólo se suele lograr con el tratamiento ajustado al tipo de hiponatremia, lo cual hemos denominado tratamiento adecuado (ver tabla nº 19). Según lo anterior, de los 109 pacientes con valoración de la volemia clínica que recibieron tratamiento, a 60 (55,0%) se les administró la terapia adecuada. Al estratificar por tipo de hiponatremia, la frecuencia de tratamiento adecuado fue

significativamente inferior en los pacientes con hiponatremia euvolémica (figura nº23). Dentro de este grupo, fue similar en los casos de SIADH vs elevación fisiológica de la ADH (47,6% vs 47,1%; $p=0,969$).

Figura nº 23: Distribución de pacientes con tratamiento adecuado según el tipo de hiponatremia.

4.1.3. Tipo de tratamiento administrado en los pacientes con SIADH

Los pacientes con SIADH se evalúan a continuación de manera más detallada por su mayor frecuencia y la complejidad de su tratamiento.

Un total de 42 pacientes con diagnóstico de SIADH (euvolémicos, con confirmación bioquímica y ausencia de estímulos fisiológicos de la AVP, déficit de ACTH e hipotiroidismo severo) recibieron tratamiento, considerándose adecuado en 20 de ellos (47,6%). Como se muestra en la figura nº 24 la amplia mayoría recibieron incremento de Na en la NP y reducción de volumen (NP o líquidos extras), mientras que la furosemida y el tolvaptán solo se usó en un mínimo porcentaje. El aporte de volumen recibido durante el tratamiento fue de 2361,6 [RIQ 1843,7-2886,5] ml/día (1468,0 [RIQ 1212,0-1740,1] ml/día de la NP y 885,8 [RIQ 506,0-1181,0] ml/día de líquidos extras) y el aporte de sodio de 247,8 [RIQ 183,9-299,8] mEq/día (138,8 [RIQ

126,5-166,7] mEq/día en la NP y 107,0 [RIQ 55,8-145,6] mEq/día en los líquidos extras). Respecto los 22 pacientes restantes con SIADH que no recibieron el tratamiento adecuado, al 90,9% se les incrementó el Na en la NP.

Figura nº 24: Tipo de tratamiento adecuado recibido en los pacientes con SIADH.

4.1.4. Factores predictores de respuesta al tratamiento adecuado en el SIADH

Se han descrito como factores predictores de respuesta: el uso de furosemida y la restricción de líquidos en el SIADH (*apartado 6.3.2.2 de Antecedentes y Estado Actual del Tema*).

La restricción de líquidos < 1 litro/día es uno de los tratamientos de elección en el SIADH, aunque prácticamente imposible de realizar en los pacientes con NP. De hecho, los sujetos con SIADH a los que se les redujo el aporte total de volumen, recibieron una mediana de 2361,5 [RIQ 1881,2-3013,0] ml/día, siendo el mínimo de 1457 ml/día. Y por otra parte, aunque se logre una reducción de líquidos < de 1 litro/día, no en todos los pacientes se obtiene un incremento significativo de la natremia; únicamente lo hacen aquellos que no reúnen los factores predictores de ausencia de respuesta: OsmU > 500 mOsm/kg, índice de Furst > 1, diuresis < 1500 ml/24h. A este respecto, hasta un 68,1% de los 47 pacientes de nuestra muestra con SIADH tenía al menos uno de estos factores previamente citados. En la tabla nº 32, se describe la frecuencia de cada uno de los factores predictores de ausencia de respuesta a la restricción de líquidos < 1 litro/día y el número de los mismos.

Tabla nº 32: Factores predictores de ausencia de respuesta a la restricción de líquidos menor de 1 litro/día.

	N	% de pacientes
OsmU > 500 mOsm/kg	47	55,3
Índice de Furst > 1	44	36,4
Diuresis < 1500 ml/día	36	22,2
Presencia de 1 factor	21/47	44,7
Presencia de 2 factores	9/47	19,1
Presencia de 3 factores	2/47	4,3

* OsmU = Osmolalidad urinaria; Índice de Furst = (sodio urinario+ potasio urinario)/natremia sérica

Respecto al tratamiento del SIADH con furosemida, únicamente es eficaz en aquellos con una osmolaridad urinaria > 350 mOsm/kg. En nuestra muestra de 47 pacientes con SIADH, hasta en el 69,6% de los pacientes la OsmU fue > 350 mOsm/kg.

4.2. Eficacia del tratamiento pautado a los pacientes con hiponatremia

4.2.1. Incremento de natremia y porcentaje de eunatremia a las 48-72 horas del inicio del tratamiento

En 94 pacientes de los 111 que recibieron tratamiento, se disponía de una determinación de natremia a las 48-72 horas del inicio de la terapia. El incremento de natremia fue significativo (figura nº25), con una mediana de 3,0 [RIQ 1,0-6,0] mmol/L.

Figura nº 25: Incremento de natremia a las 48-72h en los pacientes con hiponatremia que recibieron tratamiento

Al estratificar por tipo de hiponatremia, el incremento de natremia a las 48-72 hs respecto al inicial fue estadísticamente significativo tanto en los pacientes con hipovolemia (n= 14) , como en los euvolémicos (n= 62) e hipervolémicos (n=16) (figura nº26). Al comparar el incremento de natremia de cada uno de los grupos, no se obtuvo significación estadística (p=0,256).

Entre los pacientes con hiponatremia euvolémica, también se observó un incremento significativo de natremia a las 48-72 hs de tratamiento, tanto en los pacientes con SIADH (n=38) como en aquellos con elevación fisiológica de la AVP (n= 16) (figura nº27). Al comparar el incremento de natremia entre ambos, los pacientes con elevación fisiológica de la AVP presentaron un incremento significativamente superior respecto a los pacientes con SIADH, 6,0 [RIQ 3,0-7,0] mmol/L vs 1,5 [RIQ 1,0-3,2] mmol/L, respectivamente (p<0,001).

Figura nº 26: Incrementos de natremia a las 48-72h en los pacientes con hiponatremia que recibieron tratamiento, según tipo de hiponatremia

Figura nº 27: Incrementos de natremia a las 48-72h en los pacientes con hiponatremia euvolémica que recibieron tratamiento, según su etiología

Respecto a la eficacia del tratamiento ($\text{Na} \geq 135 \text{ mmol/L}$ a las 48-72 horas del inicio del tratamiento), hasta un 61,7% de los pacientes alcanzaron la eunatremia. Al estratificar por tipo de hiponatremia, los porcentajes de eunatremia variaban entre la hipovolémica (78,6%), la hipervolémica (68,8%) y la eurolémica (55,6%), sin alcanzar la significación estadística ($p=0,222$). Sin embargo, sí encontramos diferencias significativas entre los pacientes con hiponatremia eurolémica, en los que se alcanzó la eunatremia en el 42,1% del grupo con SIADH, frente a un 87,5% en el de elevación fisiológica de la AVP ($p=0,002$).

4.2.2. Eficacia del tratamiento adecuado

En los pacientes que recibieron tratamiento adecuado (tratamiento ajustado al tipo de hiponatremia) el incremento de natremia a las 48-72 hs fue estadísticamente significativo (figura nº 28). Este incremento ($4,0 \pm 3,6 \text{ mmol/L}$) fue mayor que en los pacientes sin tratamiento adecuado ($2,8 \pm 3,1 \text{ mmol/L}$), aunque no se logró alcanzar la significación estadística ($p=0,097$).

Figura nº 28: Incremento de natremia a las 48-72h en los pacientes que recibieron tratamiento adecuado ajustado al tipo de hiponatremia.

En las figuras nº 29 y 30 se representan los incrementos de natremia a las 48-72 horas tras aplicar un tratamiento adecuado según el tipo de hiponatremia, y según la etiología de la hiponatremia eurolémica, respectivamente

Figura nº 29: Incrementos de natremia a las 48-72h en los pacientes con hiponatremia que recibieron tratamiento adecuado, según tipo de hiponatremia

Figura nº 30: Incrementos de natremia a las 48-72h en los pacientes con hiponatremia euvolémica que recibieron tratamiento adecuado, según su etiología

Respecto a la eficacia del tratamiento adecuado, el porcentaje de eunatremia a las 48-72 horas fue significativamente superior en los pacientes con tratamiento adecuado frente a los pacientes sin tratamiento adecuado de la hiponatremia (figura nº 31).

Figura nº 31: Porcentaje de pacientes que alcanzaron la eunatremia a las 48-72 horas con o sin el tratamiento adecuado

Al estratificar por tipo de hiponatremia (figura nº 32), en la hiponatremia eurolémica el porcentaje de eunatremia fue similar entre los pacientes con y sin tratamiento adecuado. Sin embargo, en los sujetos con hiponatremia hiper- e hipo-volémica el porcentaje de eunatremia fue mayor en los pacientes con tratamiento adecuado frente a los pacientes sin el mismo. A pesar del bajo número de sujetos en los 2 últimos tipos de hiponatremia, en los pacientes con hiponatremia hipovolémica la diferencia fue tan amplia que se alcanzó la significación estadística.

Figura nº 32: Porcentaje de tratamiento eficaz en función de la aplicación o no de un tratamiento adecuado según tipo de hiponatremia.

Entre el grupo de pacientes con hiponatremia euvolémica, tanto en los de SIADH como en los de elevación fisiológica de la AVP, no se encontró un mayor porcentaje de eunatremia en los pacientes con tratamiento adecuado frente a los pacientes sin el mismo (figura nº 32). El subgrupo con SIADH agrupa a los pacientes que presentan una menor respuesta a las 48-72 horas tras aplicar un tratamiento adecuado (45,0%), mientras que el subgrupo con elevación fisiológica de la AVP tienen una respuesta casi del 90% tanto si son tratados de forma ajustada a su volemia como si no (figura nº 33).

Figura nº 33: Frecuencia de eunatremia en pacientes con y sin tratamiento adecuado de la hiponatremia, tanto en SIADH como en elevación fisiológica de la ADH.

Tras excluir al grupo de hiponatremia por elevación fisiológica de la AVP, en los pacientes con tratamiento adecuado se encontró un incremento significativo del porcentaje de eunatremia en aquellos con descenso del volumen circulante efectivo VCE (hipervolemia o hipovolemia) respecto a los pacientes con SIADH, 83,3% vs 45,0% ($p=0,008$).

RESULTADOS DEL TERCER OBJETIVO SECUNDARIO

- Describir el papel de la hiponatremia en la mortalidad intrahospitalaria y la estancia hospitalaria en pacientes con nutrición parenteral

5. Morbimortalidad asociada a la hiponatremia en pacientes con nutrición parenteral

5.1. Relación de la natremia y la hiponatremia en la mortalidad intrahospitalaria

Durante la estancia hospitalaria de nuestra muestra de pacientes con NP, fallecieron un total de 73 sujetos (13,6%).

5.1.1. Influencia de variables demográficas, clínicas y relacionadas con la NP en la mortalidad intrahospitalaria

En la tabla nº 33 se describen las diferencias entre los pacientes que fallecieron y los que no fallecieron durante la estancia hospitalaria en cuanto a las variables demográficas, clínicas y relacionadas con la NP. En el análisis de regresión logística no ajustado, únicamente se asociaron a mayor riesgo de mortalidad : la edad (OR 1,05 [IC 95%: 1,02-1,07]; $p<0,001$), la presencia de comorbilidades previas (insuficiencia renal, hepática, respiratoria o cardíaca) (OR 2,31 [IC 95%: 1,34-3,99]; $p=0,002$), el diagnóstico de desnutrición grave por VGS (OR 3,91 [IC 95%: 1,99-7,69]; $p<0,001$), el IMC (OR 2,78 [IC 95%: 1,66-4,67]; $p<0,001$), la duración de la NP (OR 1,04 [IC 95%: 1,01-1,07]; $p=0,010$) y el desarrollo de complicaciones metabólicas (alteraciones hepatobiliares, hipertrigliceridemia, hiperglucemia, hipopotasemia, hipofosforemia...), tras el inicio de la NP (OR 2,30 [IC 95%: 1,38-3,85]; $p=0,001$).

Tabla nº 33: Características demográficas, clínicas y relacionadas con la nutrición parenteral según la presencia de mortalidad intrahospitalaria

	Defunción durante la estancia hospitalaria		
	SI N=73	NO N=464	p valor
Sexo femenino	31 (42,5)	183 (39,4)	0,624
Edad (años)	74 [63,5-81]	66 [56-75]	<0,001
Comorbilidades previas	24 (32,9)	81 (17,5)	0,002
Enfermedad renal crónica	6 (8,2)	26 (5,6)	0,421
Fracaso renal agudo	5 (6,8)	14 (3,0)	0,160
Insuficiencia hepática crónica	5 (6,8)	6 (1,3)	0,010
Insuficiencia hepática aguda	3 (4,1)	8 (1,7)	0,178
Insuficiencia respiratoria crónica	4 (5,5)	17 (3,7)	0,510
Insuficiencia respiratoria aguda	2 (2,7)	2 (0,4)	0,091
Insuficiencia cardíaca crónica	3 (4,1)	14 (3,0)	0,178
Insuficiencia cardíaca aguda	5 (6,8)	8 (1,7)	0,022
Diabetes Mellitus	12 (16,4)	76 (16,4)	1
Neoplasia	45 (61,6)	257 (55,4)	0,317
Valoración Global Subjetiva			
A (normonutrido)	12 (16,7)	148 (32,7)	<0,001
B (desnutrición moderada)	14 (19,4)	160 (35,3)	
C (desnutrición grave)	46 (63,9)	145 (32,0)	
IMC*	30 (41,1)	93 (20,0)	<0,001
PCR (mg/dl)	8,2 [2,7-14,8]	6,5 [2,3-14,7]	0,393
Cirugía durante el ingreso	30 (41,1)	383 (61)	0,001
Duración de la NP	10 [7-15,5]	8 [6-12]	0,003
Nutrición permisiva (<80% GET)	7 (9,6)	44 (9,5)	0,981
Complicaciones infecciosas	24 (32,9)	104 (22,4)	0,051
Complicaciones metabólicas	58 (79,5)	285 (61,4)	0,003
Alteraciones hepatobiliares	21 (28,8)	126 (27,2)	0,774
Hipertrigliceridemia	1 (1,4)	10 (2,2)	1
Hiperglucemia	40 (54,8)	196 (42,2)	0,045
Uremia	21 (28,8)	23 (5)	<0,001
Hipopotasemia	14 (19,2)	61 (6,7)	<0,001
Hiperpotasemia	3 (4,1)	6 (1,3)	0,111
Hipofosforemia	20 (27,4)	78 (16,8)	0,029
Hipernatremia	7 (9,6)	5 (1,1)	<0,001

* IMC como variable categórica, en base a la definición de desnutrición: si IMC<20 en < 65 años y si IMC < 22 kg/m² en ≥ 65 años.

Los datos se expresan como n (%), en media (DE) O en mediana [RIQ]. IMC = Índice de masa corporal; PCR = Proteína C reactiva; NP = Nutrición parenteral; GET = Gasto energético total.

5.1.2. Mortalidad intrahospitalaria en función de la natremia

Para valorar el papel de la natremia en la mortalidad intrahospitalaria se obtuvieron los valores de natremia mínimos, del P25, del P50, del P75 y máximos de todas las natremias de cada uno de los pacientes (natremia intraindividual) en función de si habían fallecido o no. Los valores fueron significativamente inferiores en los pacientes fallecidos vs no fallecidos tanto en la natremia mínima (135 [133-138] vs 137 [135-139] mmol/L; $p=0,001$) como en la del P25 (137 [134-139] vs 138 [136-140] mmol/L; $p=0,018$), manteniéndose sin alcanzar la significación en la del P50 (138 [135-140] vs 139 [137-140] mmol/L; $p=0,090$) y en la del P75. En la figura nº 34 se puede observar esta tendencia de los pacientes fallecidos a presentar una natremia inferior a los no fallecidos, excepto en la natremia máxima.

Figura nº 34: Natremia intraindividual mínima, máxima y en percentiles 25,50 y 75 según la presencia de mortalidad intrahospitalaria

5.1.3. Mortalidad intrahospitalaria en función de la presencia de hiponatremia

Los pacientes que presentaron hiponatremia en algún momento de la administración de la NP tuvieron una significativa mayor tasa de mortalidad (22,5%) frente a los que no la presentaron (9,8%) ($p < 0,001$), con una OR de 2,67 [IC 95%: 1,61-4,41]

Al subdividir por tipo de hiponatremia, la mayor mortalidad se observó en los pacientes con hiponatremia hipervolémica (41,7%), tal y como se representa en la figura nº 35.

Figura nº 35: Mortalidad intrahospitalaria en función del tipo de hiponatremia

En los pacientes con hiponatremia mantenida ($Na_{in} < 135$ mmol/L en al menos el 75% de las natremias), se observó un incremento de la frecuencia de mortalidad respecto a pacientes con menor persistencia de hiponatremia (tabla nº 34). Este mayor incremento de mortalidad se constató en el análisis de regresión logística no ajustado, de tal modo que los sujetos con al menos un 25% de sus determinaciones con hiponatremia (Na_{in} percentil 25 < 135 mmol/L) tenían un riesgo de 2,27 [IC 95%: 1,27-4,04] ($p = 0,005$), mientras que los sujetos con hiponatremia mantenida tenían un riesgo de 4,43 [IC 95%: 1,93-10,20] ($p < 0,001$).

Tabla nº 34: Mortalidad intrahospitalaria en función de la presencia de hiponatremia en la natremia intraindividual mínima, en los percentiles 25, 50 y 75, y en la máxima

	N	Mortalidad	p valor
Na_{in} Mínima			
< 135 mmol/L	140	34 (24,1)	<0,001
≥ 135 mmol/L	396	39 (9,8)	
Na_{in} Percentil 25			
< 135 mmol/L	86	20 (23,3)	0,004
≥ 135 mmol/L	450	53 (11,8)	
Na_{in} Percentil 50			
< 135 mmol/L	55	15 (27,3)	0,002
≥ 135 mmol/L	481	58 (12,1)	
Na_{in} Percentil 75			
< 135 mmol/L	26	10 (38,5)	0,001
≥ 135 mmol/L	510	63 (12,4)	
Na_{in} Máxima			
< 135 mmol/L	17	7 (41,2)	0,004
≥ 135 mmol/L	519	66 (12,7)	

* Na_{in} = natremia intraindividual . Los datos se expresan como n (%).

5.1.4. Mortalidad intrahospitalaria en función de la presencia de hiponatremia: análisis de regresión logística multivariante

Tras ajustar por edad, sexo, comorbilidades previas, desnutrición por VGS, desnutrición por IMC, duración de la NP, complicaciones infecciosas y complicaciones metabólicas, la presencia de hiponatremia en cualquier momento de la administración de la NP se mantuvo como factor de riesgo independiente de mortalidad con una OR de 1,83 [IC 95%: 1,03-3,24] (p=0,039) (tabla 35). A su vez, se mantuvieron de manera estadísticamente significativa la edad, la desnutrición grave por VGS, la desnutrición por IMC y el desarrollo de complicaciones metabólicas.

Tabla nº 35: Análisis de regresión logística multivariante: riesgo ajustado de mortalidad intrahospitalaria

	B	Odds Ratio	IC 95%		p valor
			Inferior	Superior	
Hiponatremia	0,60	1,83	1,03	3,24	0,039
Edad	0,04	1,04	1,02	1,07	<0,001
Sexo femenino	-0,17	0,85	0,48	1,50	0,566
Comorbilidades previas	0,56	1,75	0,94	3,23	0,075
Valoración global subjetiva					
A (normonutrido)					0,003
B (desnutrición moderada)	-0,28	0,75	0,32	1,75	0,509
C (desnutrición grave)	0,84	2,32	1,08	4,98	0,031
IMC*	0,86	2,37	1,25	4,52	0,008
Duración de la NP	0,021	1,02	0,98	1,06	0,248
Complicaciones metabólicas	0,81	2,24	1,25	4,01	0,006
Complicaciones infecciosas	0,22	1,23	0,68	2,28	0,485

* IMC como variable categórica, en base a la definición de desnutrición: si $IMC < 20$ en < 65 años y si $IMC < 22 \text{ kg/m}^2$ en ≥ 65 años.

IMC = índice de masa corporal; NP = nutrición parenteral

Aplicando el mismo modelo de regresión logística para obtener la influencia de la hiponatremia mantenida ajustada, se observó que los pacientes con mayor grado de hiponatremia mantenida presentaban mayor riesgo de mortalidad (tabla nº 36). Los sujetos con al menos el 75% de sus determinaciones con hiponatremia (Na_{In} percentil $75 < 135 \text{ mmol/L}$) presentaban un riesgo mayor de mortalidad significativo de 3,99 [IC 95%: 1,52-10,4] ($p=0,005$).

Tabla nº 36: Análisis de regresión logística multivariante: riesgo ajustado de mortalidad intrahospitalaria según la presencia de hiponatremia en los percentiles 25,50 y 75 de la natremia intraindividual

	B	Odds Ratio	IC 95%		p valor
			Inferior	Superior	
Hiponatremia	0,60	1,83	1,03	3,24	0,039
Na _{in} Percentil 25	0,44	1,55	0,82	2,95	0,177
Na _{in} Percentil 50	0,71	2,04	0,99	4,32	0,058
Na _{in} Percentil 75	1,38	3,99	1,52	10,4	0,005

Análisis de regresión logística ajustado por edad, sexo, comorbilidades previas, desnutrición por VGS, desnutrición por IMC, duración de la NP, complicaciones metabólicas y complicaciones infecciosas
Na_{in} = natremia intraindividual

5.2. Relación de la natremia y la hiponatremia en la estancia hospitalaria

La mediana de estancia hospitalaria de nuestros pacientes fue de 22 [15-36] días. Para el análisis de la relación de la natremia y la hiponatremia con la estancia se marcó como punto de corte esta mediana (22 días).

5.2.1. Influencia de variables demográficas, clínicas y relacionadas con la NP en la estancia hospitalaria

En la tabla nº 37 se describen las diferencias entre los pacientes con estancia hospitalaria vs > 22 días en cuanto a variables demográficas, clínicas y relacionadas con la NP.

En el análisis de regresión logística, se asociaron a mayor riesgo de estancia hospitalaria únicamente: la duración de la NP (OR 1,28 [IC 95%: 1,21-1,35]; p<0,001), el desarrollo de complicaciones infecciosas (OR 3,00 [IC 95%: 1,97-4,56]; p<0,001) y de complicaciones metabólicas (alteraciones hepatobiliares, hipertrigliceridemia, hiperglucemia, hipopotasemia, hipofosforemia...) tras el inicio de la NP (OR 1,74 [IC 95%: 1,23-2,45]; p=0,002).

Tabla nº 37: Características demográficas, clínicas y relacionadas con la nutrición parenteral según la estancia hospitalaria

	Estancia media hospitalaria		p valor
	≤ 22 días N=281	> 22 días N=254	
Sexo (mujer)	110 (39,1)	103 (49,6)	0,740
Edad (años)	67 [57-76]	68 [56-76]	0,974
Comorbilidades previas	48 (17,1)	56 (22,0)	0,147
Enfermedad renal crónica	17 (6,0)	14 (5,5)	0,790
Fracaso renal agudo	7 (2,5)	12 (4,7)	0,163
Insuficiencia hepática crónica	4 (1,4)	7 (2,8)	0,278
Insuficiencia hepática aguda	4 (1,4)	7 (2,8)	0,278
Insuficiencia respiratoria crónica	9 (3,2)	12 (4,7)	0,365
Insuficiencia respiratoria aguda	3 (1,1)	1 (0,4)	0,626
Insuficiencia cardíaca crónica	7 (2,5)	10 (3,9)	0,341
Insuficiencia cardíaca aguda	5 (1,8)	8 (3,1)	0,304
Diabetes Mellitus	45 (16,0)	43 (16,9)	0,776
Neoplasia	160 (56,9)	142 (55,9)	0,810
Valoración Global Subjetiva			
A (normonutrido)	88 (32,6)	70 (27,7)	0,317
B (desnutrición moderada)	83 (30,7)	92 (36,4)	
C (desnutrición grave)	99 (36,7)	91 (36,0)	
IMC*	63 (22,4)	60 (23,6)	0,741
PCR (mg/dl)	6,5 [2,4-13,3]	7,2 [2,3-16,0]	0,440
Cirugía durante el ingreso	162 (57,7)	152 (59,8)	0,607
Duración de la NP	7 [5-9]	11 [7-18]	0,003
Nutrición permisiva (<80% GET)	28 (10,0)	24 (9,4)	0,830
Complicaciones infecciosas	41 (14,6)	86 (33,9)	<0,001
Complicaciones metabólicas	177 (69,7)	165 (58,7)	0,001
Alteraciones hepatobiliares	59 (21,0)	87 (34,3)	0,001
Hipertrigliceridemia	5 (1,8)	6 (2,4)	0,625
Hiperglucemia	114 (40,6)	122 (48,0)	0,083
Uremia	18 (6,4)	26 (10,2)	0,107
Hipopotasemia	16 (5,7)	29 (11,4)	0,017
Hiperpotasemia	2 (0,7)	7 (2,8)	0,093
Hipofosforemia	61 (21,7)	36 (14,2)	0,024
Hipernatremia	5 (1,8)	7 (2,8)	0,446

* IMC como variable categórica, en base a la definición de desnutrición: si IMC<20 en < 65 años y si IMC < 22 kg/m² en ≥ 65 años.

Los datos se expresan como n (%), en media (DE) O en mediana [RIQ]. IMC = Índice de masa corporal; PCR = Proteína C reactiva; NP = Nutrición parenteral; GET = Gasto energético total.

5.2.2. Estancia hospitalaria en función de la natremia

Como en el caso de la mortalidad, para valorar la influencia de la natremia en la estancia hospitalaria se obtuvieron los valores de natremia mínimos, del P25, del P50, del P75 y máximos de todas las natremias de cada uno de los pacientes en función de si tenían una estancia media $>$ o $\leq$ de 22 días. Los valores fueron significativamente inferiores en los pacientes con una estancia media mayor tanto en la natremia mínima (136 [133-138] vs 138 [135-139] mmol/L; $p=0,001$) como en la del P25 (137 [135-139] vs 138 [136-140] mmol/L; $p=0,018$), manteniéndose sin alcanzar la significación en la del P50 (138,5 [136-140] vs 139 [137-141] mmol/L; $p=0,090$) y en la del P75. En la figura nº 36 se puede observar esta tendencia de los pacientes con mayor estancia media a presentar una natremia inferior, salvo en la natremia máxima.

Figura nº 36: Natremia intraindividual mínima, máxima y en percentiles 25,50 y 75 según la estancia hospitalaria.

5.2.3. Estancia hospitalaria en función de la presencia de hiponatremia

Los pacientes que presentaron hiponatremia en algún momento de la administración de la NP tuvieron un mayor porcentaje de estancia media > 22 vs $\leq$ de 22 días, siendo de 61,5% vs 41,4% respectivamente ($p < 0,001$).

Como se muestra en la figura nº 37, al estratificar por tipo de hiponatremia, la mayor estancia media se observó en los pacientes con hiponatremia hipervolémica (87,5% con estancia media > 22 días) vs los pacientes con hiponatremia euvolémica (55% con estancia media > 22 días) o hipovolémica (58,7% con estancia media > 22 días), siendo esta diferencia estadísticamente significativa ($p = 0,024$). Por su parte, no hubo diferencias entre la estancia media de los pacientes con SIADH (55,3% con estancia media > 22 días) y con elevación fisiológica de la ADH (60,7% con estancia media > 22 días) ($p = 0,648$).

Figura nº 37: Estancia hospitalaria en función del tipo de hiponatremia

Respecto a la persistencia de la hiponatremia, únicamente se objetivó una mayor frecuencia de estancia hospitalaria en los pacientes con el 25% de sus natremias en rango de hiponatremia (Tabla nº 38). En el análisis de regresión logística univariante no

se observó una mayor asociación entre la persistencia de la hiponatremia y la estancia hospitalaria. De hecho, se encontró un incremento significativo de mayor estancia en los pacientes con hiponatremia en al menos el 25% de sus determinaciones con una OR de 2,11 [IC 95%: 1,41-3,40] ($p=0,002$) y en los pacientes con al menos una determinación de hiponatremia con una OR de 2,66 [IC 95% 1,78-3,97] ($p<0,001$).

Tabla nº 38: Estancia hospitalaria mayor de 22 días en función de la presencia de hiponatremia en la natremia intraindividual mínima, en los percentiles 25, 50 y 75, y en la máxima

	N	Estancia media > 22 días	p valor
Na_{in} Mínima			
< 135 mmol/L	140	91 (65,0)	<0,001
≥ 135 mmol/L	394	162 (41,1)	
Na_{in} Percentil 25			
< 135 mmol/L	86	54 (62,1)	0,002
≥ 135 mmol/L	448	199 (44,4)	
Na_{in} Percentil 50			
< 135 mmol/L	55	27 (49,1)	0,788
≥ 135 mmol/L	479	226 (47,2)	
Na_{in} Percentil 75			
< 135 mmol/L	26	11 (42,3)	0,595
≥ 135 mmol/L	508	242 (47,6)	
Na_{in} Máxima			
< 135 mmol/L	17	6 (35,3)	0,311
≥ 135 mmol/L	517	247 (47,8)	

* Na_{in} = natremia intraindividual . Los datos se expresan como n (%).

5.2.4. Estancia hospitalaria en función de la presencia de hiponatremia: análisis de regresión logística multivariante

En el análisis de regresión logística, tras ajustar por edad, sexo, comorbilidades previas, desnutrición por VGS, desnutrición por IMC, duración de la NP, complicaciones infecciosas y complicaciones metabólicas, la presencia de hiponatremia en cualquier momento de la administración de la NP se mantuvo como factor de riesgo

independiente de estancia hospitalaria > de 22 días con una OR de 1,83 [IC 95%: 1,15-2,91] ($p=0,010$) (tabla nº 39). De igual modo, se mantuvieron como factores de riesgo independientes la duración de la NP y el desarrollo de complicaciones infecciosas.

Tabla nº 39: Análisis de regresión logística multivariante: riesgo ajustado de estancia hospitalaria mayor de 22 días

	B	Odds Ratio	IC 95%		p valor
			Inferior	Superior	
Hiponatremia	0,60	1,83	1,15	2,91	0,010
Edad	-0,01	0,99	0,98	1,01	0,477
Sexo (mujer)	-0,04	0,96	0,63	1,46	0,842
Comorbilidades previas	0,43	1,54	0,91	2,61	0,107
Valoración global subjetiva					
A (normonutrido)					0,078
B (desnutrición moderada)	0,24	1,27	0,76	2,13	0,360
C (desnutrición grave)	-0,35	0,70	0,40	1,23	0,217
IMC*	-0,27	0,76	0,44	1,31	0,326
Duración de la NP	0,25	1,28	1,21	1,36	<0,001
Complicaciones metabólicas	-0,10	0,91	0,59	1,39	0,654
Complicaciones infecciosas	0,91	2,49	1,51	4,11	<0,001

* IMC como variable categórica, en base a la definición de desnutrición: si $IMC < 20$ en < 65 años y si $IMC < 22 \text{ kg/m}^2$ en ≥ 65 años.

IMC = índice de masa corporal; NP = nutrición parenteral

Aplicando el mismo modelo de regresión logística ajustado, se mantuvo como factor de riesgo independiente de mayor estancia hospitalaria únicamente la hiponatremia en al menos el 25% de todas sus determinaciones (Na_{In} percentil 25 < 135 mmol/L) con una OR de 1,80 [IC 95%: 1,02-3,19] ($p=0,042$) (tabla nº 40).

Tabla nº 40: Análisis de regresión logística multivariante: riesgo ajustado de estancia hospitalaria mayor de 22 días según la presencia de hiponatremia en los percentiles 25,50 y 75 de la natremia intraindividual

	B	Odds Ratio	IC 95%		p valor
			Inferior	Superior	
Hiponatremia	0,60	1,83	1,15	2,91	0,010
Na _{in} Percentil 25	0,59	1,80	1,02	3,19	0,042
Na _{in} Percentil 50	-0,07	0,93	0,48	1,81	0,838
Na _{in} Percentil 75	-0,07	0,93	0,37	2,36	0,879

Análisis de regresión logística ajustado por edad, sexo, comorbilidades previas, desnutrición por VGS, desnutrición por IMC, duración de la NP, complicaciones metabólicas y complicaciones infecciosas.

Na_{in} = Natremia intraindividual

V. DISCUSIÓN

1. Discusión general

La hiponatremia, definida como la concentración de sodio sérico menor de 135 mmol/L, es el trastorno hidroelectrolítico más frecuente en la práctica clínica, con una prevalencia estimada del 15-30% en los pacientes hospitalizados (31,33). Aunque en la gran mayoría de los casos la hiponatremia no es grave (natremia > 125 mmol/L), su presencia reviste de gran importancia, al implicar una mayor morbimortalidad (31,32,34).

La hiponatremia se produce por una alteración de los mecanismos que regulan el balance hídrico, sin que sea necesario un descenso de la cantidad de sodio corporal. En general, se debe a una disminución de la capacidad renal de eliminar agua libre (antidiuresis; aumento de agua corporal total), secundaria a un incremento de la secreción de la arginina-vasopresina (AVP) u hormona antidiurética (ADH), que es la hormona que regula el metabolismo hídrico (2). Este incremento de la AVP normalmente se debe a la aparición de estímulos no osmóticos fisiológicos (náuseas, dolor, estrés, descenso del volumen circulante efectivo (VCE)...) o a su secreción inapropiada (síndrome de secreción inadecuada de ADH – SIADH). Estas situaciones son especialmente frecuentes en pacientes hospitalizados (15), lo que explica el incremento de incidencia de hiponatremia a este nivel. Además, a estas circunstancias se puede añadir la posibilidad de pérdidas renales (diuréticos, hipoaldosteronismo) o extrarrenales de sodio (diarrea, vómitos, fístulas intestinales, obstrucción intestinal...), así como de un aporte de líquidos que supere la capacidad de eliminación renal.

Por la elevada frecuencia de todos estos factores de riesgo, uno de los grupos de pacientes hospitalizados con especial incidencia de hiponatremia son los sujetos con nutrición parenteral (NP). En un estudio retrospectivo que incluyó 222 pacientes con NP, se observó una prevalencia de hiponatremia al inicio de la NP del 19,8%, con un desarrollo posterior durante su administración en el 28,0% de los sujetos sin hiponatremia inicial (47).

Respecto a la morbilidad asociada a la hiponatremia, numerosos estudios han demostrado una mayor mortalidad en los pacientes con hiponatremia frente a eunatrémicos (15,30–32,34,58–65,67,69,84) incluyendo a pacientes con NP (47). Se han descrito varias hipótesis para explicar esta influencia de la hiponatremia en el incremento de mortalidad. Algunos autores lo justifican por un efecto directo de la propia hiponatremia (30–32,60,64,84) y otros por la gravedad de la enfermedad subyacente (31,61–63). Sin embargo, la hipótesis más aceptada actualmente es que la hiponatremia puede contribuir indirectamente en un aumento de mortalidad al generar una disfunción orgánica (76,77). Los mecanismos fisiopatológicos aun son desconocidos, pero entre los descritos se encuentran una disminución de la contractilidad cardíaca (78,79), alteración en la función mitocondrial (81), inmunosupresión (82),... Aunque exista controversia en algunos estudios, la corrección de la hiponatremia puede disminuir la mortalidad (83). Por otro lado, en los pacientes con hiponatremia también se ha encontrado una mayor estancia hospitalaria frente a los eunatrémicos (32,67,69,84–87).

A la hora del abordaje diagnóstico del paciente con hiponatremia, el primer paso es descartar la hiponatremia traslocacional (tras ajustar la natremia por la glucosa plasmática (94)) y la pseudohiponatremia (por hiperlipidemia o hiperproteinemia) (93). Tras confirmar así la presencia de una hiponatremia hipotónica, se debe valorar la volemia clínica junto a un estudio bioquímico (función renal, iones y osmolalidad en suero y orina) para diferenciar el tipo de hiponatremia: hipovolémica (disminución del VCE), euvolémica (VCE normal o elevado), hipervolémica (VCE bajo, con mala distribución del agua corporal total). Posteriormente, con la historia clínica se realiza una aproximación etiológica de la hiponatremia. Respecto a ello, se han realizado estudios para valorar la etiología de los pacientes con hiponatremia a nivel hospitalario, encontrándose el SIADH como la causa más frecuente (108), pero ninguno en pacientes con NP.

El tipo y etiología de la hiponatremia (no grave) van a guiar la elección del tratamiento más adecuado para su corrección (93). De este modo, la base del tratamiento de cada tipo de hiponatremia, sin añadir las particularidades de cada etiología, es: el

incremento del aporte de líquidos isotónicos en la hiponatremia hipovolémica; la restricción de líquidos +/- antagonistas del receptor V2 de la AVP o furosemina en la hiponatremia euvolémica; y los diuréticos +/- la restricción de líquidos en la hiponatremia hipervolémica (93,95). El aporte de un mínimo de sodio en todas ellas es también esencial. Estas indicaciones de tratamiento se mantienen en pacientes con NP (151), aunque nunca han sido evaluadas específicamente.

La NP está indicada en los pacientes con imposibilidad de utilizar la vía enteral por un periodo superior a 7-10 días (3-7 días si presencia de desnutrición) (153). Las principales patologías que justifican su administración son: tubo digestivo no funcionante (diarrea grave, vómitos intratables, obstrucción e íleo intestinal...), necesidad de reposo intestinal (cirugía abdominal mayor, mucositis, fístulas digestivas...) y el aumento de los requerimientos (críticos, grandes quemados...) (154). La composición de la NP depende de los requerimientos energéticos, agua, macronutrientes y micronutrientes del paciente, calculados según las recomendaciones de las guías de práctica clínica (153,156). El seguimiento de este tipo de soporte nutricional requiere una monitorización clínica y analítica frecuentes para evitar la aparición de complicaciones (tanto mecánicas como metabólicas) y en su defecto, instaurar un tratamiento precoz de las mismas (156). Dentro de las complicaciones metabólicas, la hiperglucemia (162) y las alteraciones electrolíticas se consideran las más frecuentes. Entre estas últimas, probablemente la más frecuente sea la hiponatremia, como consecuencia de una mayor confluencia de situaciones de antidiuresis en los pacientes candidatos a NP. Sin embargo, aún no existen estudios que lo confirmen.

El objetivo de la presente Tesis Doctoral es el estudio del tipo y etiología de la hiponatremia en pacientes no críticos con NP. En segundo lugar, también se pretende conocer la implicación de los principales factores de riesgo de desarrollo de hiponatremia en estos pacientes. En tercer lugar, se van a describir las pautas de tratamiento utilizadas actualmente por los Servicios de Endocrinología y Nutrición, así como la eficacia de las mismas. Y por último, se analizará el papel de la hiponatremia en la mortalidad intrahospitalaria y en la estancia hospitalaria en pacientes con NP.

2. Descripción de la población estudiada

La NP está indicada en aquellas situaciones en las que la función del tracto gastrointestinal está excluida durante al menos 7-10 días (3-7 días si desnutrición) (153,154). En los últimos años, con la publicación de guías de práctica clínica (153,156), cada vez está mejor establecido el papel de la NP, las patologías en las que se indica, y cómo debe ser su composición en macro y micronutrientes.

En nuestro estudio, las características basales de los pacientes en cuanto a edad (mediana de 65 años), sexo (60% hombres), comorbilidades previas (9% insuficiencia renal, 4% insuficiencia hepática, 5% insuficiencia respiratoria, 6% insuficiencia cardíaca y 16% diabetes conocida), y porcentaje de pacientes quirúrgicos (58%) fueron similares a otro estudio multicéntrico español reciente de similar metodología y tamaño muestral (162,163). La mayor diferencia respecto a este estudio, fue un mayor rango en el número de pacientes procedentes de cada hospital [5-92].

En general, los pacientes hospitalizados que requieren NP, suelen tener mayor gravedad y un peor estado nutricional, lo que conlleva un mayor riesgo de complicaciones. En nuestra muestra se confirmó esta premisa, ya que más de dos tercios presentaron desnutrición moderada o grave según la Valoración Global Subjetiva (VGS), y aproximadamente un cuarto según el índice de masa corporal (IMC). Respecto a los parámetros analíticos, los valores de albúmina y prealbúmina también se encontraron muy disminuidos. Estos resultados fueron similares a los objetivos por Oliveira et al. La mayor divergencia entre ambos estudios fue el porcentaje de desnutrición grave según la VGS (36,2% en nuestro estudio respecto 24,1% en el de Oliveira et al) (162,163,167).

Las principales indicaciones de la NP que encontramos, siguiendo las guías de práctica clínica actuales (156), fueron la necesidad de reposo intestinal y el íleo paralítico, con porcentajes muy similares respecto otros estudios, como los realizados en el ámbito español de Oliveira et al. o el del Hospital de Guadalajara de Herranz et al. (155,162,163). Aproximadamente en tres cuartas partes de los pacientes se retiró la NP

por paso a dieta oral, lo cual también se observó en los estudios nacionales nombrados (155,162,163).

La mediana de duración de la NP de nuestra muestra fue de 8 días. Esta duración es menor respecto a las medias obtenidas en otros estudios similares, de entre 12 y 14 días (155,162,163). Sin embargo, solo el 9% tuvieron una duración menor de 5 días, lo cual sugiere que, en general, las indicaciones de inicio de NP fueron adecuadas.

Los requerimientos calóricos, así como la composición de la NP en cuanto a macronutrientes, micronutrientes, vitaminas, oligoelementos, volumen e iones, deben adaptarse a las necesidades del paciente en cada momento. En nuestro protocolo especificamos las recomendaciones para el cálculo de la composición de la NP, basándonos en las guías de práctica clínica actuales (153,156), dejando a criterio del facultativo su formulación según las características clínicas y analíticas del paciente, así como la disponibilidad del centro hospitalario. El aporte calórico diario administrado por la NP (25,9 kcal/kg peso/día) se ajustó en un amplio porcentaje al gasto energético total (GET) calculado según las indicaciones del protocolo de estudio (ecuación de Harris Benedict multiplicada por factor de estrés), y se encontró dentro del rango de kcal/kg peso/día recomendado para pacientes hospitalizados no críticos (20-30 kcal/kg peso/día) (156). La media de gramos de proteínas aportados se correspondieron de manera adecuada a un grado de estrés moderado (1,3 g prot/kg peso/día) y la distribución del resto de macronutrientes también cumplió las indicaciones de las guías de práctica clínica (entre 40-60% de las kcal no proteicas). El aporte de hidratos de carbono fue de 3 g/kg peso/día y el de lípidos de 0,9 g/kg peso/día. Tanto el aporte energético como de macronutriente obtenidos fueron muy similares los estudios nacionales previamente citados (155,162,163). Así mismo, el aporte de potasio estuvo dentro de las recomendaciones del protocolo (1 mEq/kg peso/día).

Sin embargo, la cantidad de volumen total de líquido administrado, teniendo en cuenta la NP y los líquidos extra (42,5 ml/kg peso/día) excedió ligeramente las recomendaciones (entre 30-40 ml/kg peso/día). El aporte de sodio por la NP fue de 1,2 mEq/kg peso/día, dentro del rango recomendado. Sin embargo, al añadir los mEq

administrados por la solución salina, obtuvimos un aporte de sodio total de 2,8 mEq/kg peso /día. Estos resultados nos podrían indicar que no se tiene en cuenta de manera adecuada el aporte extra de volumen a la NP, y sobretodo de sodio.

Respecto a las complicaciones relacionadas con la NP, en solo el 21,9% de los pacientes no se detectó ninguna, siendo este porcentaje mayor al compararlo con el estudio retrospectivo de Herranz et al, cuyo objetivo era describir la frecuencia de complicaciones asociadas a la NP (155). Múltiples factores lo podrían justificar, como las diferencias en las definiciones (sobretudo el de hiperglucemia), o la menor duración de la NP de nuestro estudio.

En nuestra población obtuvimos un 23,8% de complicaciones infecciosas, cifra ligeramente superior al estudio de Oliveira et al. Por el contrario, en nuestros pacientes la frecuencia de infecciones asociadas a catéter fue menor (9,2%).

En cuanto a las complicaciones metabólicas asociadas, la hiperglucemia fue la más frecuente, presentándose hasta en un 43,8% de los pacientes. Sin embargo, esta incidencia se encuentra muy lejos del aproximadamente 80% obtenido por Herranz et al y por Oliveira et al (155,162,163). Ello puede deberse a la diferente definición en estos estudios (una única determinación de glucemia capilar ≥ 140 mg/dl) respecto a la nuestra (dos determinaciones de glucemia capilar > 140 mg/dl o una $>$ de 180 mg/dl), y que uno de los objetivos principales de estos trabajos era el estudio de la frecuencia de hiponatremia. La hipertrigliceridemia (triglicéridos > 500 mg/dl) se desarrolló solo en el 2%, dato no comparable con las incidencias mayores obtenidas por Herranz et al y Llop et al (estudio multicéntrico catalán de estudio de hipertrigliceridemia asociada a NP), al definir la hipertrigliceridemia en ambos por encima de 250 mg/dl (155,177). Por otra parte, encontramos una alteración de las pruebas de función hepática en el 27,1% de nuestros pacientes. En este caso Herranz et al, a pesar de tener una definición similar, obtuvieron una incidencia menor (155).

En conclusión, la gran mayoría de los datos de nuestros pacientes respecto a sus características demográficas, de valoración nutricional y de composición de la NP (siguiendo de manera adecuada las guías de práctica clínica) concuerdan con los

resultados de estudios previos, de similar metodología y ámbito (162,163,167). Las diferencias respecto a las complicaciones de la NP se deben principalmente a la diversidad de las definiciones.

3. Objetivo principal: Conocer el tipo y etiología de la hiponatremia en pacientes no críticos que reciben nutrición parenteral

La hiponatremia es la alteración hidroelectrolítica más frecuente en la práctica clínica (25). Su prevalencia e incidencia varían según la definición de hiponatremia y la población estudiada. Estudios a nivel hospitalario han estimado una prevalencia entre el 15% y el 30% (30–32).

Los pacientes que reciben NP se consideran una población de mayor riesgo de hiponatremia por su exposición a múltiples circunstancias, algunas en común con el resto de pacientes hospitalizados: estímulos no osmóticos fisiológicos de la AVP (náuseas, dolor, estrés, cirugía,...), SIADH (origen neoplásico, farmacológico, pulmonar, neurológico...), pérdidas renales o extrarrenales de sodio (diarrea, vómitos, fístulas, obstrucción intestinal...), así como un posible aporte de líquidos que supere la capacidad de eliminación renal. En un reciente estudio retrospectivo, Gómez-Hoyos et al. valoraron por primera vez la frecuencia de hiponatremia en 222 pacientes con NP. En él se halló que al inicio de la NP el 19,8% ya presentaban hiponatremia (natremia < 135 mmol/L), desarrollándose durante su administración en el 28,0% de los sujetos sin hiponatremia inicial. Al comparar estos datos con un grupo control, la frecuencia de hiponatremia fue próxima al doble en pacientes con vs sin NP, independientemente de la edad, sexo y el índice de comorbilidad de Charlson (OR 1,8 [IC 95%: 1,1-2,9]) (47). En nuestro estudio multicéntrico obtuvimos una frecuencia menor, con presencia de hiponatremia al inicio de la NP en el 14,2% de los pacientes, y desarrollo posterior en el 18,2% restante. Eso conllevaba que hasta el 29,8% de los sujetos presentaron hiponatremia en algún momento de la administración de la NP. Esta cifra fue inferior a la objetivada en el estudio de Gómez Hoyos et al (52%), probablemente justificable por el diseño de éste y que la frecuencia de hiponatremia resultante fue la de todo el ingreso frente a la nuestra extraída durante la administración de la NP. También pudo influir el tipo de paciente, obtenido principalmente de los servicios de Medicina Interna y Cirugía General, que se han asociado a mayor frecuencia de hiponatremia (30). En nuestro estudio sólo se observó hiponatremia grave (natremia < 125 mmol/L)

en un 0,7%, al igual que en estudio de Gómez Hoyos et al (0,6%) (47), y similar a los estudios en población hospitalizada (27,30,31).

En relación a la persistencia de hiponatremia, en nuestra muestra un 16,1% presentaban hiponatremia en al menos el 25% del total de sus determinaciones de natremia (percentil 25), un 10,1% lo hacía en al menos el 50% de las natremias (percentil 50), y un 4,8% de los sujetos tuvieron hiponatremia mantenida (al menos el 75% de las natremias < 135 mmol/L, percentil 75). Un 3,1% presentó hiponatremia en todas las determinaciones. En el estudio de Gómez Hoyos et al, se encontraron frecuencias mayores en pacientes con menor grado de persistencia de hiponatremia (27% en percentil 25 y 15,7% en percentil 50), mientras que hubo una menor frecuencia de hiponatremia mantenida (3%) (47).

Realizar un correcto diagnóstico de la hiponatremia es esencial para el abordaje terapéutico de la misma. El tipo y etiología de la hiponatremia (no grave) van a guiar la elección del tratamiento más adecuado para su corrección (93). En el algoritmo diagnóstico, inicialmente hay que descartar la hiponatremia traslocacional (tras ajustar la natremia por la glucosa plasmática (94)) y la pseudohiponatremia (por hiperlipidemia o hiperproteinemia) (93), en las que la osmolalidad plasmática no se encuentra descendida. En nuestro estudio realizamos la corrección de natremia por glucemia, y excluíamos las cifras de natremia acompañadas de niveles de triglicéridos superiores a 400 mg/dl. Al confirmar así la presencia de hiponatremia, se debe valorar la volemia clínica para diferenciar el tipo de hiponatremia: hipovolémica (disminución del VCE), euvolémica (VCE normal o elevado), hipervolémica (VCE bajo, con mala distribución del agua corporal total). A continuación también hay que solicitar el estudio bioquímico específico de hiponatremia (función renal, iones en suero y orina, osmolalidad plasmática y orina, hormonas tiroideas y cortisol), que junto a algunos datos de la historia clínica, permite establecer la etiología de la hiponatremia (93).

Nuestro estudio es el primero que ha evaluado el tipo y etiología de la hiponatremia en pacientes con NP. Se valoró la volemia clínica por parte de los investigadores en un elevado porcentaje de sujetos (84,6%), resultando la hiponatremia euvolémica la más

frecuente (67,9%), con amplia diferencia respecto a la hipervolémica (17,5%) y a la hipovolémica (14,6%). Estos resultados divergen relativamente a los obtenidos en población hospitalaria general. En un estudio prospectivo unicéntrico recientemente publicado por Cuesta et al, la hiponatremia eurolémica también fue el tipo más frecuente de hiponatremia en pacientes hospitalizados, pero con un menor porcentaje (43,5%), seguida de la hipovolémica (32,6%) y la hipervolémica (20,8%) (178). Por otra parte, en el registro multicéntrico de pacientes hospitalizados con hiponatremia (111), se objetivó una menor frecuencia de hiponatremia hipovolémica (20%) respecto a la eurolémica e hipervolémica, al igual que en nuestro estudio. Sin embargo, la frecuencia de hiponatremia eurolémica no fue tan superior a la hipervolémica como en nuestras pacientes. Este mayor porcentaje de hiponatremia eurolémica en los pacientes con NP probablemente es consecuencia de una mayor presencia de estímulos fisiológicos de la AVP (náuseas, vómitos, estrés post-quirúrgico..), así como de cuadros asociados al síndrome de secreción inadecuada de ADH (SIADH), como neoplasia, fármacos, incremento de presión intraabdominal,...

El estudio bioquímico de hiponatremia (función renal, iones y osmolalidad en sangre y orina) para establecer el diagnóstico de hiponatremia, se realizó en la mayoría de los pacientes, siendo completo (incluyendo hormonas tiroideas y cortisol) en un 56,8%. La solicitud del estudio completo es particularmente importante en la hiponatremia eurolémica y el diagnóstico de SIADH. En el registro multicéntrico de hiponatremia hospitalaria, solo un 21% de los pacientes etiquetados de SIADH disponían de hormonas tiroideas y cortisol, y un 47% de iones y osmolalidad en plasma y orina. En este estudio se objetivó además una ausencia de respuesta al tratamiento de la hiponatremia asociada a SIADH, lo cual relacionaron a un probable diagnóstico incorrecto del SIADH entre otros motivos (111). Con ello, se pone de manifiesto la relevancia del estudio analítico y la realización de un correcto diagnóstico.

Como era esperable, tras comparar el estudio bioquímico en los tres tipos de hiponatremia, no se encontraron diferencias significativas en los valores del potasio sérico, osmolalidad plasmática, potasio urinario y osmolalidad urinaria. En cambio, sí hubo diferencias significativas en el sodio urinario: 21 [13-33] mmol/L en

hipovolémicos; 78 [53-95,4] mmol/L en euvolémicos; 58 [18,4-82] mmol/L en hipervolémicos. Estas diferencias se mantuvieron al comparar los pacientes hipovolémicos vs euvolémicos, y los hipovolémicos vs hipervolémicos. Los resultados obtenidos son acordes a la fisiopatología de la hiponatremia según la clasificación por tipos. El sodio urinario reviste un especial interés en el diagnóstico diferencial. En la hiponatremia hipovolémica, hay un bajo volumen circulante efectivo (VCE), que estimula la secreción de AVP vía barorreceptores y que, a parte del aumento de reabsorción de agua libre a nivel renal, se acompaña de un descenso de la perfusión renal, con la activación secundaria del SRAA, una reducción en el flujo por las asas de Henle y una reabsorción renal de sodio (14). Esto se refleja a nivel analítico, situándose el sodio urinario habitualmente por debajo de 20 mmol/L, excepto en los casos de pérdidas renales de sodio, como en el uso de diuréticos, en la insuficiencia suprarrenal primaria o en el hipoaldosteronismo. En nuestra muestra, la mediana de sodio urinario en los hipovolémicos fue la más baja, entorno a estos 20 mmol/L, lo cual concuerda con la etiología más frecuente hallada en estos pacientes: las pérdidas digestivas. En la hiponatremia hipervolémica, aunque la fisiopatología es la misma que la hipovolémica (bajo VCE, pero con mala distribución del agua corporal total), dado el uso de diuréticos para el tratamiento, lo habitual es obtener sodios urinarios más elevados. Y en la hiponatremia euvolémica, hay un VCE normal o elevado, por lo que la perfusión renal está aumentada, con inhibición del SRAA (reducción de la reabsorción proximal y distal de sodio), con incremento en la reabsorción de agua libre inducida por AVP en el túbulo colector (115). En este caso el sodio urinario es superior a 40 mmol/L (siempre que el aporte de solutos sea suficiente), tal y como se muestra en las cifras de nuestros sujetos. Según los mecanismos fisiopatológicos anteriormente descritos, también sería esperable encontrar diferencias en la función renal al estratificar por tipo de hiponatremia. De hecho, obtuvimos diferencias significativas en las determinaciones de urea, siendo mayor en los pacientes con VCE disminuido, en los que hay hemoconcentración (50 [35,5-76] mg/dl en hipovolémicos y 50 [30-50,7] en hipervolémicos) respecto a los euvolémicos, donde existe hemodilución (37 [30-47] mg/dl). Por el contrario, en los otros parámetros analíticos que usamos para ver los

patrones de hemoconcentración o hemodilución (creatinina, ácido úrico), no se encontraron diferencias significativas.

Una vez establecido el tipo de hiponatremia, se debe realizar una aproximación etiológica de la misma. En pacientes con NP, hasta el momento, tampoco se había evaluado la causa de la hiponatremia. Tras la valoración de la volemia clínica junto con el estudio analítico, la presencia de patologías previas, uso de fármacos y datos clínicos relacionados con la hiponatremia, se pudo hacer un diagnóstico etiológico en casi el 75% de los pacientes.

En aquellos con hiponatremia hipovolémica, la causa más frecuente fueron las pérdidas digestivas (77%). El resto de pacientes presentaban pérdidas renales por diuréticos (23%). Por el contrario, en el estudio prospectivo de Cuesta et al, los pacientes hospitalizados con hiponatremia hipovolémica presentaron mayor número de etiologías, siendo la más frecuente la sepsis (33,1%), seguida de las pérdidas gastrointestinales (15,6%), y el uso de diuréticos (11,3%) (178). Esta divergencia puede explicarse por la elevada frecuencia de patología del tracto gastrointestinal en los pacientes con NP.

En cuanto a los sujetos con hiponatremia euvolémica, la causa más frecuente fue el SIADH (62,7%), seguida de la elevación fisiológica de la AVP por náuseas, dolor o cirugía (37,3%). Las etiologías del SIADH (neoplásica, farmacológica, neurológica, pulmonar...) no pudieron ser descritas al no disponer de los datos clínicos suficientes y al no haber sido protocolizado el diagnóstico etiológico del SIADH. Por otra parte, en nuestro estudio no se encontró ninguna hiponatremia asociada insuficiencia suprarrenal secundaria. Este hallazgo es diferente al objetivado por Cuesta et al, que obtuvieron un 4% de insuficiencia suprarrenal secundaria, probablemente debido al mayor número de pacientes con patología neurológica y neuroquirúrgica incluidos en este estudio (108).

En la hiponatremia hipervolémica, la insuficiencia cardíaca fue la etiología más común (82,6%), seguida con un amplio margen de diferencia de la insuficiencia hepática (17,4%). Tanto en el "Hyponatremia Registry" como en el estudio prospectivo de

Cuesta et al, la hiponatremia asociada a insuficiencia cardiaca era también la más frecuente, aunque con porcentajes inferiores a nuestro estudio (111,178).

Al analizar globalmente las etiologías de la hiponatremia en nuestros pacientes, el SIADH fue la más frecuente, tal y como se considera en los pacientes hospitalizados por los resultados de otros estudios (111,178). La segunda causa más frecuente fue la elevación fisiológica de la AVP, no bien determinada en la mayoría de estudios previos, pero que consideramos congruente con el perfil de nuestros pacientes (elevada frecuencia de cirugía mayor del tracto gastrointestinal, con presencia de náuseas, vómitos, dolor, ...). Tras ellas, la insuficiencia cardiaca y las pérdidas digestivas fueron la tercera y cuarta etiología más frecuente de hiponatremia en nuestros pacientes.

4. Primer objetivo secundario: Conocer los principales factores de riesgo asociados al desarrollo de hiponatremia en pacientes con nutrición parenteral

Teniendo en cuenta la importante incidencia de hiponatremia tras el inicio de la NP (18,2%) y su relevancia en la morbimortalidad, en nuestro estudio prospectivo consideramos de primordial interés conocer los principales factores de riesgo de su desarrollo. De esta manera, los pacientes con alguno o varios de estos factores, deberían de tener un seguimiento más cercano, a fin de disminuir la incidencia y/o el grado de gravedad de la hiponatremia.

En nuestros pacientes, en el análisis univariante, el riesgo de desarrollo de hiponatremia tras el inicio de la NP, fue significativamente mayor en mujeres, en aquellos con menor IMC o con desnutrición grave según el test de VGS, en presencia de náuseas o vómitos, en pacientes con pérdidas digestivas (fístulas, obstrucción intestinal, íleo paralítico o diarrea), en aquellos con signos de tercer espacio (ascitis o edemas), y con la toma de algunos fármacos (antidepresivos, opiáceos). Tras el análisis de regresión logística multivariante, permanecieron como factores de riesgo independientes de desarrollo de hiponatremia: el sexo femenino, la desnutrición grave según la VGS, la presencia de náuseas y vómitos y la toma de opiáceos.

El sexo femenino es un conocido factor de riesgo para el desarrollo de hiponatremia. Se ha relacionado a un mayor porcentaje de agua extracelular, a diferencias en el mecanismo de transporte celular de sodio, así como a una mayor sensibilidad a la AVP respecto al sexo masculino (48). En nuestro estudio se obtuvieron resultados congruentes, siendo el sexo femenino un factor de riesgo independiente de aparición de hiponatremia tras el inicio de la NP, con una OR de 1,74 [IC 95%: 1,04-2,92]. Por otra parte, se ha documentado un mayor riesgo de muerte en mujeres pre-menopáusicas frente a post-menopáusicas y varones en cuadros de hiponatremia grave. Ello se justificaría por la interferencia de los estrógenos en los mecanismos de adaptación cerebral al edema celular, así como por una mayor sensibilidad a la acción vasoconstrictora de la AVP a nivel cerebral (49).

La desnutrición no está considerada un factor de riesgo común de hiponatremia a día de hoy. Sin embargo, en nuestro estudio se obtuvo la desnutrición grave por el test de la VGS como factor de riesgo independiente de desarrollo de hiponatremia durante la administración de NP, con una OR de 2,15 [IC 95%: 1,06-4,35]. Estos hallazgos se podrían explicar por el aumento de agua extracelular de estos pacientes, así como a un mayor grado de estrés inflamatorio (contemplado en el test de VGS), lo cual se relaciona con un estímulo de la síntesis parvocelular de AVP (57). En un estudio reciente de pacientes en hemodiálisis se ha relacionado la desnutrición (así como la inflamación y los signos de tercer espacio), con mayor presencia de hiponatremia (179). Se precisaría de estudios específicos para poder determinar esta asociación. Por lo tanto, como hallazgo de interés, nuestros datos sugieren una relación entre la desnutrición asociada a enfermedad y el desarrollo de hiponatremia, aunque para establecer esta asociación son necesarios estudios con parámetros que reflejen mejor la inflamación y con la medición de la distribución de líquidos corporales (bioimpedanciometría).

Por su parte, la presencia de náuseas y vómitos es uno de los estímulos más potentes de secreción no osmótica de AVP, y por tanto, uno de los factores de riesgo descritos de hiponatremia (19). En nuestros pacientes tuvimos resultados acordes con ello, ya que se constató que la presencia de náuseas o vómitos se relacionaba a mayor riesgo de desarrollo de hiponatremia de manera independiente, con una OR de 1,75 [IC 95%: 1,04-2,94].

Y por último, en el análisis de regresión logística multivariante también encontramos como factor de riesgo de aparición de hiponatremia el uso de opiáceos, con una OR de 2,20 [IC 95%: 1,30-3,73]. Estos fármacos se han relacionado a desarrollo de hiponatremia por elevación de AVP, aunque no están dentro de los más frecuentes (antiepilépticos, antidepresivos,...) (54). Posiblemente en este resultado también influya que los opiáceos reflejan la presencia de dolor no controlado en los pacientes, el cual es un conocido estímulo de secreción no osmótica de AVP, y por tanto, un factor de riesgo de hiponatremia.

Como se ha mencionado, en estos cuatro factores de riesgo interviene la elevación no osmótica de la AVP como mecanismo fisiopatológico de desarrollo de hiponatremia, y por tanto serían responsables de generar una hiponatremia euvolémica, el tipo más frecuente de hiponatremia encontrado en nuestros pacientes.

En cuanto al resto de factores de riesgo clásicos de la hiponatremia, cabe mencionar varios datos relevantes. Los pacientes con hiponatremia tenían una mediana de edad mayor, sin llegar a la significación estadística. Respecto a la presencia de comorbilidades previas (insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal, insuficiencia hepática, insuficiencia renal, diabetes), no hubo diferencias entre aquellos con o sin desarrollo de hiponatremia. Solo en el caso del fallo hepático agudo se encontró una asociación significativa, no valorable por la mínima cantidad de pacientes. Y por último, los sujetos con hiponatremia tenían un mayor porcentaje de neoplasia, sin ser una diferencia estadísticamente significativa. La neoplasia es un conocido factor de riesgo de hiponatremia, siendo la principal causa el SIADH neoplásico, pero en la aparición de la hiponatremia también contribuyen: las náuseas y vómitos, el dolor y algunos fármacos para su control (opiáceos, carbamacepina), el uso de quimioterapia (algunos fármacos estimulan la secreción de AVP, otros originan pérdidas renales), y la radioterapia abdominal (estimula la liberación de AVP) (37). Por otra parte, no en todos los tumores es igual de frecuente el SIADH. Esta última consideración y la previa, podrían justificar la ausencia de diferencias significativas en la frecuencia de hiponatremia en los pacientes con y sin neoplasia.

Respecto a la cirugía, el desarrollo de hiponatremia fue similar entre aquellos que habían recibido tratamiento quirúrgico en el ingreso respecto al resto. Aunque se considere a los pacientes quirúrgicos de mayor riesgo, en ambos grupos se pueden dar otras circunstancias predisponentes a la hiponatremia, lo cual explicaría nuestro hallazgo. Los pacientes quirúrgicos comparten factores de riesgo para el desarrollo de hiponatremia euvolémica mediada por AVP (náuseas, dolor, estrés postquirúrgico, uso de fármacos opiáceos), así como de hipovolémica (pérdidas digestivas, hemorragia...) o hipervolémica (descompensación insuficiencia cardíaca por exceso de aporte de líquidos). Sin embargo, los sujetos no quirúrgicos suelen tener peor estado nutricional

(factor de riesgo independiente de desarrollo de hiponatremia en nuestro estudio), así como una edad más avanzada y reciben múltiples fármacos. Además, no se valoró el periodo post-quirúrgico inmediato, que es el de mayor riesgo de hiponatremia, al encontrarse los pacientes hospitalizados en las Unidades de Cuidados Intensivos o Reanimación en dicho periodo.

Además de las náuseas y vómitos, también se recogieron otros cuadros clínicos que previamente se han relacionado con el desarrollo de hiponatremia. En los pacientes con vs sin hiponatremia se encontró un porcentaje significativamente superior de pérdidas digestivas (fístulas, obstrucción intestinal, íleo paralítico, diarrea) (67,1% vs 51,7%) y de ascitis y edemas (29,4% vs 17,6%), perdiendo la significación tras ajustarse por el resto de factores de riesgo en el análisis multivariante. Las pérdidas digestivas son causa de hiponatremia hipovolémica, secundaria al déficit de volumen plasmático que genera la eliminación de sodio. La diarrea fue la patología digestiva de mayor riesgo de desarrollo de hiponatremia hipovolémica en nuestro estudio. Sin embargo, estas circunstancias suelen estar presentes al inicio de la NP y son en muchas ocasiones su indicación. La alteración electrolítica se suele resolver, en la mayoría de las ocasiones, tras la reposición de volumen que reciben estos pacientes a través de la NP. Por tanto, no sería razonable obtener que las pérdidas digestivas fueran un factor de riesgo independiente de desarrollo de hiponatremia durante la administración de la NP. La ascitis y los edemas son signos de tercer espacio que ponen de manifiesto un riesgo de hiponatremia hipervolémica (insuficiencia cardíaca, cirrosis hepática o síndrome nefrótico). Sin embargo, no todos los pacientes con signos de tercer espacio desarrollan hiponatremia. Probablemente sea necesario la confluencia de más factores, entre ellos la elevación no osmótica de la AVP, que forma parte de la respuesta neurohormonal activada por el déficit de volumen plasmático (14).

En cuanto a los fármacos relacionados con el desarrollo de hiponatremia, se evaluó el uso de antidepresivos, AINEs, IECAs, opiáceos y diuréticos. También se recogieron datos de gabapentina/pregabalina, antiepilépticos (carbamazepina/ oxcarbazepina) y de cotrimoxazol, sin poderse realizar un estudio comparativo por el escaso número de casos. Como se ha nombrado con anterioridad, tras el análisis de regresión logística

multivariante, en nuestra muestra los opiáceos resultaron un factor de riesgo independiente de desarrollo de hiponatremia durante la NP. Sin embargo, en el análisis comparativo se objetivó un consumo significativamente mayor de antidepresivos en los pacientes con desarrollo de hiponatremia (10,6%) frente a aquellos sin desarrollo de la misma (4,2%) durante la NP. Esta significación estadística se perdió tras el ajuste por el resto de factores en el análisis multivariante. A pesar de que los antidepresivos se han descrito como causa de hiponatremia euvolémica al estimular la secreción no osmótica de AVP (54), justificamos los resultados no significativos de nuestro estudio por el bajo porcentaje de pacientes del total de la muestra con uso de antidepresivo, respecto al resto de factores de riesgo. Por otra parte, tampoco encontramos un mayor riesgo de hiponatremia con el consumo de IECAs. Los IECAs se han relacionado con el desarrollo de hiponatremia euvolémica por estímulo de la secreción de AVP, aunque con menor frecuencia respecto a otros fármacos; así como de hiponatremia hipovolémica, al poder desencadenar un hipoaldosteronismo por bloqueo del SRAA (sin repercusión en nuestro estudio al no objetivarse ningún diagnóstico evidente) (54). Por último, los diuréticos estuvieron al borde de la significación estadística al comparar los pacientes con vs sin desarrollo de hiponatremia durante la NP (50,6% vs 39,1%). En su caso pueden ser causa de hiponatremia hipovolémica por pérdidas renales de sodio, aunque durante la administración de la NP es menos probable que se produzca ya que con el aporte de líquidos de la misma, se repone la volemia en la mayoría de las ocasiones. Por ello era esperable que los diuréticos no fueran un factor de riesgo independiente de desarrollo de hiponatremia.

Finalmente valoramos la influencia del aporte total de líquidos, sodio y osmoles, así como de la osmolalidad de la fórmula de la NP, no encontrando diferencias entre los pacientes con y sin desarrollo de hiponatremia tras el inicio de la NP. Respecto al aporte de sodio, la ausencia de relación con el desarrollo de hiponatremia durante la administración de la NP era esperable. Se justifica por el aporte suficiente de osmoles derivados de la urea generada en el metabolismo de las proteínas administradas (10 g de proteínas generan 50 mmol de urea, 1 mmol de urea equivale a 1 mOsm). Estos osmoles, sin incluir los osmoles derivados del aporte de sodio y potasio, aseguran la

eliminación de agua libre (50-60 mOsmol para eliminar un litro de agua), en ausencia de una situación basal de antidiuresis (elevación no osmótica de la AVP) (4). En nuestros pacientes el aporte de osmoles fue de $687,7 \pm 115,4$ mOsm/día, lo que implica que el riñón, en ausencia de una elevación no ósmótica de la AVP, es capaz de eliminar 17 litros de agua. Únicamente un aporte de fluidos por encima de dicha cifra originaría hiponatremia. En nuestro estudio ningún paciente recibió un aporte total de líquidos superior a dicha cifra, siendo el aporte total diario de fluidos de 2649 [2239,5 – 3150,6] ml. En nuestro estudio tampoco encontramos diferencias en el aporte total de líquidos entre los pacientes con (2632,4 [2246,7-3159,4] ml/día) y sin desarrollo (2650 [2250-3158,4] ml/L) de hiponatremia. Sin embargo, en la hiponatremia sin déficit de volumen plasmático, es necesario un mínimo de aporte de líquidos. La cantidad necesaria para producir hiponatremia es inversamente proporcional al grado de alteración de la excreción de agua libre. Si la ingesta de líquidos es extremadamente alta, un mínimo deterioro de la dilución urinaria puede ser suficiente para expandir el agua corporal y disminuir la natremia. Si por el contrario, la capacidad de excreción de agua libre está muy disminuida, incluso un consumo discreto de agua puede ser suficiente para causar hiponatremia (180). Por lo tanto, el desarrollo de hiponatremia durante la administración de la NP es consecuencia de una situación basal de antidiuresis (elevación no osmótica de la AVP), independiente del aporte total de sodio y del aporte de líquidos. La cantidad de estos últimos, únicamente puede influir en el grado de hiponatremia

En definitiva, los factores de riesgo independientes de desarrollo de hiponatremia durante la administración de la NP encontrados en nuestro estudio (sexo femenino, desnutrición grave por VGS, presencia de náuseas y vómitos, uso de opiáceos) se relacionan con una elevación no osmótica de la AVP, y por tanto, con la aparición del tipo de hiponatremia más frecuente, la euvolémica. El resto de factores de riesgo importantes analizados tendrían un menor peso por su menor presencia en los pacientes (como uso de antidepresivos, antiepilépticos...) o por ser causa de hiponatremias menos frecuentes (uso de diuréticos, pérdidas digestivas, presencia de ascitis o edemas).

5. Segundo objetivo secundario: Describir las pautas de tratamiento habituales de la hiponatremia y su eficacia en los pacientes que reciben nutrición parenteral

El objetivo de tratamiento de la hiponatremia varía en función de la gravedad neurológica de la misma. En pacientes con hiponatremia grave (disminución del nivel consciencia, confusión, convulsiones, etc) es revertir la clínica neurológica del paciente. Sin embargo, en pacientes sin clínica neurológica grave el objetivo es corregir la hiponatremia (natremia < 135 mmol/L) (93,95). Para lograr una corrección eficaz de la hiponatremia el tratamiento debe ser administrado en base al tipo de volemia y etiología de la misma (93,95). Este enfoque terapéutico se ha calificado como tratamiento adecuado, y debe aplicarse tanto en pacientes sin NP como en pacientes con dicho soporte (151,156).

En nuestro estudio, el 99% de los pacientes con NP e hiponatremia presentaron hiponatremia no grave. Uno de nuestros objetivos secundarios fue conocer las pautas de tratamiento de la hiponatremia no grave utilizadas actualmente en los pacientes con NP de los hospitales españoles. En relación a ello también valoramos si el tratamiento aplicado era el adecuado (ajustado al tipo y etiología de la hiponatremia), y la eficacia del mismo.

Aproximadamente un tercio de nuestros pacientes no recibieron tratamiento de la hiponatremia. Aunque consideremos un adecuado porcentaje de indicación terapéutica, en el mayor estudio observacional multicéntrico descriptivo del tratamiento actual de la hiponatremia (natremia < 135 mmol/L) euvolémica o hipervolémica (Hyponatremia Registry, n 3087), no se trató a un menor porcentaje (17%) (111). Esta diferencia la podemos relacionar a la dificultad y las particularidades del tratamiento en los pacientes con NP.

El tratamiento más frecuentemente administrados, en casi el 80% de los pacientes, fue el incremento del sodio en la NP, requerido en todos los tipos de hiponatremia, aunque nunca suficiente por sí solo. Pero la valoración del tratamiento no se debe realizar

globalmente, siempre hay que estratificar por tipo de hiponatremia. Por ello a continuación se discuten los tratamientos administrados en cada tipo de hiponatremia:

- En los pacientes con hiponatremia hipovolémica, se recomienda la reposición de volumen (151,156), lo cual se realizó en la mitad de los pacientes que recibieron tratamiento. También se considera un tratamiento adecuado la retirada de diurético, realizada en un 25%. Al resto solo se les aumentó el sodio en la NP, lo cual sería insuficiente. Por tanto, un 75% de los pacientes con hiponatremia hipovolémica recibieron una terapia ajustada a su volemia.
- La hiponatremia hipervolémica fue el tipo que se trató de manera más adecuada. Aproximadamente dos tercios recibieron furosemida y a un cuarto se les redujo el aporte de líquidos (sin asociarse diurético), ambos tratamientos recomendados (151,156). Los sujetos que consideramos que no fueron tratados de manera correcta, se les incrementó solo el sodio en la NP.
- Por el contrario, los pacientes con hiponatremia euvolémica fueron los que presentaron mayor dificultad en su abordaje terapéutico. Recibieron tratamiento adecuado menos de la mitad de ellos. En este tipo de hiponatremia, a parte del incremento de aporte de sodio, se precisa siempre de una reducción del volumen administrado, al existir un exceso de agua corporal total (151,156). Otras terapias que se pueden añadir serían la furosemida (en SIADH y osmolalidad urinaria > 350 mmol/L, por favorecer la eliminación de agua libre) (137,138) y los agonistas del receptor V2 de la AVP (vaptanes). En nuestro estudio llama la atención que el tratamiento más frecuentemente administrado, hasta en la mitad de los sujetos, fuera el aumento aislado de sodio en la NP. Además, a 2 pacientes se les incrementó el aporte de líquidos. La expansión de volumen no estaría indicada en la euvolemia, pero actualmente se sigue utilizando en la práctica clínica habitual. De hecho, en el “Hyponatremia Registry” hasta un 25% de los pacientes con eu- o hipervolemia fueron tratados con suero isotónico (aunque con dudas diagnósticas por la

eficacia encontrada de este tratamiento) (111). Entre los pacientes que recibieron tratamiento adecuado, a un tercio se les concentró el volumen administrado, a 5 pacientes se pautó furosemida, y únicamente 2 recibieron tolvaptán.

El porcentaje de tratamiento adecuado administrado en los pacientes con SIADH o con elevación fisiológica de la AVP fue muy similar. Aunque en los de elevación fisiológica de la AVP, no se registró de manera específica el tratamiento analgésico o antiemético, que también se habría considerado adecuado. El tratamiento del SIADH debe ser individualizado (93,95,106). Las opciones terapéuticas manejadas actualmente son: la restricción de líquidos a menos de 0,5 – 1 litro/día (si persiste la capacidad renal de eliminar agua libre y no hay contraindicaciones (95,132)), la furosemida (elimina agua libre al modificar el gradiente osmótico entre médula renal y túbulo colector si la osmolalidad urinaria es superior a 350 mOsm/kg (137,138)), los vaptanes (aumentan la acuarexis al bloquear de manera competitiva el receptor V2 de la AVP del túbulo colector), y la urea (disminuye la natriuresis e incrementa la eliminación renal de agua libre). La elección del tratamiento se realiza en base a los siguientes criterios: duración estimada de la causa del SIADH (ejemplo: SIADH idiopático senil crónico, vs SIADH pulmonar en el que hay una recuperación tras resolución de la enfermedad de base) y la capacidad renal para eliminar agua libre mediante la valoración de los factores predictores de ausencia de respuesta a la restricción de líquidos (osmolalidad urinaria > 500 mOsm/kg, índice de Furst > 1, diuresis < 1500 ml/día) o la respuesta a la furosemida (93,95,106). En pacientes con NP, además hay que tener presente que la restricción de líquidos (aporte menor de 0,5-1 litro/día) es prácticamente imposible. De hecho, nuestros pacientes recibieron una mediana total de volumen de 2361,6 [1843,7-2886,5] ml, y un mínimo de aproximadamente un litro y medio. Sin embargo, la reducción del aporte de volumen sí se debe realizar con fin de no empeorar la hiponatremia. Entre los pacientes con SIADH que recibieron tratamiento adecuado, a la amplia mayoría se les incrementó el

sodio en la NP y se les redujo el volumen total de líquidos, mientras que la furosemida y el tolvaptán solo se usaron en un mínimo porcentaje. Ello no concuerda con el análisis de los factores de respuesta a los tratamientos de nuestros SIADH. Solo en un tercio de estos sujetos se preveía una respuesta a la restricción de volumen, mientras que aproximadamente el 70% se habría beneficiado del tratamiento con furosemida. Además, dada la imposibilidad de la realización de una reducción de volumen eficaz para la corrección de la hiponatremia, el tolvaptán también lo consideramos infrutilizado.

Al estudiar globalmente la respuesta del tratamiento administrado para la hiponatremia según la variación de la natremia a las 48-72 horas de su inicio, se alcanzó la eunatremia en aproximadamente dos tercios de los pacientes. Al estratificar por tipo de hiponatremia, tanto en los pacientes con euvolemia, como en los hipovolémicos o hipervolémicos, se obtuvo un incremento significativo de la natremia, sin diferencias al compararlos entre ellos. Tampoco hubo diferencias en la eficacia del tratamiento entre los tres grupos (eunatremia a las 48-72 horas), siendo mayor en la hipovolémica. No realizamos una comparación con el grupo de pacientes hiponatremicos no tratados, al no ser un objetivo del estudio y no tener un protocolo específico de tratamiento. En estos sujetos carecemos de natremia de partida para realizar un análisis adecuado. Por otra parte, encontramos un mayor incremento de natremia, así como un significativo mayor porcentaje de eunatremia en los pacientes que recibieron tratamiento ajustado a su volemia respecto a los que no se les pautó de manera adecuada (70,9% vs 29,1%). En un estudio prospectivo previo de 20 pacientes con hiponatremia y NP, también se observó un incremento significativo de la natremia a las 72 horas de la administración de un tratamiento adecuado, alcanzándose la eunatremia en un porcentaje similar (75%) (152). Estos resultados confirman la importancia de administrar el tratamiento en base al tipo y etiología de la hiponatremia. Para ello es necesario un correcto abordaje diagnóstico de la misma.

Al analizar la eficacia del tratamiento adecuado por tipo de hiponatremia, encontramos resultados dispares. Tanto en los sujetos con hiponatremia hipervolémica como en los de hiponatremia hipovolémica, el porcentaje de eunatremia fue superior en los

pacientes con vs sin tratamiento adecuado, aproximándose a la significación estadística. A pesar de la diferencia marcada de porcentajes (hipovolemia: 90,9% vs 33,3%; hipervolemia: 76,9% vs 33,3%) no se alcanzó la significación estadística probablemente por el bajo número de pacientes analizados en cada grupo (14 en la hipovolémica, 16 en la hipervolémica). Por el contrario, en la hiponatremia euvolémica, el porcentaje que alcanzó la eunatremia fue similar entre los pacientes con y sin tratamiento adecuado.

Dentro del grupo de la hiponatremia euvolémica, para analizar la ausencia de eficacia del tratamiento adecuado, hay que diferenciar los sujetos con SIADH y los que presentan una elevación fisiológica de la AVP. La elevación fisiológica de la AVP provoca un descenso de la natremia transitorio, con duración proporcional a la presencia del estímulo que la genera (95). Por tanto, cabría esperar una elevación de la natremia, independientemente de la administración de tratamiento, y de que éste sea adecuado. De hecho, en nuestro estudio, más de un 85% de los pacientes con hiponatremia asociada a una elevación fisiológica de la AVP alcanzaron la eunatremia, sin diferencias entre los que recibieron o no tratamiento adecuado. Respecto al SIADH, la duración del cuadro es mayor y con frecuencia es crónico. Además, en los pacientes con NP y SIADH existen algunas limitaciones al tratamiento. Entre ellas, la imposibilidad de llevar a cabo una correcta restricción de volumen, como hemos visto previamente. En nuestros pacientes con SIADH, la restricción de volumen fue el tratamiento adecuado pautado con mayor frecuencia. Consecuentemente con ello, sólo se alcanzó la eunatremia en el 42,1%, de los pacientes, sin haber ninguna diferencia entre los pacientes que recibieron o no una terapia adecuada. Por otra parte, al comparar la eficacia del tratamiento adecuado en los pacientes con SIADH frente a los pacientes con hiponatremia hipovolémica-hipervolémica, el porcentaje de eunatremia fue significativamente inferior en los pacientes con SIADH (45% vs 83%). Esto confirma la dificultad del abordaje terapéutico de los pacientes con NP y SIADH, siendo necesaria la valoración de terapias alternativas como la furosemida y los vaptanes.

6. Tercer objetivo secundario: Describir el papel de la hiponatremia en la mortalidad intrahospitalaria y la estancia hospitalaria en pacientes con nutrición parenteral

Mortalidad:

La presencia de hiponatremia está claramente relacionada con un aumento de riesgo de mortalidad (15,30–32,34,58–65,67,69,84). Este incremento de mortalidad no sólo se produce en pacientes con hiponatremia grave, sino también en pacientes con hiponatremia moderada o leve. A nivel hospitalario se han descrito diferentes tasas de mortalidad, probablemente en relación a la heterogeneidad de la definición de hiponatremia, y a la ausencia de clasificación de la clínica neurológica de la misma en la mayoría de los estudios. En líneas generales, se han objetivado tasas de mortalidad de un 19 - 29% en pacientes con hiponatremia grave (natremias < 120-125 mmol/L) (30,181) y de un 3,4 - 11,2% en pacientes hiponatremia leve (natremias < 130-138 mmol/L) (15,32).

Se han formulado varias hipótesis para explicar la influencia de la hiponatremia en el incremento de mortalidad. Algunos autores lo justifican por un efecto directo de la propia hiponatremia (30–32,60,64,84) y otros por la gravedad de la enfermedad subyacente (31,61–63). Sin embargo, la hipótesis más aceptada actualmente es que la hiponatremia puede contribuir indirectamente al aumento de mortalidad, originando una disfunción orgánica, con el consecuente empeoramiento de la enfermedad de base (76,77). Los mecanismos fisiopatológicos aún son desconocidos, pero entre los descritos se encuentran una disminución de la contractilidad cardíaca (78,79), alteración en la función mitocondrial (81), o la inmunosupresión (82).

En pacientes con NP, en el único estudio que ha valorado la morbimortalidad asociada a hiponatremia, se objetivó una tasa de mortalidad significativamente superior en presencia de hiponatremia (23,2%) respecto a la ausencia de la misma (11,8%) (47). Resultados muy similares obtuvimos en nuestra población, de forma que los pacientes con hiponatremia en algún momento de la administración de la NP tuvieron una tasa

de mortalidad (22,5%) significativamente superior a los sujetos normonatrélicos (9,8%). En relación a ello, observamos también valores de natremia significativamente inferiores en el mínimo y en el percentil 25 de las natremias intraindividuales de los pacientes fallecidos frente a los no fallecidos. Esta tendencia se mantuvo en el percentil 50 y 75 de las natremias individuales, no así en la natremia máxima. Ello lo relacionamos a que la aparición de hipernatremia también conlleva un aumento de mortalidad (182). Respecto a la influencia de la persistencia de la hiponatremia en la mortalidad, valoramos la presencia o no de hiponatremia en al menos el 25% de las natremias intraindividuales de cada paciente, así como en al menos el 50% y en al menos el 75% (hiponatremia mantenida). Tras el análisis, únicamente obtuvimos un porcentaje significativamente superior de mortalidad en los pacientes con hiponatremia mantenida (38,5%) respecto a aquellos con menor persistencia de hiponatremia, como son los sujetos con al menos un 25% de sus determinaciones en hiponatremia (23,3%). Similares resultados objetivaron Gómez Hoyos et al: tasa de mortalidad del 42,9% en sujetos con hiponatremia mantenida, vs 20% en aquellos con hiponatremia en al menos el 25% de sus determinaciones (47).

Respecto a la mortalidad en función del tipo de hiponatremia, en nuestro trabajo se objetivó un mayor porcentaje de defunción en pacientes con hiponatremia hipervolémica (41,7%), seguidos de la euvolémica e hipovolémica de porcentaje similar (20,9% y 20% respectivamente). Cuesta et al, en su población de pacientes hospitalizados con hiponatremia, también encontraron que la hiponatremia hipervolémica era el tipo de hiponatremia con mayor riesgo de mortalidad (178). Este hallazgo se explica por la presencia en los sujetos con hiponatremia hipervolémica de mayor comorbilidad, siendo la hiponatremia un marcador de gravedad de su enfermedad de base, consecuencia de una activación extrema del sistema neurohormonal. Por el contrario, en la hiponatremia euvolémica, en concreto en el SIADH, la alteración electrolítica podría contribuir de manera indirecta a la mortalidad a través de mecanismos aún desconocidos, lo cual implica una menor tasa final. Esta hipótesis también la sugiere Cuesta et al, tras los resultados similares de su estudio (178).

Por otra parte, se objetivó de manera independiente un mayor riesgo de mortalidad asociado a hiponatremia. De tal forma que tras un análisis de regresión logística multivariante (ajustado por edad, sexo, comorbilidades previas, presencia de desnutrición grave por VGS, IMC, duración de la NP, complicaciones infecciosas y metabólicas relacionadas con la NP), la presencia de hiponatremia se mantuvo como factor de riesgo independiente de mortalidad, con una OR de 1,83 [IC 95%: 1,03-3,24]. Este mayor riesgo fue sobretodo a expensas de aquellos pacientes con hiponatremia mantenida, que tenían hasta cuatro veces más riesgo de mortalidad respecto al resto (OR de 3,99 [IC 95%: 1,52-10,4]). En los sujetos con menor grado de persistencia de la hiponatremia, se perdió la asociación estadísticamente significativa entre la presencia de hiponatremia y la mortalidad. Estos resultados confirman los ya hallados en el estudio retrospectivo de Gómez Hoyos et al, en el que también sólo se relacionó la hiponatremia mantenida con un mayor riesgo de mortalidad, independientemente de la edad, el sexo, el índice de comorbilidad de Charlson y el IMC, con una OR de 7,38 [IC 95%: 1,07-50,78] (47). Por lo tanto, la hiponatremia la podemos considerar un factor de riesgo independiente de mortalidad, y más aún la hiponatremia mantenida.

Entre el resto de variables que también se asociaron de manera independiente a mayor mortalidad se encuentran: la edad avanzada, la presencia de desnutrición grave por VGS o bajo IMC y el desarrollo de complicaciones metabólicas tras el inicio de la NP. La desnutrición es un factor de riesgo ampliamente conocido de incremento de morbimortalidad. El test de VGS se considera la herramienta más válida de valoración del estado nutricional al ser capaz de asociar de la mejor manera los pacientes desnutridos a un incremento de complicaciones y mortalidad intrahospitalaria, así como a largo plazo (170). De hecho, en el estudio multicéntrico de Oliveira et al. de pacientes no críticos con NP, se concluyó que la VGS era la herramienta de valoración nutricional que mejor predecía la mortalidad intrahospitalaria (comparada con otros tests, el IMC o parámetros bioquímicos como la albúmina o la prealbúmina) (167). Por todo ello elegimos la VGS para el diagnóstico de desnutrición en nuestros pacientes. El aumento significativo e independiente de riesgo de mortalidad obtenido en los sujetos con desnutrición grave respecto al resto (OR 2,32 [IC 95%: 1,25-4,52], era esperable.

Además, da validez a los resultados en relación a la influencia de la hiponatremia en la mortalidad. A parte del test de VGS, en el análisis de regresión logística multivariante, también incluimos el IMC como parámetro complementario de valoración nutricional. Aunque la desnutrición puede aparecer con cualquier cifra de IMC, la presencia de un IMC muy bajo se ha relacionado con mayor morbimortalidad (173,174). Ello también se confirmó en nuestro estudio, ya que el diagnóstico de desnutrición por IMC se asoció de manera independiente con un incremento de riesgo de mortalidad (OR 2,37 [IC 95%: 1,25-4,52]). A pesar que la albúmina se ha asociado a mayor morbimortalidad en pacientes hospitalizados (175,176,183), no se incluyó en el análisis multivariante, principalmente por formar ya parte del test de la VGS. Por otra parte, sus cifras se deben interpretar con cautela ya que albúmina refleja en mayor medida la gravedad de la respuesta inflamatoria que un pobre estado nutricional. Por último, Las complicaciones metabólicas asociadas a la NP también se asociaron de manera significativa a un incremento de riesgo de mortalidad tras el ajuste por el resto de factores. Entre ellas, las de mayor importancia fueron el desarrollo de hiperglucemia, hipopotasemia, hipofosforemia, hipernatremia y uremia.

En resumen, con el presente estudio se ha confirmado una vez más que la presencia de hiponatremia se relaciona con un incremento significativo de riesgo de mortalidad, con el ajuste por otros factores de confusión (incluidos la edad, la desnutrición, comorbilidades, complicaciones de la NP). Además, al haber un muy bajo porcentaje de hiponatremias graves, y al encontrar un mayor riesgo en los sujetos con hiponatremia mantenida, sugerimos que este incremento de mortalidad podría justificarse por la contribución de la propia hiponatremia al empeoramiento de la enfermedad de base y a la disfunción orgánica.

En relación a la disminución de la mortalidad con la corrección de la hiponatremia, no existen estudios aleatorizados que hayan podido demostrarlo. Pero en el trabajo retrospectivo de Waikar et al, se objetivó una atenuación del riesgo de mortalidad en el subgrupo de pacientes en los que se corrigió la hiponatremia (31). Recientemente, en un metanálisis de 15 estudios se objetivó un descenso del riesgo de mortalidad en los pacientes con mejoría de la natremia respecto aquellos sin mejoría, con una OR de

0,57 [IC 95% 0,40-0,81] (83). En nuestro estudio no se analizó esta hipótesis, al no estar protocolizado el tratamiento de la hiponatremia y no disponer de un grupo control sin tratamiento.

Estancia Hospitalaria:

La presencia de hiponatremia se ha relacionado en varios estudios con una mayor estancia hospitalaria (32,67,69,84,85,87), incluyendo a pacientes con NP. En relación a ello, Gómez Hoyos et al. encontraron una estancia hospitalaria significativamente mayor en los que presentaron hiponatremia (33 [23,5-46,7] días) respecto a aquellos con eunatremia (23,5 [15,7-32,2] días) (47). En nuestro trabajo utilizamos la mediana de estancia hospitalaria de 22 días para el análisis de la influencia de la hiponatremia en la misma. De esta forma, los pacientes con hiponatremia tuvieron un porcentaje de estancia hospitalaria mayor de 22 días (61,5%) significativamente superior respecto a los eunatrémicos (41,4%). De igual manera, en el análisis de la mortalidad, al comparar las natremias intraindividuales mínima, máxima y en el percentil 25, 50 y 75 de cada uno de los pacientes, encontramos valores de natremia significativamente inferiores en aquellos con mayor estancia hospitalaria vs menor o igual a 22 días en la natremia mínima y en la del percentil 25. Esta tendencia de los pacientes con mayor estancia hospitalaria a tener una natremia inferior se mantuvo en el percentil 50 y 75, no así en la natremia máxima (como en el análisis de la mortalidad).

Respecto a la persistencia de la hiponatremia, únicamente obtuvimos una significativa mayor estancia hospitalaria en aquellos pacientes con al menos el 25% de sus natremias en rango de hiponatremia. Con mayor grado de persistencia de hiponatremia no se obtuvo una mayor estancia hospitalaria. Aunque los resultados pudieran no ser esperables, en el estudio de Gómez Hoyos et al. se encontraron datos similares, no hallándose una significativa mayor estancia hospitalaria en los sujetos con hiponatremia mantenida, y sí en aquellos con al menos el 25% o el 50% de sus natremias en rango de hiponatremia (47).

En cuanto a la influencia del tipo de hiponatremia, encontramos un significativo mayor porcentaje de estancia hospitalaria superior a 22 días en los pacientes con

hiponatremia hipervolémica (87,5%) respecto a aquellos con euvolemia (58,7%) o hipovolemia (55%). Estos resultados concuerdan con los obtenidos en la valoración de la mortalidad.

Tras un análisis de regresión logística multivariante (ajustado por edad, sexo, comorbilidades previas, desnutrición, duración de la NP, complicaciones infecciosas y metabólicas relacionadas con la NP), la presencia de hiponatremia se siguió relacionando con un incremento significativo de estancia hospitalaria mayor de 22 días, con una OR de 1,83 [IC 95%: 1,15-2,91]. Presentar hiponatremia en al menos el 25% de las determinaciones también permaneció como factor de riesgo de riesgo independiente de mayor estancia hospitalaria.

A parte de la hiponatremia (y la duración de la NP), el desarrollo de complicaciones infecciosas relacionadas con la NP fue el único factor evaluado que también se asoció de manera independiente con una mayor estancia hospitalaria. Otras variables que se han relacionado ampliamente en la literatura con un aumento de morbilidad, como son la edad avanzada o la desnutrición, en nuestro estudio no se asociaron a una significativa mayor estancia hospitalaria. Que no hayamos observado una estancia hospitalaria significativamente mayor en los pacientes desnutridos, probablemente lo podamos justificar al ser la desnutrición un factor de riesgo de hiponatremia, y restar así significación en el análisis multivariante.

Con estos hallazgos podemos concluir que, a diferencia de la mortalidad, presentar solo una cifra en rango de hiponatremia ya implica una mayor estancia hospitalaria, sin ser necesaria la hiponatremia mantenida. Estos resultados ya se han observado en otros estudios de pacientes con NP (47) y en población hospitalaria general (69,84).

7. Fortalezas y limitaciones del estudio

El presente estudio presenta algunas fortalezas y limitaciones que se deben tener en consideración.

Entre las fortalezas destacamos:

- Se trata de un estudio multicéntrico con la participación de 19 centros de ámbito nacional, con la consiguiente consistencia de los resultados.
- Es de carácter prospectivo. La gran mayoría de los estudios previos de hiponatremia son retrospectivos.
- La muestra de pacientes obtenida es amplia y homogénea.
- Se considera un trabajo original, de escasa investigación previa.
- La valoración del tipo y etiología de hiponatremia se realizó en base a un protocolo detallado con todos los datos clínicos necesarios. Esta evaluación de manera prospectiva y multicéntrica no se había realizado previamente.
- En el apartado de la influencia de la hiponatremia en la morbimortalidad se realizaron análisis de regresión logística con inclusión de múltiples factores de confusión (comorbilidades previas, grado de desnutrición, complicaciones relacionadas con la NP, etc.).

Dentro de las limitaciones señalamos:

- Las determinaciones analíticas no se centralizaron. Fueron procesadas en cada uno de los laboratorios de los centros reclutadores. En el caso de la natremia sérica, sí se confirmó el uso del mismo método en todos los hospitales: la potenciometría indirecta con electrodos selectivos. Ello podría provocar pequeñas variaciones de la natremia real, así como del resto de determinaciones. Sin embargo, dada la consistencia de los resultados, no creemos que estas variaciones pudieran modificar nuestras conclusiones.
- Las determinaciones de natremia sérica no fueron protocolizadas. Se recomendaba su solicitud al inicio de la nutrición parenteral (NP) y cada 24-48 horas hasta estabilización clínica, y posteriormente al menos una vez a la

semana. Sin embargo, se priorizó mantener la práctica clínica habitual. Con ello pudimos encontrar diferencias en el número de natremias realizadas en cada paciente en un mismo periodo de tiempo. Ello pudo influir en el cálculo de las natremias intraindividuales y en los análisis posteriores que se hicieron con ellas (sobre todo con morbilidad asociada). Se reflejó además en la valoración de la eficacia del tratamiento de la hiponatremia, perdiéndose varios datos de pacientes a los que no se realizó una natremia sérica antes de las 72 horas post-tratamiento. No obstante, dado el tamaño muestral, no creemos que los resultados finales se hayan visto influenciados por ello de manera significativa.

- La valoración etiológica de la hiponatremia no se realizó en tiempo real. Sin embargo, en el cuaderno de recogida de datos se incluyeron todas las variables necesarias para su evaluación. Por ello consideramos que se realizó una aproximación diagnóstica adecuada en la práctica totalidad de los casos.
- La ausencia de un tratamiento protocolizado impidió valorar con contundencia la eficacia del mismo en la corrección de la natremia. Y al carecer de un grupo control sin tratamiento, no se pudo valorar la influencia del tratamiento en el descenso de mortalidad.

VI. CONCLUSIONES

1. Durante la administración de nutrición parenteral, aproximadamente un tercio de los pacientes presentó hiponatremia. El tipo de hiponatremia más frecuente fue la euvolémica, y la principal etiología el SIADH.
2. Los principales factores de riesgo clásicos de desarrollo de hiponatremia durante la administración de la NP fueron: el sexo femenino, la presencia de náuseas o vómitos y el uso de opiáceos. Por vez primera en la literatura, la desnutrición grave también se identificó como factor de riesgo.
3. El tratamiento adecuado de la hiponatremia, ajustado al tipo y etiología de la misma, se relacionó a una mayor eficacia en la corrección de la hiponatremia, excepto en los pacientes con SIADH.
4. En pacientes con SIADH, el tratamiento adecuado más frecuente fue el incremento de sodio en la nutrición parenteral junto a una restricción de líquidos. Sin embargo, la restricción correcta (aporte menor de 1 litro al día) no fue factible en pacientes con nutrición parenteral. Por ello se deben tener en cuenta otras alternativas terapéuticas poco utilizadas en la actualidad, como la furosemida o el tolvaptán.
5. La presencia de hiponatremia en pacientes con nutrición parenteral, sobretodo a expensas de la hiponatremia mantenida (al menos el 75% de todas las natremias inferiores a 135 mmol/L) se asoció significativamente a una mayor mortalidad, independientemente de la edad, sexo, comorbilidades previas, desnutrición, duración de la nutrición parenteral y complicaciones metabólicas e infecciosas relacionadas con la administración de la nutrición parenteral.
6. La presencia de hiponatremia en pacientes con nutrición parenteral se asoció de forma significativa a una mayor estancia hospitalaria, independientemente de la edad, sexo, comorbilidades previas, desnutrición, duración de la nutrición parenteral y complicaciones metabólicas e infecciosas relacionadas con la administración de la nutrición parenteral.

VII. BIBLIOGRAFÍA

1. Guyton AC, Hall JE. Tratado de fisiología médica. 12.^a ed. S.A. Elsevier España; 2011.
2. Verbalis JG. Disorders of body water homeostasis. *Best Pract Res Clin Endocrinol Metab.* diciembre de 2003;17(4):471-503.
3. Alcázar A, Tejedor A, Quereda A. Fisiopatología de las hiponatremias. Diagnóstico diferencial. Tratamiento. *Nefrología.* 2011;2(6):3-14.
4. Berl T. Impact of solute intake on urine flow and water excretion. *J Am Soc Nephrol.* 2008;19(6):1076-8.
5. Halperin ML, Kamel KS, Goldstein MB. Fluid, electrolyte, and acid-base physiology. A problem-based approach. 4th ed. Philadelphia: Saunders; 2010. 314-363 p.
6. Kronenberg HM, Melmed S, Polonsky KS and Larsen. Williams tratado de Endocrinología. 11^a Edición. Elsevier Saunders; 2009.
7. Kovács KJ, Földes A, Sawchenko PE. Glucocorticoid negative feedback selectively targets vasopressin transcription in parvocellular neurosecretory neurons. *J Neurosci Off J Soc Neurosci.* 15 de mayo de 2000;20(10):3843-52.
8. Aguilera G, Liu Y. The molecular physiology of CRH neurons. *Front Neuroendocrinol.* 2012;33(1):67-84.
9. Zingg H, Lefebvre D, Almazan G. Regulation of vasopressin gene expression in rat hypothalamic neurons. Response to osmotic stimulation. *J Biol Chem.* 1986;261(28):12956-9.
10. Robertson GL. Regulation of arginine vasopressin in the syndrome of inappropriate antidiuresis. *Am J Med.* 2006;119(7):S36–S42.
11. Robinson AG. Disorders of antidiuretic hormone secretion. *Clin Endocrinol Metab.* 1985;14(1):55–88.
12. Bourque CW, Oliet SH. Osmoreceptors in the central nervous system. *Annu Rev Physiol.* 1997;59:601-19.
13. Hebert SC, Culpepper RM, Andreoli TE. NaCl transport in mouse medullary thick ascending limbs. ADH enhancement of transcellular NaCl cotransport; origin of transepithelial voltage. *Am J Physiol.* 1981;241(4):F432-42.
14. Nielsen S, Fror J, Knepper MA. Renal aquaporins: key roles in water balance and water balance disorders. *Curr Opin Nephrol Hypertens.* 1998;7(5):509–516.
15. Anderson RJ, Chung HM, Kluge R, Schrier RW. Hyponatremia: a prospective analysis of its epidemiology and the pathogenetic role of vasopressin. *Ann Intern Med.* 1985;102(2):164-8.
16. Robertson GL. The regulation of vasopressin function in health and disease. *Recent Prog Horm Res.* 1976;33:333-85.
17. Zhang Z, Bourque CW. Amplification of transducer gain by angiotensin II-mediated enhancement of cortical actin density in osmosensory neurons. *J Neurosci.* 2008;28(38):9536-44.
18. Robertson GL, Athar S. The interaction of blood osmolality and blood volume in regulating plasma vasopressin in man. *J Clin Endocrinol Metab.* 1976;42(4):613-20.
19. Rowe JW, Shelton RL, Helderman JH, Vestal RE, Robertson GL. Influence of the

- emetic reflex on vasopressin release in man. *Kidney Int.* 1979;16(6):729-35.
20. Robertson GL, Aycinena P, Zerbe RL. Neurogenic disorders of osmoregulation. *Am J Med.* 1982;72(2):339-53.
 21. Manoogian C, Pandian M, Ehrlich L, Fisher D, Horton R. Plasma atrial natriuretic hormone levels in patients with the syndrome of inappropriate antidiuretic hormone secretion. *J Clin Endocrinol Metab.* 1998;67(3):571-5.
 22. Fichman MP, Michelakis AM, Horton R. Regulation of aldosterone secretion in the syndrome of inappropriate antidiuretic hormone secretion (SIADH). *J Clin Endocrinol Metab.* 1974;39(1):136-44.
 23. Hoorn EJ, Zietse R. Hyponatremia revisited: translating physiology to practice. *Nephron Physiol.* 2008;108(3):p46-59.
 24. Fenske WK, Christ-Crain M, Horning A, Simet J, Szinnai G, Fassnacht M, et al. A copeptin-based classification of the osmoregulatory defects in the syndrome of inappropriate antidiuresis. *J Am Soc Nephrol.* 2014;25(10):2376-83.
 25. Adroque HJ, Madias NE. Hyponatremia. *N Engl J Med.* 2000;342(21):1581-9.
 26. Gankam-Kengne F, Ayers C, Khera A, de Lemos J, Maalouf NM. Mild hyponatremia is associated with an increased risk of death in an ambulatory setting. *Kidney Int.* 2013;83(4):700-6.
 27. Hawkins RC. Age and gender as risk factors for hyponatremia and hypernatremia. *Clin Chim Acta.* 2003;337(1-2):169-72.
 28. Sajadieh A, Binici Z, Mouridsen MR, Nielsen OW, Hansen JF, Haugaard SB. Mild Hyponatremia Carries a Poor Prognosis in Community Subjects. *Am J Med.* julio de 2009;122(7):679-86.
 29. Owen JA, Campbell DG. A comparison of plasma electrolyte and urea values in healthy persons and in hospital patients. *Clin Chim Acta.* 1968;22(4):611-8.
 30. Hoorn EJ, Lindemans J, Zietse R. Development of severe hyponatremia in hospitalized patients: treatment-related risk factors and inadequate management. *Nephrol Dial Transplant.* 2006;21(1):70-6.
 31. Waikar SS, Mount DB, Curhan GC. Mortality after hospitalization with mild, moderate, and severe hyponatremia. *Am J Med.* 2009;122(9):857-65.
 32. Wald R, Jaber BL, Price LL, Upadhyay A, Madias NE. Impact of hospital-associated hyponatremia on selected outcomes. *Arch Intern Med.* 2010;170(3):294-302.
 33. Upadhyay A, Jaber BL, Macias NE. Incidence and prevalence of hiponatremia. *Am J Med.* 2006;119(7 Suppl 1):S30-5.
 34. Corona G, Giuliani C, Parenti G, Norello D, Verbalis JG, Forti G, et al. Moderate hyponatremia is associated with increased risk of mortality: evidence from a meta-analysis. Alisi A, editor. *PLoS One.* 2013;8(12):e80451.
 35. Gheorghiade M, Rossi JS, Cotts W, Shin DD, Hellkamp AS, Piña IL, et al. Characterization and prognostic value of persistent hyponatremia in patients with severe heart failure in the ESCAPE Trial. *Arch Intern Med.* 2007;167(18):1998-2005.
 36. Angeli P, Wong G, Watson H, Ginès P; CAPPS Investigators. Hyponatremia in cirrhosis: Results of a patient population survey. *Hepatology.* 2006;44(6):1535-42.

37. Doshi SM, Shah P, Lei X, Lahoti A, Salahudeen AK. Hyponatremia in hospitalized cancer patients and its impact on clinical outcomes. *Am J Kidney Dis.* 2012;59(2):222-8.
38. Sherlock M, O'Sullivan, Agha A, Behan LA, Rawluk D, Brennan P, et al. The incidence and pathophysiology of hyponatremia after subarachnoid hemorrhage. *Clinical Endocrinol (Oxf).* 2006;64(3):250-4.
39. Wijdicks EF, Vermeulen M, Hijdra A, Van Gijn J. Hyponatremia and cerebral infarction in patients with ruptured intracranial aneurysms: Is fluid restriction harmful? *Ann Neurol.* 1985;17(2):137-40.
40. Agha A, Sherlock M, Phillips J, Tormey W, Thompson CJ. The natural history of post-traumatic neurohypophysial dysfunction. *Eur J Endocrinol.* 2005;152(3):371-7.
41. Moro N, Katayama Y, Iragashi T, Mori T, Kawamata T, Kojima J. Hyponatremia in patients with traumatic brain injury: incidence mechanism, and response to sodium supplementation or retention therapy with hydrocortisone. *Surg Neurol.* 2007;68(4):387-93.
42. Brouwer MC, Van de Beek D, Heckenberg SG, Spanjaard L, de Gans J. Hyponatremia in adults with community-acquired bacterial meningitis. *QJM.* 2007;100(1):37-40.
43. Anderson NE, Somaratne J, Mason DF, Holland D, Thomas MG. Neurological and systemic complications of tuberculous meningitis and its treatment at Auckland City Hospital, New Zealand. *J Clin Neurosci.* 2010;17(9):1114-8.
44. Rahman M, Friedman WA. Hyponatremia in neurosurgical patients: clinical guidelines development. *Neurosurgery.* 2009;65(5):925-35.
45. Nair V, Niederman MS, Masani N, Fishbane S. Hyponatremia in community-acquired pneumonia. *Am J Nephrol.* 2007;27(2):184-90.
46. Winther JA, Brynildsen J, Høiseth AD, Følling I, Brekke PH, Christensen G, et al. Prevalence and prognostic significance of hyponatremia in patients with acute exacerbation of chronic obstructive pulmonary disease: data from the Akershus Cardiac Examination (ACE) 2 study. *PLoS One.* 2016;11(8):e0161232.
47. Gómez E, Cuesta M, Del Prado N, Matía P, Pérez N, De Luis DA, et al. Prevalence of hyponatremia and associated morbimortality in hospitalized patients receiving parenteral nutrition. *Ann Nutr Metab.* In press.
48. Grikinienė J, Volbekas V, Stakisaitis D. Gender differences of sodium metabolism in hyponatremia as an adverse drug effect. *Medicina (Kaunas).* 2004;40(10):935-42.
49. Ayus JC, Wheeler JM, Arieff AI. Postoperative hyponatremic encephalopathy in menstrual women. *Ann Intern Med.* 1992;117(11):891-7.
50. Cowen LE, Hodak Sp, Verbalis JG. Age-associated abnormalities of water homeostasis. *Endocrinol Metab Clin North Am.* 2013;42(2):349-70.
51. Lindner G, Pfortmüller CA, Leichtle AB, Fiedler GM, Exadaktylos AK. Age-related variety in electrolyte levels and prevalence of dysnatremias and dyskalemias in patients presenting to the emergency department. *Gerontology.* 2014;60(5):420-3.
52. Tejedor A, Alexandru S, Tejedor Bravo M. Hiponatremia postquirúrgica. *Nefrología.* 2011;2(6):35-47.

53. Chung HM, Kluge R, Schrier RW, Anderson RJ. Postoperative hyponatremia. A prospective study. *Arch Intern Med.* 1986;146(2):333-6.
54. Liamis G, Millionis H, Elisaf M. A review of drugs-induced hyponatremia. *Am J Kidney Dis.* 2008;52(1):144-53.
55. Moritz ML, Ayus JC. Hospital-acquired hyponatremia - why are hypotonic parenteral fluids still being used? *Nat Clin Pract Nephrol.* 2007;3(8):374-82.
56. Foster BA, Tom D, Hill V. Hypotonic versus isotonic fluids in hospitalized children: a systematic review and meta-analysis. *J Pediatr.* 2014;165(1):163-9.
57. Swart RM, Hoorn EJ, Betjes MG, Zietse R. Hyponatremia and inflammation: the emerging role of interleukin-6 in osmoregulation. *Nephron Physiol.* 2011;118(2):45-51.
58. Tierney WM, Martin DK, Greenlee MC, Zerbe RL, McDonald CJ. The prognosis of hyponatremia at hospital admission. *J Gen Intern Med.* 1986;1(6):380-5.
59. Natkunam A, Shek CC, Swaminathan R. Hyponatremia in a hospital population. *J Med.* 1991;22(2):83-96.
60. Nzerue CM, Baffoe-Bonnie H, You W, Falana B, Dai S. Predictors of outcome in hospitalized patients with severe hyponatremia. *J Natl Med Assoc.* 2003;95(5):335.
61. Clayton JA, Le Jeune IR, Hall IP. Severe hyponatremia in medical in-patients: aetiology, assessment and outcome. *QJM.* 2006;99(8):505-11.
62. Gill G, Huda B, Boyd A, Skagen K, Wile D, Watson I, et al. Characteristics and mortality of severe hyponatremia - a hospital based study. *Clinical Endocrinol (Oxf).* 2006;65(2):246-9.
63. Chawla A, Sterns RH, Nigwekar SU, Cappuccio JD. Mortality and serum sodium: do Patients die from or with hyponatremia? *Clin J Am Soc Nephrol.* 2011;6(5):960-5.
64. Arieff AI. Hyponatremia, convulsions, respiratory arrest, and permanent brain damage after elective surgery in healthy women. *N Engl J Med.* 1986;314(24):1529-35.
65. Fraser CL, Arieff AI. Epidemiology, pathophysiology, and management of hyponatremic encephalopathy. *Am J Med.* 1997;102(1):67-77.
66. Koenig MA, Bryan M, Lewin JL, Mirski MA, Geocadin RG, Stevens RD. Reversal of transtentorial herniation with hypertonic saline. *Neurology.* 2008;70(13):1023-9.
67. Balling L, Gustafsson F, Goetze JP, Dalsgaard M, Nielsen H, Boesgaard S, et al. Hyponatremia at hospital admission is a predictor of overall mortality. *Intern Med J.* 2015;45(2):195-202.
68. Leung AA, McAlister FA, Rogers SO, Pazo V, Wright A, Bates DW. Preoperative hyponatremia and perioperative complications. *Arch Intern Med.* 2012;172(19):1474-81.
69. Tzoulis P, Bagkeris E, Bouloux PM. A case-control study of hyponatraemia as an independent risk factor for inpatient mortality. *Clin Endocrinol (Oxf).* 2014;81(3):401-7.
70. Gheorghiade M, Abraham WT, Albert NM, Gattis W, Greenberg BH, O'Connor CM, et al. Relationship between admission serum sodium concentration and clinical outcomes in patients hospitalized for heart failure: an analysis from the OPTIMIZE-HF registry. *Eur Heart J.* 2007;28(8):908-88.

71. Bettari L, Fiuzat M, Shaw LK, Wojdyla DM, Metra M, Felker GM, et al. Hyponatremia and long-term outcomes in chronic heart failure - an observational study from the Duke Databank for Cardiovascular Diseases. *J Card Fail.* 2012;18(1):74-81.
72. Gines P, Berl T, Bernardi M, Bichet DG, Hamon G, Jiménez W, et al. Hyponatremia in cirrhosis: from pathogenesis to treatment. *Hepatology.* 1998;28(3):851-64.
73. Rodrigues B, Staff I, Fortunato G, McCullough LD. Hyponatremia in the prognosis of acute ischemic stroke. *J Stroke Cerebrovasc Dis.* 2014;23(5):850-4.
74. Carcel C, Sato S, Zheng D, Heeley E, Arima H, Yang J, et al. Prognostic significance of hyponatremia in acute intracerebral hemorrhage: pooled analysis of the intensive blood pressure reduction in acute cerebral hemorrhage trial studies. *Crit Care Med.* 2016;44(7):1388-94.
75. Lim WS, Lewis S, Macfarlane JT. Severity prediction rules in community acquired pneumonia: a validation study. *Thorax.* 2000;55(3):219-23.
76. Hoorn EJ, Zietse R. Hyponatremia and Mortality: How Innocent is the Bystander? *Clin J Am Soc Nephrol.* 2011;6(5):951-3.
77. Hoorn EJ, Zietse R. Hyponatremia and Mortality: moving beyond associations. *Am J Kidney Dis.* 2013;62(1):139-49.
78. Movafagh S, Cleemann L, Morad M. Regulation of cardiac Ca(2+) channel by extracellular Na(+). *Cell Calcium.* 2011;49(3):162-173.
79. Barsony J, Manigrasso MB, Xu Q, Tam H, Verbalis JG. Chronic hyponatremia exacerbates multiple manifestations of senescence in male rats. *Age (Dordr).* 2013;35(2):271-88.
80. Schrier RW, Sharma S, Shchekochikhin D. Hyponatraemia: more than just a marker of disease severity? *Nat Rev Nephrol.* 2013;9(1):37-50.
81. Fujisawa H, Sugimura Y, Takagi H, Mizoguchi H, Takeuchi H, Izumida H, et al. Chronic hyponatremia causes neurologic and psychologic impairments. *J Am Soc Nephrol.* 2016;27(3):766-80.
82. Chassin C, Hornef MW, Bens M, Lotz M, Goujon JM, Vimont S, et al. Hormonal control of the renal immune response and antibacterial host defense by arginine vasopressin. *J Exp Med.* 2007;204(12):2837-52.
83. Corona G, Giuliani C, Verbalis JG, Forti G, Maggi M, Peri A. Hyponatremia improvement is associated with a reduced risk of mortality: evidence from a meta-analysis. *PLoS One.* 2015;10(4):e0124105.
84. Zilberberg M, Exuzides A, Spalding J, Foreman A, Jones A, Colby C, et al. Epidemiology, clinical and economic outcomes of admission hyponatremia among hospitalized patients. *Curr Med Res Opin.* 2008;24(6):1601-8.
85. Amin A, Deitelzweig S, Christian R, Friend K, Lin J, Belk K, et al. Evaluation of incremental healthcare resource burden and readmission rates associated with hospitalized hyponatremic patients in the US. *J Hosp Med.* 2012;7(8):634-9.
86. Callahan MA, Do HT, Caplan DW, Yoon-Flannery K. Economic impact of hyponatremia in hospitalized patients: a retrospective cohort study. *Postgrad Med.* 2009;121(2):186-91.

87. Corona G, Giuliani C, Parenti G, Colombo GL, Sforza A, Maggi M, et al. The economic burden of hyponatremia: systematic review and meta-analysis. *Am J Med.* 2016;129(8):823-35.
88. Verbalis JG. Adaptation to acute and chronic hyponatremia: implications for symptomatology, diagnosis, and therapy. *Semin Nephrol.* 1998;18(1):3-19.
89. Renneboog B, Musch W, Vandemergel X, Manto MU, Decaux G. Mild chronic hyponatremia is associated with falls, unsteadiness, and attention deficits. *Am J Med.* 2006;119(1):71.
90. Verbalis JG, Barsony J, Sugimura Y, Tian Y, Adams DJ, Carter EA, et al. Hyponatremia-induced osteoporosis. *J Bone Miner Res.* 2010;25(3):554-63.
91. Upala S, Sanguankee A. Association between hyponatremia, osteoporosis, and fracture: a systematic review and meta-analysis. *J Clin Endocrinol Metab.* 2016;101(4):1880-6.
92. Hoorn EJ, Rivadeneira F, van Meurs JB, Ziere G, Stricker BH, Hofman A, et al. Mild hyponatremia as a risk factor for fractures: The Rotterdam Study. *J Bone Miner Res.* 2011;26(8):1822-8.
93. Verbalis J, Goldsmith S, Greenberg A, Korzelius C, Schrier R, Sterns R et al. Diagnosis, evaluation, and treatment of hyponatremia: expert panel recommendations. *Am J Med.* 2013;126(10 Suppl 1):S1-42.
94. Hillier TA, Abbot RD, Barrett EJ. Hyponatremia: evaluating the correction factor for hyperglycemia. *Am J Med.* 1999;106(4):399-403.
95. Runkle I, Gomez-Hoyos E, Cuesta-Hernández M, Chafer-Vilaplana J, de Miguel P. Hyponatraemia in older patients: a clinical and practical approach. *Rev Clin Gerontol.* 2015;25(1):31-52.
96. Verbalis J. Whole-Body Volume Regulation and escape from Antidiuresis. *Am J Med.* 2006;7(A):S21-S29.
97. Kim GH, Lee JW, Oh YK, Chang HR, Joo KW, Na KY, et al. Antidiuretic effect of hydrochlorothiazide in lithium-induced nephrogenic diabetes insipidus is associated with upregulation of aquaporin-2, Na-Cl co-transporter, and epithelial sodium channel. *J Am Soc Nephrol.* 2004;15(11):2836-43.
98. Leung AA, Wright A, Pazo V, Karson A, Bates DW. Risk of thiazide-induced hyponatremia in patients with hypertension. *Am J Med.* 2011;124(11):1064-72.
99. Sonnenblick M, Friedlander Y, Rosin AJ. Diuretic-induced severe hyponatremia. Review and analysis of 129 reported patients. *Chest.* 1993;103(2):601-6.
100. Sharabi Y, Illan R, Kamari Y, Cohen H, Nadler M, Messerli FH, et al. Diuretic induced hyponatraemia in elderly hypertensive women. *J Hum Hypertens.* 2002;16(9):631-5.
101. Haas CS, Pohlenz I, Lindner U, Muck PM, Arand J, Suefke S, et al. Renal tubular acidosis type IV in hyperkalaemic patients - a fairy tale or reality? *Clin Endocrinol (Oxf).* 2013;78(5):706-11.
102. Choi MJ, Ziyadeh FN. The utility of the transtubular potassium gradient in the evaluation of hyperkalemia. *J Am Soc Nephrol.* 2008;19(3):424-6.

103. Hannon MJ, Behan LA, O'Brien MM, Tormey W, Ball SG, Javadpour M, et al. Hyponatremia following mild/moderate subarachnoid hemorrhage is due to SIAD and glucocorticoid deficiency and not cerebral salt wasting. *J Clin Endocrinol Metab*. 2014;99(1):291-8.
104. Sands JM, Layton HE. The physiology of urine concentration: an update. *Semin Nephrol*. 2009;29(3):178-95.
105. Janicic N, Verbalis JG. Evaluation and management of hypo-osmolality in hospitalized patients. *Endocrinol Metab Clin North Am*. 2003;23(2):459-81.
106. Runkle I, Villabona C, Navarro A, Pose A, Formiga F, Tejedor A, et al. Tratamiento de la hiponatremia secundaria al síndrome de secreción inadecuada de la hormona antidiurética: algoritmo multidisciplinar. *Nefrología*. 2014;34(4):439-50.
107. Suzuki H, Kawasaki M, Ohnishi H, Otsubo H, Ohbuchi T, Katoh A, et al. Exaggerated response of a vasopressin-enhanced green fluorescent protein transgene to nociceptive stimulation in the rat. *J Neurosci*. 2009;29(42):13182-9.
108. Cuesta M, Garrahy A, Slattery D, Gupta S, Hannon AM, Forde H, et al. The contribution of undiagnosed adrenal insufficiency to euvolaemic hyponatraemia: results of a large prospective single-centre study. *Clin Endocrinol (Oxf)*. 2016;85(6):836-44.
109. Hannon MJ, Finucane FM, Sherlock M, Agha A, Thompson CJ. Clinical review: disorders of water homeostasis in neurosurgical patients. *J Clin Endocrinol Metab*. 2012;97(5):1423-33.
110. Hwang KS, Kim GH. Thiazide-induced hyponatremia. *Electrolyte Blood Press*. 2010;8(1):51-7.
111. Greenberg A, Verbalis JG, Amin AN, Burst VR, Chiodo JA, Chiong JR, et al. Current treatment practice and outcomes. Report of the hyponatremia registry. *Kidney Int*. 2015;88(1):167-77.
112. Cuesta M, Gupta S, Yunus S, Tormey W, Thompson C. Análisis prospectivo de las etiologías implicadas en el síndrome de secreción inapropiada de ADH (SIADH) en un hospital terciario de Dublin, Irlanda. 57º Congr Soc Esp Endocrino. mayo de 2015;Poster N° 178.
113. Bartter FC, Schwartz WB. The syndrome of inappropriate secretion of antidiuretic hormone. *Am J Med*. 1967;42(5):790-806.
114. Powlson AS, Challis BG, Halsall DJ, Schonmakers E, Gurnell M. Nephrogenic syndrome of inappropriate antidiuresis secondary to an activating mutation in the arginine vasopressin receptor AVPR2. *Clin Endocrinol (Oxf)*. 2016;85(2):306-12.
115. Shafiee MA, Charest AF, Cheema-Dhadli S, Glick DN, Napolova O, Roozbeh J, et al. Defining conditions that lead to the retention of water: the importance of the arterial sodium concentration. *Kidney Int*. 2005;67(2):613-21.
116. Chinitz A, Turner FL. The association of primary hypothyroidism and inappropriate secretion of the antidiuretic hormone. *Arch Intern Med*. 1965;116(6):871-4.
117. Liamis G, Filippatos TD, Lontos A, Elisaf MS. Management of endocrine disease: hypothyroidism-associated hyponatremia: mechanisms, implications and treatment. *Eur J Endocrinol*. 2017;176(1):R15-20.

118. Warner MH, Holding S, Kilpatrick ES. The effect of newly diagnosed hypothyroidism on serum sodium concentrations: a retrospective study. *Clin Endocrinol (Oxf)*. 2006;64(5):598-9.
119. Szatalowicz VL, Arnold PE, Chaimovitz C, Bichet D, Berl T, Schrier RW. Radioimmunoassay of plasma arginine vasopressin in hyponatremic patients with congestive heart failure. *N Engl J Med*. 1981;305(5):263-6.
120. Schrier RW, Arroyo V, Bernardi M, Epstein M, Henriksen JH, Rodés J. Peripheral arterial vasodilation hypothesis: a proposal for the initiation of renal sodium water retention in cirrhosis. *Hepatology*. 1988;8(5):1151-7.
121. Sterns RH, Nigwekar SU, Hix JK. The treatment of hyponatremia. 2009;29(3):282-99.
122. Schrier RW, Bansal S. Diagnosis and management of hyponatremia in acute illness. *Curr Opin Crit Care*. 2008;14(6):627-34.
123. Lien YH, Shapiro JJ, Chan L. Study of brain electrolytes and osmolytes during correction of chronic hyponatremia. Implications for the pathogenesis of central pontine myelinolysis. *J Clin Invest*. 1991;88(1):303-9.
124. Baker EA, Tian Y, Adler S, Verbalis JG. Blood-brain barrier disruption and complement activation in the brain following rapid correction of chronic hyponatremia. *Exp Neurol*. 2000;165(2):221-30.
125. Lien YH. Role of organic osmolytes in myelinolysis, a topographic study in rats after rapid correction of hyponatremia. *J Clin Invest*. 1995;95(4):1579-86.
126. Sterns RH, Cappuccio JD, Silver SM, Cohen EP. Neurologic sequelae after treatment of severe hyponatremia: a multicenter perspective. *J Am Soc Nephrol*. 1994;4(8):1522-30.
127. Graff-Radford J, Fugate JE, Kaufmann TJ, Mandrekar JN, Rabinstein AA. Clinical and radiologic correlations of central pontine myelinolysis syndrome. *Mayo Clin Proc*. 2011;86(11):1063-7.
128. Gankam Kengne F, Soupart A, Pochet R, Brion JP, Decaux G. Re-induction of hyponatremia after rapid overcorrection of hyponatremia reduces mortality in rats. *Kidney Int*. 2009;76(6):614-21.
129. Ball S, Barth J, Levy M, the Society for Endocrinology Clinical Committee. Society for Endocrinology Endocrine Emergency Guidance: Emergency management of severe symptomatic hyponatraemia in adult patients. *Endocr Connect*. 2016;5(5):G4-6.
130. Huang EA, Feldman BJ, Schwartz ID, Geller DH, Rosenthal SM, Gitelman SE. Oral urea for the treatment of chronic syndrome of inappropriate antidiuresis in children. *J Pediatr*. 2006;148(1):128-31.
131. Gómez Hoyos E, Cuesta Hernández M, Ruíz Gracia T, de Miguel Novoa MP, Molino González A, Díaz Pérez JA et al. Manejo diagnóstico y terapéutico de la hiponatremia (HN) por el Síndrome de secreción inadecuada de ADH (SIADH) por el Servicio de Endocrinología y Nutrición (EN) del Hospital Clínico San Carlos. *Endocrinol Nutr*. 2013;60(Especial Congreso SEEN 2013):32.
132. Furst H, Hallows KR, Post J, Chen S, Kotzker W & Goldfarb S. The Urine/Plasma Electrolyte Ratio: A Predictive Guide to Water Restriction. *Am J Med Sci*.

2000;319(4):240-4.

133. Cuesta M, Ortolá A, Garrahy A, Calle Pascual AL, Runkle I, Thompson CJ. Predictors of failure to respond to fluid restriction in SIAD in clinical practice; time to re-evaluate clinical guidelines? QJM. 2017;

134. Decaux G, Andres C, Gankam Kengne, Soupart A. Treatment of euvolemic hyponatremia in the intensive care unit by urea. Crit Care. 2010;14(5):R184.

135. Soupart A, Coffernils M, Couturier B, Gankam-Kengne F, Decaux G. Efficacy and tolerance of urea compared with vaptans for long-term treatment of patients with SIADH. Clin J Am Soc Nephrol. 2012;7(5):742-7.

136. Vandergheynst F, Brachet C, Heinrichs C, Decaux G. Long-term treatment of hyponatremic patients with nephrogenic syndrome of inappropriate antidiuresis: personal experience and review of published case reports. Nephron Clin Pract. 2012;120(3):c168-72.

137. Decaux G. Treatment of the syndrome of inappropriate secretion of antidiuretic hormone by long loop diuretics. Nephron. 1983;35(2):82-8.

138. Decaux G, Waterlot Y, Genette F, Hallemans R, Demanet JC. Inappropriate secretion of antidiuretic hormone treated with furosemide. Br Med J (Clin Res Ed). 1982;285(6335):89-90.

139. Verbalis JG, Zeltser D, Smith N, Barve A, Andoh M. Assessment of the efficacy and safety of intravenous conivaptan in patients with euvolaemic hyponatraemia: subgroup analysis of a randomized, controlled study. Clin Endocrinol (Oxf). 2008;69(1):159-68.

140. Naidech AM, Paparello J, Liebling SM, Bassin SL, Levasseur K, Alberts MJ, et al. Use of conivaptan (Vaprisol) for hyponatremic neuro-ICU patients. Neurocrit Care. 2010;13(1):57-61.

141. Berl T, Quittnat-Pelletier F, Verbalis JG, Schrier RW, Bichet DG; SALTWATER Investigators. Oral tolvaptan is safe and effective in chronic hyponatremia. J Am Soc Nephrol. 2010;21(4):705-12.

142. Runkle I, Gomez Hoyos E, Recio Blázquez L, Cuesta Hernández M, De Miguel Novoa MP, Ruiz Gracia T, et al. Experiencia con una dosis inicial de 7,5 mg de tolvaptan en el tratamiento de la hiponatremia secundaria al SIADH. Abstrac 56 Congr SEENValencia Mayo 2014.

143. Amengual A, Ortolá A, Crespo I, Penso R, Ruiz T, Gómez E, et al. The use of a specific protocol for initiation of tolvaptan therapy in mild/moderate euvolemic hyponatremia secondary to SIADH: not a single case of overcorrection. Endocr Abstr 18th Eur Congr Endocrinol. 2016;41:E-Poster 754.

144. Canuso CM, Goldman MB. Clozapine restores water balance in schizophrenic patients with polydipsia-hyponatremia syndrome. J Neuropsychiatry Clin Neurosci. 1999;11(1):86-90.

145. Rogers IR, Hook G, Stuempfle KJ, Hoffman MD, Hew-Butler T. An intervention study of oral versus intravenous hypertonic saline administration in ultramarathon runners with exercise-associated hyponatremia: a preliminary randomized trial. Clin J Sport Med. 2011;21(3):200-3.

146. Kearney MT, Fox KA, Lee AJ, Prescott RJ, Shah AM, Batin PD, et al. Predicting death due to progressive heart failure in patients with mild-to-moderate chronic heart failure. *J Am Coll Cardiol.* 2002;40(10):1801-8.
147. O'Donnell M, Mente A, Rangarajan S, McQueen MJ, Wang X, PURE Investigators. Urinary sodium and potassium excretion, mortality, and cardiovascular events. *N Engl J Med.* 2014;371(7):612-23.
148. Licata G, Di Pasquale P, Parrinello G, Cardinale A, Scandurra A, Follone G, et al. Effects of high-dose furosemide and small-volume hypertonic saline solution infusion in comparison with a high dose of furosemide as bolus in refractory congestive heart failure: long-term effects. *Am Heart J.* 2003;145(3):459-66.
149. Hauptman PJ, Burnett J, Gherghiade M, Grinfeld L, Konstam MA, Kostic D, et al. Clinical course of patients with hyponatremia and decompensated systolic heart failure and the effect of vasopressin receptor antagonism with tolvaptan. *J Card Fail.* 2013;19(6):390-7.
150. Yan L, Xie F, Lu J, Ni Q, Shi C, Tang C, et al. The treatment of vasopressin V2-receptor antagonists in cirrhosis patients with ascites: a meta-analysis of randomized controlled trials. *BMC Gastroenterol.* 2015;15:65.
151. Whitmire SJ. Nutrition-focused evaluation and management of dysnatremias. *Nutr Clin Pract.* 2008;23(2):108-21.
152. Gómez Hoyos E, Cuesta Hernández M, Fernández Capel F, Ruiz Gracia T, Martín Matía P, Rubio Herrera MA et al. Diagnosis and Management of Patients presenting Hyponatremia while receiving parenteral nutrition. *Endocr Abstr Th Eur Congr Endocrinol.* 2013;32:Abstrac n°457.
153. Singer P, Berger MM, Van den Berghe G, Biolo G, Calder P, Forbes A, et al. ESPEN Guidelines on Parenteral Nutrition: intensive care. *Clin Nutr.* 2009;28(4):387-400.
154. Oliveira G, González-Molero I. Manual de Nutrición Clínica y Dietética. Díaz de Santos; 2007. 233-255 p.
155. Herranz S, Alvarez V, Blasco M, García MDC, Gimeno MDC. Nutritional support with parenteral nutrition. course and associated complications. *Endocrinol Nutr.* 2013;60(6):287-93.
156. American Society for Parenteral and Enteral Nutrition (A.S.P.E.N.) Board of Directors. Clinical Guidelines for the Use of Parenteral and Enteral Nutrition in Adult and Pediatric Patients. *JPEN J Parenter Enteral Nutr.* 2009;33(3):255-9.
157. Shafiee MA, Bohn, D, Hoorn EJ, Halperin ML. How to select optimal maintenance intravenous fluid therapy. *QJM.* 2003;96(8):601-10.
158. Gil MJ, Franch G, Guirao X, Oliva A, Herms R, Salas E, et al. Response of severely malnourished patients to preoperative parenteral nutrition: a randomized clinical trial of water and sodium restriction. *Nutrition.* 1997;13(1):26-31.
159. Gomis Muñoz P. Tratado de Nutrición. Vol. Tomo IV. Acción Médica; 2006. 173-204 p.
160. Bonet A, Grau T. Estudio multicéntrico de incidencia de las complicaciones de la nutrición parenteral total en el paciente grave. Estudio ICOMEP 1ª parte. *Nutri Hosp.*

2005;20(4):268-77.

161. O'Grady NP, Alexander M, Dellinger EP, Gerberding JL, Heard SO, Maki DG, et al. Guidelines for the prevention of intravascular catheter-related infections. Centers for Disease Control and Prevention. *MMWR Recomm Rep*. 2002;51(RR-10):1-29.

162. Study Group Of Hyperglycemia in Parenteral Nutrition. Nutrition Area Of The Spanish Society Of Endocrinology And Nutrition SEEN, Oliveira G, Tapia MJ, Ocón J, Cabrejas-Gómez C, Ballesteros-Pomer MD, et al. Prevalence of diabetes, prediabetes, and stress hyperglycemia: insulin therapy and metabolic control in patients on total parenteral nutrition (prospective multicenter study). *Endocr Pract*. 2015;21(1):59-67.

163. Oliveira G, Tapia MJ, Ocón J, Cabrejas-Gómez C, Ballesteros-Pomar MD, Vidal-Casariago A, et al. Parenteral Nutrition–Associated Hyperglycemia in Non–Critically Ill Inpatients Increases the Risk of In-Hospital Mortality (Multicenter Study). *Diabetes Care*. 2013;36(5):1061-6.

164. Fernández López MT, López Otero MJ, Álvarez Vázquez P, Arias Delgado J, Varela Correa JJ. Refeeding syndrome. *Farm Hosp*. 2009;33(4):183-93.

165. Cederholm T, Barazzoni R, Austin P, Ballmer P, Biolo G, Bischoff SC, et al. ESPEN guidelines on definitions and terminology of clinical nutrition. *Clin Nutr*. 2017;36(1):49-64.

166. Álvarez J, Planas M, León M, García A, Celaya S, García P, et al. Prevalence and costs of malnutrition in hospitalized patients; the PREDyCES Study. *Nutri Hosp*. 2012;27(4):1049-59.

167. Study Group Of Hyperglycemia in Parenteral Nutrition. Nutrition Area Of The Spanish Society Of Endocrinology And Nutrition SEEN, Oliveira G, Tapia MJ, Ocón J, Cabrejas-Gómez C, Ballesteros-Pomer MD, et al. The subjective global assessment predicts in-hospital mortality better than other nutrition-related risk indexes in noncritically ill inpatients who receive total parenteral nutrition in Spain (prospective multicenter study). *J Acad Nutr Diet*. 2013;113(9):1209-18.

168. Cederholm T, Bosaeus I, Barazzoni R, Bauer J, Van Gossum A, Klek S. Diagnostic criteria for malnutrition - An ESPEN Consensus Statement. *Clin Nutr*. 2015;34(3):335-40.

169. Detsky AS, McLaughlin JR, Baker JP, Johnston N, Whittaker S, Mendelson RA, et al. What is subjective global assessment of nutritional status? *JPEN J Parenter Enteral Nutr*. 1987;11(1):8-13.

170. Lim SL, Ong KC, Chan YH, Loke WC, Ferguson M, Daniels L. Malnutrition and its impact on cost of hospitalization, length of stay, readmission and 3-year mortality. *Clin Nutr*. 2012;31(3):345-50.

171. Vellas B, Guigoz Y, Garry PJ, Nourhashemi F, Bennahum D, Lauque S, et al. The Mini Nutritional Assessment (MNA) and its use in grading the nutritional state of elderly patients. *Nutrition*. 1999;15(2):116-22.

172. Kondrup J, Rassmussen HH, Hamberg O, Stanga Z; ESPEN Working Group. Nutritional Risk Screening (NRS 2002): a new method based on an analysis of controlled clinical trials. *Clin Nutr*. 2003;22(3):321-36.

173. Kyle UG, Pirlich M, Lochs H, Schuetz T, Pichard C. Increased length of hospital

stay in underweight and overweight patients at hospital admission: a controlled population study. *Clin Nutr.* 2005;24(1):133-42.

174. Kulminski AM, Arbeev KG, Kulminskaya IV, Ukraintseva SV, Land K, Akushevich I, et al. Body mass index and nine-year mortality in disabled and nondisabled older U.S. individuals. *J Am Geriatr Soc.* 2008;56(1):105-10.

175. Phillips A, Shaper AG, Whincup PH. Association between serum albumin and mortality from cardiovascular disease, cancer, and other causes. *Lancet.* 1989;2(8677):1434-6.

176. Iwata M, Kuzuya M, Kitagawa Y, Iguchi A. Prognostic value of serum albumin combined with serum C-reactive protein levels in older hospitalized patients: continuing importance of serum albumin. *Aging Clin Exp Res.* 2006;18(4):307-11.

177. Llop J, Sabin P, Garau M, Burgos R, Pérez M, Massó J, et al. The importance of clinical factors in parenteral nutrition-associated hypertriglyceridemia. *Clin Nutr.* 2003;22:577-83.

178. Cuesta M, Garrahy A, Slattery D, Gupta S, Hannon AM, McGurren K, et al. Mortality rates are lower in siad, than in hypervolaemic or hypovolaemic hyponatraemia; results of a prospective observational study. *Clin Endocrinol (Oxf).* 2017;

179. Dekker MJ, Marcelli D, Canaud B, Konings CJ, Leunissen KM, Levin NW, et al. Unraveling the relationship between mortality, hyponatremia, inflammation and malnutrition in hemodialysis patients: results from the international MONDO initiative. *Eur J Clin Nutr.* 2016;70(7):779-84.

180. Leaf A, Bartter FC, Santos RF, Wrong O. Evidence in man that urinary electrolyte loss induced by pitressin is a function of water retention. *J Clin Invest.* 1953;32:868-878.

181. Ellis SJ. Severe hyponatremia: complications and treatment. *QJM.* 1995;88:905-9.

182. Palevsky PM, Bhagrath R, Greenberg A. Hypernatremia in hospitalized patients. *Ann Intern Med.* 1996;124:197-203.

183. Vincent JL, Dubois MJ, Navickis RJ, Wilkes MM. Hypoalbuminemia in acute illness: is there a rationale for intervention? A meta-analysis of cohort studies and controlled trials. *Ann Surg.* 237:319-34.

ANEXOS

ANEXO 1: Lista de los centros hospitalarios participantes, investigadores, y número de pacientes incluidos por cada centro hospitalario

CENTRO HOSPITALARIO	Nº pacientes
Hospital Clínico Universitario de Valladolid Daniel A. De Luis, Emilia Gómez	92
Complejo Asistencial Universitario de León María Ballesteros, Alfonso Vidal	73
Hospital Universitario Insular de Gran Canaria Yaiza García	57
Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa (Zaragoza) Maria Julia Ocón Bretón	50
Hospital General Universitario de Alicante Ángel Luis Abad	45
Hospital Infanta Cristina (Badajoz) Luis Miguel Luengo	41
Hospital Clínico San Carlos de Madrid Pilar Matía	31
Hospital Regional Universitario de Málaga Gabriel Oliveira, María José Tapia	24
Hospital Universitario Severo Ochoa (Leganés, Madrid) Dolores Del Olmo	22
Hospital Universitario de Salamanca Ana Herrero	18
Hospital Universitario Príncipe de Asturias (Getafe, Madrid) Julia Álvarez	17
Hospital General Universitario Santa Lucía de Cartagena Victoria García	14
Hospital General Universitario de Guadalajara Alejandra Herranz	14
Complejo Hospitalario Universitario de Albacete Francisco Botella	10
Complejo Hospitalario de Jaén Carmen Tenorio	10
Complejo Hospitalario Universitario de Ferrol Diego Bellido	10
Complejo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela Miguel Martínez	5
Hospital Universitario y Politécnico La Fe (Valencia) María Argente	5
Hospital General Universitario Gregorio Marañón (Madrid) Irene Bretón	5
19 centros reclutadores	543

ANEXO 2: Aprobación del Comité de Ética del Hospital Clínico Universitario de Valladolid

COMITÉ ÉTICO DE INVESTIGACIÓN CLÍNICA ÁREA DE SALUD VALLADOLID – ESTE (CEIC-VA-ESTE-HCUV)

Valladolid a 26 de Febrero de 2015

En la reunión del CEIC ÁREA DE SALUD VALLADOLID – ESTE del 26 de Febrero de 2015, se procedió a la evaluación de los aspectos éticos del siguiente proyecto de investigación.

PI 15-225 CINV 15-06	INCIDENCIA Y TIPO DE HINONATREMIA EN PACIENTES NO CRÍTICOS CON NUTRICIÓN PARENTERAL EN ESPAÑA: ESTUDIO MULTICÉNTRICO.	I.P.: EMILIA GOMEZ HOYOS Y DANIEL DE LUIS ROMAN. EQUIPO: ENRIQUE ROMERO, AURELIA VILLAR, JUAN JOSÉ GÓMEZ, BEATRIZ TORRES, GONZALO DÍAZ, M ^a ÁNGELES CASTRO, MANUEL MARTÍN, SILVIA RODRÍGUEZ ENDOCRINOLOGÍA Y NUTRICIÓN. APROBACIÓN POR LA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN EL 13-02-2015 RECIBIDO: 19-02-2015
-----------------------------	---	---

A continuación les señalo los acuerdos tomados por el CEIC ÁREA DE SALUD VALLADOLID – ESTE en relación a dicho Proyecto de Investigación:

Considerando que el Proyecto contempla los Convenios y Normas establecidos en la legislación española en el ámbito de la investigación biomédica, la protección de datos de carácter personal y la bioética, se hace constar el **informe favorable** y la **aceptación** del Comité Ético de Investigación Clínica del Área de Salud Valladolid Este para que sea llevado a efecto dicho Proyecto de Investigación.

Un cordial saludo.

Dr. F. Javier Álvarez.

CEIC Área de Salud Valladolid Este –
Hospital Clínico Universitario de Valladolid
Farmacología
Facultad de Medicina,
Universidad de Valladolid,
c/ Ramón y Cajal 7,
47005 Valladolid

alvarez@med.uva.es, jalvarezgo@saludcastillayleon.es tel.: 983 423077

ANEXO 3: Consentimiento informado (página 1)

1

DOCUMENTO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA INVESTIGACIÓN

HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO DE VALLADOLID

SERVICIO DE ENDOCRINOLOGIA Y NUTRICION

INVESTIGADOR RESPONSABLE: EMILIA GOMESZ HOYO Y DA DE LUIS ROMAN

TÍTULO DEL PROYECTO: Incidencia y tipo de Hiponatremia, en pacientes no críticos con Nutrición Parenteral en España: estudio Multicéntrico

Finalidad:

Para un adecuado avance en la investigación biomédica es necesario realizar estudios recogiendo datos de pacientes para identificar los factores que influyen en el desarrollo de las enfermedades. Los resultados de estos estudios ayudarán probablemente a mejorar la indicación y seguimiento de los pacientes con enfermedades (neurológicas, oncológicas, inflamatorias, etc) que precisan nutrición parenteral y presentan una hiponatremia (sodio en sangre bajo) durante su tratamiento. Por ello recogeremos sus datos clínicos y bioquímicos relacionados con el soporte nutricional parenteral.

Descripción del proceso:

Es importante que Vd., como potencial participante en este estudio, conozca que el proceso constará de las siguientes fases:

A) Los datos clínicos que habitualmente son registrados en su Historia Clínica van a ser utilizados para realizar estudios de investigación sobre la utilidad de la nutrición parenteral. Usted va a recibir una fórmula parenteral para su uso en pacientes con desnutrición. Durante los días que recibirá estos productos se recogerán estos datos en una base y se analizarán para valorar la utilidad de este soporte nutricional y la presencia de hiponatremia.

Después de firmar este documento, el médico le realizará una exploración nutricional y una analítica de rutina que también se realizará en la siguiente visita de control. La participación en el estudio no conlleva ningún riesgo adicional, al de recibir nutrición parenteral según su indicación clínica,

B) Dentro del proceso de asistencia hospitalaria por su enfermedad, se realizará una encuesta clínica. Esta encuesta no interferirá con los procesos diagnósticos o terapéuticos que usted ha de recibir por causa de su enfermedad.

Otras consideraciones:

C) No percibirá ninguna compensación económica o de otro tipo por su participación en el estudio. No obstante, la información generada en el mismo podría ser fuente de beneficios comerciales. En tal caso, están previstos mecanismos para que estos beneficios reviertan en la salud de la población, aunque no de forma individual en el participante.

E) La información obtenida se almacenará en una base de datos, en soporte informático, y registrada en la Agencia Española de Protección de Datos, según lo indicado en la legislación vigente sobre protección de datos de carácter personal (Ley Orgánica 15/1999), de 13 de diciembre). Los datos registrados serán tratados estadísticamente de forma codificada. En todo momento el donante tendrá derecho de acceso, rectificación o cancelación de los datos depositados en la base de datos siempre que expresamente lo solicite. Los datos quedarán custodiados bajo la responsabilidad del Investigador Principal del Estudio, Dr Daniel A de Luis Román. Los datos serán guardados de forma indefinida, al menos hasta la consecución de los fines científicos del proyecto.

ANEXO 3: Consentimiento informado (página 2)

2

F) La información estará codificada de forma que la identidad del participante nunca estará disponible para los investigadores.

H) Conforme al artículo 70 punto 2 de la Ley 14/2007 de Investigación Biomédica, sus datos podrán ser empleados en estudios de Investigación Biomédica en Nutrición clínica realizados por este u otros centros, nacionales o extranjeros, siempre que: 1) hayan sido considerados de interés científico, 2) que cumplan los requisitos establecidos por la Comisión de Investigación del HCUV.

I) No se empleará su información con fines distintos a los definidos en el apartado previo. En caso de que se plantee un uso diferente, deberá Vd. dar su consentimiento por escrito. En caso de que esto suponga un esfuerzo no razonable o sea imposible, un comité de ética competente deberá decidir si permite o no el uso de sus datos para fines distintos a los expresados en el apartado anterior, de acuerdo con lo previsto en la Ley 14/2007 de Investigación Biomédica.

J) La falta de consentimiento o la revocación de este consentimiento previamente otorgado no supondrá perjuicio alguno en la asistencia sanitaria que Vd. recibe/recibirá.

K) Es posible que los estudios realizados sobre sus datos aporten información relevante para su salud o la de sus familiares. Vd. tiene derecho a conocerla si lo desea, y puede ser conveniente que se trasmita a sus familiares.

L) Sólo si Vd. lo desea, existe la posibilidad de que pueda ser contactado en el futuro para completar o actualizar la información asociada al estudio.

ANEXO 3: Consentimiento informado (página 3)

3

DECLARACIONES Y FIRMAS**Declaración del participante:**

He sido informado por el profesional de salud abajo firmante:

- Sobre las ventajas e inconvenientes de la participación en este estudio.
- Sobre el lugar de obtención, almacenamiento y el proceso que sufrirán los datos personales.
- Que mis datos personales serán proporcionados de forma codificada a los investigadores que trabajen con ellas.
- Que en cualquier momento puedo revocar mi consentimiento y solicitar la eliminación o anonimización de todos mis datos personales que permanezcan almacenados o distribuidos. Esta eliminación no se extendería a los datos resultantes de las investigaciones que ya se hubieran llevado a cabo.
- Que en cualquier momento, yo, mi Representante Legal, ó Tutor, de conformidad con lo establecido en el artículo 4, punto 5 de la Ley 14/2007, de 3 de julio, puedo solicitar información sobre los resultados que se obtengan a partir del análisis de mis datos.
- Que he comprendido la información recibida y he podido formular todas las preguntas que he creído oportunas.

Consiento en:

- El fin para el que se utilizarán mis datos personales (estudios biomédicos que cumplan todos los requisitos que exige la ley).
- Yo, mi Representante Legal o Tutor, accedo (márquese sí o no) a que los médicos del HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO DE VALLADOLID me contacten en el futuro en caso de que se estime oportuno añadir nuevos datos a los recogidos. ...SI..... NO
- Yo, mi Representante Legal o Tutor, accedo (márquese sí o no) a que los médicos del HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO DE VALLADOLID me contacten en caso de que los estudios realizados sobre mis datos aporten información relevante para mi salud o la de mis familiares ...SI..... NO

Nombre del Paciente. _____ Firma: _____

Ó

Representante Legal del Paciente _____ Firma: _____

Lugar: _____ Fecha: _____

Declaración del profesional de salud médica de que ha informado debidamente al donante-

Nombre: Firma:.....

APARTADO PARA LA REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO

Yo,.....revoco el consentimiento de participación en el estudio, arriba firmado, con fecha.....

Firma:

ANEXO 4: Cuaderno de recogida de datos (página 1)

Area de Nutrición SEEN

1

DATOS A RECOGER :

Hospital:		Fch:	
Datos demográficos y clínicos			
Número de historia:		Fch de nacimiento:	
Género (1= varón; 2= mujer):		Edad (años):	
Fch de ingreso:		Fch de alta:	
Motivo de ingreso:			
Destino al alta, código:..... 1 (a su domicilio); 2 (defunción); 3 (residencia u hospital de cuidados crónicos)			
Si intervención quirúrgica, fch de la cirugía:			
Patologías asociadas al inicio de la NP, código: 1 (Inf. renal crónica) 2 (Inf renal aguda) 3 (Inf hepática crónica) 4 (Inf. hepática aguda) 5 (Inf respiratoria crónica) 6 (Inf. respiratoria crónica reagudizada) 7 (Inf. cardíaca crónica) 8 (Inf. cardíaca aguda) 9 (diabetes mellitus)			
Fch inicio de NP en planta:		Fch de retirada :	
Indicación de la NP (patología), código: 1 (desnutridos severos preoperatoriamente) 2 (postoperatorio de cirugía mayor del tracto gastrointestinal) 3 (trasplante de órgano sólido) 4 (sepsis) 5 (quemados) 6 (tumor sólido RT) 7 (tumor sólido QT) 8 (tumor sólido QT+ RT) 9 (tumor sólido carcinomatosis) 10 (leucemia/linfoma/mieloma) 11 (transplante de médula ósea) 12 (enfermedad inflamatoria intestinal) 13 (pancreatitis) 14 (Inf hepática severa) 15 (Inf renla severa) 16 (traumatismo cráneo encefálico) 17 (politraumatizado) 18 (fístula intestinal de alto débito) 19 (otros)			

ANEXO 4: Cuaderno de recogida de datos (página 2)

Area de Nutrición SEEN

2

Indicación de la NP (causa última), código:		
1 (vómitos intratables)		
2 (diarrea intratable)		
3 (mucositis severa)		
4 (íleo paralítico)		
5 (estrés severo, hipermetabolismo e hipercatabolismo, necesidades aumentadas no cubiertas con nutrición enteral)		
6 (obstrucción intestinal)		
7 (malabsorción severa)		
8 (necesidad de reposo intestinal)		
9 (terapia de soporte o necesidades no cubiertas mediante nutrición enteral)		
10 (otros)		
Motivo de retirada de la NP, código:		
0 (paso a N oral)		
1 (paso a N enteral por sonda)		
2 (paso a N oral + enteral por sonda)		
3 (pérdida de vía)		
4 (fallecimiento)		
5 (otros)		
Valoración del estado nutricional		
Valoración Global Subjetiva, código:		
0 (A); 1 (B); 2 (C)		
Peso actual (kg):	Estimado (0)/medido (1):	Peso habitual (kg):
% de pérdida de peso:	Tiempo (semanas):	
Talla (metros):	Estimado (0)/medido(1):	
IMC con peso actual (kg/m2):	Estimado (0)/medido(1):	
Requerimientos de energía estimados al inicio de la NP	Basal(HB):	
	Totales (HB x Factor de estrés):	
Datos de la composición de la NP administrada		
g medios de lípidos (total lípidos infundidos / n° días con NP):		
g medios de HC (total HC infundidos / n° días con NP):		
g medios de AA (total AA infundidos / n° días con NP):		
mEq medios de Na (total de Na infundido/n° de días de NP):.....		
mEq medios de K (total de Na infundido/n° de días de NP):.....		
ml medios de volumen (total de volumen/n° de días de NP):.....		
mOsmol/kg medios (total de mOsmol/n° de días de NP):.....		
Aporte extra de fluidos		
Tipo de fluido aportado, código:		
0 (no); 1 (solución glucosalina); 2 (solución salina al 0,9%); 3 (solución salina al		

ANEXO 4: Cuaderno de recogida de datos (página 3)

Area de Nutrición SEEN

3

0,45%); 4 (suero glucosado); 5 ingesta oral de líquidos		
Cantidad de fluido extra (Total de fluidos extra /nº de días de NP):		
Pérdidas corporales : diuresis y otros débitos (SNG, drenajes, fistulas)		
Media de diuresis (ml) durante la NP (Total de diuresis diaria/ nº días NP):		
Media de débitos (ml) durante la NP (Total de débitos / nº días NP):		
Fármacos al inicio y durante la NP : 0 (No) ; 1 (Si)		
Diurético:	Tipo, código: 1 (Hidroclotiazida); 2 (clortalidona); 3 (indapamida); 4 (furosemida); 5 (torasemida); 6 (espironolactona).	
AINE:	IECA:.....	
Carbamacepina/Oxacarbecina:.....	Gabapentina/Pregabalina.....	
Amitriptilina / IRS (fluoxetina, paroxetina, duloxetina...):.....	Quimioterápicos :..... Albumina :.....	
Cotrimoxazol.....	Opiáceos (tramadol,morfina):.....	
Corticoides:	Tipo, código:..... 1 (DMX); 2 (hidrocortisona); 3 (metilprednisolona); 4 (prednisona); 5 (fludrocortisona).	
Otras comorbidades durante el ingreso : 0 (No) ; 1 (Si)		
Dolor:.....	Náuseas:.....	Vómitos:.....
Diarrea:.....	Fístulas:.....	Drenajes:.....
Hemorragia (interna/externa):.....	Obstrucción intestinal:.....	
Ascitis:.....	Edemas (periféricos/pulmonar):.....	
Complicaciones durante la administración de NP (al menos 1 día de esa complicación) : 0 (No), 1 (Si).		
Alteraciones hepatobiliares: Tras el inicio de la NP alguno de los siguientes valores, que estaban previamente bien y en ausencia de patología de base, se elevan por encima de: GOT, GPT y GGT > 90, FA > 400, Bilirrubina total > 2,5.		
Infecciosas:; Tipo de infección, código:..... 0 (no); 1 (infección del catéter o flebitis); 2 (sepsis); 3 (neumonía); 4 (infección de la herida quirúrgica).		
Mecánicas:.....; Tipo de complicación, código:..... 0 (no); 1 (canalización infructuosa); 2 (neumotórax); 3 (punción de la arteria); 4 (embolismo del catéter); 5 (trombosis).		
Metabólicas :		
Hipertrigliceridemia (Tg > 500 mg/dl):		

247

ANEXO 4: Cuaderno de recogida de datos (página 5)

Area de Nutrición SEEN

5

Analítica en las primeras 24-48 h de infusión de la NP		
PCR.....	Albúmina.....	Prealbúmina.....
Leucocitos (nº).....	Proteínas totales.....	Natremia.....
Glucemia	Triglicéridos.....	Colesterol total.....
Urea.....	Creatinina.....	EFG.....
Analítica diagnóstica de hiponatremia (sólo los que presentan hiponatremia)		
Natremia.....	Sodio urinario.....	Potasio plasmático.....
Potasio urinario.....	Ac.urico.....	Urea.....
Cloro.....	Cloro urinario (si es posible).....	
Osmolalidad plasmática.....	Osmolalidad Urinaria.....	
Creatinina.....	Creatinina urinaria (si es posible).....	
TSH (unidades)	T4L (unidades).....	
Cortisol basal (sólo en pacientes que no reciban corticoides).....		
Tipo de volemia (sólo en los pacientes con hiponatremia): 0 (no); 1 (si)		
Hipovolemia: TA baja y FC elevada Presión venosa yugular baja Tensión ocular baja	Euvolemia: Ausencia de signos de hipovolemia y de tercer espacio Tensión ocular normal	Hipevolemia: Presencia de signos de tercer espacio (ascitis, edemas periféricos, edema pulmonar,...) Tensión ocular normal
Tratamiento (tto) de la hiponatremia durante la NP (sólo en pacientes con hiponatremia)		
Tipo de tto de la hiponatremia durante la NP, código :..... 0 (ninguno) 1 (incremento del aporte de sodio de la NP) 2 (aumento del volumen de la NP) 3 (solución salina al 0,9%) 4 (reducción del volumen de la NP) 5 (reducción del aporte de líquidos extra, como sueros, diluciones....) 6 (retirada de diurético) 7 (furosemida) 8 (tolvaptan) 9 (incremento de sodio + reducción de volumen de la NP) 10 (incremento de sodio+ aumento del volumen de la NP) 11 (otros, especificar)		
Fecha de inicio del tto de la hiponatremia.....		
Aporte medio de volumen de la NP durante el tto de la hiponatremia..... (Aporte total de volumen / todos los días de NP tras inicio del tto)		
Aporte medio de fluidos extras a la NP durante el tto de la hiponatremia..... (Aporte total de fluidos extras / todos los días de NP tras inicio del tto)		
Aporte medio de sodio en la NP durante el tto de la hiponatremia (Aporte total de sodio / todos los días de NP tras inicio del tto)		