

Cruz
6

UVA. BHSC. SC 04146

UVA. BHSC. SC 04146

UVA. BHSC. SC 04146

se ~~25=4~~. ~~10=3~~. ~~30=4~~ ~~80=5~~ 4.146

~~3=4~~

97-1



(Stave

2 1 7

4.146

UVA. BHSC. SC 04146

LA METHODE DES FLUXIONS,

ET DES SUITES INFINIES.

Par M. le Chevalier NEWTON.

A PARIS,

Chez DE BURE l'aîné, Libraire, Quay des Augustins, à Saint Paul.

M. DCC XL.

UVA. BHSC. SC 04146

VVA. BHSC. SC 04146

PAR M. LE CHEVALIER.

EL DES SOLIDES INSCRITS:

EXPOSITION

DES

NOUVELLE METHODE

EN

PREFACE.

L'OUVRAGE dont on donne ici la Traduction, a été commencé en 1664. & achevé en 1671 : * Newton encore peu connu dans ce tems vouloit le faire imprimer à la suite d'une introduction à l'Algebre d'un certain Kinckhuysen, qu'il avoit corrigée & augmentée ; on ne voit pas pourquoi ce Livre ne fut pas imprimé : on voit seulement que dans la même année Newton changea d'avis, & prit le dessein de le publier avec son Optique dont il avoit déja composé la plus grande partie : mais les objections & les chicanes qu'on lui fit sur ses principes & sur ses expériences d'Optique, le chagrinérent & l'empêcherent de donner au Pu-

* Voyez le Com. Epistolicum. pag. 101, 102, &c. Newtoni Princip. 3a. Ed. pag. 246.

UVA. BHSC. SC 04146

blic ces deux Ouvrages. Voici ce qu'il en dit lui-même: *Et ſubortæ ſtatim (per diverſorum Epiſtolas objectionibus refertas) crebræ interpellationes me prorſus à concilio deterruerunt & effecerunt ut me arguerem imprudentiæ quod umbram captando, eatenus perdideram quietem meam rem prorſus ſubſtantialem.* Il ſemble même qu'Il ait entiérement oublié ſon Ouvrage juſqu'en 1704. qu'il en a tiré ſon Traité des Quadratures. Pluſieurs années après M. Pemberton * obtint ſon conſentement pour faire imprimer l'Ouvrage entier, on ne ſçait encore pourquoi cela a manqué ; enfin l'Auteur eſt mort avant que le Livre ait paru, & encore il n'a paru que traduit. Newton la compoſé en latin, M. Colſon entre les mains de qui le Manuſcrit a été remis, n'a pas voulu le donner en original ; il l'a traduit, & en 1736. il l'a fait imprimer en Anglois, afin, dit-il, que les Anglois ſes compatriotes puſſent jouir des travaux du Grand Newton avant les autres Nations. Il ajoute une raiſon qui me paroît meilleure & plus naturelle ; c'eſt qu'il avoit envie de joindre un Commentaire & des Notes de ſa main, ces Notes ſont en Anglois, & apparemment il a voulu éviter la peine de les mettre en Latin.

Quoiqu'il en ſoit, c'eſt ſur cette verſion Angloiſe que j'ai fait ma traduction ; elle n'en ſera pas plus mauvaiſe pour cela ; car j'ai ſuivi en tout l'eſprit de l'Auteur, encore plus que le ſens littéral ; dans des

* Voyez A Wiew of Sir Iſaac Newton's Philoſophy.

UVA. BHSC. SC 04146

matiéres de cette eſpéce il ſuffit d'entendre les choſes pour les bien rendre ; d'ailleurs la Géometrie & ſur-tout la Géometrie de Newton n'a qu'un ſtyle. Je n'ai pas traduit le Commentaire de M. Colſon, cependant j'en fais cas, & j'avouë qu'il contient pluſieurs bonnes choſes ; mais il faut avouer auſſi que ces bonnes choſes ſe trouvent noyées dans une diffuſion de calcul qui rebute ; que d'ailleurs ce long Commentaire n'eſt qu'un commencement de Commentaire, & que l'Auteur nous promet une ſuite bien complette au cas que ce commencement ſoit bien reçu ; ajoutez à tout cela que ces longues Gloſes ſont ſuivies de deux grands Chapitres qui n'ont aucun rapport avec l'Ouvrage ou le Commentaire ; en voilà plus qu'il n'en faut pour juſtifier ma répugnance à le traduire.

On n'aura donc ici que Newton tout ſeul ; mais Newton plus clair, plus traitable, & plus à la portée du commun des Géometres qu'il ne l'eſt dans aucun autre de ſes Ouvrages ; en 1671. dans le tems que ce Livre a été compoſé, il auroit eu beſoin de Commentaire ; mais la Géometrie a fait de grands progrès depuis ſoixante-dix ans, & je ne crois pas que les Géometres ſoient arrêtés à la lecture de cet Ouvrage, qui a toute la clarté & toute l'étenduë néceſſaire pour être facilement entendu, dont les principaux articles ont déja été commentés *, & qui

* Voyez les Ouvrages de Meſſieurs Stirling, Maclaurin.

UVA. BHSC. SC 04146

d'ailleurs ne contient guére de choſes entierement nouvelles, & dont on ne ſache au moins les réſultats, tant par les morceaux que Newton lui-même nous a donné en 1704, 1711, &c. que par les différentes piéces & les traités que les autres Géometres ont publié ſur ces matieres.

On ſera bien aiſe de voir en un ſeul petit volume le calcul différentiel & le calcul integral avec toutes leurs applications; on reconnoîtra à la maniere dont les ſujets ſont traités la main du grand Maître, & le génie de l'Inventeur; & on demeurera convaincu que Newton ſeul eſt l'auteur de ces merveilleux calculs, comme il l'eſt auſſi de bien d'autres productions tout auſſi merveilleuſes.

Tout le monde ſçait que Leibnitz a voulu partager la gloire de l'invention, & bien des gens lui donnent encore au moins le titre de ſecond Inventeur; il a publié en 1684. les regles du Calcul Différentiel, & il a été comblé d'éloges par de très-grands Géometres, qui non contents de lui avoir rendu ces brillants hommages, travailloient encore pour lui & ajoutoient à ſa réputation en lui attribuant leurs propres découvertes. D'un autre côté Newton ſe ſoutenoit par la maſſe de ſes Ouvrages, & ſembloit ſe repoſer ſur la ſuperiorité qu'il ſe ſentoit; il ſe paſſa pluſieurs années ſans aucune plainte de ſa part, ſans qu'il revendiquât cette découverte; mais enfin il y eut procès, procès où les Nations entieres ſe ſont intereſſées, procès qui n'eſt pas encore terminé, ou

UVA. BHSC. SC 04146

du moins, qui a été ſuivi juſqu'à ce jour de chicanes,& qui peut-être eſt la ſource de la plûpart des querelles qu'on a faites au calcul infiniteſimal. On ne ſera pas fâché de voir ici une relation abregée de cette époque littéraire, & par occaſion les principaux faits de l'Hiſtoire de la Géometrie & du Calcul de l'Infini.

Dès les premiers pas qu'on fait en Géometrie, on trouve l'infini, & dès les tems les plus reculés les Géometres l'ont entrevû, la Quadrature de la Parabole & le Traité *de Numero Arenæ* d'Archimede prouvent que ce grand homme avoit des idées de l'infini, & même des idées telles qu'on les doit avoir; on a étendu ces idées, on les a maniées de différentes façons, enfin on a trouvé l'art d'y appliquer le calcul: mais le fond de la Metaphyſique de l'Infini n'a point changé,& ce n'eſt que dans ces derniers tems que quelques Géometres nous ont donné ſur l'infini des vûës différentes de celles des Anciens, & ſi éloignées de la nature des choſes, qu'on les a méconnues juſque dans les ouvrages de ces grands hommes; & de là ſont venues toutes les oppoſitions, toutes les contradictions qu'on a fait & qu'on fait encore ſouffrir au calcul infiniteſimal; de là ſont venues les diſputes entre les Géometres ſur la façon de prendre ce calcul, & ſur les principes dont il dérive; on a été étonné des prodiges que ce calcul opéroit, cet étonnement a été ſuivi de confuſion; on a cru qne l'infini produiſoit toutes ces merveilles; on s'eſt imaginé que

UVA. BHSC. SC 04146

la connoiſſance de cet infini avoit été refuſée à tous les ſiécles & réſervée pour le nôtre ; enfin on a bâti ſur cela des ſyſtêmes qui n'ont ſervi qu'à embrouiller les Faits & obſcurcir les idées. Avant que d'aller plus loin diſons donc deux mots de la nature de cet infini, qui en éclairant les hommes ſemble les avoir ébloui.

Nous avons des idées nettes de la grandeur, nous voyons que les choſes en général peuvent être augmentées ou diminuées, & l'idée d'une choſe devenuë plus grande ou plus petite eſt une idée qui nous eſt auſſi préſente & auſſi familiere que celle de la choſe même ; une choſe quelconque nous étant donc préſentée ou étant ſeulement imaginée, nous voyons qu'il eſt poſſible de l'augmenter ou de la diminuer ; rien n'arrête, rien ne détruit cette poſſibilité, on peut toujours concevoir la moitié de la plus petite choſe imaginable, & le double de la plus grande choſe ; on peut même concevoir qu'elle peut devenir cent fois, mille fois, cent mille fois plus petite ou plus grande ; & c'eſt cette poſſibilité d'augmentation ou de diminution ſans bornes en quoi conſiſte la véritable idée qu'on doit avoir de l'infini ; cette idée nous vient de l'idée du fini, une choſe finie eſt une choſe qui a des termes, des bornes ; une choſe infinie n'eſt que cette même choſe finie à laquelle nous ôtons ces termes & ces bornes ; ainſi l'idée de l'infini n'eſt qu'une idée de privation, & n'a point d'objet réel. Ce n'eſt pas ici le lieu de faire voir que l'eſpace,

UVA. BHSC. SC 04146

l'eſpace, le tems, la durée, ne ſont pas des Infinis réels ; il nous ſuffira de prouver qu'il n'y a point de nombre actuellement Infini ou infiniment petit, ou plus grand ou plus petit qu'un Infini, &c.

Le Nombre n'eſt qu'un aſſemblage d'unités de même eſpece ; l'unité n'eſt point un Nombre, l'unité déſigne une ſeule choſe en général ; mais le premier Nombre 2 marque non-ſeulement deux choſes, mais encore deux choſes ſemblables, deux choſes de même eſpece ; il en eſt de même de tous les autres Nombres : Mais ces Nombres ne ſont que des repréſentations, & n'exiſtent jamais indépendamment des choſes qu'ils repréſentent ; les caractéres qui les déſignent ne leur donnent point de réalité, il leur faut un ſujet, ou plûtôt, un aſſemblage de ſujets à repréſenter pour que leur exiſtence ſoit poſſible ; j'entends leur exiſtence intelligible, car ils n'en peuvent avoir de réelle ; or un aſſemblage d'unités ou de ſujets ne peut jamais être que fini, c'eſt-à-dire, on pourra toujours aſſigner les parties dont il eſt compoſé, par conſéquent le Nombre ne peut être Infini quelqu'augmentation qu'on lui donne.

Mais dira-t'on le dernier Terme de la ſuite naturelle 1, 2, 3, 4, &c. n'eſt-il pas Infini ? n'y a-t-il pas des derniers Termes d'autres ſuites encore plus Infinis que le dernier Terme de la ſuite naturelle ? Il paroît que les Nombres doivent à la fin devenir Infinis, puiſqu'ils ſont toujours ſuſceptibles d'augmentation ; à cela je réponds que cette augmentation

UVA. BHSC. SC 04146

dont ils ſont ſuſceptibles, prouve évidemment qu'ils ne peuvent être Infinis ; je dis de plus que dans ces ſuites il n'y a point de derniers Termes, que même leur ſuppoſer un dernier Terme, c'eſt détruire l'eſſence de la ſuite qui conſiſte dans la ſucceſſion des Termes qui peuvent être ſuivis d'autres Termes, & ces autres Termes encore d'autres, mais qui tous ſont de même nature que les précédens, c'eſt-à-dire, tous finis, tous compoſés d'unités ; ainſi lorſqu'on ſuppoſe qu'une ſuite a un dernier Terme, & que ce dernier Terme eſt un nombre infini, on va contre la définition du nombre & contre la loi générale des ſuites.

La plûpart de nos erreurs en Metaphyſique viennent de la réalité que nous donnons aux idées de privation, nous connoiſſons le fini, nous y voyons des propriétés réelles, nous l'en dépouillons, & en le conſidérant après ce dépouillement, nous ne le reconnoiſſons plus, & nous croyons avoir créé un être nouveau, tandis que nous n'avons fait que détruire quelque partie de celui qui nous étoit anciennement connu.

On ne doit donc conſidérer l'Infini ſoit en petit, ſoit en grand, que comme une privation, un retranchement à l'idée du fini, dont on peut ſe ſervir comme d'une ſuppoſition qui dans quelques cas peut aider à ſimplifier les idées, & doit generaliſer leurs réſultats dans la pratique des Sciences ; ainſi tout l'art ſe réduit à tirer parti de cette ſuppoſition, en

UVA. BHSC. SC 04146

tâchant de l'appliquer aux ſujets que l'on conſidére. Tout le mérite eſt donc dans l'application, en un mot dans l'emploi qu'on en fait.

Avant que Deſcartes eût appliqué l'Algebre à la Géometrie, les principes & la Metaphyſique de la Géometrie étoient bien connus & bien certains ; cependant cette application a beaucoup augmenté nos connoiſſances Géometriques, & s'eſt étenduë ſur toutes les opérations de cette ſcience ; de même l'Infini étoit connu, & la Metaphyſique de l'Infini étoit familiere aux Anciens ; mais l'application qu'on a faite de nos jours du Calcul à cet Infini, nous a mis au-deſſus d'eux & nous a valu toutes les nouvelles découvertes.

Archimede, Apollonius, Viviani, Gregoire de S. Vincent, ont connu l'Infini ; leur Methode d'aproximation & d'exhauſtion en ſont tirées, & ils s'en ſont ſervi pour quarrer & rectifier quelques Courbes ; mais ces connoiſſances de l'Infini dénuées de Calcul n'ont produit que des Méthodes particulieres, ſouvent embaraſſées & toujours confinées à quelques cas aſſez ſimples, la generalité étoit réſervée au Calcul, il embraſſe tout, il donne tout, auſſi la Géometrie qui a précédé le Calcul eſt-elle devenuë moins néceſſaire, & peut-être auſſi a-t-elle été un peu trop négligée.

Les Anciens Géometres ont conſideré les Courbes comme des Polygones compoſés de côtés infiniment petits, ils ont inſcrit & circonſcrit autour

UVA. BHSC. SC 04146

des Courbes des figures compoſées de parties finies & connuës dont ils ont augmenté le nombre & diminué la grandeur à l'Infini ; & par là ils ſont venu à bout de meſurer quelques Courbes ; Cavallieri & vingt ans après Fermat & Wallis ont été les premiers qui ayent appliqué quelques idées de Calcul à cette Géometrie de l'Infini ; leurs Methodes de Sommer ſont des germes de Calcul, & les premiers germes de cette eſpéce qui ſe ſoient développés.

Cavallieri cependant n'avoit pas pris la vraie route, il avoit des idées * qui réduites en Calcul réel auroient fructifié, mais il n'en put tirer que des choſes déja connuës ; il conſidére la ligne comme une partie indiviſible de la Surface, la Surface comme une partie indiviſible du ſolide, & il cherche la meſure des Surfaces & des ſolides par des Sommes Infinies de lignes & de Surfaces ; les réſultats de ſa Méthode ſont bons, ſa Méthode eſt même générale, & cependant avec cet avantage il ne va pas au-delà des Anciens, il ne donne rien de nouveau, & lui-même paroît borner le mérite de ſon Ouvrage à l'accord parfait des conſéquences de ſa Méthode avec les vérités de la Géometrie ancienne.

Fermat s'éleva bien au-deſſus de Cavallieri, il trouva moïen de calculer l'Infini, & donna une Méthode excellente pour la réſolution *des plus grands & des moindres*, cette Méthode eſt la même à la nota-

* Geom. Indiviſibil. Bonon. 1635.

UVA. BHSC. SC 04146

tion près, que celle dont on se sert encore aujourd'hui ; enfin cette Methode étoit le Calcul Différentiel si son auteur l'eût generalisée.

Mais Wallis prit un autre chemin, il appliqua réellement l'Arithmétique aux idées de l'Infini, il réduisit en suites infinies les fractions composées ; il se servit même assez heureusement de ses suites Arithmétiques pour la Quadrature & la Rectification des Courbes ; cependant il marchoit en tâtonnant, & faute d'un Calcul assez puissant & assez général il employoit les combinaisons, les affections particulieres & individuelles des Nombres, &c. Brownker & Mercator profiterent des vûës de Wallis, ils étendirent sa Méthode, & on peut dire qu'ils furent les premiers qui oserent s'avancer dans cette route & fraïer la bonne voie ; Brownker quarra l'Hyperbole par une suite Infinie toute composée de Termes finis & connus, & Mercator en donna la démonstration par la division Infinie à la maniére de Wallis ; Jacques Gregori donna presque aussi-tôt que Mercator une Démonstration de cette même Quadrature de l'Hyperbole, & c'est proprement là l'époque de la naissance des nouveaux Calculs ; il est même étonnant que ces Géometres ne se soient pas élevés jusqu'à la Méthode générale des Suites après avoir trouvé la Suite particuliere de l'Hyperbole ; il paroît qu'un moment de réfléxion auroit au moins dû leur donner par une même Méthode la Quadrature de l'Ellipse & du Cercle ; cependant ils ne

UVA. BHSC. SC 04146

l'ont pas trouvée, & même on ne voit pas qu'ils ayent faït d'autre uſage de cette theorie des Suites Infinies que celui de quarrer l'Hyperbole ; mais il eſt vrai que Newton ne leur en donna pas le tems : au mois de Juin 1669. toutes ces Méthodes furent envoyées à Barrow comme des nouveautés brillantes, il les communiqua à Newton pour qui elles n'eurent pas le même mérite ; car il remit entre les mains de Barrow des papiers qui contenoient 1°. la Methode générale des Suites qu'il avoit trouvée quelques années auparavant, Méthode par laquelle il fait ſur toutes les Courbes ce que les Autres n'avoient fait que ſur l'Hyperbole. 2°. La réſolution Numérique & littérale des Equations affectées. 3°. La Méthode des Fluxions. 4°. La Méthode Inverſe des Tangentes, la Quadrature, la Rectification des Courbes, & un mot ſur la meſure des Solides, ſur l'invention des Centres de gravité, &c. ſçavoir *que comme ces Meſures ſe réduiſent à celles des Surfaces, il n'eſt pas néceſſaire qu'il avertiſſe que ſa Methode donne tout cela* ; ainſi dès 1669. Newton avoit trouvé les Suites Infinies, le Calcul Différentiel & le Calcul intégral ; tout cela fut envoyé par Barrow à Collins qui en tira copie & le communiqua à Brownker & à Oldembourg, celui-ci l'envoya à Sluſius : de plus Collins l'avoit encore envoyé par Lettres à Jacques Gregori, à Bertet, à Borelli, à Vernon, à Strode, & à pluſieurs autres Géometres ; ces Lettres ſont imprimées dans le *Commercium Epiſto-*

UVA. BHSC. SC 04146

licum, & c'eſt dans ces Lettres qu'on voit que Newton avoit trouvé toutes ces choſes, même avant que Brownker eût quarré l'Hyperbole, c'eſt-à-dire, dès l'année 1664. ou 1665. c'eſt dans ces Lettres que l'on voit auſſi que Newton vouloit faire imprimer dès l'année 1671. l'Ouvrage dont nous donnons ici la traduction.

De plus en 1672. Newton dans une Lettre écrite à Collins, lui envoïe un exemple de ſa Méthode des Tangentes, comme un Corollaire, dit-il, d'une Méthode générale, qu'aucune complication de Calcul n'arrête, & qui s'étend non-ſeulement aux Courbes Géometriques, mais même aux Courbes Mécaniques, & qui outre la ſolution complette de la queſtion des Tangentes, donne encore celle de pluſieurs Problêmes beaucoup plus difficiles comme des Courbures des Courbes, de leurs Aires, de leurs longueurs, de leurs Centres de gravité : *J'ai*, dit-il, *joint cette Méthode à une autre qui donne la réſolution des Equations par des ſuites Infinies, &c.* On voit bien que ces deux Méthodes ſont la Méthode directe & inverſe des Fluxions, & celle des Suites Infinies telles qu'elles ſont dans ce Traité fait en 1671. Tſchirnhaus au mois de Mai 1675. Leibnitz au mois de Juin 1676. & Sluſius dès le 29. Janvier 1673. avoient reçu des copies de cette Lettre ; c'étoit même à l'occaſion de la Méthode des Tangentes de Sluſius que Newton l'avoit écrite, il loüe beaucoup l'invention de Sluſius, qui en effet avoit trouvé ſa,

UVA. BHSC. SC 04146

Méthode avant que d'avoir vû celle de Newton, & il l'avoit envoïée le 17. Janvier 1673. à Oldembourg. Wallis, Mercator, Brownker, Gregori, Barrow, Slusius étoient alors les seuls qui eussent pénétré les mysteres des nouveaux Calculs; Leibnitz ne travailloit pas encore sur ces Matieres, car dans une de ses Lettres à Oldembourg du 3. Février 1672. il donne une Maniere de Sommer des Suites de Nombres, comme une invention qu'il estimoit, & cette invention étoit une Méthode que Mouton avoit autrefois donnée; & sur la remarque que Pell lui en fit faire, il dit qu'il va montrer qu'il n'est pas assez dénué de méditations qui lui soient propres, pour être obligé d'en emprunter; il répéte plusieurs fois qu'il va donner quelque chose qui empêchera qu'on ne le prenne pour un copiste, & cette grande chose est une propriété des Nombres figurés qu'il dit avoir trouvée le premier, & qu'il est étonné que Pascal n'ait pas observée; mais il se trompe, comme le remarque le *Com. Epist.* Car Pascal dans ce Traité appellé le Triangle Arithmétique imprimé à Paris en 1665. donne la prétenduë découverte de Leibnitz dès la 2de page dans la définition ante-pénultiéme; outre cette Lettre de Leibnitz qui roule toute sur des bagatelles d'Arithmétique, il y en a encore cinq autres dans le même goût, la premiere dattée de Londres le 20 Février, les autres de Paris, 30 Mars, 26 Avril, 24 Mai, & 8 Juin 1673. Jusques-là Leibnitz dit le *Commercium Epistolicum* ne se mêloit que d'Arithmétique,

UVA. BHSC. SC 04146

d'Arithmétique, mais l'année ſuivante il ſe tourna du côté de la Géometrie, & dans une Lettre qu'il écrivit à Oldembourg le 15. Juillet 1674. il dit qu'il a des choſes d'une grande importance, & ſur-tout un Theorême admirable par lequel l'Aire d'un Cercle ou d'un Secteur peut être exprimée exactement par une ſuite de Nombres rationels, il ajoute qu'il a des Méthodes Analytiques générales & fort étenduës, qu'il eſtime plus que les plus beaux Theorêmes particuliers ; dans un ſeconde Lettre à Oldembourg dattée du 26. Octobre même année, Leibnitz dit : *Vous ſçavez que Mylord Brownker & M. Mercator ont donné une ſuite Infinie de Nombres rationels égale à l'eſpace Hyperbolique ; mais perſonne n'a pû encore le faire dans le Cercle* ; le *Com. Epiſt.* remarque que quatre ans auparavant Collins avoit communiqué à tout le monde les ſuites Infinies de Newton, & un an après, celle de Gregori, & que Leibnitz ne donna les ſiennes qu'après avoir vû celles-là ; tout cela eſt prouvé plus au long dans le *Commercium Epiſtolicum*, où l'on voit clairement par les Lettres de Leibnitz & les réponſes à ces Lettres, qu'il a eu connoiſſance de la théorie générale des Suites avant que d'avoir donné ſa Suite pour le Cercle, & que Newton lui-même la lui avoit envoyée par la voie d'Oldembourg. Il paroît même que Leibnitz qui dans ce tems ſe diſoit auteur de ce Theorême, n'en avoit pas la démonſtration, puiſqu'il la demande à Oldembourg par une

UVA. BHSC. SC 04146

Lettre du 12. Mai 1676. Il paroît encore par une Lettre de Newton dattée du 13. Juin 1676. que dans ce tems il a communiqué directement à Leibnitz ſon Binome avec pluſieurs exemples d'extractions de Racines, pluſieurs Suites Infinies pour le Cercle, l'Ellipſe, l'Hyperbole, la Quadratrice, &c. Et par une autre Lettre de Newton du 24. Octobre 1676. il paroît qu'il a communiqué à Leibnitz 1°. tout le procédé des Suites, & la façon dont il eſt arrivé à cette découverte. 2°. Une maniere de faire des Logarithmes par les Aires Hyperboliques. 3°. La Quadrature des Courbes en entier, avec pluſieurs Exemples. 4°. Son Parallelogramme, autrement l'artifice dont il ſe ſert pour la réſolution des Equations affectées. 5°. Le retour des Suites. Juſque-là Leibnitz avoit toujours reçu & n'avoit rendu que les mêmes Suites qu'on lui avoit envoïées, il paroît même qu'il ignoroit juſqu'alors le Calcul infinitéſimal par ce qu'il dit dans une Lettre du 27. Août 1676. que les Problêmes de la Méthode inverſe des Tangentes, ne dépendent ni des Equations, ni des Quadratures. Enfin en 1677. dans une Lettre à Oldembourg, il donne une Méthode pour les Tangentes par le Calcul Différentiel; cette Méthode eſt la même que celle de Barrow publiée en 1670. & le Calcul eſt le même à la notation près que celui de Newton communiqué par Collins en 1669. Oldembourg mourut à la fin de l'année 1677. & ſa mort termina ce commerce de Lettres. Collins mourut en 1682. & la même

UVA. BHSC. SC 04146

année Leibnitz publia dans les Actes de Leipsick la Quadrature du Cercle & de l'Hyperbole; & en 1684. les Elements du Calcul Différentiel; & enfin Newton en 1686. publia son Livre des Principes.

Voilà en racourci l'Histoire de ce Calcul; c'est au Lecteur à juger de la part à cette découverte qu'on doit accorder à Leibnitz. Cependant Newton loin de se plaindre sembloit convenir que Leibnitz avoit trouvé une Méthode de Calcul semblable à la sienne, bien des années s'écoulerent sans qu'il se souciât de détromper le public, tout le monde sçavant à l'exception de l'Angleterre, regardoit Leibnitz comme l'Inventeur; à peine le Livre des Principes étoit-il connu, toutes les vûës, tous les travaux des Géometres se tournerent du côté du Calcul Différentiel, tous les éloges furent pour l'Auteur prétendu de ce Calcul; enfin Leibnitz étoit en possession, & en possession non contestée de tout ce que la Géometrie avoit produit de plus brillant depuis vingt siécles; mais cet éclat de gloire n'a pas duré, des Partisans trop zelés & des Disciples ébloüis, en voulant élever leur Maître, ont été cause de l'abaissement de sa réputation. En 1695. les Ouvrages de Wallis parurent en deux gros volumes, les Journalistes de Leipsick se plaignirent assez mal-à-propos de ce que ce Géometre n'avoit pas parlé de Leibnitz, & de sa grande découverte autant qu'il auroit dû le faire; sur cela Wallis écrivit à Leibnitz qu'il étoit bien faché de n'avoir pû parler de lui, mais qu'il n'avoit au-

UVA. BHSC. SC 04146

cune connoiſſance de ſes découvertes, ſinon de ſa Suite du Cercle & de ſa *Tortuë quarrable*; qu'il n'avoit jamais vû ſa Géometrie des Incomparables, ou ſon Analyſe des infinis, ni ſon Calcul Différentiel; que ſeulement il avoit oui dire que ce Calcul étoit tout-à-fait ſemblable à la Méthode des Fluxions; Leibnitz lui répondit que ſon Calcul étoit différent de celui de Newton, & Wallis le pria de lui marquer la différence, mais Leibnitz ne répondit rien.

En 1699. M. Fatio de Duilliers publia une Diſſertation ſur la Ligne de la plus courte deſcente, &c. & en parlant du Calcul infiniteſimal, il dit que Newton en eſt le premier, & de pluſieurs années le premier Inventeur, que l'évidence de la choſe l'oblige d'avouer ce fait, & qu'il laiſſe à ceux qui ont vû les Lettres & les Manuſcrits de Newton à juger ce que Leibnitz le ſecond Inventeur de ce Calcul a emprunté de Newton; à cela Leibnitz répondit dans les Actes de Leipſick qu'il n'avoit aucune connoiſſance des découvertes de Newton, lorſqu'il publia ſon Calcul Différentiel en 1684. cependant on a vû ci-deſſus par l'extrait des Lettres de Collins & de Newton qu'il avoit eu copie de la Méthode des ſuites, de celle des Fluxions, & de tout ce que Newton avoit fait en ce genre; auſſi les Journaliſtes de Leipſick refuſerent d'imprimer la réponſe de M. Fatio, qui ſans doute contenoit la preuve de tous ces faits; mais ces mêmes Journaliſtes lorſque paru-

UVA. BHSC. SC 04146

rent les Traités de Newton ſur le Nombre des Courbes du ſecond genre & ſur les Quadratures, ces Journaliſtes, dis-je, firent des Extraits où ils rabaiſſerent autant qu'ils purent la gloire de Newton ; ils dirent à l'égard des Courbes du ſecond genre que Tſchirnhaus avoit été plus loin que Newton, & à l'égard des Quadratures ils publierent que Leibnitz étoit l'Inventeur du Calcul Différentiel, Calcul néceſſaire pour trouver les Quadratures ; qu'au lieu des Différences de Leibnitz, Newton employoit & avoit toujours employé les Fluxions, comme Fabri avoit autrefois ſubſtitué à la Méthode de Cavallieri la progreſſion des Mouvements, &c. Keill piqué de cette injuſte comparaiſon & du peu de reſpect de ces Journaliſtes pour Newton, imprima en 1708. dans les Tranſactions Philoſophiques, une Lettre où il dit, qu'il eſt clair que Newton eſt le premier Inventeur de la Méthode des Fluxions, & cependant que Leibnitz après avoir changé le nom & la notation de cette Méthode des Fluxions de Newton, l'a publiée comme la ſienne dans les Actes de Leipſick. En 1711. Leibnitz ſe plaignit & cria à la calomnie contre Keill, il écrivit à M. Hans Sloane alors Sécretaire, & maintenant Préſident de la Société Royale, pour demander juſtice à cette Compagnie, exigeant en même tems un déſaveu de Keill & une reconnoiſſance qu'il n'avoit emprunté de perſonne ſon Calcul Différentiel : Keill ſe défendit par les preuves & par les Lettres dont nous venons de donner

UVA. BHSC. SC 04146

les extraits, & ſoutint que Leibnitz n'étoit que le ſecond Inventeur, & que même il étoit très-vraiſemblable, pour ne pas dire averé qu'il avoit pris de Newton les principes & le fond de ſon Calcul Différentiel, & qu'il ne lui en appartenoit en propre que la notation & le nom. Sur cela Leibnitz répondit que Keill étoit un homme trop nouveau pour ſçavoir ce qui s'étoit paſſé auparavant, & continua de demander juſtice à la Société Royale; on nomma pluſieurs Commiſſaires de toutes les Nations, on foüilla les Archives, les Lettres, les Papiers manuſcrits; & les Commiſſaires firent leur rapport contre Leibnitz en faveur de Keill, ou plûtôt de Newton; la Societé Royale fit imprimer ce rapport avec l'Extrait de toutes les piéces du Procès, ſous le titre de *Commercium Epiſtolicum*, & ne voulant pas juger, s'eſt contentée de laiſſer juger le Public; c'eſt des piéces même du Procès d'où nous avons tiré la plus grande partie des faits que nous avons cité; Leibnitz ſe plaignit verballement à ſes amis, cria beaucoup par Lettres, mais il n'écrivit rien contre ce qui venoit de ſe paſſer, rien du moins qu'on puiſſe citer; il ne parut qu'une Feüille volante, ſans nom d'Auteur, dattée du 7. Juillet 1713. ſous le titre de Jugement d'un Mathématicien du premier ordre, &c. Dans ce jugement on convient que Newton a le premier trouvé les Suites; mais on dit que dans ce tems où il a trouvé les Suites, il n'avoit pas encore même ſongé à ſon Calcul des Flu-

UVA. BHSC. SC 04146

xions, parce que dans toutes ſes Lettres citées dans le *Com. Epiſt.* non plus que dans ſon Livre des Principes, on ne voit pas le moindre veſtige des lettres ponctuées $\dot{x}$, $\ddot{x}$, $\ddot{\dot{x}}$, &c. dont il s'eſt ſervi enſuite, & qui ont paru pour la premiere fois dans le Livre de Wallis, c'eſt-à-dire, pluſieurs années après le Calcul Différentiel de Leibnitz ; & que par conſéquent le Calcul des Fluxions étoit poſtérieur au Calcul Différentiel. Ce jugement porte auſſi que Newton n'avoit connu la Méthode des Secondes Différences que long-tems après les autres. Tout cela n'avoit pas beſoin de réfutation & tomboit de ſoi-même ; cependant on répondit que la notation ne faiſoit point la Méthode, que Newton pour marquer les Fluxions ſe ſervoit tantôt de lettres ponctuées $\dot{x}$, $\dot{y}$, $\dot{z}$, &c. tantôt de lettres majuſcules X, Y, Z, &c. tantôt d'autres lettres p, q, r, &c. tantôt de lignes ; que Leibnitz au contraire n'avoit jamais déſigné les Fluxions, & qu'il n'avoit point de caractére pour cela ; car les dx, dy, dz, &c. ne marquent que les Différences, c'eſt-à-dire, les Moments que Newton marque par $\dot{o}x$, $\dot{o}y$, $\dot{o}z$, &c. c'eſt-à-dire, par le Rectangle formé du Moment o, & de la Fluxion. que la Méthode des ſecondes, troiſiémes & quatriémes Différences eſt donnée en général dans la premiere propoſition du Traité des Quadratures communiqué à Leibnitz dès l'année 1675. que Wallis avoit appliqué cette régle à des exemples de ſecon-

UVA. BHSC. SC 04146

des Différences en 1693. trois ans avant que Leibnitz eût publié la maniere de différentier les Différentielles, & qu'il étoit évident que Newton l'avoit trouvée dès 1666. dans le même tems qu'il a trouvé le Calcul des Suites & des Fluxions, &c.

Nous n'avons pris que les points principaux de cette petite Hiſtoire de la découverte du Calcul infiniteſimal, nous n'avons donné que le gros de la querelle entre Leibnitz & Newton; car il y eut des hoſtilités particulieres, des défits, des Problêmes propoſés de la part de Leibnitz & de ſes adherans, Newton ſans s'émouvoir réſolut les Problêmes & ne chercha point à ſe vanger; la ſeule choſe qu'on pourroit lui reprocher, c'eſt d'avoir laiſſé retrancher de la derniere édition de ſon Livre des Principes fait à Londres en 1726. l'article qui concernoit Leibnitz, & il faut convenir que l'on a fort mal fait, même pour la gloire de l'Auteur, qui dans cet article donne des loüanges à Leibnitz; mais en même tems s'attribuë la premiere invention de ce Calcul, *J'ai autrefois*, dit-il, *communiqué par Lettres, au très-habile Géometre M. Leibnitz, ma Méthode; il m'a répondu qu'il avoit une Méthode ſemblable, & qui ne différe preſque point du tout de la mienne, &c.* Pourquoi ſupprimer cet article? puiſqu'on l'avoit laiſſé ſubſiſter dans la ſeconde édition en 1713. c'eſt-à-dire, dans le tems de la chaleur de la conteſtation. D'ailleurs qu'en pouvoit-on craindre, après l'impreſſion du *Com. Epiſtol*? Nous obſerverons en paſſant

UVA. BHSC. SC 04146

ſant que ce n'eſt pas la ſeule choſe qu'on ait changée mal-à-propos dans cette édition de 1726. à laquelle Newton n'a ſurvécu que quelques mois, & peut-être l'Editeur a eu plus de part que lui à ces changemens.

Tandis que Leibnitz cherchoit querelle à l'inventeur du Calcul, d'autres Géometres cherchoient querelle au Calcul même; Rolle, Ceva & quelques autres prétendirent qu'il étoit erroné, & ne voulurent pas le recevoir; d'autres comme Neuwentyt, ne voulurent admettre que les premieres Différences, & rejetterent les ſecondes, troiſiémes, &c. Tout cela venoit du peu de lumiere que Leibnitz avoit répandu ſur cette Matiére; il chancela lui-même à la vûë des difficultés qu'on lui fit, & il réduiſit ſes Infinis à des Incomparables, ce qui ruinoit l'exactitude de la Méthode: Mrs Bernoulli, de l'Hopital, Taylor & pluſieurs autres Géometres éclaircirent ces difficultés, défendirent le Calcul & le firent triompher à force de le préſenter.

On étoit tranquille depuis pluſieurs années, lorſque dans le ſein même de l'Angleterre il s'eſt élevé un Docteur ennemi de la Science qui a déclaré la Guerre aux Mathématiciens; ce Docteur monte en Chaire pour apprendre aux Fidéles que la Géometrie eſt contraire à la Religion; il leur dit d'être en garde contre les Géometres, ce ſont, ſelon lui, des gens aveugles & indociles qui ne ſçavent ni raiſonner ni croire; des viſionnaires qui ſe refuſent aux

UVA. BHSC. SC 04146

choſes ſimples & qui donnent tête baiſſée dans les merveilles. Selon lui le Calcul de l'Infini eſt un myſtere plus grand que tous les myſteres de la Religion, il les compare enſemble comme choſes de même genre, & il nous dit en même-tems que le Calcul de l'Infini eſt erroné, fautif, obſcur, que les principes n'en ſont pas certains, & que ce n'eſt que par hazard quand il méne au but.

Voilà un plan d'Ouvrage bien bizarre, & un aſſortiſſement d'objets bien ſingulier ; j'ai recherché en liſant attentivement ſon Livre, les motifs qui ont pû le pouſſer à faire cette inſulte aux Mathématiciens, & j'ai reconnu que ce n'eſt pas le zele, mais la vanité qui a conduit ſa plume ; ce Docteur a l'eſprit peu fait pour les Mathématiques ; car il entaſſe Paralogiſmes ſur Paralogiſmes lorſqu'il veut refuter les Méthodes des Géometres ; mais avec cet eſprit ſi peu Géometre il ne laiſſe pas que d'avoir quelques vûës Métaphyſiques, & une Dialectique aſſez vive, il ſent apparemment toute la valeur de ces talens, & il s'efforce de rendre mépriſable tout ce qui n'eſt pas Métaphyſique ; je lui avouerai que la Métaphyſique eſt la Philoſophie premiere, qu'elle eſt la vraie ſcience intellectuelle ; mais il faut en même-tems qu'il m'accorde que c'eſt la ſcience la plus trompeuſe dans les applications qu'on en fait, & la plus difficile à ſuivre ſans s'égarer ; on peut dire que ſon Ouvrage eſt un exemple de cette vérité, puiſqu'avec ſa Métaphyſique il commet des erreurs très-

UVA. BHSC. SC 04146

grossiéres & fait des raisonnemens très-faux ; je doute qu'il en convienne, mais au moins tout le monde conviendra pour lui en lisant ses Ouvrages *, que sa fausse Métaphysique l'a conduit à une mauvaise Morale, & qu'à force de bien penser de lui-même, il est venu à fort mal penser des autres hommes.

Ce qui a donné de la célébrité à ces écrits contre les Mathématiques & les Mathématiciens, sont les réponses d'un Sçavant qui sous le nom de Philalethes Cantabrigiensis a réfuté ** le Docteur de la maniere du monde la plus solide & la plus brillante, dans deux Dissertations *** qui sont admirables par la force de raison & la finesse de raillerie qu'on y trouve par tout ; je ne sçais pas comment le Docteur pense à présent, car il y a dequoi humilier la plus orgueilleuse Métaphysique ; il n'a pas répondu à la derniere Dissertation qui pulvérisoit son Ouvrage ; mais de ses cendres il est sorti un Phenix, un homme unique, un homme au-dessus de Newton, ou du moins qui voudroit qu'on le crût tel, car il commence ¶ par le censurer & par désaprouver sa

* The Analyst. London 1734. A Defence of free-thinking in Mathematicks. Lond. 1735.

** M. Colson l'a aussi refuté dans la Préface de la Méthode des Fluxions. Lond. 1736.

*** Geometry no freind to infidelity. Lond. 1734. The minute Mathematician. Lond. 1735.

¶ A Discourse concerning Nat. and certainty of Fluxions by M. Robins. Lond. 1735.

UVA. BHSC. SC 04146

maniere trop bréve de préſenter les choſes ; enſuite il donne des explications de ſa façon , & ne craint pas de ſubſtituer ſes notions incomplettes * aux Démonſtrations de ce grand homme. Il avouë que la Géometrie de l'Infini eſt une ſcience certaine , fondée ſur des principes d'une vérité ſûre , mais enveloppée , & qui *ſelon lui n'a jamais été bien connuë ;* Newton n'a pas bien lû les Anciens Géometres , ſon Lemme de la Méthode des Fluxions eſt obſcur & mal exprimé , ſa Démonſtration eſt hypothetique ; ainſi on avoit très-grande raiſon de ne rien croire de tout cela ; ainſi M. Berckey , le Docteur n'avoit point tort lorſqu'il diſoit que les Mathématiciens croyoient les choſes ſans les entendre , notre Auteur M. Robins eſt venu au monde exprès pour le démontrer , il fait voir que Newton n'a pas les idées nettes ni les expreſſions claires , & que toute la théorie des Fluxions avoit beſoin d'un Commentateur qui fût capable non-ſeulement de corriger les fautes de la parole , mais de reformer les défauts de la penſée : malheureuſement les Mathematiciens ont été plus incrédules que jamais , il n'y a pas eu moyen de leur faire croire un ſeul mot de tout cela , de ſorte que Philalethes comme défenſeur de la verité , s'eſt chargé de lui ſignifier qu'on n'en croyoit rien , qu'on entendoit fort bien Newton ſans Robins , que les penſées & les expreſſions de ce grand Philoſo-

* State of Learning. 1735. & 1736.

UVA. BHSC. SC 04146

phes ſont juſtes & très-claires, & qu'elles n'ont beſoin pour être compriſes que d'être méditées & ſuivies ; & chemin faiſant il fait voir que ce ſont les idées de M. Robins qui ſont obſcures, que ce ſont ſes phraſes qui ne ſignifient rien, & que ſon ſtyle n'eſt intelligible que lorſqu'il ſe louë & qu'il blâme les autres ; car il eſt ſingulier, comme ce M. Robins traite les plus grands hommes, il ne craint pas de ſe deshonorer en diſant que M. Jurin eſt un ignorant auſſi bien que M. Smith, deux hommes dont le mérite ſupérieur eſt univerſellement reconnu ; je me garderai bien de le juger lui-même auſſi ſévérement, ceux qui voudront le connoître n'ont qu'à parcourir ſes Ecrits, ce ſont des piéces d'une mauvaiſe critique, aſſez groſſiérement écrite, à laquelle il vient de mettre le comble, en attaquant ſans aucune conſidération M. Euler *, & en inſultant ** ſans aucune raiſon le Grand Bernoulli. Croit-il être le premier qui ait remarqué qu'il a échappé à M. Euler quelques négligences dans ſon grand Ouvrage ſur le Mouvement ? ce ſont des petites fautes qu'on doit pardonner, en faveur du très-grand nombre de bonnes choſes dont ce Livre eſt rempli, qu'il nous donne quelque choſe qui vaille le Livre de M. Euler, après quoi nous oublirons ſes erreurs, & nous lui pardonnerons ſes odieuſes critiques.

---

* Remarcks on M. Euler's Treatiſe de Motu. Lond. 1738.
** That inelegant, *ibid.* Computiſt.

UVA. BHSC. SC 04146

Nous n'ajouterons qu'un mot à cette Préface, déja trop longue, c'eſt que quiconque apprendra le Calcul de l'Infini dans ce Traité de Newton, qui en eſt la vraie ſource, aura des idées claires de la choſe, & fera fort peu de cas de toutes les objections qu'on a faites, ou qu'on pourroit faire contre cette ſublime Méthode.

UVA. BHSC. SC 04146

ERRATA.

Je n'ai pû donner à l'impreſſion de ce Livre tous les ſoins néceſſaires ; & il s'y eſt gliſſé pluſieurs fautes que je prie le Lecteur de vouloir bien corriger.

P. Age 2. ligne 16. Nominateur, *liſez* Numerateur.
P. 3. l. 4. $a + o$ *l.* $aa + o$.
P. 4. l. 6. x, x^o *l.* x, $x^{\frac{1}{2}}$, x^o. *idem* l. 9. $aabx^{-1}$ *l.* $aabx^{-2}$.
P. 5. l. 22. $512a^{16}$ *l.* $512a^{10}$.
P. 12. l. 15. $q^3 - \frac{2}{16}ax^2$ *l.* $4a^2q - \frac{1}{16}ax^2$.
ibid. égales, *l.* égalez.
P. 15. l. 24. $\frac{2}{z} - \frac{2}{3}$ *l.* $2z^{-\frac{2}{3}}$ *id.* l. 25. dès lots. *l.* dès lors. *id.* l. derniere. $\frac{+x}{4a^2}$ *l.* $+\frac{x^4}{4a^2}$.
P. 21. l. 21. expprimé. *l.* exprimé.
P. 22. l. 28. $\frac{z}{z}$ *l.* $\frac{\dot{z}}{z}$.
P. 23. l. 21. z *l.* $\dot{z}$. *id.* l. 24. $\frac{by^3}{a+y}xx\sqrt{ay+xx}$. *l.* $\frac{by^3}{a+y} - xx\sqrt{ay+xx}$. *id.* l. 26. $-o$ *l.* $= o$.
P. 24. dans la Figure, faites un H au lieu de Π. *id.* l. 29. AD *l.* BD.
P. 29. l. 1. $\pm xx - xy$ *l.* $+\dot{x}\dot{x} - \dot{x}\dot{y}$.
P. 30. l. 34. $\ddot{x}\ddot{y}$ l. $\dot{x}\dot{y}$.
P. 31. l. 7. $-\frac{1}{x}$ *l.* $-\frac{1^2}{x}$. *id.* l. 19. $\frac{2c}{3abx^{\frac{2}{3}}}$ *l.* $\frac{3abx^{\frac{2}{3}}}{2c}$.
P. 35. l. 9. multipliés, *l.* multipliée.
P. 37. l. 15. $-6x^3$ *l.* $-2x^3$.
P. 41. l. 2. cette Equation, *l.* une Equation.
P. 44. l. 26. pour x *l.* pour $\dot{x}$.
P. 49. l. 25. $\dot{x} : \dot{y}$ *l.* $\dot{y} : \dot{x}$.
P. 52. l. 31. $\dot{x} \times \frac{CT}{BT}$ *l.* $\dot{x} \times \frac{Ct}{Bt}$.
P. 53. l. 7. ſoit AB *l.* ſoit AC. *id.* l. 18. CT & ET *l.* Ct & Et.
P. 54. dans la Figure marquez F & E qui ſont brouillez, F doit être entre B & T.
P. 55. l. 14. au point un *l.* au point D un. *id.* dans la Figure, marquez la lettre G & la lettre *d*.
P. 60. l. 12. C*d*. *l.* *c*D. *id.* l. 19. AD. *l.* A*c*.
P. 61. dans la Figure, achevez le petit *k* qui eſt au-deſſus au bout de la petite ligne ponctuée. *id.* l. 32. *yy l. by.*
P. 62. l. 13. BT *l.* B*t*. *id.* l. 22. AD *l.* BD.
P. 63. l. 12. Lignees *l.* Lignes.
P. 64. dans la Figure, au lieu de λ mettez δ. *id.* l. 31. D*h* *l.* *dh*. *id.* l. 38. point C. *l.* point D.
P. 65. l. 8. ſe rencontrent plus loin *l.* ſe rencontrent plûtôt en H, & celles qui ſont ſur le côté moins courbe D*d* ſe rencontrent plus loin.
P. 66. l. 10. égal à z *l.* égal à $\dot{z}$.
P. 68. l. 3. $-x^2$ *l.* $-xy^2$.
P. 69. l. 6. d'où $-\frac{2b^2cz}{y^3}$ *l.* $-\frac{2b^2c^2z}{y^3}$.
P. 73. l. 14. ſoit BC. *l.* ſoit BK.
P. 74. l. 14. $\frac{y+yzz}{1+zz-z}$ *l.* $\frac{y+yzz}{1+zz-\dot{z}}$.
P. 76. l. 22. AQ *l.* Aβ.
P. 79. l. 2. $\frac{a^2x}{6xx}$ *l.* $\frac{a^2\dot{x}}{6xx}$. *id.* dans la Figure mettez D au lieu de ⊃.
P. 81. l. 2. quantité *l.* qualité. *id.* l. 15. l'Arc AK *l.* l'Arc BK.
P. 82. dans la Figure, prolongez un peu la ligne DC. *id.* l. 18. $x = 1$ *l.* $\dot{x} = 1$.
P. 84. l. 4. $t = \sqrt{\frac{1}{2}}$ *l.* $t = \sqrt{\frac{1}{2}}$.
P. 87. l. 9. $2zz$ *l.* $2\dot{z}z$. *id.* exterminé $\dot{z}$. *l.* exterminé z. *id.* l. 11. $\frac{3uu^2}{b} = z$ *l.* $\frac{3uu^2}{b} = \dot{z}$. *id.* l. 15. $+\frac{5}{2}z$ *l.* $+\frac{2}{5}z$.
P. 88. l. 11. $= y$, l'Aire AGEC *l.* $= y$, l'Aire AFDB $= s$, l'Aire AGEC.
P. 89. l. 22. $+\frac{zz}{aa}$ *l.* $+\frac{2\dot{z}z}{aa}$.
P. 90. l. 6. $45sz$ *l.* $45\dot{s}z$.
P. 92. l. 6. $\frac{1}{2}$ *l.* $\frac{1}{2}a$.
P. 96. l. 4. $\frac{\sqrt{1+axx}}{1-bxx}$ donne *l.* $\frac{\sqrt{1+axx}}{1-bxx} = \dot{z}$ donne.
P. 97. l. 27. *liſez* ainſi $aX - \frac{a^3}{X}$. *id.* l. 29. ou en le ſuppoſant infini *l.* ou en ſuppoſant X infini.
P. 98. dans la Figure, marquez le petit *d* au-deſſus de la ligne ponctuée G*b*.

UVA. BHSC. SC 04146

P. 101. l. 20. 7964 *l.* 7973.
P. 103. l. 18. 4000080 *l.* 4000000.
P. 109. dans la Figure au lieu de *x* qui eſt entre les lettres C & *c* écrivez *x*.
P. 114. l. 23. par $-\frac{1}{2}$ *l.* par $-\frac{3}{2}-\frac{1}{4}-\frac{7}{6}-\frac{2}{9}-\frac{11}{10}$ ou dans le 4e Ordre en multipliant par $-\frac{1}{2}$ *id.* l. derniere $+\frac{de^2}{f^3}z^n$ *liſ.* $+\frac{de^2}{nf^3}z^n$.
P. 122. l. 37. Conique *b*, *l.* Conique, *b*.
P. 123. l. 19. détermine *l.* termine.
P. 126. l. 6. d'égalité *l.* d'inégalité.
P. 128. l. 4. ou a *l.* on *a*.
P. 129. l. 2. $-\frac{1}{5}x^{\frac{5}{2}}$ *l.* $-\frac{1}{5}x^{\frac{5}{2}}$.
P. 130. l. 2. $\frac{1}{175}x^{\frac{5}{2}}$ *l.* $\frac{1}{175}x^{\frac{7}{2}}$ *id.* l. 12 $\frac{z}{q}$ *l.* $\frac{z}{b}$. *id.* l. 16. l'Aire ci-deſſus devient u^3 *l.* vous aurez u^3.
P. 133. l. 19. GK. *l.* GC. *ibid.* $a+4x$ *liſez* $\frac{a+4x}{a}$. *id.* l. 22. AL $-\frac{1}{2}a$ *l.* AL $-\frac{1}{2}a$.
P. 135. l. 31. donc $2a$ *l.* donc $\frac{1}{2}a$.
P. 136. l. 15. $-y^2z$ *l.* $-y^2\dot{z}$.
P. 137. l. 22. Rs *l.* RS. *id.* l. 25. R*sr* *l.* RS*r*.
P. 138. l. 22. $=4ay$ *l.* $=4a\dot{y}$.
P. 144. l. 21. $=\frac{1}{2}$ AV *l.* $=\frac{1}{3}$ AV. *id.* dans la Figure au lieu de X écrivez K.
P. 145. l. 11. quarrée eſt *l.* quarrée.
P. 146. l. 4. βp *l.* $\beta\delta$. *id.* l. 24. Racine $4bx$ *liſ.* Racine $\frac{1}{4bz}$.

UVA. BHSC. SC 04146

LA METHODE DES FLUXIONS.

I. J'Ai obſervé que les Géometres modernes ont la pluſpart négligé la Syntheſe des anciens, & qu'ils ſe ſont appliqués principalement à cultiver l'Analyſe; cette Methode les a mis en état de ſurmonter tant d'obſtacles, qu'ils ont épuiſé toutes les Spéculations de la Géometrie, à l'exception de la Quadrature des Courbes & de quelques autres matieres ſemblables, qui ne ſont point encore diſcutées; cela joint à l'envie de faire plaiſir aux jeunes Géometres, m'a engagé à compoſer le Traité ſuivant, dans lequel j'ai tâché de reculer encore les limites de l'Analyſe, & de perfectionner la ſcience des Lignes Courbes.

II. La grande conformité qui ſe trouve dans les Opérations litterales de l'Algebre, & dans les Opérations numeriques de l'Arithmetique; cette reſſemblance ou analogie, qui ſeroit parfaite, ſi les Caracteres n'étoient pas differens, les premiers étant généraux & indéfinis, & les autres particuliers & définis, devoit naturellement nous conduire à en faire uſage; & je ne puis qu'être étonné de ce

UVA. BHSC. SC 04146

que perſonne, à moins que vous ne vouliez excepter M. *Mercator*, *de Quadratura Hyperbolæ*, n'a ſongé à appliquer à l'Algebre la doctrine des Fractions Decimales, puiſque cette application ouvre la route pour arriver à des découvertes plus importantes & plus difficiles. Mais, puiſqu'en effet cette doctrine reduite en eſpeces doit avoir avec l'Algebre la même relation que la doctrine des Nombres Decimaux ſe trouve avoir avec l'Arithmetique ordinaire, il ſuffit de ſçavoir l'Arithmetique & l'Algebre, & d'obſerver la correſpondance qui doit être entre les Fractions Decimales & les Termes Algebriques continués à l'infini, pour faire les Opérations de l'Addition, Souſtraction, Multiplication, Diviſion & Extraction de Racines dans cette nouvelle façon de calcul. Car comme dans les Nombres les places à droite diminuent en raiſon Decimale, ou Soudecuple, il en eſt reſpectivement de même dans les eſpeces, lorſque les Termes ſont diſpoſés en Progreſſion uniforme continuée à l'infini, ſuivant l'ordre des dimenſions d'un Nominateur ou Dénominateur quelconque; & comme les Fractions Decimales ont l'avantage de transformer en quelque façon toutes les Fractions ordinaires & tous les Radicaux en Nombres entiers, de ſorte que, lorſque ces Fractions & ces Nombres ſourds ſont reduits en Decimales, ils peuvent être traités comme des Nombres entiers; de même les ſuites infinies ont l'avantage de reduire à la claſſe des Quantités ſimples toutes les eſpeces de Termes compliqués, tels que les Fractions dont les Dénominateurs ſont des Quantités complexes, les Racines des Quantités compoſées ou des Equations affectées, & d'autres ſemblables; c'eſt-à-dire qu'elles donnent la commodité de pouvoir les exprimer par une ſuite infinie de Fractions, dont les Numerateurs & les Dénominateurs ſont des Termes ſimples, ce qui applanit des difficultés, qui ſous la forme ordinaire, auroient paru inſurmontables. Je vais donc commencer par faire voir comment ces Reductions doivent ſe faire, ou ce qui eſt la même choſe, comment une Quantité compoſée quelconque peut être reduite à des Termes ſimples, dans les cas ſur-tout où la Methode de calculer ne ſe préſente pas d'abord; j'appliquerai enſuite cette Analyſe à la ſolution des Problêmes.

III. La Reduction par la Diviſion & par l'Extraction des Racines ſe concevra clairement par les exemples ſuivans, en comparant les façons d'opérer en Nombres & en Eſpeces.

UVA. BHSC. SC 04146

Exemples de Reduction par la Diviſion.

IV. La Fraction $\frac{aa}{b+x}$ étant propoſée, Diviſes aa par $b+x$ de la maniere qui ſuit.

$$b+x)\,aa+0\,\Big(\frac{aa}{b}-\frac{aax}{b^2}+\frac{aax^2}{b^3}-\frac{aax^3}{b^4}+\frac{aax^4}{b^5},\ \&c.$$

$$\begin{array}{l}
aa+\frac{aax}{b} \\
\hline
0-\frac{aax}{b}+0 \\
\quad -\frac{aax}{b}-\frac{aax^2}{b^2} \\
\hline
0+\frac{a^2x^2}{b^2}+0 \\
\quad +\frac{a^2x^2}{b^2}+\frac{a^2x^3}{b^3} \\
\hline
0-\frac{a^2x^3}{b^3}+0 \\
\quad -\frac{a^2x^3}{b^3}-\frac{a^2x^4}{b^4} \\
\hline
0+\frac{a^2x^4}{b^4},\ \&c.
\end{array}$$

Le Quotient eſt donc $\frac{aa}{b}-\frac{a^2x}{b^2}+\frac{a^2x^2}{b^3}-\frac{a^2x^3}{b^4}+\frac{a^2x^4}{b^5}$, &c. laquelle ſuite étant continuée à l'infini $=\frac{aa}{b+x}$. ou ſi l'on fait x le premier Terme du Diviſeur de cette façon, $x+b\,(aa+0$, alors le Quotient ſera $\frac{aa}{x}-\frac{aab}{x^2}+\frac{aab^2}{x^3}-\frac{aab^3}{x^4}$, &c. ce que l'on trouvera par la même maniere que ci-deſſus.

V. De même la Fraction $\frac{1}{1+xx}$, ſe reduira à $1-x^2+x^4-x^6+x^8$, &c. ou bien à $x^{-2}-x^{-4}+x^{-6}-x^{-8}$, &c.

VI. Et la Fraction $2x^{\frac{1}{2}}-x^{\frac{3}{2}}$, ſe reduira à $2x^{\frac{1}{2}}-2x+7x^{\frac{5}{2}}-$
$\overline{1+x^{\frac{1}{2}}-3x}$
$13x^2+34x^{\frac{5}{2}}$, &c.

UVA. BHSC. SC 04146

VII. Il convient ici d'obſerver que je me ſers de x^{-1}, x^{-2}, x^{-3}, x^{-4}, &c. au lieu de $\frac{1}{x}$, $\frac{1}{x^2}$, $\frac{1}{x^3}$, $\frac{1}{x^4}$, &c. de $x^{\frac{1}{2}}$, $x^{\frac{3}{2}}$, $x^{\frac{5}{2}}$, $x^{\frac{1}{3}}$, $x^{\frac{2}{3}}$, &c. au lieu de $\sqrt{x}$, $\sqrt{x^3}$, $\sqrt{x^5}$, $\sqrt[3]{x}$, $\sqrt[3]{x^2}$, & de $x^{-\frac{1}{2}}$, $x^{-\frac{2}{3}}$, $x^{-\frac{1}{4}}$, &c. au lieu de $\frac{1}{\sqrt{x}}$, $\frac{1}{\sqrt[3]{x^2}}$, $\frac{1}{\sqrt[4]{x}}$, &c. Et cela par regle d'Analogie, comme on peut le concevoir par des Progreſſions Géometriques ſemblables à celles-ci, x^3, $x^{\frac{5}{2}}$, x^2, $x^{\frac{3}{2}}$, x, x^0 ou 1, $x^{-\frac{1}{2}}$, x^{-1}, $x^{-\frac{3}{2}}$, x^{-2}, &c.

VIII. Ainſi au lieu de $\frac{aa}{x} - \frac{aab}{x^2} + \frac{aab^2}{x^3}$, &c. on peut écrire $aax^{-1} - aabx^{-2} + aab^2x^{-3}$, &c.

IX. Et au lieu de $\sqrt{aa-xx}$, on peut écrire $\overline{aa-xx}\,|^{\frac{1}{2}}$, & $\overline{aa-xx}\,|^2$, au lieu du Quarré de $aa-xx$, & $\left.\frac{abb-y^3}{by+yy}\right|^{\frac{1}{3}}$ au lieu de $\sqrt[3]{\frac{ab^2-y^3}{by+yy}}$, & ainſi des autres.

X. Ainſi il convient aſſez de diſtinguer les Puiſſances en Affirmatives, Négatives; Entieres & Rompuës.

UVA. BHSC. SC 04146

Exemples de Reduction par l'Extraction des Racines.

XI. La quantité $aa + xx$ étant proposée, vous pouvez en extraire la Racine quarrée, comme vous le voyez ici.

$$aa + xx \left(a + \frac{xx}{2a} - \frac{x^4}{8a^3} + \frac{x^6}{16a^5} - \frac{5x^8}{128a^7} + \frac{7x^{10}}{256a^9} - \frac{21x^{12}}{1024a^{11}}, \text{ \&c.}\right.$$

$$\begin{array}{l|l}
aa & a + \frac{xx}{2a} - \frac{x^4}{8a^3} + \frac{x^6}{16a^5} - \frac{5x^8}{128a^7} + \frac{7x^{10}}{256a^9} - \frac{21x^{12}}{1024a^{11}}, \text{ \&c.} \\
0 + xx & \\
+ xx + \frac{x^4}{4a^2} & \\
- x^4 & \\
\frac{4a^2}{4a^2} & \\
- \frac{x^4}{4a^2} - \frac{x^6}{8a^4} + \frac{x^8}{64a^6} & \\
+ \frac{x^6}{8a^4} - \frac{x^8}{64a^6} & \\
+ \frac{x^6}{8a^4} + \frac{x^8}{16a^6} - \frac{x^{10}}{64a^8} + \frac{x^{12}}{256a^{10}} & \\
- \frac{5x^8}{64a^6} + \frac{x^{10}}{64a^8} - \frac{x^{12}}{256a^{10}}, \text{ \&c.} & \\
\frac{5x^8}{64a^6} + \frac{5x^{10}}{128a^8} + \frac{5x^{12}}{512a^{10}} & \\
+ \frac{7x^{10}}{128a^8} - \frac{7x^{12}}{512a^{10}}, \text{ \&c.} & \\
\frac{7x^{10}}{128a^8} + \frac{7x^{12}}{256a^{10}} & \\
- \frac{21x^{12}}{512a^{10}}, \text{ \&c.} &
\end{array}$$

La Racine se trouve donc être $a + \frac{x^2}{2a} - \frac{x^4}{8a^3} + \frac{x^6}{16a^5}$, &c.

On peut observer que vers la fin de l'Opération je néglige tous les Termes dont les Dimensions surpassent les Dimensions du dernier Terme, c'est-à-dire du Terme auquel je veux finir ma suite, par Exemple, $\frac{x^{12}}{a^{11}}$.

UVA. BHSC. SC 04146

XII. En changeant l'ordre des Termes, c'eſt-à-dire en écrivant $xx + aa$, la Racine ſera $x + \frac{aa}{2x} - \frac{a^4}{8x^3} + \frac{a^6}{16x^5} - \frac{5a^8}{128x^7}$, &c.

XIII. Ainſi la Racine de $aa - xx$ eſt $a - \frac{xx}{aa} - \frac{x^4}{8a^3} - \frac{x^6}{16a^5}$, &c.

XIV. La Racine de $x - xx$ eſt $x^{\frac{1}{2}} - \frac{1}{2}x^{\frac{3}{2}} - \frac{1}{8}x^{\frac{5}{2}} - \frac{1}{16}x^{\frac{7}{2}}$, &c.

XV. Celle de $aa + bx - xx$ eſt $a + \frac{bx}{2a} - \frac{xx}{2a} - \frac{b^2x^2}{8a^3}$, &c.

XVI. Et $\sqrt{\frac{1 + axx}{1 - bxx}}$ eſt $\frac{1 + \frac{1}{2}ax^2 - \frac{1}{8}a^2x^4 + \frac{1}{16}a^3x^6, \text{ \&c.}}{1 - \frac{1}{2}bx^2 - \frac{1}{8}b^2x^4 - \frac{1}{16}b^3x^6, \text{ \&c.}}$ & en diviſant actuellement, on aura

$$\begin{array}{llll} 1 + \frac{1}{2}bx^2 & + \frac{3}{8}b^2 & x^4 & + \frac{5}{16}b^3x^6, \text{ \&c.} \\ + \frac{1}{2}a & + \frac{1}{4}ab & & + \frac{3}{16}ab^2 \\ & - \frac{1}{8}a^2 & & - \frac{1}{16}a^2b \\ & & & + \frac{1}{16}a^3 \end{array}$$

XVII. Mais ces Opérations peuvent être abregées par une préparation convenable. Dans l'Exemple précedent $\sqrt{\frac{1 + axx}{1 - bxx}}$, ſi la Forme du Numerateur & du Dénominateur n'avoit pas été la même, j'aurois pû les multiplier tous deux par $\sqrt{1 - bxx}$, ce qui auroit produit $\frac{\sqrt{1 + ax^2 - abx^4}}{1 - bxx}$, auquel cas il ne reſte plus qu'à extraire la Racine du Numerateur ſeulement, & la diviſer par le Dénominateur.

XVIII. Je m'imagine qu'en voilà aſſez pour faire connoître comment on peut extraire les autres Racines, quelque compliquées qu'elles ſoient, comme

$$x^3 + \left(\frac{\sqrt{x - \sqrt{1 - xx}}}{\sqrt[3]{axx + x^3}} - \frac{\sqrt[5]{x^3 + 2x^5 - x^{\frac{5}{2}}}}{\sqrt[3]{x + xx} - \sqrt{2x - x^{\frac{2}{3}}}} \right)$$

& les reduire à une ſuite infinie de Termes Simples.

De la Reduction des Equations Affectées.

XIX. Il faut que nous entrions dans un détail un peu plus grand, pour expliquer comment on doit reduire les Racines de ces Equations à des ſuites infinies; car ce que les Géomettres nous ont donné

UVA. BHSC. SC 04146

ſur les Equations en Nombres, eſt extrêmement embaraſſé, & chargé d'Opérations ſuperfluës; de ſorte qu'on ne peut prendre ſur cela un bon Modele pour faire les mêmes Opérations en Eſpeces. Je ferai donc voir d'abord comment ſe doit faire en Nombres la Reduction des Equations Affectées, & enſuite j'appliquerai la Methode aux Eſpeces.

XX. Soit l'Equation $y^3 - 2y - 5 = 0$ à reduire en ſuite infinie, prenez un Nombre comme 2, qui ne differe pas d'une de ſes dixiemes Parties de la vraie valeur de la Racine, & faites $2 + p = y$, ſubſtituez $2 + p$ pour y dans l'Equation donnée, & vous aurez $p^3 + 6p^2 + 10p - 1 = 0$, dont il faut chercher la Racine pour l'ajoûter au Quotient; rejettez $p^3 + 6p^2$ à cauſe de ſa petiteſſe, il reſtera $10p - 1 = 0$, ou $p = 0,1$, ce qui eſt très-près de la vraie valeur de p; c'eſt pourquoi l'écrivant au Quotient, je fais $0,1 + q = p$, & ſubſtituant comme auparavant, j'ai $q^3 + 6,3q^2 + 11,23q + 0,061 = 0$, négligeant les deux premiers Termes, il reſte $11,23q + 0,061 = 0$, ou $q = -0,0054$ à peu près (& cela en diviſant 0,061 par 11,23 juſqu'à ce qu'on ait autant de Figures qu'il y a de places entre les premieres Figures de ce Quotient & le principal Quotient exclusivement, comme ici où il a deux places entre 2 & 0,005) J'écris donc $-0,0054$ dans le Quotient, mais au-deſſous parce que ce Terme eſt Négatif; & ſuppoſant $-0,0054 + r = q$, je ſubſtitue comme auparavant, & je continue ainſi l'Opération auſſi long-tems qu'il convient, comme on le peut voir ci-deſſous.

$y^3 - 2y - 5 = 0$		$+2,10000000$ $-0,0054485\,2$ $+2,0945514\,8$, &c. $= y$
$2 + p = y$	$+ y^3$ $- 2y$ $- 5$	$+8 + 12p + 6p^2 + p^3$ $-4 - 2p$ -5
SOMME.		$-1 + 10p + 6p^2 + p^3$
$0,1 + q = p$	$+ p^3$ $+ 6p^2$ $+ 10p$ $- 1$	$+0,001 + 0,03q + 0,3q^2 + q^3$ $+0,06 + 1,2 + 6$ $+1, + 10,$ $-1,$
SOMME.		$+0,061 + 11,23q + 6,3q^2 + q^3$
$-0,0054 + r = q.$	$+ q^3$ $+ 6,3\ q^2$ $+ 11,23\ q$ $+ 0,061$	$-0,000000015\,\#\,\#\,\# + 0,000087\,\#\,\#\,8r - 0,0162r^2 + r^3$ $+0,0001837\,08 - 0,068\,\#\,\# + 6,3$ $-0,060642 + 11,23$ $+0,061$
SOMME.		$+0,0005416 + 11,162r$
$-0,0000485\,2 + s = r$		

UVA. BHSC. SC 04146

XXI. On peut abreger le Calcul vers la fin de l'Opération, & cela principalement dans les Equations qui ont pluſieurs Dimenſions; vous déterminerez d'abord juſqu'où vous voulez pouſſer votre Extraction, c'eſt-à-dire combien vous voulez que le Quotient contienne de Chiffres; enſuite vous compterez autant de Chiffres moins un après la premiere Figure du Coefficient du dernier Terme des Equations, qu'il reſte de Places à remplir dans le Quotient, & vous rejetterez les Decimales qui ſuivent; dans le dernier Terme il faudra négliger les Decimales qui ſeront au-delà du nombre des Figures du Quotient; dans le Terme antepénultiéme toutes celles qui ſeront en-deçà de ce même nombre de Figures, en procedant ainſi Arithmetiquement, ſuivant l'intervalle des Chiffres; ou bien, ce qui eſt la même choſe, vous couperez par-tout autant de Figures que dans le terme pénultiéme; de ſorte que leurs Places les plus éloignées ſoient en progreſſion Arithmétique, ſelon la ſuite des Termes, ou ſoient ſuppoſées remplies de Chiffres, lorſque cela arrive autrement. Ainſi dans l'exemple ci-deſſus, ſi je ne veux pas pouſſer mon Extraction, ou continuer mon Quotient plus loin que la huitiéme Figure des Decimales; lorſque j'aurai ſubſtitué $0,00054 + r$ pour q, il y aura dans le Quotient quatre Places de Decimales remplies, & autant qui demeureront à remplir; je puis donc négliger les Figures dans les cinq places les plus éloignées, & c'eſt pour cela que je les ai croiſées de petites lignes; & à la vérité j'aurois pû négliger auſſi le premier Terme r^3 quoique ſon Coefficient ſoit $0,99999$, &c. Ainſi en ne tenant plus compte de ces Figures, l'on aura dans l'Opération ci-deſſus $0,00005416 + 11,162r$ pour la ſomme, ce qui par la Diviſion continuée auſſi loin que le terme preſcrit, donne pour la valeur de r, $— 0,00004852$, ce qui remplit le Quotient juſqu'au Terme preſcrit; il ne reſte qu'à ſouſtraire le Négatif du Quotient de l'Affirmatif, & l'on aura $2,09455148$ pour la Racine de l'Equation propoſée.

XXII. On peut auſſi remarquer que ſi l'on ſoupçonnoit au commencement de l'Opération que $0,1 = p$ ne donnât pas une aſſez grande approximation de la vraie valeur de la Racine, il faudroit au lieu de $10p - 1 = 0$ faire $6p^2 + 10p - 1 = 0$, & écrire dans le Quotient la premiere Figure de la Racine de cette Equation; il convient donc de trouver ainſi la deuxiéme & même la troiſiéme Figure du Quotient, lorſque dans les Equations ſecondaires le Quarré du Coefficient du Terme pénultiéme n'eſt pas dix fois plus grand que le produit du dernier Terme multiplié par le Coefficient de l'antepénultiéme. On s'épargnera ſouvent bien du travail, ſur-tout dans les Equations de pluſieurs

UVA. BHSC. SC 04146

pluſieurs Dimenſions, ſi l'on cherche avec cette exactitude les Figures qu'il faut ajoûter au Quotient, c'eſt-à-dire ſi l'on extrait ainſi la plus petite Racine des trois derniers Termes des Equations; car cela donnera à chaque Opération autant de Figures au Quotient.

XXIII. Cette maniere de reduire les Equations numeriques va nous conduire à celles des Equations litterales; mais il faut obſerver.

XXIV. 1°. Que l'un des Coefficiens litteraux, ſuppoſé qu'il y en ait plus d'un, doit être diſtingué des autres, lequel Coefficient eſt ou peut être ſuppoſé de beaucoup le plus grand, ou le plus petit de tous, ou bien le plus approchant d'une quantité donnée; & cela parce que ſes Dimenſions augmentant continuellement dans les Numerateurs ou dans les Dénominateurs des Termes du Quotient, ces Termes doivent devenir toujours moindres, & par conſéquent le Quotient doit toujours approcher de la vraie valeur de la Racine, comme on peut le voir dans les Exemples de Reduction par la Diviſion & l'Extraction de Racine de la Lettre x; je m'en ſervirai dans la ſuite auſſi-bien que de la Lettre z pour marquer les Racines dont on cherche la valeur, & je me ſervirai de y, p, q, r, s, &c. pour exprimer les Radicaux qu'il faut extraire.

XXV. 2°. Lorſque l'Equation contient des Fractions complexes, ou des Quantités irrationelles, ou lorſqu'il s'en trouve après l'Opération, il faut pour plus de facilité s'en débaraſſer par les Methodes que les Analyſtes nous ont données pour cela. Comme ſi l'Equation propoſée étoit $y^3 + \frac{bb}{b-x}y^2 - x^3 = 0$, il faudroit multiplier par $b - x$, & tirer la Racine y du Produit $by^3 - xy^3 + bby^2 - bx^3 + x^4 = 0$; ou bien on peut ſuppoſer $y(b-x) = u$, car en écrivant $\frac{v}{b-x}$ au lieu de y on aura $v^3 + b^2v^2 - b^3x^3 + 3b^2x^4 - 3bx^5 + x^6 = 0$, dont, après avoir tiré la Racine v, il faudra diviſer le Quotient par $b - x$ pour avoir la valeur de y. De même ſi l'Equation propoſée étoit $y^3 - xy^{\frac{1}{2}} + x^{\frac{4}{3}} = 0$, on pourroit faire $y^{\frac{1}{2}} = v$ & $x^{\frac{1}{3}} = z$, ce qui donneroit $v^6 - z^3v + z^4 = 0$, dont, après avoir extrait la Racine, on tireroit par la Subſtitution les valeurs de x & y, car on trouvera la Racine $v = z + z^3 + 6z^5$, &c. & ſubſtituant, on auroit $y^{\frac{1}{2}} = x^{\frac{1}{3}} + x + 6x^{\frac{5}{3}}$, &c. ou $y = x^{\frac{2}{3}} + 2x^{\frac{4}{3}} + 13x^2$, &c.

XXVI. Et de même s'il ſe trouve des Dimenſions Négatives de x & y, on les fera diſparoître en multipliant par x & y; comme ſi l'Equation propoſée étoit $x^3 + 3x^2y^{-1} - 2x^{-1} - 16y^{-3} = 0$, en multipliant par x & y^3, on aura $x^4y^3 + 3x^3y^2 - 2y^3 - 16x = 0$. Et ſi l'Equation étoit $x = \frac{aa}{y} - \frac{2a^3}{y^2} + \frac{3a^4}{y^3}$, en multipliant par y^3 on

UVA. BHSC. SC 04146

aura $xy^3 = a^2y^2 - 2a^3y + 3a^4$, & ainſi des autres.

XXVII. 3°. Après que l'Equation ſera ainſi préparée, il faut commencer l'Opération par trouver le premier Terme du Quotient. Nous allons donner une regle génerale pour cela, auſſi-bien que pour trouver les Termes ſuivans, lorſque l'Eſpece x ou z eſt ſuppoſée petite, ce qui ſervira pour les deux autres cas qui ſont reductibles à celui-ci.

XXVIII. De tous les Termes dans leſquels l'Eſpece Radicale y ou p, q, r, &c. ne ſe trouve pas, prenez celui qui eſt le plus bas eu égard aux Dimenſions de l'Eſpece indéfinie x ou z; puis entre les Termes dans leſquels cette Eſpece Radicale y, ſe trouve, choiſiſſez-en un, tel que la Progreſſion des Dimenſions de chacune de ces Eſpeces depuis le Terme que vous aurez pris d'abord, juſqu'à celui-ci, deſcende le plus, ou monte le moins qu'il ſe pourra; & ſi l'Equation contient quelques autres termes, dont les Dimenſions tombent dans cette Progreſſion continuée à volonté, il faudra les joindre aux deux autres, & égaler leur ſomme totale à zero, ce qui donnera la valeur de l'Eſpece Radicale qu'il faudra écrire dans le Quotient.

XXIX. La Figure ſuivante facilitera l'uſage, & donnera une idée plus claire de cette regle. Diviſez l'Eſpace Angulaire ABC en petits Quarrés ou Paralellogrammes égaux, dans leſquels vous inſcrirez x & y ſelon leurs Dimenſions, comme vous le voyez. Quand on vous propoſera une Equation, marquez tous les Paralellogrammes qui correſpondent par leurs Dimenſions à tous les Termes de l'Equation; puis appliquez une Regle à l'Angle du Paralellogramme le plus bas à main gauche de tous les Paralellogrammes marqués, faites tourner cette Regle juſqu'à ce qu'elle touche un ou plus d'un Paralellogramme marqué à main droite, ſans qu'elle quitte celui qui eſt à main gauche; prenez ces termes que la Regle touche, & en les égalant à zero, tirez-en la quantité qu'il faut écrire au Quotient.

B

x^4	x^4y	x^4y^2	x^4y^3	x^4y^4
x^3	x^3y	x^3y^2	x^3y^3	x^3y^4
x^2	x^2y	x^2y^2	x^2y^3	x^2y^4
x	xy	xy^2	xy^3	xy^4
1	y	y^2	y^3	y^4

A C

XXX. Par exemple pour tirer la Racine y de l'Equation $y^6 - 5xy^5 + \frac{x^3}{a}y^4 - 7a^2x^2y^2 + 6a^3x^3 + b^2x^4 = 0$, je marque les Paralellogrammes auſquels les termes de cette Equation appartiennent de la Note *, puis j'applique la Regle DE au plus bas Paralellogram-

UVA. BHSC. SC 04146

me marqué à main gauche, & je la fais tourner à main droite, juſqu'à ce qu'elle touche un ou plus d'un autre Paralellogramme marqué; je vois que ceux qu'elle touche appartiennent à x^3, x^2y^2 & y^6 je prens donc dans l'Equation les Termes de ces Dimenſions, ſçavoir $y^6 - 7a^2x^2y^2 + 6a^3x^3$, & je les égale à zero; & pour avoir une Equation plus ſimple, je fais $y = v\sqrt{ax}$ ce qui en ſubſtituant me donne $v^6 - 7v^2 + 6 = 0$, dont les Racines $\pm\sqrt{ax}$ & $\pm\sqrt{2ax}$ me donnent chacune à mon choix le premier Terme du Quotient, & cela ſelon la Racine de cette Equation que j'ai deſſein de tirer.



XXXI. Si l'Equation propoſée étoit $y^5 - by^2 + 9bx^2 - x^3 = 0$, je choiſirois $-by^2 + 9bx^2$, dont je tirerai $+3x$ pour le premier Terme du Quotient.

XXXII. Dans l'Equation $y^3 + axy + aay - x^3 - 2a^3 = 0$, je choiſis $y^3 + a^2y - 2a^3$, & j'écris au Quotient ſa Racine $+a$.

XXXIII. De même dans l'Equation $x^2y^5 - 3c^4xy^2 - c^5x^2 + c^7 = 0$, je prens $x^2y^5 + c^7$ ce qui me donne $-\sqrt[5]{\frac{c^7}{x}}$ pour le premier Terme du Quotient, & ainſi des autres.

XXXIV. Mais lorſqu'après avoir trouvé ce Terme, il arrive que ſa Puiſſance eſt Négative, j'abaiſſe l'Equation, c'eſt-à-dire je la multiplie par cette même Puiſſance Négative, afin qu'il ne ſoit pas neceſſaire de le faire dans la Réſolution, & outre cela pour que la Regle que nous donnerons pour retrancher les Termes ſuperflus, puiſſe être appliquée comme il faut. Par exemple ſi l'Equation propoſée étoit $8z^6y^3 + az^6y^2 - 27a^9 = 0$ le premier Terme du Quotient ſeroit $\frac{3a^3}{2z^2}$ ainſi je multiplierai l'Equation par z^{-2} & j'aurai $8z^4y^3 + az^4y^2 - 27a^9z^{-2} = 0$, de laquelle je chercherai la Réſolution.

XXXV. Par cette Methode continuée, on trouve les Termes ſuivans du Quotient, en les tirant des Equations ſecondaires, ce qui ſe fait d'ordinaire plus aiſément que l'Extraction du premier Terme, car il ſuffit de diviſer le plus bas des Termes affectés de la petite eſpece x ou x^2, x^3, &c. & non affectés de l'Eſpece Radicale p ou q, r, &c. par la quantité dont cette Eſpece Radicale qui n'a qu'une Dimenſion, eſt affectée, ſans être affectée de l'Eſpece indéfinie; & enſuite écrire au Quotient le Réſultat. Ainſi dans l'Exemple ſuivant

UVA. BHSC. SC 04146

les Termes $\frac{x}{4}$, $\frac{xx}{64a}$, $\frac{131x^3}{512a^2}$, &c. ſont produits par la Diviſion de a^2x, $\frac{1}{16}ax^2$, $\frac{131}{128}x^3$ par $4aa$.

XXXVI. Il nous reſte maintenant à montrer la pratique de la Réſolution. Soit donc pour Exemple l'Equation $y^3 + a^2y + axy - 2a^3 - x^3 = o$, dont il faille tirer la Racine; je choiſis, comme je l'ai dit les Termes $y^3 + a^2y - 2a^3$, qui étant égalés à zero, me donnent $y - a = o$, ainſi j'écris $+ a$ dans le Quotient; mais parce que $+ a$ n'eſt pas la valeur complette de y je fais $a + p = y$, & je ſubſtitue dans l'Equation cette valeur de y, & parmi les Termes $p^3 + 3ap^2 + axp$, &c. qui en réſultent; je choiſis de la même façon les Termes $+ 4a^2p + a^2x$, qui étant égalés à zero donnent $p = -\frac{1}{4}x$, j'écris donc $-\frac{1}{4}x$ au Quotient; mais parce que $-\frac{1}{4}x$ n'eſt pas la valeur exacte de p, je fais $-\frac{1}{4}x + q = p$, & ſubſtituant cette valeur je choiſis dans les Termes $q^3 - \frac{3}{4}xq^2 + 3aq^2$, &c. qui en réſultent, les Termes $q^3 - \frac{2}{16}ax^2$ qui étant égales à zero donnent $q = \frac{xx}{64a}$ que j'écris au Quotient, mais comme $\frac{xx}{64a}$ n'eſt pas la valeur exacte de q, je fais $\frac{xx}{64a} + r = q$, & je ſubſtitue comme ci-deſſus, ce qui ſe peut continuer auſſi long-tems qu'on voudra, comme on peut le voir dans la Figure ſuivante.

UVA. BHSC. SC 04146

$y^3+a^2y-2a^3+axy-x^3=0.\ y=a-\frac{x}{4}+\frac{x^2}{64a}+\frac{131x^3}{512a^2}+\frac{509x^4}{16384a^3}$ &c.

$+a+p=y.$	$+y^3$ $+axy$ $+a^2y$ $-x3$ $-2a^3$
	$+a^3$ $+3a^2p+3ap^2+p^3$ $+a^2x+axp$ $+a^3$ $+a^2p$ $-x^3$ $-2a3$
$-\frac{1}{4}x+q=p.$	$+p3$ $+3ap^2$ $+axp$ $+4a^2p$ $+a^2x$ $-x^3$
	$-\frac{1}{64}x^3$ $+\frac{3}{16}x^2q$ $-\frac{3}{4}xq^2+q^3$ $+\frac{3}{16}ax^2$ $-\frac{3}{2}axq$ $+3aq^2$ $-\frac{1}{4}ax^2$ $+axq$ $-a^2x$ $+4a^2q$ $+a^2x$ $-x3$
$+\frac{x^2}{64a}+r=q.$	$+q^3$ $-\frac{3}{4}xq^2$ $+3aq^2$ $+\frac{3}{16}x^2q$ $-\frac{1}{2}axq$ $+4a^2q$ $-\frac{65}{64}x3$ $-\frac{1}{16}ax^2$
	* * $+\frac{3x^4}{4096a}$ * $+\frac{3}{32}x^2r+3ar^2$ $+\frac{3x^4}{1024a}$ * $+\frac{3}{16}x^2r$ $-\frac{1}{128}x3$ $-\frac{1}{2}axr$ $+\frac{1}{16}ax^2$ $+4a^2r$ $-\frac{65}{64}x^3$ $-\frac{1}{16}ax^2$
$+4a^2-\frac{1}{2}ax+\frac{9}{32}x^2)+\frac{131}{128}x3-\frac{15x^4}{4096a}($	$+\frac{131x^3}{512a^2}+\frac{509x^4}{16384a^3}$

XXXVII. Quand on a déterminé juſqu'à quelle Dimenſion l'on veut pouſſer l'Extraction, on doit pour plus de facilité negliger les Termes qui deviendront inutiles, c'eſt-à-dire qu'il ne faut pas les écrire quand on fait les ſubſtitutions, & pour les reconnoître ſûrement, il ſuffit d'obſerver la Dimenſion du premier Terme qui réſulte des Equations ſecondaires, & n'écrire à main droite de ce premier Terme qu'autant de Termes que la plus haute Dimenſion du Quotient ſurpaſſe celle de ce premier Terme.

XXXVIII. Ainſi dans l'Exemple ci-deſſus ſi je ne veux pouſſer l'Extraction qu'à quatre Dimenſions, je néglige tous les Termes après x^4, je n'en conſerve qu'un après x^3, &c. & je marque * tous

UVA. BHSC. SC 04146

les Termes que j'omets. L'on continuera donc juſqu'à ce qu'on arrive aux Termes $\frac{15x^4}{4096a} - \frac{131x^3}{128} + 4a^2r - \frac{1}{2}axr$, dans leſquels p, q, r ou s, qui repréſentent les ſupplémens de la Racine qu'on veut extraire, n'ont qu'une Dimenſion; nous trouverons donc par la Diviſion autant de Termes, comme $+ \frac{131x^3}{512a^2} + \frac{509x^4}{16384a^3}$ qu'il en faudra pour remplir le Quotient; nous aurons donc enfin $y = a - \frac{1}{4}x + \frac{xx}{64a} + \frac{131x^3}{512a^2} + \frac{509x^4}{16384a^3}$, &c.

XXXIX. Pour mettre ceci dans un plus grand jour, je vais encore donner quelques Exemples. Soit l'Equation $\frac{1}{5}y^5 - \frac{1}{4}y^4 + \frac{1}{3}y^3 - \frac{1}{2}y^2 + y - z = 0$, dont on veut trouver la Racine juſqu'à la cinquiéme Dimenſion, il faut négliger tous les Termes qui ſe trouvent après la Note *

$\frac{1}{5}y^5 - \frac{1}{4}y^4 + \frac{1}{3}y^3 - \frac{1}{2}y^2 + y - z = 0$. $y = z + \frac{1}{2}z^2 + \frac{1}{6}z^3 + \frac{1}{24}z^4 + \frac{1}{120}z^5$, &c.

$z + p = y$.	$+\frac{1}{5}y^5$	$+\frac{1}{5}z^5$, &c.
	$-\frac{1}{4}y^4$	$-\frac{1}{4}z^4 - z^3p$, &c.
	$+\frac{1}{3}y^3$	$+\frac{1}{3}z^3 + z^2p + zp^2$, &c.
	$-\frac{1}{2}y^2$	$-\frac{1}{2}z^2 - zp - \frac{1}{2}p^2$
	$+y$	$+z + p$
	$-z$	$-z$
$\frac{1}{2}z^2 + q = p$.	$+zp^2$	$+\frac{1}{4}z^5$, &c.
	$-\frac{1}{2}p^2$	$-\frac{1}{8}z^4 - \frac{1}{2}z^2q$, &c.
	$-z^3p$	$-\frac{1}{2}z^5$, &c.
	$+z^2p$	$+\frac{1}{2}z^4 + z^2q$
	$-zp$	$-\frac{1}{2}z^3 - zq$
	$+p$	$+\frac{1}{2}z^2 + q$
	$+\frac{1}{5}z^5$	$+\frac{1}{5}z^5$
	$-\frac{1}{4}z^4$	$-\frac{1}{4}z^4$
	$+\frac{1}{3}z^3$	$+\frac{1}{3}z^3$
	$-\frac{1}{2}z^2$	$-\frac{1}{2}z^2$

$1 - z + \frac{1}{2}z^2 \;)\; \frac{1}{6}z^3 - \frac{1}{8}z^4 + \frac{1}{20}z^5 \;(\; \frac{1}{6}z^3 + \frac{1}{24}z^4 + \frac{1}{120}z^5$

XL. Et de même ſi on propoſoit de pouſſer juſqu'à la neuviéme Dimenſion la réſolution de l'Equation $\frac{63}{2816}y^{11} + \frac{35}{1152}y^9 + \frac{5}{112}y^7$

UVA. BHSC. SC 04146

$+\frac{3}{40}y^5+\frac{1}{6}y^3+y-z=0$, avant de commencer l'Opération, on rejettera le Terme $\frac{63}{2816}y^{11}$; & enſuite on rejettera tous les Termes au-deſſus de z^9 dans l'Opération, & on n'en ſouffrira qu'un après z^7 & deux après z^5, parce qu'il eſt aiſé de voir que le Quotient doit deſcendre par des intervalles de deux unités, comme z, z^3, z^5, &c. Ainſi nous aurons à la fin $y=z-\frac{1}{6}z^3+\frac{1}{120}z^5+\frac{1}{5040}z^7+\frac{1}{362880}z^9$, &c.

XLI. Ceci nous conduit à trouver un moyen pour réſoudre les Equations affectées *in infinitum* & compoſées d'un nombre infini de Termes; car avant l'Opération vous rejetterez tous les Termes dont les Dimenſions ſe trouveront exceder après la ſubſtitution du premier Terme celle que vous voulez donner à votre Quotient; ainſi dans l'Exemple précedent j'ai rejetté tous les Termes au-delà de y^9, quoiqu'ils s'étendiſſent à l'infini. Et dans cette Equation

$$0=\begin{cases}-8+z^2-4z^4+9z^6-16z^8, \text{ \&c.}\\ +y \text{ par } z^2-2z^4+3z^6-\frac{4}{1}z^8, \text{ \&c.}\\ -y^2 \text{ par } z^2-z^4+z^6-z^8, \text{ \&c.}\\ +y^3 \text{ par } z^2-\frac{1}{2}z^4+\frac{1}{3}z^6-\frac{1}{4}z^8, \text{ \&c.}\end{cases}$$

dont je ſuppoſe qu'on demande la Racine Cubique juſqu'à la quatriéme Dimenſion de z. Je rejette tous les Termes qui ſont au-delà de y^3 par $z^2-\frac{1}{2}z^4+\frac{1}{3}z^6$, & tous ceux qui ſont au-delà de $-y^2$ par z^2-z^4+z6, &c. & tous ceux au-delà de y par z^2-2z^4, & enfin au-delà de $-8+z^2-4z^4$, parce que le premier Terme qu'il faut ſubſtituer au lieu de y, ſe trouve être $\frac{2}{z}-\frac{2}{3}$, ce qui donne plus de quatre Dimenſions dans tout le reſte de l'Equation, & des lots il ne reſte que cette Equation à réſoudre $\frac{1}{3}z^6y^3-\frac{1}{2}z^4y^3+z^2y^3-z^6y^2+z^4y^2-z^2y^2-2z^4y+z^2y-4z^4+z^2-8=0$.

XLII. Ce que je viens de dire des Equations élevées s'applique aux Equations du ſecond Dégré; je ſuppoſe par exemple qu'on demande la Racine de cette Equation, & qu'on veuille en approcher juſqu'à la ſixiéme Dimenſion de x.

$$0=\begin{cases}y^2\\ -y \text{ par } a+x+\frac{x^2}{a}+\frac{x^3}{a^2}+\frac{x^4}{a^3}, \text{ \&c.}\\ +\frac{x^4}{4a^2}\end{cases}$$

UVA. BHSC. SC 04146

Je cherche d'abord le premier Terme du Quotient, & je trouve $y = \frac{x^4}{4a^3}$, ce qui étant ſubſtitué dans l'Equation me fait voir que tous les Termes ſont plus élevés que x^6, à l'exception de $-y$ par $a + x + \frac{x^2}{a}$; ainſi je n'ai plus que l'Equation $y^2 - ay - xy - \frac{x^2y}{a} + \frac{x^4}{4a^2} = 0$ d'où je puis tirer la Racine à la maniere ordinaire, en faiſant $y = \frac{1}{2}a + \frac{1}{2}x + \frac{x^2}{2a} - \sqrt{\frac{1}{4}a^2 + \frac{1}{2}ax + \frac{3}{4}x^2 + \frac{x^3}{2a}}$, ou bien ce qui eſt plus commode & plus prompt en ſe ſervant de la Methode ci-deſſus qui donnera $y = \frac{x^4}{4a^3} - \frac{x^5}{4a^4}$ * On trouvera que le dernier Terme, c'eſt-à-dire celui qui doit être affecté de x^6 s'évanouira en devenant égal à zero.

XLIII. Quand on a une fois trouvé la ſuite juſqu'à un certain nombre de termes, on peut quelquefois la continuer par la ſimple Analogie des Termes; par Exemple vous continuerez tant qu'il vous plaira $z + \frac{1}{2}z^2 + \frac{1}{6}z^3 + \frac{1}{24}z^4 + \frac{1}{120}z^5$, &c. (qui eſt la Racine de la ſuite ou Equation infinie, $z = y + \frac{1}{2}y^2 + \frac{1}{3}y^3 + \frac{1}{4}y^4$, &c.) en diviſant le dernier Terme par ces Nombres coreſpondans 2, 3, 4, 5, 6, &c. On continuera de même la ſuite $z - \frac{1}{6}z^3 + \frac{1}{120}z^5 - \frac{1}{5040}z^7 + \frac{1}{362880}z^9$, &c. en diviſant par ces Nombres, 2×3, 4×5, 6×7, 8×9, &c. Et de même la ſuite $a + \frac{x^2}{2a} - \frac{x^4}{8a^3} + \frac{x^6}{16a^5} - \frac{5x^8}{128a^7}$, &c. peut être continuée tant qu'on voudra en multipliant les Termes par ces Fractions reſpectives $\frac{1}{2} - \frac{1}{4} - \frac{3}{6} - \frac{5}{8} - \frac{7}{10}$, &c. Il en eſt de même des autres.

XLIV. Il peut reſter encore une difficulté dans la recherche du premier Terme du Quotient, & quelquefois du ſecond & du troiſiéme; car leur valeur trouvée par la Methode ci-deſſus, peut être irrationelle, ou bien elle peut être la Racine de quelque Equation élevée; lorſque cela arrive, & que la valeur n'eſt pas en même tems impoſſible, il faut la repréſenter par quelque Lettre, & proceder enſuite à l'ordinaire, en la traitant comme connue; dans l'Exemple $y^3 + axy + a^2y - x^3 - 2a^3 = 0$, ſi la Racine de cette Equation $y^3 + a^2y - 2a^3 = 0$ s'étoit trouvée ſourde ou inconnue, je l'aurois repréſentée par une Lettre b, & j'aurois fait l'Opération comme vous le voyez, en ſuppoſant qu'on ne cherche le Quotient que juſqu'à la troiſiéme Dimenſion.

$+ y^2$

UVA. BHSC. SC 04146

$y^3 + aay + axy - 2a^3 - x^3 = 0$. Faites $a^2 + 3b^2 = c^2$, alors

$y = b - \frac{abx}{c^2} + \frac{x^3}{c^2} + \frac{a^4bx^2}{c^6} + \frac{a^3b^3x^3}{c^8} - \frac{a^5bx^3}{c^8} + \frac{a^5b^3x^3}{c^{10}}$, &c.

$b + p = y$.	$+ y^3$	$+ b^3 + 3b^2p + 3bp^2 + p^3$
	$+ axy$	$+ abx + axp$
	$+ a^2y$	$+ a^2b + a^2p$
	$- x^3$	$- x^3$
	$- 2a^3$	$- 2a^3$
$- \frac{abx}{c^2} + q = p$.	$+ p3$	$- \frac{a^3b^3x^3}{c^6}$, &c.
	$+ 3bp^2$	$+ \frac{3a^2b^3x^2}{c^4} - \frac{6ab^2x}{c^2} q$, &c.
	$+ axp$	$- \frac{a^2bx^2}{c^2} + axq$
	$+ c^2p$	$- abx + c2q$
	$- x3$	$- x3$
	$+ abx$	$+ abx$

$c^2 + ax - \frac{6ab^2x}{c^2}) \frac{a^4bx^2}{c^4} + x3 + \frac{a^3b^3x^3}{c^6} (\frac{a^4bx^2}{c^6} + \frac{x^3}{c^2} + \frac{a^3b^3x^3}{c^8}$, &c.

XLV. Ayant donc écrit b au Quotient, je ſuppoſe $b + p = y$, & au lieu de y je ſubſtitue comme vous voyez; j'ai donc $p^3 + 3bp^2$, &c. je rejette les Termes $b^3 + a^2b - 2a^3$ comme étant égaux à zero, parce que b eſt ſuppoſé être l'une des Racines de cette Equation $y^3 + a^2y - 2a^3 = 0$. Enſuite les Termes $3b^2p + a^2p + abx$ donneront $p = \frac{-abx}{3b^2+a^2}$ qu'il faut écrire au Quotient; & enſuite ſuppoſer $p = \frac{-abx}{3b^2+a^2} + q$, &c.

XLVI. Pour abréger j'écris cc au lieu de $aa + 3bb$ mais avec cette attention de les reſtituer par-tout où ils peuvent abréger auſſi. Après que l'Opération eſt finie, je prends quelque Nombre pour a, & je reſous l'Equation $y^3 + a^2y - 2a^3 = 0$ par la Methode que j'ai donnée pour les Equations Numeriques, & je ſubſtitue l'une des Racines à la place de b. Ou bien je délivre l'Equation de Lettres autant qu'il eſt poſſible, & ſur-tout de la Lettre ou Eſpece indefinie, de la maniere que j'ai inſinuée ci-devant, & s'il reſte des Lettres que je ne peux chaſſer, j'écris des Nombres à leur place. Ainſi $y^3 + a^2y - 2a^3 = 0$ ſera délivrée de a, en diviſant la Racine par a, & deviendra $y^3 + y - 2 = 0$, dont la Racine étant trouvée & multipliée par a, ſera ſubſtituée au lieu de b.

UVA. BHSC. SC 04146

XLVII. Jusqu'ici j'ai toujours supposé que l'Espece indefinie étoit petite; mais si l'on suppose qu'elle ne differe que peu d'une quantité donnée, je mets une Espece ou Lettre pour cette petite difference, & après avoir substitué, je resous l'Equation comme auparavant. Ainsi dans l'Equation $\frac{1}{5}y^5 - \frac{1}{4}y^4 + \frac{1}{3}y^3 - \frac{1}{2}y^2 + y + a - x = o$; si l'on suppose que x ne differe que peu de la quantité a, j'écris z pour cette petite difference, c'est-à-dire $a + z$ ou $a - z = x$, & j'ai $\frac{1}{5}y^5 - \frac{1}{4}y^4 + \frac{1}{3}y^3 - \frac{1}{2}y^2 + y \pm z = o$ qu'il faut resoudre comme on l'a fait ci-dessus.

XLVIII. Mais si cette espece est supposée indefiniment grande, alors je prens une Quantité reciproque, qui par conséquent sera indefiniment petite, & après l'avoir substituée, j'opere comme auparavant. Si donc dans l'Equation $y^3 + y^2 + y - x^3 = o$, on suppose que x est fort grande, j'écris z pour la Quantité reciproque très-petite $\frac{1}{x}$, & substituant $\frac{1}{z}$ au lieu de x on aura $y^3 + y^2 + y - \frac{1}{z^3} = o$, dont la Racine est $y = \frac{1}{z} - \frac{1}{3} - \frac{2}{9}z + \frac{7}{81}z^2 + \frac{5}{81}z^3$, &c. ou si l'on veut restituer x on aura $y = x - \frac{1}{3} - \frac{2}{9x} + \frac{7}{81x^2} + \frac{5}{81x^3}$, &c.

XLIX. Si aucun de ces expediens ne réussit, vous pourrez avoir recours à un autre, par Exemple dans l'Equation $y^4 - x^2y^2 + xy^2 + 2y^2 - 2y + 1 = o$ où vous trouverez que le premier Terme doit se tirer de la supposition que $y^4 + 2y^2 - 2y + 1 = o$, qui ne donne point de Racines possibles, vous ferez bien de tenter quelqu'autre voie; par exemple vous pourrez supposer que x ne differe pas beaucoup de $+2$ ou que $2 + z = x$, alors substituant $2 + z$ au lieu de x vous aurez $y^4 - z^2y^2 - 3zy^2 - 2y + 1 = o$, & le Quotient commencera par $+1$. Ou bien si vous supposez x indefiniment grand, ou bien $\frac{1}{x} = z$ vous aurez $y^4 - \frac{y^2}{z^2} + \frac{y^2}{z} + 2y^2 - 2y + 1 = o$ & $+z$ sera le premier Terme du Quotient.

L. Et ainsi en partant de differentes suppositions vous extrairez & vous exprimerez les Racines de differentes façons.

LI. Si vous êtes curieux de voir de combien de façons cela se peut faire, vous essayerez de trouver les Quantités, qui étant substituées au lieu de l'Espece indefinie dans l'Equation proposée, la rendent divisible par $y +$ ou $-$ quelque Quantité, ou par y seul. Par exemple dans l'Equation $y^3 + axy + a^2y - x^3 - 2a^3 = o$, vous pourrez substituer $+a$ ou $-a$, ou $-2a$ ou $-2a3|\frac{1}{3}$ au lieu de x

UVA. BHSC: SC 04146

& vous ſerez bien fondé à ſuppoſer que la Quantité x ne differe que peu de $+a$, ou de $-a$, ou de $-2a$, ou de $-2a^{3}|^{\frac{1}{3}}$, & de-là vous pourrez tirer la Racine d'autant de façons differentes, & peut-être encore d'autant d'autres façons, en ſuppoſant ces differences indefiniment grandes. Et de plus vous pourrez peut-être arriver encore au même but, ſi pour la Quantité indefinie vous prenez l'une ou l'autre de ces Eſpeces qui exprime la Racine; & enfin encore en ſubſtituant des valeurs Fictives au lieu de l'Eſpece indefinie, telles que $az+bz^{2}$, $\frac{a}{b+z}$, $\frac{a+cz}{b+z}$, &c. & en procedant comme ci-deſſus dans les Equations qui en reſulteront.

LII. Pour s'aſſurer de la vérité de tout ce que nous venons de dire, & pour voir clairement que les Quotients ainſi tirés & continués à volonté, approchent de la Racine de l'Equation, & n'en different enfin que d'une Quantité plus petite qu'aucune Quantité donnée, & par conſéquent n'en different point du tout, quand on les ſuppoſe continués à l'infini, il ſuffit de remarquer que les Quantités qui ſont dans la colonne à main gauche du côté droit des Figures où nous avons repréſenté ces Opérations, ſont les derniers Termes des Equations, dont les Racines ſont p, q, r, s, &c. Et que quand ils s'évanouiſſent, les Racines p, q, r, s, &c. c'eſt-à-dire les differences entre le Quotient & la Racine cherchée s'évanouiſſent auſſi, de ſorte qu'alors le Quotient ne differe plus de la vraie Racine; & de-là quand vous voyez au commencement de l'Opération que tous les Termes de cette colonne ſe détruiſent mutuellement, vous pouvez conclure que le Quotient que vous avez, eſt la Racine parfaite de l'Equation: & quoique ces Termes ne ſe détruiſent pas tous, vous reconnoîtrez toujours que les Termes dans leſquels l'Eſpece indefiniment petite n'a que peu de Dimenſions, c'eſt-à-dire les plus grands Termes ſont continuellement retranchés de cette colonne, de ſorte qu'à la fin il n'en reſte plus pas un qui ne ſoit plus petit que la plus petite Quantité donnée, & infiniment petit ou égal a zero, ſi on ſuppoſe l'Opération continuée à l'infini; de ſorte que le Quotient ainſi tiré à l'infini, eſt la Racine parfaite de l'Equation.

LIII. Enfin quelque grande que fût ſuppoſée l'Eſpece que j'ai toujours faite indefiniment petite, afin de mettre la choſe dans un plus grand jour, les Quotients ſeront toujours vrais quoique moins convergens à la vraie Racine. Ceci eſt évident par l'Analogie de la choſe, mais il eſt vrai qu'il faut faire auſſi attention aux limites des

UVA. BHSC. SC 04146

Racines, ou aux plus grandes & aux plus petites Quantités ; car ces propriétés ſont communes aux Equations finies & infinies. Dans ces dernieres la Racine eſt la plus grande ou la moindre, lorſque les ſommes des Termes Affirmatifs & Négatifs ont la plus grande ou la plus petite difference, & la Racine a ſes limites ou eſt limitée, lorſque la Quantité indefinie ne peut pas être priſe plus grande, ſans que la grandeur de la Racine ne devienne infinie, c'eſt-à-dire la Racine elle-même impoſſible. Ceci fait ſentir la raiſon qui m'a fait ſuppoſer cette Quantité très-petite.

LIV. Pour mieux encore éclaircir ceci ſoit ACD un demi Cercle décrit ſur le Diametre AD & BC l'ordonnée. Faites $AB = x$, $BC = y$, $AD = a$, vous aurez $y = \sqrt{ax - xx} = \sqrt{ax} - \frac{x}{2a}\sqrt{ax} - \frac{x^2}{8a^2}\sqrt{ax} - \frac{x^3}{16a^3}\sqrt{ax}$, &c. par la maniere donnée ci-deſſus. Donc BC ou l'ordonnée y deviendra la plus grande, lorſque $\sqrt{ax}$ ſurpaſſera le plus tous les Termes $\frac{x}{2a}\sqrt{ax} + \frac{x^2}{8a^2}\sqrt{ax} + \frac{x^3}{16a^3}\sqrt{ax}$, &c. c'eſt-à-dire, lorſque $x = \frac{1}{2}a$, mais elle finira, lorſque $x = a$; car ſi vous faites x plus grand que a, la ſomme de tous les Termes $-\frac{x}{2a}\sqrt{ax} - \frac{x^2}{8a^2}\sqrt{ax} - \frac{x^3}{16a^3}\sqrt{ax}$, &c. ſera infinie. Il y a de plus une autre limite, lorſque $x = 0$, à cauſe de l'impoſſibilité du Radical $\sqrt{-ax}$; les limites A, B & D du demi Cercle ſont correſpondantes à ces limites de l'Equation.



LV. En voilà tout autant qu'il en faut de dit ſur ces Methodes de calcul, dont je ferai un frequent uſage dans la ſuite. Reſte maintenant à donner quelques eſſais de Problêmes, ſur-tout de ceux que nous préſente la nature des Courbes, & cela pour mettre l'Art Analitique dans un plus grand jour. Et d'abord j'obſerverai que toutes leurs difficultés peuvent ſe reduire à ces deux Problêmes ſeulement que je vais propoſer ſur un eſpace décrit par un mouvement local retardé ou acceleré d'une façon quelconque.

LVI. 1. *La longueur de l'Eſpace décrit étant continuellement donnée, trouver la viteſſe du Mouvement à un tems donné quelconque.*

LVII. 2. *La viteſſe du Mouvement étant continuellement donnée, trouver la longueur de l'Eſpace décrit à un tems donné quelconque.*

LVIII. Ainſi dans l'Equation $xx = y$, ſi y repréſente la lon-

UVA. BHSC. SC 04146

gueur de l'Eſpace décrit à un tems quelconque, lequel tems un autre Eſpace x en augmentant d'une viteſſe uniforme $\dot{x}$ méſure & repréſente comme décrit, alors $2\dot{x}\dot{x}$ repréſentera la viteſſe avec laquelle dans le même inſtant l'Eſpace y viendra à être décrit *& vice verſa*; & c'eſt de-là que j'ai dans ce qui ſuit conſideré les Quantités comme produites par une augmentation continuelle à la maniere de l'Eſpace que décrit un corps en mouvement.

LIX. Mais comme nous n'avons pas beſoin de conſiderer ici le tems autrement que comme exprimé & méſuré par un mouvement local uniforme, & qu'outre cela nous ne pouvons jamais comparer enſemble que des Quantités de même genre, non-plus que leurs viteſſes d'accroiſſement & de diminution; je n'aurai dans ce qui ſuit aucun égard au tems conſideré proprement comme tel; mais je ſuppoſerai que l'une des Quantités propoſées de même genre doit augmenter par une Fluxion uniforme, à laquelle Quantité je rapporterai tout le reſte comme ſi c'étoit au tems; donc par Analogie cette quantité peut avec raiſon recevoir le nom de tems; ainſi quand dans la ſuite pour donner des idées plus claires & plus diſtinctes, je me ſervirai du mot *Tems*, je n'entends jamais le tems proprement pris comme tel, mais ſeulement une autre Quantité par l'augmentation ou Fluxion de laquelle le tems peut être expprimé & méſuré.

LX. J'appellerai *Quantités Fluentes*, ou ſimplement *Fluentes* ces Quantités que je conſidere comme augmentées graduellement & indefiniment, je les repréſenterai par les dernieres Lettres de l'Alphabet v, x, y & z pour les diſtinguer des autres quantites qui dans les Equations ſont conſiderées comme connuës & déterminées qu'on repréſente par les Lettres initiales a, b, c, &c. & je repréſenterai par les mêmes dernieres Lettres ſurmontées d'un point $\dot{v}$, $\dot{x}$, $\dot{y}$ & $\dot{z}$ les viteſſes dont les Fluentes ſont augmentées par le mouvement qui les produit, & que par conſéquent on peut appeller *Fluxions*. Ainſi pour la Viteſſe ou Fluxion de v je mettrai $\dot{v}$, & pour les viteſſes de x, y, z je mettrai $\dot{x}$, $\dot{y}$, $\dot{z}$ reſpectivement.

LXI. Ces choſes étant ainſi prépoſées, je vais entrer en matiere & donner d'abord la ſolution des deux Problêmes que je viens de propoſer.

UVA. BHSC. SC 04146

PROBLEME I.

Etant donnée la Relation des Quantités Fluentes, trouver la Relation de leurs Fluxions.

SOLUTION.

I. DISPOSEZ l'Equation par laquelle la Relation donnée eſt exprimée ſuivant les Dimenſions de l'une de ſes Quantités Flueutes x par exemple, & multipliez ſes Termes par une Progreſſion Arithmetique quelconque, & enſuite par $\frac{\dot{x}}{x}$ faites cette Opération ſéparément pour chacune des Quantités Fluentes ; après quoi égalez à zero la ſomme de tous les produits, & vous aurez l'Equation cherchée.

II. EXEMPLE I. Si la Relation des Quantités Fluentes x & y eſt $x^3 - ax^2 + axy - y^3 = 0$, diſpoſez d'abord les Termes ſuivant x, & enſuite ſuivant y, & multipliez-les comme vous voyez.

Multipliez x^3	$-ax^2$	$+axy$	$-y^3$	$-y^3$	$+axy$	$-ax^2+x^3$
par $\frac{3\dot{x}}{x}$.	$\frac{2\dot{x}}{x}$.	$\frac{\dot{x}}{x}$.	0	$\frac{3\dot{y}}{y}$.	$\frac{\dot{y}}{y}$.	0
Vous aurez $3\dot{x}x^2$	$-2a\dot{x}x$	$+a\dot{x}y$ *		$-3\dot{y}y^2$	$+a\dot{y}x$ *	

la ſomme des produits eſt $3\dot{x}x^2 - 2a\dot{x}x + a\dot{x}y - 3\dot{y}y^2 + a\dot{y}x$, qui étant égalée à zero, donne la Relation des Fluxions $\dot{x}$ & $\dot{y}$; car ſi vous donnez à volonté une valeur à x, l'Equation $x^3 - ax^2 + axy - y^3 = 0$, donnera la valeur de y ; ce qui étant déterminé, l'on aura $\dot{x} : \dot{y} :: 3y^2 - ax : 3x^2 - 2ax + ay$.

III. EXEMPLE II. Si la Relation des Quantités x, y & z, eſt exprimée par l'Equation $2y^3 + x^2y - 2cyz + 3yz^2 - z^3 = 0$

Multipliez $2y^3$	$+xx\times y$	$-z^3$	yx^2	$+2y^3$	$-z^3+3yz^2-2cyz+x^2y+2y^3$
	$-2cz$			$-2cyz$	
	$+3z^2$			$+3yz^2$	
				$-z^3$	
par	$\frac{2\dot{y}}{y}$.	0 . $-\frac{\dot{y}}{y}$	$\frac{2\dot{x}}{x}$.	0 .	$\frac{3\dot{z}}{z}$. $\frac{2\dot{z}}{z}$. $\frac{z}{z}$. 0.
Vous aurez $4\dot{y}y^2$ *		$+\frac{\dot{y}z^3}{y}$	$2\dot{x}xy$ *		$-3\dot{z}z^2+6\dot{z}zy-2c\dot{z}y$ *.

UVA. BHSC. SC 04146

donc la Relation des Fluxions $\dot{x}$, $\dot{y}$ & $\dot{z}$ eſt $4\dot{y}y^2 + \frac{\dot{y}z^3}{y} + 2\dot{x}xy - 3\dot{z}z^2 + 6\dot{z}zy - 2\dot{z}zy = 0$.

IV. Mais comme il y a trois Quantités Fluentes x, y & z, il faut une autre Equation pour que la Relation entr'elles & entre leurs Fluxions, puiſſe être entierement déterminée; comme ſi l'on ſuppoſe que $x + y - z = 0$, l'on trouvera par cette Regle une autre Relation $\dot{x} + \dot{y} - \dot{z} = 0$ entre leurs Fluxions. En les comparant avec les Equations précedentes, & chaſſant l'une des trois Quantités, & auſſi l'une des Fluxions, vous aurez une Equation qui déterminera entierement la Relation de tout le reſte.

V. Lorſque dans l'Equation propoſée, il ſe trouve des Fractions complexes, ou des Quantités ſourdes, je mets pour chacune autant de Lettres, & les traitant comme des Fluentes, j'opere comme auparavant, après quoi je ſupprime ces Lettres comme vous le voyez.

VI. EXEMPLE III. Si la Relation des Quantités x & y eſt donnée par $yy - aa - x\sqrt{aa - xx} = 0$ pour $x\sqrt{aa - xx}$ j'écris z, & j'ai les deux Equations $yy - aa - z = 0$, & $a^2x^2 - x^4 - z^2 = 0$, dont la premiere donnera $2\dot{y}y - \dot{z} = 0$ pour la Relation des Viteſſes ou Fluxions $\dot{y}$ & $\dot{z}$, & la ſeconde $2a^2\dot{x}x - 4\dot{x}x^3 - 2\dot{z}z = 0$, ou $\frac{a^2\dot{x}x - 2\dot{x}x^3}{z} = \dot{z}$ pour la Relation des Viteſſes $\dot{x}$ & $\dot{z}$, & chaſſant z on aura $2\dot{y}y - \frac{a^2\dot{x}x + 2\dot{x}x^3}{z} = 0$ dans laquelle Equation remettant $x\sqrt{aa - xx}$, au lieu de z, il vient $2\dot{y}y - \frac{-a^2\dot{x} + 2\dot{x}x^2}{\sqrt{aa - xx}} = 0$ pour la Relation cherchée entre $\dot{x}$ & $\dot{y}$.

VII. EXEMPLE III. Si $x^3 - ay^2 + \frac{by^3}{a+y}xx\sqrt{ay + xx} = 0$ exprime la Relation qui eſt entre x & y; je fais $\frac{by^3}{a+y} = z$, & $xx\sqrt{ay + xx} = v$, & j'ai les trois Equations $x^3 - ay^2 + z - v - 0$, $az + yz - by^3 = 0$, & $ax^4y + x^6 - vv = 0$; la premiere donne $3\dot{x}x^2 - 2a\dot{y}y + \dot{z} - \dot{v} = 0$, la ſeconde donne $a\dot{z} + z\dot{y} + y\dot{z} - 3by\dot{y}^2 = 0$, & la troiſiéme $4ax\dot{x}^3y + 6\dot{x}x^5 + ay\dot{x}^4 - 2v\dot{v} = 0$ pour les Relations des Viteſſes $\dot{x}$, $\dot{y}$, $\dot{v}$ & $\dot{z}$. Je ſubſtitue dans la premiere Equation les valeurs $\frac{3by\dot{y}^2 - y\dot{z}}{a+y}$ & $\frac{4ax\dot{x}^3y + 6\dot{x}x^5 + ay\dot{x}^4}{2v}$ de z & v trouvées par la ſeconde & la troiſiéme Equation, & j'ai $3\dot{x}x^2 - 2a\dot{y}y$

UVA. BHSC. SC 04146

$+\frac{3b\dot{y}y^2-\dot{y}z}{a+y}-\frac{4a\dot{x}x^3y-6\dot{x}x^5-a\dot{y}x^4}{2v}=0$, & reſtituant au lieu de $\dot{z}$ & $\dot{v}$ leurs valeurs $\frac{b\dot{y}^3}{a+y}$ & $\dot{x}x\sqrt{ay+xx}$ j'aurai l'Equation cherchée $3\dot{x}x^2-2a\dot{y}y+\frac{3ab\dot{y}y^2+2b\dot{y}y^3}{aa+2ay+yy}-\frac{4a\dot{x}xy-6\dot{x}x^3-a\dot{y}xx}{2\sqrt{ay+xx}}=0$ qui exprime la Relation des Viteſſes $\dot{x}$ & $\dot{y}$.

VIII. Je crois qu'après cela il eſt aiſé de voir clairement comment on doit opérer dans les autres cas, comme quand il ſe trouve dans l'Equation propoſée des Dénominateurs ſourds des Radicaux ſous d'autres Radicaux, comme $\sqrt{ax+\sqrt{aa-xx}}$ ou d'autres Termes compliqués de même genre.

IX. De plus, quoiqu'il ſe trouve dans l'Equation propoſée des Quantités qui ne peuvent être déterminées ou exprimées par aucune Methode Géometrique, comme par exemple des Aires ou des Longueurs de Courbes : cependant on ne laiſſera pas que de trouver les Relations de leurs Fluxions, comme il paroîtra par l'Exemple ſuivant.

Préparation pour l'Exemple V.

X. Je ſuppoſe que BD ſoit une Ordonnée élevée à Angles droits ſur AB, & que ADH ſoit un Courbe quelconque déterminée par la Relation de AB à BD exprimée par une Equation. Appellons x la Ligne AB, & z l'Aire de la Courbe ADB multipliée par l'unité. Enſuite élevons la Perpendiculaire AC égale à l'unité, & par le point C tirons CE paralelle à AB, & qui rencontre BD en E; enfin concevons que ces deux Surfaces ADB & ACEB ſont produites par le mouvement de la Ligne droite BED, il eſt évident que leurs Fluxions (c'eſt-à-dire les Fluxions des Quantités $1\times z$, & $1\times x$, ou des Quantités z & x) ſont entre elles comme les Lignes AD, BE, qui les ont produites. Ainſi $\dot{z}:\dot{x}::BD:BE=1$, donc $\dot{z}=\dot{x}\,BD$.



XI. z Peut donc ſe trouver dans une Equation quelconque, qui exprime la Relation entre x & une autre Quantité Fluente quelconque y, & cependant on ne laiſſera pas de trouver la Relation des Fluxions x & y.

XII. Ex.

UVA. BHSC. SC 04146

XII. Exemple V. Comme ſi l'on avoit l'Equation $zz + axz - y^4 = o$ pour expreſſion de la Relation entre x & y, & en même tems $\sqrt{ax - xx} = BD$ pour l'expreſſion de la Courbe, qui par conſéquent eſt un Cercle. L'Equation $zz + axz - y^4 = o$ donnera $2\dot{z}z + a\dot{z}x + a\dot{x}z - 4\dot{y}y^3 = o$ pour la Relation des Viteſſes $\dot{x}$, $\dot{y}$ & $\dot{z}$ & comme $\dot{z} = \dot{x} \times BD$ ou $= \dot{x}\sqrt{ax - xx}$, ſubſtituez cette valeur en ſa place, & vous aurez l'Equation $2\dot{x}z + a\dot{x}x\sqrt{ax - xx} + a\dot{x}z - 4\dot{y}y^3 = o$, qui détermine la Relation des Viteſſes $\dot{x}$ & $\dot{y}$.

Démonſtration de la Solution.

XIII. Les momens des Quantités Fluentes (c'eſt-à-dire leurs parties indefiniment petites, par l'acceſſion deſquelles, dans des parties indefiniment petites de tems, elles ſont continuellement augmentées) ſont comme les Viteſſes de leur Flux ou Accroiſſement.

XIV. Si donc le produit de la Viteſſe $\dot{x}$ par une Quantité indefiniment petite o, c'eſt-à-dire, ſi $\dot{x}o$ repréſente le moment d'une Quantité quelconque x, les moments des autres v, y, z ſeront repréſentés par $\dot{v}o$, $\dot{y}o$, $\dot{z}o$, parce que $\dot{v}o$, $\dot{y}o$, $\dot{x}o$, $\dot{z}o$ ſont chacuns comme u, y, x, z.

XV. Puis donc que les moments comme $\dot{x}o$, $\dot{y}o$ ſont les acceſſions ou augmentations indefiniment petites des Quantités Fluentes x & y pendant les indefiniment petits intervales de tems, il ſuit que ces Quantités x & y après un intervalle indefiniment petit de tems, deviennent $x + \dot{x}o$ & $y + \dot{y}o$, & par conſéquent l'Equation qui en tout tems exprime également la Relation des Quantités Fluentes, exprimera la Relation entre $x + \dot{x}o$ & $y + \dot{y}o$ tout auſſi-bien qu'entre x & y; ainſi on peut ſubſtituer dans la même Equation $x + \dot{x}o$ & $y + \dot{y}o$, au lieu de x & y.

XVI. Soit donc l'Equation donnée quelconque $x^3 - ax^2 + axy - y^3 = o$ je ſubſtitue $x + \dot{x}o$ pour x, & $y + \dot{y}o$ pour y, & j'ai

$$\left.\begin{array}{llll} x^3 & + 3\dot{x}ox^2 & + 3\dot{x}^2oox & + \dot{x}^3o^3 \\ - ax^2 & - 2a\dot{x}ox & - a\dot{x}^2oo & \\ + axy & + a\dot{x}oy & + a\dot{y}ox & + a\dot{x}yoo \\ - y^3 & - 3\dot{y}oy^2 & - 3\dot{y}^2ooy & - \dot{y}^3o^3 \end{array}\right\} = o$$

UVA. BHSC. SC 04146

XVII. Maintenant j'ai par la ſuppoſition $x^3 - ax^2 + axy - y^3 = 0$, j'efface donc ces Termes dans l'Equation précedente, & ayant diviſé par o tous les Termes qui reſtent, j'aurai $3\dot{x}x^2 - 2a\dot{x}x + a\dot{x}y - 3\dot{y}y^2 + 3x^2o\dot{x} - ax2o + ay\dot{x} - 3y^2o\dot{y} + x^3o^2 + a\dot{x}yo - y^3o^2 = 0$. Mais comme o a dû être ſuppoſé infiniment petit, pour pouvoir repréſenter les momens des Quantités, les Termes qu'il multiplie ſont nuls en comparaiſon des autres, je les rejette donc, & il me reſte $3\dot{x}x^2 - 2a\dot{x}x + a\dot{x}y + ay\dot{x} - 3\dot{y}y^2 = 0$, comme ci-deſſus dans l'Exemple premier.

XVIII. On peut obſerver ici que les Termes qui ne ſont pas multipliés par o s'évanoüiſſent toujours, comme auſſi ceux qui ſonr multipliés par o élevé à plus d'une Dimenſion, & que le reſte des Termes étant diviſé par o acquiert la forme qu'il doit avoir par la régle preſcrite ; & c'eſt ce qu'il falloit prouver.

XIX. De ceci bien entendu ſuivent aiſément les autres choſes compriſes dans la régle, que dans l'Equation propoſée il peut ſe trouver pluſieurs Quantités Fluentes & que les Termes peuvent être multipliés non ſeulement par le Nombre des Dimenſions des Quantités Fluentes, mais auſſi par d'autres Progreſſions Arithmetiques quelconques ; enſorte cependant que dans l'Operation il y ait la même difference, & que la Progreſſion ſoit diſpoſée ſelon le même ordre des Dimenſions. Ces choſes étant admiſes, le reſte qui eſt compris dans les Exemples 3, 4 & 5, ſera aſſez clair.

PROBLEME II.

Etant donnée la Relation des Fluxions, trouver celle des Quantités Fluentes.

SOLUTION PARTICULIERE.

I. Comme ce Problême eſt l'inverſe du précédent, on peut le réſoudre en Procédant d'une façon contraire, c'eſt-à-dire, il faudra diſpoſer ſuivant les Dimenſions de x les Termes multipliés par $\dot{x}$, enſuite les diviſer par $\frac{\dot{x}}{x}$ & enfin par le Nombre de leur Dimenſions, ou peut-être par quelqu'autre Progreſſion Arithmetique. On répétera la même Opération pour les Termes multipliés par $\dot{v}$, $\dot{y}$ ou $\dot{z}$, & l'on égalera toute la ſomme à zero en rejettant les Termes ſuperflus.

UVA. BHSC. SC 04146

II. Exemple. Soit l'Equation propoſée $3\dot{x}x^2 - 2a\dot{x}x + a\dot{x}y - 3\dot{y}y^2 + a\dot{y}x = 0$. faites l'Opération comme vous voyez.

Diviſés $3\dot{x}x^2 - 2a\dot{x}x + a\dot{x}y$	Diviſés $-3\dot{y}y^2 * + a\dot{y}x$
par $\frac{\dot{x}}{x}$	par $\frac{\dot{y}}{y}$
Le Quot. eſt $3x^3 - 2ax^2 + ayx$	Le Qu. eſt $-3y^3 * + ayx$
Diviſés par 3 . 2 . 1 .	Diviſés par 3 . 2 . 1 .
Quotient $x^3 - ax^2 + ayx$	Quotient $-y^3 * + ayx$

la ſomme eſt $x^3 - ax^2 + axy - y^3$ qui égalée à zero donne la Relation des Quantités Fluentes x & y. On peut obſerver que quoique le Terme axy ſe trouve deux fois, je ne le mets qu'une fois dans la Somme $x^3 - ax^2 + axy - y^3 = 0$, & que j'en rejette un comme ſuperflu, & en effet toutes les fois qu'un Terme ſe trouve deux fois ou même plus de deux fois, ce qui peut arriver lorſqu'il y a plus de deux Quantités Fluentes, il ne faudra l'écrire qu'une fois dans la Somme des Termes.

III. Il y a d'autres Circonſtances à obſerver, que je laiſſe à la Sagacité de l'Artiſte ; d'autant plus qu'il ſeroit inutile de s'arrêter trop long-tems ſur cet article, parce que le Problême ne peut pas toujours être réſolu par cet Artifice. J'ajouterai ſeulement que quand cette Methode nous donne la Relation des Fluentes, il faut par le Prob. I. en chercher les Fluxions, & quand elles ſe retrouveut les mêmes, l'Opération eſt bonne, mais ſans cela non ; ainſi dans l'Exemple propoſé après avoir trouvé $x^3 - ax^2 + axy - y^3 = 0$, je cherche par le Prob. I. la Relation des Fluxions $\dot{x}$ & $\dot{y}$ & j'arrive à l'Equation propoſée $3\dot{x}x^2 - 2a\dot{x}x + a\dot{x}y - 3\dot{y}y^2 + a\dot{y}x = 0$. Ce qui ne prouve que l'Equation $x^3 - ax^2 + axy - y^3 = 0$ a été bien trouvée. Mais ſi l'Equation propoſée étoit $\dot{x}x - \dot{x}y + a\dot{y} = 0$ on auroit par cette Methode $\frac{1}{2}x^2 - xy + ay = 0$, pour la Relation de x & y ; ce qui ne ſeroit pas juſte, puiſque par le Prob. I. cette Equation donneroit $\dot{x}x - \dot{x}y - \dot{y}x + a\dot{y} = 0$ differente de la premiere.

IV. Après ceci que je n'ai mis que par préambule, je viens à la Solution générale.

UVA. BHSC. SC 04146

Prèparation pour la Solution générale.

V. Il faut d'abord obſerver que dans l'Equation propoſée les Symboles qui repréſentent les Fluxions, doivent monter dans chaque Terme au même nombre de Dimenſions, parce que les Fluxions ſont des Quantités d'un genre différent de celui des Quantités dont elles ſont Fluxions. Lorſque dans une Equation il en arrive autrement, on doit y entendre une autre Fluxion priſe pour l'unité, & il faut multiplier par cette Fluxion les Termes les plus bas autant de fois qu'il le faudra pour que les Symboles des Fluxions ſoient élevez dans tous les Termes au même nombre de Dimenſions. Comme ſi l'Equation propoſée étoit $\dot{x} + \dot{x}\dot{y}x - axx = 0$, il faudroit entendre que la Fluxion $\dot{z}$ d'une troiſiéme Quantité Fluente z a été priſe pour l'unité & multiplier le premier Terme $\dot{x}$ une fois par cette même Fluxion $\dot{z}$, & le dernier Terme axx deux fois, afin que dans ces deux Termes les Fluxions ſoient élevées au même nombre de Dimenſions que le ſecond Terme $\ddot{x}\dot{y}x$, comme ſi l'Equation propoſée eut été tirée de celle-ci $\ddot{x}\dot{z} + \ddot{x}\dot{y}x - az\dot{z}xx = 0$, en faiſant $\dot{z} = 1$. De même dans l'Equation $\dot{y}x = yy$, il faut imaginer que l'unité $\dot{x}$ multiplie le Terme yy.

VI. Les Equations dans leſquelles il ne ſe trouve que deux Quantités Fluentes toutes deux élevées dans tous les Termes au même nombre de Dimenſions, peuvent toujours ſe réduire à une forme telle que le rapport des Fluxions, c'eſt-à-dire, $\left(\frac{\dot{x}}{\dot{y}}\right.$ ou, $\frac{\dot{y}}{\dot{x}}$ ou, $\left.\frac{\dot{z}}{\dot{x}}, \text{\&c.}\right)$ ſe trouve toujours d'un côté, & de l'autre côté la valeur de ce rapport exprimée en Termes ſimples & purement Algébriques, par Exemple $\frac{\dot{y}}{\dot{x}} = 2 + 2x - y$. quand donc la Solution particuliere ci-deſſus n'a pas lieu, il faudra amener les Equations à cette forme.

VII. Et lorſque dans la Valeur de ce Rapport il ſe trouve quelque Terme compoſé ou Radical, ou bien lorſque le Raport lui-même ſe trouve être la Racine d'une Equation affectée, il faut faire la Réduction au moyen de la Diviſion ou de l'Extraction de Racines, ou de la Reſolution de l'Equation affectée comme on l'a vû ci-devant.

UVA. BHSC. SC 04146

VIII. Ainſi l'Equation propoſée $\dot{y}a - \dot{y}x - \dot{x}a + \dot{x}\dot{x} - \dot{x}y = 0$ donne d'abord par la Réduction $\frac{\dot{y}}{\dot{x}} = 1 + \frac{y}{a-x}$, ou $\frac{\dot{x}}{\dot{y}} = \frac{a-x}{a-x+y}$. Et ſi dans cette premiere Equation je réduits le Terme compoſé $\frac{y}{a-x}$, à une ſuite infinie de Termes ſimples $\frac{y}{a} + \frac{xy}{a^2} + \frac{x^2y}{a^3} + \frac{x^3y}{a^4}$ &c. en diviſant le Numerateur y par le Denominateur $a-x$, j'aurai $\frac{\dot{y}}{\dot{x}} = 1 + \frac{y}{a} + \frac{xy}{a^2} + \frac{x^2y}{a^3} + \frac{x^3y}{a^4}$ &c. au moyen de laquelle Equation l'on déterminera la Relation de $\dot{x}$ & $\dot{y}$.

IX. Et de même ſi l'Equation donnée eſt $\ddot{y}\dot{y} = \ddot{x}y + \ddot{x}\dot{x}\dot{x}\dot{x}$ je la réduits d'abord à $\frac{\ddot{y}\dot{y}}{\ddot{x}\dot{x}} = \frac{\dot{y}}{\dot{x}} + xx$ & enſuite à $\frac{\dot{y}}{\dot{x}} = \frac{1}{2} + \sqrt{\frac{1}{4} + xx}$: (en faiſant $\dot{x} = 1$ & tirant la Racine quarrée de l'Equation affectée $\ddot{y}\dot{y} = \dot{y} + xx$,) puis je tire la Racine quarrée des Termes $\frac{1}{4} + xx$ qui me donne la ſuite infinie $\frac{1}{2} + x^2 - x^4 + 2x^6 - 5x^8 + 14x^{10}$ que je ſubſtituë au lieu de $\sqrt{\frac{1}{4} + xx}$, & j'ai $\frac{\dot{y}}{\dot{x}} = 1 + x^2 - x^4 + 2x^6 - 5x^8$, &c. ou $= -x^2 + x^4 - 2x^6 + 5x^8$, &c. ſelon que $\sqrt{\frac{1}{4} + xx}$ eſt ajouté ou ſouſtrait à $\frac{1}{2}$.

X. De même encore ſi l'on propoſe l'Equation $\dot{y}^3 + ax\dot{x}^2\dot{y} + a^2\dot{x}^2\dot{y} - x^3\dot{x}^3 - 2a^3\dot{x}^3 = 0$, ou $\frac{\dot{y}^3}{\dot{x}^3} + \frac{axy}{\dot{x}} + \frac{a^2y}{\dot{x}} - x^3 - 2a^3 = 0$ je tire comme je l'ai fait ci-devant la Racine Cubique de cette Equation affectée & j'ai $\frac{\dot{y}}{\dot{x}} = a - \frac{x}{4} + \frac{xx}{64a} + \frac{131x^3}{512a^2} + \frac{509x^4}{16384a^3}$ &c.

XI. On peut obſerver que je ne regarde comme compoſés que les ſeuls Termes qui ſont en effet compoſés à l'égard des Quantités Fluentes ; & que je regarde comme des Quantités ſimples, ceux qui ne ſont compoſés qu'à l'égard des Quantités données : car ceux-ci peuvent toujours être réduits à des Quantités ſimples, en les ſuppoſant égaux à d'autres Quantités données. Je conſidere donc les Quantités $\frac{ax+bx}{c}$, $\frac{x}{a+b}$, $\frac{bcc}{ax+bx}$, $\frac{b^4}{ax^2+bx^2}$, $\sqrt{ax+bx}$, &c. comme des Quantités ſimples, parce qu'elles peuvent être réduites à des Quantités ſimples $\frac{ex}{c}$, $\frac{x}{e}$, $\frac{bc^2}{ex}$, $\frac{b^4}{ex^2}$, $\sqrt{ex}$ (ou $e^{\frac{1}{2}}x^{\frac{1}{2}}$) &c. en ſuppoſant $a + b = e$.

UVA. BHSC. SC 04146

XII. De plus, pour mieux distinguer les Quantités Fluentes les unes des autres, on peut avec assez de raison donner à la Fluxion qui est au Numerateur du Raport, ou à l'Antecedent de ce Raport le nom de *Quantité Relative*, & à celle qui est au Denominateur & à laquelle on compare la premiere le nom de *Correlative* ; & on peut aussi distinguer les Fluentes respectivement par ces mêmes Noms, même pour mieux entendre ce qui suit, il faut concevoir que la Quantité Correlative est le Temps ou plûtôt une Quantité quelconque qui fluë ou coule uniformement, & qui mesure & exprime le Temps. Et que la Quantité Relative est l'Espace que décrit dams ce Temps un Corps ou un Point qui se meut d'un mouvement acceleré ou retardé d'une façon quelconque : enfin que l'Esprit du Problême est de déterminer par la Viteſſe donnée à chaque instant l'Espace parcouru pendant le Temps tout entier.

XIII. Mais à l'égard de ce Problême nous pouvons distinguer les Equations en trois Classes.

XIV. La premiere des Equations où il ne se trouve que les deux Fluxions & l'une des Fluentes.

XV. La seconde ou il se trouve les deux Fluxions & les deux Fluentes.

XVI. La troisiéme ou il se trouve des Fluxions de plus de deux Quantités.

XVII. Ceci étant prépoſé, je vais chercher la Solution de ce Problême dans les trois Cas.

Solution du premier Cas.

XVIII. Prenons pour la Quantité Correlative la Fluente de l'Equation, & mettons d'un côté de l'Equation le Raport de la Fluxion de l'autre Quantité à la Fluxion de celle-ci & de l'autre côté de l'Equation la Valeur de ce Raport en Termes simples ; ensuite multiplions la Valeur du Raport de ces Fluxions par la Quantité Correlative, & divisons chacun de ses Termes par le nombre des Dimensions de la Quantité ; le résultat de cette Opération sera la Valeur de l'autre Quantité Fluente.

XIX. Par Exemple dans l'Equation propoſée $\ddot{y}y = \ddot{x}y + \ddot{x}xxx$; je prends x pour la Quantité Correlative, & en réduisant l'Equation j'ai $\frac{\dot{y}}{\dot{x}} = 1 + x^2 - x^4 + 2x^6$, &c. je multiplie par x cette

UVA. BHSC. SC 04146

Valeur de $\frac{\dot{y}}{\dot{x}}$ & j'ai $x + x^3 - x^5 + 2x^7$, &c. qui étant diviſés chacun par le nombre de leur Dimenſions donnent $x + \frac{1}{3}x^3 - \frac{1}{5}x^5 + \frac{2}{7}x^7$, &c. que j'égale à y. Ainſi l'Equation $y = x + \frac{1}{3}x^3 - \frac{1}{5}x^5 + \frac{2}{7}x^7$, &c. déterminera la Relation de x & y, que l'on demandoit.

XX. Soit l'Equation $\frac{\dot{y}}{\dot{x}} = a - \frac{x}{4} + \frac{xx}{64a} + \frac{131x^3}{512a^2}$ &c. l'on aura $y = ax - \frac{x^2}{8} + \frac{x^3}{192a} + \frac{131x^4}{2048a^2}$ &c. pour la Relation de x & y.

XXI. L'Equation $\frac{\dot{y}}{\dot{x}} = \frac{1}{x^3} - \frac{1}{x} + \frac{a}{x^{\frac{1}{2}}} - x^{\frac{1}{2}} + x^{\frac{3}{2}}$, &c. donne $y = -\frac{1}{2x^2} + \frac{1}{x} + 2ax^{\frac{1}{2}} - \frac{2}{3}x^{\frac{3}{2}} + \frac{2}{5}x^{\frac{5}{2}}$, &c. car en multipliant par x la Valeur de $\frac{\dot{y}}{\dot{x}}$ elle devient $\frac{1}{xx} - \frac{1}{x} + ax^{\frac{1}{2}} - x^{\frac{3}{2}} + x^{\frac{5}{2}}$, &c. ou $x^{-2} - x^{-1} + ax^{\frac{1}{2}} - x^{\frac{3}{2}} + x^{\frac{5}{2}}$, &c. qui étant diviſé par le nombre des Dimenſions, donnera la Valeur que nous venons de trouver pour y.

XXII. De la même façou l'Equation $\frac{\dot{x}}{\dot{y}} = \frac{2b^2c}{\sqrt{ay^3}} + \frac{3y^2}{a+b} + \sqrt{by+cy}$, donne $x = -\frac{4b^2c}{\sqrt{ay}} + \frac{y^3}{a+b} + \frac{2}{3}\sqrt{by^3+cy^3}$. Car la Valeur de $\frac{\dot{x}}{\dot{y}}$ multipliée par y, produit $\frac{2b^2c}{\sqrt{ay}} + \frac{3y^3}{a+b} + \sqrt{by^3+cy^3}$ ou $2b^2ca^{-\frac{1}{2}}y^{-\frac{1}{2}} + \frac{3}{a+b}y^3 + \sqrt{b+c}\times y^{\frac{3}{2}}$, & de là on aura la Valeur de x en diviſant par le nombre des Dimenſions de chaque Terme.

XXIII. Et de même $\frac{\dot{y}}{\dot{z}} = z^{\frac{2}{3}}$, donne $y = \frac{3}{5}z^{\frac{5}{3}}$. Et $\frac{\dot{y}}{\dot{x}} = \frac{ab}{cx^{\frac{1}{3}}}$, donne $y = \frac{2c}{3abx^{\frac{1}{3}}}$. Mais l'Equation $\frac{\dot{y}}{\dot{x}} = \frac{a}{x}$ donnne $y = \frac{a}{0}$. Car $\frac{a}{x}$ multiplié par x produit a, qui étant diviſé par le nombre des Dimenſions qui eſt o, donne $\frac{a}{0}$ pour la Valeur de y, ce qui eſt une Quantité infinie.

XXIV. Toutes les fois qu'il ſe rencontrera dans la Valeur de $\frac{\dot{x}}{\dot{y}}$

UVA. BHSC. SC 04146

un Terme dont le Dénominateur renfermera la Quantité Correlative d'une ſeule Dimenſion, il faudra au lieu de la Quantité Correlative ſubſtituer la Somme ou la Difference de cette Quantité & de quelqu'autre Quantité donnée ou priſe à volonté ; car cela ne changera rien au Raport des Fluxions, & la Quantité Relative Fluente ſera ſeulement diminuée d'une portion infinie, elle deviendra donc finie quoique non exprimable autrement que par un nombre infini de Termes.

XXV. Si donc dans l'Equation propoſée $\frac{\dot{y}}{\dot{x}} = \frac{a}{x}$ j'introduis la Quantité b priſe à volonté en écrivant $b + x$, au lieu de x j'aurai $\frac{\dot{y}}{\dot{x}} = \frac{a}{b+x}$, & en Diviſant $\frac{\dot{y}}{\dot{x}} = \frac{a}{b} - \frac{ax}{b^2} + \frac{ax^2}{b^3} - \frac{ax^3}{b^4}$, &c. & par conſéquent $y = \frac{ax}{b} - \frac{ax^2}{2b^2} + \frac{ax^3}{3b^3} - \frac{ax4}{4b4}$ &c. pour la Relation de x & y.

XXVI. Et ſi l'on propoſe l'Equation $\frac{\dot{y}}{\dot{x}} = \frac{2}{x} + 3 - xx$; à cauſe du Terme $\frac{2}{x}$, je mettrai $1 + x$ au lieu de x, & j'aurai $\frac{\dot{y}}{\dot{x}} = \frac{2}{1+x} + 2 - 2x - xx$. Et réduiſant le Terme $\frac{2}{1+x}$ en ſuite infinie $+ 2 - 2x + 2x^2 - 2x3 + 2x4$, &c. j'aurai $\frac{\dot{y}}{\dot{x}} = 4 - 4x + x^2 - 2x3 + 2x4$, &c. Et par conſéquent $y = 4x - 2x^2 + \frac{1}{3}x3 - \frac{1}{2}x4 + \frac{2}{5}x5$, pour la Relation de x & y.

XXVII. Et de même dans l'Equation $\frac{\dot{y}}{\dot{x}} = x^{-\frac{1}{2}} + x^{-1} - x^{\frac{1}{2}}$ ou le Terme x^{-1} ou $\frac{1}{x}$ ſe trouve, je change x en $1 - x$, & non pas $1 + x$; (car dans l'Equation x poſitif eſt plus petit que l'unité.) Et j'ai $\frac{\dot{y}}{\dot{x}} = \frac{1}{\sqrt{1-x}} + \frac{1}{1-x} - \sqrt{1-x}$. Mais le Terme $\frac{1}{1-x}$ produit $1 + x + x^2 + x^3$, &c. & le Terme $\sqrt{1-x}$ eſt égal à $1 - \frac{1}{2}x - \frac{1}{8}x^2 - \frac{1}{16}x^3$, &c. & par conſéquent $\frac{1}{\sqrt{1+x}} =$

1

UVA. BHSC. SC 04146

$\frac{1}{1 - \frac{1}{2}x - \frac{1}{8}x^2}$, &c. ou par la Diviſion $= 1 + \frac{1}{2}x + \frac{3}{8}x^2$, &c. Donc en ſubſtituant toutes ces Valeurs j'aurai $\frac{\dot{y}}{\dot{x}} = 1 + 2x + \frac{3}{2}x^2 + \frac{27}{16}x^3$, &c. Et par la Regle preſcrite $y = x + x^2 + \frac{1}{2}x3 + \frac{27}{64}x4$, &c. Et ainſi des autres.

XXVIII. Cette Tranſmutation de la Quantité Fluente peut dans d'autres Cas quelquefois réduire l'Equation à une meilleure forme, comme ſi on propoſoit $\frac{\dot{y}}{\dot{x}} = \frac{c^2x}{c^3 - 3c^2x + 3cx^2 - x^3}$, au lieu de x j'écrirois $c - x$, & j'aurois $\frac{\dot{y}}{\dot{x}} = \frac{c^3 - c^2x}{x^3}$ ou $= \frac{c^3}{x^3} - \frac{c^2}{x^2}$ ce qui donne $y = -\frac{c^3}{2x^2} + \frac{c^2}{x}$. Mais on ſentira mieux encore l'uſage de ces Tranſmutation dans la ſuite.

Solution du ſecond Cas.

XXIX. PREPARATION. Lorſque les deux Fluentes ſe trouvent dans l'Equation, il faut d'abord la réduire à la forme preſcrite en égalant le Raport des Fluxions à une ſomme de Termes ſimples.

XXX. Et outre cela, ſi dans l'Equation ainſi réduite il ſe trouve quelques Termes diviſés par la Quantité Fluente, il faut changer cette Quantité Fluente comme nous l'avons fait.

XXXI. Ainſi l'Equation $\dot{y}ax - \dot{x}xy - \dot{a}ax = 0$ étant propoſé, ou $\frac{\dot{y}}{\dot{x}} = \frac{y}{a} + \frac{a}{x}$; à cauſe du Terme $\frac{a}{x}$, je prends b à volonté, & au lieu de x j'écris $b + x$, ou $b - x$, ou $x - b$. En écrivant $b + x$, j'ai $\frac{\dot{y}}{\dot{x}} = \frac{y}{a} + \frac{a}{b+x}$, & convertiſſant $\frac{a}{b+x}$ en ſuite infinie, j'ai $\frac{\dot{y}}{\dot{x}} = \frac{y}{a} + \frac{a}{b} - \frac{ax}{b^2} + \frac{ax^2}{b^3} - \frac{ax^3}{b^4}$, &c.

XXXII. Et de même ſi on propoſoit l'Equation $\frac{\dot{y}}{\dot{x}} = 3y - 2x + \frac{x}{y} - \frac{2y}{xx}$ je mettrois pour y & pour x, $1 - y$, & $1 - x$ à cauſe des Termes $\frac{x}{y}$ & $\frac{2y}{xx}$, ce qui me donneroit $\frac{\dot{y}}{\dot{x}} = 1 - 3y + 2x +$

UVA. BHSC. SC 04146

$\frac{1-x}{1-y} + \frac{2y-2}{1-2x+x^2}$. Mais $\frac{1-x}{1-y} = 1 - x + y - xy + y^2 - xy^2 + y^3 - xy^3$, &c. Et $\frac{2y-2}{1-2x+x^2} = 2y - 2 + 4xy - 4x + 6x^2y - 6x^2 + 8x^3y - 8x^3 + 10x^4y - 10x^4$, &c. Donc $\frac{\dot{y}}{\dot{x}} = -3x + 3xy + y^2 - xy^2 + y^3 - xy^3$, &c. $+ 6x^2y - 6x^2 + 8x^3y - 8x^3 + 10x^4y - 10x^4$, &c.

XXXIII. REGLE. Vous préparerez ainſi votre Equation lorſque cela ſera néceſſaire, & vous en diſpoſerez les Termes ſelon les Dimenſions des Quantités Fluentes, en mettant d'abord ceux qui ne ſont pas affectés de la Quantité Relative; puis ceux qui ſont affectés par les plus petites Dimenſions & ainſi de ſuite. Et de la même façon vous diſpoſerez auſſi les Termes dans chacune de ces Claſſes, ſuivant les Dimenſions de la Quantité Correlative, & vous écrirez de ſuite de gauche à droite les Termes de la premiere Claſſe, c'eſt-à-dire, ceux qui ne ſont point affectés de la Quantité Relative, & vous mettrez le reſte dans une Colomne à main gauche en forme de Serie deſcendante comme vous le voyez dans la Figure. Après cette premiere Opération vous multiplierez le premier ou le plus bas des Termes de la premiere Claſſe par la Quantité Correlative, & vous diviſerez le produit par le nombre des Dimenſions, ce que vous écrirez au Quotient pour le premier Terme de la Valeur de la Quantité Relative. Puis ſubſtituant au lieu de la Quantité Relative cette Valeur dans les Termes de la Colomne à main gauche, vous procederez de la même façon pour tirer des plus bas Termes ſuivants un ſecond Terme pour le Quotient. Et en répétant ainſi l'Opération, vous continuerez le Quotient juſqu'au nombre de Termes que vous ſouhaiterez; tout ceci s'éclaircira par un Exemple ou deux.

XXXIV. EXEMPLE. Soit propoſée l'Equation $\frac{\dot{y}}{\dot{x}} = 1 - 3x + y + x^2 + xy$, j'écris de ſuite & de gauche à droite dans une ligne au-deſſus les Termes $1 - 3x + x^2$, qui ne ſont pas affectés de la Quantité Relative y; & j'écris le reſte y & xy dans une Colomne à main gauche. Et d'abord je multiplie le premier Terme 1 par la Quantité Correlative x, & diviſant le produit $1x$ ou x par le nombre 1 des Dimenſions, j'écris $\frac{x}{1}$ ou ſimplement x dans le Quotient au-deſſous; puis au lieu de y ſubſtituant cette Valeur dans

UVA. BHSC. SC 04146

	$+ 1 - 3x + xx$
$+ y$	$* + x - xx + \frac{1}{3}x^3 - \frac{1}{6}x^4 + \frac{1}{30}x^5$, &c.
$+ xy$	$* \quad * + xx - x^3 + \frac{1}{3}x^4 - \frac{1}{6}x^5 + \frac{1}{30}x^6$, &c.
Somme	$1 - 2x + xx - \frac{2}{3}x^3 + \frac{1}{6}x^4 - \frac{4}{30}x^5$, &c.
$y =$	$x - xx + \frac{1}{3}x^3 - \frac{1}{6}x^4 + \frac{1}{30}x^5 - \frac{1}{45}x^6$, &c.

les Termes $+ y$ & $+ xy$ de la Colomne à main gauche, j'ai $+ x$ & $+ xx$, que j'écris vis-à-vis & à main droite: enſuite je prends dans ce qui reſte les Termes les plus bas $- 3x$ & $+ x$, dont la Somme $- 2x$ multipliés par x devient $- 2xx$, qui diviſé par le nombre 2 des Dimenſions donne $- xx$ pour le ſecond Terme de la Valeur de y dans le Quotient. Prenant donc ce Terme & le ſubſtituant au lieu de y, j'ai $- xx$ & $- x^3$ qu'il faut ajouter reſpectivement aux Termes $+ x$ & $+ xx$, écris vis-à-vis de y & yx. Je prends de même les plus bas Termes $+ xx - xx + xx$, de la Somme xx deſquels &c. je tire le troiſiéme Terme $+ \frac{1}{3}x^3$, de la Valeur de y, & après l'avoir ſubſtitué &c. je tire des plus bas Termes $\frac{1}{3}x^3$ & $- x^3$; le quatriéme Terme $- \frac{1}{6}x^4$. Ce que l'on peut continuer auſſi long-tems qu'on le jugera à propos.

XXXV. EXEMPLE II. De même ſi vous vouliez déterminer la Relation de x & y dans l'Equation $\frac{\dot{y}}{\dot{x}} = 1 + \frac{y}{a} + \frac{xy}{a^2} + \frac{x^2y}{a^3} + \frac{x^3y}{a^4}$, &c. dans laquelle je ſuppoſe cette ſuite continuée à l'infini; il faudroit écrire 1 au commencement & les autres Termes dans la Colomne à main gauche & opérer enſuite comme vous voyez.

UVA. BHSC. SC 04146

	$+1$
$+\frac{y}{a}$	$*+\frac{x}{a}+\frac{x^2}{2a^2}+\frac{x^3}{2a^3}+\frac{x^4}{2a^4}+\frac{x^5}{2a^5}$, &c.
$+\frac{xy}{a^2}$	$*\quad *+\frac{x^2}{a^2}+\frac{x^3}{2a^3}+\frac{x^4}{2a^4}+\frac{x^5}{2a^5}$, &c.
$+\frac{x^2y}{a^3}$	$*\quad *\quad *+\frac{x^3}{a^3}+\frac{x^4}{2a^4}+\frac{x^5}{2a^5}$, &c.
$+\frac{x^3y}{a^4}$	$*\quad *\quad *\quad *+\frac{x^4}{a^4}+\frac{x^5}{2a^5}$, &c.
$+\frac{x^4y}{a^5}$	$*\quad *\quad *\quad *\quad *+\frac{x^5}{a^5}$, &c.
&c.	
Somme	$1+\frac{x}{a}+\frac{3x^2}{2a^2}+\frac{2x^3}{a^3}+\frac{5x^4}{2a^4}+\frac{3x^5}{a^5}$, &c.
$y=$	$x+\frac{x^2}{2a}+\frac{x^3}{2a^2}+\frac{x^4}{2a^3}+\frac{x^5}{2a^4}+\frac{x^6}{2a^5}$, &c.

XXXVI. Comme je n'ai eu intention de tirer la Valeur de y que juſqu'à la ſixiéme Dimenſion de x, j'ai omis dans l'Opération tous les Termes dont j'ai prévû l'inutilité dans mon deſſein.

XXXVII. EXEMPLE III. Je ſuppoſe qu'on ait l'Equation

$\frac{\dot{y}}{\dot{x}} = -3x+3xy+y^2-xy^2+y^3-xy^3+y^4-xy^4$, &c.

$+6x^2y-6x^2+8x^3y-8x^3+10x^4y-10x^4$, &c. dont on veuille tirer la Valeur de y juſqu'à la ſeptiéme Dimenſion de x. Il faut placer les Termes dans l'ordre que j'ai preſcrit, ſeulement on obſervera de plus que dans la Colomne à gauche y étant de pluſieurs Dimenſions ſucceſſives, il faut auſſi l'écrire & lui ſubſtituer des Valeurs comme on le voit ici.

UVA. BHSC. SC 04146

	$-3x-6x^2-8x^3-10x^4-12x^5-14x^6$, &c.
$+3xy$	$*\quad *\quad -\frac{9}{2}x^3-6x^4-\frac{75}{8}x^5-\frac{273}{20}x^6$, &c.
$+6x^2y$	$*\quad *\quad *\quad -9x^4-12x^5-\frac{75}{4}x^6$, &c.
$+8x^3y$	$*\quad *\quad *\quad *\quad -12x^5-16x^6$, &c.
$+10x^4y$	$*\quad *\quad *\quad *\quad *\quad -15x^6$, &c.
&c.	
$+y^2$	$*\quad *\quad *\quad +\frac{9}{4}x^4+6x^5+\frac{107}{8}x^6$, &c.
$-xy^2$	$*\quad *\quad *\quad *\quad -\frac{9}{4}x^5-6x^6$, &c.
&c.	
$+y^3$	$*\quad *\quad *\quad *\quad *\quad -\frac{27}{8}x^6$, &c.
Somme	$-3x-6x^2-\frac{25}{2}x^3-\frac{91}{4}x^4-\frac{333}{8}x^5-\frac{367}{5}x^6$, &c.

$$y = -\tfrac{3}{2}x^2-2x^3-\tfrac{25}{8}x^4-\tfrac{91}{20}x^5-\tfrac{111}{16}x^6-\tfrac{367}{35}x^7, \text{ \&c.}$$
$$y^2 = +\tfrac{9}{4}x^4+6x^5+\tfrac{107}{8}x^6, \text{ \&c.}$$
$$y^3 = -\tfrac{27}{8}x^6, \text{ \&c.}$$

Il vient à la fin $y = -\frac{3}{2}x^2-6x^3-\frac{25}{8}x^4$, &c. pour l'Equation cherchée ; & comme cette Valeur eſt négative, il faut en conclure que l'une des Quantités x & y diminuë, tandis que l'autre augmente. C'eſt la même choſe quand l'une des Fluxions eſt poſitive & l'autre négative.

XXXVIII. Exemple IV. Lorſque la Quantité Relative de l'Equation aura des Dimenſions rompuës, vous ne laiſſerez pas que d'opérer de la même façon, comme pour tirer la Valeur de x de cette Equation, $\frac{\dot{x}}{\dot{y}} = \frac{1}{2}y-4y^2+2yx^{\frac{1}{2}}-\frac{4}{1}x^2+7y^{\frac{5}{2}}+2y^3$

UVA. BHSC. SC 04146

	$+\frac{1}{2}y \quad * \quad -4y^2 \quad +7y^{\frac{5}{2}} \quad +2y^3$
$2yx^{\frac{1}{2}}$	$* \quad * \quad +y^2 \quad * \quad -2y^3 \quad +4y^{\frac{7}{2}} \quad -2y^4$, &c.
$-\frac{4}{5}x^2$	$* \quad * \quad * \quad * \quad * \quad * \quad -\frac{1}{20}y^4$, &c.
Somme	$+\frac{1}{2}y \quad * \quad -3y^2 \quad +7y^{\frac{5}{2}} \quad * \quad +4y^{\frac{7}{2}} \quad -\frac{41}{20}y^4$, &c.

$x =$ $+\frac{1}{4}y^2 - y^3 + 2y^{\frac{7}{2}} \quad * \quad +\frac{8}{9}y^{\frac{9}{2}} - \frac{41}{100}y^5$, &c.

$x^{\frac{1}{2}} =$ $+\frac{1}{2}y - y^2 + 2y^{\frac{5}{2}} - y^3$, &c.

$x^2 =$ $\frac{1}{10}y^4$, &c.

ou il ſe trouve un Terme $2yx^{\frac{1}{2}}$ d'une Dimenſion rompuë $\frac{1}{2}$ de x; je cherche d'abord la Valeur de x, & de cette Valeur en extraïant la Racine quarrée, je tire la Valeur de $x^{\frac{1}{2}}$ & je la tranſporte auſſi par degrés dans la Colomne à main gauche, comme l'on peut voir ci-deſſus, & à la fin j'ai l'Equation $x = \frac{1}{4}y^2 - y^3 + 2y^{\frac{7}{2}} + \frac{8}{9}y^{\frac{9}{2}} - \frac{41}{100}y^5$, &c. qui exprime indéfiniment la Valeur de x par raport à y. Vous opérerez de même dans tous les autres cas ſemblables.

XXXIX. J'ai dit que ces Réſolutions d'Equations pouvoient ſe faire d'une infinité de manieres differentes. En effet, ſi vous prenez non ſeulement le premier Terme de la ſuite ſupérieure; mais telle autre Quantité donnée que vous voudrez pour le premier Terme du Quotient & que vous opériez comme ci-deſſus, vous en viendrez toujours à bout; ainſi dans le premier des Exemples précédens ſi vous prenez 1 pour le premier Terme de la Valeur de y, & qu'après l'avoir ſubſtitué au lieu de y dans les Termes $+y$ & $+xy$ de la Colomne à main gauche, vous ſuiviez l'Opération il viendra une autre Valeur de y qui ſera $1 + 2x + x^3 + \frac{1}{4}x^4$, &c.

	$+1 - 3x + xx$
$+y$	$+1 \quad +2x \quad * \quad +x^3 \quad +\frac{1}{4}x^4$, &c.
$+xy$	$* \quad +x \quad +2x^2 \quad * \quad +x^4$, &c.
Somme	$+2 \quad * \quad +3x^2 \quad +x^3 \quad +\frac{5}{4}x^4$, &c.

$y =$ $1 + 2x \quad * \quad +x^3 \quad +\frac{1}{4}x^4 \quad +\frac{1}{4}x^5$, &c.

UVA. BHSC. SC 04146

Et de cette façon vous pourrez avoir d'autres Valeurs en prenant 2, ou 3, ou un autre nombre quelconque pour le premier Terme. Ou bien en vous ſervant d'un Symbole quelconque comme a, pour repréſenter le premier Terme, vous trouverez $y = a + x + ax - xx + axx + \frac{1}{3}x3 + \frac{2}{3}ax3$, ou ſubſtituant pour a les Nombres 1, 2, 0, $\frac{1}{2}$, ou tout autre Nombre, vous pourrez avoir la Relation entre x & y d'une infinité de façons differentes.

	$+ 1 - 3x + xx$
$+ y$	$+ a + x - xx + \frac{1}{3}x3$, &c.
	$+ ax + ax^2 + \frac{2}{3}ax3$, &c.
$+ xy$	$* + ax + x^2 - x3$, &c.
	$+ ax^2 + ax3$, &c.
Somme	$+ 1 - 2x + x^2 - \frac{2}{3}x3$, &c.
	$+ a + 2ax + 2ax^2 + \frac{5}{3}ax3$, &c.
$y =$	$a + x - x^2 + \frac{1}{3}x3 - \frac{1}{2}x4$, &c.
	$+ ax + ax^2 + \frac{2}{3}ax3 + \frac{5}{12}ax4$, &c.

XL. Et vous obſerverez dans le cas où la Quantité eſt affectée d'une Dimenſion rompuë, comme dans l'Exemple 4. qu'il convient alors de prendre l'unité ou quelque Nombre pour le premier Terme, & même cela devient néceſſaire quand pour avoir la Valeur de cette Dimenſion rompuë l'on ne peut tirer autrement la Racine, & cela à cauſe du Signe négatif ; comme auſſi lorſqu'il n'y a aucun Terme qu'on puiſſe mettre dans la premiere Claſſe au-deſſus, pour en tirer le premier Terme du Quotient.

XLI. Ainſi j'ai donc achevé ce Problême épineux & le plus difficile de tous les Problêmes ; mais outre cette Méthode générale dans laquelle j'ai compris toutes les Difficultés, il y en a d'autres particulieres plus courtes & qui facilitent quelquefois l'Opération ; le Lecteur ne ſera pas fâché d'en voir ici quelques eſſais.

XLII. 1. Si la Quantité ſe trouve être d'une Dimenſion négative dans quelques Termes, il ne ſera pas abſolument néceſſaire pour cela de réduire l'Equation à une autre forme. Par Exemple, je pourrois réduire à une autre forme l'Equation $\dot{y} = \frac{1}{y} - xx$ en

UVA. BHSC. SC 04146

ſuppoſant $1 + y$ au lieu de y ; mais il ſera plus court d'opérer comme vous voyez.

	$* \quad * - xx$
$\frac{1}{y}$	$1 - x + \frac{3}{2}xx$, &c.
Somme	$1 - x + \frac{1}{2}xx$, &c.
$y =$	$1 + x - \frac{1}{2}xx + \frac{1}{6}x^3$, &c.
$\frac{1}{y} =$	$1 - x + \frac{3}{2}xx$, &c.

XLIII. Je prends 1 pour le premier Terme de la Valeur de y, je tire le reſte des Termes comme ci-devant, & en même temps j'en déduis par degrés & par la Diviſion la Valeur de $\frac{1}{y}$ & je la fais entrer dans la Valeur du Terme qui eſt dans la Colomne à main gauche.

XLIV. 2. Il n'eſt pas toujours néceſſaire auſſi que les Dimenſions de l'autre Quantité Fluente ſoient toujours poſitives, car de l'Equation $\dot{y} = 3 + 2y - \frac{yy}{x}$, on tirera $y = 3x - \frac{3}{2}xx + 2x^3$, &c. ſans la Réduction du Terme $\frac{yy}{x}$.

XLV. Et l'Equation $\dot{y} = -y + \frac{1}{x} - \frac{1}{xx}$ donnera $y = \frac{1}{x}$ en en faiſant l'Opération comme vous la voyez.

	$-\frac{1}{xx} + \frac{1}{x}$
$-y$	$* - \frac{1}{x}$
Somme	$-\frac{1}{xx} \quad 0$
$y =$	$\frac{1}{x}$

XLVI.

UVA. BHSC. SC 04146

XLVI. On peut obſerver en paſſant que dans le nombre infini de manieres dont on peut réſoudre cette Equation, il s'en trouve ſouvent qui déterminent en Termes finis la Valeur de la Quantité, & cela en ſe terminant tout d'un coup comme dans l'Exemple précédent ; il n'eſt pas même difficile de trouver ces façons en prenant quelque Symbole pour le premier Terme, & en lui donnant après la Solution quelque Valeur convenable qui puiſſe rendre finie la ſuite entiere.

XLVII. 3. On peut encore aſſez facilement & ſans aucune Réduction du Terme $\frac{y}{2x}$ tirer la Valeur de y de l'Equation $\dot{y} = \frac{y}{2x} + 1 - 2x + \frac{1}{2}xx$. Et cela en ſuppoſant à la maniere des Analyſtes que ce qu'on cherche eſt donné. Ainſi pour le premier Terme de la Valeur de y je mets $2ex$, prenant $2e$ pour le Cœfficient numérique inconnu. Je ſubſtitue dans la Colomne à main gauche $2ex$ au lieu de y, il vient e que j'écris à main droite & la Somme $1 + e$ donne $x + ex$, pour le même premier Terme de y que j'avois d'abord repreſenté par $2ex$; je fais donc $2ex = x + ex$, & j'ai $e = 1$, donc le premier Terme de la Valeur de y eſt $2x$. Je me ſers de même d'un Terme ſuppoſé $2fx^2$ pour repréſenter le ſecond Terme de la Valeur de y, & à la fin j'en tire $-\frac{2}{3}$ pour la Valeur de f, ainſi le ſecond Terme eſt $-\frac{4}{3}xx$; de même le Cœfficient ſuppoſé g dans le troiſiéme Terme donnera $\frac{1}{10}$; & h dans le quatriéme Terme ſera zero, ce qui marque qu'il n'y a plus d'autres Termes, que l'Opération ſe termine là, & que par conſéquent la Valeur de y eſt exactement $2x - \frac{4}{3}x^2 + \frac{1}{10}x^3$. Voyez ici l'Opération.

UVA. BHSC. SC 04146

	$1 - 2x + \frac{1}{2}xx$
$\frac{y}{2x}$	$e + fx + gxx + hx^3$
Somme	$+1 - 2x + \frac{1}{2}xx$ $+e + fx + gx^2 + hx^3$

par Hypotheſe $y =$ $2ex + 2fx^2 + 2gx^3 + 2hx^4$
par Conſéquent $y =$ $+x - x^2 + \frac{1}{3}x^3 + \frac{1}{4}hx^4$
$+ex + \frac{1}{2}fx^2 + \frac{1}{3}gx^3$
Donc Valeur réelle de $y =$ $2x - \frac{4}{3}x^2 + \frac{1}{5}x^3$

XLVIII. De la même maniere à peu près nous ſuppoſerons dans l'Equation $\dot{y} = \frac{3y}{4x}$ que y eſt égal à ex^s ; e marque le Cœfficient inconnu, & s le nombre de Dimenſions qui eſt auſſi inconnu. Subſtituons ex^s au lieu de y, nous aurons $\dot{y} = \frac{3ex^{s-1}}{4}$ & de la $y = \frac{3ex^s}{4s}$. Comparons ces deux Valeurs de y, & nous trouverons $\frac{3e}{4s} = e$, d'où $s = \frac{3}{4}$, & e ſera indéterminée ; l'on aura donc $y = ex^{\frac{3}{4}}$, & on pourra donner à e une Valeur à volonté.

XLIX. 4. On peut quelquefois commencer l'Opération par la plus haute puiſſance de la Quantité, en deſcendant continuellement aux puiſſances inférieures comme dans cette Equation $\dot{y} = \frac{y}{xx} + \frac{1}{xx} + 3 + 2x - \frac{4}{x}$; car en diſpoſant les Termes d'une façon contraire & commençant par le plus haut Terme, on trouve à la fin $y = xx + 4x - \frac{1}{x}$, &c. comme vous le voyez.

UVA. BHSC. SC 04146

	$+ 2x + 3 - \frac{4}{x} + \frac{1}{xx}$
$+ \frac{y}{xx}$	$* + 1 + \frac{4}{x} \quad * - \frac{1}{x^3} + \frac{1}{2x^4}$,
Somme	$+ 2x + 4 \quad * + \frac{1}{xx} - \frac{1}{x^3} + \frac{1}{2x^4}$,
$y =$	$x^2 + 4x \quad * - \frac{1}{x} + \frac{1}{2x^2} + \frac{1}{6x^3}$,

L. On a peut-être remarqué en faiſant l'Opération que j'aurois pû mettre entre les Termes $4x$ & $- \frac{1}{x}$, telle Quantité donnée que j'aurois voulu pour tenir lieu du Terme intermédiaire qui manque, ce qui peut donc produire une infinité de Valeurs differentes pour y.

LI. 4. Si la Quantité Relative a des Dimenſions rompuës, on peut les réduire à des Dimenſions entieres en la ſuppoſant égale à une autre Quantité, & en ſubſtituant cette nouvelle Quantité & ſa Fluxion au lieu de la Quantité Relative & de ſa Fluxion.

LII. Comme ſi l'on propoſoit l'Equation $\dot{y} = 3x\dot{y}^{\frac{2}{3}} + y$, ou la Quantité Relative y eſt élevée à l'Expoſant rompu $\frac{2}{3}$; je ſuppoſerois $y^{\frac{1}{3}} = z$, ou $y = z^3$; la Relation des Fluxions ſera $\dot{y} = 3z\dot{z}^2$; ainſi en ſubſtituant j'aurai $3z\dot{z}^2 = 3xz^2 + z^3$, ou $z = x + \frac{1}{3}z$, dans laquelle Equation z tient lieu de la Quantité Relative; mais après avoir tiré la Valeur de $z = \frac{1}{2}x^2 + \frac{x^3}{18} + \frac{x^4}{216} + \frac{x^5}{3240}$, &c. je reſtitue $y^{\frac{1}{3}}$ au lieu de z, & j'ai $y^{\frac{1}{3}} = \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{18}x^3 + \frac{1}{216}x^4 + \frac{1}{3240}x^5$, &c. ou en Cubant $y = \frac{1}{8}x^6 + \frac{1}{24}x^7 + \frac{1}{288}x^8$, &c.

LIII. De même dans l'Equation $\dot{y} = \sqrt{4y} + \sqrt{xy}$, ou $\dot{y} = 2y^{\frac{1}{2}} + x^{\frac{1}{2}}y^{\frac{1}{2}}$; je fais $z = y^{\frac{1}{2}}$, ou $z\dot{z} = \dot{y}$, & j'ai $2z\dot{z} = \dot{y}$, & par conſéquent $2z\dot{z} = 2z + x^{\frac{1}{2}}z$, ou $\dot{z} = 1 + \frac{1}{2}x^{\frac{1}{2}}$. Donc $z = x + \frac{1}{3}x^{\frac{3}{2}} = y^{\frac{1}{2}}$, ou $y = xx + \frac{2}{3}x^{\frac{5}{2}} + \frac{1}{9}x^3$. Si je voulois avoir

UVA. BHSC. SC 04146

la Valeur de y par un nombre infini de manieres differentes, je ferois $z = c + x + \frac{1}{3}x^{\frac{1}{2}}$, prenant un premier Terme quelconque c, car alors zz, ou y seroit $= c^2 + 2cx + \frac{2}{3}cx^{\frac{3}{2}} + x^2 + \frac{2}{3}x^{\frac{5}{2}} + \frac{1}{9}x^3$. Mais j'entre peut-être ici dans un trop grand détail, & je m'arrête trop long-tems à parler de choſes qui ne viendront que rarement à être miſes en pratique.

Solution du troiſiéme Cas.

LIV. Nous viendrons maintenant aiſément à bout du troiſiéme Cas ; ſçavoir, lorſque l'Equation renferme trois ou plus de trois Fluxions de Quantités. Car ſi la Relation de deux de ces Quantités n'eſt pas déterminé par l'état de la Queſtion, on peut à volonté leur ſuppoſer une Relation quelconque, & de là tirer le Raport de leur Fluxions, ce qui donnera le moyen de faire évanoüir l'une de ces Quantités & ſa Fluxion. S'il n'y a donc que les Fluxions de trois Quantités, il ne faudra ſuppoſer qu'une Equation ; mais s'il y a quatre Fluxions il faudra deux Equations, & ainſi de ſuite afin qu'en tous les Cas l'Equation ſoit renfermée dans un autre qui ne contienne que deux Fluxions, d'où vous tirerez toujours le Raport des Quantités Fluentes par les Méthodes que nous avons données ci-devant.

LV. Soit propoſée l'Equation $2\dot{x} - \dot{z} + \dot{y}x = 0$; qui contient les Fluxions $\dot{x}$, $\dot{z}$, $\dot{y}$ des Quantités x, z, y, dont on demande les Raports. Je forme à volonté un Raport entre deux de ces Quantités à mon choix, par exemple entre x & y en ſuppoſant $x = y$, ou $x = yy$; ou bien entre y & z en ſuppoſant $2y = a + z$, &c. Mais dans le Cas préſent je m'arrête au Raport $x = yy$, qui me donne $\dot{x} = 2y\dot{y}$. Subſtituant donc $2yy$ pour x, j'aurai $4y\dot{y} - \dot{z} + \dot{y}y^2 = 0$, d'où l'on tire $2yy + \frac{1}{3}y^3 = z$, pour le Raport de z & de y. Et en écrivant x pour yy, & $x^{\frac{3}{2}}$ pour y^3, on aura $2x + \frac{1}{3}x^{\frac{3}{2}} = z$. Ainſi dans le nombre infini de manieres de trouver les Relations que peuvent avoir x, y & z, nous en avons choiſis une qui eſt repréſentée par ces Equations $x = yy$, $2y^2 + \frac{1}{3}y^3 = z$, & $2x + \frac{1}{3}x^{\frac{3}{2}} = z$.

UVA. BHSC. SC 04146

Démonſtration.

LVI. Le Problême eſt donc réſolu, mais la Démonſtration reſte & n'eſt pas aiſée à trouver par la Syntheſe ; la matiere eſt trop compliquée & trop variée pour qu'on doive ſe ſervir de cette Méthode, qui au lieu d'éclaircir jetteroit ici de l'obſcuriré ; ainſi l'on ſe contentera de l'atteindre par l'Analyſe en cherchant tout ſimplement ſi de l'Equation trouvée on peut revenir à l'Equation propoſée, ce qui prouvera aſſez que la Méthode eſt ſûre.

LVII. Si donc l'Equation propoſée eſt $\dot{y} = x$, l'Equation trouvée eſt $y = \frac{1}{2}x^2$; laquelle Equation par le Prob. 1. donne $\dot{y} = x\dot{x}$; ce qui en ſuppoſant $\dot{x} = 1$, revient à notre Equation propoſée $\dot{y} = x$. Et de même de l'Equation $\dot{y} = 1 - 3x + y + xx + xy$ on tire $y = x - x^2 + \frac{1}{3}x^3 - \frac{1}{6}x^4 + \frac{1}{30}x^5 - \frac{1}{45}x^6$, &c. Et de celle-ci par le Prob. 1. on tire $\dot{y} = 1 - 2x + x^2 - \frac{2}{3}x^3 + \frac{1}{6}x^4 - \frac{2}{15}x^5$, &c. Et l'on voit que ces deux Valeurs de $\dot{y}$ conviennent enſemble en ſubſtituant dans la premiere Valeur $x - xx + \frac{1}{3}x^3 - \frac{1}{6}x^4 + \frac{1}{30}x^5$, &c. au lieu de y.

LVIII. Dans la Réduction des Equations j'ai fait uſage d'une Opération dont il eſt à propos de donner la raiſon. C'eſt la Tranſmutation d'une Quantité Fluente en une autre Quantité compoſée d'une Quantité donnée, & de cette Quantité Fluente pour expliquer ceci ſoient AE & *ae* deux Lignes indéfiniment étenduës des deux côtés, ſur leſquelles deux Points ſe meuvent & arrivent en même tems en A & *a*, B & *b*, C & *c*, D & *d*, &c. Suppoſons que B ſoit le Point par la diſtance duquel ſe meſure & s'eſtime le Mouvement du Point en AE, de ſorte que — BA, BC, BD, BE, ſoient ſucceſſivement les Quantités Fluentes, quand le Point qui ſe meut ſe trouve ſucceſſivement en A, C, D, E. De même ſuppoſons que *b* ſoit un pareil Point pris dans l'autre Ligne ; alors — BA & — *ba* ſeront les Fluentes contemporaines, comme auſſi BC & *bc*, BD & *bd*, BE & *be*. Mais ſi au lieu des Points B



UVA. BHSC. SC 04146

& *b*, on prenoit les Points A & *c*, comme les Points de Repos auſquels on dût rapporter les Mouvemens ; alors o & — *ca*, AB & — *cb*, AC & o, AD & *cd*, AE & *ce*, ſeront les Fluentes contemporaines ; on voit donc que les Quantités Fluentes ſont changées par l'Addition & la Souſtraction des Quantités données AB & *ac* ; mais qu'elles ne ſont point changées eu égard à la Viteſſe de leur Mouvement, & par conſéquent le Raport mutuel des Fluxions reſte le même, car les Parties contemporaines AB & *ab*, BC & *bc*, CD & *cd*, DE & *de*, ſont de même longueur dans les deux Cas : Ainſi dans les Equations on peut augmenter ou diminuer d'une Quantité donnée la grandeur abſoluë des Quantités Fluentes qu'elles contiennent ſans changer le Raport de leurs Parties contemporaines ; & le ſeul but du Problême de l'invention des Fluentes eſt de déterminer les Parties ou Differences contemporaines des Quantités abſoluës u, x, y, ou z, par la Loi donnée de leur Mouvement de Fluxion, qui eſt toujours la même de quelque grandeur abſoluë que ſoient ces Quantités.

LIX. On peut auſſi faire concevoir ceci par Symboles. Soit l'Equation $\dot{y} = \dot{x}xy$, je ſuppoſe $x = 1 + z$ donc $\dot{x} = \dot{z}$; ainſi au lieu de $\dot{y} = \dot{x}xy$, j'aurai $\dot{y} = \dot{x}y + \dot{x}zy$; mais puiſque $\dot{x} = \dot{z}$, il eſt évident que quoique les Quantités x & z ne ſoient pas de même longueur, elles Fluent cependant de même à l'égard de y, & que leurs Parties contemporaines ſont égales ; je puis donc repréſenter par les mêmes Symboles les Quantités qui conviennent enſemble par le Raport de leurs Fluxions, & me ſervir de $\dot{y} = \dot{x}y + \dot{x}xy$, au lieu de $\dot{y} = \dot{x}xy$, pour déterminer les Differences contemporaines.

LX. On voit bien comment dans une Equation qui ne contient que des Quantités Fluentes, on peut trouver les Parties contemporaines ; par Exemple, ſi l'Equation eſt $y = \frac{1}{x} + x$; lorſque $x = 2$, $y = 2\frac{1}{2}$; mais lorſque $x = 3$, $y = 3\frac{1}{3}$. Ainſi tandis que x flue de 2 à 3, y flue de $2\frac{1}{2}$ à $3\frac{1}{3}$. Et les Parties comtemporaines, c'eſt-à-dire décrites pendant cet intervale de tems ſont $3 - 2 = 1$, & $3\frac{1}{3} - 2\frac{1}{2} = \frac{5}{6}$.

LXI. Tout ce que j'ai établi ci-devant ſe verra dans la ſuite de ce Traité, où je vais donner des Problêmes plus particuliers que les précédens.

UVA. BHSC. SC 04146

PROBLEME III.

Déterminer les Maxima *& les* Minima *des Quantités.*

I. UNE Quantité qui eſt devenuë la plus grande ou la moindre qu'il ſe peut, n'augmente ni ne diminuë, c'eſt-à-dire, ne flue ni en avant ni en arriere dans cet inſtant ; car ſi elle augmente, c'eſt une marque qu'elle étoit plus petite & que tout à l'heure elle va être plus grande qu'elle n'étoit, ce qui eſt contre la ſuppoſition, & c'eſt le contraire ſi elle diminue. Ainſi trouvez ſa Fluxion par le Prob. 1. & ſuppoſez la égale à zero.

II. EXEMPLE. 1. Si l'on demande la plus grande Valeur de x dans l'Equation $x^3 - ax^2 + axy - y^3 = 0$, cherchez la Relation des Fluxions de x & de y, & vous aurez $3\dot{x}x^2 - 2a\dot{x}x + a\dot{x}y - 3\dot{y}y^2 + a\dot{y}x = 0$. Faiſant donc $\dot{x} = 0$, il reſte $-3\dot{y}y^2 + a\dot{y}x = 0$, ou $3y^2 = ax$. Par le moyen de cette Equation vous pouvez exterminer x ou y dans l'Equation primitive, & par l'Equation qui en réſultera vous déterminerez l'autre.

III. Cette Opération eſt la même que ſi vous aviez multiplié les Termes de l'Equation propoſée par le nombre des Dimenſions de l'autre Quantité Fluente y, d'où nous pouvons tirer la fameuſe Régle de Hudde, *que pour avoir la plus grande ou la moindre Quantité Relative l'Equation doit être diſpoſée ſuivant les Dimenſions de la Quantité Correlative, & qu'on doit multiplier alors les Termes par une progreſſion Arithmétique quelconque* ; mais comme ni cette Régle ni aucune de celles que l'on a publiées juſqu'à préſent & qui ſoient venues à ma connoiſſance ne peuvent s'étendre aux Equations affectées de Quantités ſourdes ſans une Réduction précédente ; je vais donner un Exemple à ce ſujet.

IV. EXEMPLE 2. Si l'on demande la plus grande Quantité y dans l'Equation $x^3 - ay^2 + \frac{by^3}{a+y} - xx\sqrt{ay + xx} = 0$, cherchez les Fluxions de x & de y, & vous aurez $3\dot{x}x^2 - 2a\dot{y}y + \frac{3ab\dot{y}y^2 + 2b\dot{y}y^3}{a^2 + 2ay + y^2} - \frac{4a\dot{x}xy + 6\dot{x}x^3 + a\dot{y}x^2}{2\sqrt{ay + xx}} = 0$. Et puiſque par la ſuppoſition $\dot{y} = 0$, ôtez les Termes multipliés par $\dot{y}$, (ce qui pour abréger

UVA. BHSC. SC 04146

auroit pû ſe faire auparavant, c'eſt-à-dire, en faiſant l'Opération,) diviſés le reſte par xx, & vous n'aurez plus que $3x - \frac{2ay + 3xx}{\sqrt{ay + xx}} = 0$.

Et après la Réduction $4ay + 3xx = 0$, au moyen de laquelle Equation vous exterminerez dans la propoſée l'une ou l'autre des Quantités x ou y & de l'Equation Cubique qui en réſultera, vous tirerez la Valeur de l'autre Quantité.

V. De ce Problême on tire la Solution des ſuivants.

1. *Dans un Triangle donné, ou dans un Segment d'une Courbe donnée quelconque inſcrire le plus grand Rectangle.*

2. *Tirer la moindre ou la plus grande Ligne droite d'un Point donné à une Courbe donnée de poſition, ou bien tirer une Perpendiculaire d'un Point donné à une Courbe quelconque.*

3. *Par un Point donné faire paſſer la plus grande ou la moindre Ligne droite qui puiſſe être compriſe entre deux autres Lignes droites ou Courbes.*

4. *D'un Point donné au-dedans d'une Parabole, tirer une Ligne droite qui coupe la Parabole plus obliquement qu'aucune autre. Faire le même dans les autres Courbes.*

5. *Déterminer les Sommets des Courbes, leurs plus grandes ou moindres Amplitudes, leurs Points d'interſection dans les révolutions.*

6. *Trouver les Points des Courbes où elles ont la plus grande ou la moindre Courbure.*

7. *Dans une Ellipſe donnée trouver le plus petit Angle ſous lequel les Ordonnées peuvent couper leurs Diametres.*

8. *Des Ellipſes qui paſſent par quatre Points donnés, déterminer la plus grande ou celle qui approche le plus du Cercle.*

9. *Déterminer la partie poſtérieure d'une ſurface Spherique, qui peut être éclairée par la lumiere venant de loin & rompuë par l'Hemiſphere antérieur.*

Et pluſieurs autres Problêmes de ſemblables nature que l'on peut plus aiſément propoſer que réſoudre, à cauſe du travail que demande le Calcul.

PROBLEMES

UVA. BHSC. SC 04146

PROBLEME IV.

Tirer les Tangentes des Courbes.

PREMIERE MANIERE.

I. ON peut tirer les Tangentes différemment, ſelon les différentes Relations des Courbes aux Lignes droites, & premierement ſoit BD une Ligne droite Ordonnée ſous un Angle donné à une autre Ligne droite AB, priſe pour Baſe ou Abſciſſe, & ſoit BD terminée à une Courbe ED. Faites mouvoir cette Ordonnée & faites-lui parcourir un Eſpace indéfiniment petit & parvenir à *bd*. Elle aura augmenté du Moment *cd*, tandis que AB aura augmenté du Moment B*b*, auquel D*c* eſt égal & parallele. Prolongés D*d* juſqu'à ce qu'elle rencontre AB en T, cette Ligne touchera la Courbe en D ou *d*, & les Triangles *dc*D, DBT ſeront ſemblables; ce qui donne TB : BD :: D*c* ou B*b* : *cd*.



II. La Relation de BD à AB eſt donnée par l'Equation à la Courbe; cherchez par le Prob. 1. la Relation des Fluxions, & prenez TB à BD dans le Raport de la Fluxion de AB à la Fluxion de BD; la Ligne TD touchera la Courbe au Point D.

III. EXEMPLE. 1. Nommant AB, x & BD, y, ſoit leur Raport $x^3 - ax^2 + axy - y^3 = 0$. Celui des Fluxions ſera $3\dot{x}x^2 - 2a\dot{x}x + a\dot{x}y + ay\dot{x} - 3\dot{y}y^2 = 0$. Ainſi $\dot{x} : \dot{y} :: 3xx - 2ax + ay : 3y^2 - ax$ :: BD (y) : BT. Donc BT $= \frac{3y^3 - axy}{3x^2 - 2ax + ay^2}$ Et le Point D & de la les Lignes DB & AB ou x & y étant données, la longueur BT ſera donnée, ce qui détermine la Tangente TD.

IV. Mais on peut abréger l'Opération; faites les Termes de l'Equation propoſée égaux à zero, multipliez-les par les nombres des Dimenſions de l'Ordonnée, & mettez le Réſultat au Numerateur; multipliez enſuite les Termes de la même Equation par les nombres des Dimenſions de l'Abciſſe, & mettez le

UVA. BHSC. SC 04146

produit diviſé par l'Abciſſe au Dénominateur de la Valeur de BT, & prenez BT du côté de A, ſi ſa Valeur eſt poſitive, & du côté oppoſé ſi ſa Valeur eſt négative.

V. Ainſi l'Equation $x^{3}{}^{0} - ax^{2}{}^{0} + axy^{1} - y^{3}{}^{3} = 0$, étant multipliée par les Nombres du deſſus, donne $axy - 3y^3$ pour le Numerateur ; & multipliée par les Nombres de deſſous & diviſée par x, donne $3x^2 - 2ax + ay$ pour le Dénominateur de la Valeur de BT.

VI. Ainſi l'Equation $y^3 - by^2 - cdy + bcd + dxy = 0$, qui déſigne une Parabole du ſecond genre par le moyen de laquelle *Deſcartes* conſtruiſoit les Equations de ſix Dimenſions, Voyez ſa Géometrie *pag.* 42. *Edit. d'Amſterdam* 1659. donne à l'Inſpection $\frac{3y^3 - 2by^2 - cdy + dxy}{dy}$, ou $\frac{3yy}{d} - \frac{2by}{d} - c + x = \text{BT}$.

VII. Et de même $a^2 - \frac{r}{q}x^2 - y^2 = 0$, qui déſigne une Ellipſe dont le Centre eſt A, donne $\frac{-2yy}{\frac{2rx}{q}}$, ou $\frac{qyy}{rx} = \text{BT}$, & ainſi des autres.

VIII. Vous pouvez remarquer qu'il n'importe de quelle grandeur ſoit l'Angle d'Ordination ABD.

IX. Mais comme cette Régle ne peut s'étendre aux Equations affectées de Quantités ſourdes, ou aux Courbes mécaniques ; il faut dans ces Cas avoir recours à la Méthode fondamentale.

X. Exemple 2. Soit $x^3 - ay^2 + \frac{by^3}{a+y} - xx\sqrt{ay+xx} = 0$, l'Equation qui exprime la Relation entre AB & BD ; la Relation des Fluxions ſera $3\dot{x}x^2 - 2a\dot{y}y + \frac{3ab\dot{y}y^2 + 2b\dot{y}y^3}{aa+2ay+yy} - \frac{4a\dot{x}xy - 6\dot{x}x^3 - a\dot{y}x^2}{2\sqrt{ay+xx}} = 0$. Donc $3xx \frac{-4axy-6x^3}{2\sqrt{ay+xx}} : 2ay \frac{-3abyy+2by^3}{aa+2ay+yy} + \frac{axx}{2\sqrt{ay+xx}} :: \dot{y} : \dot{x} :: \text{BD} : \text{BT}$.

UVA. BHSC. SC 04146

II. Exemple 3. Soit ED la Conchoïde de *Nicodeme*, décrite du Pôle G, soit AT l'Asymptote & LD la Distance ou Ligne interceptée. Soit GA $= b$, LD $= c$, AB $= x$, & BD $= y$. A cause des Triangles semblables DBL & DMG, on aura LB :



$\overline{BD} : \overline{DM} : \overline{MG}$; c'est-à-dire, $\sqrt{cc - yy} : y :: x : b + y$, ou $b + y\sqrt{cc - yy} = yx$. Dans cette Equation je suppose $\sqrt{cc - yy} = z$, & par là j'ai deux autres Equations $bz + yz = xy$, & $zz = cc - yy$, par le moyen desquelles je trouve les Fluxions de x, y & z, car la premiere donne $\dot{b}z + \dot{y}z + z\dot{y} = \dot{x}y + y\dot{x}$, & la seconde $2z\dot{z} = -2y\dot{y}$, ou $z\dot{z} + y\dot{y} = 0$. En exterminant z, on aura $-\frac{b\dot{y}y}{z} - \frac{y\dot{y}^2}{z} + \dot{y}z = \dot{x}y + y\dot{x}$, qui étant réduite en proportion donne $y : z - \frac{by}{z} - \frac{yy}{z} - x :: \dot{y} : \dot{x} :: BD : BT$. Mais comme BD est y, BT sera par conséquent $= z - x\ \frac{=by-yy}{z}$. C'est-à-dire, $-BT = AL + \frac{BD \times GM}{BL}$; ou le Signe $-$ devant BT, désigne que le Point T doit être pris du côté opposé au Point A.

XII. Scholie. De là on voit comment on peut trouver le Point de la Conchoïde qui sépare la partie concave de la partie convexe ou le Point d'Inflexion ; car c'est au Point ou AT est un moindre. Faisant donc $AT = u$, puisque $BT = -z + x + \frac{by + yy}{z}$, u sera $= -z + 2x + \frac{by + yy}{z}$; pour abréger mettez $\frac{bz + yz}{y}$ au lieu de x, car cette Valeur se tire de ce qui précéde, & vous aurez

UVA. BHSC. SC 04146

$\frac{2bz}{y} + z + \frac{by+yy}{z} = u$. Cherchez les Fluxions $\dot{u}$, $\dot{y}$ & $\dot{z}$, & supposez $\dot{u} = o$, vous trouverez $\frac{2b\dot{z}}{y} - \frac{2b\dot{y}z}{yy} + \dot{z} + \frac{b\dot{y}+2\dot{y}y}{z} - \frac{bz\dot{y}+z\dot{y}y}{zz} = \dot{u} = o$. Enfin substituant $\frac{-\dot{y}y}{z}$ au lieu de $\dot{z}$, & $cc - yy$ au lieu de zz, vous aurez $y^3 + 3by^2 - 2bc^2 = o$. Et la construction de cette Equation vous donnera y ou AM; le Point M étant donc déterminé, tirez MD parallele à AB, elle tombera sur le Point d'Inflection D.

XIII. Pour tirer les Tangentes des Courbes Mécaniques, il faut trouver les Fluxions comme nous l'avons fait dans l'Exemple V. du Problême 1. & faire le reste à l'ordinaire.

XIV. Exemple 4. Soient AC & AD deux Courbes coupées aux Points C & D par la Ligne droite BCD, appliquée à l'Abscisse AB sous un Angle donné, soit $AB = x$, $BD = y$, & $\frac{\text{l'Aire ACB}}{1} = z$. Par le Prob. 1. Préparat. à l'Exemp. 5. on aura $\dot{z} = \dot{x} \times BC$.

XV. Maintenant soit AC un Cercle ou une autre Courbe connuë, & pour la Courbe AD, soit une Equation quelconque affectée de z, comme $zz + axz = y^4$. Par le Prob. 1. $2z\dot{z} + ax\dot{z} + az\dot{x} = 4y\dot{y}y^3$, substituant $\dot{x} \times BC$ au lieu de $\dot{z}$, on aura $2xz \times BC + axx \times BC + axz = 4y\dot{y}y^3$, ou bien $2z \times BC + ax \times BC + az : 4y^3 :: \dot{y} : \dot{x} :: BD : BT$. Si donc la nature de la Courbe AC est donnée, & aussi l'Ordonnée BC & l'Aire ACB ou z; le Point T qui détermine la Tangente sera aussi donné.



XVI. De même si l'Equation à la Courbe AD est $3z = 2y$; l'on aura $3\dot{z}$ ou $3\dot{x} \times BC = 2\dot{y}$, ou $3BC : 2 :: \dot{y} : \dot{x} :: BD : BT$, & ainsi des autres.

XVII. Exemple 5. Soit $AB = x$, $BD = y$, comme auparavant, & soit la longueur d'une Courbe quelconque $AC = z$; en tirant à cette Courbe une Tangente comme Ct, on aura $Bt : Ct :: \dot{x} : \dot{z}$, ou $\dot{z} = \frac{\dot{x} \times CT}{BT}$.

XVIII. Maintenant soit une Equation quelconque affectée de

UVA. BHSC. SC 04146

$\dot{z}$, comme $z = y$ à la Courbe AD dont on veut tirer la Tangente ; on aura $\dot{z} = \dot{y}$, ainſi $Ct : Bt :: \dot{y} : \dot{x} ::$ BD : BT ; par le Point T on tirera donc la Tangente DT.

XIX. De même ſuppoſant $xz = yy$, on aura $\dot{x}z + \dot{z}x = 2\dot{y}y$, & mettant $\frac{\dot{x} \times Ct}{Bt}$ au lieu de $\dot{z}$, il viendra $\dot{x}z + \frac{\dot{x}x \times Ct}{Bt} = 2\dot{y}y$. D'où $z + \frac{x \times Ct}{Bt} : 2y :: BD : DT$.

XX. Exemple 6. Soit AB un Cercle ou une autre Courbe connue dont la Tangente eſt Ct, & ſoit AD une autre Courbe quelconque dont il faut tirer la Tangente DT, & ſoit la Loi de cette Courbe AB = à l'Arc AC ; enfin CE & BD étant des Ordonnées à AB ſous un Angle donné, ſoit le Raport de BD à CE ou à AE exprimé par une Equation quelconque.



XXI. Nommez AB ou AC = x, BD = y, AE = z, & CE = u ; il eſt évident que $\dot{u}$, $\dot{x}$ & $\dot{z}$, Fluxions de CE, AC & AE, ſont entre-elles comme CE, CT & ET ; ainſi $\dot{x} \times \frac{CE}{Ct} = \dot{u}$ & $\dot{x} \times \frac{Et}{Ct} = \dot{z}$.

XXII. Maintenant ſoit une Equation donnée quelconque à la Courbe AD, comme $y = z$; on aura $\dot{y} = \dot{z}$, & par conſéquent $Et : Ct :: \dot{y} : \dot{x} ::$ BD : BT.

XXIII. Ou ſoit l'Equation $y = z + u - x$, on aura $\dot{y} = \dot{z} + \dot{u} - \dot{x} = \dot{x} \times \frac{CE + Et - Ct}{Ct}$; ainſi $CE + Et - Ct : Ct :: \dot{y} : \dot{x} ::$ BD : BT.

XXIV. Ou enfin ſoit l'Equation $ayy = u^3$, on aura $2a\dot{y}y = 3\dot{u}u^2 = 3\dot{x}u^2 \times \frac{CE}{Ct}$; ainſi $3u^2 \times CE : 2ay \times Ct :: BD : BT$.

UVA. BHSC. SC 04146

XXV. Exemple 7. Soit FC un Cercle touché par CS au Point C ; ſoit FD une Courbe dont la Loi eſt donnée par une Relation quelconque de l'Ordonnée DB à l'Arc FC terminé par la Ligne DA tirée du Centre ; ayant mené l'Ordonnée CE au Cercle, faites AC ou AF $=$ 1, AB $= x$, DB $= y$, AE $= z$, CE $= u$, CF $= t$; vous aurez $\dot{t}z = \dot{t} \times \frac{CE}{CS} = \dot{u}$ & $- \dot{t}u = \dot{t} \times \frac{-ES}{CS}$ $= \dot{z}$; je prends $\dot{z}$ négativement parce que AE diminue tandis que EC augmente ; de plus AE : EC :: AB : BD, ou $z\dot{y} = \dot{u}x$, d'où $\dot{z}y + \dot{y}z = \dot{u}x + x\dot{u}$. Enfin exterminant $\dot{u}$, $\dot{z}$ & u, il vient $\dot{y}x - t\dot{y}^2 - t\dot{x}^2 = x\dot{y}$.



XXVI. Soit maintenant une Equation quelconque à la Courbe DF dont on puiſſe tirer la Valeur de $\dot{t}$ afin de la ſubſtituer ici ; par Exemple, ſoit $\dot{t} = y$, (l'Equation à la premiere Quadratrice,) j'aurai $\dot{t} = \dot{y}$, & $\dot{y}x - \dot{y}\dot{y}^2 - \dot{y}\dot{x}^2 = x\dot{y}$, d'où $\dot{y} : xx + yy - x :: \dot{y} : - x$ :: BD, y : BT. Ainſi BT $= x^2 + y^2 - x$; & AT $= xx + yy = \frac{ADq}{AF}$.

XXVII. De même ſi $t\dot{t} = b\dot{y}$, on aura $2t\dot{t} = b\dot{y}$, & de là AT $= \frac{b}{2t} \times \frac{ADq}{AF}$; & ainſi des autres.

XXVIII. Exemple 8. Maintenant ſi l'on prend AD égal à l'Arc FC, la Courbe ADH ſera la Spirale d'*Archimede*. Laiſſant aux Lignes les mêmes Dénominations, l'Angle Droit ABD donne $xx + yy = tt$, donc $x\dot{x} + y\dot{y} = t\dot{t}$. Et AD : AC :: DB : CE, d'où $t\dot{u} = \dot{y}$, & $t\dot{u} + u\dot{t} = \dot{y}$. Enfin la Fluxion de l'Arc FC eſt à la Fluxion de la Ligne droite CE, comme AC eſt à AE, ou comme AD : AB, c'eſt-à-dire $\dot{t} : \dot{u} :: t : x$, ou $t\dot{u} = x\dot{t}$. Comparant les Equations, on aura $t\dot{u} + \dot{t}x = \dot{y}$, & de là $x\dot{x} + y\dot{y} = t\dot{t} = \frac{y\dot{t}}{u + x}$. Complettant donc le Parallelogramme ABDQ,



UVA. BHSC. SC 04146

si l'on fait QD : QP : : BD : BT : : $\dot{y} : -\dot{x} :: x : y - \frac{t}{u+x}$;

c'est-à-dire, si vous prenez AP $= \frac{t}{u+x}$, PD sera perpendiculaire à la Spirale.

XXIX. Et de là je m'imagine qu'il est aisé de voir comment on peut tirer les Tangentes de toutes sortes de Courbes ; cependant je crois qu'il est à propos de montrer la façon d'opérer lorsque les Courbes sont rapportées aux Lignes droites de toute autre maniere. Il sera toujours bon d'avoir à choisir dans ces différentes Méthodes la plus simple & la plus commode.

Seconde maniere.

XXX. Soit un Point donné G, duquel on tire la Soutendente DG à un Point D de la Courbe, soit DB l'Ordonnée sous un Angle quelconque à l'Abciſſe AB ; faites parcourir au Point un Espace infiniment petit *d*D sur la Courbe, sur GD prenez G*k* = G*d*, achevez le Parallelogramme *dc*B*b*, D*k* & D*c* seront les Moments contemporains de GD & de BD, dont ils diminuent tandis que D est porté en *d*. Prolongez la Ligne droite D*d* jusqu'à ce qu'elle rencontre AB en T ; & de ce Point T abaissez sur la Soutendente GD la perpendiculaire TF, les Trapezes D*cdk* & DBTF seront semblables ; ainsi DB : DF : : D*c* : D*k*.



XXXI. Comme la Relation de BD à GD est donnée par l'Equation à la Courbe, cherchez la Relation des Fluxions, & faites FD à DB comme la Fluxion de GD à la Fluxion de BD ; du Point F élevez la perpendiculaire FT qui rencontre AB en T, tirez DT elle touchera la Courbe en D ; si DT est positive il faut la prendre du côté de G, & si elle est négative du côté opposé.

XXXII. Exemple 1. Prenez GD $= x$, BD $= y$, & soit leur Raport exprimé par $x^3 - ax^2 + axy - y^3 = 0$. Le Raport des Fluxions sera $3\dot{x}x^2 - 2a\dot{x}x + a\dot{x}y + ay\dot{x} - 3y\dot{y}^2 = 0$, d'où $3xx - 2ax + ay : 3yy - ax :: \dot{y} : \dot{x} ::$ DB, y : DF ; ainsi $DF = \frac{3y^3 - axy}{3x^2 - 2ax + ay}$; un Point quelconque D dans la Courbe étant

UVA. BHSC. SC 04146

donné & par conſéquent les Lignes BD & GD ou x & y, le Point F ſera auſſi donné ; ainſi il n'y aura plus qu'à élever la Perpendiculaire FT, & du Point T de concours avec l'Abciſſe AB, tirer la Tangeute DT.

XXXIII. D'où il eſt clair qu'on peut comme dans le premier Cas tirer de ceci une Régle. Car ayant mis du même côté tous les Termes de l'Equation donnée, multipliez-les par les Dimenſions de l'Ordonnée y, & mettez le réſultat au Numerateur, enſuite multipliez les Termes par les Dimenſions de la Soutendente x, diviſez le produit par cette Soutendente x, & placez le Quotient au Dénominateur de la Valeur de DF ; prenez cette même Ligne DF du côté de G ſi elle eſt poſitive, & du côté oppoſé ſi elle eſt négative. Vous pouvez obſerver qu'il n'importe à quelle diſtance ſoit le Point G de l'Abciſſe AB, pas même qu'il en ſoit diſtant du tout ; & que l'Angle d'Ordination ABD peut auſſi être tel qu'on voudra.

XXXIV. Soit comme ci-devant l'Equation $x^3 - ax^2 + axy - y^3 = 0$; elle donne tout de ſuite $axy - 3y^3$ pour le Numerateur, & $3x^2 - 2ax + ay$ pour le Dénominateur de la Valeur de DF.

XXXV. Soit auſſi $a + \frac{b}{a}x - y = 0$, (Equation à une Section Conique,) elle donne $-y$ pour le Numerateur, & $\frac{b}{a}$ pour le Dénominateur de la Valeur de DF, qui par conſéquent eſt $-\frac{ay}{b}$

XXXVI. Ainſi dans la Conchoïde, ou tout ceci ſe fera plus



promptement que ci-deſſus, faiſant GA = b, LD = c, GD = x, &

UVA. BHSC. SC 04146

& BD $= y$, on aura BD, y : DL, c :: GA, b : GL, $x - c$. Ainſi $xy - cy = cb$, ou $xy - cy - cb = 0$. Cette Equation ſuivant la Régle donne $\frac{xy - cy}{y}$, ou $x - c =$ DF, prolongez donc GD vers F, de ſorte que DF $=$ LG, & au Point F élevez la perpendiculaire FT qui rencontre l'Aſymptote AB en T, tirez DT, elle touchera la Conchoïde.

XXXVII. Mais lorſque l'Equation renferme des Quantités compoſées ou radicales, il faut avoir recours à la Méthode générale, à moins qu'on ne préfére de réduire l'Equation.

XXXVIII. Exemple 2. Soit la Relation de GD à BD exprimée par l'Equation $\overline{b + y} \times \sqrt{cc - yy} = yx$, voyez la Fig. précédente, trouvez la Relation des Fluxions, en ſuppoſant $\sqrt{cc - yy} = z$, vous aurez les Equations $bz + yz = yx$, & $cc - yy = zz$, d'où la Relation des Fluxions $\dot{b}z + \dot{y}z + y\dot{z} = \dot{y}x + y\dot{x}$, & $-2\dot{y}y = 2\dot{z}z$. Exterminant $\dot{z}$ & z il viendra $\dot{y}\sqrt{cc - yy} - \frac{\dot{b}yy - \dot{y}y^2}{\sqrt{cc - yy}} - y\dot{x} = x\dot{y}$. Donc $y : \sqrt{cc - yy} - \frac{by + yy}{\sqrt{cc - yy}} = x :: \dot{y} : \dot{x} ::$ BD, y : DF.

Troiſiéme Maniere.

XXXIX. Si l'on rapporte la Courbe à deux Soutendentes AD & BD, qui tirées de deux Points donnés A & B ſe rencontrent ſur la Courbe; imaginez que le Point D parcourt l'Eſpace infiniment petit Dd, & ſur AD & BD prenez Ak $=$ Ad, & Bc $=$ Bd; kD & cD ſeront les Moments contemporains des Lignes AD & BD, prenez donc DF à BD comme le Moment Dk au Moment Dc, (c'eſt-à-dire, dans le Raport de la Fluxion de la Ligne AD à la Fluxion de la Ligne BD) élevez ſur BD & AD les perpendiculaires BT & FT qui ſe rencontreront au Point T; les Trapezes DFTB & Dkdc ſeront ſemblables, & par conſéquent la Diagonale DT touchera la Courbe.



XL. Au moyen donc de l'Equation qui exprime la Relation de

UVA. BHSC. SC 04146

AD à BD ; trouvez la Relation des Fluxions & prenez FD à BD dans le même Raport.

XLI. Exemple Suppoſons AD $= x$, & BD $= y$, & leur Relation $a + \frac{ex}{d} - y = 0$. Cette Equation eſt aux Ellipſes du ſecond Ordre, dont *Deſcartes* dans le ſecond Livre de ſa Géometrie a démontré les propriétés pour rompre la Lumiere ; la Relation des Fluxions ſera $\frac{e\dot{x}}{d} - \dot{y} = 0$. D'où $e : d :: \dot{y} : \dot{x} :: BD :$ DF.

XLII. Et par la même raiſon ſi $a - \frac{ex}{d} - y = 0$, on aura $e : -d :: BD : DF$. Dans le premier Cas prenez DF du côté de A, & dans l'autre Cas du côté oppoſé.

XLIII. Coroll. 1. Si $d = e$, la Courbe devient une Section Conique, & l'on aura DF = DB ; ainſi les Triangles DFT & DBT étant égaux, l'Angle FDB ſera partagé en deux par la Tangente.



XLIV. Coroll. 2. Et de là on voit évidemment toutes les choſes que *Deſcartes* a démontré d'une maniere très-prolixe au ſujet de la Refraction de ces Courbes ; car DF & DB qui ſont en Raiſon donnée de d à e, ſont à l'égard du Raïon DT les Sinus des Angles DTF & DTB, c'eſt-à-dire du Raïon d'Incidence AD ſur la Surface de la Courbe & du Raïon de Reflection ou de Refraction DB. Le même raiſonnement s'applique aux Refractions des Sections Coniques, en ſuppoſant que l'un des Points A ou B eſt à une diſtance infinie.

XLV. Il ſeroit aiſé de modifier cette Régle comme nous avons fait la précédente, & de donner d'autres Exemples, & lorſque les Courbes ſont rapportées à des Lignes droites de toute autre façon, & qu'on ne peut pas commodément les réduire aux Méthodes précédentes, il ſera aiſé de s'en faire à l'imitation de celles-ci.

UVA. BHSC. SC 04146

Quatriéme Maniere.

XLVI. Comme ſi la Ligne droite BCD tournoit autour du Point donné B, & que l'un de ſes Points D décrivît une Courbe, & qu'un autre de ſes Points C coupât la Ligne droite AC donnée de poſition. La Relation de BD & BC étant exprimée par une Equation quelconque ; tirez BF parallele à AC, de ſorte qu'elle rencontre en F la Ligne DF perpendiculaire à BD ; élevez FT perpendiculaire à DF, & prenez FT à BC comme la Fluxion de BD à la Fluxion de BC ; tirez la Ligne DT elle ſera Tangente à la Courbe.



Cinquiéme Maniere.

XLVII. Mais ſi le Point A étant donné, l'Equation exprimoit la Relation de AC à BD ; tirez CG parallele à DF, & prenez FT à BG comme la Fluxion de BD à la Fluxion de AC.

Sixiéme Maniere.

XLVIII. Ou ſi l'Equation exprime la Relation entre AC & CD ; faites rencontrer AC & FT au Point H, & prenez HT à BG, comme la Fluxion de CD à la Fluxion de AC. Et ainſi des autres.

UVA. BHSC. SC 04146

Septiéme maniere.

POUR LES SPIRALES.

XLIX. Le Problême eſt le même lorſqu'on ne rapporte pas les Courbes à des Lignes droites, mais à d'autres Courbes, comme cela arrive dans les Courbes Mécaniques. Soit BG la Circonférence d'un Cercle dont le demi Diametre eſt AG; tandis qu'il tourne autour du Centre A, faites mouvoir le Point D d'une façon quelconque, de ſorte qu'il décrive la Spirale ADE; faites parcourir au Point D l'Eſpace infiniment petit D*d*, & ſur AD prenez A*c* = A*d*; C*d* & G*g* ſeront les Moments contemporains de la Ligne droite AD & de la Circonférence BG. Tirez A*t* parallele à *cd*, c'eſt-à-dire perpendiculaire à AD, & qui rencontre la Tangente DT au Point T. Vous aurez *c*D : *cd* :: AD : AT; ſoit auſſi G*t* parallele à la Tangente DT, & vous aurez *cd* : G*g* :: A*d* ou AD : AG :: AT : A*t*.



L. Ainſi l'Equation qui exprime la Relation de BG à AD étant donnée; cherchez la Relation de leur Fluxions, & prenez A*t* à AD dans le même Raport, G*t* ſera parallele à la Tangente.

LI. EXEMPLE 1. Nommant BG, x & AD, y; ſoit leur Relation $x^3 - ax^2 + axy - y^3 = 0$, on aura $3x^2 - 2ax + ay : 3y^2 - ax :: \dot{y} : \dot{x} :: AD : At$; le Point *t* étant donc trouvé, tirez G*t* & ſa parallele DT qui touchera la Courbe.

LII. EXEMPLE 2. Si l'on a $\frac{ax}{b} = y$, ce qui eſt l'Equation à la Spirale d'*Archimedes*, on aura $\frac{a\dot{x}}{b} = \dot{y}$, & par conſéquent $a : b :: \dot{y} : \dot{x} :: AD : At$; c'eſt pourquoi ſi l'on prolonge TA en P, de ſorte que AP : AB : : *a* : *b*, PD ſera perpendiculaire â la Courbe.

LIII. EXEMPLE 3. Si $xx = by$, $2xx$ ſera $= by$, & $2x : b :: AD : At$. Et de la même façon on pourra toujours aiſément tirer des Tangentes à toutes les Spirales.

UVA. BHSC. SC 04146

Huitiéme Maniere.

POUR LES QUADRATRICES.

LIV. Si la Courbe eſt telle qu'une Ligne quelconque AGD, tirée du Centre A, rencontre l'Arc de Cercle en G, & la Courbe en D ; & ſi la Relation de l'Arc BG & de la Ligne droite DH, qui eſt une Ordonnée à la Baſe ou Abciſſe AH ſous un Angle donné, eſt déterminée par une Equation quelconque ; concevez que le Point D parcourt ſur la Courbe un Eſpace infiniment petit D*d* ; achevez le Parallelogramme *dh*H*k* & prolongez A*d* en *c*, de ſorte que A*c* = AD, G*g* & D*k* ſeront les Moments contemporains de l'Arc BG & de l'Ordonnée DH ; prolongez D*d* directement en T, ou elle rencontre AB, & de ce Point abaiſſez la perpendiculaire TF ſur D*c*F ; les Trapezes D*kdc* & DHTF ſeront ſemblables ; ainſi D*k* : D*c* :: DH : DF ; de plus ſi vous élevez G*f* perpendiculaire à AG, & qui rencontre AF en *f*, les paralleles DF & G*f* donneront D*c* : G*g* :: DF : G*f*, & de même D*k* : G*g* :: DH : G*f*, c'eſt-à-dire, comme les Moments ou les Fluxions des Lignes DH & BG.



LV. Ainſi par l'Equation qui exprime la Relation de BG & de DH, trouvez la Relation des Fluxions, & dans ce même Raport prenez la Tangente G*f* du Cercle BG, & la Ligne DH ; tirez DF parallele à G*f*, qui rencontre A*f* prolongée en F ; à ce Point F élevez la perpendiculaire FT, qui rencontre AB en T ; & enfin tirez la Ligne droite DT elle ſera Tangente à la Quadratrice.

LVI. EXEMPLE 1. Nommant BG, x & DH, y ſoit $xx = yy$, on aura $2xx = by$; d'où $2x : b :: \dot{y} : \dot{x} ::$ DH : G*f*, le Point *f* étant trouvé on déterminera le reſte comme ci-deſſus.

Mais on pourroit peut-être préſenter cette Régle un peu plus clairement ; faites $\dot{x} : \dot{y} ::$ AB : AL ; AL ſera à AD :: AD : AT, & DT touchera la Courbe, car les Triangles ſemblables AFD &

UVA. BHSC. SC 04146

ATD, donneront AD × DF = AT × DH, & par conſéquent AT : AD : : DF ou $\frac{AD}{AG}$ × Gf : DH ou $\frac{\dot{y}}{\dot{x}}$ Gf : : AD : $\frac{\dot{y}}{\dot{x}}$ AG ou AL.

LVII. EXEMPLE 2. Soit $x = y$, Equation à la Quadratrice des Anciens ; $\dot{x}$ ſera $= \dot{y}$; ainſi AB : AD : : AD : AT.

LVIII. EXEMPLE 3. Soit $axx = y^3$; $2axx$ ſera $= 3yy^2\dot{y}$. Faites donc $3y^2 : 2ax : : \dot{x} : \dot{y}$: : AB : AL & AL : AD : : AD : AT. Par ce moyen vous pourrez toujours déterminer les Tangentes de toutes ſortes de Quadratrices quelque compliquées quelles ſoient.

Neuviéme Maniere.

LIX. Enfin ſi ABF eſt une Courbe quelconque touchée par la droite BT ; & ſi une partie BD (de la Ligne droite BC, Ordonnée ſous un Angle quelconque à l'Abciſſe AC,) interceptée entre cette Courbe & une autre Courbe DE a une Relation à une partie de la Courbe AB exprimée par une Equation, vous pourrez tirer la Tangente DT à l'autre Courbe, en prenant ſur la Tangente de la premiere, BT en même raiſon avec AD, comme la Fluxion de la Courbe AB avec la Fluxion de la Ligne droite BD.



LX. EXEMPLE 1. Nommant AB, x ; BD, y ; ſoit $ax = yy$, donc $a\dot{x} = 2y\dot{y}$; ainſi $a : 2y : : \dot{y} : \dot{x}$: : BD : BT.

LXI. EXEMPLE 2. Soit $\frac{a}{b}x = y$, Equation à la Trocoïde ſi ABF eſt un Cercle ; on aura $\frac{a}{b}\dot{x} = \dot{y}$, & $a : b$: : BD : BT.

LXII. On peut avec la même facilité tirer les Tangentes lorſque la Relation de BD à AC, ou à BC, eſt donnée par une Equation quelconque, ou lorſque les Courbes ſont rapportées à des Lignes droites ou à d'autres Courbes d'une façon quelconque.

LXIII. On peut tirer des mêmes Principes la Solution de pluſieurs autres Problêmes, comme de ceux qui ſuivent.

UVA. BHSC. SC 04146

1. *Trouver le Point d'une Courbe, où la Tangente eſt parallele à l'Abciſſe, ou à une autre Ligne droite donnée de poſition; ou le Point où elle eſt perpendiculaire ou inclinée ſous un Angle donné.*

2. *Trouver le Point ou la Tangente eſt le plus ou le moins inclinée à l'Abciſſe, ou à une autre Ligne droite donnée de poſition, c'eſt-à-dire, trouver le Point d'Inflexion.* J'en ai déja donné un Eſſai ſur la Conchoïde.

3. *D'un Point donné hors du Perimetre d'une Courbe, tirer une Ligne droite, qui avec le Perimetre de la Courbe faſſe ou un Angle de Contact, ou un Angle droit, ou un autre Angle donné. C'eſt-à-dire, d'un Point donné tirer des Tangentes ou des Perpendiculaires, ou des Lignées inclinées à une Ligne Courbe.*

4. *D'un Point donné au-dedans d'une Parabole, tirer une Ligne droite qui faſſe avec le Perimetre le plus grand ou le moindre Angle poſſible. Faire le même dans toutes les autres Courbes.*

5. *Tirer une Ligne droite qui touche deux Courbes données de poſition, ou la même Courbe en deux Points lorſque cela ſe peut faire.*

6. *Décrire une Courbe quelconque ſous des Conditions données, qui touche un autre Courbe donnée de poſition en un Point donné.*

7. *Déterminer la Refraction d'un Raïon de Lumiere, qui tombe ſur une Surface Courbe quelconque.*

La Réſolution de ces Problêmes & de tous les autres de même nature ne ſera pas fort difficile, il n'y aura guéres que l'ennui du Calcul; je n'ai donc pas crû qu'il fût néceſſaire d'en donner ici les Solutions, & je m'imagine que les Géometres me ſçauront gré de ne les avoir qu'énoncés.

PROBLEME V.

Trouver la Quantité de Courbure d'une Courbe donnée à un Point donné quelconque.

I. IL y a peu de Problêmes ſur les Courbes qui ſoient plus élégants que celui-ci, & qui nous donne plus de lumiere ſur leur nature. Je vais avant que de le réſoudre mettre ici quelques Conſidérations générales.

II. 1. Le même Cercle a partout le même degré de Courbure, & dans différens Cercles ce degré de Courbure eſt réciproquement

UVA. BHSC. SC 04146

proportionel à leurs Diametres ; de ſorte que ſi le Diametre d'un Cercle eſt une fois plus petit que le Diametre d'un autre, la Courbure de ſa Circonférence ſera une fois plus grande ; ſi le Diametre n'eſt qu'un tiers de l'autre la Courbure ſera trois fois plus grande, &c.

III. 2. Si un Cercle touche une Courbe dans ſa concavité à un Point donné quelconque, & que ce Cercle ſoit d'une grandeur telle qu'on ne puiſſe en faire paſſer un autre dans les Angles du Cercle avec la Courbe au Point de Contact ; ce premier Cercle aura la même Courbure que la Courbe a dans ce Point de Contact. Car un Cercle qui paſſeroit dans les Angles de la Courbe & du premier Cercle approcheroit davantage de la Courbe, & par conſéquent de ſa Courbure plus que n'en approche le premier Cercle ; donc le Cercle qui eſt tel qu'on ne peut en faire paſſer un autre entre ſa Circonférence & la Courbe au Point de Contact eſt celui qui approche le plus de la Courbure de la Courbe.

IV. 3. Ainſi le Centre de Courbure d'un Point d'une Courbe eſt le Centre d'un Cercle qui a la même Courbure que ce Point de la Courbe ; ainſi le demi Diametre ou le Raïon de Courbure eſt une partie de la Perpendiculaire à la Courbe terminée à ce Centre.

V. 4. Et la proportion de Courbure de différents Points ſe trouvera par la proportion de Courbure de différents Cercles qui auront la même Courbure que ces Points, ou ſimplement par la proportion réciproque des Raïons de Courbure.

VI. Ainſi le Problême ſe réduit à trouver le Raïon ou le Centre de Courbure.

VII. Imaginez donc qu'à trois Points ſ, D, *d*, d'une Courbe on tire des Perpendiculaires, dont celles en ſ & D ſe rencontrent en H, & celles en D & *d* ſe rencontrent en *h*. Le Point D étant au milieu, s'il y a une plus grande Courbure à la partie Dſ qu'à la partie D*d*, DH ſera moindre que D*h* ; mais plus les Perpendiculaires ſH & *dh* ſeront près de la Perpendiculaire intermédiaire, plus petite ſera la diſtance des Points H & *h* ; de ſorte qu'à la fin lorſque les Perpendiculaires ſe réuniront, ces Points coincideront ; imaginons donc qu'ils coincident au Point C, il ſera le Centre de Courbure du Point C de la Courbe. Cela eſt évident de ſoi-même.



VIII.

UVA. BHSC. SC 04146

VIII. Le Point C a plusieurs Symptomes ou Propriétés qui nous serviront pour le déterminer.

IX. 1. Il est le concours de deux Perpendiculaires qui chacune sont infiniment près de DC.

X. 2. Il sépare & divise les Intersections des Perpendiculaires qui sont à une distance finie de chaque côté quelque petite qu'elle soit ; de sorte que celles qui sont sur le côté plus Courbe Dδ se rencontrent plus loin en *h*.

XI. 3. Si on conçoit que la Ligne DC se meuve tandis qu'elle insiste perpendiculairement sur la Courbe, ce Point C sera comme le Centre du Mouvement, & se mouvera moins qu'aucun autre Point de DC.

XII. 4. Si on décrit un Cercle du Centre C & du Raïon DC; on ne pourra en décrire aucun autre qui puisse passer entre les Angles du Contact.

XIII. V. Enfin si le Centre H ou *h* d'un autre Cercle touchant quelconque, approche par degrés du Centre C de celui-ci, jusqu'à ce qu'enfin ils viennent à coincider ensemble ; aucun des Points dans lesquels ce premier Cercle aura coupé la Courbe ne coincidera avec le Point D de Contact.

XIV. Chacune de ces Propriétés donneroit un moyen de résoudre le Problême d'une différente façon ; mais nous choisirons la premiere comme étant la plus simple.

XV. Soit DT une Tangente à un Point quelconque D d'une Courbe ; soit DC la Perpendiculaire à ce Point, & C le Centre de Courbure comme ci-devant ; soit AB l'Abciſſe sur laquelle DB est Ordonnée à Angles droits, & soit P le Point ou la Perpendiculaire rencontre cette Abciſſe ; tirez DG parallele à AB, & CG Perpendiculaire à la même AB, sur laquelle CG prenez C*g* d'une longueur donnée quelconque ; à ce Point *g* tirez la Perpendiculaire *g*δ qui rencontre DC en δ. On aura C*g* : *g*δ :: TB : BD, comme la Fluxion de l'Abciſſe est à la Fluxion de l'Ordonnée. Imaginant donc que le Point D parcourt sur la Courbe un Espace infiniment petit D*d*, tirez *de* perpendiculaire



UVA. BHSC. SC 04146

à DG, & C*d* perpendiculaire à la Courbe, C*d* rencontra DG en F, & ∫*g* en *f*; & D*e* ſera le Moment de l'Abciſſe, *de* le Moment de l'Ordonnée, & ∫*f* le Moment contemporain de la Ligne droite *g*∫; ainſi $DF = De + \frac{de \times de}{De}$, ayant donc trouvé le Raport de ces Moments, ou ce qui eſt la même choſe, de leurs Fluxions, vous aurez le Raport de CG à la Ligne donnée C*g*, qui eſt le même que celui de DF à ∫*f*, & par là vous déterminerez le point C.

XVI. Ainſi ſoit $AB = x$, $BD = y$, $Cg = 1$, & $g\int = z$; vous aurez $1 : z :: \dot{x} : \dot{y}$, ou $z = \frac{\dot{y}}{\dot{x}}$; Maintenant ſoit le Moment ∫*f* de *z* égal à $z \times o$, c'eſt-à-dire, égal au produit de la Viteſſe & d'une Quantité infiniment petite *o*, vous aurez les Moments $De = \dot{x} \times o$, $de = \dot{y} \times o$, d'où $DF = \dot{x}o + \frac{\ddot{y}\dot{y}o}{\dot{x}}$; Donc C*g*, 1, : CG :: ∫*f* : DF :: $\dot{z}o : \dot{x}o + \frac{\ddot{y}\dot{y}o}{\dot{x}}$, c'eſt-à-dire, $CG = \frac{\ddot{x}\dot{x} + \ddot{y}\dot{y}}{\dot{x}z}$.

XVII. Et comme il nous eſt libre de donner à la Fluxion $\dot{x}$ de l'Abciſſe telle Viteſſe que nous voudrons, parce que nous pouvons lui rapporter tout le reſte; faiſons $\dot{x} = 1$, nous aurons $\dot{y} = z$, & $CG = \frac{1 + zz}{\dot{z}}$, d'où $DG = \frac{z + z^3}{\dot{z}}$, & $DC = \frac{\overline{1 + zz}\sqrt{1 + zz}}{\dot{z}}$.

XVIII. Etant donc donnée entre BD & AB une Equation qui exprime la nature de la Courbe, cherchez le Raport de $\dot{x}$ à $\dot{y}$, & ſubſtituez 1 pour $\dot{x}$ & *z* pour $\dot{y}$, enſuite en prenant les Fluxions de l'Equation qui en réſultera, trouvez la Relation entre $\dot{x}$, $\dot{y}$ & $\dot{z}$, & ſubſtituez encore 1 pour $\dot{x}$ & *z* pour $\dot{y}$ comme auparavant, par la premiere Opération vous aurez la Valeur de *z*, & par la ſeconde vous aurez celle de $\dot{z}$; cela étant fait prolongez DB en H vers la partie concave de la Courbe, de ſorte que $DH = \frac{1 + zz}{\dot{z}}$; tirez HC parallele à AB, & qui rencontre la perpendiculaire DC en C, ce Point C ſera le Centre de Courbure du Point D de la Courbe; Mais $1 + zz = \frac{PT}{BT}$, ainſi faites $DH = \frac{PT}{\dot{z} \times BT}$, ou $DC = \frac{\overline{DP}\,|^3}{\dot{z} \times \overline{DB}\,|^3}$.

XIX. Exemple 1. Si l'on a $ax + bx^2 - y^2 = o$ Equation

UVA. BHSC. SC 04146

à l'Hyperbole dont le Parametre eſt a, & le *Latus Tranſverſum* $\frac{a}{b}$, on aura $a\dot{x} + 2b\dot{x}x - 2\dot{y}y = 0$; & ſubſtituant 1 pour $\dot{x}$ & z pour $\dot{y}$, on aura $a + 2bx - 2zy = 0$, en prenant encore les Fluxions on a $2b\dot{x} - 2z\dot{y} - 2\dot{z}y = 0$, ou $2b - 2zz - 2\dot{z}y = 0$, après avoir ſubſtitué 1 pour x & z pour y; par la premiere Equation nous avons $z = \frac{a + 2bx}{2y}$, & par la ſeconde $z = \frac{b - zz}{y}$. Ainſi un Point quelconque D de la Courbe étant donné, & par conſéquent les Lignes x & y, les Valeurs de z & $\dot{z}$ ſeront auſſi données; faites donc $\frac{1 + zz}{\dot{z}} =$ CG ou DH, & tirez la Ligne HC.

XX. Comme ſi pour un Cas particulier vous faites $a = 3$, $b = 1$, $3x + xx = yy$ ſera l'Equation à l'Hyperbole; ſi vous prenez donc $x = 1$, y ſera $= 2$, $z = \frac{1}{4}$, $\dot{z} = -\frac{9}{32}$, & DH $= -9\frac{1}{9}$. H étant donc trouvé, élevez la perpendiculaire HC qui rencontre la perpendiculaire DC qu'on aura tirée auparavant, ou bien ce qui eſt la même choſe faites HD : HC :: 1 : z :: 1 : $\frac{1}{4}$; tirez DC, elle ſera le Raïon de la Courbure.

XXI. Quand le Calcul ne vous paroîtra pas trop compliqué vous pourrez ſubſtituer dans la Valeur $\frac{1 + zz}{\dot{z}}$ de CG, les Valeurs indéfinies de z & de $\dot{z}$; ainſi dans cette Exemple vous aurez après la Réduction néceſſaire, DH $= y + \frac{4y^3 + 4by^3}{aa}$; cependant la Valeur de DH devient négative dans l'Exemple Numérique, mais cela marque ſeulement que DH doit être priſe du côté de B, car ſi elle étoit devenuë affirmative il auroit fallu la tirer du côté oppoſé.

XXII. Coroll. En changeant donc le Signe du Symbole $+b$, vous aurez $a\dot{x} - bx\dot{x} - \dot{y}y = 0$ Equation à l'Ellipſe, & DH $= y + \frac{4y^3 - 4by^3}{aa}$.

XXIII. Mais ſuppoſant $b = 0$, l'Equation deviendra $a\dot{x} - \dot{y}y = 0$, ce qui appartient à la Parabole; vous aurez DH $= y + \frac{4y^3}{aa}$, & de la DG $= \frac{1}{2}a + 2x$.

XXIV. De ces différentes Expreſſions on peut aiſément con-

UVA. BHSC. SC 04146

clure que le Raïon de Courbure d'une Section Conique quelconque eſt $\frac{\overline{4DP}\,|^3}{aa}$.

XXV. EXEMPLE 2. Soit $x^3 = ay^2 - x^2$ Equation à la Ciſſoïde de *Diocles*, vous aurez d'abord $3x^2 = 2azy - 2xzy - y^2$, & enſuite $6x = 2azy + 2azz - 2zy - 2xzy - 2xzz - 2zy$; ainſi $z = \frac{3xx + yy}{2ay - 2xy}$, & $\dot{z} = \frac{3x - azz + 2zy + xzz}{ay - xy}$. Ainſi un Point quelconque de la Ciſſoïde étant donné & par conſéquent x & y, z & $\dot{z}$ ſeront auſſi données, il ne reſte donc plus qu'à faire CG $= \frac{1 + zz}{\dot{z}}$

XXVI. EXEMPLE 3. Soit $\overline{b + y}\sqrt{\overline{cc - yy}} = xy$ Equation à la Conchoïde; faites $\sqrt{\overline{cc - yy}} = u$, & vous aurez $bu + yu = xy$. Mais $cc - yy = uu$ donnera $-2yz = 2uu$, & $bu + yu = xy$ donnera $bu + \dot{y}u + z\dot{u} = y + xz$; ces Equations bien diſpoſées détermineront $\dot{u}$ & z, mais pour trouver $\dot{z}$, il faudra exterminer dans la derniere Equation la Fluxion $\dot{u}$ en ſubſtituant $= \frac{yz}{u}$, car alors vous aurez $-\frac{byz}{u} - \frac{yyz}{u} + z\dot{u} = y + xz$, Equation délivrée de Fluxions comme la Réſolution du premier Problême le demande; vous aurez donc en prenant les Fluxions $-\frac{bz^2}{u} - \frac{by\dot{z}}{u} + \frac{byz\dot{u}}{u^2} - \frac{2yz\dot{z}}{u} - \frac{yy\dot{z}}{u} + \frac{yyz\dot{u}}{u^2} + \dot{z}u + z\dot{u} = 2\dot{z} + x\dot{z}$. Et de cette Equation réduite & bien diſpoſée vous tirerez la Valeur de $\dot{z}$, qui étant connue auſſi bien que celle de z vous donnera celle de $\frac{1 + zz}{\dot{z}}$ c'eſt-à-dire, celle de CG.

XXVII. Si vous aviez diviſé l'Equation $-\frac{byz}{u} - \frac{yyz}{u} + z\dot{u} = y + xz$ par z, vous auriez eu $-\frac{bz}{u} + \frac{by\dot{u}}{uu} - \frac{2yz}{u} + \frac{yy\dot{u}}{uu} + \dot{u} = 2 - \frac{yz}{zz}$ Equation, pour déterminer $\dot{z}$, qui eſt plus ſimple que l'autre.

UVA. BHSC. SC 04146

XXVIII. J'ai donné cet Exemple pour faire voir comment cette Opération doit se faire dans les Equations qui contiennent des Radicaux ; mais on peut trouver la Courbure de la Conchoïde d'une maniere bien plus courte, pour cela quarrez les Membres de l'Equation $\overline{b+y}\sqrt{\overline{cc-yy}} = xy$, divisés par yy & vous aurez $\frac{b^2c^2}{y^2} + \frac{2bc^2}{y} + c^2 - b^2 - 2by - y^2 = x^2$; d'où $-\frac{2b^2cz}{y^3} - \frac{2bc^2z}{y^2} - 2bz - 2yz = 2x$, ou $-\frac{b^2c^2}{y^3} - \frac{bc^2}{y^2} - b - y = \frac{\dot{x}}{\dot{z}}$; d'où encore $\frac{3b^2c^2z}{y^4} + \frac{2bc^2z}{y^3} - z = \frac{\dot{1}}{\dot{z}} - \frac{\dot{x}\dot{z}}{z\dot{z}}$; le premier Résultat donne z & le second donne $\dot{z}$.

XXIX. Exemple 4. Soit ADF une Trochoïde ou Cycloïde dont le Cercle générateur soit ALE, soit BD une Ordonnée à cette Courbe qui coupe le Cercle en L ; faites $AE = a$, $AB = x$, $BD = y$ $BL = u$, l'Arc $AL = t$, & la Fluxion de cet Arc $= \dot{t}$; tirez le demi Diametre PL ;



d'abord la Fluxion de la Base ou Abciſſe AB est à la Fluxion de l'Arc AL, comme BL est à PL ; c'est-à-dire, $\dot{x}$ ou 1 : $\dot{t} :: u : \frac{1}{2}a$. Ainsi $\frac{a}{2u} = \dot{t}$, & par la nature du Cercle $ax - xx = uu$, d'où $a - 2x = 2\dot{u}u$, ou $\frac{a-2x}{2u} = \dot{u}$.

XXX. De plus par la nature de la Trochoide ; LD = l'Arc AL, ainsi $u + t = y$, d'où $\dot{u} + \dot{t} = \dot{z}$; au lieu des Fluxions $\dot{u}$ & $\dot{t}$ substituez leurs Valeurs & vous aurez $\frac{a-x}{u} = \dot{z}$; d'où vous

UVA. BHSC. SC 04146

tirerez $-\frac{\ddot{x}u}{uu}+\frac{\dot{x}u}{uu}-\frac{1}{u}=\dot{z}$; faites donc $\frac{1+zz}{\dot{z}}=-$DH & élevez la perpendiculaire HC.

XXXI. Corol. 1. Il ſuit de là que DH = 2BL, & CH = 2BE, c'eſt-à-dire que EF coupe par la moitié le Raïon de Courbure CD au Point N ; cela ſe voit en ſubſtituant les Valeurs de z & $\dot{z}$ dans l'Equation $\frac{1+zz}{\dot{z}}=$ DH, & en réduiſant le réſultat.

XXXII. Corol. 2. De là on voit que la Courbe FCK, décrite par le Centre de Courbure de ADF, eſt une autre Trochoïde égale à la premiere ; mais dont les Sommets I & F ſe joignent aux pointes de cette même premiere Trochoïde ; car imaginons un Cercle Fλ de même grandeur & poſition que ALE, & Cβ parallele à EF, rencontrant le Cercle en λ ; l'Arc Fλ ſera = l'Arc EL = NF = Cλ.

XXXIII. Corol. 3. La Ligne droite CD perpendiculaire à la Trochoide IAF, ſera Tangente de la Trochoïde IKF au Point C.

XXXIV. Corol. 4. De là on voit encore que ſi à la pointe K de la Trochoïde ſupérieure, on ſuſpend au bout d'un fil un poids à la hauteur KA ou 2EA, & que tandis que le poids fait ſes Vibrations le fil s'applique ſur la Trochoïde KF & KI, qui lui réſiſte de chaque côté & l'empêche de ſe tendre en Ligne droite, & au contraire en repouſſe & Courbe en Trochoïde la partie ſupérieure, tandis que l'inférieure demeure une Ligne droite ; on voit, dis-je, que le poids ſe mouvra dans le Perimetre de la Trochoïde inférieure, parce que le fil CD lui ſera toujours perpendiculaire.

XXXV. Corol. 5. Ainſi la longueur entiere du fil KA eſt égale au Perimetre KCF de la Trochoïde, & la partie CD du fil eſt égale à la partie CF du Perimetre.

XXXVI. Corol. 6. Puiſque le fil par ſon Mouvement d'Oſcillation tourne autour du Point mobile C, comme autour d'un Centre, la Surface que la Ligne entiere CD décrit continuellement ſera à la Surface que la partie CN au-deſſus de la droite IF décrit dans le même temps comme $\overline{CD}^2 : \overline{CN}^2$, c'eſt-à-dire, comme 4 : 1, ainſi l'Aire CFN eſt le quart de l'Aire CFD, & l'Aire KCNE eſt le quart de l'Aire AKCD.

XXXVII. Corol. 7. Puiſque la Soutendente EL eſt égale & parallele à CN, & qu'elle tourne autour du Centre immobile

UVA. BHSC. SC 04146

E, préciſément dans le même temps que CN tourne autour du Centre mobile C, les Surfaces qu'elles décriront dans le même temps ſeront égales, c'eſt-à-dire, l'Aire CFN ſera égale au Segment de Cercle EL, & par conſéquent l'Aire NFD ſera triple de ce Segment, & l'Aire totale EADF triple de celle du demi Cercle.

XXXVIII. Corol. 8. Lorſque le poids D arrive au Point F, toute la longueur du fil ſe trouve appliquée ſur la Trochoïde KCF, & le Raïon de Courbure eſt zero dans ce Point ; ainſi la Trochoide IAF eſt plus Courbe à ſa pointe F qu'aucun Cercle, & fait avec la Tangente prolongée un Angle de Contact infiniment plus grand qu'aucun Cercle ne peut faire avec une Ligne droite.

XXXIX. Mais il y a des Angles de Contact encore infiniment plus grands que les Angles Trochoïdaux & d'autres encore infiniment plus grands que ceux-ci, & ainſi à l'infini, & cependant toujours moindres que des Angles Rectilignes ; par Exemple $xx = ay$, $x^3 = by^2$, $x^4 = cy^3$, $x^5 = dy^4$, &c. déſigne une ſuite de Courbes dont chacune fait des Angles de Contact avec ſon Abciſſe infiniment plus grands que ceux que forme avec ſa même Abciſſe la Courbe qui la précéde ; l'Angle de Contact que forme la premiere $xx = ay$, eſt de la même eſpece que les Angles de Contact que forme le Cercle, celui que forme la ſeconde $x^3 = by^2$ eſt de la même eſpece que ceux de la Trochoide ; & quoique les Angles des Courbes ſuivantes excédent toujours infiniment les Angles des précédentes, ils ne peuvent jamais arriver à la grandeur d'un Angle Rectiligne.

XL. De même $x = y$, $xx = ay$, $x^3 = b^2y$, $x^4 = c^3y$, &c. déſigne une ſuite de Lignes dont chacune forme au Sommet de ſon Abciſſe un Angle infiniment plus petit que celui de celle qui précéde, & encore entre chacun de ces Angles de Contact on peut trouver à l'infini d'autres Angles de Contact qui ſe ſurpaſſeront infiniment chacun.

XLI. L'on voit donc que les Angles de Contact d'une eſpece, ſont infiniment plus grands que ceux d'une autre eſpece, puiſqu'une Courbe d'une eſpece quelque grande que ſoit cette Courbe ne peut au Point de Contact paſſer entre la Tangente & une Courbe d'une autre eſpece quelque petite que ſoit cette Courbe ; ainſi un Angle de Contact d'une eſpece ne peut pas abſolument contenir un Angle de Contact de la même eſpece comme le tout contient une partie,

UVA. BHSC. SC 04146

XLVI. Lorſque les Courbes ſont rapportées à des Lignes droites de toute autre maniere, & qu'on voudra déterminer la Courbure ſans aucune Réduction précédente, on pourra appliquer la Méthode dont je me ſuis ſervi pour tirer les Tangentes ; mais comme toutes les Courbes Géometriques & Mécaniques peuvent toujours ſe rapporter à des co-Ordonnées perpendiculaires, principalement lorſque les Conditions qui définiſſent ces Courbes ſont réduites à des Equations infinies, comme je le ferai voir ci-après ; je m'imagine en avoir aſſez dit ſur cette matiere ; celui qui en voudra davantage pourra aiſément le ſuppléer de lui-même, ſur tout après avoir jetté les yeux ſur la Méthode pour les Spirales que je vais ajouter ici pour donner plus de facilité.

XLVII. Soit BC la Circonférence d'un Cercle, A ſon Centre & B un Point donné dans ſa Circonférence ; ſoit AD*d* une Spirale, DC ſa perpendiculaire, & C le Centre de Courbure du Point D ; tirez la droite ADK, faites CG égale & parallele à AK, tirez la perpendiculaire GF qui rencontre CD en F ; faites AB ou AK $=$ 1 $=$ CG, BK $= x$, AD $= y$, & GF $= z$; enſuite imaginez que le Point D décrit ſur la Spirale un Eſpace infiniment petit D*d*, par ce Point *d* tirez le demi Diametre A*k*, faites C*g* égale & parallele à A*k* ; tirez *gf* perpendiculaire à *g*C, C*d* coupera *gf* en *f* & GF en P ; prolongez GF en φ, de ſorte que Gφ $=$ *gf* ; tirez *de* perpendiculaire à AK, & prolongez-la juſqu'à-ce qu'elle rencontre CD en I ; les Moments contemporains de BK, AD & Gφ, ſeront K*k*, D*e* & Fφ, qu'on peut donc nommer $\dot{x}o$, $\dot{y}o$ & $\dot{z}o$.



XLVIII. Maintenant AK : A*e* ou AD : : *k*K : *de* $= \dot{y}o$, où je prends $\dot{x} = 1$, comme ci-devant ; & CG : GF : : *de* : *e*D $= \dot{y}o\dot{z}$, ainſi $\dot{y}\dot{z} = \dot{y}$; de plus CG : CF : : *de* : *d*D $= \dot{y}o \times$ CF : : *d*D : *d*I $= \dot{y}o \times$ CF*q* ; mais comme l'Angle PCφ $=$ GC*g* $=$ DA*d* & l'Angle CPφ $=$ C*d*I $=$ *ed*D plus un droit $=$ AD*d*, les Triangles CPφ & AD*d* ſont ſemblables ; ainſi AD : D*d* : : CP

UVA. BHSC. SC 04146

ou CF : Pφ = $o \times$ CFq, retranchant Fφ reſte PF = $o \times$ CFq $- o \times \dot{z}$; enfin en laiſſant tomber ſur AD la perpendiculaire CH, vous aurez PF : dI : : CG : eH ou DH = $\frac{y \times \text{CF}q}{\text{CF}q - z}$, ſubſtituez 1 $+ zz$ pour pour CFq, vous aurez DH = $\frac{y + yzz}{1 + zz - z}$. On peut obſerver que dans ces eſpeces de Calculs, je prends les Quantités AD & Ae pour égales, parce que leur Raport differe infiniment peu du Raport d'égalité.

XLIX. On peut de la tirer la Régle ſuivante. La Relation de x & y étant donnée par une Equation quelconque, trouvez la Relation des Fluxions $\dot{x}$ & $\dot{y}$, ſubſtituez 1 pour $\dot{x}$ & $y\dot{z}$ pour $\dot{y}$, & de l'Equation qui en réſulte tirez une ſeconde fois la Relation entre $\dot{x}$, $\dot{y}$ & $\dot{z}$, ſubſtituez encore 1 pour $\dot{x}$; le premier Réſultat bien réduit donnera $\dot{y}$ & $\dot{z}$, & le ſecond donnera $\dot{z}$; vous ferez $\frac{y + yzz}{1 + zz - z}$ = DH, & vous éleverez la perpendiculaire HC, qui rencontre en C la Ligne DC perpendiculaire à la Spirale, C ſera le Centre de Courbure : Ou ce qui revient au même, prenez CH à HD : : z : 1, & tirez CD.

L. Exemple 1. Si l'on a $ax = y$, Equation à la Spirale d'*Archimede*, on aura $a\dot{x} = \dot{y}$, ou $a = y\dot{z}$ en mettant 1 pour $\dot{x}$ & $y\dot{z}$ pour $\dot{y}$; & prenant encore les Fluxions on aura $o = y\dot{z} + \dot{y}z$; ainſi un Point quelconque D de la Spirale étant donné & par conſéquent la Ligne AD ou y, z ſera auſſi donnée = $\frac{a}{y}$, & $\dot{z} = -\frac{\dot{y}z}{y}$ ou $-\frac{a\dot{z}}{y}$; ainſi faites $1 + zz - \dot{z} : 1 + zz$: : DA, y : DH; & 1 : z : : DH : CH.

Vous tirerez aiſément la Conſtruction ſuivante; prolongez AB en Q, de ſorte que AB : l'Arc BK : : l'Arc BK : BQ, & faites AB + AQ : AQ : : DA : DH : : a : HC.

LI. Exemple 2. Si $ax^2 = y^3$ eſt l'Equation qui détermine la Relation entre BK & AD, vous aurez $2a\dot{x}x = 3\dot{y}y^2$, ou $2a\dot{x} = 3\dot{z}y^3$, d'où vous tirerez $2a\dot{x} = 3\dot{z}y^3 + 9z\dot{y}y^2$; z eſt donc =

UVA. BHSC. SC 04146

$\frac{2ax}{3y^3}$ & $\dot{z} = \frac{2a - 9zzy^3}{3y^3}$; z & $\dot{z}$ étant connues faites $1 + zz - \dot{z} : 1 + zz :: DA : DH$, ou ayant réduit l'Opération à une meilleure forme, faites $9xx + 10 : 9xx + 4 :: DA : DH$.

LII. Exemple 3. De même si $ax^2 - bxy = y^3$ désigne la Relation de BK à AD, vous aurez $\frac{2ax - by}{bxy + 3y^3} = z$, & $\frac{2a - 2bzy - bz^2xy - 9z^2y^3}{bxy + 3y^3} = \dot{z}$; d'où vous pourrez déterminer la Ligne DH & le Point C.

LIII. De cette façon vous déterminerez aisément la Courbure des autres Spirales ; & à l'imitation des Régles que nous avons données vous pourrez en inventer d'autres pour toutes les Courbes.

LIV. Ce Problême est donc entierement discuté, mais comme il est singulier & que ma Méthode de Résolution est singuliere aussi ; je vais jetter les idées d'une autre façon de le résoudre, qui a plus de raport avec les manieres ordinaires de tirer les Tangentes, & qui d'ailleurs se présente plus naturellement. Si d'un Raïon quelconque vous décrivez un Cercle qui coupe en différents Points une Courbe quelconque, & si vous imaginez que ce Cercle s'étende ou se referre de sorte que les deux Points d'intersection coincident, il touchera la Courbe en ce Point ; & outre cela si vous supposez que son Centre s'approche ou s'éloigne du Point de Contact jusqu'à ce que le troisiéme Point d'Intersection tombe sur les premiers au Point de Contact, ce Cercle aura la même Courbure que la Courbe dans ce Point de Contact, comme je l'ai insinué ci-devant dans la derniere des cinq propriétés du Centre de Courbure par le moyen de chacune desquelles j'ai assuré qu'on pouvoit résoudre le Problême d'une maniere différente.

UVA. BHSC. SC 04146

LV. Du Centre C & du Raïon CD, ſoit donc décrit un Cercle qui coupe la Courbe aux Points d, D & δ; abaiſſez les perpendiculaires DB, db, $\beta\delta$ & CF ſur l'Abciſſe AB; nommez AB $= x$, BD $= y$, AF $= u$, FC $= t$, & DC $= s$, BF $= u - x$, & DB $+$ FC $= y + t$; la ſomme de leur Quarrez eſt égale au quarré de DC, c'eſt-à-dire, $u^2 - 2ux + x^2 + y^2 + 2yt + t^2 = ss$; pour abréger faites $u^2 + t^2 - s^2 = q^2$, vous aurez $x^2 - 2ux + y^2 + 2ty + q^2 = 0$; trouvez t, u & q^2, & vous aurez $s = \sqrt{u^2 + t^2 - q^2}$.



LVI. Soit donc donnée l'Equation à la Courbe, dont on cherche la Quantité de Courbure; par le moyen de cette Equation vous exterminerez l'une ou l'autre des Quantités x ou y, & vous aurez une Equation dont les Racines db, DB, $\beta\delta$, dans le premier Cas ou Ab, AB, AQ dans le ſecond, ſeront aux Points d'Interſection d, D, δ, &c. Puis donc que trois de ces Lignes deviennent égales, le Cercle touche la Courbe & a en même temps le même degré de Courbure que la Courbe dans le Point de Contact; elles deviendront égales en comparant l'Equation avec une autre Equation ſuppoſée, qui a le même nombre de Dimenſions & trois Racines égales, comme *Deſcartes* l'a fait voir; mais on le fera encore plus promptement en multipliant les Termes deux fois par une Progreſſion Arithmétique.

LVII. Exemple. Soit l'Equation à la Parabole $ax = yy$, exterminez x en ſubſtituant ſa Valeur $\frac{yy}{a}$; vous aurez trois Equations dont les Racines y doivent être faites égales; ainſi je multiplie les Termes deux fois par une Progreſſion Arithmétique, comme vous le voyez ici,

$$\begin{array}{rcccc} & \frac{y^4}{aa} & * & -\frac{2u}{a}y^2 + 2ty + q^2 = 0. \\ & & & + y^2 \\ 4 & * & 2 & 1 & 0 \\ 3 & * & 1 & 0 - & 1 \\ \hline & \frac{12y^4}{aa} & - & \frac{4u}{a}y^2 + 2y^2 = 0. & \end{array}$$

& j'ai $\frac{12y^4}{a^2} - \frac{4u}{a}y^2 + 2y^2 = 0$, ou $u = \frac{3y^2}{a} + \frac{1}{2}a$, d'où vous

UVA. BHSC. SC 04146

tirerez aiſément que BF $= 2x + \frac{1}{2}a$, comme ci-devant.

LVIII. Un Point quelconque D de la Parabole étant donc donné, tirez DP perpendiculaire à la Courbe, & ſur l'Axe prenez PF $=$ 2AB, élevez FC perpendiculaire à FA, qui rencontre DP en C, ce Point C ſera le Centre de Courbure.

LIX. On peut faire de même pour le trouver dans l'Ellipſe & dans l'Hyperbole, mais le Calcul ſera déſagréable, & en général dans les autres Courbes il ſera fort ennuyeux.

Des Queſtions qui ont raport au Problême précédent.

LX. La Réſolution de ce Problême nous en fournit d'autres comme,

1. *Trouver le Point ou la Courbe à un degré donné de Courbure.*

LXI. Ainſi dans la Parabole $ax = yy$, ſi l'on demande le Point ou le Raïon de Courbure eſt d'une longueur donnée f; par le Centre de Courbure trouvé ci-devant vous déterminerez le Raïon $= \frac{a + 4x}{2a}\sqrt{aa + 4xx}$, qu'il faut par conſéquent égaler à f; & après la Réduction vous aurez $x = -\frac{1}{4}a + \sqrt[3]{\frac{1}{16}aff}$.

2. *Trouver le Point de droiture.*

LXII. J'appelle le Point de droiture celui ou le Raïon de Courbure devient infini, ou bien ce qui revient au même, celui ou le Centre de Courbure eſt à une diſtance infinie, tel qu'il eſt au Sommet de la Parabole $a^3x = y^4$; ce même Point eſt ordinairement celui d'Infléxion que j'ai montré ci-devant la façon de déterminer; mais ce Problême-ci peut fournir une autre maniere qui eſt même aſſez élegante; plus le Raïon de Courbure eſt long, plus l'Angle DCd (*Fig. pag.* 65.) eſt petit, & par conſéquent le Moment df; ainſi la Fluxion de la Quantité z diminue à meſure, & s'évanouit lorſque le Raïon devient infini; trouvez donc la Fluxion $\dot{z}$, & égalez-la à zero.

LXIII. Comme ſi vous voulez déterminer la Limite de l'Infléxion dans la Parabole de la ſeconde eſpece, dont *Deſcartes* ſe ſervoit pour conſtruire les Equations du ſixiéme degré, l'Equation à cette Courbe eſt $x^3 - bx^2 - cdx + bcd + dxy = 0$; ce qui donne $3\dot{x}xx - 2b\dot{x}x - cd\dot{x} + d\dot{x}y + dx\dot{y} = 0$; écrivez 1 pour

UVA. BHSC. SC 04146

$\dot{x}$ & $\dot{z}$ pour $\dot{y}$, vous aurez $3x^2 - 2bx - cd + dy + dxz = 0$ d'où $6x\dot{x} - 2b\dot{x} + d\dot{y} + dx\dot{z} + d\dot{x}z = 0$; mettez encore 1 pour $\dot{x}$, $\dot{z}$ pour $\dot{y}$ & 0 pour $\dot{z}$, vous aurez $6x + 2b + 2dz = 0$, ou $dz = b - 3x$; exterminez z en ſubſtituant cette Valeur dans l'Equation $3xx - 2bx - cd + dy + dxz = 0$, & vous aurez $-bx - cd + dy = 0$, ou $y = c + \frac{bx}{d}$; ce qui étant ſubſtitué au lieu de y dans l'Equation à la Courbe, donne $x^3 + bcd = 0$, pour déterminer la Limite de l'Infléxion.

LXIV. Par une ſemblable Méthode vous pourrez déterminer les Points de droiture qui ne tombent pas dans les Limites de l'Infléxion, comme ſi l'Equation à la Courbe eſt $x^4 - 4ax^3 + 6a^2x^2 - b^3y = 0$, vous aurez d'abord $4x^3 - 12ax^2 + 12a^2x - b^3z = 0$, & de la $12x^2 - 24ax + 12a^2 - b^3\dot{z} = 0$; ſuppoſez $\dot{z} = 0$, vous trouverez $x = a$; ainſi prenez AB $= a$, & élevez la perpendiculaire BD, elle rencontrera la Courbe au Point de droiture D.



3. *Trouver le Point de Courbure infinie.*

LXV. Trouvez le Raïon de Courbure & égalez-le à zero. Dans la Parabole de la ſeconde eſpece dont l'Equation eſt $x^3 = ay^2$, le Raïon CD ſera $= \frac{4a + 9x}{6a}\sqrt{4ax + 9xx}$; qui eſt égal à zero lorſque $x = 0$.

4. *Déterminer le Point de la plus grande ou de la moindre Courbure.*

LXVI. Dans ces Points le Raïon de Courbure devient ou un plus grand ou un moindre, ainſi le Centre de Courbure dans cet inſtant n'avance ni ne recule vers le Point de Contact, mais il eſt en repos; trouvez donc la Fluxion du Raïon CD, ou plûtôt celle des Lignes BH ou AK, & égalez-la à zero.



LXVII. Dans la Parabole de la ſeconde eſpece $x^3 = a^2y$ en déterminant le Centre de Courbure vous trouverez d'abord DH $= \frac{aa + 9xy}{6x}$; & par conſéquent BH $= \frac{aa + 15xy}{6x}$;

UVA. BHSC. SC 04146

faites BH $=$ u, c'eſt-à-dire, $\frac{aa}{6x} + \frac{5}{2}y = u$, vous aurez $-\frac{a^2x}{6xx} + \frac{5}{2}\dot{y} = \dot{u}$; ſuppoſez maintenant $\dot{u}$ ou la Fluxion de BH $=$ o; de plus puiſque $x^3 = a^2y$, vous aurez $3\dot{x}x^2 = a^2\dot{y}$, mettant 1 pour $\dot{x}$ & $\frac{3x^2}{a^2}$ pour $\dot{y}$; vous aurez $45x^4 = a^4$; prenez donc AB $= a\sqrt[4]{\frac{1}{45}} = a \times \overline{45}^{-\frac{1}{4}}$; élevez la perpendiculaire BD, elle rencontrera la Courbe au Point de la plus grande Courbure, ou bien ce qui eſt la même choſe, faites AB : BD : : $3\sqrt{5}$: 1.

LXVIII. On trouvera de la même maniere que l'Hyperbole de la ſeconde eſpece dont l'Equation eſt $xy^2 = a^3$ eſt le plus courbée aux Points D & d, ce que vous pourrez déterminer en prenant ſur l'Abciſſe la Ligne AQ $=$ 1, élevant la perpendiculaire QP $= \sqrt{5}$, & Qp de l'autre côté auſſi $= \sqrt{5}$, & en tirant AP & Ap; car elles rencontreront la Courbe aux Points cherchés D & d.



5. *Déterminer le lieu du Centre de Courbure, ou bien la Courbe où ce Centre ſe trouve toujours.*

LXIX. Nous avons déja fait voir que le Centre de Courbure d'une Trochoïde ſe trouve toujours dans une autre Trochoïde. De même le Centre de Courbure de la Parabole ſe trouve toujours dans une Parabole de la ſeconde eſpece, dont l'Equation eſt $axx = y^3$, comme on le verra aiſément par le Calcul.

6. *Trouver le Foier lumineux d'une Courbe, ou bien le concours des Raïons rompus par chacun de ſes Points.*

LXX. Trouvez la Courbure de la Courbe à ce Point; du Centre & du Raïon de Courbure décrivez un Cercle & trouvez le concours des Raïons rompus par le Cercle dans ce Point, il ſera le même que celui des Raïons rompus par la Courbe.

LXXI. On peut ajouter à ces Problêmes une façon particuliere de trouver la Courbure aux Sommets des Courbes lorſqu'elles coupent leurs Abciſſes à Angles droits; car dans ce cas le Point où la perpendiculaire à la Courbe coupe l'Abciſſe eſt le Centre de Courbure; ainſi la Relation donnée de l'Abciſſe x & de l'Ordonnée per-

UVA. BHSC. SC 04146

pendiculaire y ; donnera celle des Fluxions $\dot{x}$ & $\dot{y}$; & le Raïon de Courbure ſera la Valeur de $\dot{y}\dot{y}$, après avoir fait $1 = \dot{x}$ & $\dot{y} = 0$.

LXXII. Ainſi dans l'Ellipſe $ax - \frac{a}{b}xx = yy$, on a $\frac{a\dot{x}}{2} - \frac{ax\ddot{x}}{b} = \dot{y}\dot{y}$; ſuppoſant dans la premiere Equation $y = 0$, on a $\dot{x} = b$, & mettant dans la ſeconde b au lieu de x & 1 au lieu de $\dot{x}$, on trouve $\dot{y}\dot{y} = \frac{1}{2}a =$ la longueur du Raïon de Courbure ; & de même aux Sommets de l'Hyperbole & de la Parabole, le Raïon de Courbure ſera toujours la moitié du Parametre.

LXXIII. De même dans la Conchoïde repréſentée par l'Equation $\frac{b^2c^2}{xx} + \frac{2bc}{x} + \frac{cc}{-bb} - 2bx - xx = yy$, la Valeur de $\dot{y}\dot{y}$ ſera $- \frac{b^2c^2}{x^3} - \frac{bc^2}{x^2} - b - x$; ſuppoſez donc $y = 0$, & par conſéquent $x = c$ ou $-c$, vous aurez $- \frac{bb}{c} - 2b - c$, ou $\frac{bb}{c} - 2b + c$, pour le



Raïon de Courbure ; faites donc AE : EG :: EG : EC , & Ae : eG : : eG : ec , & vous aurez les Centres de Courbure C & c , aux Sommets E & e des Conchoïdes conjuguées.

PROBLEME

UVA. BHSC. SC 04146

PROBLEME VI.

Déterminer dans les Courbes la Quantité de la Courbure à un Point donné quelconque.

I. PAR *Qualité de la Courbure*, j'entends ici ſa Forme, eu égard à ſon plus ou moins d'uniformité, ou à ſon plus ou moins de variation dans les differentes parties de la Courbe; ainſi on peut dire que la Qualité de la Courbure d'un Cercle eſt uniforme ou invariable; dans une Spirale décrite par le Mouvement acceleré du Point D de A vers D, & emporté par la droite AK, tournant uniformément autour du Point A, l'accélération étant telle que la droite AD ſoit toujours en même Raport avec l'Arc AK, la Qualité de la Courbure ſera variée uniformément, c'eſt-à-dire, également inégale. On peut dire que d'autres Courbes dans différents Points ont la Courbure inégalement inégale, ſelon la variation de cette Courbure.



II. On demande donc l'inégalité ou la variation de Courbure dans chaque Point de la Courbe, & ſur cela on peut obſerver,

III. 1. Qu'aux Points ſemblablement placés dans les Courbes ſemblables, la variation de Courbure eſt ſemblable.

IV. 2. Qu'à ces Points les Moments des Raïons de Courbure ſont proportionels aux Moments contemporains des Courbes, & les Fluxions aux Fluxions.

V. 3. Ainſi lorſque ces Fluxions ne ſeront pas proportionelles, la variation de Courbure ne ſera pas ſemblable; car la variation eſt plus grande où la raiſon de la Fluxion du Raïon de Courbure à la Fluxion de la Courbe eſt auſſi plus grande; cette raiſon des Fluxions peut donc être regardée comme l'Indice de la variation de la Courbure.

UVA. BHSC. SC 04146

VI. Aux Points D & *d* indéfiniment près l'un de l'autre dans la Courbe AD*d*, ſoient tirés les Raïons de Courbure DC, *dc* ; D*d* étant le Moment de la Courbe, C*c* ſera le Moment contemporain du Raïon de Courbure, & $\frac{Cc}{Dd}$ ſera l'Indice de la variation de la Courbure ; car cette variation ſera préciſement telle & auſſi grande que la Quantité du Raport $\frac{Cc}{Dd}$ l'indiquera. Ou bien ce qui revient au même, la Courbure ſera préciſément différente d'autant de la Courbure uniforme du Cercle.



VII. Abaiſſez maintenant les Lignes DB, *db*, Ordonnées perpendiculaires à une Ligne AB qui rencontre DC en P ; faites AB $= x$, BD $= y$, DP $= t$, DC $= u$; par conſéquent B*b* $= \dot{x}o$, C*c* $= \dot{u}o$, & BD : DP : : B*b* : D*d* $= \frac{\dot{x}ot}{y}$ & $\frac{Cc}{Dd} = \frac{\dot{u}y}{\dot{x}t} = \frac{\dot{u}y}{t}$, en faiſant $x = 1$. La Relation de x & y étant donc donnée par une Equation quelconque ; & par les Prob. 4 & 5, la perpendiculaire DP ou t, le Raïon de Courbure u, la Fluxion $\dot{u}$ de ce Raïon étant trouvés, l'indice $\frac{\dot{u}y}{t}$ de la variation de Courbure ſera auſſi donné.

VIII. Exemple 1. Soit donnée l'Equation à la Parabole $2ax = yy$, vous aurez par le Prob. 4, BP $= a$, & par conſéquent DP $= \sqrt{aa + yy} = t$; par le Prob. 5, BF $= a + 2x$, & BP : DP : : BF : DC $= \frac{at + 2tx}{a} = u$; mais les Equations $2ax = yy$; $aa + yy = tt$, & $\frac{at + 2tx}{a} = u$, donnent $2a\dot{x} = 2y\dot{y}$, $2y\dot{y} = 2t\dot{t}$, & $\frac{a\dot{t} + 2t\dot{x} + 2t\dot{x}}{a} = \dot{u}$; mettant 1 au lieu de $\dot{x}$, vous aurez $\dot{y} = \frac{a}{y}$, $t = \frac{\dot{y}y}{\dot{t}} = \frac{a}{t}$, & $\dot{u} = \frac{a\dot{t} + 2t\dot{x} + 2\dot{t}}{a}$, ayant donc ainſi trouvé $\dot{y}$, $\dot{t}$ & & $\dot{u}$, vous aurez l'Indice $\frac{\dot{u}y}{t}$ de la variation de la Courbure.

UVA. BHSC. SC 04146

IX. Comme ſi on ſuppoſoit en Nombres que $a = 1$; ou $2x = yy$ & $x = \frac{1}{2}$, alors $y = \sqrt{2x} = 1$, $\dot{y} = \frac{a}{y} = 1$, $t = \sqrt{aa + yy} = \sqrt{2}$, $\dot{t} = \frac{a}{t} = \sqrt{\frac{1}{2}}$, & $\dot{u} = \frac{\dot{a}t + 2\dot{t}x + 2t}{a} = 3\sqrt{2}$; ainſi $\frac{\dot{u}y}{t} = 3$; qui par conſéquent eſt le Nombre qui indique la variation de la Courbure.

X. Si $x = 2$, alors $y = 2$, $\dot{y} = \frac{1}{2}$, $t = \sqrt{5}$, $\dot{t} = \sqrt{\frac{1}{5}}$, & $\dot{u} = 3\sqrt{5}$; ainſi $\frac{\dot{u}y}{t} = 6$ indique ici la variation de la Courbure.

XI. Ainſi dans cette Parabole au Point ou l'Ordonnée perpendiculaire à l'Axe eſt égale au Parametre, la variation de la Courbure eſt double de celle du Point ou l'Ordonnée n'eſt que la moitié de ce Parametre ; c'eſt-à-dire, la Courbure de ce premier Point differe de celle du Cercle une fois plus que celle du ſecond Point.

XII. Exemple 2. Soit l'Equation $2ax - bxx = yy$; par le Prob. 4. vous aurez $a - bx = \text{BP}$, & de la $tt = aa - 2abx + bbxx + yy = aa - byy + yy$. Par le Prob. 5. $\text{DH} = y + \frac{y^3 - by^3}{aa}$, & ſubſtituant $tt - aa$ au lieu de $yy - byy$, vous aurez $\text{DH} = \frac{tty}{aa}$; & $\text{BD} : \text{DP} :: \text{DH} : \text{DC} = \frac{t^3}{a^2} = u$; Mais les Equations $2ax - bxx = yy$, $aa - byy + yy = tt$, & $\frac{t^3}{a^2} = u$ donnent $a - bx = \dot{y}y$, $\dot{y}y - b\dot{y}y = \dot{t}t$, & $\frac{3\dot{t}tt}{aa} = \dot{u}$; ayant donc trouvé $\dot{u}$ vous aurez auſſi $\frac{\dot{u}y}{t}$ qui eſt l'Indice de la variation de la Courbure.

UVA. BHSC. SC 04146

XIII. Ainſi dans l'Ellipſe $2x - 3xx = yy$, où $a = 1$, & $b = 3$; ſi nous faiſons $x = \frac{1}{2}$, nous aurons $y = \frac{1}{2}$, $\dot{y} = -1$, $t = \sqrt{\frac{1}{-}}$, $\dot{t} = \sqrt{2}$, $u = 3\sqrt{\frac{1}{2}}$, & par conſéquent $\frac{\dot{u}y}{t} = \frac{3}{2}$ nombre qui indique la variation de la Courbure. D'où l'on voit que la Courbure de cette Ellipſe à ce Point D eſt deux fois moins inégale ou deux fois plus ſemblable à la Courbure d'un Cercle que la Courbure de la Parabole au Point ou l'Ordonnée égale la moitié du Parametre.



XIV. Si nous comparons les Concluſions tirées de ces Exemples, nous verrons que dans la Parabole dont l'Equation eſt $2ax = yy$, l'Indice $\frac{\dot{u}y}{t}$ ſera $= \frac{3y}{a}$; que dans l'Ellipſe dont l'Equation eſt $2ax - bxx = yy$, cet Indice $\frac{\dot{u}y}{t} = \frac{3y - 3by}{aa} \times$ BP; & que dans l'Hyperbole par Analogie $\frac{\dot{u}y}{t} = \frac{3y + 3by}{aa} \times$ BP; d'où il eſt évident qu'aux différents Points d'une Section Conique quelconque conſiderée ſeule & ſéparément, la variation de Courbure eſt comme le Rectangle BD × BP, & qu'aux différents Points de la Parabole elle eſt comme l'Ordonnée BD.

XV. Comme la Parabole eſt la figure la plus ſimple de toutes celles qui ont une Courbure inégale, & comme la variation de ſa Courbure ſe détermine fort aiſément, puiſque l'Indice de cette variation eſt $\frac{6 \times \text{Ordonnée}}{\text{Parametre}}$; les Courbures des autres Courbes pourront fort bien être comparées avec la Courbure de la Parabole.

XVI. Comme ſi l'on demandoit qu'elle eſt la Courbure de l'Ellipſe $2x - 3xx = yy$, au Point du Perimetre ou $x = \frac{1}{2}$; l'on a trouvé ci-devant que l'Indice eſt $\frac{3}{2}$ ainſi l'on peut répondre qu'elle eſt comme la Courbure de la Parabole $6x = yy$, au Point de cette Courbe, ou l'Ordonnée perpendiculaire à l'Axe eſt égale à $\frac{3}{2}$.

XVII. De même comme la Fluxion de la Spirale ADE eſt à

UVA. BHSC. SC 04146

la Fluxion de la Soutendante AD, dans une Raiſon donnée; par Exemple, comme $d : e$; élevez ſur la concavité de cette Courbe la Ligne A P $\left(= \frac{e}{\sqrt{dd - ee}} \times \text{AD}\right)$ Perpendiculaire ſur AD ; P ſera le Centre de Courbure, & $\frac{\text{AP}}{\text{AD}}$ ou $\frac{e}{\sqrt{dd - ee}}$, ſera l'Indice de la variation, de ſorte que cette Spirale a partout une variation ſemblable de Courbure, comme celle que la Parabole $6x = yy$ a dans le Point ou l'Ordonnée perpendiculaire à l'Abciſſe eſt égale à $\frac{e}{\sqrt{dd - ee}}$.



XVIII. De même l'Indice de la variation de Courbure d'un Point quelconque de la Trochoïde, (Voyez *Fig. de l'Art.* 29. *pag.* 69.) eſt $\frac{\text{AB}}{\text{BL}}$; ainſi ſa Courbure à ce même Point D eſt auſſi differente de celle d'un Cercle que la Courbure d'une Parabole quelconque $ax = yy$ au Point ou l'Ordonnée eſt $\frac{1}{6}a \times \frac{\text{AB}}{\text{BL}}$.

XIX. Ces Réfléxions ſuffiſent pour faire ſentir le ſens dans lequel j'ai pris ce Problême, & quand une fois on l'aura bien conçu il n'y aura plus de difficulté à faire d'autres Exemples, & même à trouver d'autres manieres d'opérer lorſqu'on en aura beſoin ; de ſorte qu'il ſera toujours aiſé à l'ennui près du Calcul de traiter des Problêmes de même eſpece comme pourroient être les ſuivants.

1. *Dans une Courbe quelconque trouver le Point ou la variation de la Courbure eſt la plus grande ou la moindre, infinie ou nulle.*

XX. Par Exemple, aux Sommets des Sections Coniques la variation de la Courbure eſt nulle, à la pointe de la Trochoïde elle eſt infinie ; dans l'Ellipſe elle eſt la plus grande aux Points ou le Rectangle BD × BP eſt le plus grand.

2. *Déterminer une Courbe d'une eſpece définie, par exemple, une Section Conique dont la Courbure à un Point quelconque ſoit égale & ſemblable à la Courbure d'un Point donné d'une autre Courbe quelconque.*

3. *Déterminer une Section Conique à un Point quelconque de laquelle la Courbure & la poſition de la Tangente par raport à l'Axe*

UVA. BHSC. SC 04146

ſoit ſemblable à la Courbure & à la poſition de la Tangente à un Point donné d'une autre Courbe quelconque.

XXI. Ce Problême peut avoir ſon uſage ; car au lieu des Ellipſes de la ſeconde eſpece dont *Deſcartes* a démontré les propriétés pour rompre la lumiere , on peut ſubſtituer les Sections Coniques qui feront la même choſe à très-peu près. La même choſe doit s'entendre des autres Courbes.

PROBLEME VII.

Trouver autant de Courbes que l'on voudra dont les Aires ſoient exprimées par des Equations finies.

I. AU Sommet A de l'Abciſſe AB d'une Courbe , ſoit élevée la perpendiculaire AC = 1 , & ſoit CE parallele à AB ; ſoit auſſi DB une Ordonnée perpendiculaire qui rencontre CE en E , & la Courbe AD en D ; concevez que les Aires ACEB & ADB ſont produites par le Mouvement des droites BD & BE le long de la Ligne AB ; les augmentations de ces Aires ou leur Fluxions ſeront toujours comme ces Lignes BD & BE ; ainſi le Parallelogramme ACEB ou AB × 1 = x , & l'Aire de la Courbe ADB = z ; les Fluxions $\dot{x}$ & $\dot{z}$ ſeront comme BE & BD ; de ſorte que faiſant x = 1 = BE , $\dot{z}$ ſera = BD.



II. Si donc on prend une Equation quelconque pour déterminer la Relation de x & de z, on en tirera la Valeur de $\dot{z}$, & l'on aura ainſi deux Equations , dont l'une déterminera la Courbe & l'autre ſon Aire.

EXEMPLE.

III. Prenez $xx = z$, vous aurez $2\dot{x}x = \dot{z}$, ou $2x = \dot{z}$, parce que $\dot{x} = 1$.

UVA. BHSC. SC 04146

IV. Prenez $\frac{x^3}{a} = z$, vous aurez $\frac{3x^2}{a} = \dot{z}$, Equation à la Parabole.

V. Prenez $ax3 = zz$, ou $a^{\frac{1}{2}}x^{\frac{3}{2}} = z$, vous aurez $\frac{3}{2}a^{\frac{1}{2}}x^{\frac{1}{2}} = \dot{z}$, ou $\frac{9}{4}ax = \ddot{z}z$, Equation encore à la Parabole.

VI. Prenez $a^6x^{-2} = zz$, ou $a3x^{-1} = z$, vous aurez $- a3x^{-2} = \dot{z}$, ou $a^3 + \dot{z}xx = o$. La Valeur négative de $\dot{z}$ marque seulement que BD doit être prise du côté opposé à BE.

VII. Si vous prenez $c^2a^2 + c^2x^2 = z^2$, vous aurez $2c^2x = 2z\dot{z}$, & après avoir exterminé $\dot{z}$, $\frac{cx}{\sqrt{aa+xx}} = \dot{z}$.

VIII. Ou si vous prenez $\frac{aa+xx}{b}\sqrt{aa+xx} = z$; faites $\sqrt{aa+xx} = u$, vous aurez $\frac{u^3}{b} = z$, & $\frac{3\dot{u}u^2}{b} = \dot{z}$; l'Equation $aa + xx = uu$ donne $2x = 2\dot{u}u$, exterminez $\dot{u}$ & vous aurez $\frac{3ux}{b} = \dot{z} = \frac{3x}{b}\sqrt{aa+xx}$.

IX. Enfin si vous prenez $8 = 3xz + \frac{2}{5}z = z\dot{z}$, vous aurez $- 3z - 3x\dot{z} + \frac{5}{2}\dot{z} = 2z\dot{z}$; au moyen de la premiere Equation vous trouverez l'Aire z, & l'Ordonnée $\dot{z}$ par l'Equation qui vous résultera.

X. Ainsi vous pourrez toujours par les Aires déterminer les Ordonnées auxquelles elles appartiennent.

UVA. BHSC. SC 04146

PROBLEME VIII.

Trouver autant de Courbes que l'on voudra, dont les Aires ſoient à l'Aire d'une autre Courbe donnée dans un raport qui puiſſe être exprimé par des Equations finies.

I. SOIT FDH une Courbe donnée, & GEI la Courbe cherchée ; concevez que leur Ordonnées DB & EC ſe meuvent perpendiculairement ſur leurs Abciſſes ou Baſes AB & AC ; les



augmentations ou Fluxions des Aires qu'elles décrivent, ſeront comme les Ordonnées multipliées par les Viteſſes de leurs Mouvements, c'eſt-à-dire, par les Fluxions de leurs Abciſſes ; faites donc AB $= x$, BD $= u$, AC $= z$, & CE $= y$, l'Aire AGEC $= t$; les Fluxions de ces Aires ſeront $\dot{s}$ & $\dot{t}$, & vous aurez $x\dot{u} : z\dot{y} :: \dot{s} : \dot{t}$, faiſant donc $\dot{x} = 1$ & $\dot{u} = \dot{s}$, vous aurez $z\dot{y} = \dot{t}$, ou $\frac{\dot{t}}{\dot{z}} = y$.

II. Ainſi deux Equations quelconques étant données, dont l'une exprime la Relation des Aires s & t, & l'autre la Relation de leurs Abciſſes x & z, vous aurez les Valeurs de $\dot{t}$ & de $\dot{z}$, qu'il ne faudra plus que ſubſtituer dans l'Equation $\frac{\dot{t}}{\dot{z}} = y$.

III.

UVA. BHSC. SC 04146

III. Exemple 1. Supposons que la Courbe donnée FDH, soit un Cercle representé par l'Equation $ax - xx = uu$, & que l'on cherche d'autres Courbes dont les Aires soient égales à celles de ce Cercle ; par l'Hypothese $s = t$, donc $\dot{s} = \dot{t}$ & $y = \frac{\dot{t}}{\dot{z}} = \frac{u}{\dot{z}}$, reste à déterminer $\dot{z}$ par l'Equation donnée entre x & z.

IV. Comme si $ax = zz$, a sera $= 2z\dot{z}$, mettant donc $\frac{a}{2z}$ au lieu de $\dot{z}$, $y = \frac{u}{\dot{z}}$ sera $= \frac{2uz}{a}$; mais $u = \sqrt{ax - xx} = \frac{z}{a}\sqrt{aa - zz}$, donc $\frac{2zz}{aa}\sqrt{aa - zz} = y$ est l'Equation à la Courbe dont l'Aire est égale à celle du Cercle.

V. De même si $xx = z$, $2x$ sera $= \dot{z}$ & $y = \frac{u}{\dot{z}} = \frac{u}{2x}$; exterminant u & x, y sera $= \frac{\sqrt{az^{\frac{1}{2}} - z}}{2z^{\frac{1}{2}}}$.

VI. Ou si $cc = xz$, o sera $= z + x\dot{z}$ & $- \frac{ux}{z} = y = -\frac{c^3}{z^3}\sqrt{az - cc}$.

VII. Ou bien si $ax + \frac{s}{1} = z$, $a + \dot{s}$ sera $= \dot{z}$ & $\frac{u}{a + \dot{s}} = y = \frac{u}{a + u}$, ce qui désigne une Courbe Mécanique.

VIII. Exemple 2. Soit encore donné le Cercle $ax - xx = uu$, & que les Courbes cherchées soient telles que leurs Aires ayent une Relation quelconque donnée à l'Aire du Cercle ; si vous prenez $cx + s = t$, & que vous supposiez $ax = zz$; vous aurez $c + \dot{s} = \dot{t}$, & $a = 2z\dot{z}$; ainsi $y = \frac{\dot{t}}{\dot{z}}$ sera $= \frac{2cx + 2\dot{s}x}{a}$; & substituant $\sqrt{ax - xx}$ pour $\dot{s}$ & $\frac{zz}{a}$ pour x, y sera $= \frac{2cx}{a} + \frac{zz}{aa}\sqrt{aa - zz}$.

IX. Mais si vous prenez $s - \frac{2u^3}{3a} = t$ & $x = z$, vous aurez $\dot{s} - \frac{2u\dot{u}u}{a} = \dot{t}$ & $1 = \dot{z}$; ainsi $y = \frac{\dot{t}}{\dot{z}}$ sera $= \dot{s} - \frac{2u\dot{u}u}{a}$, ou $= u$

UVA. BHSC. SC 04146

$-\frac{2uu^2}{a}$; exterminant u au moyen de l'Equation $ax - xx = uu$, qui donne $a - 2x = 2uu$, vous aurez $y = \frac{2ux}{a}$, & ſubſtituant $\sqrt{ax - xx}$ & z Valeurs de u & de x, vous aurez enfin $y = \frac{2z}{a}\sqrt{az - zz}$.

X. Si $ss = t$ & $x = zz$, $2ss$ ſera $= \dot{t}$ & $1 = 2\dot{z}z$; ainſi $y = \frac{\dot{t}}{\dot{z}}$ ſera $= 4ssz$, ſubſtituant $\sqrt{ax - xx}$ & zz pour s & x, vous aurez $y = 4szz\sqrt{a - zz}$ Equation à une Courbe Mécanique.

XI. Exemple 3. On peut de la même maniere trouver des Figures qui ayent une Relation donnée avec telle autre Figure donnée que l'on voudra. Soit donnée l'Hyperbole $cc + xx = uu$, ſi vous prenez $s = t$ & $xx = cz$, vous aurez $\dot{s} = \dot{t}$ & $2\dot{x} = c\dot{z}$; ainſi $y = \frac{\dot{t}}{\dot{z}}$ ſera $= \frac{cs}{2x}$; ſubſtituant $\sqrt{cc + xx}$ pour s, & $c^{\frac{1}{2}}z^{\frac{1}{2}}$ pour x, vous aurez $y = \frac{c}{2z}\sqrt{cz + zz}$.

XII. Et de même ſi vous prenez $xu - s = t$, & $xx = cz$, vous aurez $\dot{u}x + u\dot{x} - \dot{s} = \dot{t}$ & $2\dot{x} = c\dot{z}$; mais $u = s$ & par conſéquent $\dot{u}x = \dot{t}$; ainſi $y = \frac{\dot{t}}{\dot{z}}$ ſera $= \frac{cu}{z}$; de plus $cc + xx = uu$ donne $x = \dot{u}u$; ainſi $y = \frac{cx}{2u}$; & ſubſtituant $\sqrt{cc + xx}$ pour u, & $c^{\frac{1}{2}}z^{\frac{1}{2}}$ pour x, y ſera $= \frac{cz}{2\sqrt{cz + zz}}$.

XIII. Exemple 4. Si l'on vouloit rapporter d'autres Figures à la Ciſſoïde donnée $\frac{xx}{\sqrt{ax - xx}} = u$ & que leur Relation fût $\frac{x}{3}\sqrt{ax - xx} + \frac{2}{3}s = t$; faites $\frac{x}{3}\sqrt{ax - xx} = h$, vous aurez $\dot{h} + \frac{2}{3}\dot{s} = \dot{t}$; mais l'Equation $\frac{ax^3 - x^4}{9} = hh$ donne $\frac{3ax^2 - 4x^3}{9} = 2\dot{h}h$; exterminant h, $\dot{h}$ ſera $= \frac{3ax - 4xx}{6\sqrt{ax - xx}}$; de plus $\frac{2}{3}\dot{s} = \frac{2}{3}\dot{u} = \frac{4x\dot{x}}{6\sqrt{ax - xx}}$ Donc $\frac{ax}{2\sqrt{ax - xx}} = \dot{t}$. Pour déterminer z & $\dot{z}$ prenez $\sqrt{aa - ax} = z$,

UVA. BHSC. SC 04146

vous aurez $-a = 2z\dot{z}$ ou $\dot{z} = -\frac{a}{2z}$; ainſi $y = \frac{\dot{t}}{\dot{z}}$ ſera $= \frac{-zx}{\sqrt{ax - xx}}$ $= \frac{\sqrt{zzx}}{a-x} = \sqrt{ax} = \sqrt{aa - zz}$; comme cette Equation appartient au Cercle vous aurez le Raport des Aires du Cercle & de la Ciſſoïde.

XIV. Si vous prenez $\frac{2x}{3}\sqrt{ax - xx} + \frac{1}{3}s = t$, & $x = z$, vous en tirerez $y = \sqrt{az - zz}$, Equation qui appartient encore au Cercle.

XV. Et tout de même ſi une Courbe Mécanique quelconque étoit donnée, on pourroit trouver d'autres Courbes Mécaniques. Mais pour avoir des Courbes Géometriques il convient que quelqu'une des Lignes droites qui dépendent Géometriquement les unes des autres ſoit priſe pour l'Abciſſe ou Baze, & que l'on cherche l'Aire qui complette le Parallelogramme en ſuppoſant ſa Fluxion égale à l'Abciſſe multipliée par la Fluxion de l'Ordonnée.

XVI. Exemple 5. Ainſi la Trochoïde ADF étant propoſée, je la rapporte à l'Abciſſe AB, & le Parallelogramme ABDG étant achevé, je cherche la Surface de complement ADG, en la ſuppoſant décrite par le Mouvement de la droite GD, dont par conſéquent la Fluxion eſt égale à la Ligne GD, multipliée par la Viteſſe du Mouvement, c'eſt-à-dire, $= x \times \dot{u}$; mais comme AL eſt parallele à la Tangente DT, AB ſera à BL comme la Fluxion de la même AB à la Fluxion de l'Ordonnée BD, c'eſt-à-dire comme $1 : \dot{u}$; ainſi $\dot{u} = \frac{BL}{AB}$, & $x\dot{u} = BL$; ainſi l'Aire ADG



UVA. BHSC. SC 04146

eſt décrite par la Fluxion BL, & comme l'Aire Circulaire ALB eſt décrite auſſi par la même Fluxion, ces deux Aires ſeront égales.

XVII. De même ſi vous imaginez que ADF ſoit une Figure d'Arcs ou de Sinus verſes, c'eſt-à-dire, ſi vous ſuppoſez l'Ordonnée BD égale à l'Arc AL; la Fluxion de l'Arc AL ſera à la Fluxion de l'Abciſſe AB comme PL eſt à BL, ou $\dot{u} : 1 :: \frac{1}{2} : \sqrt{ax - xx}$, & $\dot{u} = \frac{a}{2\sqrt{ax - xx}}$; la Fluxion $\dot{u}x$ de l'Aire ADG ſera $\frac{ax}{2\sqrt{ax - xx}}$: Si donc on imagine une droite $\frac{ax}{2\sqrt{ax - xx}}$ appliquée perpendiculairement à un Point B de la droite AB, elle ſera terminée par une Courbe Géometrique dont l'Aire adjacente à l'Abciſſe AB ſera égale à l'Aire ADG.

XVIII. Et de même on peut trouver des Figures Géometriques égales à d'autres Figures formées par l'application ſous un Angle quelconque des Arcs d'un Cercle, d'une Hyperbole, ou d'une autre Courbe quelconque, ſur les Sinus droits ou verſes de ces Arcs, ou ſur toutes les autres Lignes droites qui peuvent être déterminées Géometriquement.

XIX. La façon ne ſera pas longue pour les Spirales. Du Centre A de Rotation, & du Raïon quelconque AG, ſoit décrit l'Arc DG, qui coupe la droite AF en G & la Spirale en D. Cet Arc comme une Ligne qui ſe meut ſur l'Abciſſe AG, décrit l'Aire de la Spirale AHDG; ainſi la Fluxion de cette Aire eſt à la Fluxion du Rectangle $1 \times AG$, comme l'Arc GD eſt à 1; élevez la perpendiculaire GL égale à cet Arc, elle décrira en ſe mouvant de même ſur la Ligne AG l'Aire A*l*LG égale à l'Aire de la Spirale AHDG, & la Courbe A*l*L ſera Géometrique; de plus tirez la Soutendente AL, le Triangle ALG ſera $= \frac{1}{2}AG \times GL = \frac{1}{2}AG \times GD =$ au Secteur AGD; ainſi les Segments de complement AL*l* & ADH ſeront auſſi égaux. Ceci convient non ſeulement à la Spirale d'*Archimede*, ou A*l*L devient la Parabole d'*Apollonius*, mais à toutes les Spirales quelconques; de ſorte qu'elles peuvent toutes ſe convertir aiſément en Courbes Géometriques égales.



XX. J'aurois pû donner un plus grand nombre d'Eſſais ſur la

UVA. BHSC. SC 04146

Conſtruction de ce Problême ; mais ceux-ci ſuffiſent, car ils ont une generalité ſi grande qu'elle embraſſe tout ce qui a été trouvé ſur les Aires des Courbes, & je crois même tout ce qu'on pourra trouver à cet égard, & cela avec une facilité de le déterminer, dont les Méthodes ordinaires d'opérer ne peuvent approcher.

XXI. Mais le principal uſage de ce Problême & du précédent eſt de trouver des Courbes comparables avec les Sections Coniques ou d'autres Courbes de grandeur connue, & de diſpoſer par Ordre & dans une Table les Equations qui les définiſſent ; car cette Table étant conſtruite, il n'y aura qu'à voir ſi l'Equation de la Courbe dont on cherche l'Aire s'y trouve, ou bien ſi elle peut ſe transformer en une autre Equation qui s'y trouve ; car alors l'Aire pourra toujours être connue. Outre qu'une Table de cette eſpece peut s'appliquer à la détermination de la longueur des Courbes, à l'invention de leurs Centres de gravité, des Solides produits par leur Révolution, des Surfaces de ces Solides, & en général à trouver une autre Quantité Fluente quelconque, produite par une Fluxion qui lui eſt analogue.

PROBLEME IX.

Trouver l'Aire d'une Courbe propoſée quelconque.

I. LA Réſolution de ce Problême dépend de celle du Prob. 2. où par la Relation donnée des Fluxions, on trouve celle des Fluentes. Concevez comme ci-devant que la droite BD perpendiculaire à l'Abciſſe AB décrive par ſon Mouvement l'Aire cherchée AFDB, & qu'en même temps une Ligne égale à l'unité décrive de l'autre côté de AB le Parallelogramme ABEC ; ſi vous ſuppoſez que BE ſoit la Fluxion de ce Parallelogramme, BD ſera la Fluxion de l'Aire cherchée.



II. Ainſi faites $AB = x$, ABEC ſera $= 1 \times x = x$, & $BE = \dot{x}$; nommez z l'Aire AFDB, BD ſera $= \dot{z} = \frac{\dot{x}}{\dot{x}}$ puiſque $\dot{x} = 1$; ainſi l'Equation qui exprimera BD exprimera en même temps le

UVA. BHSC. SC 04146

Raport de $\frac{\dot{z}}{\dot{x}}$, & par le premier Cas du Prob. 2. vous trouverez la Relation des Quantités Fluentes x & z.

III. Exemple. 1. Lorſque BD ou $\dot{z}$ eſt égal à quelque Quantité ſimple.

IV. Comme ſi vous avez $\frac{xx}{a} = \dot{z}$ ou $\frac{\dot{z}}{\dot{x}}$, Equation à la Parabole, vous aurez par le Prob. 2. $\frac{x^3}{3a} = z$, d'où $\frac{x^3}{3a} = \frac{1}{3}$ AB × BD = à l'Aire de la Parabole AFDB.

V. Si vous avez $\frac{x^3}{aa} = \dot{z}$, Equation à la Parabole de la ſeconde eſpece, vous aurez $\frac{x^4}{4a^2} = z$, c'eſt-à-dire, $\frac{1}{4}$ AB × BD = à l'Aire AFBD.

VI. Si vous prenez $\frac{a^3}{xx} = \dot{z}$, ou $a^3x^{-2} = \dot{z}$, Equation à l'Hyperbole de la ſeconde eſpece, vous aurez $- a^3x^{-1} = z$, ou $- \frac{a^3}{x} = z$, c'eſt-à-dire, AB × BD = à l'Aire HDBH d'une étenduë infinie, priſe de l'autre côté de l'Ordonnée BD, comme le déſigne la Valeur négative indiquée par le Signe —.



VII. De même $\frac{a^4}{x^3} = \dot{z}$, donne $- \frac{a^4}{2xx} = z$.

VIII. Soit $ax = \ddot{z}z$, ou $a^{\frac{1}{2}}x^{\frac{1}{2}} = \dot{z}$, Equation à la Parabole, vous aurez $\frac{2}{3}a^{\frac{1}{2}}x^{\frac{3}{2}} = z$, c'eſt-à-dire, $\frac{2}{3}$AB × BD = à l'Aire AFDB.

IX. $\frac{a^3}{x} = \ddot{z}z$ donne $2a^{\frac{3}{2}}x^{\frac{1}{2}} = z$, ou 2AB × BD = AFDB.

X. $\frac{a^5}{x^3} = \ddot{z}z$ donne $- \frac{2a^{\frac{5}{2}}}{x^{\frac{1}{2}}} = z$, ou 2AB × BD = HDBH.

XI. $ax^2 = \dot{z}^3$ donne $\frac{3}{5}a^{\frac{1}{3}}x^{\frac{5}{3}} = z$, ou $\frac{3}{5}$ AB × BD = AFDB, & ainſi des autres.

XII. Exemple 2. Lorſque $\dot{z}$ eſt égale à une Somme de Quantités ſimples.

UVA. BHSC. SC 04146

XIII. Comme $x + \frac{xx}{a} = \dot{z}$, vous aurez $\frac{xx}{2} + \frac{x^3}{3a} = z$.

XIV. Si $a + \frac{a^3}{xx} = \dot{z}$, $ax - \frac{a^3}{x}$ sera $= z$.

XV. $3x^{\frac{1}{2}} - \frac{5}{xx} - \frac{2}{x^{\frac{1}{2}}} = \dot{z}$ donne $2x^{\frac{3}{2}} + \frac{5}{x} - 4x^{\frac{1}{2}} = z$.

XVI. EXEMPLE 3. Où il faut une Réduction par la Division.

XVII. Soit donnée $\frac{aa}{b+x} = \dot{z}$ Equation à l'Hyperbole d'*Apollonius* ; faites la Division à l'infini & vous aurez $\dot{z} = \frac{aa}{b} - \frac{aax}{b^2} + \frac{aax^2}{b^3} - \frac{aax^3}{b^4}$, &c. Et de là par le Prob. 2. $z = \frac{a^2x}{b} - \frac{a^2x^2}{2b^2} + \frac{a^2x^3}{3b^3} - \frac{a^2x^4}{4b^4}$, &c.

XVIII. $\frac{1}{1+xx} = \dot{z}$ devient par la Division $\dot{z} = 1 - x^2 + x^4 - x^6$, &c. Ou bien $\dot{z} = \frac{1}{x^2} - \frac{1}{x^4} + \frac{1}{x^6}$, &c. Et par le Prob. 2. $z = x - \frac{1}{3}x3 + \frac{1}{5}x^5 - \frac{1}{7}x^7$, &c. = AFDB, ou $z = -\frac{1}{x} + \frac{1}{3x^3} - \frac{1}{5}x^5$, &c. = HDBH.

XIX. Soit donnée $\frac{2x^{\frac{1}{2}} - x^{\frac{3}{2}}}{1 + x^{\frac{1}{2}} - 3x} = \dot{z}$, par la Division elle deviendra $\dot{z} = 2x^{\frac{1}{2}} - 2x + 7x^{\frac{3}{2}} - 13x^2 + 34x^{\frac{5}{2}}$, &c. Et par le Prob. 2. $z = \frac{4}{3}x^{\frac{3}{2}} - x^2 + \frac{14}{5}x^{\frac{5}{2}} - \frac{13}{3}x3 + \frac{68}{7}x^{\frac{7}{2}}$, &c.

XX. EXEMPLE 4. Où il faut une Réduction par l'Extraction des Racines.

XXI. Soit donnée $\dot{z} = \sqrt{aa + xx}$ Equation à l'Hyperbole, faites l'Extraction à l'infini vous aurez $\dot{z} = a + \frac{x^2}{2a} - \frac{x^4}{8a^3} + \frac{x^6}{16a^5} - \frac{5x^8}{112a^7}$, &c. D'où $z = ax + \frac{x^3}{6a} - \frac{x^5}{40a^3} + \frac{x^7}{112a^5} - \frac{5x^9}{1008a^7}$, &c.

XXII. De même l'Equation au Cercle $\dot{z} = \sqrt{aa - xx}$ produira $z = ax - \frac{x^3}{6a} - \frac{x^5}{40a^3} - \frac{x^7}{112a^5} - \frac{5x^9}{1008a^7}$, &c.

XXIII. L'Equation au Cercle $\dot{z} = \sqrt{x - xx}$, donne par l'Extraction $\dot{z} = x^{\frac{1}{2}} - \frac{1}{2}x^{\frac{3}{2}} - \frac{1}{8}x^{\frac{5}{2}} - \frac{1}{16}x^{\frac{7}{2}}$, &c. Et $z = \frac{2}{3}x^{\frac{3}{2}} - \frac{1}{5}x^{\frac{5}{2}} - \frac{1}{28}x^{\frac{7}{2}} - \frac{1}{72}x^{\frac{9}{2}}$, &c.

UVA. BHSC. SC 04146

XXIV. De même l'Equation au Cercle $\dot{z} = \sqrt{aa + bx - xx}$, donne par l'Extraction $\dot{z} = a + \frac{bx}{2a} - \frac{xx}{2a} - \frac{b^2x^2}{8a^3}$, &c. Et $z = ax + \frac{bx^2}{4a} - \frac{x^3}{6a} - \frac{b^2x^3}{24a^3}$.

XXV. $\frac{\sqrt{1 + axx}}{1 - bxx}$ donne par la Réduction $\dot{z} = 1 + \frac{1}{2}bx^2 + \frac{3}{8}bbx^4$, &c.
$+\frac{1}{2}a \quad +\frac{1}{4}ab$
$-\frac{1}{8}aa$

Et par conséquent $z = x + \frac{1}{6}bx3 + \frac{3}{40}b^2x5$, &c.
$+\frac{1}{6}a \quad +\frac{1}{20}ab$
$-\frac{1}{40}aa$

XXVI. Et $\dot{z} = \sqrt[1]{a3 + x3}$ par l'Extraction de la Racine Cubique donne $\dot{z} = a + \frac{x^3}{3a^2} - \frac{x^6}{9a^5} + \frac{5x^9}{81a^8}$, &c. Et par le Prob. 2. $z = ax + \frac{x^4}{12a^2} - \frac{x^7}{63a^5} + \frac{x^{10}}{162a^8}$, &c. = AFDB ; ou bien $\dot{z} = x + \frac{a^3}{3xx} - \frac{a^6}{9x^5} + \frac{5a^9}{81x^8}$, &c. Et $z = \frac{x^2}{2} - \frac{a^3}{3x} + \frac{a^6}{36x^4} - \frac{5a^9}{567x^7}$, &c. = HDBH.

XXVII. EXEMPLE 5. Où il faut une Réduction par la Résolution d'une Equation affectée.

XXVIII. Si la Courbe est representée par l'Equation $\dot{z}3 + a^2\dot{z} + ax\dot{z} - 2a^3 - x^3 = 0$, tirez la Racine & vous aurez $\dot{z} = a - \frac{x}{4} + \frac{xx}{64a} + \frac{131x^4}{512aa}$, &c. Et $z = ax - \frac{xx}{8} + \frac{x^3}{192a} + \frac{131x^4}{2048a^2}$, &c.

XXIX. Mais si l'Equation est $\dot{z}^3 - c\dot{z}^2 - 2x^2\dot{z} - c^2\dot{z} + 2x^3 + c^3 = 0$, la Résolution donneroit trois Racines ; sçavoir, $\dot{z} = c + x - \frac{xx}{4c} + \frac{x^3}{32c^2}$, &c. ou $\dot{z} = c - x + \frac{3x^2}{4c} - \frac{15x^3}{32cc}$, &c. ou $\dot{z} = -c - \frac{x^2}{2c} - \frac{x^3}{2cc} + \frac{x^5}{4c^4}$, &c. qui fourniront les Valeurs des trois Aires correspondantes $z = cx + \frac{1}{2}x^2 - \frac{x^3}{12c} + \frac{x^4}{128c^2}$, &c. $z = cx - \frac{1}{2}x^2 + \frac{x^3}{4c} - \frac{15x^4}{128c^2}$, &c. Et $z = -cx - \frac{x^3}{6c} - \frac{x^4}{8c^2} + \frac{x^6}{24c^4}$, &c.

XXX. Je n'ajoute rien ici à l'égard des Courbes Mécaniques, parce que je donnerai ci-après leur Réduction à la forme des Courbes Géometriques.

XXXI.

UVA. BHSC. SC 04146

XXXI. Mais comme les Valeurs ainſi trouvées de z appartiennent à des Aires ſituées tantôt ſur une partie finie AB de l'Abciſſe; tantôt ſur une partie BH prolongée à l'infini, & quelques fois ſur les deux ſelon les differents termes; il faut pour avoir la vraie Valeur de l'Aire adjacente à une portion quelconque de l'Abciſſe, faire cette Aire égale à la difference des Valeurs de z, qui appartiennent aux parties de l'Abciſſe terminée par le commencement & à la fin de l'Aire.

XXXII. Par Exemple, dans la Courbe repreſentée par l'Equation $\frac{1}{1+xx} = \dot{z}$, on trouve $z = x - \frac{1}{3}x^3 + \frac{1}{5}x^5$, &c. Si l'on veut déterminer l'Aire bdDB, adjacente à la partie bB de l'Abciſſe; il faut de la Valeur de z, AB étant x, ôter la Valeur de z, Ab étant x, & l'on aura $x - \frac{1}{3}x^3 + \frac{1}{5}x^5$, &c. $- x + \frac{1}{3}x^3 - \frac{1}{5}x^5 =$ à l'Aire bdDB; ſi l'on fait Ab ou $x = 0$, on aura l'aire entiere AFDB $= x - \frac{1}{3}x^3 + \frac{1}{5}x^5$, &c.



XXXIII. On trouve auſſi pour la même Courbe $z = -\frac{1}{x} + \frac{1}{3x^3} - \frac{1}{5x^5}$, &c. Et par conſéquent l'Aire bdDB $= \frac{1}{x} - \frac{1}{3x^3} + \frac{1}{5x^5}$, &c. $- \frac{1}{x} + \frac{1}{3x^3} - \frac{1}{5x^5}$, &c. Si donc AB ou x eſt ſuppoſée infinie, l'Aire adjacente bdH qui eſt auſſi infiniment étenduë ſera $= \frac{1}{x} - \frac{1}{3x^3} + \frac{1}{5x^5}$, &c. car la ſeconde ſuite $-\frac{1}{x} + \frac{1}{3x^3} - \frac{1}{5x^5}$, &c. s'évanoüira, parce que ſes Dénominateurs ſont infinis.

XXXIV. Pour la Courbe repreſentée par l'Equation $a + \frac{a^3}{xx} = \dot{z}$, on trouve que $z = ax - \frac{a^3}{x}$, ainſi $ax - \frac{a^3}{x} - ax + \frac{a^3}{x} =$ à l'Aire bdDB, cette Aire devient infinie ſoit en ſuppoſant $x = 0$, ou en le ſuppoſant infini, chacune des Aires AFDB & bdH eſt donc infiniment grande, & l'on ne peut donner que les parties intermédiaires telles que bdDB; cela arrive toujours lorſque l'Abciſſe x ſe trouve au Numerateur de quelqu'uns des Termes & au Déno-

UVA. BHSC. SC 04146

minateur de quelqu'autres dans la Valeur de z ; mais quand x ne ſe trouve qu'au Numerateur comme dans le premier Exemple, la Valeur de z appartient à l'Aire ſituée ſur AB du côté de A, à main gauche de l'Ordonnée. Mais lorſque x ſe trouve aux Dénominateurs ſeulement comme dans le deuxiéme Exemple, la Valeur de z, les Signes de tous les Termes étant changés, appartient à l'Aire entiere infiniment prolongée au-delà de l'Ordonnée.

XXXV. S'il arrive que la Courbe coupe l'Abciſſe entre les Points B & b comme en E, vous aurez au lieu de l'Aire la différence bdE — BDE des Aires des parties de l'Abciſſe, à laquelle différence vous ajouterez le Rectangle BDGb, & vous aurez l'Aire dEDG.



XXXVI. Lorſque dans la Valeur de $\dot{z}$ il ſe trouve un Terme diviſé par x, l'Aire correſpondante à ce Terme appartient à l'Hyperbole Conique, & par conſéquent doit être donnée par cette Hyperbole elle-même en ſuite infinie comme il ſuit.

XXXVII. Soit $\frac{a^3 - a^2x}{ax + xx} = \dot{z}$ l'Equation à la Courbe ; par la Diviſion elle devient $\dot{z} = \frac{aa}{x} - 2a + 2x - \frac{2x^2}{a} + \frac{2x^3}{aa}$, &c. D'où $z = \boxed{\frac{aa}{x}} - 2ax + x^2 - \frac{2x^3}{3a} + \frac{x^4}{2a^2}$, &c. Et l'Aire bdDB $= \boxed{\frac{aa}{x}} - 2ax + x^2 - \frac{2x^3}{3a}$, &c. $- \boxed{\frac{aa}{x}} + 2ax - xx + \frac{2x^3}{3a}$, &c. Les Figures $\boxed{\frac{aa}{x}}$ & $\boxed{\frac{aa}{x}}$ repréſentent les petites Aires appartenant aux Termes $\frac{aa}{x}$ & $\frac{aa}{x}$.

XXXVIII. Pour trouver donc $\boxed{\frac{aa}{x}}$ & $\boxed{\frac{aa}{x}}$ je fais Ab ou x définie, & bD indéfinie, c'eſt-à-dire, j'en fais une Ligne Fluente que j'appelle y ; ainſi $\boxed{\frac{aa}{x+y}}$ ſera $=$ à l'Aire Hyperbolique adjacente à bB $= \boxed{\frac{aa}{x}} - \boxed{\frac{aa}{x}}$; mais par la Diviſion $\frac{aa}{x+y}$ ſera $= \frac{aa}{x} - \frac{a^2y}{x^2} +$

UVA. BHSC. SC 04146

$\frac{a^2y^2}{x^3} - \frac{a^2y^3}{x^4}$, &c. par conſéquent $\left[\frac{aa}{x+y}\right]$ ou $\left[\frac{aa}{x}\right] - \left[\frac{aa}{x}\right] = \frac{a^2y}{x} - \frac{a^2y^2}{2x^2} + \frac{a^2y^3}{3x^3} - \frac{a^2y^4}{4x^4}$, &c. Donc l'Aire entiere cherchée *bd*DB ſera $= \frac{a^2y}{x} - \frac{a^2y^2}{2x^2} + \frac{a^2y^3}{3x^3}$, &c. $- 2ax + x^2 - \frac{2x^3}{3a}$, &c. $+ 2ax - xx + \frac{2x^3}{3a}$, &c.

XXXIX. On auroit pû de même rendre AB ou x définie, & alors on auroit eu $\left[\frac{aa}{x}\right] - \left[\frac{aa}{x}\right] = \frac{a^2y^2}{x} + \frac{a^2y^2}{2x^3} + \frac{a^2y^3}{3x^3} + \frac{a^2y^4}{4x^4}$, &c.

XL. De plus *(Fig. penult.)* ſi l'on partage en deux la Ligne *b*B au Point C, & ſi l'on fait AC d'une longueur définie & C*b*, CB indéfinies, nommant AC, *e*, & C*b*, CB, *y*, on aura *bd* $= \frac{aa}{e-y} = \frac{aa}{e} + \frac{a^2y}{e^2} + \frac{a^2y^2}{e^3} + \frac{a^2y^3}{e^4} + \frac{a^2y^4}{e^5}$, &c. Ainſi l'Aire Hyperbolique adjacente à la partie *b*C de l'Abciſſe ſera $\frac{a^2y}{e} + \frac{a^2y^2}{2e^2} + \frac{a^2y^3}{3e^3} + \frac{a^2y^4}{4e^4}$, &c. L'on aura auſſi DB $= \frac{aa}{e+y} = \frac{aa}{e} - \frac{aay}{e^2} + \frac{aay^2}{e^3} - \frac{aay^3}{e^4} + \frac{aay^4}{e^5}$, &c. Et par conſéquent l'Aire adjacente à l'autre partie CB de l'Abciſſe ſera $\frac{a^2y}{e} - \frac{a^2y^2}{2e^2} + \frac{a^2y^3}{3e^3} - \frac{a^2y^4}{4e^4} + \frac{a^2y^5}{5e^5}$, &c. Et la Somme de ces Aires ſera $\frac{2a^2y}{e} + \frac{2a^2y^3}{3e^3} + \frac{2a^2y^5}{5e^5}$, &c. $= \left[\frac{aa}{x}\right] - \left[\frac{aa}{x}\right]$

XLI. Si l'Equation à la Courbe eſt $\dot{z}^3 + \dot{z}^2 + \dot{z} - x^3 = 0$; ſa Racine ſera $\dot{z} = x - \frac{1}{3} - \frac{2}{9x} + \frac{7}{81xx} + \frac{5}{81x^3}$, &c. D'où $z = \frac{1}{2}xx - \frac{1}{3}x - \left[\frac{2}{9x}\right] - \frac{7}{81x} - \frac{5}{162xx}$, &c. Et l'Aire *bd*DB $= \frac{1}{2}x^2 - \frac{1}{3}x - \left[\frac{2}{9x}\right] - \frac{7}{81x}$, &c. $- \frac{1}{2}xx + \frac{1}{3}x + \left[\frac{2}{9x}\right] + \frac{7}{81x}$, &c. c'eſt-à-dire, $= \frac{1}{2}x^2 - \frac{1}{3}x - \frac{7}{81x}$, &c. $- \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{3}x + \frac{7}{81x}$, &c. $- \frac{4y}{9e} - \frac{4y^3}{27e^3} - \frac{4y^5}{45e^5}$, &c.

UVA. BHSC. SC 04146

XLII. Mais d'ordinaire il eſt aiſé d'éviter ce Terme Hyperbolique en changeant le commencement de l'Abciſſe, c'eſt-à-dire, en l'augmentant ou le diminuant d'une Quantité donnée, comme dans le dernier Exemple où $\frac{a^3 - a^2x}{ax + xx} = \dot{z}$ eſt l'Equation à la Courbe, en faiſant b l'origine de l'Abciſſe, & ſuppoſant Ab d'une longueur déterminée $\frac{1}{2}a$, j'écrirai x pour le reſte bB de l'Abciſſe; ſi donc je diminue l'Abciſſe de $\frac{1}{2}a$ en écrivant $x + \frac{1}{2}a$ au lieu de x j'aurai $\frac{\frac{1}{2}a^3 - a^2x}{\frac{5}{4}a^2 + 2ax + xx} = \dot{z}$, & par la Diviſion $\dot{z} = \frac{2}{3}a - \frac{28}{9}x + \frac{200x^2}{27a}$, &c. D'où $z = \frac{3}{2}ax - \frac{14}{9}x^2 + \frac{200x^3}{81a}$, &c. = à l'Aire bdDB.

XLIII. Et de même en prenant ſucceſſivement differents Points pour le commencement de l'Abciſſe, on pourra exprimer d'une infinité de façons l'Aire d'une Courbe quelconque.

XLIV. l'Equation $\frac{a^3 - a^2x}{ax + xx} = \dot{z}$ auroit pû ſe réſoudre auſſi en deux ſuites infinies $\dot{z} = \frac{a^3}{x^2} - \frac{a^4}{x^3} + \frac{a^5}{x^4}$, &c. $- a + x - \frac{xx}{a} + \frac{x^3}{a^2}$, &c. où il ne ſe trouve aucun Terme diviſé par la premiere Puiſſance de x; mais ces Eſpeces de ſuites où les Puiſſances de x s'élevent à l'infini dans les Numerateurs de l'une & dans les Dénominateurs de l'autre, ne permettent pas auſſi aiſément d'en tirer la Valeur de z dans le Calcul Arithmétique, lorſque ces Eſpeces ſont changées en Nombres.

XLV. A peine trouvera-t'on la moindre difficulté dans le Calcul en Nombres quand on aura en Eſpeces la Valeur de l'Aire; cependant je vais encore ajouter un Exemple ou deux pour achever d'éclaircir cette matiere.

XLVI. Soit propoſée l'Hyperbole AD dont l'Equation eſt $\sqrt{x + xx} = \dot{z}$, le Sommet étant en A & les deux Axes égaux chacun à l'unité; par ce qui a été dit ci-devant l'Aire ADB eſt $= \frac{2}{3}x^{\frac{3}{2}} + \frac{1}{5}x^{\frac{5}{2}} - \frac{1}{28}x^{\frac{7}{2}} + \frac{1}{27}x^{\frac{9}{2}} - \frac{5}{704}x^{\frac{11}{2}}$, &c. c'eſt-à-dire, $x^{\frac{1}{2}} \times (\frac{2}{3}x + \frac{1}{5}x^2 - \frac{1}{28}x3 + \frac{1}{72}x^4 - \frac{5}{704}x^5$, &c. Suite que l'on peut continuer à l'infini en multipliant continuellement le dernier Terme par les Termes ſucceſſifs de cette Progreſſion $\frac{1.3}{2.5}x$, $\frac{-1.5}{4.7}x$, $\frac{-3.7}{6.9}x$, $\frac{-5.9}{8.11}x$, $\frac{-7.11}{10.13}x$,



UVA. BHSC. SC 04146

&c. c'eſt-à-dire que le premier Terme $\frac{2}{3}x^{\frac{3}{2}}$ multiplié par $\frac{1.3}{2.5}x$, formera le ſecond Terme $\frac{1}{5}x^{\frac{5}{2}}$; lequel ſecond Terme multiplié par $\frac{-1.5}{4.7}x$ formera le troiſiéme Terme $-\frac{1}{28}x^{\frac{7}{2}}$, qui multiplié par $\frac{-3.7}{6.9}x$ donnera le quatriéme Terme $\frac{1}{72}x^{\frac{9}{2}}$ & ainſi à l'infini; prenons maintenant AB de telle longueur que nous voudrons, par Exemple $\frac{1}{4}$; écrivons ce Nombre pour x, ſa Racine $\frac{1}{2}$ pour $x^{\frac{1}{2}}$; le premier Terme $\frac{2}{3}x^{\frac{3}{2}}$ ou $\frac{2}{3}.\frac{1}{8}$ réduit en Fractions decimales devient 0. 083333333, &c. ce qui multiplié par $\frac{1.3}{2.5.4}$ produit le ſecond Terme 0.00625 qui multiplié par $\frac{-1.5}{4.7.4}$ donne — 0.00027901 78, &c. pour le troiſiéme Terme & ainſi de ſuite à l'infini; à meſure que je tire ainſi la Valeur de ces Termes je les diſpoſe en deux Tables, l'une des affirmatifs & l'autre des négatifs, comme vous voyez ici.

+		—	
+	0.083333333333333	—	0.00027901785 71429
	625000000000		346790660 51
	271267361111		83446502 7
	51351693 96		2628535 4
	14462891 7		96129 6
	4954581		3867 6
	190948		166 3
	7964		7 5
	352		4
	16	—	0.00028257193895 75
	1	+	0.08961098856465 18
+	0.08961098856465 18		0.08932841662570 43

Et ôtant la ſomme des negatifs de celle des affirmatifs, je trouve 0.08932841662570 43 pour l'Aire Hyperbolique ADB, que je cherchois.

XLVII. Soit maintenant propoſé le Cercle A*d*F repreſenté par l'Equation $\sqrt{x - xx} = z$, le Diametre étant ſuppoſé égal à l'unité; par ce qui a été dit ci-devant l'Aire A*d*B ſera $\frac{2}{3}x^{\frac{3}{2}} - \frac{1}{5}x^{\frac{5}{2}} - \frac{1}{28}x^{\frac{7}{2}} - \frac{1}{72}x^{\frac{9}{2}}$, &c. comme cette ſuite ne differe de celle qui exprime l'Aire Hyperbolique que par les Signes + & —;



UVA. BHSC. SC 04146

il n'y a donc qu'à joindre enſemble les mêmes Termes numériques avec d'autres Signes, c'eſt-à-dire, ôter le Total des deux Sommes des deux Tables 0.0898935605036193 du premier Terme doublé 0.1666666666666, &c. le reſte 0.0767731061630473 ſera la portion A*d*B de l'Aire circulaire, AB étant le quart du Diametre, nous pouvons obſerver ici que quoique les Aires du Cercle & de l'Hyperbole ne ſoient pas comparables Géometriquement, elles ſe trouvent cependant par le même calcul Arithmetique.

XLVIII. L'Aire de la portion A*d*B étant trouvée, l'on peut en tirer l'Aire totale; car en tirant le Raïon *d*C & multipliant *b*D ou $\frac{1}{4}\sqrt{3}$ par *b*C ou $\frac{1}{4}$, la moitié $\frac{1}{32}\sqrt{3}$ du produit ou 0.0541265877365275 ſera la Valeur du Triangle C*d*B, laquelle étant ajoutée à l'Aire A*d*B donne l'Aire du Secteur AC*d* = 0.1308996938995747, dont le Sextuple 0.7853981633974482 eſt la Valeur de l'Aire totale.

XLIX. On peut obſerver en paſſant que la longueur de la Circonférence qui eſt égale à l'Aire diviſée par le quart du Diametre eſt égale à 3.1415926535897928.

L. Voici encore le Calcul de l'Aire compriſe entre l'Hyperbole *d*FD & ſon Aſymptote CA. Soit C le Centre de l'Hyperbole, CA = *a*, AF = *b*, & AB = A*b* = *x*; BD ſera = $\frac{ab}{a+x}$, & $bd = \frac{ab}{a-x}$; par conſéquent l'Aire AFDB ſera = $bx - \frac{bxx}{2a} + \frac{bx^3}{3a^2} - \frac{bx^4}{4a^3}$, &c. l'Aire AF*db* = $bx + \frac{bxx}{2a} + \frac{bx^3}{3a^2} + \frac{bx^4}{4a^3}$ & la ſomme *bd*DB = $2bx + \frac{2bx^3}{3a^2} + \frac{2bx^5}{5a^4} + \frac{2bx^7}{7a^6}$, &c. Suppoſons à préſent que CA = AF = 1, & A*b* ou AB = $\frac{1}{10}$, C*b* ſera 0.9 & C*b* 1.1, ſubſtituez ces Nombres au lieu de *a*, *b* & *x*; la ſuite ſera 0, 2, le ſecond 0.0006666666, &c. le troiſiéme 0.000004, & ainſi de ſuite comme vous le voyez dans cette Table; dont la Somme 0.2006706954621511 eſt égale à l'Aire *bd*DB.



L I. Si l'on demandoit ſéparément les Parties A*d* & AD de cette Aire, ôtez la plus petite BA de la plus grande *d*A, &

; le premier Terme de
0.2000000000000000
6666666666666
4000000000
285714286
2222222
18182
154
1

UVA. BHSC. SC 04146

vous aurez $\frac{bx^2}{a} + \frac{bx^4}{2a^3} + \frac{bx^6}{3a^5} + \frac{bx^8}{4a^7}$, &c. ſi vous écrivez donc 1 pour a & pour b, & $\frac{1}{10}$ pour x, & que vous réduiſiez les Termes en decimales, vous aurez donc la ſomme 0.0100503358535014 égale Ad — AD.

0.0100000000000000
5000000000000
3333333333
25000000
200000
1667
14

LII. Cette difference des Aires étant ajoutée à leur ſomme ci-devant trouvée, ou étant ſouſtraite de cette même ſomme, la moitié 0.1053605156578263 de *l'agregé* ou du Total, ſera la plus grande Aire Ad, & la moitié 0.0953101798043248 du reſte ſera la plus petite Aire AD.

LIII. On aura par les mêmes Tables ces Aires Ad & AD, lorſque Ab & AB ſeront égales à $\frac{1}{100}$, ou CB = 1, 01, & Cb = 0.99, en tranſportant ſeulement les Nombres à des places plus baſſes, comme vous pouvez le voir ici.

0.0200000000000000
6666666666
400008
28

Somme 0.0200006667066695 = bD

0.0001000000000000
50000000
3333

Somme 0.0001000050003333 = Ad — AD

la moitié du Total eſt 0.0100503358535014 = Ad, & la moitié du reſte eſt 0.0099503308531681 = AD.

LIV: Et de même en faiſant Ab & AB = $\frac{1}{1000}$, & CB = 1.001, Cb = 0.999, on aura Ad = 0.0010005003335835, & AD = 0.0009995003330835.

LV. De même ſi CA & AF = 1, Ab & AB = 0.2, ou 0.02, ou 0.002, ces Aires ſeront,

Ad = 0.2231435513142097, & AD = 0.1823215567939546.
ou Ad = 0.0202027073175194, & AD = 0.0198026272961797.
ou Ad = 0.002002 & AD = 0.001

LVI. De ces Aires trouvées il ſera aiſé d'en tirer d'autres par la ſeule Addition & la Souſtraction, car comme $\frac{1.2}{0.8} \times \frac{1.2}{0.9} = 2$, la ſomme 0.6931471805599453 des Aires qui appartiennent aux Raports $\frac{1.2}{0.8}$ & $\frac{1.2}{0.9}$, c'eſt-à-dire, qui inſiſtent ſur les parties de l'Abciſſe 1.2 — 0.8, & 1.2 — 0.9 ſera égale à l'Aire AF$\mathcal{A}\beta$, Cβ étant comme l'on ſçait = 2, de même comme $\frac{1.2}{0.8} \times 2 = 3$, la ſomme

UVA. BHSC. SC 04146

1.0986122886681097 des Aires appartenant à $\frac{1.2}{0.8}$ & à 2 ſera = à l'Aire AF$\mathcal{A}\beta$, C$\mathcal{C}$ étant 3. De même comme $\frac{2 \times 2}{0.8} = 5$, & $2 \times 5 = 10$, en ajoutant les Aires on aura 1.6093379124341004 = AF$\mathcal{J}\beta$, lorſque C$\mathcal{C} = 5$, & 2.302585092994045 7 = AF$\mathcal{A}\mathcal{C}$, lorſque C$\beta = 10$. Et encore puiſque $10 \times 10 = 100$, & $10 \times 100 = 1000$, & $\sqrt{5 \times 10 \times 0.98} = 7$, & $10 \times 1.1 = 11$, & $\frac{1000 \times 1.001}{7 \times 11} = 13$, & $\frac{100 \times 0.998}{2} = 499$; il eſt évident que l'Aire AF$\mathcal{A}\mathcal{C}$ peut ſe trouver par le moyen des Aires trouvées ci-devant, lorſque C$\mathcal{C} = 100$, 1000, 7 ou tout autre nombre mentionné ci-deſſus, bien entendu que AB = BF eſt toujours égale à l'unité. Tout ceci n'eſt que pour inſinuer qu'on peut de là tirer une Méthode fort commode pour conſtruire une Table de Logarithmes, qui détermineroit les Aires Hyperboliques correſpondantes aux Nombres, & cela par deux Opérations ſeulement qui ne ſeroient pas même fort difficiles ; & des Aires Hyperboliques on tireroit aiſément les Logarithmes. Comme cette façon me paroît la plus commode, je vais en donner la conſtruction, afin qu'il ne reſte rien à déſirer ſur cela.

LVII. Je prends à l'ordinaire 0 pour le Logarithme de 1, & 1 pour le Logarithme de 10, pour trouver les Logarithmes des Nombres 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 37, je diviſe les Aires Hyperboliques trouvées par 2.302585092994045 7 qui eſt l'Aire correſpondante au Nombre 10, ou ce qui eſt la même choſe, je multiplie par la Quantité réciproque 0.4342944819032518, ainſi par Exemple, 0.6931471 8, &c. Aire correſpondante au Nombre 2, multipliée par 0.43429, &c. donne 0.3010299956639812 pour le Logarithme du Nombre 2.

LVIII. On peut donc comme à l'ordinaire par l'Addition de leur Logarithmes trouver les Logarithmes de tous les Nombres produits par la multiplication de ceux-ci, & l'on remplira enſuite les places vuides au moyen de ce Theoreme.

LIX. Soit n un nombre auquel on cherche un Logarihme, x la différence de ce Nombre aux deux Nombres qui en ſont les plus près & également éloignez, & dont les Logarithmes ſont déja trouvez, & d ſoit la moitié de la différence des Logarithmes ; on aura le Logarithme cherché du Nombre n en ajoutant $d + \frac{dx}{2n} + \frac{dx^3}{12n^3}$, &c.

au

UVA. BHSC. SC 04146

au Logarithme du plus petit Nombre ; car en ſuppoſant les Nombres repreſentés par Cp , C$\mathcal{C}$ & CP , le Rectangle CBD ou C$\mathcal{C}\mathcal{S}$ = 1 , & les Ordonnées pq & PQ étant élevées ; ſi pour C$\mathcal{C}$ on écrit n , & x par $\mathcal{C}p$ ou $\mathcal{C}$P , l'Aire pqQP ou $\frac{2x}{n} + \frac{2x^3}{3n^3} + \frac{2x^5}{5n^5}$, &c. ſera à l'Aire $pq\mathcal{S}\mathcal{C}$ ou $\frac{x}{n} + \frac{x^2}{2n^2} + \frac{x^3}{3n^3}$, &c. comme la différence $2d$ des Logarithmes des Nombres extrêmes eſt à la différence des Logarithmes du moindre & du moyen Nombre, laquelle ſera par conſéquent $\frac{\frac{dx}{n} + \frac{dx^2}{2n^2} + \frac{dx^3}{3n^3}, \text{ \&c.}}{\frac{x}{n} + \frac{x^3}{3n^3} + \frac{x^5}{5n^5}, \text{ \&c.}}$, ou après la Diviſion $d + \frac{dx}{2n} + \frac{dx^3}{12n^3}$, &c.

LX. Je penſe que les deux premiers Termes $d + \frac{dx}{2n}$ de cette ſuite ſont aſſez exacts pour conſtruire une Table de Logarithmes , quand même on les voudroit de 14 ou 15 Figures , pourvû que le nombre dont on cherche le Logarithme ſurpaſſe 1000 ; le calcul même doit en être aiſé , parce que d'ordinaire x eſt égale à 1 ou 2. Mais il n'eſt pas toujours néceſſaire de recourir à cette Régle pour remplir toutes les places vuides ; car on a les Logarithmes des nombres produits par la Multiplication ou la Diviſion du dernier nombre trouvé par l'Addition ou la Souſtraction des Logarithmes déja trouvés de ces nombres. On peut encore & plus promptement remplir ces places vuides par les différences premieres , ſecondes & troiſiémes s'il eſt néceſſaire , des Logarithmes ; il ne faudra ſe ſervir de la Régle précédente que lorſqu'il ſera queſtion de continuer quelques places pleines afin d'avoir ces différences.

LXI. La même Méthode peut nous donner des Régles pour les cas où de trois nombres les Logarithmes du plus petit & du moyen ou du plus grand & du moyen ſont donnés , & où l'on cherche le Logarithme du troiſiéme, & cela quoique les nombres ne ſoient pas en Progreſſion Arithmétique.

LXII. En ſuivant cette même Méthode , un peu plus loin , elle pourra nous donner des Régles pour une conſtruction de Tables artificielles de Sinus & de Tangentes , ſans ſe ſervir des Tables naturelles ; nous en parlerons tout à l'heure.

LXIII. Juſqu'ici j'ai traité de la Quadrature des Courbes qui ſont exprimées par des Equations compoſées de Termes compliques que j'ai réduit à des Equations compoſées d'une infinité de Termes

UVA. BHSC. SC 04146

ſimples ; mais comme ces mêmes Courbes peuvent ſouvent être quarrées par des Equations finies, ou comme elles peuvent ſouvent être comparées avec d'autres Courbes dont les Aires peuvent être regardées comme connues telles que ſont les Sections Coniques ; j'ai penſé qu'il falloit mettre ici les deux Tables ſuivantes que j'ai promiſes & que j'ai conſtruites par le moyen des propoſitions 7 & 8 qui précédent.

LXIV. La premiere repréſente les Aires des Courbes quarrables ; la ſeconde contient les Courbes dont les Aires ſont comparables avec celles des Sections Coniques ; dans toutes deux les Lettres d, e, f, g & h ſont des Quantités données quelconques, x & z ſont les Abciſſes des Courbes, u & y ſont les Ordonnées paralleles, s & t les Aires comme ci-devant ; les Lettres n & θ annexées à la Quantité z, marquent le nombre des Dimenſions de cette même z, ſoit entier, rompu, négatif ou affirmatif; par Exemple, ſi $n = 3$, z^n ſera $= z^3$, z^{2n} ſera $= z^6$, $z^{-n} = z^{-3}$ ou $\frac{1}{z^3}$, $z^{n+1} = z^4$, & $z^{n-1} = z^2$.

LXV. De plus j'ai dans les Valeurs des Aires écrit pour abréger R au lieu du Radical $\sqrt{e + fz^n}$, ou $\sqrt{e + fz^n + gz^{2n}}$, & p au lieu de $\sqrt{h + iz^n}$, qui affecte la Valeur de l'Ordonnée y.

UVA. BHSC. SC 04146

Ordres des Courbes.		Valeurs de leurs Aires.
I.	$dz^{n-1} = y$	$\frac{d}{n} z^n = t.$
II.	$\frac{dz^{n-1}}{ee + 2efz^n + ffz^{2n}} = y$	$\frac{dz^n}{ne^2 + nefz^n} = t$, ou $\frac{-d}{nef + nffz^n} = t.$
III. 1	$dz^{n-1}\sqrt{e + fz^n} = y$	$\frac{2d}{3nf} R^3 = t.$
III. 2	$dz^{2n-1}\sqrt{e + fz^n} = y$	$\frac{-4e + 6fz^n}{15nff} dR^3 = t.$
III. 3	$dz^{3n-1}\sqrt{e + fz^n} = y$	$\frac{16ee - 24efz^n + 30ffz^{2n}}{105nf^3} dR^3 = t.$
III. 4	$dz^{4n-1}\sqrt{e + fz^n} = y$	$\frac{-96e^3 + 144e^2fz^n - 180ef^2z^{2n} + 210f^3z^{3n}}{945nf^4} dR^3 = t.$
IV. 1	$\frac{dz^{n-1}}{\sqrt{e + fz^n}} = y$	$\frac{2d}{nf} R = t.$
IV. 2	$\frac{dz^{2n-1}}{\sqrt{e + fz^n}} = y$	$\frac{-4e + 2fz^n}{3nff} dR = t.$
IV. 3	$\frac{dz^{3n-1}}{\sqrt{e + fz^n}} = y$	$\frac{16e^2 - 8efz^n + 6ffz^{2n}}{15nf^3} dR = t.$
IV. 4	$\frac{dz^{4n-1}}{\sqrt{e + fz^n}} = y$	$\frac{-96e^3 + 48e^2fz^n - 36ef^2z^{2n} + 30f^3z^{3n}}{105nf^4} dR = t.$

UVA. BHSC. SC 04146

Ordres des Courbes.		Valeurs des Aires.
V. 1	$2\theta ez^{\theta-1} + 2\theta fz^{\theta+n-1} + 3nf$ par $\frac{1}{2}\sqrt{e+fz^n} = y.$	$z^\theta R^3 = t.$
V. 2	$2\theta ez^{\theta-1} + 2\theta fz^{\theta+n-1} + 2\theta gz^{\theta+2n-1} + 3nf + 6ng$ par $\frac{1}{2}\sqrt{e+fz^n+gz^{2n}} = y.$	$z_\theta R^3 = t.$
VI. 1	$\frac{2\theta ez^{\theta-1} + \overline{2\theta+n} \times fz^{\theta+n-1}}{2\sqrt{e+fz^n}} = y.$	$z^\theta R = t.$
VI. 2	$\frac{2\theta ez^{\theta-1} + \overline{2\theta+n} \times fz^{\theta+n-1} + \overline{2\theta+2n} \times gz^{\theta+2n-1}}{2\sqrt{e+fz^n+gz^{2n}}} = y.$	$z^\theta R = t.$
VII. 1	$\frac{2\theta ez^{\theta-1} + \overline{2\theta-n} \times fz^{\theta+n-1}}{e+fz^n \text{ par } 2\sqrt{e+fz^n}} = y.$	$\frac{z^\theta}{R} = t.$
VII. 2	$\frac{2\theta ez^{\theta-1} + \overline{2\theta-n} \times fz^{\theta+n-1} + \overline{2\theta-2n} \times gz^{\theta+2n-1}}{e+fz^n+gz^{2n} \text{ par } 2\sqrt{e+fz^n+gz^{2n}}} = y.$	$\frac{z^\theta}{R} = t.$
VIII. 1	$\frac{2\theta ez^{\theta-1} + \overline{2\theta-2n} \times fz^{\theta+n-1}}{ee+2efz^n+ffz^{2n}} = 2y$	$\frac{z^\theta}{R^2}\left(\text{ou } \frac{z\theta}{e+fz^n}\right) = t.$
VIII. 2	$\frac{2\theta ez^{\theta-1} + \overline{2\theta-2n} \times fz^{\theta+n-1} + \overline{2\theta-4n} \times gz^{\theta+2n-1}}{e^2+2efz^n+\overline{ff+2eg} \times z^{2n}+2fgz^{3n}+ggz^{4n}} 2 = y$	$\frac{z^\theta}{R^2}\left(\text{ou } \frac{z^\theta}{e+fz^n+gz^{2n}}\right) = t.$
IX.	$2\theta ehz^{\theta-1} + \overline{2\theta+3n} \times fhz^{\theta+n-1} + \overline{2\theta+4n} \times fiz^{\theta+2n-1} + \overline{2\theta+n} \times ei$ par $\frac{\sqrt{e+fz^n}}{2\sqrt{h+iz^n}} = y.$	$z^\theta R^3 p = t.$
X.	$2\theta ehz^{\theta-1} + \overline{2\theta+3n} \times fhz^{\theta+n-1} + \overline{2\theta+2n} \times fiz^{\theta+2n-1} + \overline{2\theta-n} \times ei$ par $\frac{\sqrt{e+fz^n}}{h+iz^n \text{ par } 2\sqrt{h+iz^n}} = y.$	$\frac{z^\theta R^3}{p} = t.$

UvA. BHSC. SC 04146

LXVII. J'aurois pû ajouter ici d'autres choſes de la même eſpece ; mais je vais paſſer à des Courbes d'une autre ſorte que l'on peut comparer avec les Sections Coniques. Dans cette Table la Courbe propoſée eſt repreſentée par la Ligne QEχR, l'origine de ſon Abciſſe eſt en A, cette Abciſſe eſt AC, l'Ordonnée eſt CE, le commencement de l'Aire eſt $\alpha\chi$, & l'Aire décrite eſt $\alpha\chi$EC ; on trouvera le Terme initial ou le commencement de cette Aire, qui d'ordinaire commence à l'origine de l'Abciſſe A ou s'en éloigne à l'infini, en cherchant la longueur de l'Abciſſe Aα, la Valeur de l'Aire étant ſuppoſée $=$ o, & en élevant la perpendiculaire $\alpha\chi$.



LXVIII. De même la Ligne PDG repréſente la Section Conique, le Centre eſt A, le Sommet a, les demi-Diametres perpendiculaires ſont Aa & AP, l'origine de l'Abciſſe eſt A, ou a, ou a, l'Abciſſe eſt AB, ou aB, ou aB, l'Ordonnée BD, la Tangente eſt DT & rencontre AB en T, la Soutendente eſt aD, le Rectangle inſcrit ou *adſcrit* eſt ABDO.



LXIX. Prenant donc les mêmes Lettres que ci-devant l'on aura AC $= z$, CE $= y$, $\alpha\chi$EC $= t$, AB ou aB $= x$, BD $= u$ & ABDP ou aGDB $= s$; & de plus lorſqu'il faudra deux Sections Coniques pour déterminer une Aire, l'Aire de cette ſeconde Section Conique ſera repreſentée par σ, l'Abciſſe par ξ, & l'Ordonnée par Y. P eſt au lieu de $\sqrt{ff - 4eg}$.

UVA. BHSC. SC 04146

Formes des Courbes.	Sections Coniques. Abciſſes.	Ordonnées.	Valeurs des Aires.
I. 1 $\frac{dz^{n-1}}{e+fz^n}=y$	$z^n=x$	$\frac{d}{e+fx}=u$	$\frac{1}{n}s=t=\frac{aGDB}{n}$ *Fig. 1.*
I. 2 $\frac{dz^{2n-1}}{e+fz^n}=y$	$z^n=x$	$\frac{d}{e+fx}=u$	$\frac{d}{nf}z^n-\frac{e}{nf}s=t.$
I. 3 $\frac{dz^{3n-1}}{e+fz^n}=y$	$z^n=x$	$\frac{d}{e+fx}=u$	$\frac{d}{2nf}z^{2n}-\frac{de}{nf^2}z^n+\frac{e^2}{nf^2}s=t.$
II. 1 $\frac{dz^{\frac{1}{2}n-1}}{e+fz^n}=y$	$\sqrt{\frac{d}{e+fz^n}}=x$	$\sqrt{\frac{d}{f}-\frac{e}{f}x^2}=u$	$\frac{2xu\div 4s}{n}=t=\frac{4}{n}$ADGa. *Fig. 3, 4.*
II. 2 $\frac{dz^{\frac{3}{2}n-1}}{e+fz^n}=y$	$\sqrt{\frac{d}{e+fz^n}}=x$	$\sqrt{\frac{d}{f}-\frac{e}{f}x^2}=u$	$\frac{2d}{nf}z^{\frac{1}{2}n}+\frac{4es-2exu}{nf}=t.$
II. 3 $\frac{dz^{\frac{5}{2}n-1}}{e+fz^n}=y$	$\sqrt{\frac{d}{e+fz^n}}=x$	$\sqrt{\frac{d}{f}-\frac{e}{f}x^2}=u$	$\frac{2d}{3}z^{\frac{3}{2}n}-\frac{2de}{nf^2}z^{\frac{1}{2}n}+\frac{2e^2xu-4e^2s}{nf}=t.$
III. 1 $\frac{d}{z}\sqrt{e+fz^n}=y$	$\frac{1}{z^n}=x^2$	$\sqrt{f+ex^2}=u$	$\frac{4de}{nf}\times\frac{u^3}{2ex}-s=t=\frac{4de}{nf}$ par aGDT, ou par APDB$\div$TDB. (*Fig. 2, 3, 4.*
III. 1 ou ainſi	$\frac{1}{z^n}=x$	$\sqrt{fx+ex^2}=u$	$\frac{8de^2}{nf^2}\times s-\frac{1}{2}xu-\frac{fu}{4e}+\frac{f^2u}{4e^2x}=t=\frac{8de^2}{nf^2}$ par aGDA$+\frac{f^2u}{4e^2x}$ (*Fig. 3, 4.*
III. 2 $\frac{d}{z^{n+1}}\sqrt{e+fz^n}=y$	$\frac{1}{z^n}=x^2$	$\sqrt{f+ex^2}=u$	$\frac{-2d}{n}s=t=\frac{2d}{n}$ APDB ou $\frac{2d}{n}$ aGDB. *Fig. 2, 3, 4.*
III. 2 ou ainſi	$\frac{1}{z^n}=x$	$\sqrt{fx+ex^2}=u$	$\frac{4de}{nf}\times s-\frac{1}{2}xu-\frac{fu}{2e}=t=\frac{4de}{nf}\times$ aGDK. *Fig. 3, 4.*
III. 3 $\frac{d}{z^{2n+1}}\sqrt{e+fz^n}=y$	$\frac{1}{z^n}=x$	$\sqrt{fx+ex^2}=u$	$\frac{-d}{n}s=t=\frac{d}{n}\times-$ aGDB ou BDPK. *Fig. 4.*
III. 4 $\frac{d}{z^{3n+1}}\sqrt{e+fz^n}=y$	$\frac{1}{z^n}=x$	$\sqrt{fx+ex^2}=u$	$\frac{3dfs-2du^3}{6ne}=t.$

UVA. BHSC. SC 04146

Formes des Courbes.	Sections Coniques. Abciſſes.	Ordonnées.	Valeurs des Aires.
IV. 1 $\frac{d}{z\sqrt{e+fz^n}}=y$	$\frac{1}{z^n}=x^2$	$\sqrt{f+ex^2}=u$	$\frac{4d}{nf}\times\overline{\frac{1}{2}xu\div s}=t=\frac{4d}{nf}$ par PAD ou par aGDA. *Fig.* 2, 3, 4.
ou ainſi	$\frac{1}{z^n}=x$	$\sqrt{fx+ex^2}=u$	$\frac{8de}{nf^2}\times s-\overline{\frac{1}{2}xu-\frac{fu}{4e}}=t=\frac{8de}{nf^2}$ par aGDA. *Fig.* 3, 4.
2 $\frac{d}{z^{n+1}\sqrt{e+fz^n}}=y$	$\frac{1}{z^n}=x^2$	$\sqrt{f+ex^2}=u$	$\frac{2d}{ne}\times\overline{s-xu}=t=\frac{2d}{ne}$ par POD ou par AODGa. *Fig.* 2, 3, 4.
ou ainſi	$\frac{1}{z^n}=x$	$\sqrt{fx+ex^2}=u$	$\frac{4d}{nf}\times\overline{\frac{1}{2}xu\div s}=t=\frac{4d}{nf}$ par aDG*a*. *Fig.* 3, 4.
3 $\frac{d}{z^{2n}\sqrt{e+fz^n}}=y$	$\frac{1}{z^n}=x$	$\sqrt{fx+ex^2}=u$	$\frac{d}{ne}\times\overline{3s\div 2xu}=t=\frac{d}{ne}$ par 3aDGa÷△aDB. *Fig.* 3, 4
4 $\frac{d}{z^{3n}\sqrt{e+fz^n}}=y$	$\frac{1}{z^n}=x$	$\sqrt{fx+ex^2}=u$	$\frac{10dfxu-15dfs-2dex^2u}{6ne}=t.$
V. 1 $\frac{dz^{n-1}}{e+fz^n+gz^{2n}}=y$	$\sqrt{\frac{d}{e+fz^n+gz^{2n}}}=x$	$\sqrt{\frac{d}{g}+\frac{f^2-4eg}{4g^2}x^2}=u$	$\frac{xu-2s}{n}=t.$
ouainſi	$\sqrt{\frac{dz^n}{e+fz^n+gz^{2n}}}=x$	$\sqrt{\frac{d}{e}+\frac{f^2-4eg}{4e^2}x^2}=u$	$\frac{2s-xu}{n}=t.$
2 $\frac{dz^{2n-1}}{e+fz^n+gz^{2n}}=y$	$\left\{\begin{array}{l}\sqrt{\frac{d}{e+fz^n+gz^{2n}}}=x\\ fz^n+gz^{2n}=\xi\end{array}\right.$	$\left\{\begin{array}{l}\sqrt{\frac{d}{g}+\frac{f^2-4eg}{4g^2}x^2}=u\\ \frac{1}{e+\xi}=\Upsilon\end{array}\right.$	$\frac{d\sigma+2fs-fxu}{2ng}=t.$
VI. 1 $\frac{dz^{\frac{1}{2}n-1}}{e+fz^n+gz^{2n}}=y$	$\left\{\begin{array}{l}\sqrt{\frac{2dg}{f-p+2gz^n}}=x\\ \sqrt{\frac{2dg}{f+p+2gz^n}}=\xi\end{array}\right.$	$\left\{\begin{array}{l}\sqrt{d+\frac{-f+p}{2g}x^2}=u\\ \sqrt{d+\frac{-f-p}{2g}\xi^2}=\Upsilon\end{array}\right.$	$\frac{2xu-4s-2\xi\Upsilon+4\sigma}{np}=t.$
2 $\frac{dz^{\frac{1}{2}n-1}}{e+fz^n+gz^{2n}}=y$	$\left\{\begin{array}{l}\sqrt{\frac{2dez^n}{fz^n-pz^n+2e}}=x\\ \sqrt{\frac{2dez^n}{fz^n+pz^n+2e}}=\xi\end{array}\right.$	$\left\{\begin{array}{l}\sqrt{d+\frac{-f+p}{2e}x^2}=u\\ \sqrt{d+\frac{-f-p}{2e}\xi^2}=\Upsilon\end{array}\right.$	$\frac{4s-2xu-4\sigma+2\xi\Upsilon}{np}=t.$

UVA. BHSC. SC 04146

Formes des Courbes.	Sections Coniques. Abciſſes.	Ordonnées.	Valeurs des Aires.
VII. 1 $\frac{d}{z}\sqrt{e+fz^n+gz^{2n}}=y$	$\left\{\begin{matrix} z^n=x \\ z^n=\xi \end{matrix}\right.$	$\left\{\begin{matrix} \sqrt{e+fx+gx^2}=u \\ \sqrt{g+f\xi+e\xi^2}=\Upsilon \end{matrix}\right.$	$\frac{4de^2\xi\Upsilon+2def\Upsilon-2dfgxu-2ffd+4deg_u-8de^2\sigma+4dfgs}{4neg-nff}=t.$
2 $dz^{n-1}\sqrt{e+fz^n+gz^{2n}}=y$	$z^n=x$	$\sqrt{e+fx+gx^2}=u$	$\frac{d}{n}s=t=\frac{d}{n}\times\alpha GDB.$ Fig. 2, 3, 4.
3 $dz^{2n-1}\sqrt{e+fz^n+gz^{2n}}=y$	$z^n=x$	$\sqrt{e+fx+gx^2}=u$	$\frac{d}{3ng}u^3-\frac{df}{2ng}s=t.$
4 $\frac{1}{2}z^{3n-1}\sqrt{e+fz^n+gz^{2n}}=y$	$z^n=x$	$\sqrt{e+fx+gx^2}=u$	$\frac{6dgx-5df}{24ng^2}u^3+\frac{5df^2-4deg}{16ng^2}s=t.$
1 $\frac{dz^{n-1}}{\sqrt{e+fz^n+gz^{2n}}}=y$	$z^n=x$	$\sqrt{e+fx+gx^2}=u$	$\frac{8dgs-4dgxu-2dfu}{4neg-nf^2}=t=\frac{8dg}{4neg-nf^2}\times\alpha GDB=\triangle DBA.$ (Fig. 2, 4.
2 $\frac{dz^{2n-1}}{\sqrt{e+fz^n+gz^{2n}}}=y$	$z^n=x$	$\sqrt{e+fx+gx^2}=u$	$\frac{-4dfs+2dfxu+4deu}{4neg-nf^2}=t.$
VIII. 3 $\frac{dz^{3n-1}}{\sqrt{e+fz^n+gz^{2n}}}=y$	$z^n=x$	$\sqrt{e+fx+gx^2}=u$	$\frac{3dff-2dff}{-4deg^s+4deg}xu-2defu=t.$
4 $\frac{dz^{4n-1}}{\sqrt{e+fz^n+gz^{2n}}}=y$	$z^n=x$	$\sqrt{e+fx+gx^2}=u$	$\frac{36defg+8legg\,x^2u+10dfff\,xu+10deff}{-15df^3s-2df^2g-28defg\,xu-16de^2gu}=t.$
IX. 1 $\frac{dz^{n-1}\sqrt{e+fz^n}}{g+hz^n}=y.$	$\sqrt{\frac{d}{g+hz^n}}=x$	$\sqrt{\frac{df}{h}+\frac{eh-fg}{h}x^2}=u$	$\frac{4fg-2fg}{-4eh^s+2eh}xu+2df^u_x=t.$
2 $\frac{dz^{2n-1}\sqrt{e+fz^n}}{g+hz^n}=y$	$\sqrt{\frac{d}{g+hz^n}}=x$	$\sqrt{\frac{df}{h}+\frac{eh-fg}{h}x^2}=u$	$\frac{4egh-2egh}{-4fgg^s+2fgg}xu+\frac{2}{3}dh\frac{u^3}{x^3}-2dfg\frac{v}{x}=t.$

UVA. BHSC. SC 04146

Formes des Courbes.		Sections Coniques. Abciſſes.	Ordonnées.	Valeurs des Aires.
X.	1 $\frac{dz^{n-1}}{\sqrt{g+hz^n}\sqrt{e+fz^n}}=y$	$\sqrt{\frac{d}{g+hz^n}}=x$	$\sqrt{\frac{af}{h}+\frac{eh-fg}{h}x^2}=u$	$\frac{2xu-4s}{nf}=t=\frac{4}{nf}$ADGa. *Fig. 3, 4.*
	2 $\frac{dz^{2n-1}}{\sqrt{g+hz^n}\sqrt{e+fz^n}}=y$	$\sqrt{\frac{d}{g+hz^n}}=x$	$\sqrt{\frac{df}{h}+\frac{eh-fg}{h}x^2}=u$	$\frac{4gs-2gxu+2d\frac{u}{x}}{nfh}=t.$
XI.	1 $dz^{-1}\sqrt{\frac{e+fz^n}{g+hz^n}}=y$	$\sqrt{g+hz^n}=x$, $\sqrt{h+gz^{-n}}=\xi$	$\sqrt{\frac{eh-fg}{h}+\frac{f}{h}x^2}=u$, $\sqrt{\frac{fg-eh}{g}+\frac{e}{g}\xi^2}=r$	$\frac{2dxu^3z^{-n}-4dfs-4de\sigma}{nfg-neh}=t.$
	2 $dz^{n-1}\sqrt{\frac{e+fz^n}{g+hz^n}}=y$	$\sqrt{g+nz^n}=x$	$\sqrt{\frac{eh-fg}{h}+\frac{f}{h}x^2}=u$	$\frac{2d}{nh}s=t.$
	3 $dz^{2n-1}\frac{e+fz^n}{g+hz^n}=y.$	$\sqrt{g+hz^n}=x$	$\sqrt{\frac{eh-fg}{h}+\frac{f}{h}x^2}=u$	$\frac{dhxu^3-3dfgs-deh}{2nfh^2}=t.$

UVA. BHSC. SC 04146

LXXI. Avant que d'éclaircir par des Exemples ces Theoremes ſur ces Claſſes de Courbes, je penſe qu'il convient d'obſerver,

LXXII. 1. Que comme j'ai ſuppoſé dans les Equations à ces Courbes que tous les Signes des Quantités d, e, f, g, h & i ſont affirmatifs, il faut toutes les fois qu'ils ſeront négatifs les changer dans les valeurs ſubſequentes de l'Abciſſe & de l'Ordonnée de la Section Conique, & auſſi dans la valeur de l'Aire cherchée.

LXXIII. 2. De même lorſque les Symboles numériques n & θ ſe trouvent négatifs, il faut les changer dans les valeurs des Aires. Il arrive même que par le changement de ces Signes les Theoremes peuvent prendre une nouvelle forme. Par Exemple, dans la quatriéme forme de la Table 2 ſi l'on change le Signe de n, le troiſiéme Theoreme devient $\frac{d}{z^{-2n}\sqrt[-1]{e+fz^{-n}}} = y$, $\sqrt[-n]{z^{-1}} = x$, c'eſt-à-dire $\frac{dz^{3n-1}}{\sqrt{ez^{2n}+fz^n}} = y$, $z^n = x$, $\sqrt{fx+ex^2} = u$, $\frac{d}{ne}(2xu - 3s) = t$. Il en eſt de même des autres.

LXXIV. 3. La ſuite de chaque ordre, à l'exception du ſecond de la premiere Table, peut de chaque côté être continuée à l'infini; car dans les ſuites du troiſiéme & du quatriéme Ordre de la premiere Table, les Coëfficients numériques 2, —4, 16, —96, 768, &c. des Termes initiaux, ſont formés par la multiplication continuelle des Nombres — 2, — 4, — 6, — 8, — 10, &c. par eux-mêmes; & les Coëfficients des Termes ſuivants ſe tirent des initiaux du troiſiéme Ordre en multipliant par $-\frac{1}{2}$, $-\frac{3}{4}$, $-\frac{5}{6}$, $-\frac{7}{8}$, $-\frac{9}{10}$, &c. Mais les Coëfficients 1, 3, 15, 105, &c. des Dénominateurs ſe trouveront en multipliant continuellement par eux-mêmes les Nombres 1, 3, 5, 7, 9, &c.

LXXV. Mais dans la ſeconde Table les ſuites du 1r, 2e, 3e, 4e, 9e & 10e Ordre s'étendent à l'infini par la ſeule Diviſion. Ainſi en pouſſant la Diviſion juſqu'où il convient ſur $\frac{dz^{4n-1}}{e+fz^n} = y$, du premier Ordre, vous aurez $\frac{d}{f}z^{3n-1} - \frac{de}{ff}z^{2n-1} + \frac{de^2}{f^3}z^{n-1} - \frac{de^3}{f^3}\frac{z^{n-1}}{e+fz^n} = y$; les trois premiers Termes appartiennent au premier Ordre de la Table 1, & le quatriéme Terme appartient à la premiere forme de cet Ordre; d'où l'on voit que l'Aire eſt $\frac{d}{3nf}z^{3n} - \frac{de}{2nff}z^{2n} + \frac{de^2}{f^3}z^n -$

UVA. BHSC. SC 04146

$\frac{e^3}{zf^3}s$, en mettant s pour l'Aire de la Section Conique dont l'Abciſſe eſt $x = z^n$, & l'Ordonnée $u = \frac{d}{e+fx}$

LXXVI. Les ſuites du 5e & du 6e Ordre peuvent ſe continuer à l'infini, au moyen des deux Theoremes du 5e Ordre de la premiere Table, & cela par une Addition ou Souſtraction convenable ; on peut de même continuer les 7e & 8e ſuites au moyen des Theoremes du 6e Ordre de la Table 1, & la ſuite du 11e par les Theoremes du 10e Ordre de la Table 1. Par Exemple, ſi vous vouliez continuer la ſuite du 3e Ordre de la Table 2, ſuppoſez $\theta = -4n$ le 1r Theoreme du 5e Ordre de la Table 1 deviendra $(-8nez^{-4n-1} - 5nfz^{-3n-1})(\frac{1}{2}\sqrt{e+fz^n} = y ; \frac{R^3}{z^{4n}} = t$. Mais ſuivant le 4e Theoreme de cette ſuite qu'il faut continuer, écrivez $-\frac{5nf}{2}$ au lieu de d, & vous aurez $-\frac{5n}{2}fz^{-3n-1}\sqrt{e+fz^n} = y$, $\frac{1}{z^n} = x$, $\sqrt{fx+exx} = u$, & $\frac{10fu^3-15f^2s}{12e} = t$. Otez-en les premieres Valeurs de y & de t, il vous reſtera $4nez^{-4n-1}\sqrt{e+fz^n} = y$, $\frac{10fu^3-15ffs}{12e} - \frac{R^3}{z^{4n}} = t$; multipliés par $\frac{d}{4ne}$ & écrivez ſi vous voulez xu^3 au lieu de $\frac{R^3}{z^{4n}}$ & vous aurez pour la ſuite à continuer un 5e Theoreme $\frac{d}{z^{4n}+1}\sqrt{e+fz^n} = y$, $\frac{1}{z^n} = x$, $\sqrt{fx+exx} = u$, & $\frac{10dfu^3-15df^2s}{48ne^2} - \frac{dxu^3}{4ne} = t$.

LXXVII. 4. On peut auſſi tirer autrement quelqu'uns de ces Ordres des autres Ordres ; comme dans la ſeconde Table le 5e, 6e, 7e, & 11e du huitiéme, & le 9e du 10e ; de ſorte qu'abſolument j'aurois pû les paſſer, mais ils ne laiſſent pas d'être de quelqu'uſage quoiqu'ils ne ſoient pas d'une neceſſité indiſpenſable ; j'ai cependant paſſé quelques Ordres que j'aurois pû tirer du premier & du ſecond comme auſſi du 9e & du 10e, parce qu'ils étoient affectés de Dénominateur plus compliqués, & que par conſéquent ils ne pouroient être de preſque aucun uſage.

LXXVIII. 5. Si l'Equation qui repréſente une Courbe quelconque eſt compoſée de pluſieurs Equations de différens Ordres, ou d'une eſpece differente quoique du même Ordre, ſon Aire pourra être compoſée des Aires correſpondantes en prenant garde de les joindre par des Signes convenables ; car il ne faut pas toujours join-

UVA. BHSC. SC 04146

dre par l'Addition ou la Souſtraction les Ordonnées aux Ordonnées, ou les Aires correſpondantes aux Aires correſpondantes; mais quelquefois la ſomme de celle-ci & la différence de celle-là doivent être priſes pour une nouvelle Ordonnée ou pour faire une Aire correſpondante; cela doit ſe pratiquer lorſque les Aires conſtituantes ſont ſituées du côté oppoſé à l'Ordonnée. Mais pour lever ce ſcrupule & pour éviter plus aiſément cet inconvénient, j'ai donné aux différentes Valeurs des Aires les Signes qui leur conviennent & qui quelquefois ſont négatifs, comme on le voit dans le 5e & 7e Ordre de la Table 2.

LXXIX. 6. Il faut de plus obſerver ſur les Signes des Aires que $+ s$ indique ou qu'il faut ajouter à d'autres Quantités dans la Valeur de t l'Aire de la Section Conique adjacente à l'Abciſſe, (*Voyez le premier Exemple ſuivant.*) ou bien que l'Aire de l'autre côté de l'Ordonnée doit en être ſouſtraite, & au contraire $- s$ indique ambiguement ou que l'Aire adjacente à l'Abciſſe doit être ſouſtraite, ou bien que l'Aire de l'autre côté de l'Ordonnée doit être ajoutée comme il conviendra. Et ſi la Valeur de t ſe trouve affirmative, elle repréſente l'Aire de la Courbe adjacente à l'Abciſſe, & ſi au contraire elle eſt négative elle repréſente l'Aire de l'autre côté de l'Ordonnée.

LXXX. 7. Mais pour déterminer plus certainement cette Aire nous pouvons rechercher ſes limites; il n'y a aucune incertitude dans les limites à l'Abciſſe, à l'Ordonnée & au Perimetre de la Courbe; mais ſa limite initiale ou l'origine de ſa Deſcription peut avoir differentes poſitions; dans les Exemples ſuivants elle eſt ou au commencement de l'Abciſſe, ou à une diſtance infinie, ou au concours de la Courbe avec ſon Abciſſe. Mais on peut la placer ailleurs, & quelque part qu'elle ſoit on peut toujours la trouver en cherchant la longueur de l'Abciſſe au Point où la valeur de t devient $= 0$, & en y élevant une Ordonnée, car elle ſera la limite cherchée.

LXXXI. 8. Si une partie quelconque de l'Aire eſt ſituée au-deſſous de l'Abciſſe, t marquera la différence de cette Aire, & de la partie ſituée au-deſſus de l'Abciſſe.

LXXXII. 9. Toutes les fois que dans les Valeurs de x, u & t, les Dimenſions des Termes montent trop haut ou deſcendent trop bas, on peut les réduire à un juſte degré d'élevation en les diviſant ou les multipliant par une Quantité donnée quelconque, que l'on peut ſuppoſer ſervir d'unité, & cela autant de fois que ces Dimenſions ſeront trop hautes ou trop baſſes.

UVA. BHSC. SC 04146

LXXXIII. 10. Outre les Tables précédentes on peut encore en conſtruire d'autres pour les Courbes qu'on peut rapporter à d'autres Courbes les plus ſimples de leur eſpece, comme à $\sqrt{a+fx^3}=u$, ou bien à $x\sqrt{e+fx^3}=u$, ou bien à $\sqrt{e+fx^4}=u$, &c. enſorte qu'on puiſſe toujours tirer l'Aire d'une Courbe propoſée quelconque de la Courbe la plus ſimple, & ſçavoir à quelles Courbes on peut la rapporter. Mais je viens aux Exemples pour celles qui précédent.

LXXXIV. Exemple 1. Soit QER une Courbe Conchoïdale de telle eſpece que le demi-Cercle QHA étant décrit, AC élevée perpendiculairement au Diametre AQ, le Parallelogramme QACI achevé, la Diagonale AI tirée qui rencontre le demi-Cercle en H & la perpendiculaire HE abaiſſée au Point H ſur la Ligne IC; le Point E décrive une Courbe dont on demande l'Aire ACEQ.



LXXXV. Faites $AQ=a$, $AC=z$, $CE=y$; à cauſe des proportionelles continuës AI, AQ, AH, EC, vous aurez EC ou $y=\frac{a^3}{a^2+z^2}$.

LXXXVI. Pour que cette Equation puiſſe prendre la forme des Equations des Tables faites $n=2$, pour z^2 au Dénominateur écrivez z^n, & $a^3z^{\frac{1}{2}n-1}$ pour a^3 ou a^3z^{1-1} au Numerateur, & vous aurez $y=\frac{a^3z^{\frac{1}{2}n-1}}{a^2+z^n}$, Equation à la premiere forme du ſecond Ordre de la Table 2, en comparant les Termes vous aurez $d=a^3$, $e=a^2$, & $f=1$, de ſorte que $\sqrt{\frac{a^3}{a^2+z^2}}=x$, $\sqrt{a^3-a^2x^2}=u$, & $xu-2s=t$.

LXXXVII. Maintenant pour réduire les Valeurs trouvées de x & u à un nombre juſte de Dimenſions, prenez une Quantité donnée quelconque comme a, par laquelle comme par l'unité, vous multiplierez a^3 une fois dans la Valeur de x, & vous diviſerez a^3 une fois dans la Valeur de u, & deux fois a^2x^2 dans cette même Valeur; vous aurez par ce moyen $\sqrt{\frac{a^4}{a^2+z^2}}=x$, $\sqrt{a^2-x^2}=u$, & $xu-2s=t$, dont voici la conſtruction.

UVA. BHSC. SC 04146

LXXXVIII. Du Centre A & du Raïon AQ décrivez le quart de Circonférence QDP ; ſur AC prenez AB = AH, élevez la perpendiculaire BD qui rencontre cet Arc en D & tirez AD ; le double du Secteur ADP ſera égal à l'Aire cherchée ACEQ ; car $\sqrt{\frac{a^4}{a^2+z^2}} = \sqrt{AQ \times EC} = HA = AB = x$, & $\sqrt{a^2 - x^2} = \sqrt{ADq - ABq} = BD$ ou u, & $xu - 2s =$ le double du Triangle ADB — 2ABDQ, ou bien = le double du Triangle ADB + 2BDP, c'eſt-à-dire, ou = — 2QAD ou = 2DAP, cette Valeur affirmative 2DAP appartient à l'Aire ACEQ du côté de EC, & la négative — 2QAD appartient à l'Aire RECR étenduë à l'infini au-delà de EC.

LXXXIX. On peut quelquefois rendre plus élégantes ces Solutions de Problêmes ; dans ce cas-ci par exemple tirez RH demi-Diametre du Cercle QHA ; à cauſe des Arcs égaux QH & DP, le Secteur QRH eſt la moitié du Secteur DAP, & par conſéquent le quart de la Surface ACEQ.

XC. Exemple 2. Soit une Courbe AGE décrite par le Point Angulaire E de la Régle en Equerre AEF, dont l'une des jambes AE eſt indéfinie & paſſe continuellement par le Point donné A, tandis que l'autre jambe EF d'une longueur donnée gliſſe ſur la droite AF donnée de poſition. Sur AF laiſſez tomber la perpendiculaire EH, achevez le Parallelogramme AHEC, & nommez AC = z, CE = y, EF = a, à cauſe des proportionelles continuës HF, HE, HA, vous aurez HA ou $y = \frac{z^2}{\sqrt{a^2 - z^2}}$.



XIC. Maintenant pour connoître l'Aire AGEC ſuppoſez $z^2 = z^n$, ou $2 = n$, cela vous donnera $\frac{z^{\frac{1}{2}n-1}}{\sqrt{a^2 - z^n}} = y$; comme z eſt dans le Numerateur élevé à une Dimenſion rompuë, abaiſſez la Valeur de y en diviſant par $z^{\frac{1}{2}n}$, & vous aurez $\frac{z^{\frac{n}{2}-1}}{\sqrt{a^2 z^{-n} - 1}} = y$, Equation de la ſeconde forme du 7e Ordre de la Table 2. Comparant les Termes $d = 1$, $e = -1$, & $f = a^2$; ainſi $z^2 = \frac{1}{z^{-n}} = x^2$, $\sqrt{a^2 - x^2} = u$, & $s - xu = t$; puis donc que x & z ſont égales & que $\sqrt{a^2 - x^2}$

UVA. BHSC. SC 04146

$= u$, eſt une Equation au Cercle dont le Diametre eſt a ; du Centre A & de l'intervale a ou EF, décrivez le Cercle PDQ que CE rencontre en D, achevez le Parallelogramme ACDI & vous aurez $AC = z$, $CD = u$ & l'Aire cherchée $AGEC = s - xu = ACDP - ACDI = IDP$.

XIIC. Exemple 3. Soit AGE la Ciſſoïde appartenant au Cercle ADQ décrit du Diametre AQ, ſoit tirée DCE perpendiculaire au Diametre & rencontrant les Courbes en D & E ; faites $AC = z$, $CE = y$ & $AQ = a$; à cauſe des proportionelles continuës CD, CA, CE, vous aurez CE ou $y = \frac{zz}{\sqrt{az - zz}}$ ou en diviſant par z, $y = \frac{z}{\sqrt{az^{-1} - 1}}$. Ainſi $z - 1 = z^n$ ou $-1 = n$ & $y = \frac{z^{-2n-1}}{\sqrt{az^n - 1}}$ Equation de la 3e forme du 4e Ordre de la Table 2 ; comparant les Termes $d = 1$; $e = -1$, & $f = a$, ainſi $z = \frac{1}{z^n} = x$, $\sqrt{ax - xx} = u$ & $3s - 2xu = t$; c'eſt pourquoi $AC = x$, $CD = u$ & $ACDH = s$; de ſorte que $3ACDH$ — quatre fois le Triangle $ADC = 3s - 2xu = t =$ à l'Aire de la Ciſſoïde ACEGA ; ou ce qui eſt la même choſe trois Segments ADHA = l'Aire ADEGA ou quatre Segments ADHA = l'Aire AHDEGA.



UVA. BHSC. SC 04146

XCXIII. Exemple 4. Soit PE la premiere Conchoïde des Anciens, décrite du Centre G de l'Aſymptote AL & de l'intervale LE ; tirez ſon Axe GAP & abaiſſez l'Ordonnée EC ; faites AC $= z$, CE $= y$, GA $= b$, & AP $= c$; la proportion AC : CE — AL :: GC : CE donne CE ou $y = \frac{b + z}{z}\sqrt{c^2 - z^2}$.



XCXIV. Maintenant pour trouver l'Aire PEC, il faut conſidérer ſéparément les parties de l'Ordonnée CE ; en diviſant cette Ordonnée CE en D de telle façon que CD $= \sqrt{e^2 - z^2}$, & DE $= \frac{b}{z}\sqrt{e^2 - z^2}$, CD ſera l'Ordonnée d'un Cercle décrit du Centre A & du Raïon AP ; la partie PCD de l'Aire eſt donc connuë, & il ne reſte à trouver que l'autre partie DPED ; puis donc que DE partie de l'Ordonnée par laquelle cette Aire eſt décrite $= \frac{b}{z}\sqrt{e^2 - z^2}$ faites $z = n$, vous aurez $\frac{b}{z}\sqrt{e^2 - z^n} =$ DE, Equation à la premiere forme du 3e Ordre de la Table 2 ; comparant les Termes, d, eſt $= b$, $e = c^2$ & $f = -1$, d'où $\frac{1}{z} = \sqrt{\frac{1}{z^n}} = x$, $\sqrt{-1 + c^2x^2} = u$ & $2bc^2s - \frac{bu^3}{x} = t$.

XCXV. Réduiſez les Termes à un nombre juſte de Dimenſions en multipliant ceux qui ſont trop bas & diviſant ceux qui ſont trop haut par quelque Quantité donnée, ſi vous le faites par c vous aurez $\frac{c^2}{z} = x$, $\sqrt{-c^2 + x^2} = u$ & $\frac{2bs}{c} - \frac{bu^3}{cx} = t$, ce qui ſe conſtruit ainſi,

XCXVI. Du Centre A, du principal ſommet P & du Parametre 2AP décrivez l'Hyperbole PK ; puis du Point C tirez la droite CK qui touche l'Hyperbole en K ; vous aurez AP : 2AG :: l'Aire CKPC : l'Aire cherchée DPED.

XCXVII. Exemple 5. La Régle en Equerre GFE tourne autour du Pôle G, de ſorte que ſon Point Angulaire F gliſſe continuellement ſur la droite AF donnée de poſition ; dans ce Mouvement un Point quelconque E de l'autre jambe EF décrit une Courbe

UVA. BHSC. SC 04146

be PE ; on demande l'Aire de cette Courbe ; pour la trouver sur la droite AF abaissez les perpendiculaires GA & EH , achevez le Parallelogramme AHEC & nommez AC , z ; CE, y ; AG, b ; & EF , c ; les proportionelles HF : EH : : AG : AF vous donnent AF $= \frac{bz}{\sqrt{cc-zz}}$: Donc CE ou $y = \frac{bz}{\sqrt{c^2-z^2}} - \sqrt{c^2-z^2}$; mais comme $\sqrt{cc-zz}$ est l'Ordonnée d'un Cercle dont le Raïon est c , décrivez du Centre A un tel Cercle PDQ rencontré en D par la Ligne prolongée CE & vous aurez DE $= \frac{bz}{\sqrt{c^2-z^2}}$, Equation par le moyen de laquelle vous devez déterminer l'Aire PDEP ou DERQ ; supposez donc $n = 2$ & $\theta = b$, vous aurez DE $= \frac{bz^{n-1}}{\sqrt{cc-z^n}}$ Equation de la premiere forme du 4e Ordre de la Table 1 ; comparant les Termes vous trouverez $b = d$, $cc = e$, & $-1 = f$; de sorte que $-b\sqrt{cc-zz} = -bR = t$.



XCXVIII. Comme la Valeur de t est négative , & que par conséquent l'Aire representée par t est au-delà de la Ligne DE , il faut pour trouver sa limite initiale chercher la longueur de z au Point ou $t = 0$, on trouve que cette longueur $= c$; prolongez donc AC en Q de sorte que AQ $= c$, & élevez l'Ordonnée QR ; DQRED sera l'Aire dont la Valeur trouvée est $-b\sqrt{cc-zz}$.

XCXIX. Si vous voulez connoître l'Aire PDE située sur l'Abciſſe AC & qui s'étend conjointement avec elle, mais sans connoître la limite , voici comment vous pourrez la déterminer.

C. Otez la Valeur de t au commencement de l'Abciſſe de sa Valeur quand il regne sur l'Abciſſe , c'est-à-dire , ôtez $-bc$ de $-b\sqrt{cc-zz}$, & vous aurez la Quantité cherchée $bc - b\sqrt{cc-zz}$; faisant donc le Parallelogramme PAGK & sur AP abaissant la perpendiculaire DM qui rencontre GK en M ; le Parallelogramme PKLM sera égal à l'Aire PDE.

UVA. BHSC. SC 04146

CI. Mais lorſque l'Equation qui détermine la nature de la Courbe ne ſe peut pas trouver dans les Tables, & ne peut ſe réduire à des Termes plus ſimples par la Diviſion n'y par aucun autre moyen, il faudra la transformer en d'autres Equations de Courbes qui y ayent raport de la façon qu'on a vû dans le Prob. 8. juſqu'à ce qu'enfin l'on en trouve une dont l'Aire puiſſe être connuë par les Tables; & lorſqu'après tous ces Eſſais l'on ne peut en trouver une telle, on peut conclure certainement que la Courbe propoſée ne peut ſe comparer ni avec des Figures Rectilignes, ni avec les Sections Coniques.

CII. Lorſqu'il s'agira de Courbes Mécaniques il faudra les tranſformer d'abord en Courbes Geometriques égales comme dans le Prob. 8. & alors vous pourrez trouver par les Tables les Aires de ces Courbes Géometriques. En voici un Exemple.

CIII. EXEMPLE 6. Soit propoſé de déterminer l'Aire de la Courbe des Arcs d'une Section Conique quelconque, en ſuppoſant ces Arcs Ordonnés à leur Sinus droits. Soit pour mieux s'expliquer A le Centre de la Section Conique; AQ & AR les demi-Axes, CD l'Ordonnée à l'Axe AR, PD une perpendiculaire au Point D de la Section Conique; ſoit AE la Courbe Mécanique cherchée rencontrant CD en E; par la nature de la Courbe CE ſera égale à l'Arc QD; & c'eſt l'Aire AEC que l'on cherche, ou bien ayant achevé le Parallelogramme ACEF c'eſt l'excès AEF que l'on demande. Pour cela ſoit *a* le Parametre de la Section Conique *b*, ſon *Latus tranſverſum* = 2AQ, ſoit AC = *z*, & CD = *y*, vous aurez



UVA. BHSC. SC 04146

$\sqrt{\frac{1}{4}bb + \frac{b}{a}zz} = y$, Equation à la Section Conique ; auſſi PC $= \frac{b}{a}z$, d'où PD $= \sqrt{\frac{1}{4}bb + \frac{bb+ab}{aa}zz}$.

CIV. Mais la Fluxion de l'Arc QD eſt à la Fluxion de l'Abciſſe AC comme PD eſt à CD ; la Fluxion de l'Abciſſe étant donc ſuppoſée $= 1$, la Fluxion de l'Arc QD ou de l'Ordonnée CE ſera $\sqrt{\frac{\frac{1}{4}bb + \frac{bb+ab}{aa}zz}{\frac{1}{4}bb + \frac{b}{a}zz}}$; multipliés par FE ou z, vous aurez $z\sqrt{\frac{\frac{1}{4}bb + \frac{bb+ab}{aa}zz}{\frac{1}{4}bb + \frac{b}{a}zz}}$ pour la Fluxion de l'Aire AEF ; ſur l'Ordonnée CD prenez donc CG $= z\sqrt{\frac{\frac{1}{4}bb + \frac{bb+ab}{aa}zz}{\frac{1}{4}bb + \frac{b}{a}zz}}$; l'Aire AGC décrite par le Mouvement de CG ſur AC ſera égale à l'Aire AEF, & la Courbe AG ſera une Courbe Géometrique, & par conſéquent l'Aire AGC eſt trouvée ; car pour z^2 ſubſtituez z^n dans la derniere Equation, & vous aurez $z^{n-1}\sqrt{\frac{\frac{1}{4}bb + \frac{bb+ab}{aa}z^n}{\frac{1}{4}bb + \frac{b}{a}z^n}} =$ CG, Equation de la ſeconde forme du onziéme Ordre de la Table 2. & en comparant $d = 1$, $e = \frac{1}{4}bb = g$, $f = \frac{bb+ab}{aa}$, & $h = \frac{b}{a}$; de ſorte que $\sqrt{\frac{1}{4}bb + \frac{b}{a}zz} = x$, $\sqrt{-\frac{b^3}{4a} + \frac{a+b}{a}xx} = u$, & $\frac{a}{b}s = t$; c'eſt-à-dire, CD $= x$, DP $= u$, & $\frac{a}{b}s = t$. Voici maintenant la conſtruction.

CV. Au Point Q élevez QK perpendiculaire & égale à QA, à laquelle par le Point D tirez la parallele HI égale à DP ; la Ligne KI ou ſe détermine HI ſera une Section Conique, & l'Aire HIKQ ſera à l'Aire cherchée AEF, comme $b : a$ ou :: PC : AC.

CVI. Remarquez qu'en changeant le Signe de b, la Section Conique à l'Arc de laquelle la ligne droite CE eſt égale, devient une Ellipſe, & cette Ellipſe un Cercle en faiſant $b = -a$, auquel cas la Ligne KI devient une droite parallele à AQ.

CVII. Quand vous aurez ainſi trouvé l'Aire de la Courbe & fait la conſtruction ; il faudra en chercher la démonſtration par la

UVA. BHSC. SC 04146

Syntheſe, c'eſt-à-dire en éloignant autant qu'il ſera poſſible tout calcul Algébrique, ce qui deviendra bien plus élégant. Il y a ſur cela une Méthode générale de démonſtration que je vais tâcher d'éclaircir par les Exemples ſuivants.

Démonſtration de la Conſtruction dans l'Exemple 5.

CVIII. Sur l'Arc PQ prenez un Point *d* indéfiniment près de D, (*Fig. pag.* 121.) tirez *de* & *dm* paralleles à DE & DM, qui rencontrent DM & AP en *p* & *l*. DE*ed* ſera le moment de l'Aire PDEP, & LM*ml* ſera celui de l'Aire LMKP ; tirez le demi-Diametre AD & imaginez que l'Arc indéfiniment petit *d*D eſt une droite, les Triangles D*pd* & ALD ſeront ſemblables, & par conſéquent D*p* : *pd* :: AL : LD ; mais HF : EH :: AG : AF ou AL : LD :: ML : DE ; ainſi D*p* : *pd* :: ML : DE ; donc D*p* × DE = *pd* × ML, c'eſt-à-dire, le Moment DE*ed* eſt égal au Moment LM*ml* ; & comme ceci eſt démontré des Moments contemporains quelconques, il eſt évident que tous les Moments de l'Aire PDEP ſont égaux à tous les Moments contemporains de l'Aire PLMK, & par conſéquent les Aires entieres compoſées de ces Moments ſont égales auſſi C. Q. F. D.

Démonſtration de la Conſtruction dans l'Exemple 3.

CIX. Soit DE*ed* le Moment de la Surface AHDE, & ſoit A*d*DA le Moment contemporain du Segment ADH ; tirez le demi-Diametre DK, & que *de* rencontre AK en *c* ; C*c* : D*d* :: CD : DK, & DC : QA ou 2DK :: AC : DE ; ainſi C*c* : 2D*d* :: DC : 2DK :: AC : DE & C*c* × DE = 2D*d* × AC. Sur le Moment prolongé D*d* de la Circonférence, c'eſt-à-dire, ſur la Tangente du Cercle élevez la perpendiculaire AI, elle ſera égale à AC ; de ſorte que 2D*d* × AC = 2D*d* × AI = quatre



UVA. BHSC. SC 04146

fois le Triangle AD*d* = par conſéquent C*c* × DE = le Moment DE*ed* ; donc chaque Moment de l'Eſpace AHDE eſt Quadruple du Moment contemporain du Segment ADH , & l'Eſpace total Quadruple du Segment total.

Démonſtration de la Conſtruction dans l'Exemple 4.

CX. Tirez *ce* parallele & indéfiniment près de CE , tirez auſſi la Tangente *ck* de l'Hyperbole , & KM perpendiculaire à la Ligne AP. Par la nature de l'Hyperbole AC : AP : : AP : AM & AG*q* : GL*q* : : AC*q* : LE*q* ou AP*q* : : AP*q* : AM*q* ; & en diviſant AG*q* : AL*q* ou DE*q* : : AP*q* : AM*q* — AP*q* ou MK*q* ; & en renverſant AG : AP : : DE : MK ; mais la petite Aire DE*ed* eſt au Triangle CK*c* comme la hauteur DE eſt à la moitié de la hauteur KM , c'eſt-à-dire : : AG : $\frac{1}{2}$AP. Donc tous les Moments de l'Eſpace PDE ſont à tous les Moments contemporains de l'Eſpace PKC, comme AG : $\frac{1}{2}$AP ; & par conſéquent les Eſpaces entiers ſont en même raiſon.



Démonſtration de la Conſtruction dans l'Exemple 6.

CXI. Tirez indéfiniment près la Ligne *cd* parallele à CD , (*Fig. pag.* 122.) qui rencontre en *e* la Courbe AE ; tirez auſſi *hi* & *fe* qui rencontrent DC en *p* & *q*. Par l'Hypotheſe D*d* = E*q* , & à cauſe des Triangles ſemblables D*dp* & DCP , D*p* : D*d* ou E*q* : : CP : PD ou HI , ainſi D*p* × HI = E*q* × CP ; & de-là D*p* × HI ou le Moment HI*ih* : E*q* × AC ou le Moment EF*fe* : : E*q* × CP : E*q* × AC : : CP : AC , & comme AC & PC ſont en raiſon donnée du Parametre au *Latus tranſverſum* de la Section Conique QD , & comme les Moments HI*ih* & EF*fe* des Aires HIKQ & AEF ſont dans cette même raiſon , les Aires auſſi ſeront dans cette même raiſon. C. Q. F. D.

CXII. Dans ces démonſtrations l'on doit obſerver que je prends

UVA. BHSC. SC 04146

pour égales les Quantités dont la raiſon eſt celle de l'égalité, & qu'une raiſon eſt cenſée telle lorſqu'elle ne differe de l'égalité que par une raiſon moindre qu'une raiſon inégale aſſignable quelconque. Ainſi dans la derniere démonſtration j'ai ſuppoſé le Rectangle $Eq \times AC$ ou $FEqf$ égal à l'Eſpace $FEef$, parce que Eqe étant infiniment plus petit en comparaiſon, ils ne peuvent avoir une raiſon d'égalité. J'ai fait par la même raiſon $DP \times HI = HIih$, & ainſi des autres.

CXIII. Pour prouver l'égalité ou la raiſon donnée des Aires des Courbes, je me ſuis ſervi de l'égalité ou de la raiſon donnée de leur Moments comme d'une maniere qui a quelqu'affinité avec les Méthodes qu'on employe ordinairement ; mais celle qui dépend de la conſidération du Mouvement ou Fluxion qui produit une Surface paroît la plus naturelle ; ainſi pour démontrer la conſtruction de l'Exemple 2. je dirois, par la nature du Cercle la Fluxion de la droite ID (*Fig. pag.* 118.) eſt à la Fluxion de la droite IP :: AI : ID & AI : ID :: ID : CE par la nature de la Courbe AGE ; ainſi $CE \times \dot{\overline{ID}} = ID \times \dot{\overline{IP}}$; mais $CE \times \dot{\overline{ID}} =$ à la Fluxion de l'Aire ACEG & $ID \times \dot{\overline{IP}} =$ à la Fluxion de l'Aire PDI, donc ces Aires qui ſont produites par une égale Fluxion doivent être égales C. *q. f.* D.

CXIV. Je vais encore ajouter la démonſtration de la conſtruction de l'Exemple 3. où l'on détermine l'Aire de la Ciſſoïde, tirez la corde DQ & l'Aſymptote QR de la Ciſſoïde. Par la nature du Cercle $DQq = AQ \times CQ$, & en prenant les Fluxions $2DQ$ multipliées par la Fluxion de $DQ = AQ \times \dot{\overline{CQ}}$; ainſi $AQ : DQ :: 2\dot{\overline{DQ}} : \dot{\overline{CQ}}$. Par la nature de la Ciſſoïde $ED : AD :: AQ : DQ$ & $ED : AD :: 2\dot{\overline{DQ}} : \dot{\overline{CQ}}$, donc $ED \times \dot{\overline{CQ}} =$



UVA. BHSC. SC 04146

$AD \times 2\dot{D}\dot{Q}$, ou $4 \times \frac{1}{2} AD \times \dot{D}\dot{Q}$. Mais comme DQ eſt perpendiculaire ſur l'extrémité de AD qui tourne autour du Point A ; & comme $\frac{1}{2}AD \times \dot{Q}D$ eſt égale à la Fluxion qui produit l'Aire ADOQ ; le Quadruple $ED \times \dot{C}\dot{Q}$ = la Fluxion qui produit l'Aire Ciſſoïdale QREDO ; donc cette Aire QREDO infiniment étenduë eſt Quadruple de l'autre ADOQ. C. *q. f.* D.

SCHOLIE.

CXV. Par les Tables précédentes on peut tirer de leur Fluxions non ſeulement les Aires des Courbes ; mais même toutes les Quantités d'une autre eſpece qui peuvent être produites par une façon Analogue du Mouvement, & cela au moyen de ce Theoreme : *Une Quantité d'une eſpece quelconque eſt à l'unité de la même eſpece comme l'Aire d'une Conrbe eſt à l'unité de Surface, ſi la Fluxion qui produit cette Quantité eſt à l'unité de ſon eſpece comme la Fluxion qui produit l'Aire eſt à l'unité de ſon eſpece, c'eſt-à-dire, comme l'Ordonnée ou perpendiculaire qui ſe meut ſur l'Abciſſe & décrit l'Aire eſt à l'unité lineaire.* Si donc une Fluxion quelconque eſt exprimée par une Ordonnée qui ſe meut, la Quantité produite par cette Fluxion ſera exprimée par l'Aire décrite par cette Ordonnée ; ou ſi la Fluxion eſt exprimée par les mêmes Termes Algébriques que l'Ordonnée, la Quantité produite ſera exprimée par les mêmes Termes que l'Aire décrite ; il faut donc chercher dans la premiere Colonne des Tables l'Equation qui contient la Fluxion d'une eſpece quelconque, & la Valeur de t dans la derniere Colonne donnera la Quantité produite.

CXVI. Comme ſi $\sqrt{1 + \frac{9z}{4a}}$ repréſentoit une Fluxion d'une eſpece quelconque faites-là $= y$, & pour la réduire à la forme des Equations des Tables, ſubſtituez z^n pour z, vous aurez $z^{n-1}\sqrt{1 + \frac{9}{4a}z^n} = y$, Equation de la premiere forme du 3e Ordre de la Table 1 ; en comparant les Termes vous trouverez $d = 1$, $e = 1$, $f = \frac{9}{4a}$ & de là $\frac{8a + 18z}{27}\sqrt{1 + \frac{9z}{4a}} = \frac{2d}{3nf} R^3 = t$; c'eſt donc la Quantité $\frac{8a + 18z}{27}\sqrt{1 + \frac{9z}{4a}}$ qui eſt produite par la Fluxion $\sqrt{1 + \frac{9z}{4a}}$.

UVA. BHSC. SC 04146

CXVII. De même ſi $\sqrt{1+\frac{16z^{\frac{2}{3}}}{9a^{\frac{2}{3}}}}$ repréſente une Fluxion, tirant $z^{\frac{2}{3}}$ hors du Signe & écrivant z^{n} pour $z^{\frac{2}{3}}$, on aura $z^{\frac{1}{n}+1}\sqrt{z^{n}+\frac{16}{9a^{\frac{2}{3}}}}=y$, Equation de la 2e forme du 5e Ordre de la Table 2. en comparant les Termes ou à $d=1$, $e=\frac{16}{9a^{\frac{2}{3}}}$, & $f=1$, ainſi $z^{\frac{2}{3}}=\frac{1}{z^{n}}=xx$, $\sqrt{1+\frac{16xx}{9a^{\frac{2}{3}}}}=u$, & $\frac{3}{2}s=\frac{-2d}{n}s=t$, ce qui étant connu, on connoîtra auſſi la Quantité produite par la Fluxion $\sqrt{1+\frac{16z^{\frac{2}{3}}}{9a^{\frac{2}{3}}}}$ en faiſant cette Fluxion à l'unité de ſon eſpece, comme l'Aire $\frac{1}{2}s$ à l'unité de Surface : ou ce qui revient au même en ſuppoſant que t ne repréſente plus une Surface, mais une Quantité d'une autre eſpece qui ſoit à l'unité de ſa propre eſpece, comme cette Surface eſt à l'unité de Surface.

CXVIII. Comme ſi l'on ſuppoſe que $\sqrt{1+\frac{16z^{\frac{2}{3}}}{9a^{\frac{2}{3}}}}$ repréſente une Fluxion lineaire, j'imagine que t ceſſe de repréſenter une Surface & qu'il ne repréſente plus qu'une Ligne, cette Ligne par Exemple qui eſt à l'unité lineaire comme l'Aire qui (ſuivant les Tables) eſt repreſentée par t, eſt à l'unité de Surface ou autrement à l'unité qui eſt produite en multipliant cette Aire par l'unité lineaire ; nommant donc e cette unité linaire, la longueur produite par la Fluxion précédente ſera $\frac{3s}{2e}$. Vous voyez qu'on peut ſur ce fondement appliquer ces Tables à déterminer les longueurs des Courbes, leur Solides & mêmes toutes autres Quantités, auſſi bien que les Aires des Courbes.

Des Queſtions qui ont raport à cette matiere.

1. *Trouver les Aires des Courbes par des approximations mécaniques.*

CXIX. La Méthode conſiſte en ce que les Valeurs de deux ou de pluſieurs Figures Rectilignes peuvent être combinées enſemble, de façon qu'elles faſſent à très-peu près la Valeur de l'Aire que l'on cherche.

CXX.

UVA. BHSC. SC 04146

CXX. Par Exemple dans le Cercle AFD désigné par l'Equation $x - xx = \dot{z}\dot{z}$, quand vous aurez trouvé la Valeur $\frac{2}{3}x^{\frac{3}{2}} - \frac{1}{5}x^{\frac{5}{2}} - \frac{1}{28}x^{\frac{7}{2}} - \frac{1}{72}x^{\frac{9}{2}}$, &c. de l'Aire AFDB, vous chercherez les Valeurs de quelques Rectangles comme la Valeur $x\sqrt{x - xx}$, ou $x^{\frac{3}{2}} - \frac{1}{2}x^{\frac{5}{2}} - \frac{1}{8}x^{\frac{7}{2}} - \frac{1}{16}x^{\frac{9}{2}}$, du Rectangle BD × AB, & la Valeur $x\sqrt{x}$ ou $x^{\frac{3}{2}}$ du Rectangle AD × AB ; ensuite vous multiplierez ces Valeurs par des Lettres differentes qui désigneront indéfiniment tels nombres qu'on voudra ; vous ajouterez ensuite ces Termes & vous comparerez les Termes de la somme avec les Termes correspondants de la Valeur de l'Aire AFDB, pour les rendre égaux autant que faire se pourra. Comme si vous multipliez ces Parallelogrammes par e & f, la somme sera $ex^{\frac{3}{2}} - \frac{1}{2}ex^{\frac{5}{2}} - \frac{1}{8}ex^{\frac{7}{2}}$, &c. dont les Termes comparés avec $\frac{2}{5}x^{\frac{5}{2}} - \frac{1}{5}x^{\frac{5}{2}} - \frac{1}{28}x^{\frac{7}{2}}$, &c. donnent $e + f = \frac{2}{3}$, $-\frac{1}{2}e = -\frac{1}{5}$, ou $e = \frac{2}{5}$, & $f = \frac{2}{3} - e = \frac{4}{15}$; ainsi $\frac{2}{5}$ BD × AB + $\frac{4}{15}$ AD × AB = l'Aire AFDB à très-peu près ; car $\frac{2}{5}$BD × AB + $\frac{4}{15}$ AD × AB = $\frac{2}{3}x^{\frac{3}{2}} - \frac{1}{5}x^{\frac{5}{2}} - \frac{1}{20}x^{\frac{7}{2}} - \frac{1}{40}x^{\frac{9}{2}}$, &c. ce qui étant ôté de l'Aire AFDB, ne laisse d'erreur que $\frac{1}{70}x^{\frac{7}{2}} + \frac{1}{90}x^{\frac{9}{2}}$, &c.



CXXI. Si l'on coupe AB au Point E, la Valeur du Rectangle AB × DE sera $x\sqrt{x - \frac{1}{4}xx}$, ou $x^{\frac{3}{2}} - \frac{3}{8}x^{\frac{5}{2}} - \frac{2}{128}x^{\frac{7}{2}} - \frac{27}{1024}x^{\frac{9}{2}}$, &c. ce qui étant comparé avec le Rectangle AD × AB, donne $\frac{8DE + 2AD}{15} \times$ AB = l'Aire AFDB, il n'y a d'erreur que $\frac{1}{560}x^{\frac{5}{2}} + \frac{1}{1760}x^{\frac{7}{2}}$, &c. ce qui est toujours moindre que $\frac{1}{1500}$ partie de l'Aire totale, lors même que l'Aire AFDB est celle du quart de Cercle. On peut donc dire en maniere de Theoreme, 3 sont à 2, comme le Rectangle AB × DE, ajouté à la cinquiéme partie de la différence entre AD & DE est à l'Aire AFDB à très-peu près.

CXXII. Et de même au moyen des deux Rectangles AB × ED & AB × BD, ou des trois Rectangles tous ensemble, ou bien en prenant un plus grand nombre de Rectangles ; on trouvera des Régles qui seront d'autant plus exactes qu'on aura pris davantage de Rectangles ; la même chose doit s'entendre de l'Aire de l'Hyperbole ou de telle autre Courbe qu'on voudra, & même un seul Rectangle suffit quelquefois pour représenter l'Aire comme dans le Cercle

UVA. BHSC. SC 04146

ci-deſſus, ſi l'on fait BE : AB : : $\sqrt{10}$: 5, le Rectangle AB × ED ſera à l'Aire AFDB comme 3 : 2, & il n'y aura d'erreur que $\frac{1}{175}x^{\frac{5}{2}} + \frac{11}{11250}x^{\frac{9}{2}}$, &c.

2. L'Aire étant donnée déterminer l'Abciſſe & l'Ordonnée.

CXXIV. Il n'y a aucune difficulté lorſque l'Aire eſt exprimée par une Equation finie ; mais quand c'eſt une ſuite infinie il faut en extraire la Racine qui indique l'Abciſſe ; ainſi dans l'Hyperbole dont l'Equation eſt $\frac{ab}{a+x} = \dot{z}$, vous aurez $z = bx - \frac{bx^2}{2a} + \frac{bx^3}{3a^2} - \frac{bx^4}{4a^3}$, &c. pour tirer de l'Aire donnée l'Abciſſe x, tirez la Racine & vous aurez $x = \frac{z}{b} + \frac{z^2}{2ab^2} + \frac{z^3}{6a^2b^3} + \frac{z^4}{24a^3b^4} + \frac{z^5}{96a^4b^5}$, &c. Et ſi l'on demande l'Ordonnée $\dot{z}$, diviſez ab par $a + x$, c'eſt-à-dire, par $a + \frac{z}{q} + \frac{z^2}{2ab^2} + \frac{z^3}{6a^2b^3}$, &c. ce qui donne $\dot{z} = b - \frac{z}{a} - \frac{z^2}{2a^2b} - \frac{z^3}{6a^3b^2} - \frac{z^4}{24a^4b^3}$, &c.

CXXIV. Dans l'Ellipſe dont l'Equation eſt $ax - \frac{a}{c}xx = \ddot{z}z$, & l'Aire trouvée $z = \frac{2}{3}a^{\frac{1}{2}}x^{\frac{3}{2}} - \frac{a^{\frac{1}{2}}x^{\frac{5}{2}}}{5c} - \frac{a^{\frac{1}{2}}x^{\frac{7}{2}}}{28c^2} - \frac{a^{\frac{1}{2}}x^{\frac{9}{2}}}{72c^3}$, &c. écrivez u^3 pour $\frac{3z}{2a^{\frac{1}{2}}}$, & t pour $x^{\frac{1}{2}}$; l'Aire ci-deſſus devient $u^3 = t^3 - \frac{3t^5}{10c} - \frac{3t^7}{56c^2} - \frac{t^9}{48c^3}$, &c. Et en tirant la Racine $t = u + \frac{u^3}{10c} + \frac{81u^5}{1400c^2} + \frac{1171u^7}{25200c^3}$, &c. dont le quarré $u^2 + \frac{u^4}{5c} + \frac{22u^6}{175c^2} + \frac{823u^8}{7875c^3}$, &c. eſt égal à x. Si vous ſubſtituez cette Valeur au lieu de x dans l'Equation $ax - \frac{a}{c}xx = \ddot{z}z$, & que vous tiriez la Racine, vous aurez $\dot{z} = a^{\frac{1}{2}}u - \frac{2a^{\frac{1}{2}}u^3}{5c} - \frac{38a^{\frac{1}{2}}u^5}{175c^2} - \frac{407a^{\frac{1}{2}}u^7}{2250c^3}$, &c. ainſi par l'Aire donnée z & la ſuppoſition de $u = \sqrt[3]{\frac{3z}{2a^{\frac{1}{2}}}}$, l'Abciſſe x & l'Ordonnée $\dot{z}$ ſeront données. Tout ceci convient à l'Hyperbole en changeant ſeulement le Signe de la Quantité c, par tout où le nombre de ſes Dimenſions eſt impair.

UVA. BHSC. SC 04146

PROBLEME X.

Trouver autant de Courbes que l'on voudra, dont les longueurs puiſſent être exprimées par des Equations finies.

I. VOICI quelques préparations néceſſaires à la Solution de ce Problême.

II. 1. Si vous concevez que la droite DC perpendiculaire à une Courbe quelconque AD, ſe meuve en demeurant toujours perpendiculaire à cette Courbe, tous ſes Points G, *g*, *r*, &c. décriront d'autres Courbes perpendiculaires & également éloignées de cette Ligne, comme GK, *gk*, *rs*, &c.



III. 2. Si vous ſuppoſez cette Ligne droite indéfinie de chaque côté, ſes deux extrémités ſe mouvront en ſens contraire, & par conſéquent il y aura un Point C dans cette Ligne qui ſera immobile & qu'on peut appeller le Centre de ce Mouvement ; ce Point ſera le même que le Centre de Courbure de la Courbe AD au Point D, comme je l'ai dit ci-devant.

IV. 3. Si cette Courbe AD n'eſt point un Cercle, c'eſt-à-dire, ſi ſa Courbure eſt inégale, par Exemple plus grande vers ∫ & plus petite vers Δ ; ce Centre changera continuellement de place & s'approchera de plus près comme en K des parties les plus Courbes & s'éloignera le plus comme en *k* des parties les moins Courbes, de ſorte qu'il décrira une Ligne comme KC*k*.

V. 4. La Ligne droite DC touchera continuellement la Ligne décrite par le Centre de Courbure ; car ſi le Point D de cette Ligne ſe meut vers ∫, le Point G qui dans le même temps paſſe en K & qui eſt ſitué du même côté que le Point C, ſe mouvra du même ſens par l'Article 2. Et ſi le Point D ſe meut vers Δ, le Point *g* qui dans le même temps paſſe en *k*, & qui eſt ſitué du côté op-

UVA. BHSC. SC 04146

posé au Centre C, se mouvra en sens contraire, c'est-à-dire, du même sens que G, lorsque dans le premier Cas il passe en K; ainsi K & *k* se trouvent toujours être d'un seul & même côté de la Ligne droite DC; mais comme K & *k* sont pris arbitrairement pour des Points quelconques, il est clair que toute la Courbe se trouve être d'un seul & même côté de la droite DC, & que par conséquent elle n'est point coupée mais seulement touchée par cette Ligne.

VI. On suppose ici que la Courbure de la Ligne ∫D△ augmente toujours vers ∫ & diminue vers △, & si la plus grande ou la moindre Courbure étoit en D, la droite DC couperoit la Courbe CK dans un Angle mais moindre qu'aucun Angle Rectiligne possible, ce qui fait encore l'effet d'une Tangente; & dans ce Cas le Point C est le Terme ou la pointe où les deux extrémités de la Courbe se rencontrent de la façon la plus oblique & se touchent toutes deux; ainsi la droite DC qui divise l'Angle de Contact doit être regardée plûtôt comme une Ligne qui touche que comme une Ligne qui coupe.

VII. 5. La droite CG est égale à la Courbe CK; car imaginez que tous les Points *r*, 2*r*, 3*r*, 4*r*, &c. de cette droite décrivent les Arcs de Courbe *rs*, 2*r*2*s*, 3*r*3*s*, &c. dans le même temps qu'ils approchent de la Courbe CK par le Mouvement de cette droite, ces Arcs qui par l'Art. 1. sont perpendiculaires aux droites qui touchent la Courbe CK, seront aussi par l'Art. 4. perpendiculaires à cette Courbe; ainsi les parties de la Ligne CK comprises entre ces Arcs pouvant être regardées comme droites à cause de leur petitesse infinie, seront égales aux intervales de ces mêmes Arcs, c'est-à-dire, par l'Art. 1. égales a autant de parties correspondantes de la droite CG; & ajoutant choses égales à choses égales, la Ligne entiere CK sera égale à la Ligne entiere CG.

VIII. On aura la même chose en imaginant que les parties de la droite CG s'appliquent successivement sur celle de la Courbe CK, & les mesurent de la même façon que la circonférence d'une rouë en roulant dans une plaine mesure la longueur du chemin que le Point de Contact décrit continuellement.

IX. On voit donc qu'on peut résoudre le Problême en prenant à volonté une Courbe quelconque A∫D△, & en déterminant la Courbe KC*k* dans laquelle se trouve toujours le Centre de Courbure de la Courbe prise à volonté. Elevant donc sur la droite AB donnée de position les perpendiculaires DB & CL, prenant en AB

UVA. BHSC. SC 04146

un Point quelconque A, & nommant AB, x & BD, y, vous trouverez par le Prob. 5. le Point C, au moyen de l'Equation à la Courbe AD, qui donne la Relation de x & y, & par là vous déterminerez la Courbe KC & sa longueur GC.

X. Exemple. Supposons que l'Equation à la Courbe soit $ax = yy$, celle de la Parabole d'*Appolonius*, vous trouverez par le Prob. 5. $AL = \frac{1}{2}a + 3x$, $CL = \frac{4y^3}{aa}$ & $DC = \frac{a+4x}{a}\sqrt{\frac{1}{4}aa + ax}$; AL & LC déterminent la Courbe KC, & DC détermine sa longueur; car comme il vous est libre de prendre les Points K & C par tout sur la Courbe KC; imaginons que K est le Centre de Courbure de la Parabole à son sommet, & supposons AB & BD ou x & $y = 0$, nous aurons $DC = \frac{1}{2}a$; cette longueur AK ou DG étant ôtée de la premiere Valeur indéterminée de DC laisse GK ou $KC = a + 4x\sqrt{\frac{1}{4}aa + ax} - \frac{1}{2}a$.



XI. Maintenant si vous voulez connoître cette Courbe-ci & sa longueur; faites $KL = z$ & $LC = u$; z sera $= AL - \frac{1}{2}a = 3x$, ou $\frac{1}{3}z = x$, & $\frac{az}{3} = ax = yy$; ainsi $4\sqrt{\frac{z^3}{27a}} = \frac{4y^3}{aa} = CL = u$, ou $\frac{16z^3}{27a} = u^2$, ce qui montre que la Courbe CK est une Parabole de la seconde Espece; sa longueur sera $\frac{3a+4z}{3a}\sqrt{\frac{1}{4}aa + \frac{1}{3}az} - \frac{1}{2}a$, en mettant $\frac{1}{3}z$ pour x dans la Valeur de CG.

UVA. BHSC. SC 04146

XII. On peut auſſi réſoudre le Problême en cherchant une Equation entre AP & PD, P étant ſuppoſé l'interſection de l'Abciſſe & de la perpendiculaire ; car faiſant AP $= x$, & PD $= y$, imaginez que CPD ſe meuve & arrive en Cpd, après avoir parcouru un eſpace infiniment petit, ſur CD & Cd prenez CΔ & Cδ du même côté & de la même longueur donnée, par exemple $= 1$, ſur CL abaiſſez les perpendiculaires Δg & $\delta\gamma$; cette premiere Δg que vous appellerez z rencontrera la Ligne Cd au Point f; achevez le Parallelogramme $g\gamma\delta e$ & prenez comme ci-devant les Fluxions $\dot{x}$, $\dot{y}$ & $\dot{z}$ des Quantités x, y & z; vous aurez $\Delta e : \Delta f :: \overline{\Delta e^2} : \overline{\Delta\delta^2} :: \overline{Cg^2} : \overline{C\Delta^2} :: \frac{\overline{Cg^2}}{C\Delta} : C\Delta$, & $\Delta f : Pp :: C\Delta : CP$, ainſi de même $\Delta e : Pp :: \frac{Cg^2}{C\Delta} : CP$. Mais Pp eſt le Moment dont augmente l'Abciſſe AP en devenant Ap, & Δe eſt le Moment contemporain dont diminue la perpendiculaire Δg lorſqu'elle devient $\delta\gamma$; ainſi Δe & Pp ſont comme les Fluxions des Lignes Δg, z & Ap, x, c'eſt-à-dire, comme $\dot{z}$ & $\dot{x}$. Donc $\dot{z} : \dot{x} :: \frac{\overline{Cg^2}}{C\Delta} : CP$; & comme $\overline{Cg^2} = C\Delta^2 - \overline{\Delta g^2}$ $= 1 - zz$, vous aurez $CP = \frac{\dot{x} - \dot{x}zz}{\dot{z}}$; & de plus comme il eſt libre de prendre pour la Fluxion uniforme l'une des trois Fluxions $\dot{x}$, $\dot{y}$ ou $\dot{z}$, faites $\dot{x} = 1$, CP deviendra $\frac{1 - zz}{\dot{z}}$.



XIII. Outre cela $C\Delta, 1 : \Delta g, z :: CP : PL$; & $C\Delta, 1 : \overline{Cg} \sqrt{1 - zz} :: CP : CL$, ainſi $PL = \frac{z - z^3}{\dot{z}}$, & $CL = \frac{1 - zz}{\dot{z}}\sqrt{1 - zz}$; tirez pq parallele à l'Arc infiniment petit Dd, ou perpendiculaire à DC, Pq ſera le Moment dont augmente DP lorſqu'il devient dp, & que dans le même temps AP devient Ap ; ainſi Pp & Pq ſont comme les Fluxions de AP, x & PD, y, c'eſt-à-dire, comme $\dot{x}$ & $\dot{y}$; donc par les Triangles ſemblables Ppq & $C\Delta g$, $\dot{y}$ ſera $= z$, ce qui donne la Solution ſuivante.

XIV. De l'Equation propoſée qui exprime la Relation entre x

UVA. BHSC. SC 04146

& y, tirez celle des Fluxions $\dot{x}$ & $\dot{y}$, & faisant $\dot{x} = 1$, prenez la Valeur de $\dot{y}$ à laquelle $\dot{z}$ est égale ; substituez $\dot{z}$ pour $\dot{y}$, & de cette derniere Equation tirez la Relation des Fluxions $\dot{x}$, $\dot{y}$ & $\dot{z}$, & substituant encore 1 pour $\dot{x}$, vous aurez la Valeur de $\dot{z}$; faites ensuite $\frac{1 - \ddot{y}\dot{y}}{\dot{z}} = CP$, $\dot{z} \times CP = PL$, & $CP \times \sqrt{1 - \ddot{y}\dot{y}} = CL$, C sera le Point d'où une partie quelconque CK de la Courbe est toujours égale à la droite CG, qui est la différence des Tangentes tirées des Points C & K perpendiculairement à la Courbe D*d*.

XV. Exemple. Soit $ax = yy$, l'Equation qui exprime la Relation entre AP & PD, vous aurez d'abord $a\dot{x} = 2y\dot{y}$, ou $a = 2y\dot{z}$; ainsi $2\dot{y}\dot{z} + 2y\ddot{z} = 0$, ou $\frac{-z\dot{z}}{y} = \ddot{z}$, ainsi $CP = \frac{1 - \ddot{y}\dot{y}}{\dot{z}} = y - \frac{4y^3}{aa}$, $PL = \dot{z} \times CP = \frac{1}{2}a - \frac{2yy}{a}$, & $CL = \frac{aa - 4yy}{aa}\sqrt{4yy - aa}$; ôtant y & x de CP & de PL, il reste $CD = -\frac{4y^3}{aa}$, & $AL = \frac{1}{2}a - \frac{3yy}{a}$; on ôte y & x parce que quand CP & PL ont des Valeurs affirmatives, ces Lignes tombent à l'égard du Point P vers D & A, & qu'on doit les diminuer en leur retranchant les Quantités affirmatives PD & AP ; & quand elles ont des Valeurs négatives elles tombent de l'autre côté du Point P, & on doit alors les augmenter, ce qui arrive aussi en leur ôtant les Quantités affirmatives PD & AP.



XVI. Après avoir trouvé le Point C, pour avoir la longueur de la partie de Courbe CK, il faudra chercher la longueur de la Tangente au Point K & l'ôter de la longueur CD ; par Exemple, si K est le Point auquel se termine la Tangente lorsque $C\Delta$ & Δg, ou 1 & $\dot{z}$ sont égales, c'est-à-dire, lorsque ce Point est pris sur l'Abcisse même AP, mettez 1 pour $\dot{z}$ dans l'Equation $a = 2y\dot{z}$, vous aurez $a = 2y$, écrivez donc $_2a$ au lieu de y dans la Valeur de CD, c'est-à-dire, dans $\frac{4y^3}{aa}$ elle deviendra $\frac{1}{2}a$, ce qui est la

UVA. BHSC. SC 04146

longueur de la Tangente au Point K ou de la Ligne DG, la différence de cette Ligne & de la Valeur indéfinie de CD eſt CG ou $\frac{4y^3}{aa} - \frac{1}{2}a$, à laquelle la partie CK de la Courbe eſt égale.

XVII. Pour connoître la Courbe ôtez AK qui eſt $= \frac{1}{4}a$ de la longueur AL, après avoir changé le Signe en affirmatif, il vous reſtera KL $= \frac{3yy}{a} - \frac{3}{4}a$ que vous appellerez t, appellez de même u la Valeur de la Ligne CL, ſubſtituez $\frac{4at}{3}$ au lieu de $4yy - aa$ dans cette Valeur, & vous aurez $\frac{2t}{3a}\sqrt{\frac{4}{3}at} = u$, ou $\frac{16t^3}{27a} = uu$, Equation à une Parabole de la ſeconde eſpece, comme on l'avoit trouvé ci-devant.

XVIII. Lorſqu'on ne peut pas commodément réduire la Relation de t à u à une Equation, il ſuffit de trouver les longueurs PC & PL, comme ſi la Relation entre AP & PD eſt donnée par l'Equation $3a^2x + 3a^2y - y^3 = 0$, vous aurez d'abord $a^2 + a^2z - y^2z = 0$, enſuite $aaz - 2yyz - y^2z = 0$. Donc $z = \frac{aa}{yy - aa}$, & $\dot{z} = \frac{2yy\dot{z}}{aa - yy}$; ainſi PC ou $\frac{1 - \ddot{y}y}{\dot{z}}$, & PL ou $z \times$ PC ſont données, & par conſéquent le Point C & la longueur de la Courbe, au moyen de la différence DC ou PC $-$ y des deux Tangentes correſpondantes.

XIX. Par Exemple, ſi nous faiſons $a = 1$, & pour déterminer quelque Point C de la Courbe ſi nous prenons $y = 2$, alors AP ou $x = \frac{y^3 - 3a^2y}{3aa} = \frac{2}{3}$, $z = \frac{1}{3}$, $\dot{z} = -\frac{4}{9}$, PC $= -2$, & PL $= -\frac{2}{3}$; pour déterminer un autre Point ſi nous prenons $y = 3$, alors AP $= 6$, $z = \frac{1}{8}$ $\dot{z} = -\frac{3}{256}$, PC $= -84$ & PL $= -10\frac{1}{2}$; ôtons y de PC il nous reſtera -4 dans le premier cas & -87 dans le ſecond pour les longueurs DC dont la différence 83 eſt la longueur de la Courbe compriſe entre les deux Points trouvés C & c.

XX. Ceci doit s'entendre d'une Courbe dont le Terme ou la limite qu'on appelle la pointe ne ſe trouve pas entre les Points C & c ou C & K; car ſi cette pointe ou pluſieurs pointes ſe trouvent entre ces Points (ce que l'on peut trouver en faiſant DC ou PC un moindre ou un plus grand,) les longueurs de chacune des parties de la Courbe entre ces pointes & les Points C ou K doivent être trouvées ſéparément & enſuite ajoutées enſemble.

PROB.

UVA. BHSC. SC 04146

PROBLEME XI.

Trouver autant de Courbes que l'on voudra dont les longueurs puiſſent ſe comparer avec celle d'une Courbe propoſée quelconque, ou avec ſon Aire par des Equations finies.

I. CELA ſe fait en mettant la longueur ou l'Aire de la Courbe propoſée dans l'Equation que nous avons pris dans le Problême précédent pour déterminer la Relation entre AP & PD, (*Fig. pag.* 134.); mais pour en tirer z & $\dot{z}$ il faut trouver qu'elle eſt la Fluxion de la longueur ou de l'Aire.

II. On détermine la Fluxion de la longueur en la faiſant égale à la Racine quarrée de la ſomme des quarrés de la Fluxion de l'Abciſſe & de l'Ordonnée ; car ſoit RN l'Ordonnée perpendiculaire qui ſe meut ſur l'Abciſſe MN, & ſoit QR la Courbe propoſée à laquelle ſe termine RN, appellez MN, s, NR, t, QR, u ; les Fluxions reſpectives ſeront $\dot{s}$, $\dot{t}$, $\dot{u}$; concevez que NR ſe meut en nr infiniment près de NR, abaiſſez RS perpendiculaire à nr, les petites Lignes Rs, Sr & Rr, ſeront les Moments contemporains des Lignes MN, NR & QR, & elles augmentent de ces Quantités en devenant Mn, nr & Qr ; or ces Moments ſont entre-eux comme les Fluxions des mêmes Lignes & l'Angle Rsr eſt un Angle droit, donc $\sqrt{\overline{RS^2}+\overline{Sr^2}} = Rr$, ou $\sqrt{\dot{s}^2+\dot{t}^2} = \dot{u}$.



III. Mais il faut deux Equations pour déterminer les Fluxions $\dot{s}$ & $\dot{t}$, l'une pour avoir la Relation entre MN & NR ou s & t ; d'où on tirera la Relation des Fluxions $\dot{s}$ & $\dot{t}$, & l'autre pour avoir la Relation entre MN ou NR de la Figure donnée, & AP ou x de la Figure cherchée ; d'où l'on tirera la Relation de la Fluxion $\dot{s}$ ou $\dot{t}$ à la Fluxion $\dot{x}$ ou 1.

UVA. BHSC. SC 04146

IV. Enſuite ayant trouvé $\dot{u}$, il faudra au moyen d'une troiſiéme Equation donnée ou priſe trouver les Fluxions $\dot{y}$ & $\dot{z}$, ce qui déterminera la longueur PD ou y, après quoi il n'y aura plus qu'à trouver $PC = \frac{1 - \dot{y}\ddot{y}}{\dot{z}}$, $PL = y \times PC$ & $DC = PC - y$, comme dans le Prob. précédent.

V. Exemple 1. Soit $as - ss = tt$ l'Equation à la Courbe donnée QR qui par conſéquent eſt un Cercle ; $xx = az$ l'Equation qui exprime la Relation entre les Lignes AP & MN, & $\frac{2}{3}u = y$, la Relation entre la longueur de la Courbe donnée QR & la droite PD ; la premiere Equation donne $a\dot{s} - 2\dot{s}s = 2\dot{t}t$, ou $\frac{a - 2s}{2t}\dot{s} = \dot{t}$, & de là $\frac{a\dot{s}}{2t} = \sqrt{\dot{s}^2 + \dot{t}^2} = \dot{u}$; par la ſeconde Equation l'on a $2x = a\dot{s}$, & par conſéquent $\frac{x}{t} = \dot{u}$; par la troiſiéme $\frac{2}{3}\dot{u} = \dot{y}$, c'eſt-à-dire, $\frac{2x}{3t} = z$, & de là $\frac{2}{3t}\dot{x} - \frac{2x\dot{t}}{3tt} = \dot{z}$, ce qui étant trouvé vous déterminerez $PC = \frac{1 - \dot{y}\ddot{y}}{\dot{z}}$, $PL = \dot{y} \times PC$ & $DC = PC - y$, ou $PC - \frac{2}{3}QR$; on voit que l'on ne peut avoir la longueur de la Courbe donnée QR ſans connoître en même temps la droite DC, & que cela donne la longueur de la Courbe où ſe trouve le Point C. & *vice verſa*.

VI. Exemple 2. Retenant l'Equation $as - ss = tt$, faites $x = s$ & $uu - 4ax = 4ay$; la premiere Equation donnera comme ci-deſſus $\frac{a\dot{s}}{2t} = \dot{u}$, la ſeconde $1 = \dot{s}$ & par conſéquent $\frac{a}{2t} = \dot{u}$; la troiſiéme $2\dot{u}u - 4a = 4a\dot{y}$, ou $\frac{u}{4t} - 1 = z$ en exterminant $\dot{u}$, & de là $\frac{\dot{u}}{4t} - \frac{u\dot{t}}{4tt} = \dot{z}$.

VII. Exemple 3. Suppoſons trois Equations $aa = st$, $a + 3s = x$, & $x + u = y$; la premiere qui déſigne une Hyperbole donne $0 = \dot{s}t + \dot{t}s$, ou $-\frac{\dot{s}t}{s} = \dot{t}$, & par conſéquent $\frac{\dot{s}}{s}\sqrt{ss + tt} = \sqrt{\ddot{s}\ddot{s} + \ddot{t}\ddot{t}} = \dot{u}$; la ſeconde donne $3\dot{s} = 1$, & $\frac{1}{3\dot{s}}\sqrt{ss + tt} = \dot{u}$; la troiſiéme donne $1 + \dot{u} = \dot{y}$, ou $1 + \frac{1}{3\dot{s}}\sqrt{ss + tt} = z$; ſuppo-

UVA. BHSC. SC 04146

ſons que w repréſente la Fluxion du Radical $\frac{1}{3s}\sqrt{ss+tt}$, nous aurons $\dot{w}=\dot{z}$ & $\frac{1}{3s}\sqrt{ss+tt}=w$, ou $\frac{1}{9}+\frac{tt}{9ss}=ww$, & de la $\frac{2\dot{t}t}{9ss}-\frac{2tt\dot{s}}{9s^3}=2w\dot{w}$; & ſubſtituant $-\frac{\dot{s}t}{s}$ au lieu de $\dot{t}$ & enſuite $\frac{1}{3}$ au lieu de $\dot{s}$, puis diviſant par $2\dot{w}$, nous aurons $-\frac{2tt}{27ws^3}=\dot{w}=\dot{z}$; ainſi $\dot{y}$ & $\dot{z}$ étant trouvées, on fera le reſte comme dans le premier Exemple.

VIII. Si d'un Point quelconque Q d'une Courbe, on laiſſe tomber ſur MN une perpendiculaire QV, & s'il faut trouver une Courbe dont la longueur puiſſe ſe connoître par la longueur de l'Aire QRNV diviſée par une Ligne donnée E, appellez u la longueur $\frac{QRNV}{E}$ & $\dot{u}$ ſa Fluxion. Comme la Fluxion de l'Aire QRNV eſt à la Fluxion de l'Aire du Rectangle E × VN, comme l'Ordonnée NR qui décrit cette Aire eſt à la Ligne E qui décrit l'autre dans le même temps, & que les Fluxions $\dot{u}$ & $\dot{s}$ des Lignes u & MN, s, ou des longueurs de ces Aires diviſées par la Ligne E ſont auſſi dans le même raport, vous aurez $\dot{u}=\frac{\dot{s}t}{E}$, il faut donc chercher par cette Régle la Valeur de $\dot{u}$, & faire le reſte comme dans les Exemples précédents.

IX. Exemple 4. Soit QR une Hyperbole repreſentée par l'Equation $aa+\frac{ass}{c}=tt$, en prenant les Fluxions vous aurez $\frac{\dot{a}ss}{c}=t\dot{t}$, ou $\frac{\dot{a}ss}{ct}=\dot{t}$; ſi pour les deux autres Equations vous faites $x=s$ & $y=u$, la premiere vous donnera $1=\dot{s}$; d'où $\dot{u}=\frac{\dot{s}t}{E}=\frac{t}{E}$, & la ſeconde donne $\dot{y}=\dot{u}$, ou $\dot{z}=\frac{\dot{t}}{E}$ & enſuite $\dot{z}=\frac{\dot{t}}{E}$, ſubſtituant $\frac{\dot{a}ss}{ct}$ ou $\frac{as}{ct}$ pour $\dot{t}$, cette derniere Equation devient $\dot{z}=\frac{as}{Ect}$; $\dot{y}$ & $\dot{z}$ étant donc trouvées faites comme auparavant $CP=\frac{1-\dot{y}\ddot{y}}{\dot{z}}$, & $PL=CP\times\dot{y}$, vous aurez le Point C & la Courbe où il ſe trouve dont vous connoîtrez la longueur par la longueur $DC=CP-u$, comme on l'a fait voir ci-devant.

UVA. BHSC. SC 04146

X. On peut réſoudre ce Problême par une autre Méthode, qui conſiſte à trouver des Courbes dont les Fluxions ſont ou égales à la Fluxion de la Courbe propoſée, ou compoſées de la Fluxion de cette Courbe & d'autres Lignes ; cela peut ſervir quelque fois pour changer des Courbes Mécaniques en Courbes Géometriques uniformes, on peut en voir un Exemple remarquable dans les Lignes Spirales.

XI. Soit AB une droite donnée de poſition, BD un Arc ſe mouvant ſur AB comme ſur une Abciſſe mais retenant toujours le Point A pour ſon Centre, AD*d* une Spirale à laquelle ſe termine continuellement l'Arc BD, *bd* un Arc infiniment près du premier, ou bien le lieu infiniment prochain ou arrive BD ; DC une perpendiculaire à l'Arc *bd*, *d*G la différence des Arcs, AH une autre Courbe égale à la Spirale AD, BH une droite ſe mouvant perpendiculairement ſur AB & terminée à la Courbe AH, *bh* la Ligne infiniment près de BH, & enfin HK une perpendiculaire à *bh*. Dans les Triangles infiniment petits DC*d*, HK*h*, puiſque DC = B*b* = HK, & que par l'Hypotheſe D*d* & H*h* ſont des parties correſpondantes de Courbes égales, c'eſt-à-dire, des Lignes égales, que de plus les Angles C & K ſont droits, les autres côtés *d*C & *h*K des Triangles ſeront auſſi égaux ; & comme AB : BD :: A*b* : *b*C : : A*b* — AB (B*b*) : *b*C — BD (CG), $\frac{BD \times Bb}{AB}$ ſera = CG ôtant cette Quantité de *d*G il reſte *d*G — $\frac{BD \times Bb}{AB}$ = *d*C = *h*K, faites donc AB = z, BD = u, BH = y, & leur Fluxions $\dot{z}$, $\dot{u}$ & $\dot{y}$; B*b*, *d*G & *h*K ſont les Moments contemporains de ces mêmes Lignes, par l'Addition deſquelles elles deviennent A*b*, *bd* & *bh*, ces Moments ſont donc entre-eux comme les Fluxions ; ſubſtituez donc dans la derniere Equation les Fluxions au lieu des Moments & les Lettres pour les Lignes, vous aurez $\dot{u} - \frac{u\dot{z}}{z} = \dot{y}$, & prenant $\dot{z}$ pour l'unité l'Equation ſera $\dot{u} - \frac{u}{z} = \dot{y}$.



XII. La Relation entre AB & BD ou entre z & u étant donc exprimée par une Equation qui détermine la Spirale, la Fluxion $\dot{u}$

UVA. BHSC. SC 04146

ſera donnée, & enſuite la Fluxion y en la faiſant $= \dot{u} - \frac{u}{z}$; puis par le Prob. 2. l'on aura y ou BH, dont $\dot{y}$ eſt la Fluxion.

XIII. Exemple 1. Soit l'Equation à la Spirale d'*Archimede* $\frac{zz}{a} = u$, on aura $\frac{2z}{a} = \dot{u}$, ôtez $\frac{u}{z}$ ou $\frac{z}{a}$ vous aurez $\frac{z}{a} = \dot{y}$, & par le Prob. 2. $\frac{zz}{2a} = y$, ce qui montre que la Courbe AH à laquelle eſt égale la Spirale AD eſt la Parabole d'*Apollonius* dont le Parametre eſt $2a$, ou dont l'Ordonnée BH eſt toujours égale à la moitié de l'Arc BD.

XIV. Exemple 2. Si la Spirale propoſée eſt exprimée par l'Equation $z^3 = au^2$ ou $u = \frac{z^{\frac{1}{2}}}{a^{\frac{1}{2}}}$, vous aurez par le Prob. 1. $\frac{3z^{\frac{1}{2}}}{2a^{\frac{1}{2}}} = \dot{u}$; ôtant $\frac{u}{z}$ ou $\frac{z^{\frac{1}{2}}}{a^{\frac{1}{2}}}$, vous aurez $\frac{z^{\frac{1}{2}}}{2a^{\frac{1}{2}}} = \dot{y}$, & de là par le Prob. 2. $\frac{z^{\frac{1}{2}}}{3a^{\frac{1}{2}}} = y$, c'eſt-à-dire, $\frac{1}{3}$BD $=$ BH, AH étant une Parabole de la ſeconde eſpece.

XV. Exemple 3. Si l'Equation à la Spirale eſt $z\sqrt{\frac{a+z}{c}} = u$; vous aurez par le Prob. 1. $\frac{2a+3z}{2\sqrt{ac+cz}} = \dot{u}$, d'où retranchant $\frac{u}{z}$ ou $\sqrt{\frac{a+z}{c}}$, il nous reſtera $\frac{z}{2\sqrt{ac+cz}} = \dot{y}$, & comme on ne peut trouver par le Prob. 2. la Fluente de $\dot{y}$ qu'en ſuite infinie; je réduis l'Equation à la forme des Equations de la premiere Colonne des Tables en ſubſtituant z^n pour z, ce qui donne $\frac{z^{2n-1}}{2\sqrt{ac+cz^n}} = \dot{y}$, Equation qui appartient à la ſeconde Eſpece du quatriéme Ordre de la Table 1. comparant les Termes j'ai $d = \frac{1}{2}$, $e = ac$, & $f = c$, de ſorte que $\frac{z-2a}{3c}\sqrt{ac+cz} = t = y$, Equation à une Courbe Géometrique AH, dont la longueur égale celle de la Spirale AD.

UVA. BHSC. SC 04146

PROBLEME XII.

Déterminer la longueur des Courbes.

I. DANS le Problême précédent nous avons montré que la Fluxion d'une Ligne Courbe eſt égale à la Racine quarrée de la ſomme des quarrés des Fluxions de l'Abciſſe & de l'Ordonnée perpendiculaire ; en prenant donc la Fluxion de l'Abciſſe pour la meſure uniforme & determinée, ou autrement pour l'unité à laquelle nous puiſſions rapporter les autres Fluxions, & trouvant par l'Equation à la Courbe la Fluxion de l'Ordonnée, nous aurons la Fluxion de la Ligne Courbe, d'où par le Prob. 2. nous déduirons ſa longueur.

II. EXEMPLE 1. Soit propoſée la Courbe FDH exprimée par l'Equation $\frac{z^3}{aa} + \frac{aa}{12z} = y$; faites l'Abciſſe AB $= z$, & l'Ordonnée DB $= y$; l'Equation vous donnera $\frac{3zz}{aa} - \frac{aa}{12zz} = \dot{y}$, en ſuppoſant que la Fluxion de z eſt 1. Ajoutant donc les quarrés des Fluxions la ſomme ſera $\frac{9z^4}{a^4} + \frac{1}{2} + \frac{a^4}{144z^4} = \ddot{t}t$, & tirant la Racine $\frac{3zz}{aa} + \frac{aa}{12zz} = \dot{t}$, & de la par le Prob. 2. $\frac{z^3}{aa} - \frac{aa}{12z} = t$. $\dot{t}$ eſt ici la Fluxion de la Courbe & t ſa longueur.



III. Si l'on demandoit donc la longueur dD d'une partie quelconque de cette Courbe ; des Points d & D abaiſſez ſur AB les perpendiculaires db & DB, & dans la Valeur de t ſubſtituez au lieu de z les Quantités AB & Ab, la différence des Réſultats ſera dD la longneur cherchée, comme ſi A$b = \frac{1}{2}a$ & AB $= a$, en écrivant $\frac{1}{2}a$ pour z, t devient $= -\frac{a}{24}$, enſuite écrivant a pour z, t devient $= \frac{11a}{12}$, la différence $\frac{23a}{24}$ de ces deux Valeurs eſt égale à la longueur dD ; ou ſi Ab étant $\frac{1}{2}a$, AB eſt regardée comme indéterminée, on aura $\frac{z^3}{aa} - \frac{aa}{12z} + \frac{a}{24}$ pour la Valeur de dD.

UVA. BHSC. SC 04146

IV. Pour connoître la partie de Courbe que t exprime, égalez à zero la Valeur de t, vous aurez $z^4 = \frac{a^4}{12}$ ou $z = \frac{a}{\sqrt[4]{12}}$; ſi vous prenez donc $Ab = \frac{a}{\sqrt[4]{12}}$, & ſi vous élevez la perpendiculaire bd la longueur de l'Arc dD ſera t ou $\frac{z^3}{aa} - \frac{aa}{12z}$. La même choſe doit s'entendre de toutes les Courbes en général.

V. De l'Equation $\frac{z^4}{a^3} + \frac{a^3}{32z^2} = y$. On déduira de la même maniere $t = \frac{z^4}{a^3} - \frac{a^3}{32z^2}$; & de l'Equation $\frac{z^{\frac{5}{2}}}{a^{\frac{1}{2}}} - \frac{1}{3}a^{\frac{1}{2}}z^{\frac{1}{2}} = y$, on tirera $t = \frac{z^{\frac{3}{2}}}{a^{\frac{1}{2}}} + \frac{1}{3}a^{\frac{1}{2}}z^{\frac{1}{2}}$; & en general de $cz^\theta + \frac{z^{2-\theta}}{4\theta\theta c - 8\theta c} = y$, ou θ repréſente un nombre quelconque entier ou rompu, on déduira $cz^\theta - \frac{z^{2-\theta}}{4\theta\theta c - 8\theta c} = t$.

VI. Exemple 2. Si la Courbe propoſée eſt exprimée par l'Equation $\frac{2aa + 2zz}{3aa}\sqrt{aa + zz} = y$, vous aurez par le Prob. 1. $\dot{y} = \frac{4a^4z + 8a^2z^3 + 4z^5}{3a^4y}$, & en exterminant y, $\dot{y} = \frac{2z}{aa}\sqrt{aa + zz}$, ajoutez 1 au quarré de cette Quantité la ſomme ſera $1 + \frac{4zz}{aa} + \frac{4z^4}{a^4}$, & ſa Racine $1 + \frac{2zz}{aa} = \dot{t}$; d'où par le Prob. 2. $z + \frac{2z^3}{3a^2} = t$.

VII. Exemple 3. Soit propoſée une Parabole de la ſeconde Eſpece dont l'Equation eſt $z^3 = ay^2$ ou $\frac{z^{\frac{3}{2}}}{a^{\frac{1}{2}}} = y$; par le Prob. 1. vous aurez $\frac{3z^{\frac{1}{2}}}{2a^{\frac{1}{2}}} = \dot{y}$, & par conſéquent $\sqrt{1 + \frac{9z}{4a}} = \sqrt{1 + \ddot{y}\dot{y}} = \dot{t}$; & comme la longueur de la Courbe ou la Fluente de $\dot{t}$ ne peut pas ſe trouver ici autrement que par une ſuite infinie, conſultez les Tables & vous aurez $t = \frac{8a + 18z}{27}\sqrt{1 + \frac{9z}{4a}}$; vous pourrez de la même façon trouver les longueurs des Paraboles $z^5 = ay^4$, $z^7 = ay^6$, $z^9 = ay^8$, &c.

VIII. Exemple 4. Soit propoſée la Parabole dont l'Equation eſt $z^4 = ay^3$ ou $\frac{z^{\frac{4}{3}}}{a^{\frac{1}{3}}} = y$, on aura $\frac{4z^{\frac{1}{3}}}{3a^{\frac{1}{3}}} = \dot{y}$ & par conſéquent $\sqrt{1 + \frac{16z^{\frac{2}{3}}}{9a^{\frac{2}{3}}}} = \sqrt{\ddot{y}\dot{y} + 1} = \dot{t}$; ainſi je conſulte les Tables & la comparaiſon du ſecond Theoreme du 5e Ordre de la Table 2. me donne $z^{\frac{1}{3}} = x$,

UVA. BHSC. SC 04146

$\sqrt{1+\frac{16xx}{9a^{\frac{2}{3}}}} = u$ & $\frac{3}{2}s = t$; x marque l'Abciſſe, y l'Ordonnée, s l'Aire de l'Hyperbole, & t la longueur de l'Aire $\frac{3}{2}s$ diviſée par l'unité lineaire.

IX. On peut de la même maniere réduire à l'Aire de l'Hyperbole les longueurs des Paraboles $z^6 = ay^5$, $z^8 = ay^7$, $z^{10} = ay^9$, &c.

X. Exemple 5. Soit propoſée la Ciſſoïde des Anciens dont l'Equation eſt $\frac{aa-2az+zz}{\sqrt{az-zz}} = y$, vous aurez $\frac{-a-2z}{2zz}\sqrt{az-zz} = \dot{y}$, & par conſéquent $\frac{a}{2z}\sqrt{\frac{a+3z}{z}} = \sqrt{\dot{y}\dot{y}+1} = \dot{t}$, & mettant z^n pour $\frac{1}{z}$ ou z^{-1}, $\dot{t}$ ſera $= \frac{a}{2z}\sqrt{az^n+3}$, Equation de la premiere Eſpece du 3e Ordre de la Table 2. comparant les Termes $\frac{a}{2} = d$, $3 = e$, & $a = f$, de ſorte que $z = \frac{1}{z^n} = x^2$, $\sqrt{a+3xx} = u$, & $6s - \frac{2u^3}{x} = \frac{4de}{nf} \times \frac{u^3}{2ex} - s = t$, prenant a pour l'unité par la Multiplication ou Diviſion de laquelle ces Quantités puiſſent ſe réduire à un nombre juſte de Dimenſions, il vient $az = xx$, $\sqrt{aa+3xx} = u$, & $\frac{6s}{a} - \frac{2u^3}{ax} = t$, ce qui ſe conſtruit ainſi.

XI. Soit VD la Ciſſoïde, AV le Diametre de ſon Cercle, AF ſon Aſymptote & DB une perpendiculaire ſur AV coupant la Courbe en D. Avec le demi Axe AF = AV & le demi Parametre AG = ¼AV ſoit décrite l'Hyperbole F*k*K ; prenez AC moyenne proportionelle entre AB & AV ; ſur AV aux Points C & V, tirez les perpendiculaires C*k* & VK qui coupent l'Hyperbole en K & *k* ; à ces Points tirez les Tangentes KT & *kt* qui coupent AV en T & en *t*, ſur AV décrivez le Rectangle AVNM égal à l'Eſpace TK*kt* la longueur de la Ciſſoïde VD ſera Sextuple de la hauteur VN.



XII.

UVA. BHSC. SC 04146

EXEMPLE 6. Supposons que A*d* soit une Ellipse dont l'Equation est $\sqrt{az - 2zz} = y$, soit proposée une Courbe Mécanique AD d'une nature telle que si B*d* ou *y* est prolongée jusqu'à-ce qu'elle rencontre cette même Courbe en D, BD soit égal à l'Arc Elliptique A*d*. Pour en trouver la longueur je prends la Fluxion $\frac{a - 4z}{2\sqrt{az - 2zz}} = \dot{y}$, de l'Equation $\sqrt{az - 2zz} = y$, j'ajoute l'unité au quarré de cette Fluxion & j'ai $\frac{aa - 4az + 8zz}{4az - 8zz}$, ce qui est le quarré de la Fluxion de l'Arc A*d*; ajoutez encore l'unité vous aurez $\frac{aa}{4az - 8zz}$ dont la Racine quarrée est $\frac{a}{2\sqrt{az - 2zz}}$ est la fluxion de la Ligne Courbe AD.; si vous tirez *z* hors du Signe Radical & si pour z^{-1} vous écrivez z^n, vous aurez $\frac{a}{2z\sqrt{az^n - 2}}$ Fluxion de la premiere Espece du 4e Ordre de la Table 2. comparant donc les Termes $d = \frac{1}{2}a$, $e = -2$, & $f = a$, de sorte que $z = \frac{1}{z^n} = x$, $\sqrt{ax - 2xx} = u$, & $\frac{8s}{a} - \frac{4xu}{a} + u = \frac{8de}{nff} \times s - \frac{1}{2}xu - \frac{fu}{4e} = t$, ce qui se construit ainsi.



XIII. Ayant tiré au Centre de l'Ellipse la Ligne droite *d*C, faites sur AC un Parallelogramme égal au Secteur AC*d*, le double de sa hauteur sera la longueur de la Courbe AD.

UVA. BHSC. SC 04146

XIV. Exemple 7. Faisant $A\beta = \varphi$ (*Fig.* 1.) & $\alpha\delta$ étant une Hyperbole dont l'Equation est $\sqrt{-a+b\varphi\varphi} = \beta\rho$, & sa Tangente δT étant supposée tirée, soit proposée la Courbe VdD, dont l'Abcisse AB est $\frac{1}{\varphi\varphi}$, l'Ordonnée perpendiculaire est la longueur BD produite par l'Aire $\alpha\delta T\alpha$ divisée par l'unité ; pour déterminer la longueur de cette Courbe VD, je cherche la Fluxion de l'Aire $\alpha\delta T\alpha$, en supposant que AB flue uniformément



& je trouve que cette Fluxion est $\frac{a}{4bz}\sqrt{b-az}$, AB étant $= z$ & sa Fluxion $= 1$; car $AT = \frac{a}{b\varphi} = \frac{a}{b}\sqrt{z}$ & sa Fluxion $= \frac{a}{2b\sqrt{z}}$ dont la moitié multipliée par la hauteur $\beta\delta$ ou $\sqrt{-a+\frac{b}{z}}$ est la Fluxion de l'Aire $\alpha\delta T$ décrite par la Tangente δT, cette Fluxion est donc $\frac{a}{4bz}\sqrt{b-az}$, & étant divisée par l'unité elle devient la Fluxion de l'Ordonnée BD. Au quarré $\frac{aab-a^3z}{16b^2z^2}$ de cette Fluxion, ajoutez 1 & vous aurez $\frac{aab-a^3z+16b^2z^2}{16b^2z^2}$ dont la Racine $\frac{}{4bz}\sqrt{a^2b+a^3z+16b^2z^2}$ est la Fluxion de la Courbe VD ; cette Fluxion est de la premiere Espece du 7e Ordre de la Table 2. comparant les Termes on aura $\frac{1}{4b} = d$, $aab = e$, $-a^3 = f$, $16b^2 = g$, & par conséquent $z = x$ & $\sqrt{a^2b-a^3x+16b^2x^2} = u$ Equation à une Section Conique comme HG (*Fig.* 2.) dont l'Aire EFGH est s, si $EF = x$ & $FG = u$. On aura aussi $\frac{1}{z} = \xi$ & $\sqrt{16bb-a^3\xi+ab\xi^2} = \Upsilon$, Equation à une autre Section Conique comme ML (*Fig.* 3.) dont l'Aire IKLM est σ si $IK = \xi$ & $KL = \Upsilon$, enfin $t = \frac{2aabb\xi\Upsilon-a^3b\Upsilon-a^4u-4aabb\sigma-32abbs}{64b^4-a^4}$.

UVA. BHSC. SC 04146

XV. Pour trouver donc la longueur d'une partie quelconque D*d* de la Courbe VD, abaiſſez ſur AB la perpendiculaire *db*, faites A*b* = *z* & au moyen de ce qui eſt trouvé cherchez la Valeur de *t*; enſuite faites AB = *z* & cherchez encore la Valeur de *t*, la difference de ces deux Valeurs de *t* ſera la longueur cherchée D*d*.

XVI. Exemple 8. Soit propoſée l'Equation à l'Hyperbole $\sqrt{aa+bzz} = y$, ce qui donne $\dot{y} = \frac{bz}{y}$ ou $\frac{bz}{\sqrt{aa+bzz}}$, au quarré de cette Quantité ajoutez l'unité, la Racine de la ſomme ſera $\sqrt{\frac{aa+bzz+bbzz}{aa+bzz}} = \dot{t}$; comme cette Fluxion ne ſe trouve pas dans les Tables je la réduis à une ſuite infinie, & par la Diviſion d'abord elle devient $\dot{t} = \sqrt{1 + \frac{b^2}{a^2}z^2 - \frac{b^3}{a^4}z^4 + \frac{b^4}{a^6}z^6 - \frac{b^5}{a^8}z^8}$, &c. & en tirant la Racine, $\dot{t} = 1 + \frac{b^2}{2a^2}z^2 - \frac{4b^3+b^4}{8a^4}z^4 + \frac{8b^4+4b^5+b^6}{16a^6}z^6$, &c. d'où par le Prob. 2. on tire la longueur de l'Arc Hyperbolique $t = z + \frac{b^2}{6a^2}z^3 - \frac{4b^3+b^4}{40a^4}z^5 + \frac{8b^4+4b^5+b^6}{112a^6}z^7$, &c

XVII. Si l'on propoſoit l'Equation à l'Ellipſe $\sqrt{aa-bzz} = y$, il faudroit changer par tout le Signe de *b* & on auroit alors $z + \frac{b^2}{6a^2}z^3 + \frac{4b^3-b^4}{40a^4}z^5 + \frac{8b^4-4b^5+b^6}{112a^6}z^7$, &c. pour la longueur de l'Arc. En mettant l'unité pour *b* l'on aura $z + \frac{z^3}{6a^2} + \frac{3z^5}{40a^4} + \frac{5z^7}{112a^6}$, &c. pour la longueur de l'Arc circulaire. On trouvera des Coëfficiens numériques de cette ſuite à l'infini, en multipliant continuellement les Termes de cette Progreſſion $\frac{1\times1}{2\times3}, \frac{3\times3}{4\times5}, \frac{5\times5}{6\times7}, \frac{7\times7}{8\times9}, \frac{9\times9}{10\times11}$.

XVIII. Exemple 9. Enfin ſoit propoſée la Quadratrice VDE dont le ſommet eſt V, A le Centre & AV le demi Diametre de ſon Cercle, & l'Angle VAE ſoit un Angle droit; du Point A tirez une droite quelconque AKD qui coupe le Cercle en K & la Quadratrice en D; ſur AE abaiſſez les perpendiculaires KG, DB; faites AV = *a*, AG = *z*, VK = *x* & DB = *y*, vous aurez comme dans l'Exemple précédent $x = z + \frac{z^3}{6a^2} + \frac{3z^5}{40a^4} + \frac{5z^7}{112a^6}$, tirez la Racine *z* & vous aurez $z = x - \frac{x^3}{6a^2} + \frac{x^5}{120a^4} - \frac{x^7}{5040a^6}$, &c. ôtez de AK*q*



UVA. BHSC. SC 04146

ou a^2 le quarré de cette Quantité, la Racine $a - \frac{x^2}{2a} + \frac{x^4}{24a^3} - \frac{x^6}{720a^5}$ du reſte ſera $=$ GK ; mais comme par la nature de la Quadratrice AB $=$ VR $= x$, & comme AG : GK : : AB : BD, y ; diviſez AB $\times$ GK par AG vous aurez $\dot{y} = a - \frac{xx}{3a} - \frac{x^4}{45a^3} - \frac{2x^6}{945a^5}$, &c. d'où $\dot{y} = 1 - \frac{2x}{3a} - \frac{4x^3}{45a^3} - \frac{4x^5}{315a^5}$, &c. ajoutez l'unité au quarré de cette Quantité, tirez la Racine de la ſomme il vous vient $1 + \frac{2xx}{9aa} + \frac{14x^4}{405a^4} + \frac{604x^6}{127575a^6}$, &c. $= \dot{t}$, d'où t ou l'Arc de la Quadratrice

VD $= x + \frac{2x^3}{27a^2} + \frac{14x^5}{2835a^4} + \frac{604x^7}{893025a^6}$ &c.





UVA.-BHSC. SC 04146

Extrait des Regiſtres de l'Académie Royale des Sciences, du 23. Décembre 1738.

MESSIEURS de Maupertuis & Clairaut qui avoient été nommés pour examiner la Traduction d'un Traité Anglois de M. Newton ſur *la Méthode des Fluxions, par M.* DE BUFFON, en ayant fait leur rapport, la Compagnie a jugé que cet excellent Ouvrage méritoit un Traducteur auſſi intelligent; en foi de quoi j'ai ſigné le préſent Certificat. A Paris ce 21. Mai 1740.

FONTENELLE, Sec. perp. de l'Ac. Roy. des Sc.

PRIVILEGE DU ROY.

LOUIS par la grace de Dieu Roi de France & de Navarre: A nos amez & feaux Conſeillers, les Gens tenans nos Cours de Parlement, Maîtres des Requêtes ordinaires de notre Hôtel, Grand'Conſeil, Prevôt de Paris, Baillifs, Sénéchaux, leurs Lieutenans Civils & autres nos Juſticiers, qu'il appartiendra, SALUT. Notre ACADEMIE ROYALE DES SCIENCES Nous a très-humblement fait expoſer, que depuis qu'il Nous a plû lui donner par un Réglement nouveau de nouvelles marques de notre affection, Elle s'eſt appliquée avec plus de ſoin à cultiver les Sciences, qui ſont l'objet de ſes exercices; enſorte qu'outre les Ouvrages qu'Elle a déja donné au Public, Elle ſeroit en état d'en produire encore d'autres, s'il Nous plaiſoit lui accorder de nouvelles Lettres de Privilege, attendu que celles que Nous lui avons accordées en date du ſix Avril 1693. n'ayant point eu de tems limité, ont été déclarées nulles par un Arrêt de notre Conſeil d'Etat, du 13. Août 1704. celles de 1715. & celles de 1717. étant auſſi expirées; & déſirant donner à notredite Academie en corps, & en particulier, & à chacun de ceux qui la compoſent toutes les facilités & les moyens qui peuvent contribuer à rendre leurs travaux utiles au Public; Nous avons permis & permettons par ces préſentes à notredite Académie, de faire vendre ou débiter dans tous les lieux de notre obéiſſance, par tel Imprimeur ou Libraire qu'Elle voudra choiſir, *Toutes les Recherches ou Obſervations journalieres, ou Relations annuelles de tout ce qui aura été fait dans les aſſemblées de notredite Académie Royale des Sciences; comme auſſi les Ouvrages, Mémoires, ou Traités de chacun des particuliers qui la compoſent, & généralement tout ce que ladite Académie voudra faire paroître, après avoir fait examiner leſdits Ouvrages, & jugé qu'ils ſont dignes de l'impreſſion;* & ce pendant le tems & eſpace de quinze années conſécutives, à compter du jour de la date deſdites préſentes. Faiſons défenſes à toutes ſortes de perſonnes de quelque qualité & condition qu'elles ſoient d'en introduire d'impreſſion étrangere dans aucun lieu de notre obéiſſance; comme auſſi à tous Imprimeurs, Libraires, & autres, d'imprimer, faire imprimer, vendre, faire vendre, débiter ni con-

UVA. BHSC. SC 04146

trefaire aucun desdits Ouvrages ci-dessus spécifiés, en tout ni en partie, ni d'en faire aucuns Extraits, sous quelque prétexte que ce soit, d'augmentation, correction, changement de titre, feuilles même séparées, ou autrement, sans la permission expresse & par écrit de notredite Académie, ou de ceux qui auront droit d'elle, & sans cause, à peine de confiscation des Exemplaires contrefaits, de dix mille livres d'amende contre chacun des Contrevenans, dont un tiers à Nous, un tiers à l'Hôtel-Dieu de Paris, l'autre tiers au Dénonciateur, & de tous dépens, dommages & interêts : à la charge que ces présentes seront enregistrées tout au long sur le Registre de la Communauté des Imprimeurs & Libraires de Paris, dans trois mois de la date d'icelles ; que l'impression desdits Ouvrages sera faite dans notre Royaume & non ailleurs, & que notredite Académie se conformera en tout aux Réglemens de la Librairie, & notamment à celui du 10. Avril 1725. & qu'avant que de les exposer en vente, les manuscrits ou imprimés qui auront servi de copie à l'impression desdits Ouvrages, seront remis dans le même état, avec les approbations ou certificats qui auront été donnés, ès mains de notre très-cher & féal Chevalier Garde des Sceaux de France, le Sieur Chauvelin ; & qu'il en sera ensuite remis deux Exemplaires de chacun dans notre Bibliotheque publique, un dans celle de notre Château du Louvre, & un dans celle de notre très-cher & féal Chevalier Garde des Sceaux de France le Sieur Chauvelin : le tout à peine de nullité des présentes; du contenu desquelles vous mandons & enjoignons de faire jouir notredite Académie ou ceux qui auront droit d'Elle & ses ayans cause, pleinement & paisiblement, sans souffrir qu'il leur soit fait aucun trouble ou empêchement : Voulons que la copie desdites présentes qui sera imprimée tout au long au commencement ou à la fin desdits Ouvrages, soit tenuë pour dûement signifiée, & qu'aux copies collationnées par l'un de nos amez & feaux Conseillers & Sécretaires foi soit ajoutée comme à l'Original : Commandons au premier notre Huissier ou Sergent de faire pour l'exécution d'icelles tous actes requis & nécessaires, sans demander autre permission, & nonobstant clameur de Haro, Chartre Normande & Lettres à ce contraires : Car tel est notre plaisir. Donné à Fontainebleau le douziéme jour du mois de Novembre, l'an de grace 1734. & de notre Regne le vingtiéme, Par le Roy en son Conseil. *Signé*,

SAINSON.

Registré sur le Registre VIII. *de la Chambre Royale & Syndicale des Libraires & Imprimeurs de Paris, num.* 792. *fol.* 775. *conformément aux Réglemens de* 1723. *qui font défenses, Art. IV. à toutes personnes de quelque qualité & condition qu'elles soient, autres que les Libraires & Imprimeurs, de vendre, débiter, & faire afficher aucuns Livres pour les vendre en leur nom, soit qu'ils s'en disent les Auteurs ou autrement, & à la charge de fournir les Exemplaires prescrits par l'Art. CVIII. du même Réglement. A Paris le* 15. *Novembre* 1734. G. MARTIN, *Syndic.*

UVA. BHSC. SC 04146

UVA. BHSC. SC 04146

UVA. BHSC. SC 04146

UVA-BHSC-SC 04146

Biblioteca

UVA. BHSC. SC 04146

NEW
METH
DES
FLV

ioteca de Santa Cr

UVA. BHSC. SC 04146



UVA. BHSC. SC 04146

UVA. BHSC. SC 04146

UVA. BHSC. SC 04146