

Síntomas en la


VASCULITIS DE BEHÇET (ojo: NO BEÇHET)

Infografías para la asignatura Patología Médico Quirúrgica del Aparato Locomotor (5º curso) UVa

1 Afectación de mucosas



NO dejan cicatriz



Borde sobrelevado

SÍ dejan cicatriz

Úlceras orales (dolorosas) **90%** Úlceras genitales **75%**

3 Afectación ocular



25-75%
Uveitis (cualquier localización)
Vasculitis retina
Hipopion

4 Vascular **33%**



Trombosis venosa o arterial

Vasculitis de vasos pequeños, grandes o medianos

5 Artritis **30-50%**



No erosiva asimétrica

Rodilla, muñeca, codo


6 Afectación **10-20%** neurológica (SNC)



afectación SNC, cerebro, médula, mielopatía (Encefalopatía, hemiparesia, epilepsia,...)

7 Gastro-intestinal **<10%**

Dolor abdominal
Diarrea
Sangrado digestivo
Úlceras
Perforaciones



2 Lesiones cutáneas **75%**

Pseudofoliculitis (estériles)



Lesiones purpúricas



Eritema nodoso



Úlceras cutáneas

No son vasculares. Son por la propia enfermedad

Test de patergia cutáneo

En el antebrazo del paciente

Clavar una aguja gruesa (20-21g) a 45° a 2-3 mm de profundidad

y luego retirar torsionando ligeramente a derecha e izquierda

Repetir hasta hacer unas 2 a 6 marcas de punción (señaladas con rotulador)

Pasadas 48h comprobar si alguna de las punciones ha desarrollado una PÁPULA o una PÚSTULA

Algunos autores proponen la administración intradérmica de suero, en vez del simple pinchazo, pero no está demostrado que esta práctica tenga mayor utilidad

48 h

Rara vez es frecuente en nuestro medio

+ Epidemiología (ruta de la seda, mediterráneo)

+ HLA-B51 35-60%

+ Biopsiar

by Tutorcylo V1.0 Septiembre 2023