

Síntomas en la ESCLEROSIS SISTÉMICA (ESCLERODERMIA)

Infografías para la asignatura Patología Médico Quirúrgica del Aparato Locomotor (5º curso) UVa

1 Afectación cutánea ≈100%

Prurito, edema, cambios color piel, sin vello, esclerodactilia, calcinosis, úlceras en pulpejos,...

Esclero-Dermia "piel-dura"

Afectación cutánea Limitada Difusa

Microstomía, telangiectasias

3 Síntomas musculoesqueléticos >90%

Artralgia, mialgia, fatiga
Artritis, tendinitis

4 Afectación digestiva 90%

La mitad sin síntomas

Disfagia, pirosis, reflujo, estreñimiento/diarrea,...

2 Afectación vascular 85-95%

* <10% de pacientes con Raynaud desarrollan Esclerodermia

Fenómeno de Raynaud

Exposición al frío o a emociones

Normal → Palidez → Cianosis → Enrojecido (hiperemia reactiva)

Para confirmar un fenómeno de Raynaud se necesitan al menos 2 fases (no vale solo con la palidez)

Afectación lecho ungual (capilaroscopia)

5 Afectación pulmonar 80%

Muchos sin síntomas al diagnóstico

Hipertensión pulmonar Enf. intersticial pulmonar

Afectación cutánea Limitada Difusa

6 Afectación cardíaca 80%

En necropsias

Fibrosis o infl. del miocardio
Pericarditis, trast. conduc.

+ Sarcopenia, pérdida de peso, disfunción sexual

7 Afectación renal 60-80%

En necropsias 10-15% crisis renal

Crisis renal (HTA, FRA)
Afectación cutánea Limitada Difusa