

# Síntomas en la ARTRITIS REUMATOIDE

Infografías para la asignatura Patología Médico Quirúrgica del Aparato Locomotor (5º curso) UVa

## 1 Afectación articular ≈ 100%

**Presentación CLÁSICA:** (la más frecuente, de forma progresiva)  
 Afectación BILATERAL y SIMÉTRICA de pequeñas articulaciones en la mano: a) interfalángicas proximales y b) metacarpo falángicas (infrecuente en interfalángica distal), c) de la muñeca y d) del antepié (metatarsofalángicas).  
 Suele iniciarse en articulaciones periféricas y progresa de forma lenta a afectación proximal (codos, hombros, tobillos, rodillas)

### Otras formas de presentación menos habituales

**Presentación Palindrómica 15-20%**  
 Afectación de distintas articulaciones, no simétrica, en brotes de corta duración (horas o días). Con periodos asintomáticos de meses entre los episodios.

**Presentación Aguda 8-15%**  
 Más en personas mayores. Cuadro de horas o días de instauración (se podría confundir con una polimialgia reumática o un brote de artritis por cristales)

**Presentación Mono/oligoarticular**  
 Afectación únicamente de una o varias articulaciones, a veces de gran tamaño (rodilla,...), asimétrica.  
**Artritis Indiferenciada**

## \* Síntomas articulares

- Dolor**
- Enrojecimiento**
- Tumefacción** (edema peri-articular)
- Rigidez** (>1h, mañanas)
- Adormecimiento**
- Deformidad** (pacientes evolucionados y sin respuesta al tratamiento)

## 2 Síntomas generales 40-70%

Astenia, algias, rigidez, fiebre, pérdida de peso

## 3 Nódulos 30% reumatoideos

Indolores y de consistencia firme. Zonas de roce (olécranon, dorso de manos, T. Aquiles), también órganos como el pulmón, pleura, esclera.

## 4 Pulmonar y cardíaca 10-20%

Enf. Pulmonar intersticial (5%)  
 Derr. pleural  
 Bronquiectasias  
 Pericarditis

## 5 Neurológico 10%

Neuropatía por atrapamiento (tuneles carpiano, tarsiano) Vasculitis-polineuritis, Luxación atloaxoidea (<10%)

## 6 Ocular

Queratoconjuntivitis seca 40%  
 Epiescleritis  
 Escleritis (1-2%)

## 7 Hematológico

Anemia N N. 40%  
 Leucopen S. Felty. <1%

+ Ac Pep Citru. 70-75%  
 + Fact Reumat 70-75%

+ ↑PCR/VSG

Otros:  
 \*\*Osteoporosis (30%)  
 \*\*Amiloidosis (7-26%)  
 \*\*Vasculitis (1%)

