

PARCHES DE FENTANILO



Opioides fuertes o analgesicos mayores

- Amplia ventana terapéutica
- No techo analgésico
- Más analgesia
- Menos efectos secundarios limitantes

Reacción adversa grave: somnolencia o lentitud al respirar

Antes de empezar el tratamiento se debe informar:

- Al médico de todos los medicamentos que esta tomando con o sin receta.
- A los paciente, de que este medicamento esta contraindicado en caso de embarazo y durante su búsqueda.
- Como utilizar los parches y que dosis se debe poner nunca debe de autoajustarse la dosis.
- Debe conocer todos las posibles Reacciones adversas.



Durante la administración del medicamento

- Dosis exacta y NUNCA cortar los parches
- Cambiar parche cada 3 días a la misma hora
- Retirar parche viejo antes de poner el nuevo
- Rotar zonas (tronco o brazos)
- Comprobar que la piel no tenga heridas y este seca.
- Comprobar que el sobre no esta dañado antes de ponerlo
- Los parches son resistentes al agua.
- No se deben de exponer al sol ni al calor
- Si olvida quitarse el parche quítelo cuando se acuerde.
- Si se le despega ponga uno nuevo en una zona diferente.
- No suspender ningún medicamento por cuenta propia ni de forma brusca
- Si tiene dudas consultar con su medico
- Mantener el medicamento en un lugar seguro.

Posibles reacciones adversas

Acudir a urgencias si presenta alguno de estos síntomas

- Dificultad para mantenerse despierto, caminar, pensar o respirar, mareos, respiración o latidos lentos.

Otros síntomas

- Mareos, estreñimiento



Control de efectos secundarios

- Metoclopramida (Primperán)--> Nauseas
- Naloxona --> Estreñimiento

