nº 109
123

UVA. BHSC. IyR_006_1

UVA. BHSC. IyR_006_1

2380

UVA. BHSC. IyR_006_1

UVA. BHSC. IyR_006_1

133

III

Ugonis ſenẽſis ſuper quarta Fen Primi Aui. pre
clara expoſitio: cũ annotatõib⁹ Jacobi de partib⁹

BIBLIOTECA DE LA UNIVERSIDAD
VALLADOLID

UVA. BHSC. IyR_006_1

Aloyſius comēſis ꝛ Bartholomeus Troctus ſocij Magnifico ꝛ preſtātiſſimo Ambroſio Variſio Roſati Comiti Ducali Phiſico ꝛ cōſiliario digniſſimo. Salutē.

Moris fuit veteris ꝛ antiqui Ambroſi magnifice vt artifices opera ſua deo alicui dedicarēt ſub cuius eēnt tutela. Quo fit vt Apollini carmina poete: Marti arma equites offerrēt. Nos vero nefas ꝛ piaculū putauimꝰ: ſique in medicina ꝓdierint in lucē tuo nomini nō inſcriberent. Tu enim poſt admirabilē peritiā Aſtrologie vtrāqz partē Medicine ita foues ꝛ illuſtras: vt dignus ſis noſtro ſeculo ab omibus venerari. Oſtendit Medicina ꝛ Aſtrologia in te vno mirificos ſuos fructus: qui meruiſti a Ludouico īuictiſſimo Mediolani Duce ampliſſimas aſſequi dignitates: qui ad Comitatū patrie tue es ꝓuectus. Sed dolemus ꝙ facultas in preſentia data nō ſit ad tuas ſingulares laudes amplificādas. Accipies ergo hylari fronte Vgonē Senēſē ſuꝑ quarta primi pricipis Aui. Cui multa addita ſunt Nicolai Scyllacij Siculi philoſophiā Papie interpretātis: ꝛ Franciſci de la turre de ſancta Victoriria Marchiani Artiū ꝛ Medicine Doctoꝝ induſtria ꝛ emendatione: ex his que Jacobus de partibꝰ ſcriptis reliquerat: queqz illuſtres alij ſcriptores elucubrauerant: Ita tamē hec accipias veluti primitias rerū noſtrarū: poſtea ſique in manus venerint: nomen tuū feliciori omine reſonabūt. Vale Ex Papia.

UVA. BHSC. IyR_006_1

Ugonis ſenenſis preclari viri Cōmentaria ſup Quarta Primi Auicēne cū annotatiōibus quibuſdã Jacobi de partibus ⁊ alioꝝ ī margine locatis.

Dicemus ꝙ res medicationis ex vna triuꝫ reꝝ ↄpletur. vna earū eſt regimē ⁊ nutriētia: ⁊ alia medicinarum exhibitio: ⁊ tertia eſt operatio manualis.

¶ Jſta eſt quarta fen primi cañ. Auic. in qua determinaṫ de modis cure generaliter. Que ideo poniṫ in fine primi cañ. q₂ in primis duabus fen Auic. determinauit de rebus ꝑtinētibus ad partē theoricã medicine. Jn 3ª de reb⁹ ꝑtinētib⁹ ad partē practicaꝫ pro reginine ſanoꝝ. Reſtabat in vltimo illam partē ponere que generaliter determinaret pertinētia ad partem practicam curatiuã. ¶ Et iſta pars diuidiṫ in duas partes. Primo facit hoc valde generaliter. ſcdo min⁹. ſcda ibi: in principio ſequentis capituli. Que eaꝝ ē ſine materia. ¶ Preſens capitulū diuidiṫ ī duas partes. Primo ponitur vna diuiſio inſtrumētoꝝ artis curatiue. ſcdo mēbra diuiſionis declarãtur. ibi ſcda: regimen autē. ¶ Dicit primo ꝙ res medicatōis cōpletur ex vna trium reruꝫ. Quaꝝ vna eſt regimē ⁊ nutrientia. Scda eſt exhibitio medicinaꝝ. Tertia eſt opatio manualis. ¶ Ubi primo notandū ꝙ per res medicationis debemus intelligere fineꝫ in medicãdo intentū qui eſt ſanitatis acquiſitio ⁊ morbi remotio. ¶ Nota ſcdo ꝙ medicatio qñqꝫ ſumiṫ pro omni actione medici ſiue in ↄſeruãdo ſanū: ſiue in preſeruãdo neutrū: ſiue curãdo egrū. Scdo ſumitur ſtricte pro curatione egroꝝ: ⁊ hoc modo ſumiṫ hic. ¶ Differētiaꝫ autē inter preſeruationē ⁊ cōſeruationē vide. ſ. in prin. fen tertie. ¶ Sumiṫ etiã tertio medicatio ꝓ adminiſtratiōe farmaci laxatiui: vt prima afforiſmoꝝ. Digeſta medicari. Sed ad ꝓpoſitū nō capiṫ ſic. ¶ Tertio nota ꝙ ille finis acquiriṫ a medico: aut ꝑ regimē ⁊ nutriētia: aut per exhibitionē medicinarū: aut per operationē manualē. ſ. per quã aliquid operaṫ incidēdo: ſuendo: vel ligando: ⁊ talia faciēdo: ⁊ ſic dicemus ꝙ res medicatōis ex vna iſtaꝝ triū rerū ↄpleṫ. ¶ Nota quarto ꝙ qñqꝫ vna iſtaꝝ ſufficit: qñqꝫ due: qñqꝫ omnes tres requiruntṫ. Et eſt intelligendū ꝙ vna aut duab⁹: aut omnibus cōpletur. ¶ Nota q̄nto ꝙ hoc nomē regimen qñqꝫ ſumiṫ in medicina pro omni opatione medici: ꝑ quã regit corpus humanū. ⁊ hoc modo ſumiṫ primo regiminis acutoꝝ: ↄmento 21° ſiue illud fiat ꝑ medicinas: ſiue per res non naturales. Scdo ſumitur pro adminiſtratōe debita ſex rerū nō naturaliū: ⁊ hoc modo ſumitur infra. Tertio ſumiṫ ꝓ adminiſtratōe oīum reꝝ nō naturaliuꝫ excepto cibo ⁊ potu: ⁊ ſic ſumiṫ hic. Ex quo patet quare dixit regimē ⁊ nutriētia vt oīum reꝝ nō naturaliuꝫ adminiſtratiōeꝫ cōprehēderet. ¶ Sexto notãdū ꝙ lꝫ hec tria ſint tria genera inſtrumētoꝝ practice medicine tã quo ad parteꝫ preſeruatiuã q̄ꝫ ↄſeruatiuaꝫ ⁊ curatiuã: vt pōt patere ex dictis in fen tertia: tñ diuerſis modis ſpãlibus ſub iſtis generib⁹ contētis vteṫ medicus in curatōe: p̄ſeruatōe: ⁊ cōſeruatione. ¶ Sunt ergo in genere hec inſtrumēta eadē: ſꝫ ī ſingulari ⁊ ſpãli modo differūt: ⁊ hoc ſufficit pro illa differētia que eſt inter dictas partes artis. ¶ Ultimo notandnm ꝙ medicina non ſumitur hic proprie pro operante a qualitate: ſed cōiter ꝓ omni applicato corpori noſtro: qđ nō tantuꝫ a mã eſt operatiuū: ſed a qualitate vel a tota ſubſtãtia. ¶ Et ex his patet verificatio textus. Nã ſanitas acquiriṫ per acquiſitioneꝫ alicuius: aut remotionē alicuius. Et hoc fit aut ꝑ operationē manualē ſine alteri⁹ applicatōe: vt cirugia: aut requiritur rei alteri⁹ applicatio ab operatiōe. ¶ Si requiriṫ applicatio alterius rei ab opatiōe pꝫ. primo aut erit nutriens: aut res alteratiua nō naturalis: aut operatiua a tota ſubſtãtia: ⁊ ſic ē medicina. Et ſic habes diuiſionis ſufficientiã in tria inſtrumēta artis. Ex quibus patet quorūdaꝫ dubioꝝ ſolutio. ¶ Primū dubiū quare prepoſuit fen tertiaꝫ que ē de cōſeruatōe. Rō eīm eſt q₂ cauſe ↄſeruãtes ſunt priores cauſis efficiētibus: vt 3° tegni: ⁊ ſic ars cōſeruatiua prior ē arte curatiua. ¶ Scdꝫ dubiū quare nō fecit ſpãlem tractatū de preſeruatōe corpoꝝ neutroꝝ. Ratio eſt q₂ neutra decidentie multuꝫ cōueniūt cū ſanis lapſis: ⁊ ideo in codeꝫ tractatu cum illis poniṫ coꝝ regimē. Neutra autē ↄualeſcētie: q₂ ex particulari quodã morbo inueniunṫ. ſ. ex febre. ideo ↄmodius viſū fuit Auic. poſt tractatum de febribus determinare de regimine illoꝝ. Jn veris eīm cōualeſcētibus calor eſt paruus ⁊ ſanguis ē paucus. ¶ Tertiū dubiū quare prepoſuit regimē. 2° exhibitionē medicinarum. 3° opationē manualeꝫ. ¶ Dicēdū ꝙ regimen eſt cōe inſtrumētū in omni morbo. Non autē ſic ē de alijs duob⁹ inſtrumētis. Exhibitio etiaꝫ medicinaꝝ in pluribus ē magis neceſſaria q̄ꝫ operatio manualis. ¶ Et nota ꝙ per manualem opationē intelligiṫ illud qđ facit medicus ſine cōcurſu alterius particularis agētis ſicut īciſio: reductio: ligatura ⁊ ſimilia. Sed exhibitio medicinaꝝ hoc modo non confert in cura ſine alteratione.

Per regimen autē intelligimus admīſtratiōeꝫ que fit in cauſis neceſſarijs que ſm vſum ſūt currentes ex quibus eſt nutriens.

¶ Explanat mēbra diuiſiōis. Et diuidiṫ in tres partes. Primo declarat quid intelligat per regimen relinquēdo alia duo tanq̄ꝫ nota. 2° excuſat ſe a quibuſdam. 3° ponit quoſdaꝫ generales cañ. circa nutriēs ⁊ medicias. 2ª ibi: ⁊ iudicia quidem. 3ª ibi: nutriēs vero ex eis. ¶ De prima dicit ꝙ ꝑ regimē ītelligit adminiſtratōeꝫ cauſaꝝ currentiū ſꝫ vſuꝫ que ſūt neceſſarie numerate ſupra fen 2ª: ⁊ de illis eſt nutriēs. ¶ Ubi nota ꝙ res nō naturales dicūtur neceſſarie. ſ. vt vita homīs duret ⁊ decurrēdo per etates: ↄſerueṫ ⁊ ſūt neceſſarie in ſua generalitate vt dictuꝫ eſt fen 2ª: ſꝫ nō ſūt neceſſarie ſua ſingularitate. Nullus enim aer eſt neceſſarius ad vite conſeruationeꝫ. ideo dicunṫ etiaꝫ cauſe non neceſſarie: ſed currētes ſm vſum q₂ cōmuniter vtimur illis. Ex quibus patet quō ſaluaṫ lr̄a que eſt negatiua in cauſis nō neceſſarijs. ¶ Notãdū 2° ꝙ ex hac lr̄a Aui. videṫ velle ꝙ in noīe regimīs ītelligiṫ adminiſtratio đbita nutriētis: cū dixit ex qb⁹ ē nutriēs. Et iō aliter exponēdo q̄ꝫ ſupra ī prima ꝑte dictū ē poſſet dici ꝙ cū ſupra dixit regimē ⁊ nutriētia: nō voluit nutriētia nō ↄtineri ſub regimīe: ſꝫ ad maiorē expꝛſſionē dixit hoc. Et poſſet dici ꝙ li quibus referṫ ad cãs neceſſarias.

Et iudicia quidē regimīs ex parte qualitatū earuꝫ ſunt proportiōalia iudicijs medicinaruꝫ.

¶ Jn iſta parte excuſat ſe dicens ꝙ iudicia regiminis quãtum ad admīſtrationē rerum nō naturaliuꝫ ex parte qualitatis. i. ſꝫ ꝙ habēt calefacere: aut aliter corpus ad primas qualitates alterare: ſunt proportionalia ⁊ ſimilia iudicijs admīſtratōis medicinaꝝ de quibus infra diceṫ: ⁊ iō ſupple nūc nō oportet ea ponere diuiſim.

Nutriens vero ex eis oībus iudicia habēt que ſunt ei ꝓpria ex mō quãtitatis: nutriēs eiꝫ qñqꝫ prohibeṫ: quãdoqꝫ minuiṫ: quãdoqꝫ equatur: quãdoqꝫ augeṫ.

¶ Nunc exequiṫ ponēdo cañ. p° de nutriēte. 2° de exhibitiōe medicinaꝝ: ſcda ibi: medicatio aūt. ¶ Nota ꝙ de operatiōe manuali nō dat hic cañ. q₂ illi ſunt magis ſpãles: ⁊ ideo ad ſequētia capitula reſeruat. Non ponit etiã regulas de modo adminiſtratōis aliaꝝ reruꝫ nō naturaliū niſi ciboꝝ: q₂ ille alie res nō niſi ex parte qua nos īmutãt qualitatiue cōſideranṫ. Et q₂ ex illa parte iudicia ſūt ꝓportōalia iudicijs medicinaꝝ: ideo nō fuit oportunū ponere. vel melius ea reſeruat ad ſequētia: vt de euacuatōe ⁊ curatōe: aut reliquit volēs ꝙ per alia dicta de eis in 2ª ⁊ 3ª fen ſciam⁹ operari. Sed prima pars diuidiṫ in tres partes ſm tres diuiſiones diuerſas de modo adminiſtratōis nutrimēti quas ponit. ſcda ibi: nutriēs quoq̄ꝫ. tertia ibi: nutriēs preterea ſm hoc. Jteꝫ primo ponit diuiſionē. 2° cañ. iuxta mēbra diuiſionis. ibi ſcda: ſꝫ non probeṫ. De prima dicit ꝙ nutriēs hꝫ iudicia ꝓpria ex parte quãtitatis: nō ꝙ in alijs rebus nō ſint iudicia quãtitatis vt in ſomno ⁊ eṽone: ſed iſta iudicia de quãtitate offerēdi nutrimēti ſunt ſibi ꝓpria. ſ. nutrimēti inquãtuꝫ eſt nutriēs. Nã alius eſt modus quãtitatis ſomni q̄ꝫ nutrientis: ⁊ alius eſt modus nutrimēti multi non ꝓportionati quãtitati in euacuatōe. Jdeo iſta iudicia dicunṫ ꝓpria nutrimēti q₂ nō cōmunia ſibi ⁊ alijs reb⁹ nō naturalib⁹. Non tamē omīa iudicia de quãtitate in nutrimēto ſunt ita ꝓpria quin ſint ſimilia in medicinis ⁊ alijs rebus nō naturalib⁹: vt patet inſpiciēti. Dicit ſcdo ꝙ nutriēs qñq̄ꝫ augetur: qñq̄ꝫ minuiṫ: qñq̄ꝫ auferṫ: qñq̄ꝫ equatur. ¶ Ubi nota primo ꝙ quãuis nutriens dicatur de vero nutrimēto qđ eſt cambiū aut gluten: ⁊ qñq̄ꝫ de quaſi nutrimēto qđ eſt ſanguis ⁊ alie hūiditates ſecūde ⁊ chilus. Hic tamē ſumiṫ pro futuro nutrimēto qđ eſt cib⁹ ab extra: ita ꝙ ſenſus eſt ꝙ īfirmis qñq̄ꝫ augemus cibuꝫ qñq̄ꝫ minuim⁹: qñq̄ꝫ equamus: qñq̄ꝫ ſubtrahim⁹. ¶ Nota 2° ꝙ hec oīa. ſ. augeri vel minui dicunṫ ↄparatiue ⁊ ſm mēteꝫ Auic. Hic nō intēdim⁹ ſoluꝫ cōparãdo infirmos ad ſanos: ſꝫ etiã egros ad egros ⁊ ſanos ad ſanos. Conſtat eniꝫ ꝙ infra dicit minui ī augmēto ⁊ ī ſtatu reſpectu principij: ergo tã ī ſanitate q̄ꝫ ēt ī morbo cibuꝫ qñq̄ꝫ augem⁹: qñq̄ꝫ minuim⁹: qñq̄ꝫ eq̄m⁹. Qđ vero hic dicit Dyn⁹ ꝙ cū ſint q̄dã morbi ꝑacuti ī qb⁹ auferim⁹ ↄſentiēte virtute: quidã acuti in qb⁹ diminuim⁹: quidã cronici in quib⁹ equare dicunṫ nō eſt de mēte Aui. cū paulo poſteri⁹ dicat ꝙ ī cronicis minuim⁹: ſed nō tantū quãtū in acutis. ¶ Notãdū 3° ꝙ cū Aui. poſuit quattuor mēbra diuiſionis: nō tñ poſuit cañ. niſi circa duo q₂ de augēdo ⁊ equãdo ītelligaṫ ꝑ illos q dicunṫ de diminuēdo ⁊ auferendo. ¶ Qđ ſi queraṫ vtrū ī aliquo morbo ſit cibus equãdus reſpectu ciboꝝ ſanitatis: Videṫ p° ꝙ nō q₂ ī omī morbo virt⁹ ē debilis reſpectu ſanitatis ⁊ cib⁹ ē dãdus ſm vir/

Quid ꝙ multi ſanati ſūt incãtatiōib⁹? ⁊ Aui. dixit ī 6° naturaliū ꝙ plus valet ↄfidētia īfirmi de ſalute q̄ꝫ medicus cuꝫ oīb⁹ ſuis īſtrumētis. Etiam ille plures ſanat ⁊c̄. Rndeṫ ꝙ iſta reducunṫ ad aīe accidētia: ⁊ ſic ñ ſūt plures res medicatiōis.

Nota tñ ꝙ prime due res medicatiōis ad medicos ꝑtinēt: tertia vero ↄuenit miniſtris coꝝ vꝫ cyrugicis vt dicit Auenzoar libro. ij. tractatu. vj. c. j. huiuſmodi eniꝫ opatōes manuū dimittēde ſūt ſeruitorib⁹ medicoruꝫ. Ad medicū aūt honoratū hec non ꝑtinēt queadmodū nō ꝑtinet ei facere ſirupos ⁊ electuaria ſuis manibus niſi eſſet in magna neceſſitate. Nec Auēzoar ſm ↄſiliuꝫ patris ſui: lꝫ ipſe opatiōe manuali valde fuerit delectatus.

Scdꝫ vnaꝫ expoſitōeꝫ Auic. ꝑ regimē hic intelligit ēt ꝓ adminiſtratiōe cibi ⁊ potus. explicauit aūt nutriētia: q₂ illa ſunt potiſſimuꝫ īſtrumētū taꝫ ↄſeruãde ſanitatis q̄ꝫ egritudis curande ſine nocumento: vnde ſi pōt medic⁹ curare ſine potōe vt dixit Damaſcen⁹ ꝓſpera eueniēt.

Hoc habet difficultatē ī multis caſib⁹. Jn febre eniꝫ putrida expetūt cibi frigidi: ⁊ tñ non cōpetunt medicine frigide vt dixit Auēzoar in pleureſi etiaꝫ ⁊ periplemonia cōueniūt medicine frigide ſicut diadragantū ⁊ ſirup⁹ violat⁹: ⁊ tñ ipſis nō ↄpetit aer frigidus ꝓpter multa. Ad hec dicitur ꝙ ſepe ī eodē morbo cōpetant remedia cōtraria diuerſis reſpectib⁹: vno modo ꝓ remouēda cauſa morbi: alio modo ꝓ mala ↄplexione alteranda.

Jmmo nihil ꝓhibeti eadeꝫ egritudine nutriens auferri minui equari ⁊ augeri ī tꝑibus diuerſis.

multū in ꝓlac... ꝑ annotatio

vide aliud capitulum ... Angularis ...

UVA. BHSC. IyR_006_1

tutis tenoꝛē:ergo ſemꝑ ē minoꝛādus. Sꝫ q̄ ſit qn̄qꝫ au/
gēdus ꝓbaẗ:q: coꝛp⁹ valde plectoꝛicū:aut cui ꝑꝑ reple/
tionē modicū cibi erat dādū cuꝫ de crepatura eſt timoꝛ
ſi ex flobotomia fiat ita vacu⁹ vt ſenſibiliter ledatur erit
egruꝫ:ꝛ tn̄ cib⁹ ī eo erit augēdus. Cōfirmaẗ:q: ſtat plus
eē cibū minuēdū ī ſanitate data ꝑꝑ timoꝛeꝫ plectoꝛie q̄ꝫ
ſit minuēdus ī moꝛbo ꝑꝑ debilitateꝫ virtutis ꝛ humoꝝ
digeſtionē:ergo ꝛc̄. ⁋ Scd̄o in fractura oſſis cum rege
neraẗ poꝛuſarcoides ſiue aroſboth al's oꝛeſbet īdigemus
pluri nutrimēto reſtaurāte q̄ꝫ tp̄e ſanitatis. Nā indige/
m⁹ nutrimēto reſtaurāte perditū: ꝛ eo ex quo regeneraẗ
araſboth: vt ſumiẗ 3° tegni textu. xj. ꝛ in cōmēto. cxix.
Hinc diciẗ q̄ alicui egro ē plus dādū d̄ cibo q̄ꝫ certo da
to ſano ꝛc̄. ꝛ ēt aliq̄n̄ ſibimet ī ſanitate ſua exiſtenti vt ꝓ/
bāt argumēta. ⁋ Diciẗ 2° q̄ ſtāte paritate neceſſitatis
nutrimēti plus de cibo dꝫ offerri ſano:q: virt⁹ magis di
gerere pōt. Et ꝯſtat q̄ argumēta ponūt diſpariatē ī ne/
ceſſitate nutrimēti. ⁋ Cōtra rn̄ſionē arguiẗ:q: ſtat vir/
tutē digeſtiuā ī certo egro eē foꝛtioꝛē q̄ꝫ fuit in eo ſano:ꝛ
moꝛbū eē mālēꝫ īdicāteꝫ de cibi īgroſſatōe vt in pꝛīcipio
cataracte vel medio ei⁹ in quo q̄riẗ eius īgroſſatio: ergo
ſolutio nō ē vera vniuerſalr̄. Idē pꝫ in miſia. nā ī illa coꝛ
p⁹ ē īpinguādūꝫ ꝛ carnoſuꝫ faciēduꝫ: vt dicit Raſis 9°
almāſoꝛis:ꝛ Auic. pꝛima tertij: ꝛ Meſue ī ſuo de appꝛo/
pꝛiatis:ſꝫ nō īpinguaẗ niſi q̄ꝫtitas cibi augmēteẗ. Nam
īpoſſibile ē mēbꝛa vltra modum creſcere niſi cibimi vltra
modū augeanẗ: vt pꝛima affoꝛ. ꝯmēto 3°. ⁋ Propterea
dicēduꝫ ē ratio nō ꝓbat: q: lꝫ ī egro virt⁹ digeſtiua ſit
debilioꝛ q̄ꝫ ī ſano:tn̄ ī ſano nō ſemꝑ ē dādum tātuꝫ q̄ꝫtū
virt⁹ pōt digerere. Et iō ī hn̄te debilioꝛē virtutē ſtat tā
tum poſſe digeri q̄ꝫtuꝫ debeẗ debite illi ſano:ꝛ erit tāta
cibi neceſſitas in egro ꝑꝑ neceſſitatē auctā aut aliq̄d̄ hu/
iuſmodi q̄ꝫtū ꝯuenienter admiſtrabiẗ ī ſano. Et ideo foꝛte
oppoſita ꝯcluſio teneri poſſet:ꝛ tu conſidera omnia hec.
Nā illud q̄d̄ diciẗ cōiter cibū dari ſm̄ tenoꝛē virtutis:
ītelligiẗ q̄ nō dꝫ dari vltra poſſe virtutis. Et cum diciẗ
q̄ ī moꝛbis cronicis ſubtiliam⁹ intelligiẗ in mālib⁹ a mā
nō reducibili ad benignuꝫ: vt putrida:aut putrere para/
ta notabilr̄ debilitāte digeſtiuā toti⁹ apta digeri dige/
ſtiōe ad expulſiōeꝫ a nā ꝑparāte:mō oīs moꝛb⁹ nō ē hu/
iuſmōi. ⁋ Si vero q̄raẗ an cib⁹ ſit qn̄qꝫ ex toto auferen/
dus: diciẗ q̄ ſic. Naꝫ per ei⁹ qn̄qꝫ ablationeꝫ infirm⁹ ci/
tiſſime liberaẗ:puta vna die vel duab⁹ aut vſqꝫ ad quar
tā:ꝛ tūc nō tātuꝫ debilitaẗ quin poſtea ſumpto cibo cō/
uertaẗ ad ſanitatis diſpoſitōeꝫ: licet ergo omnis ītentio
vtriuſqꝫ opuſculi ſit vite cuſtodia:tamen ꝓ vite cuſtodia
qn̄qꝫ ē cib⁹ auferēdus totus certo tēpoꝛe.

In trib⁹ maxime caſi-
b⁹ nutriēs ꝓhibetur. Pri
mo ī ꝑperacutꝭ egritudini
b⁹ iuxta illō Hyp. ad vlti
mas egritudines. Scd̄o ī
ſtatu moꝛbi dicente Hyp.
Quādo in ſtatu ē egritu-
do: tunc tenuiſſima dicta
neceſſariuꝫ eſt vti. Tertius
caſus ē in ꝑoxiſmis ꝛ ex-
acerbatiōibus iuxta illud
in paroxiſmis ſubtrahere
opoꝛtet.

Sed nō pꝛohibeẗ niſi cum medicus vult virtutem
cuꝫ hoc cuſtodire vt natura occupeẗ in maturatōe hu/
moꝝ: ꝛ nō minuiẗ niſi cuꝫ vult virtutē cuꝫ hoc cuſtodi/
re: ergo inquātum nutrit cuſtodit partē virtutis: ꝛ in/
quātuꝫ minuit cuſtodit parteꝫ materiei ne natura tūc
occupetur in digerendo multum cibum.

⁋ Nūc ſm̄ diuiſionē datā ponit can̄. 2° ſatiſfacit du/
bio. 2ª ibi: ipſe quoqꝫ. Adhuc pª ī duos ſꝫ can̄. 2ª ibi: ꝛ nō
minuiẗ. ⁋ De pꝛima dicit q̄ nos nō auferim⁹ cibū niſi
qn̄ volum⁹ nām occupari ī maturatōe humoꝝ. Scd̄o di
cit q̄ tūc minuim⁹ cū habem⁹ hāc ītentōeꝫ: ꝛ cū hoc vo
lum⁹ nām ꝯfoꝛtare vel virtutē cuſtodire. Et iō medicus
dādo cibū vtriqꝫ rei vacat. nā inquātū nutrit cōſeruaẗ
aliquātulū virtus: ꝛ īquātū minuit facit q̄ nā nō occu/
peẗ a digeſtiōe humoꝝ ꝑ digeſtionē multi cibi. ⁋ Circa
ꝑtes nota p° q̄ in regimine egrotātiuꝫ ꝓcipue māli moꝛ
bo per cibū pꝛīcipalr̄ duo a medico cōſideranẗ a quibus
recipit ītentōeꝫ de modo cibādi. Unū eſt virt⁹: aliud eſt
moꝛb⁹. Nā virt⁹ cū ſit res nālis dicit de ſui cuſtodia ꝛ
cōſeruatōe q̄ ſit per cibuꝫ. Nā ſanguis ſpirit⁹ ꝛ humidū
mēbꝛale ī q̄bus cōſiſtit virt⁹ reficiunẗ cibo. Scd̄ꝫ ē moꝛ
bus. nā cū moꝛb⁹ ſit res ꝓter nāꝫ īdicat de ſui remotiōe.
Et q: moꝛbi materiales remouenẗ ꝑ remotionē ſue cāe:
ideo īdicat de remotōe cāe. Cauſa vero ē humoꝛ. Et q:
remoueẗ humoꝛ ꝑ operationē nāe vel virtutis occupata
nā in digerēdo cibū nō pōt ita occupari in digerēdo hu/
moꝛē ſicut ſi nō eēt ita occupata: iō moꝛbus īdicat q̄ vir
tus nō occupeẗ in digerēdo cibū: ꝛ ſic q̄ cibus auferaẗ.
Ex quo patet iſtas īdicatōes quodāmodo eē oppoſitas.
⁋ Nota 2° debite cibando nō ſolū dꝫ medicus vnū ſed
ambo ꝯſiderare: ꝛ ſm̄ amboꝝ indicatōes elicere ītētōes.
Nā foꝛti exiſtēte īdicatione ex parte moꝛbi de nō cibādo
ſi virt⁹ ꝯſentiat ꝛ no multū indicet de oppoſito: q: ē foꝛ
tis apta ſine cibo ſtare: tūc auferimus: aut multū minui/
m⁹. ſꝫ cū non ꝯſentiat virt⁹ alr̄ foꝛet oꝑanduꝫ. ⁋ Nota
3° q̄ lꝫ virt⁹ quodāmō ꝯtrarie ſe hēat moꝛbo in īdicādo:
q: virt⁹ debilioꝛ magis indicat ꝛ moꝛb⁹ magis īdicat qn̄
ē foꝛtis: nō tn̄ oꝫ q̄ debilioꝛ virtus īdicet plurē cibū eſſe
dandū in vice vna: q: ſtat q̄ talē digerere nō poſſet. Et
ideo ꝯcediẗ q̄ indicatōe ſūpta a virtute magis indicante
qn̄qꝫ eſt minoꝛādus cibus. ⁋ Ex his pꝫ verificatio can̄.
q: qn̄ volum⁹ virtutē eſſe intētaꝫ ad digeſtionē humoꝛū
qui ſūt in venis ꝛ videm⁹ virtutē ꝯſentire: q: nō īdigere
cibarijs vſqꝫ ad ꝯplemētū digeſtiōis coꝝ: auferimus ci/
bū. ſꝫ cū videm⁹ virtutē nō ꝯſentire ita q̄ nō poſſet tāto
tp̄e ſine cibo ſtare: minuim⁹ nō multū vt natura nō īpe/
diaẗ: ꝛ virtus aliquātulūꝫ conſerueẗ ꝛ reſtaureẗ.

Ipſe quoqꝫ ſemꝑ ſit ſollicitus de eo q̄d̄ magis ſu/
ſpectū eſt: ꝛ eſt virtus ſi fuerit valde debilis aut egri/
tudo ſi fuerit multum foꝛtis.

⁋ Nunc remouet dubiū. Siquis eīꝫ querat virtute in-
dicante de cibi exhibitōe: ꝛ moꝛbo īdicante de cibi ſub/
tractōe: ad q̄d̄ medicus magis ītendere debet? ⁋ Rn̄de
tur q̄ ſemper dꝫ eſſe ſollicitus de magis ſuſpecto ideſt
de eo ꝓpter q̄d̄ magis ſuſpicamur de moꝛte. Et eſt hoc
modo: q: ſi virtus eſt valde debilis: tunc ipſa magis eſt
ſuſpecta. Si moꝛbus eſt valde foꝛtis ꝛ virtus nō ita de/
bilis: tunc moꝛbus eſt magis ſuſpectus.

Juxta illud dictū
Auic. medicus īquā
tū nutrit cuſtodit par
tē virtutis ꝛc̄. videẗ
ꝯtrariari Gal. ī affo.
vbi dicit q̄ groſſus
cibus augmētat: mo
deratus cuſtodit: ſub
tilis vero minuit vir-
tutē. Soluiẗ q̄ dimi
nutio nutriētis cuſto
dit virtutē ꝯparatiōe
ad nihil ꝛ arc: ſꝫ mi-
nuit virtuteꝫ rōne ad
id q̄d̄ de eo datur tē
poꝛe ſanitatis.

Dubitatur circa hoc vtrū deterius

ſit declinare ad latus diete groſſioꝛis q̄ꝫ opꝫ: an ad latus
diete ſubtilioꝛis q̄ꝫ oꝫ? ⁋ Et q̄ deterius ſit d̄clinare ad
lat⁹ diete ſubtilioꝛis: pꝫ ī affo° pꝛime ꝑticule. In tenuib⁹
dietis magis peccant egrotātes. Dicit eīꝫ q̄ oē peccatū
q̄d̄cūqꝫ ſit fit magis ī dieta tenui q̄ꝫ ī groſſa. ⁋ Ad ꝑtē
negatiuā ē Hyp. 2° regis acutoꝝ. ꝛ Gal. ī textu ꝛ ꝯmē/
to. xxxvj. Dixit enim Hyp. minui nāqꝫ iuuātius eſt. Et
Gal. aſſignādo cām hui⁹ dixit hoc eē: q: additio ſꝫ plu
rimū nocet: nocumēto cuius rectificatio nō ē poſſibilis.
Rectificatio aūt nocumēti q̄d̄ a diminutōe accidit eſt fa
cilis. ⁋ In hoc dubio tres ſūt rn̄ſiōes. pª eſt Dyni quā
ſequiẗ Marſili⁹ hic: Et pꝛima particula cū dicit q̄ du/
plex eſt regimē quoddā ꝑticulare q̄d̄ attendiẗ in vna ci/
batione tantuꝫ: aliud ē vniuerſale q̄d̄ accipiẗ in toto tp̄e
vſqꝫ ad ſtatū: aut ī toto tp̄e vniuerſali. Quo ergo ad vni
uerſale regimē oīuꝫ tēpoꝛuꝫ ſtatū pꝛecedētiuꝫ deteri⁹ eſt
ſubtiliare. ꝛ hoc vult Hyp. ī affo. dicto. Sꝫ quoad regi/
men ī ſolo ſtatu attēdendū minui ē melius: ſilr̄ quoad re/
gimē ꝑticulare vnius vicis tantū. et hoc voluit Hyp. 2°
regiminis acutoꝝ. Primū ꝓbat ꝑ hoc. Nā nutricādo
ꝑ ſubtiliationē cibi fit mutatio ad magis incōſuetū: ꝛ no
cet nocumēto eſſentiali: ꝛ difficili⁹ ex eo virt⁹ tollerat ac
cidētia: ꝛ difficilius ſuū nocumētū coꝛrigiẗ in ſtatu per
cibū. Scd̄ꝫ ꝓbat q: diminutio eſt ꝯueniēs in ſtatu: ꝛ in
declinatione facile coꝛrigiẗ. Tertiū ꝓbat q: minutio in/
dicat de diſpōe que eſt moꝛb⁹ ꝛ coꝛrigiẗ facili⁹: q: ī egro
peccatū replōnis difficilius coꝛrigiẗ. ⁋ Scd̄a rn̄ſio di/
cit q̄ taꝫ in ſanis q̄ꝫ in egris: ꝛ tā quoad vniuerſale regi
men q̄ꝫ quoad ꝑticulare declinare ad dictas ſubtilioꝛes
q̄ꝫ ꝯueniat virtuti eſt deteri⁹ ceteris parib⁹. Et rō eſt q:
facit nocumētū eſſentiale in defectu virtutis. Et hoc di
cūt Hyp. intēdere ponēteꝫ ꝓpoſitionē vniuerſaleꝫ cum
dicit: Omne peccatuꝫ ꝛc̄. ⁋ Dicit 2° q̄ peccatū ſubtilia/
tionis in egro in ꝯparatiōe ad dietā ſanoꝝ eſt minus in/
groſſatōe in ꝯparatōe illoꝝ. et hanc vult Hypo. 2° regi/
minis acutoꝝ. ꝛ Auic. pꝛima quarti cū dicit: Cūqꝫ igno/
ras egritudinē ſubtilia regimē. ⁋ Tertia poſitio ē mea.
naꝫ non credo vniuerſalr̄ declinare ad dietā ſubtilioꝛeꝫ
q̄ꝫ virtuti ꝯueniat q̄d̄ ſit deterius q̄ꝫ tantūdeꝫ declinare
ad groſſioꝛē: cū aliq̄n̄ per talē īgroſſationē in vna die mo
riẗ īfirm⁹: ꝛ ꝑ ſileꝫ ſubtiliationē nullo modo moꝛieẗ. Ad
q̄d̄ ꝓbandū ſuppono q̄ ꝑꝑ foꝛteꝫ ꝑcuſſionē in capite ab
ſtinēduꝫ ſit a dieta ſanoꝝ. hoc pꝫ 6° almāſoꝛis ꝛ pª ter/
tij ꝛ quarta quarti. ⁋ Suppo. 2° q̄ cā eſt: q: ex tali die/
ta infirm⁹ qn̄qꝫ īcurret apoſtema ī cerebꝛo aut pāniculo:
vn̄ moꝛieẗ. Alia eīꝫ cā non pōt aſſignari quare talē dietā
dam⁹ ad vitāduꝫ periculū moꝛtis. ⁋ Suppo. 3° q̄ tali/
bus oībus circūſtantijs ꝯſideratis opꝫ aliquo mō cibare
cibo medio īter dietā ſanoꝝ ꝛ nihil dare. hoc pꝫ: q: qn̄qꝫ
cibādi ſunt: ꝛ nō cibis ſanoꝝ ꝑꝑ periculū. ergo qn̄ ſūt ci
bandi aliquis erit cib⁹ in quo non erit hoc nocumētum.
ſit igiẗ ille medius īter cibū ſanoꝝ ꝛ nihil dare: q: argu/
mētuꝫ eodē mō de alio hēret veritatē. Cōſtat eīꝫ ſophi/
ſticis q̄ in iſto caſu ē dare ſubtiliſſimū cibū faciētem hoc
nocumētū: aut groſſiſſimū non facienteꝫ: ꝛ vtroqꝫ modo
ſignabiẗ cibus min⁹ diſtans ab īterficiēte q̄ꝫ nihil dare:
ꝛ hoc īuēto qui ꝯueniēs eēt cuꝫ coꝛp⁹ cibo īdigeret: cum
quo tale nocumētū nō incurrat. Pꝫ q̄ reſpectu illi⁹ tm̄
ingroſſare eēt cā moꝛtis: ꝛ tantūdem ſubtiliare nō eēt cā
moꝛtis. Et poteſt argumētū duci in termis mēſuraꝝ: vt
pꝫ de paratis cadere in apoſtemata mēbꝛoꝝ pꝛīcipaliū ꝛ
de paratis ſuffocari ex nimio ſanguine. ⁋ Nec credo ēt
q̄ vliter in talib⁹ quoad vlē regimen declinare ad ſubti/
lioꝛes ſit peius: nec ſemꝑ in ꝑticulari regimine declinare
ad groſſioꝛes ē peius vt cū cadit virt⁹: ſed credo q̄ ſtāte
virtute in vna ꝑticulari cibatōe melius eſt ad ſubtilioꝛes
declinare dictas. et hoc vult Hypo. 2° regi. acu. ꝛ Gal.
ſi bene īſpicias. Sꝫ vbi non eſt periculuꝫ ſuffocatōis aut
apoſtematis credo q̄ in regimīe vli ad groſſioꝛes decli/
nare dietas ī moꝛbis notabilr̄ magna tp̄a habētibus ſit
melius

Soluiẗ hic que
ſūt ꝯtra Jacobū in
tellecta illa particula
ceteris parib⁹. Et ꝑ
ăpliori notitia hui⁹
mē: vide queſtioneꝫ
ipſius motam ſupꝛa
affo. 5° ꝛc̄.

UVA. BHSC. IyR_006_1

melius: aut ſaltē ſm vtplurimū eſt melius. ¶ Poſſet ēt dici ꝙ ꝯſtante virtute tā quoad vl'e regimē q̄ȝ quoad particulare eſt meliꝰ in morbo māli minuere dietā: ita tñ ꝙ ꝑ illā nō veniat virtꝰ ad diminutionē taleȝ cū qua nō refici poſſet bene vnico cibo: ſed ſubtiliare ita ꝙ areſiat corpus aut virtꝰ fiat per illud ĩpotens ad ſubleuādū corpꝰ ſe ē peius q̄ȝ tantūdē ĩgroſſare citra limites regimĩs ⁊ diete. Et iõ Hyp. nō dicit ꝙ oē peccatū ſubtiliatõis ſit maiꝰ peccato ĩgroſſatõis: ſȝ ꝙ oē peccatū eſt magnū. qđ ſolū ĩtelligit duobꝰ modis p̄dictis. Et forte hoc qđ Auic. p̄ᵃ quarti de areſactõe ⁊ augmēto ap̄atis dicit vult Hyp. ĩ affo. dicto.

Solet ſecundo queri abſolute que

eſt fortior ĩdicatio: an morbi an virtutis? Ubi dicit ꝙ abſolute ĩdicatio ſūpta a virtute eſt fortior. Nā accidentibꝰ virtutē diſſoluētibꝰ illico dādus eſt cibꝰ ꝯmēto. ix. prime ꝑticule. Etiā q̄liſcūqȝ ſit morbꝰ ꝯmēto. ix. de ĩgenio ſanitatis dicit Gal. Igit̃ prima ĩtentio in oĩ quideȝ virtute ē iſta: tñ nō eſt curatiua ſȝ viuificatiua. Attamē regula debite dietādi ꝯſtante virtute ſumit̃ maxīe a morbi cognitõe.

Nutriēs quoqȝ ex duabꝰ minuit̃ partibꝰ. vna earum eſt ex parte quātitatis: ⁊ altera eſt ex parte qualitatis: ⁊ tibi quidē poſſibile ē ponere ꝯiunctionē duaꝝ partium diuiſionē tertiā. Differētia aūt ĩter duas dictiones quātitatis ⁊ qualitatis ē quoniā nutriēs q̄nqȝ ē multe quātitatis ⁊ pauci nutrimenti ſicut olera ⁊ fructus: quoniā qui ex eis multuȝ comedit: ex quātitate nutriētis multū recipit abſqȝ eiꝰ q̄litate. Et q̄nqȝ ē nutriēs pauce quātitatis ⁊ multi nutrimēti ſicut oua ⁊ galloꝝ teſticuli.

¶ Hic ponit aliā diuiſionē de modo admĩſtratiõis nutrimenti ⁊ cañ. illi correſpōdentē: ⁊ eſt diuiſio huius membri ſuprapoſiti. ſ. diuiſio cibi. Et diuidit̃ ĩ duas. p̄º ponit diſtinctionē. 2º cañ. correſpōdentē. ibi ſcđa nobis quoqȝ. prima ĩ duas: ſed lego totū ſimul. ¶ Dicit ĩ p̄º ꝙ nutriēs minuit̃ tribꝰ modis. vno mõ in qualitate: alio modo ĩ quātitate: ⁊ tertio ĩ qualitate ⁊ quātitate ſimul. ¶ Dicit 2º ꝙ differētia que eſt ĩter cibū multe qualitatis ⁊ cibuȝ multe quātitatis pōt ex hoc ĩtelligi q: cibus multe quātitatis cōtinue modicū prebet nutrimētū. Erit ergo ille multe quātitatis ⁊ parue qualitatis ſicut olera ⁊ fructus: ⁊ q̄nqȝ eſt ecōuerſo: q: ĩ pauca quātitate multū p̄bet nutrimētū ſicut teſticuli galloꝝ ⁊ vitelli ouoꝝ. ¶ Ubi nota p̄º ꝙ duplr̃ loquunt̃ medici de q̄litate nutrimēti. p̄º de q̄litate operatiua alterādo. ſ. caliditate ⁊ frigiditate: ⁊ hoc mõ nō dicimꝰ hic. 2º dicit̃ q̄litas rõe nutrimēti vt nutrimētū eſt: ⁊ hoc modo dicimꝰ nutrimētū eſſe multe q̄litatis vel pauce q: ē multe nutribilitatis aut pauce. Et ex hoc potes elicere moduȝ minorādi cibū ĩ qualitate: q: dare cibū minoris nutrimēti. Modus aūt minorādi q̄ȝtitatē eſt clarꝰ. Pȝ 2º ꝙ minoratio qualitatis pōt dici quodāmodo minoratio quātitatis. Nam alijs paribus per cibuȝ pauce quātitatis minus de nutrimēto dat̃ q̄ȝ ꝑ cibū multe quātitatis. ¶ Nota 3º ꝙ ideo cibus prebet̃ multi nutrimēti reſpectu alteriꝰ equalis quātitatis: q: illius cibi pars pauca tranſit in ſuperfluitates ⁊ plurima in alimētū: ſed alterius partis plurime trāſeūt ĩ ſupfluitates: ⁊ pauce in alimentuȝ. ¶ Tertio notandū ꝙ apud doctores ex tribꝰ cauſis in genere cōtingit ꝙ cibus ſit aptus ſm plurimas partes in alimentuȝ conuerti. vna eſt familiaritas ⁊ cōueniētia cum ſanguine ĩ ꝓprietate occulta. ſcđa ē ꝯueniētia in qualitatibus manifeſtis. tertia ē paſſibilitas cibi ex mõ ſubſtantie. Propter primā. Caro ſicca ē pluris nutrimēti homini q̄ȝ fenū. naȝ ĩter carnes ⁊ hoĩeȝ vl' ſanguinē humanū currit occl'ta ꝓprietas merito cuius ille ſunt ĩ ſanguine a calore naturali hoĩs trāſmutabiles ⁊ talis ⁊ tāta nō currit ĩter fenū ⁊ humanū ſanguinē ⁊ calorē: vbi econtra eſt reſpū aſini: equi ⁊ bouis. Propter ſcđaȝ ꝙ vitelli ouoruȝ ⁊ gallorum teſticuli ⁊ carnes ſm plures partes cōuertuntur ĩ nutrimento hoĩs q̄ȝ fabe aut lētes aut olera. Propter tertiā ꝙ liquida plus nutriūt: vt in ꝯmēto illius affo. facilius eſt repleri potu q̄ȝ cibo. ¶ Et pro hac materia vide dicta a me in q̄ōnibus ſuper illo affor. ſcđe particule. facilius ē repleri cibo q̄ȝ potu. ⁊ videbis q̄ō ſtat. a. cibū vt ſanguis hūanꝰ reſpū. b. vt vitelli ouorū ābobus potatis nāliter ⁊ virtualiter magis ſimilē eē mēbris tā ĩ ꝓprietatibꝰ occultis q̄ȝ in qualitatibꝰ manifeſtis. ⁊ modo ſubſtātie. b. ⁊ ꝯſimili āborū exiſtēte applicatiõe. faciliꝰ tamē alijs ꝑtibus nutriētur mēbra ex. b. q̄ȝ ex. a. ⁊ ſimilr̃ accipe exēplū de cibo ſubtili pauce quātitatis exhibito ſtomaco calido reſpectu groſſi ſimilis quātitatis. Et eodē modo videbis ꝙ ſtat. a. cibuȝ digeſtibiliorē eſſe. b. tūc ex modo ſubſtātie q̄ȝ ex ꝓprietate occulta ⁊ qualitatibꝰ manifeſtis: vtroqȝ tñ ĩ equali quātitate ⁊ ſimili modo applicatȝ meliꝰ digerit̃. b. q̄ȝ. a. ⁊ multa alia ſerua ad vidēdū ibi. ¶ Nota 4º ꝙ qualitatiua ſimilitudo attēdit̃ in hoc ꝙ cibus tēꝑatus ē qui alijs paribus ē pluris nutrimēti q̄ȝ diſtēꝑatꝰ. inter diſtempatos vero calidus ⁊ humidus. Reliqua ſunt nota. ¶ Ex his

Modus etiā ſubſtātie pōt intelligi de groſſitie cibi iuxta illud Gal. in libro de virtute cibarioruȝ. c. ix. dicēs ꝙ plurimi nutrimēti ſūt oēs cibi groſſi qui bene digerunt̃. Rurſus reddit̃ cibꝰ pauci nutrimenti ꝓpter quattuor. Prio ꝓpter ſubtilitatē: ꝓpter nimiaȝ ſiccitatē: ꝓpter nimiaȝ eius humiditateȝ aquoſaȝ ⁊ ꝓpter plurimā eiꝰ ſupfluitatē. hec vide a Gal. ĩ. c. x. preallegati libri.

Et hoc ꝓueuit ex meliori virtutis applicatione.

pȝ quare fructꝰ ⁊ olera ſunt pauci nutrimēti. ſ. q: nō hñt cū hoĩe ita ꝯueniētē ꝓprietatē ſicut caro: nec ĩ ſua ꝯpl'one ſunt ita vicinia. Ecōtra āt teſticuli galloꝝ ⁊ vitelli ouoꝝ.

Nobiſquoqȝ quādoqȝ ē neceſſariū qualitatē minuere: ⁊ in quātitate augumētum facere: ⁊ hoc quidē ē cuȝ deſiderium fuerit ſuperās: ⁊ in uenis crudi fuerint humores: ⁊ voluerimꝰ deſiderium ſopire per ſtomaci repletionē: ⁊ a venis multā prohibere materiā: iõ vt prius maturet̃ illud qđ ē in venis aut ꝓpter intentiones alias ab iſtis: ⁊ quādoqȝ neceſſariū eſt nobis in qualitate augumentū facere ⁊ minuere quātitateȝ: ⁊ hoc quidem eſt cum voluerimus virtutem confortare: ⁊ ſtomaci natura rem multam digerere non valet.

¶ Hic ponit can. pº generales attendendos. ſcđo ſpeciales ea ꝯſideratiõe nature morbi aut tp̄is eiꝰ. 2ª ibi: Plurimū aūt. ¶ In prima parte ponit duos can. primꝰ can. ē ꝙ forti exñte fame ⁊ venis repletis malis humoribꝰ crudis minuimus cibū ſm qualitatē augēdo ſm quātitatē vt ſatiſfaciat fami: ⁊ tamē nō impediat̃ virtus a digōne humorū qui ſunt ĩ venis: cū ex tali cibo modicū in venis trāſeat. Etiā propter alias intētiões: verbigratia ſi volumus corpus macer facere: vel ſi volumus materiā multā a venis expellere forti exiſtente appetitu ꝓpter timorē ap̄atis ⁊ multa alia. Scđus can. ſtomaco exiſtente debili qui nō pōt rē multā digerere ⁊ virtute indigēte cōfortatiõe: tunc minuimus ĩ quātitate ⁊ augemꝰ ĩ qualitate: q: damus cibū paucū multi nutrimēti.

Iſte primꝰ canon practicat̃ quattuor obſuatis. primo ꝙ ſit vehemēs appetitus. ſcđo ꝙ vene ſint replete humoribꝰ crudis. tertio ꝙ adſit voluntas vt ſatiſfiat eius ꝺſiderio per ventris repletionē. quarto vt prohibeat̃ noua materia a venis.

Uerificat̃ potiſſime canon iſte ſcđs in debilitate ſtomachi prouenietis ex egritudine cōſumptiua vt ptiſi: ethica: fluxibꝰ liquefactiuis: ſpaſmo de inanitione ⁊ reliquis.

Dubitatur circa iſtos cano. vtrum

humoribus crudis exñtibus ĩ venis cū forti fame ſit dandus cibus multꝰ ⁊ pauci nutrimēti. Negatiue arguit̃ ſic. Iſtis corporibꝰ nō cōueniūt cibi multarū ſupfluitatū generatiui. ſed dicti cibi ſunt huiuſmodi: ergo ⁊c̃. maior pȝ: q: ꝙ dicti cibi multarū ſupfluitatū generatiui ſunt augētes cacochimiā cū venas impleāt ſuperfluitatibꝰ. ¶ Cōfirmatur ēt q: in iſtis corporibꝰ ꝓhiberi dȝ indigeſtio. ſȝ tales cibi ſunt difficilis digeſtiõis: ergo ⁊c̃. minor pȝ: q: ñ ſunt nutrimēti pauci: niſi q: aut in ꝓprietate nō cōueniūt aut in modo ſubſtātie aut in ꝯpl'one vt pȝ in ſupradictis. ſed quocūqȝ modo ſit ꝓpter illud erūt difficilis digōnis: ergo ⁊c̃. ¶ Scđo in hyeme ē dādus multus cibꝰ ⁊ multi nutrimēti. ſed ĩ hyeme reſpū aliorū tēporū appetitus ē intenſior: ⁊ crudi humores ſunt ĩ venis. ergo nō vl'r multis exñtibus humoribꝰ crudis ĩ venis cū forti fame eſt dādus cibus pauci nutrimēti. cōſequētia ē nota ⁊ maior ē hypo. in illo affo. Uentre hyeme ⁊ vere ⁊c̃. Et minor pȝ: quia in hyeme multiplicant̃ flegmata ⁊ minorat̃ ſanguis ⁊ flegma ē humor crudus. Et aſſumptū ē Aui. 3ª primi ca. de comparatiõe gradus qualitatis aeris. Dicit enim ⁊ minuit̃ in ea ſanguis ⁊ auget̃ flegma. ¶ Tertio ⁊ vltimo ĩ corpore ĩ quo mali abūdant humores ē dādus cibus bonꝰ largiter. ſed ille cibus ē multi nutrimēti: ergo ⁊c̃. aſſumptū ē Auic. 3ª primi ca. de regimine eius qđ comedit̃ ⁊ bibitur. Sepe etiā ꝯcedit̃ ei in cuius corpore mali abūdant humores vt rē bonam largiter comedat. ¶ In oppoſitū eſt Auic. hic.

¶ Pro ſolutiõe dubij nota primo ꝙ nō eſt ĩtētio Aui. ꝙ ſemꝑ humoribꝰ crudis abūdantibꝰ ĩ venis ⁊ forti exiſtēti appetitu ſit dādus multꝰ cibus pauci nutrimēti. Nā virtus digeſtiua poſſet eē debilis ita ꝙ nō ſufficeret magnā quātitatē cibi digerere. ſed ſufficit ꝙ merito iſtarū diſpoſitionū deductis cōtrario mõ indicātibus: cibus ē dandus multe quātitatis ⁊ pauci nutrimēti. ¶ Nota ſcđo ꝙ ciboꝝ quidā eſt cibus purus: ⁊ quidā eſt cibus medicinalis qui habȝ virtutē ſubtiliādi: calefaciēdi: ſedandi: vomitū ꝓuocādi: vel aliquā talē virtutē nō oꝑando a materia.

¶ Nota tertio ꝙ aliqui cibi ſunt pauci nutrimēti ⁊ mali: quidā eīm ſunt multi nutrimēti ⁊ mali: quidā aūt pauci ⁊ boni: quidā multi ⁊ boni. Et tu vide exēpla 2º primi đ eo qđ comeditur ⁊ bibit̃ ad finē capituli. ¶ Tunc ſit iſta ꝯcluſio prima. Stante multitudine humorū crudorū ĩ venis cū forti deſiderio ſtat nō ꝯuenire cibū multe quātitatis ⁊ pauci nutrimēti. Patet q: ſtat multitudinē humorū eē tantaȝ vt ſumēdo cibū periculū eēt de crepatura venarum ⁊ ſuffocatiõe ⁊ dimittēdo ⁊ euacuando corpꝰ liberat̃.

¶ Scđa cōcluſio. Stāte humorū crudorū multitudine ĩ venis ⁊ forti appetitu ita fortibus vt nullius ĩdicatio iſtoꝝ alterius indicationē vincat ex toto deductis ecōtrario indicantibus cibus ē dandus multe quātitatis ⁊ pauci nutrimenti. ¶ Iſta eſt pro mēte Aui. Et ꝓbatur ſic ratiõe. Nā multitudo crudorū humorū nō vincēs indicationeȝ fortis famis indicat nō implēdas eē venas: ne virtus a digeſtiõe ꝓhibeat̃. ⁊ ideo cibꝰ dȝ eē pauci nutrimēti. Fortis aūt appetitus ĩdicat de famis ⁊ ſitis extinctiõe que ſit cū cibis multe quātitatis. ¶ Ad argumēta. Ad primū dicitur ponēdo ꝙ ciborū multaꝝ ſupfluitatū quidā ſunt huiuſmodi q: ex eis ſunt apte naturales ſupfluitates prīe vel ſcđe digeſtiõis generari: q: multe feces aut multa vrina.

quidam vero ſunt tales: q꞉ multiplicatiui ſuperfluitatum nō naturaliū: q꞉ homoꝛuꝫ maloꝝ in venis. Cuꝫ igiť dicit ꝙ cibi pauci nutrimēti ſunt multarū ſuꝑfluitatū: dico verum eſſe pͥo modo. Et hoc modo negať ꝙ dictis coꝛporibus non cōueniant cibi multaꝝ ſuperfluitatū. Sꝫ ſi dicatur ſcdo modo cōceditur ꝙ illi cibi nō cōueniūt. ſed nō dicemus oēs cibos modici nutrimēti ꝯuenire ⁊ multos: imo aliquos tales vt euchimos: q꞉ bonoꝛum humoꝛū generatiuos ſed paucoꝛū: q꞉ plurima eoꝛū pars ſecedit in feces ⁊ vꝛinam ꝑ vias ductuū nō implēdo venas ſicut granata lactuce amigdale. ¶ Ad ꝯformationē dicimus ꝙ iſti ſunt difficilis digeſtiōis reſpū ciboꝛū nutribiliſſimoꝛū: vt vini ⁊ aque carnis. ſed nō tñ opꝫ eē ita difficilis digōnis: q꞉ idigeſtio nō ita mltū reſiſtit virtuti quin ī illos ſit apta agere ⁊ vincere: nō obſtāte ꝙ merito ꝓpꝛietatis occulte nō ſm multas partes ſint ī ſanguinē cōuertibiles. ¶ Ad ſcdꝫ diciť ꝙ coꝛpoꝛa plurimos cibos ſumētia ī hyeme habēt plenitudinē bonoꝛū humoꝛū nō crudoꝛū. Uel ſcdo ꝙ ibi eſt indicatio indicās quare dētur cibi multi ſanguinis generatiui: vt diciť a Gal. ī cōmento. ¶ Ad tertiū ꝓpter virtutis debilitatē diciť ꝙ cibus bonus vel res bona ē cibꝰ medicinalis illis dādus. Aut hoc erit ꝓpter debilitatē virtutis indicātis ꝓpter duo dicta. Illius aūt textus expoſitionē vide a me ſuꝑ illo affo. ſcde particule. Non pura coꝛꝑa ⁊c. Scda dubitatio ē quō ī talibꝰ coꝛꝑibꝰ ſit vehemēs appetitꝰ cū eius humoꝝ crudoꝛū pñtia ſit cā ablationis appetitus: vt pꝫ de aīalibus ī hyeme ī cauernis habitātibus. Dicitur ꝙ pōt in eis eſſe appetitꝰ naturalis mēbꝛis reſpuētibus malos humoꝛes ⁊ attrahētibus bonos a ſtomaco ⁊ epate. pōt etiā eē ꝑternaturalis ꝑꝑ frigidū humoꝛē incitantē appetitū. Scdus caſus ē clarus.

Plurimū autē qđ nos laboꝛamꝰ in minuēdo cibum aut pꝛohibendo eſt cū egritudines medicamur acutas. In egritudinibus quoqꝫ cronicis minuimus: ſed minus q̄ꝫ in acutis.

¶ Ponit cañ. de minoꝛatiōe cibi ſm diſpōnem moꝛbi. Et q꞉ in moꝛbis differētibꝰ ſm cronicū ⁊ acutū: vario modo cibū damꝰ: ⁊ eodē modo variamꝰ dietā ſm variatōem tēpoꝝ eoꝝ. Ideo pͦ dicit Aui. diuerſitatē minoꝛādi cibū in moꝛbis ſm pꝛimā dictoꝝ moꝛboꝝ differētiā. 2ͦ ſꝫ differentiā tꝑuꝫ eiuſdeꝫ moꝛbi. ibi 2ª: ⁊ quāto plus egritudo. In pꝛima ponit duas cās. ibi 2ª: ī cronicis nāqꝫ. ¶ In pꝛima ponit duos cañ. Pꝛimꝰ eſt iſte ꝙ īter egritudines plurimū nos laboꝛamꝰ in minoꝛādo cibū in acutis egritudinibꝰ. Scds eſt ꝙ ī cronicis minoꝛamꝰ cibū: ſꝫ minꝰ q̄ꝫ in acutis. ¶ Circa pꝛimā parteꝫ nota ꝙ moꝛbus mālis q pendet a pñtia humoꝝ: īdiget humoꝝ digōne: aut euōne: aut vtroqꝫ. Et ideo q꞉ nā occupata nō tā bene maturat aut expellit ſicut ſi ſoluꝫ illi rei ſit intēta: ideo qlibet moꝛbꝰ talis indicat de cibi ablatōe: virtus aūt ſi ſit debilis indicat de cibi additōe per quē ꝯfoꝛteť: ⁊ ille īdicatiōes ſunt quodāmodo ꝯtrarie: ⁊ attēdimꝰ potētioꝛi altera non neglecta: ⁊ hoc totū dictū eſt ſupꝛa. ¶ Nota ꝙ moꝛboꝝ māliuꝫ qdā ſūt acuti qdā cronici. Moꝛbi cronici dicunť q vltra quadrageſimū dieꝫ terminanť. Moꝛbi autē acuti quidā ſunt abſolute acuti: ⁊ ſūt qui in. xiiij. dic terminanť. Quidā ſūt acuti cū additōe: q꞉ ꝑacuti qui īfra ſeptimū dieꝫ terminātur: ⁊ ꝑacuti qui infra quartū dieꝫ terminanť. Quidā tropici qui vltra. xiiij. dieꝫ ⁊ citra quadrageſimū terminanť. Oēs tñ acuti ī hoc conueniūt ꝙ cū velocitate ſue terminationis ſunt ſeuoꝝ accidētiū: ⁊ ideo febꝛis effimera non eſt acuta nec cronica: ⁊ hec ſūt alibi dicta. Ex his pꝫ ꝙ ī moꝛbis mālibus acutis virtꝰ magis ꝯſentit ſubtiliatōi qua indiget q̄ꝫ moꝛbꝰ cronicus: q꞉ acuti cito terminanť: ⁊ ꝑ modicū tempꝰ pōt virtꝰ melius ſuſtentari cū modico cibo q̄ꝫ per multū. Et ideo ī moꝛbis acutis ſubtiliamꝰ dietā ⁊ minuimꝰ cibū plurimū: imo qñqꝫ auferimꝰ: ſꝫ ī cronicis nō tātuꝫ minuimꝰ. ¶ Nota 3ͦ ꝙ q꞉ virtus eſt debilioꝛ ī moꝛbo cronico q̄ꝫ in ſanitate aliȷ̄s paribus ⁊ q꞉ moꝛbus īdicat de cibi ſubtractiōe: iō poſita alioꝝ paritate ī cronico moꝛbo etiaꝫ minuimus cibū reſpectu cibi ī cōparatiōe ſanoꝝ.

¶ Ex quo pꝫ pͦ ꝙ in oī moꝛbo māli ē ſubtiliāda dieta reſpcū alioꝛū: aliȷ̄s ꝯditiōibus obſeruatis. ¶ Patet 2ͦ quare ī moꝛbo cronico diciť equari a docto. ⁊ quare a Gal. pꝛima ꝑticula affo. ſub illo affo. Tenues ⁊ certe diete. dr̄ ꝙ virtus ē cōſeruāda ī cronicis. hoc eīm dicit in cōꝑatione ad id qđ ſit in acutis: q꞉ in cronicis tantuꝫ de cibo damus vt videať quaſi equari cibo ſanoꝛū ⁊ virtus cōſeruari vt eſt. ¶ Patet 3ͦ nō eē verū quod dicūt Dy. ⁊ Marſi. ꝙ generaliter in oī moꝛbo ab eo ſumiť indicatio ablationis cibi. Nā a moꝛbis qui ſunt ex inanitiōe tātū īdicať cibi exhibito: vt ī affo. Ex plenitudie ⁊c. ¶ Sequiť 4ͦ ꝙ nō in quolibet moꝛbo materiali ſalubꝛi oꝛdinanda ē dieta ī cōparatione ad ſtatū. Nā multi ſunt tales qui ſunt in declinatiōe quibus cibus ſubtilioꝛ ē dandus q̄ꝫ in ſanitate nō merito ſtatus futuri. ¶ Sed tūc cadit ꝑticulare dubium: vtrum ī moꝛbis materialibus ī quibus cibus debꝫ minoꝛari īdicatiue ſumpta a materia ſit meliꝰ minuere cibi q̄ꝫtitatē nō minoꝛata q̄litate: aut equaliter: aut vtrūqꝫ ſimul:

Hypocrates aūt tertio ꝓnoſticoꝝ diuiſit egritudines per periodos.

Duo requirunť in febꝛi acuta. ſ. ꝓpiquitas ſtatus ⁊ timoꝛ ī ea: vt vult Auic. pꝛima quarti tractatu. ij. c. iij. ⁊ per vltimuꝫ excludiť effimera.

Quia in acutis ſtatus eſt pꝛopinquus: in cronicis vero lōginquus.

videť ꝙ potius ſit minoꝛāda qualitas. nā ī acutis ptiſana oꝛdei offerť q minoꝛis ē qualitatis q̄ꝫ cibi ſanoꝛū: ⁊ offerť ſm quātitatē cibi ꝯſueti: vt ſumiť pͦ regiminis acu. textu cōmēti. xx. nā ſi bis in die ꝯſueuit comedere: bis ī die ptiſanam offerri ꝑcipit. ¶ Cōfirmatur q꞉ in moꝛbis iſtis ſunt exhibēdi cibi alteratiui: ⁊ aliquo mō moꝛbo vel cāe moꝛbi oppoſiti. tales aūt ſunt modici nutrimenti: ergo ⁊c. ¶ In oppoſitū ē cōis modus pꝛacticādi. nā damus pullū ꝯtuſum q eſt cibꝰ multi nutrimēti ⁊ pauce quātitatis. ¶ In dubio no. ꝙ iſti moꝛbi materiales qñqꝫ ſunt cuꝫ virtutis magna foꝛtitudine ⁊ ꝑcipue digeſtiue ſtomaci ⁊ nō coꝛruꝑto aut deiecto appetitu. quādoqꝫ aūt vnū iſtoꝛū dficit. ſ. virtus vel appetitus: tūc ſit pꝛima ꝯcluſio iſta. Stantibꝰ ī infirmo virtute ⁊ appetitu ī moꝛbo māli cibꝰ eſt plus qualitatiue q̄ꝫ quātitatiue minuēdus mā exñte in venis totius vel eius ambitu. Pꝛobať q꞉ per diminutionē qualitatis ſit ꝙ nā nō īpediť in digerēdo: ⁊ per quātitatē ꝯueniētem appetitui ſatiſſit. Accidit ēt ꝙ pōt magis alterare ſi alteratiuus deť ⁊ alia nocumēta nō ſequunť: ergo ⁊c. ¶ Scda ꝯclō ī moꝛbo māli indicāte minoꝛationē cibi ſtante cōi appetitu: qñqꝫ diminuimꝰ quātitatē ⁊ augemꝰ qualitatē: vt pꝫ in colica paſſiōe ⁊ lapide renū ēt ſi virtꝰ ſit foꝛtis. ¶ 3ª ꝯclō: qñqꝫ oꝫ cibū dare ꝑue quātitatis ⁊ multe qualitatis: ⁊ hoc vbi virtꝰ eſt debilis nō potēs notabilē quātitatē digerere: aut vbi appetitꝰ eſt valde ꝓſtratꝰ: ita vt īfirmꝰ non poſſet multū ſumere: ⁊ iſti ſunt caſus ī quos hodiernis tēpoꝛibꝰ incidimꝰ ſepe ꝓpter laſciuiā: ⁊ q꞉ infirmi ſūt delicati ⁊ patiunť in febꝛibꝰ faſtidiū ⁊ abhoīationē cibi nos damus pullū ⁊ oua ⁊ aquā carnis. ¶ 4ª ꝯclō cū iſti cibi exhibēť plerūqꝫ ſunt exhibēdi alterati. Nā iſti cibi ſunt facilr inflāmabiles: iō ꝑcipue in febꝛibꝰ ſunt ad frigiditatē alterādi cū decoctōe lactucaꝝ aut cuꝫ vino granatoꝝ aut ſimiliuꝫ. Et ex his habemꝰ facilē argumētoꝝ ſolutionē.

In cronicis aūt plus de virtute ſolliciti ſumus ꝙ eaꝝ criſis eſt lōginqua ⁊ ipſaꝝ ſtatꝰ ē remotꝰ. Quapꝛopter niſi virtus cuſtodiať vſqꝫ ad hoꝛā criſis ſtare nō poterit: neqꝫ illud qđ in longo digeriť tēpoꝛe digerere valebit. In acutis vero egritudinibꝰ criſis eſt ꝓpinqua ⁊ cōfidimus ꝙ virtus ante ſtatū non reſolueť: qđ ſi hoc timuerimꝰ nutriēs non plurime minuemus.

¶ Modo ꝓbat ambos cañ. ⁊ pꝫ ex notatis modus ꝓbationis amboꝝ cañ. Sed ꝓpter iuuenes nota ꝙ criſis ē vehemēs ⁊ velox motus moꝛbi quo infirmꝰ duciť ad ſaluteꝫ vel ad moꝛtē. Et iſte motꝰ plerūqꝫ accidit in ſtatu acutoꝝ. Cū ergo videmꝰ moꝛbū aliquē criſi terminādu: tūc oꝛdinamꝰ dietā ita vt in criſi virtꝰ nō ſit taꝫ debilis ꝙ deficiat neqꝫ coꝛꝑꝰ ſit humoꝛibꝰ plenū vt criſis īpediať. Cū ergo ē criſis ꝓpinqua virtute tollerāte ſubtiliamꝰ dietā ⁊ auferimꝰ cibū. ¶ Nota 2ͦ ꝙ lꝫ nō fiat criſis: tñ ꝓpe ſtatū ſubtiliamꝰ dietā maxime ex cā infra dicēda ⁊ añ ſtatū cū ſtatꝰ eſt vicinꝰ magis ſubtiliamꝰ q̄ꝫ ſi eēt lōginquꝰ alioꝝ poſita paritate: ⁊ ideo ī acutis ꝓpter hec duo magis ſubtiliamꝰ.

Et quāto egritudo plus pꝛīcipio ꝓpiqua fuerit ⁊ accidētia magis quieta nutriemus virtuteꝫ ꝯfoꝛtātes. Et quātū egritudo ſm augmētuꝫ ꝓceſſerit ⁊ accidētia ibi etiā augmētata fuerint: minuemꝰ dietā ꝓpter fiduciam eiꝰ qđ iaꝫ dedimꝰ: ⁊ ꝓpterea vt virtꝰ alleuieť in hoꝛa luctaminis. In tꝑe quoqꝫ ſtatus regimē quoqꝫ ſubtiliamꝰ vehemēter. Et quāto magis egritudo fuerit acuta ⁊ criſis ꝓpinquioꝛ: erit noſtra regimīs ſubtiliatio maioꝛ niſi cauſe acciderit que nos ab eo ꝓhibeāt quēadmodū in libꝛis nominabimꝰ particularibus.

¶ Hic ponit cañ. d minoꝛatiōe cibi merito tēpoꝝ moꝛbi. Et iſta pars diuidiť in qnqꝫ ꝑtes ſm. v. cañ. ibi 2ª: ⁊ q̄ꝫtuꝫ egritudo. ibi 3ª: in quo tꝑe. ibi 4ª: ⁊ quanto magis. ibi 5ª: niſi cauſe. ¶ Pꝛimus cañ. ē iſte ꝙ qñ egritudo ē ī pꝛimo ⁊ accidētia ſunt magis quieta: tūc nutrimꝰ cōfoꝛtādo virtutē: ⁊ intelligiť ꝙ plus nutrimus q̄ꝫ ī ſequētibus vſqꝫ ad ſtatū lꝫ minus ſit q̄ꝫ in ſanitate niſi fuerit ex cauſis dicendis ī dubio. ¶ Scds cañ. ē ꝙ cū egritudo ꝓcedit ad augmentū ⁊ accidētia augenť tūc minuemꝰ cibū: ⁊ hoc duabus de cauſis. Pꝛia q꞉ habemus fiduciā ꝙ virtꝰ rōe cibi exhibiti poterit durare cū maioꝛi ſubtiliatiōe cibi. 2ª vt virtus alleuieť ⁊ non ſit onerata cibo ⁊ humoꝛibus hoꝛa luctaminis. i. pugne ⁊ hec ē hoꝛa ſtatus. ¶ Tertius cañ. ē ꝙ in tꝑe ſtatus regimē vehemēter ſubtiliať reſpectu ꝑcedentiū. Cauſa ē q꞉ tunc virtus pugnat. ¶ Quartus cañ. ē quāto egritudines fiūt acutioꝛes tanto ſubtiliamꝰ vehemētius. ⁊ hoc quoad oīa hec tꝑa q꞉ pugna ē maioꝛ ⁊ tēpꝰ quo virtꝰ dꝫ cū ſubtiliatiōe regīs ſtare ē bꝛeuiꝰ. ¶ Quintus cañ. ē quia talis ſubtiliatio eſt fiēda niſi fuerit cā pꝛohibēs. ſ. virtutis dbilitas aut accidēs aliud: vt ī libꝛis particularibꝰ dicitur: debet fieri in criſibus.

Aduerte ꝙ ſicut periodi acutoꝝ moꝛboꝛū reſpectu criſis ꝑ quaternarios dierum ꝯputanť: ita periodi cronicoꝝ ꝑ ſeptēnarios: ⁊ nō ſolū dieꝝ ſꝫ mēſiū ⁊ annoꝛuꝫ: vt dicit Gal. tertia ꝑticula affo. in cōmento affo. xxix. plurime vero

Cōtra iſtū pꝛimū canonem erat vſus quoꝛūdā antiquoꝛū: vt recitat Hyp. ſcdo regiminis acutoꝛuꝫ. Gal. x. de īgenio ſanitatis. c. iij. iſti enim in oī egritudine materiali in tribꝰ pꝛimis diebus nihil dabāt.

Dubitatur vtrum in moꝛbis materialibus dieta debeat pꝛocedere ſubtiliando vſqꝫ ad ſtatum

tū incluſiue. ¶ Ad partez negatiuaz arguit̄ ſic. Aliquis ē morbus materialis in cuiꝰ pri. multa ē repletio ꝓpter quā dieta magis ſubtiliāda ē q̄z i ſtatu eēt ſubtiliāda merito illius morbi: ergo ⁊c̄. Aſſumptū pȥ. i. tertiana pura icipiēte cū plurima ſanguinis replōne. ¶ Confirmat̄ q: cōtigit qn̄qȝ principiū moleſtū eē: q: cōiūctū cū alio morbo ⁊ ſtatum eius eē ſine alio morbo: ⁊ cōſtat q̄ in prin. erit magis ſubtiliādū. ¶ Scd̄o arguit̄ ſic. In quartana ꝯuenit ſubtiliatio ⁊ poſtea igroſſatio: vt pria quarti. De quartana igit̄ nō generalr̄ in oī morbo groſſius ē dietādū i prin. ¶ Tertio i pleureſi groſſius ē dietan̄. in ſtatu ⁊ digeſta materia: vt decima tertij ⁊ pº regis acu. ¶ Quarto ſic virtꝰ i morbo ꝯtinue debilitādo ꝓcedit: ergo idiget maiori refectiōe: ⁊ morbꝰ ſalubris ꝯtinue minorat̄ ſaltez poſt pricipiū: ergo minꝰ indicat de cibi ablatōe: ergo merito vtriuſqȝ poſt pricipiū ē ingroſſanda dieta. ¶ Quito tunc magis ē ſubtiliāda dieta cū virtus ē fortior ⁊ pugna eius ꝯ mā̄z morbi maior ⁊ mā amplior. Et hoc ē in prinº: ergo ⁊c̄. minor pȥ: q: i prin. mā eſt magis rebellis cū ſit minus digeſta. ¶ Sexto arguit̄: in prinº paroxiſmi eſt ſubtilius dietan̄. q̄z in ſtatu: ergo in pricipio vli eſt ſubtiliꝰ dietādū q̄z in ſtatu vli. cōſequētia tenet per ſimilitudinē ⁊ aſſumptū pȥ pº regis acu. ab Hyp. textu ꝯmēti. xlv. ⁊ Gal. co. ꝯmēto dū dixit: Et deterior hora eſt cū inueniunt̄ iſta mēbra i deteriori diſpoſitōe: ⁊ manifeſtū eſt q̄ hora i qua ſūt in deteriori diſpōe: eſt hora inceptiōis paroxiſmoꝝ. ¶ In oppoſitū eſt Auic. hic ⁊ pª quarti. c. de regimīe febricitātiū. ⁊ Hyp. pª particula affo. affo. pº. ⁊ Gal. in ꝯmēto. In iſto dubio ponam notabilia 2º ꝯcluſiones. ¶ Quātuȥ ad primū nota q̄ morboꝝ quidā ſunt mā̄les: quidā imateriales. De imaterialibꝰ in pn̄ti nō eſt ſermo. Plurimi eīȥ imaterialiū morborū nō indicāt de cibi ablatōe vt morbi ſequētes inanitionez.

¶ Scd̄o notan̄. q̄ morboꝝ materialiū ſalubriū a mā cruda icipientiū ⁊ ad ſalutez terminādoꝝ cōiter quattuor ſūt tp̄a. ſ. principiū: augmētū: ſtatus ⁊ declinatio. Et hec tp̄a dicunt̄ vlia totū morbū ꝯtinētia. Et quedā ſūt tp̄a particularia determinatū morbū reſpiciētia. Hic aūt eſt ſermo de vlibus tp̄ibus. ¶ Nota 3º q̄ vlia tp̄a morbi mā̄lis qn̄qȝ diſtinguunt̄ penes accidētia: qn̄qȝ penes materie digeſtionē vel alterationē digōni oppoſitā. Et tu vide hoc pº de criſi ⁊ ꝑ ea que dixi pª particula affo. ¶ Nota 4º q̄ in quibuſdā morbis vlia tp̄a penes materie alterationē ⁊ penes accidētia coincidūt plerūqȝ: vt in quibus mā ꝯſeruat̄ ad vnicā creticā expulſionē: qbuſdā vero nō coincidunt. Et tu vide iſta in qōne mea de magnitudine morbi 2ª particula affo. ¶ Nota 5º q̄ in ſtatu morbi ſalubris ꝓut diſtinguunt̄ tp̄a penes digōnez materie: q: in ſtatu inuenit̄ mā magis digeſta q̄z ante: ⁊ cum hoc eſt magis calefacta multū naturā ⁊ virtutē irritās ad operādū in ea reſpectu precedētiuȥ tēpoꝝ paritate poſita in parte loci ⁊ quātitate eius. Et iō cū natura vincere dȥ in ſalubri morbo: pȥ tunc naturā fortiſſime ꝯ talem mā̄m pugnare. In prinº vero ⁊ augmēto ꝑꝑ ꝯrias cās ꝯtingit ecōtra. Et ita dicat̄ d̄ augmēto tanq̄z medio mō ſe hn̄te. ¶ Nota 6º q̄ in prinº quoad accidētia nō multū ſtimulat̄ virtꝰ ad agēdū i mā morbi: ſȥ in ſtatu quoad accidētia multū ſtimulat̄: ⁊ iō fortiſſime tūc conat̄ alijs paribꝰ. Ex quo pȥ q̄ hac paritate ſtāte fortior eſt actio nāe in morbum in hoc ſtatu q̄z in prinº vel augmēto: q: augmētū merito huiꝰ medio modo ſe habet.

¶ Nota 7º q̄ ex cibo exhibito i morbo mā̄li quattuor nocumēta ſequunt̄: ⁊ ſūt iſta. Primū virtutis aggrauatio. 2m eſt reſiſtētia virtuti facta in tranſmutādo debitā morbi mā̄m cū ſibi difficiliꝰ ſit duo pati. ſ. cibū ⁊ humorē q̄z vnū ſolū trāſmutare. 3m eſt diuerſio īſtrumēti quo virtꝰ opat̄. Nā ſp̄ūs diuertit̄ a loco vbi eſt mā ad locū cibi digerēdi. 4m eſt gn̄atio mali humoris ex cibo ſūpto ꝑternaturali calore agēte ſi cibo: vt in febre. aut nāli calore ipm̄ non debite trāſmutante. 5m pōt eē alteratio corꝑis a tali malo humore genito ⁊ aggrauato: vel oppilatio aut catarrꝰ nauſcatiuus vel corruptio imaginatōis vaporibus aſcēdentibꝰ ad caput: ⁊ breuiter alicuiꝰ morbi vel accidētis augmētatio.

¶ Nota 8º q̄ iſtoꝝ nocumētoꝝ quedā ſūt magis apta ſequi cibi exhibitionē cū multa eſt caliditas aut mala qualitas morbi. Quedā cū virtꝰ fortiſſime agit i mā̄z vt virtutis diſtractio vel ipedimētū opatōis eiꝰ. ¶ Nota 9º q̄ ſtat virtutē in mā̄z magis ꝑparatā pati qn̄qȝ fortius agere: nō obſtāte q̄ minus ab ea ſtimulet̄. Nā ſtat ꝑparationē plus facere ad fortitudinē opatiōis q̄z faciat ſtimulatio. ¶ His habitis ſit hec pª ꝯcl'o. In prinº morbi mā̄lis vli tā quoad acciª q̄z quoad materie digōnez vel alterationē ſubtilius ſtat eē dietāduȥ q̄z in eiuſdē morbi ſtatu. Pȥ vbi cū prinº illo aliqua fortis idicatio ꝯiūgat̄ ex alio morbo vel ex alio modo q̄z ex morbo: vt tactū eſt in augmēto prio an̄ oppoſituȥ. ¶ Scd̄a ꝯcl'o: deducta cuiuſlibet rei idicatiōe ꝑter idicatōes a morbo ⁊ eius cā ⁊ virtute: nō in cuiuſlibet morbi prinº ē groſſius dietāduȥ q̄z i ſtatu. Pȥ q: ſtat in alicuiꝰ morbi prinº vtēdū eē dieta tenuiſſima vt i morbo ꝑacuto.

¶ Tertia ꝯcl'o: i morbo mā̄li ſalubri cuiꝰ pricipiū plurimū remotū ē a ſtatu eiꝰ deductis alijs ſignificatōibꝰ a morbo illo ⁊ cā eiꝰ ⁊ virtute alijs paribꝰ groſſiꝰ eſt dietādū ꝯſtāte vtrobiqȝ virtute in prinº quoad acciª q̄z in ſtatu quoad accidētia. Cōcl'o pȥ q: magis nocent̄ ex eque groſſa dieta in ſtatu q̄z in prin. Nā cū virtꝰ in mā̄z fortiter operat̄: ſequit̄ eius diſtractōe eſſe maiꝰ nocumētū: ꝓpterea q: virtꝰ magis ſtimulat̄ vnde nō poſſet cibū digerere: ⁊ iō ad peiores humores ꝯuertet̄ ⁊ minꝰ bonū nutrimētū cauſaret. ¶ 4ª ꝯcl'o in ꝑdictis morbis alijs paribꝰ ⁊ alijs indicatōibꝰ deductis ſubtiliꝰ eſt dietan̄. in ſtatu quoad digōnez q̄z in pricipio. Pȥ q: i illo ē virtꝰ velocior ⁊ magis velociter agēs in mā̄z: ergo ipedimētū diſtractōis maius: ⁊ alia ſūt paria vt pono. ¶ 5ª ꝯcl'o: tēporibꝰ quoad māe alterationē ⁊ quoad accn̄tia coīcidētibꝰ in prinº multū a ſtatu diſtāte generalr̄ ꝓcedendū ē a pricipio vſqȝ ad ſtatū ſubtiliādo ꝯſtāte virtute ⁊ alijs indicatōibus a morbo cā ⁊ virtute ceſſantibus vel paribꝰ. Iſta eſt ponēda ꝑ mēte Auic. ⁊ pȥ: q: qn̄ magis verſus ſtatuȥ ꝓcedimꝰ: tāto nocumēta cibationis erūt maiora: vt colligit̄ ex notatis. ¶ 6ª ꝯcl'o: in morbis i quibꝰ hec tp̄a nō coincidūt ſtat ſubtilius eſſe dietandū in augmēto ⁊ pricipio quoad materiei digōnē q̄z i ſtatu. Pȥ q: ſtat mā̄z eē paucioȝē in ſtatu: ⁊ virtuti moleſtaȥ minꝰ: ⁊ virtutē magis ꝯſtantē: ideo minꝰ malū eſt cibare tūc q̄z in pricipio i quo erāt oppoſita. hoc accidit plerūqȝ i pleureſi ⁊ in morbis i quibꝰ valde notabilr̄ mā minorat̄. ¶ 7ª ꝯcl'o: in morbis in quibꝰ hec tp̄a nō coincidūt ſtat ſubtilius eſſe dietan̄. i ſtatu eiuſdē morbi quoad digōez: q̄z in ſtatu quoad accn̄tia ⁊ qn̄qȝ eꝯ. Qn̄qȝ eīȥ quātūcūqȝ modicū poſſet i accn̄tibꝰ ſtatus quoad accn̄tia ſuꝑare ſtatū quoad digōez: ⁊ per plus ſtat qn̄qȝ ſuꝑari ipȥ ſtatū quoad accn̄tia a ſtatu quoad ꝑparatōez materiei. ſtabit igit̄ q̄ maiꝰ erit nocumētū in cibatōe in ſtatu quoad digōnez māe: q̄z i ſtatu eiuſdē quoad accn̄tia ⁊ eꝯ. Ex his pȥ argumētoꝝ ſolutio.

Nutriēs preterea ſm̄ hoc quidē ex eo qd̄ fit nutrimētū duas alias hȥ operatōes que ſūt velocitas penetratōis: ſicut diſpō vini. ⁊ tarditas penetratōis: ſicut diſpō aſſatoꝝ ⁊ frixoꝝ. ⁊ ēt ſpiſſitudo ſubſtātie eius qd̄ ex ipſo generat̄ in ſanguine. ⁊ eius retētio ſicut ē diſpoſitio nutrimenti carnis porcine ⁊ vituline. aut ipſius ſubtilitas ⁊ reſolutiōis eius neceſſitas: ſicut eſt diſpoſitio nutrimēti qd̄ fit ex vino ⁊ ficubus.

¶ Hic ponit̄ 3ª diſtictio que ſumit̄ ex parte modi ſubſtātie ſm̄ cōiter exponētes. Et prīo ponit diſtictionē. 2º ponit can̄. correſpōdētes. 2ª ibi: ⁊ nobis quidē. In pª intendit duas diſtictōes: quaꝝ prima ē iſta. Nutrimētū quoddaȥ eſt velocis penetratōis: ſicut vinū. quoddā tarde: ſicut aſſata ⁊ frixa. Scd̄a diſtictio nutriētiū quoddā ꝑbet nutrimētū ſpiſſum ⁊ tarde reſol'onis: vt caro porcina ⁊ vitulina. qd̄daȥ ſubtile ⁊ cite reſol'onis: vt vinū ⁊ ficus. ¶ Nota hic pº q̄ diſtō pria. ſ. q̄ aliqd ſit tarde penetratiōis aut velocis penetratōis pēdet aut ex mō ſubſtātie: q: ſubtilia facilius penetrāt: aut ex qualitate: q: illa q̄ ſunt tp̄ata ad caliditatez ⁊ humiditatē declinātia ſicut citius digerunt̄: ita ēt citius ⁊ faciliꝰ penetrāt: aut rōne ſue ꝓprietatis. Nam quedā ēt ſunt q̄ ante ſuā digōnez penetrāt vt vinū: vt pōteſt ſumi ex his q̄ dicunt̄ 2ª primi ſūma de pulſibus ca. de variatōe pulſus ex cibo. ¶ Sȥ 2ª diſtō eſt q̄ quoddaȥ nutrimētuȥ ꝯſtans ⁊ tarde reſol'onis: ⁊ quoddā ſubtile ⁊ cite reſol'onis pēdet ex mō ſubſtātie quaſi ſolūmodo: q: ſubtilia nutrimētū ꝑſtāt cito diſſolubile: groſſa eꝯ. Similr̄ ſicca ꝯſtās ⁊ humida diſſolubile. quare Gal. prīo alimētorū c. xviij. dixit q̄ humidiora cōſiſtentijs modicū alimētum dant. i. modicuȥ durans ⁊ facilis euaporatōis.

Per carnē vitulinā intelligit carnē vacce ſȥ Gētilez loco proprio.

Triplicitcr dicit̄ nutriens facilis digōnis aut penetratōis. ſ. rōe nature ſue: rōne deſiderij appetentis ⁊ rōne ꝯtrarietatis quā hȥ cū mala ꝯpl'one accidentali. ꝓ hoc vide Gal. i libro de virtute cibarioꝝ c. v.

Et nobis quidē eſt neceſſariū nutriēs qd̄ cito penetret cū caſui virtutis aīalis ſuccurrere volumꝰ ⁊ eiꝰ reſolutioni ⁊ nō pōt ſtomacus ⁊ virtꝰ tollerare vt nutriens digerat̄ qd̄ tarde digerit̄. Et nos quidē a nutriēte terremur qd̄ cito digerit̄ cū accidit vt nutriēs precedat qd̄ tarde digerit̄: ⁊ timemꝰ ne cuȥ eo miſceat̄ ⁊ fiat ſm̄ moduȥ quē iaȥ diximꝰ. Et terremur ēt a nutrimēto groſſo cuȥ pro certo ſcimꝰ q̄ accidūt oppilatōes: ſed eligimꝰ cibuȥ fortis nutrimēti ⁊ tarde digōnis ꝓpter eū quē ꝯfortare volumꝰ ⁊ exercitijs fortibꝰ ꝑpare. Raꝝ quoqȝ nutriēs eligimꝰ ꝓpter illū cui velociter accidit poroꝝ ſpiſſitudo.

¶ Nunc ponit can̄. ⁊ ſūt quiqȝ. 2ª ibi: ⁊ nos. 3ª ibi: ⁊ terremur. 4ª ibi: ſed eligimꝰ. 5ª ibi: raro. ¶ Primꝰ canon eſt virtute digeſtiua exn̄te ita debili vt nutriēs tarde digōis debito tp̄e nō valeat digerere: cū caſui virtutis aīalis ſuccurrere volumꝰ: opȥ dare nutriēs facilis digōnis: vt vinuȥ ⁊ vitelli ouoꝝ: vt in lipothomia ⁊ defectiōe virtutis ⁊ ſincopi. ¶ Scd̄s can̄. eſt: poſt comeſtionē ciboꝝ tarde digōnis cauemꝰ ab exhibitōe cibi facilis digōis ne digerat̄ prius ⁊ poſtea cōmiſceat̄ cū eo: ita vt inde ſequat̄ vtriuſqȝ corruptio. ⁊ de hoc dictū ē ſupra in ca. de regimīe eiꝰ qd̄ comedit̄ ⁊ bibit̄. ¶ Tertius canō ē q̄ in corꝑe in quo ſunt oppilatōes aut valde facilr̄ fiūt: cauēdū eſt a nutrientibus groſſi nutrimēti: q: illd̄ addit i oppilatiōe cū fiat oppilatio

Per virtutē aīalez itelligit vitalē: vt ſupra i pria huiꝰ doctrina ſexta. c. iiij.

Dicit Gal. in libro ꝑal legato. c. ij. q̄ ſunt quidaȥ cibi groſſi ⁊ gn̄atiui groſ

UVA. BHSC. IyR_006_1

foꝝ humoꝝ quí ꝯferunt in oppilatóibus eo quod ſubtiliát ⁊ incidūt mediā tibꝰ caliditate ⁊ acuitate in eis exiſtētibus q̄re.⁊c̄.

ex hūoribꝰ: aut multis: aut groſſis: aut viſcoſis. ¶ Quartus cañ. ē ꝙ ī corporibꝰ fortibꝰ ad fortiora exercitia ꝑpara tis dāda ſunt nutriētia tarde digōnis ⁊ groſſi nutrimēti: vt nutrimētū nō cito ex labore diſſoluat̄: vt caro vaccina aſſata ⁊ porcina. ¶ Quintꝰ cañ. ē ꝙ corpori qđ velociter cadit in oppilatōeꝫ: dandū eſt nutrimētuꝫ rarū ⁊ ſubtile. Et hi cañ. ſunt noti ex his que ſupra ca. de regimine eius qđ comedit̄ ⁊ bibitur dicunt̄: ideo non repeto.

Medicatio aūt que fit cū medicis tres hꝫ regulas: vna eaꝝ eſt regula eligēdi eius qualitatē. ſ. eligēdi ipſaꝫ calidā aut frigidā aut humidā aut ſiccā. Et ſcđa eſt regula ipſiꝰ eligēdi quātitateꝫ: ⁊ hec quideꝫ regula diuidit̄ in regulā menſurādi pōdus eiꝰ: ⁊ ī regulā mēſurādi ipſiꝰ qualitatē. ſ. ſue caliditatis gradū aut frigiditatis aut reliquaꝝ ab iſtis. Et tertia ē regula ordinādi ſuā horā.

¶ Poſitis cañ. ad vnuꝫ inſtr̄m curatiuū ꝑtinētibꝰ. ſ. ad dietā ponunt̄ cañ. ad aliud inſtr̄m ꝑtinentes. ſ. ad medicinaꝝ exhibitionē. Et diuidit̄ in duas. Nā prio ponit que ⁊ quot ſunt cōſiderāda generalr̄ in exhibitōe medicinaꝝ. 2° que regule attēdunt̄ ī dādo medicinas. 2ª ibi: in electōe qualitatis. ¶ De pª dicit ꝙ medicatio que fit cū medicis tres hꝫ regulas. i. tres ſunt gnāles intētōes quas hꝫ medicus cōſiderare ī dādo medicinas. vnde volēs recte agere: tribꝰ regulis īdiget in dādo medicinā. Et ideo dicunt̄ regule: q꞉ ꝑ illas regulas dirigit̄ medici intētio ⁊ opatio. ¶ Dicit 2° ꝙ prima iſtaꝝ ē regula eligēdi qualitatē: puta calidā vel frigidā ⁊c̄. ⁊ ꝑ hoc itellige manerīē virtutis q̄ a forma opat̄: vtputa ꝺductiua colē vel flegmatis. ¶ Scđa regula eſt ad eligēduꝫ mēſuraꝫ ponderis exhibēdi: vt. ℥. j. aut. ʒ. j. ⁊ regulā gradus eius: vt qđ in primo gradu vel ſcđo vel alio. ¶ Tertia autē generalis regula eſt eligendi conuenienteꝫ horaꝫ ſue admiſtrationis.

Dubitatur vtruꝫ in debita adminiſtratōe medicinaꝝ tātū tres regule ſint attēdēde? ¶ Et videt̄ prio ꝙ nō ſint niſi due: vt vult Gal. 3° tegni. ſ. qualitas ⁊ quātitas: q꞉ ponere tp̄s ē ſupfluū: vt ibi ponit Gal. in ꝯſideratōe debite admīſtratōis ſex reꝝ nō nāliū. Scđo ꝑter iſtas ſunt multe ꝯſideratōes ſicut cōmixtiones ⁊ loca per q̄ medicīe ſunt offerēde ⁊ artificiales ꝑparatōes ⁊ modus ſubſtātie ⁊ virtutes 2° tegni: ⁊ ꝓprietates occulte vt īfra patebit. Preterea ī purgādo ꝯſequēter ſūt ꝯſiderāda. x. vt īfra. iiij. ca. ¶ Pro dubio nota p° ꝙ ī admīſtrādo medicinā: quedā cōſiderāda ſunt ex ꝑte medicīe: q̄daꝫ ex ꝑte corporis ⁊ q̄daꝫ ex parte vtriuſqꝫ. Nā cū medicīa nō poſſit debite offerri niſi in ꝯparatiōe ad corꝑis īdigētiā: pꝫ ꝙ nō ꝯueniēter offert̄ ⁊ artificialr̄ niſi cognita corporis diſpōne ⁊ ipſiꝰ medicine ⁊ etiaꝫ habitudīe vniꝰ ad reliquū. ¶ Nota 2° ꝙ de his q̄ ſunt ex ꝑte corꝑis cōſiderāda: nō intēdit hic Auic. nūc: ſed ꝑcipalr̄ de his q̄ ex parte medicine cōſiderant̄. ¶ Nota 3° ꝙ hic ꝑ qualitatē nō intelligimus qualitatē primā vt ſupradixi: ſꝫ oēꝫ diſpōneꝫ medicine denominatiuā merito cuiꝰ eſt opatiua: ſic vel ſic non ſpecificādo fortitudinē. Per quātitatē vero ītelligimꝰ diſpōneꝫ medicine ꝑ quā cōſiderat̄ vt fortiter vel debilr̄ eſt opatiua: vt pōdus mēſura vel gradus. ¶ Nota 4° ꝙ ad ſciēduꝫ qualitatē ⁊ quātitatē debitā medicine offerēde exquiſite: oꝫ ſcire oēꝫ cōditionē facientē ad hoc vt debite offerat̄. Et ad hn̄dum artificialē eſtimationē vicinā veritati de qualitate ⁊ quātitate offerēde medicine: oꝫ hēre plurimā cōſiderationē reꝝ facientiū ad hoc: vt medicina ſit cōueniēs corꝑi: oꝫ ergo eē in debita qualitate ꝑꝑ illā cām ⁊ in debita quātitate. Ex quibꝰ pꝫ ꝙ iſte due gnāles cōſideratōes ſufficiūt ex ꝑte medicine offerēde: ⁊ ita ēt ex parte aliaꝝ reꝝ corpori nr̄o applicādaꝝ. ⁊ hoc voluit Gal. 3° tegni: ⁊ rō ſua. ¶ Vltīo nota ꝙ lꝫ rō tꝑis includat̄ in cōſideratione iſtoꝝ duoꝝ: tm̄ eiꝰ ſpecificatio facit doctrinā faciliorē. Et hac de cā Auic. ipſaꝫ tanqꝫ tertiā poſuit. ⁊ Gal. ita fecit loco allegato. Ex quo pꝫ ꝙ ille tres cōſideratōes ſunt hn̄de. Pꝫ 2° ꝙ iſtorū vna includit̄ in alijs duabus. Pꝫ 3° ꝙ iſta vna per vnius illoꝝ tantū explicationē non fuiſſet debite ītellecta cū non tm̄ ad ea referat̄. ¶ Multotiēs eniꝫ tp̄s eſt indebitū in dādo medicine exhibitōeꝫ: nō ꝓpter qualitatē ſꝫ ꝑꝑ quātitatē: ⁊ multotiēs eꝯ. Ex q̄bus ſequit̄ ꝙ lꝫ in illis īcludat̄ ꝯſideratiōibꝰ: facilior tm̄ habet̄ doctrīa ſigillatiꝫ determinādo de eis qđ Aui. fecit. ¶ Ad argª in oppoſitū pꝫ ſolō primi. ¶ Solō ſcđi ē ꝙ illaꝝ plurima reducunt̄ ad ꝯſiderationē determīate q̄litatis ⁊ q̄ꝫtitatis. ¶ Ad 3ᵐ dr̄ ꝙ illa de cā cōſiderant̄ ex ꝑte corꝑis ⁊ īcludunt̄ ī debita q̄litate ⁊ quātitate medicīe ꝯſiderāde.

In electōe autē qualitatis medicine abſolute nō habet cognitio niſi ꝑ cognitōeꝫ ſpēi egritudis: quoniā cum egritudis qualitas ſcita fuerit: erit medicīa eligēda que ei in ſua qualitate ſit ꝯ̄ria: quoniā egritudo ſuo medicat̄ contrario ⁊ cōſeruatur ſanitas ſuo ſimili.

¶ Nūc exequit̄ de iſtis regulis. Et diuidit̄ ī tres ꝑtes. ibi 2ª: quātitas auteꝫ. ibi 3ª: ex tꝑe autem egritudinis. In prima parte dicit duo. ¶ Primuꝫ eſt: cognitio abſolute q̄litatis medicīe: vtputa caliditatis ⁊ frigiditatis nō ꝯ̄hendo iſta ad menſurā vel gradū: nō habet̄ niſi ex nā egritudinis. ¶ Dicit 2° ꝙ hoc eſt iſto mō: q꞉ cognita q̄litate morbi eligimꝰ medicinā ꝯ̄riam. Et rō: q꞉ oīs cura fit ꝑ ꝯ̄ria lꝫ ſanitatis ꝯſeruatio fiat ꝑ ſimilia. ¶ Circa lr̄am nota prio ꝙ q̄litatē medicine qn̄qꝫ conſideramꝰ abſolute nō trahendo ad determinatā potentiā vel gradū: verbigr̄a ꝙ eſt calida vel frida ⁊c̄. Scđo ꝯſideramꝰ ꝯ̄ctaꝫ ad ꝓprietateꝫ vel ad ꝓportionē. Cognitio ſpēi vel eēntie morbi facit nos abſolute cognoſcere q̄litatē medicine. ⁊ nō aliud ad hoc req̄rit̄ q̄ꝫ cognitio eſſentie morbi. Sꝫ q̄litas ꝯ̄cta modo dicto potius refert̄ ad quātitatē: ad quā cognoſcendā alia req̄runt̄ vt ſupra habuiſti: ⁊ ideo de illa īfra dicet̄. Ex quo pꝫ ꝙ li abſolute ī textu dꝫ coniūgi cū li quātitatis. ¶ Scđo nota hic hūc locū duplr̄ ſolere exponi. vno modo ſumēdo egritudinē ꝓprie: ita ꝙ cāꝫ vt ſic non dicimꝰ egritudinē: nec accidēs vt ſic dicamꝰ egritudinē. Et videt̄ ꝙ curatio ſoli morbo debeat̄ ⁊ cauſe ꝑuiſio: vt in cōmēto illiꝰ affo. Ex plenitudine q̄cūqꝫ egritudīes fiūt: euacuatio ſanat. Et 2° terapētice voluit ergo Aui. ꝙ in curatōe q̄ eſt morbi remotio: q̄litas medicine hoc faciētis q̄ ſūt ſumēda ab eſſentia morbi dꝫ eſſe ꝯ̄ria: q꞉ debemꝰ eligere medicinā ꝯ̄riaꝫ. Sꝫ multotiēs in oꝑe ꝑuiſionis medicamē ſumit̄ cōſimilis q̄litatis cū morbo: vt cū damꝰ ſcamoneā ad euacuañ. coleraꝫ facientē tertianā vel ſirᵐ calidū ad digereñ. flegma faciēs quotidianā. ¶ Scđs modus exponēdi eſt ītelligere hic per actū curatiuū: actū remotiuū reꝫ ꝑter nām ſiue ſit morbꝰ ſiue cā ſiue accidēs: ⁊ tunc ꝑ egritudinē nō ītelligimus tm̄ morbū ſtricte: ſed oēm diſpōneꝫ ꝑternaturalē: ſiue ſit cā ſiue accidēs: ⁊ erit ſenſus ꝙ ab eſſentia rei preter nām ſumimꝰ quātitatē medicine abſolute loquēdo de q̄litate: q꞉ medicina de ſui q̄litate dꝫ eſſe ꝯ̄ria ei. Et tūc ē cōſiderāduꝫ ꝙ ꝯ̄ria qn̄qꝫ ſumunt̄ ꝓprie: vt qn̄ dicimꝰ ꝯ̄ria q̄ in eodē genere poſita maxime a ſe inuicē diſtāt. Qn̄qꝫ vero īꝓprie ꝓ omī alteriꝰ remotiuo: ⁊ hoc modo ſumit̄ hic ꝯ̄riuꝫ qđ dicit̄ cōiter a medicis ꝯ̄riuꝫ virtualr̄: quēadmoduꝫ vere ⁊ ſtricte ꝯ̄ria ſunt ſe inuicē corruptiua: ita illud in medicina dicit̄ rei ꝑter nām ꝯ̄riuꝫ qđ eſt eiꝰ remotiuū. ⁊ hoc modo ītelligit Gal. in terapētica. Sumit̄ ergo ꝯ̄riuꝫ ꝓ ꝯ̄rio efficiente ⁊ nō ſtricte. Ex quo ſequit̄ ꝙ nō īconuenit duo ꝯ̄ria eſſe hoc modo: quoꝝ vtrūqꝫ cōparatū hōi tēperato eſt caᵐ: ⁊ tm̄ vnū alteri ꝑ illā q̄litateꝫ ꝯ̄riat̄. vnde in morbo calido cōuenit medicina cal̄a: vt in cancrena ꝑ putrefactionē q̄ eſt a caliditate cōuenit cauteriū cal̄m. Et in apate cal̄o iuuat ꝑmitti repcuſſiua frigida. In ſtatu vero conueniūt reſolutiua ⁊ ī declinatiōe q̄ ſunt cal̄a. ⁊ hoc modo itelligēdo ꝯ̄rium: veꝝ ē ꝙ oīs cura eſt ꝑ ꝯ̄riuꝫ. Qđ aūt ab Aui. infra dicit̄ ꝙ non oīs egritudo ſuo medicat̄ contrario: intelligēdum eſt de ꝯ̄rio ſtricte ⁊ non de modo dicto qđ iā conceſſuꝫ eſt. Et per hoc volo excuſari ad diſputationeꝫ: vtrū omnis cura fiat per contraria.

Quātitatis aūt ipſiꝰ mēſura ex duabꝰ cognoſcit̄ partibus ſm̄ moduꝫ mēſure artificialis ex natura mēbri ⁊ ex quātitate egritudis: ex rebꝰ que ſuꝑ illud ſua ſignāt ꝯueniētia ⁊ aptitudīe ipſaꝝ que ſūt genꝰ ⁊ etas ⁊ ꝯſuetudo ⁊ tēpus ⁊ regio ⁊ ars ⁊ virtus ⁊ forma.

¶ Nunc exequit̄ de quātitate: ⁊ diuidit̄ in duas ꝑtes. Primo eiꝫ enumerat ea a q̄bꝰ fit vel ſumit̄ cognitio quātitatis medicine. 2° ſigillatim ꝓſequit̄ oſtēdendo quō ſumat̄. 2ª ibi: natura vero. In pria dicit ꝙ nā quātitatis medicinaꝝ ſm̄ modū mēſure artificialis cognoſcit̄ ex duabꝰ rebꝰ. ſ. nā mēbri ⁊ quātitate egritudis. Cognoſcit̄ ēt ꝑ res q̄ ſui conueniētia ⁊ aptitudine hn̄t hoc ſignificare. ſ. membri nām ⁊ morbi quātitatē ſicut ſunt etas ⁊ genꝰ ⁊ ſexus ⁊ ꝯſuetudo ⁊ tp̄s ⁊ regio ⁊ ars ⁊ virtꝰ ⁊ forma. ¶ Circa parteꝫ nota p° ꝙ Aui. dicit duo genera: poſtea enumerat tria a quibꝰ illa cognitio quātitatis ſumit̄. Et rō eſt q꞉ contēta ſub mēbro tertio nō ſignificant de quātitate medicīe niſi ꝓ q̄ꝫto ſignificāt nām morbi aut mēbri q̄ꝫtitatē. ¶ Scđo nota ꝙ dicit ſm̄ moduꝫ mēſure artificialis. i. cognitio talis qualis ē artificialis cognitio mēſure debite q̄ eſt ſm̄ arbitriū eſtimatiuū certe veritati ꝓpinquū non oīo certuꝫ. Nā vt 3° de īgenio ſanitatis dr̄ ꝙ vna ē res que nec calamo ſcribi nec līgua ꝓferri pōt. ſ. certa rei q̄litas. ¶ 3° nota ꝙ ꝑ virtutē ītelligimꝰ fortitudinē aut debilitateꝫ: ⁊ ꝑ formā ītelligimꝰ corꝑis hītudinē ꝑguedinē aut macredinē.

Auic. nō fecit mētionē de q̄ꝫtitate graduali medicīe q꞉ eā dedit ītelligere qn̄ indagauit cognitioneꝫ qualitatꝭ abſolute ipſius ex natura egritudis ſm̄ modū dictū.

Nature vero mēbri cognitio quattuor reꝝ ꝯtinet cognitioneꝫ. ſ. cōplexionis mēbri ⁊ creationis eius: ⁊ eius ſitus ⁊ ipſius virtutis.

¶ Proſequit̄ de illis: diuidit̄ in duas ſꝫ ꝙ de duobus dictis determinat. determinat ēt de rebꝰ q̄ ſua conueniētia ſignificāt ꝓut in alia ꝑte ſuperiꝰ diuiſa pꝫ. Fuit eiꝫ in ca. quedā ſubordinatio: ut bn̄ notat Dynꝰ. 2ª pars eſt ibi: ſm̄ vero egritudines. Prima in duas. p° enumerat ea q̄ ſunt in nā mēbri conſiderāda. 2° exequit̄. ibi 2ª: ⁊ ꝯplones quidē. ¶ Dicit p° ꝙ cognitio nāe mēbri quātū attinet ꝓpoſito: cōtinet cognitionē quattuor reꝝ. ſ. ꝯplōnis mēbri ⁊ creatōis

UVA. BHSC. IyR_006_1

⁊ creatõis eius ⁊ plaſmatõis: ⁊ ſitus eiꝰ ⁊ virtutis eiuſdẽ. Ubi nota ꝙ hic ꝑ cõplõnez intelligimꝰ nālez ⁊ nõ accidẽtalez. ¶ Nota 2º ꝙ ꝑ creationẽ intelligimꝰ plaſma ꝯtinẽs in ſe quattuoꝛ maneries naturaꝝ.ſ. viã figurã ⁊ receptaculũ ⁊ ſuperficiẽ: lꝫ hoc plaſma nõ ſm oẽs ſuos modos cõſidereť i ſciẽdo quãtitatez medicĩe vt ĩfra patebit. ¶ Tertio nota ꝙ per ſitũ intelligimꝰ duo.ſ. ſocietatez: vt ſcio ꝙ mãmille ſunt ita ſituate ꝙ eaꝝ due vene magne ad matricez terminate aduenıũt. Et ĩtelligimꝰ locũ coꝛpoꝛis: vt in dextro vel ſiniſtro ⁊c̃. ¶ Quarto nota ꝙ per virtutẽ non ĩtelligimꝰ robur ſꝫ maneriẽ virtutis aĩe vel potẽtie aĩe: cuius oꝑatio in mẽbꝛo ꝯpleť: vt qꝛ ibi ſit virtꝰ vitalis vel aĩalis: aut ꝙ ſit virtꝰ vitalis neceſſarie operatiõis ad eſſe vel nõ eſſe: ergo ꝯſiderantť vt ĩfra videbis in mẽbꝛi nã. ¶ Nota 5º lꝫ quãtitas diſcreta ⁊ cõtinua ſint ẽt ex ꝑte mẽbꝛi nature ⁊ ſimilr numerꝰ: ab iſtis tñ nõ ſumiť indicatio de foꝛtitudine medicĩe: ⁊ iõ iſta tacuit. vel ſi quãtitas hoc ſignificat: res erat nota ⁊ quõ: ⁊ iõ nõ fuit opoꝛtunũ dicere.

Pro euidentioꝛi noª huiꝰ materie: vide Gal. in.vij.li. de ĩgenio ſanitatis in.c. xvj. ⁊ i libꝛo de apoſtematibus ad glauconez in.c.xij.

Et ꝯplexionis quidẽ mẽbꝛi quoniã cuꝫ eiꝰ naturalis ꝯplexio ſcita fuerit ⁊ ipſius ꝯplexio in egris ſcieť ꝑ mẽſurã eſtimatiuã quãto eius ꝯplexio naturalis elongata fuerit: ſcieť ergo mẽſura quãtitatis qua ipſa reduci poſſit ad tẽperiẽ: verbigratia quoniã ſi ſanatiua ꝯplõ fuerit frigida ⁊ egritudinalis calida: tũc iaꝫ multa elõgatio erit a ꝯplõne ſui: ⁊ tũc multa ĩdigebit ĩfrigidatiõe: qꝺ ſi ambe fuerint calide ſufficit ei parua ĩfrigidatio.

¶ Nunc exequiť: ⁊ diuidiť i quattuoꝛ ꝑtes ſm ꝙ quattuoꝛ ſũt in nã mẽbꝛi ꝯſiderãda. 2ª ibi: ⁊ creatõis quidez. 3ª ibi: ⁊ ſitus. 4ª ibi: ⁊ vtilitas quidẽ. ¶ De pª dicit iſtã conclusionẽ. Cognitio cõplõnis nãlis mẽbꝛi patiẽtis iuuat ad cognoſcẽduꝫ nãm vel menſurã artificialẽ medicĩe appꝛoximãde. ꝓbať qꝛ talis cognitio iuuat ad cognoſcendũ menſurã artificialẽ ꝯplõnis egritudĩs. Nã cum ſciť quãta eſt nãlis cõplõ ⁊ quãta eſt non nãlis: tũc ſciť quãta eſt diſtantia a nãli ꝯplõne. Sꝫ cognita mẽſura egritudĩalis ꝯplexionis: cognoſcimꝰ nãm medicine reductiue ad ſanitatẽ: ergo tãdez per cognitionẽ ꝯplõnis nãlis iuuať ad ſciendũ artificialez mẽſuram medicĩe appꝛoximãde: verbigrã: ſi ſciať ꝙ nãlis ꝯplõ mẽbꝛi eſt frigida ⁊ egritudĩalis ẽ calida: tũc ſciemꝰ ꝙ multa ĩdiget ĩfrigidatõe: qꝛ ibi eſt elõgatio a naturali diſpõne. Sꝫ ſi ambe ꝯplõnes ⁊ nãlis ⁊ accñtalis fuerĩt calide: tũc pauca ſufficit ĩfrigidatio. ¶ Circa quã partez nota ꝙ nõ eſt Auic. intẽtio ꝙ ſola cognitio nãlis ꝯplexionis membꝛi facit nos ſufficiẽter artificialẽ cognoſcere quãtitatẽ medicine: ſꝫ adiuuat ⁊ dedit modũ. Nã iſta cognitio adiuuat ad ſciendũ diſtantiã lapſus ꝯplõnalis ſaltẽ gradualez a ꝓpꝛio tꝑamento egrotãtis modo dicto i exº: ⁊ ad tale tꝑamentũ eſt coꝛpus reducendũ: ⁊ iõ ſciť quãtitas quodãmodo ĩfrigidatiõis aut alteratiõis requiſite per quã etiã iuuamur ad ſciendũ menſurã medicine. naꝫ alijs paribꝰ ad plus ĩfrigidãduꝫ foꝛtioꝛi ĩdigemꝰ medicina ĩfrigidãte cũ cõtinue medicina patiať ⁊ debiliteť a coꝛꝑe. Et hoc modo expoſitõis non vĩ Auic. ĩuenire ꝙ foꝛtioꝛa ĩfrigidantia ſint appꝛoximãda flegmatico calefacto q̃ꝫ colerico aut eꝯ. Sꝫ ꝙ poſita paritate in lapſu caliditatis in mẽbꝛo nãliter frĩdo ⁊ accñtalr calefacto: ⁊ in mẽbꝛo nãliter calido ⁊ accñtalr calefacto: maioꝛi ĩfrigidatõe ĩdigemꝰ ĩ frigido.

¶ Utrũ aũt iſta indigeãt foꝛtius ĩfrigidãtibus nõ dicit: nec dicit vt ſupꝛa ſuppoſita equali graduali diſtantia lapſus calidi ĩ coꝛpoꝛe frigido a ꝓpꝛio tẽperamẽto: ⁊ lapſus calidi ĩ coꝛꝑe calido a ꝓpꝛio tꝑamento: quis iſtoꝝ ſit peioꝛ lapſus vel maioꝛ: ⁊ ideo non pertinet huic loco diſputare: vtruꝫ lapſus ſimilis ſit peioꝛ lapſu ꝯ̃rio. ſed tñ ꝯñter ſolet hic q̃ri vtrũ lapſus ſimilis ſit deterioꝛ q̃ꝫ lapſus ꝯ̃riꝰ: ſꝫ ẽ dubiũ lõgũ: cuiꝰ determĩatõez vide ĩ illa.q. ſub illo affo. In moꝛbis minꝰ periclitanť egrotãtes. quã feci.

Dubitatur vtrũ colerico et flegmatico equalr febꝛiẽtibꝰ frĩdioꝛa ꝯueniãt colerico q̃ꝫ fl'atico?

¶ Arguiť negatiue ſic. Aliqua ſufficiũt ĩfrĩdare colericuꝫ q̃ nõ ſufficiũt ĩfrigidare fl'aticũ: ergo frĩdioꝛa regrunť ad ĩfrigidatõꝫ fl'atici q̃ꝫ colerici. Aſſũptũ pꝫ. medicĩa eq̃lis caliditatis cũ fl'atico febꝛicitãte nõ ſufficit ipꝫ ĩfrĩdare cũ ſit ſil'is. ⁊ illa ſufficit ĩfrĩdare colericũ: qꝛ remiſſioꝛis gradus caloꝛis: ergo ⁊c̃. ¶ 2º ĩ fl'atico febꝛiẽte ꝯueniũt frĩda merito diſcraſie remouẽde ⁊ merito nãlis ꝯplõnis cõſeruãde: ſꝫ colerico merito diſcraſie ꝯueniũt frĩda ⁊ merito cõplõnis nãlis cal'a: ergo frĩoꝛa ꝯueniũt fl'atico q̃ꝫ colerico. Cõſequẽtia nota qꝛ merito diſcraſie vtraqꝫ exñte equali eque frĩda ꝯueniręt: ergo cũ alioꝝ ſtãte paritate frĩdis vtẽdum ſit ĩ fl'atico ⁊ calidis ĩ colerico. foꝛtioꝛibꝰ frĩdis ĩdiget flegmaticꝰ q̃ꝫ colericꝰ. Aſſũptũ ẽ Gal'. 8º terapẽ. c. vl. ¶ 3º ad ĩtẽſioꝛẽ graduꝫ frĩditatis dꝫ duci coꝛpꝰ fl'aticũ q̃ꝫ colericũ febꝛiẽs: ergo ĩfrĩdãtibꝰ ĩdiget intẽſioꝛibꝰ. Cõſequẽtia nota qꝛ ſaltẽ frĩdis eque ĩdiget ſicut erit ĩ fine aut frĩdioꝛibꝰ. Sed nõ tã frĩdis ĩdiget colericꝰ: qꝛ ꝑ minꝰ frĩda ſaltẽ reiterata poterit ad ſuũ tꝑamẽtũ reduci cum talia ſint citra caliditatẽ colerico nãlez. Preterea foꝛtioꝛ ⁊ maioꝛ lapſus alijs paribus foꝛtioꝛibꝰ indiget curatiuis: ſed lapſus flegmatici ẽ maioꝛ cum ſit diſſimilis: ergo ⁊c̃. Ad eandem partem videtur mens Auic. hic.

In oppoſitum arguitur ſic.

Magis reſiſtit colericus cãis ĩfrĩdãtibꝰ q̃ꝫ fl'aticꝰ: ergo foꝛtioꝛibus ĩdiget ĩfrĩdatiuis. Cõſeq̃ntia nota ⁊ añs pꝫ: qꝛ maioꝛ ẽ ĩ eo mẽſura caliditatis ad reſiſtẽdũ ĩfrĩdãtibꝰ ꝑ quã totũ reſiſtit. ¶ Cõfirmať qꝛ colerico dãtur frĩda ꝓ moꝛbo remouẽdo ⁊ ꝓ lapſu ꝯplõnis ad ſimiliã ꝓhibẽdo. Sꝫ fl'atico cõueniũt frĩda ꝓ cura lapſus ⁊ cal'a ne ꝯplõ nãlis ad ſimilez labať. ¶ Circa iſtã.q. ẽ pº notãdũ ꝙ aliud ẽ dicẽ frĩdioꝛa ꝯpetere: ⁊ aliud ẽ dicẽ potẽtiꝰ frĩda. Nã lꝫ opiũ ſit nãliter frigidius q̃ꝫ lactuca: poſſet tñ ſumi ita parua quãtitas opij ⁊ ita magna q̃ꝫtitas lactuce ꝙ potẽtioꝛ eẽt lactuce q̃ꝫtitas ad ĩfrigidandũ q̃ꝫ q̃ꝫtitas opij. Et ideo non obſtãte ꝙ illud paucũ opij poſſꝫ ⁊ dꝫ dici frĩdius q̃ꝫ lactuca: tñ illa quãtitas magna ẽ potẽtiꝰ ĩfrigidatiua. ¶ 2º nota ꝙ colericũ ⁊ fl'aticũ equaliter febꝛire iuxta modos loq̃ndi doctoꝝ põt duplr ĩtelligi. Uno mõ ꝙ ita febꝛiãt ambo ꝙ ad actũ appeãt eq̃ calidi. 2º mõ ꝙ eq̃li gradu febꝛilis caloꝛis recedãt a tꝑamẽto ꝓpꝛio: ita ꝙ ſi ꝑ vnũ recedat colericꝰ a ſua colericitate verſus caliduꝫ: ſilr fl'aticus ꝑ vnũ diſtet gradũ a ſua nãli ꝯplõne. ¶ Tertio nota ꝙ aliqꝺ põt eẽ potens frigidũ qꝺ nõ velociter ĩfrigidat ſuũ paſſuꝫ: ⁊ põt eẽ aliqꝺ debile frigidũ ĩtẽſe frigidans ⁊ velociter ſuũ paſſuꝫ. Et hoc ꝯtigit ꝑꝑ varietatez paſſoꝝ: ꝑcipue qꝛ reſpectu potẽtioꝛis erit ẽt paſſuꝫ multo potẽtiꝰ: ⁊ q̃ñqꝫ ꝑꝑ alias circũſtãtias: vt applicatiõis ⁊ iuuamẽtoꝝ. ¶ Quarto nota ꝙ cũ dicimꝰ aliqꝺ eſſe foꝛte ĩfrigidãs: põt ex cõi vſu loquẽdi ĩtelligi duobꝰ modis. Uno modo rõne foꝛtitudĩs agẽtis: ⁊ hoc modo ſemꝑ illud diciť foꝛtiꝰ ĩfrigidãs ĩter duo ĩfrigidãtia qꝺ eſt in ſe potẽtiꝰ frigidũ. Scꝺo modo in ꝯparatõe ad ĩfrigidationẽ quã facit: ita ꝙ illud qꝺ magis ĩfrigidat diciť foꝛtiꝰ ĩfrigidãs: verbigrã ſit.a. potẽs vt.viij. b. vero reſiſtẽs vt quattuoꝛ. a. agat velocitate vt duo: ſed ſit.c. potẽs vt.vj. d. vero reſiſtẽs vt vnũ. c. agit velocitate pluſq̃ꝫ vt q̃ttuoꝛ: ⁊ tñ. a. ẽ foꝛtiꝰ ĩfrigidãs. pº modo qꝛ hꝫ maioꝛẽ potẽtiam ĩfrigidãdi. c. vero eſt foꝛtiꝰ ĩfrigidãs. 2º mõ qꝛ magis ĩfrigidat. ¶ Quĩto nota ꝙ ẽt apud modos loquẽdi medicoꝝ duobꝰ modis aliqꝺ diciť foꝛtiꝰ ĩfrigidãs. Uno mõ diciť foꝛtiꝰ: qꝛ maioꝛẽ latitudinẽ frĩditatis ĩducit ĩ equali tꝑe ſicut ſi vnũ ĩducat in hoꝛã duos gradus ⁊ aliud vnuꝫ graduꝫ. illud qꝺ ĩducit duos gradus ẽ foꝛtiꝰ ĩfrigidãs. Scꝺo mõ diciť foꝛtiꝰ infrigidãs: qꝛ maioꝛẽ latitudinẽ frĩditatis ĩducit ſiue in tꝑe equali ſiue ĩ maioꝛi. ſicut dicimꝰ ꝙ foꝛtiꝰ infrigidať vnuꝫ ꝑmanẽdo in aere mediocriter frigido per diẽ q̃ꝫ ipſuꝫ idẽ ꝑmanẽdo in aere valde frigidioꝛi ꝑ paruũ tꝑs: ⁊ ideo ille aer mediocriter frĩdus diciť foꝛtiter ĩfrigidatiuus ſiue foꝛte ĩfrigidãs: ⁊ ille frĩdioꝛ diciť debilr ĩfrigidãs non obſtãte ꝙ ille aer frigidioꝛ ꝓ tꝑe quo agit velociꝰ ĩfrigidet. Et ſꝫ hoc etiã medici dicunt ꝙ aliqꝺ ẽ foꝛtiꝰ ĩfrigidãs quoad vnã applicatõez: ſꝫ ſtat aliud debiliſſimũ ꝑ vnã applicationẽ fieri foꝛtiꝰ ĩfrigidãs: qꝛ multotiens applicabiť ita vt tãdẽ plus de ĩfrigiditate ĩducat. ¶ Sexto nota ꝙ ĩfrigidatõez foꝛtẽ vel debilẽ vel frĩda appꝛoximãda intẽſa vel remiſſa: nõ ſoluꝫ ex ꝯplõne patiẽtis ⁊ q̃litate ⁊ quãtitate moꝛbi iudicamꝰ. Nã virtꝰ ⁊ nã mẽbꝛi tꝑs anni ⁊ multa alia ſunt ꝯſiderãda que q̃ñqꝫ indicãt ꝓpoꝛtionabilr ꝯplõnez q̃ñqꝫ oppoſito modo. ¶ Septio nota ꝓut ſumiť in iſto ca. ⁊ 8º terapẽtice. c. vlti. eẽ ponẽdã paritatẽ alioꝝ ĩdicãtiũ: ⁊ erit ſenſus q̃õnis vtrũ colerico ⁊ flegmatico coꝛpoꝛibꝰ calefactis equalr ꝑter nãꝫ frĩdioꝛa ꝯueniãt colerico q̃ꝫ flegmatico alijs paribꝰ indicatõibꝰ quãtuꝫ eſt poſſibile: puta ex virtute ⁊ nã ⁊ tꝑe ⁊ alijs ĩfra dicendis in iſto caº. ¶ His itaqꝫ declaratis: ĩ reſiduo ponã duos articulos. In pº narrabo opinionẽ alioꝝ ĩ mã. In 2º videbiť de modo quodam mihi magis ꝓbabili apparente.

Quantuꝫ ad pꝛimum eſt pꝛima opinio

Cõci. ⁊ Dy. ipm ſequẽtis in q̃buſdã ꝯcl'onibꝰ. Et hec ẽ pꝛia ꝯcl'o. Colerico ⁊ flegmatico equalr febꝛiẽtibꝰ ſtat ꝑꝑ alioꝝ diſparitatẽ frĩoꝛa eſſe offerẽda colerico ĩ vna vice ⁊ eꝯ̃ flegmatico. Pꝛobať cõcluſio: qꝛ ſi virtꝰ flegmatici ſit virtꝰ valde debilis nõ tollerãs appꝛoximatõez multoꝝ frigidoꝝ: ⁊ cum hoc tꝑs hyemale ⁊ regio frĩda ⁊ cõſuetudo ſumẽdi talia. ⁊ coꝛꝑis tenuitas ĩ flegmatico: colericꝰ vero febꝛiat ĩ tꝑe calido ⁊ cũ virtute robuſta ⁊ ſit frĩdis aſſuefactꝰ: nõ ẽ dubiũ frĩoꝛa ꝯpetere colerico q̃ꝫ flegmatico: qꝛ ĩdicatões ad frĩoꝛa ſũt foꝛtioꝛes. ⁊ ita in ꝯ̃rio caſu ꝯtingere poſſꝫ oppoſitũ. In iſta ꝯcl'one nemo diſcoꝛdat. ¶ Scꝺa ꝯcl'o: colerico ⁊ flegmatico equalr febꝛiẽtibꝰ vt eque calidi ad tactũ videãť: frigidioꝛa ꝯueniũt flegmatico q̃ꝫ colerico ceteris ꝑtibꝰ: qꝛ illi ꝯpetũt frĩdioꝛa qui magis ꝑmutatus eſt a nãli ꝯplõne verſus calidũ: ſꝫ flegmaticꝰ ẽ huiuſmõi: ergo ⁊c̃. ⁊ hoc ẽ de mẽte Aui. hic ⁊ Gal. 8º terapẽtice. c. vltio. dũ ꝯpauit colericũ iuueni aſſueto diete cal'e ⁊ ſicce. ⁊ dixit fl'aticũ coꝛpꝰ pucrile ⁊c̃. Itez pꝛioꝛi qdẽ ⁊ ꝑꝑ nãm ⁊ etatẽ ⁊ ſimilibꝰ eiſdẽ dietatõibꝰ aſſuetis apta ſiccioꝛa ⁊ calidioꝛa ꝯuenire cibaria. Idem ẽt ſentit 7º terapẽtice cum

UVA. BHSC. IyR_006_1

dicit: Quecūq́ꝫ calidiores nā ꝑticule ſꝫ friditatē egrotant
magis hoc ⁊ vſq́ꝫ āpliꝰ tpˢ calefieri īdigebūt. in fridis aūt
eꝯ. Nā in tm̄ redire oꝫ vnāquāq́ꝫ diſcraſſiaꝝ ad eā q̄ ſm
nāꝫ ī quātū ē ī ea q̄ ſūt ꝑter nāꝫ euerſe. Idē ſentit Halia/
bas 3° practice cū dixit: Oꝫ medelā ſꝫ cōplōnē corꝑis fie/
ri: vt ſiqdē corꝑis frida ē nālis ꝯplō egemꝰ ī fe. rebꝰ q̄ for/
titer īfrigidāt eo q͛ hoc corpus friduꝫ a ꝯplōne ſua nāli eſt
elōgatū plurimū. ¶ Tertia ꝯclō: corpore colerico ⁊ fleg/
matico equalr̄ febriētibꝰ reſpectu ꝓprij tꝑamenti fridiora
ꝯueniūt flegmatico q̄ꝫ colerico alijs paribꝰ: qꝛ flātico ꝯue/
nit ꝓpter malā ꝯplōneꝫ remouēdaꝫ ⁊ nāleꝫ ꝯſeruādā. Sꝫ
colerico tm̄ ꝯueniūt ꝑꝑ malā cōplōneꝫ remouēdaꝫ: ⁊ ideo
ceteris paribꝰ magis ꝯueniūt frida flātico q̄ꝫ colerico. Et
cōfirmari pōt: qꝛ ī vlceribꝰ partiū ſiccaꝝ vt ſunt nerui for
tioribꝰ ⁊ ſiccioribꝰ vtimur medicaminibꝰ: in vlceribꝰ par/
tiuꝫ humidaꝝ ⁊ carniū glādoſaꝝ minus fortibꝰ: vt ſumit̄
ex Aui. 3° quarti de medicis facientibꝰ naſci carnē. Sed ſi
dicat̄ frida ꝯuenire colerico ꝑꝑ reductionē ad tēperamē/
tuꝫ: rīdet̄ q͛ ꝓ tunc nō dꝫ regi regimīe reductiuo: ſꝫ con
ſeruatiuo quouſq́ꝫ ſanet̄. ¶ Scd̄a opi. colligit̄ ab Ange.
de ſenis ī ſua. q. d̄ lapſibꝰ. ⁊ ꝯſiſtit ī duabꝰ ꝯclōnibꝰ. ¶ pᵃ
eſt iſta. Colerico ⁊ flegmatico equaliter febrientibus ſiue
quoad tactū ſiue reſpectu tꝑamenti ꝓprij frigidiora alte/
rātia ⁊ ꝓ alteratōe debent̄ colerico q̄ꝫ flegmatico. Pro/
bat̄: qꝛ illi corpori quoad pure alterātia debent̄ fridiora in
quo reperit̄ maior reſiſtētia cauſis īfrigidātibꝰ. Sꝫ in cor
pore colerico ita reſpectu flātici: ergo ⁊c̄. Cōſeq̄ntia nota.
Pꝫ minor: qꝛ calor colerici ē maior q̄ꝫ calor flātici eſto q͛
ad eq̄les gradus veniſſent. Ideꝫ cōfirmat experiētia qꝛ vi
demus medicos curātes flāticos nō audere ſuper potū aq̄
frigide ⁊ alijs rebꝰ īfrigidātibꝰ ſicut audēt in cura coleri/
coꝝ ꝑꝑ timorē extinctōis caloris nālis. Et hāc ꝯcluſioneꝫ
voluit Auer. 8° colliget. ¶ Scd̄a ꝯclō: colerico ⁊ flegma/
tico equalr̄ febriētibꝰ quocūq́ꝫ ſiue reſpectu ꝓprij tēpera/
mēti ſiue quoad tactū fridiores cibi debēt flātico q̄ꝫ cole/
rico. Probat̄: qꝛ debent̄ cibi ꝑ quos reponātur ꝑternāli/
ter frigidiores q̄ꝫ ille quibꝰ īdigent colerici. Nā debent ꝑ
iſtos cibos reponi ꝑtes ſiles partibus deꝑditis in vtroq́ꝫ.
⁊ cōſtat q͛ frigidiores ſunt deꝑdite ī flātico. Et hāc ꝯclu/
ſionē videt̄ voluiſſe Gal. 8° terapētice. ⁊ ꝑcedētē voluiſſe
Auer. ⁊ hoc mō ꝯcordant̄ iſti doctores. ¶ Tertia opi. eſt
Marſilij volētis tres ꝯclōnes. ¶ Prīa ē iſtis dictis equa
liter febriētibꝰ quoad tactū fridiora conueniūt flātico alijs
paribꝰ: pꝫ quia maior caliditatis latitudo eſt corrūpenda.
¶ Scd̄a ꝯclō: iſtis febriētibꝰ equalr̄ reſpectu ꝓprij tēpe/
ramēti fridiora ꝯueniūt colerico: qꝛ gradus equalis calidi
tatis ē remouēdus: ⁊ maior eſt reſiſtētia ī colerico alijs pa/
ribꝰ. ¶ Tertia cōcluſio: lapſu exiſtente equali reſpectu ꝓ
prij tꝑamenti eque ꝑciſe frida conueniūt effectiue: pꝫ quia
frigida eque preciſe ad equalē frigiditatis latitudinē indu
centia ꝯueniūt. ⁊ iſta quodāmodo pn̄t dici eque frida effe/
ctiue. ¶ Circa iſtaꝝ iprobationes non inſiſto: qꝛ in ſequē/
tibus videbit̄ quid de ipſis ſit dicendum.

Galienꝰ voluit fridiora deberi flegmatico. Auerrois vo ſeptio colliget. c. ij. colerico: ſꝫ ille reſpexit complexionem: hic vero virtutez.

Quantum ad ſecundum articulum

ſuppono primo q͛ in cura male cōplōnis calide non ſuffi/
ciūt per ſe ꝑ quātācūq́ꝫ reiterationē ea q̄ ſunt ita modicū
frida q͛ frigiditatē ꝓprij tꝑamenti corꝑis egrotātis intro
ducere non pn̄t. pꝫ qꝛ per ſe curatiua debēt totuꝫ lapſum
abijcere ⁊ ꝯplōneꝫ naturalē per ſe ītroducere. ¶ Suppo.
2° q͛ medicina tꝑata vel calida in certo gradu vel frida nō
eſt corꝑis alteratiua in ſimili gradu reſpectu tꝑamenti vt
tāti gradus alteratiui. Uolo dicere q͛ medicina calida in
primo: īquātū calida ī primo nō eſt corꝑis calidi in primo
ꝑ ſe alteratiua ⁊ ſic de alijs. pꝫ qꝛ oīs medicina talis calida
in primo eēt corporis calidi in primo alteratiua. mō hoc ē
falſuꝫ: qꝛ medicina que calefacit corpus tꝑatum ad primū
gradū corporis calidioris eſt īfrigidatiua multotiēs: vt ſu
mit̄ ex Gal. pᵒ ⁊ 2° de ſimplici medicina. ⁊ vidiſti de eo la
tius in ca. de eo q̄d comedit̄ ⁊ bibit̄. ¶ Suppono 3° q͛ ali
qua medicina ī primo frigida ē per reiteratōeꝫ vſq́ꝫ ad 4ᵐ
infrīdatiua: ⁊ ita correſpōdēter aliqua calida in primo ⁊c̄.
hoc totū pꝫ in. c. ſuperiꝰ allegato. ¶ Quarto ſuppo. q͛ ſi
corpꝰ tēperatū labat̄ ad calidū per nullaꝫ medicinā calidā
quātūcūq́ꝫ remiſſiorē ꝯplōne diſtēperata acquiſita ab eo
reducit̄ ad tꝑamentū. hoc pꝫ per Gal. 3° de ſimplici me/
dicina: vbi dixit q͛ ſi egritudo eēt vehemētioris calidita/
tis q̄ꝫ ſit ꝯplō media: tūc medicine ſimiles ei ſeruāt ipſam
⁊ faciūt eaꝫ remanere ſm ſuaꝫ diſpōneꝫ. Et medicine que
ſunt calidiores addūt caliditatē ei. Et medicine q̄ ſunt mi
noris caliditatis q̄ꝫ ipſa minuūt caliditatē eius: tm̄ nō ſa/
nant ſanatōe cōpleta. ¶ Ex iſto ſequit̄ q͛ corpore frido la
pſo verſus calm̄ nulla medicina minꝰ frigida ipſo: vt talis
ſufficit ipſuꝫ ꝑ ſe ſanare: vt pꝫ: qꝛ ſicut ſe hꝫ medicina cali
dior tꝑata ad tꝑatuꝫ: ita medicina minꝰ frida hoc corpore
frido hꝫ ſe ad hoc frigidū: ſꝫ medicina calidior tꝑata nō ē
alteratiua corꝑis tꝑati: vt pꝫ ex 2ᵃ ſuppōne: q̄re nec medi/
cina minꝰ frida pōt vt ſic quoad gradū friditatis eiꝰ remit
tere totalr̄ calorē: ⁊ hoc poſſet ꝑ pauca deduci ex 2ᵃ ſuppo
ſitiōe. ¶ Quīto ſuppo. q͛ corꝑe colerico calefacto ꝑ ſolaꝫ

Iſtud eſt ſꝫ mētē Gal. in de ſimplici medina volētis gradus mediciaꝝ dici reſpectu cōplexionis tēperate: ita q͛ illa dicit̄ calida in primo que tēperamētū cauſat ī primo.

alteratione reducibili ſub quodā gradu inter tꝑamentū ⁊
nāleꝫ cōplōneꝫ illiꝰ colerici nō repugnat īueniri medicinā
ꝑ reiteratōeꝫ aptā per ſeipſaꝫ colericū calefactū ad ꝓpriū
tꝑamentū reducere. probat̄ qꝛ corꝑe calefacto ꝑternatura
liter medicina cal̄a: ſꝫ minus cal̄a q̄ꝫ ſit illa ꝯplō diſtēpera
ta: illā ſufficit remittere ⁊ verſus tꝑamentū ducere: vt pꝫ
ex Gal. loco ſtatiꝫ allegato: ergo ſub quolibet gradu cali/
ditatis medicinaꝝ citra ꝓpriū tm̄ tꝑamentuꝫ dati colerici
ꝯtingit īueniri medicinā cuiuſlibet gradus ſuꝑioris remiſ
ſiuā: ⁊ iō per reiteratōeꝫ vſq́ꝫ ad ꝓpriū tꝑamentū reducti
uaꝫ. ¶ Sexto ſup. q͛ lꝫ corꝑa alicuiꝰ ꝯplōnis nālis ſint ab
illa ꝯplōne lapſa: hn̄t tm̄ nālem īclinationē ad reditum ad
nāleꝫ ꝯplōneꝫ ⁊ virtutē ab intrīſeco eorūdem reductiuā.
Iſta per ſe pꝫ: nō tm̄ in hoīe ſed ēt in brutis ⁊ īanimatis ⁊
elemētis. ¶ Ultimo ſuppo. q͛ nō repugnat dari colericū
⁊ flegmaticū eiuſdē etatis cuꝫ equali quātitate ſanguis ⁊
ſpirituū ⁊ humidi membralis. pꝫ ſuppō per multos caſus
imaginarios: vt ſi in vno fiat ſanguis eūatio ⁊ ſpūuꝫ ⁊ hu
midi mēbralis reſolutio: poterūt ambo ad equalē mēſuraꝫ
ſanguis ⁊ ſpūuꝫ ⁊ humidi mēbralis deduci. ¶ His habi
tis pᵃ ꝯclō eſt iſta. Colerico ⁊ flātico equalr̄ quoad tactum
calefactis maiori īfrigidatōe īdiget flāticus ⁊ fortiꝰ īfrigi/
dātibꝰ modo vno ſupradicto. pꝫ qꝛ ꝑ maiorē latitudinē ca
liditatis diſtat a tꝑamēto ꝓprio. ⁊ hanc vult Aui. ⁊ omēs
ꝯcedūt. ¶ Scd̄a ꝯclō: colerico ⁊ flātico equalr̄ febriētibꝰ
minꝰ potētes medicine req̄runt̄ ad īfrigidāduꝫ flāticū q̄ꝫ
colericū. Probat̄: minor eſt reſiſtētia īfrigidātibꝰ in fleg/
matico q̄ꝫ ī colerico cū caliditas iſta ſit equalis ⁊ magis ꝑ/
ternaturalis. in flātico aūt ſalteꝫ ꝑciſe tantū reſiſtit flātici
caliditas cauſis īfrigidātibꝰ ſicut illiꝰ colerici: ⁊ ab intrin/
ſeco fortius inclinat̄ ad reducēdū ſe ad frigiditatē: ⁊ fortiꝰ
iuuat̄ cū hēat nāleꝫ ꝯplōneꝫ fridaꝫ magis ad hoc iuuātē:
ergo minꝰ potēti medicīa īfriatiua pōt infrīdari flāticū q̄ꝫ
colericū. Ex iſto ſequit̄ q͛ minus potētibꝰ fridis pōt redu
ci ⁊ curari flāticus febriēs q̄ꝫ colericus: qꝛ nō fortior medi
cina requirit̄ ad īfrigidāduꝫ poſt aliqualeꝫ īfrigidationeꝫ
q̄ꝫ prius: ⁊ ideo cū minꝰ forti ad ꝓpriū tꝑamentū pōt redu
ci. Ex his ſequit̄ 2° q͛ indicatiōe ſumpta a nāli ꝯplōne di/
ctoꝝ: lꝫ maiori īfrigidatōe īdigeat flāticus q̄ꝫ colericus: ta
men minꝰ potētia frida ſunt flātico approximāda q̄ꝫ cole/
rico. ¶ Tertia ꝯclō: colerico ⁊ flātico mō dicto equalr̄ fe/
brientibꝰ req̄rit̄ vt ſint medicine gradualr̄ fridiores ad cu
raꝫ flātici q̄ꝫ colerici. Probat̄: ad curā colerici nō req̄run
tur vt ſic medicine gradualr̄ frigidiores a tꝑato gradualr̄
diſtātes: vt pꝫ ex ſuppōne 5ᵃ. Nā colerico preternaturalr̄
calefacto nō repugnat īueniri medicinā calidiorē tēperata
minꝰ calidā ꝯplōne naturali colerici illiꝰ tamē ꝑ ſe reiterā
do reductiuā vt dicit 5ᵃ ſuppō. Sꝫ ad curaꝫ flegmatici vt
ſic requirunt̄ medicine frigidiores tꝑatis: vt pꝫ ex corela
rio quarte ſuppōnis. Naꝫ tꝑata vt ſic nō eſt tꝑati īfrigida
tiua ⁊ calidiores nō pn̄t vſq́ꝫ ad tꝑamentum reducere. Ex
quibꝰ pꝫ q͛ īdicatōe ſumpta a ꝯplexione nāli tāq́ꝫ a ꝯſerua
bili: qꝛ illa nō opꝫ omittere ī cura ⁊ cū vſq́ꝫ ad illā veniēdū
eſt: gradualr̄ frigidiora opꝫ offerri flegmatico q̄ꝫ colerico.
Et hoc vult Gal. 8° terapētice. c. vl. cū dixit q͛ frigidiora
ꝯpetūt flegmatico q̄ꝫ colerico īdicatōe ſumpta a nāli ꝯplō/
ne. ¶ Quarta ꝯclō: colerico ⁊ flegmatico equalr̄ febriēti/
bꝰ alijs paribꝰ ſtat nō eque intēſe frigida ꝯueniēter offerri
flegmatico ſicut colerico. Patet qꝛ talibꝰ magis reſiſteret
colericus q̄ꝫ flegmaticus: ergo ſtabit iſta q̄nq́ꝫ ſufficere co
lericū ſine notabili leſiōe infrīdare: que tm̄ flegmaticuꝫ cū
notabili leſiōe infriāret. ⁊ hoc vult Auer. 7° collꝫ. Unde
ſecurius ītēſe frida offerimꝰ colerico intēſe febriēti multū
q̄ꝫ flegmatico ꝑꝑ debilitateꝫ caloris ad reſiſtēdū cāis infri
gidātibꝰ. ¶ Quinta ꝯclō: colerico ⁊ flegmatico equalr̄ fe
briētibꝰ alijs paribꝰ reſpectu ꝓprij temꝑamēti: lꝫ potētio/
ra requirant̄ frigida ad colericū īfrīdandū q̄ꝫ flegmaticū:
nō tm̄ req̄runt̄ gradualr̄ frīora ad alterādū ⁊ curādū cole/
ricū q̄ꝫ flegmaticū: patet ex dictis. ¶ Ex his pꝫ pᵒ q͛ rō/
nes ꝓ pᵃ 2ᵃ ⁊ 3ᵃ ꝯclōnibꝰ prime opinionis nō ꝯcludunt nec
ipi illas ad ſenſuꝫ datū poſuerūt. ¶ Seq̄t̄ 2° q͛ rōes ſcd̄e
opiniōis d̄claratiue ſūt falſe. ¶ Seq̄t̄ 3° q͛ 2ᵃ ⁊ 3ᵃ ꝯclōnes
tertie opi. nō ſūt vere. ¶ Sꝫ hic cadūt aliq̄ dubitatiōes.
Prīa vtrū duobꝰ flegmaticis īequalr̄ a tꝑamēto diſtāti/
bꝰ ⁊ eque calefactis frīora req̄rant̄ ad curā frīoris q̄ꝫ minꝰ
frigidi? Et videt̄ q͛ per eque frida pōt reduci flegmaticus
minꝰ fridus ⁊ etiā magis frigidus ſuppoſito q͛ medicina
primi gradus per reiteratione poſſet effectū quarti gra/
dus īducere. Et ſimilis q̄ō de duobꝰ calidis infrīdatis ſe/
quit̄: in quibus credo q͛ quātūcūq́ꝫ per remiſſe frida quo
ad gradualē denoīationē poſſet reduci minus frīdū. ⁊ per
tātū remiſſe frigida iuxta loquutiōes medicoꝝ pōt reduci
magis fridum. Et tu vide q̄uō hoc ſuperioribꝰ nō cōtra/
dicat ex hoc q͛ medicinaꝝ calidarū in p̄io quedā ē calefa/
ctiua calidi in pᵒ ⁊ ſcd̄o. quedā vero non ſed ſūt calidi re/
miſſiua. ¶ Ex his patet ad argumenta: ⁊ patet q͛ tria pri/
ma concludunt potentiora frigida gradualiter danda eſſe
flegmatico q̄d eſt cōceſſuꝫ. ſꝫ argumenta partis oppoſite
cōcludūt potētiora frida dāda eē colerico. illd̄ etiā conce/
ditur nec repugnat dictis vt patet.

Et hoc ē qꝛ licet ꝯplexio actualis variectur: ſtat tm̄ virtualē non variari.

Nota q͛ ſcd̄a tertia ⁊ quarta ꝯcluſiones intelliguntur de equalitate quoad tactum.

Et creatiōis

Et creationis quidem mēbꝛi iaȝ diximus ꝙ creatu-ra membꝛi in quattuoꝛ diuidiť modos:⁊ tu quidē eam ibi conſiderare debes.

⁋ Nūc ponit modū ſꝫ quē ex creatõe mēbꝛi ſumiť indicatio de quātitate medicine offerēde: ⁊ diuiditur in tres. Pꝛīo ponit vnū genꝰ ꝯtentoꝝ ſub creatõe. 2º ponit duas diſtinctões ad ꝓpoſitū cū cañ. 3º graduat mēbꝛa ſm has diſpõnes in requiſitõe foꝛtis vel debilis medicine. 2ª ibi: poſt hoc. 3ª ibi: qđ auteȝ foꝛti. ⁋ De pꝛīa dicit ꝙ iam dictuȝ ē ſupꝛa 2ª fen ꝙ creatio mēbꝛi hȝ quattuoꝛ modos ſm ꝙ hoc nomīe creatõis quattuoꝛ īpoꝛtanť maneries vel diſpõnes mēbꝛi: vt ſūt figura: receptaculū: via ⁊ ſupfícies: ꝓ quibꝰ vide qđ dixi pº tegni ⁊ ſupꝛa fen 2ª. ⁋ No. tñ hic ꝙ a figura vel a ſuperficie modica vel nulla ſumiť indicatio foꝛtitudinis medicine: ⁊ ideo ab iſtis Auic. non docet eligere: ſed quia a via vel receptaculo ſumitur: ideo de illis fecit mentionem.

Poſt hoc ſcire debes ꝙ mēbꝛoꝝ quedā ſūt que ī foraminibꝰ ſuis ſunt facilia: ⁊ ſunt ī eis interius aut exterius loca vacua: per que expellitur ſupfluitas medicina ſubtili ⁊ tempata. Et eoꝝ ſunt alia que non ſunt ita: ſꝫ medicina indiget foꝛtioꝛe: ⁊ ſimiliter eoꝝ qđ eſt rarum ⁊ qđ ē ſpiſſum. Et raro quidē medicina ſufficit ſubtilis: ⁊ ſpiſſo eſt medicina foꝛtis neceſſaria.

Galienꝰ 7º đ igenio ſanitatis. c. vltio vult nobis purgationē pꝛincipaliter oſtēdi ex creatõe mēbꝛi.

⁋ Ponit diſtinctiões cū cañ. Et ē pª diſtinctio ꝙ mēbꝛa quedaȝ ſunt facilia in ſuis foꝛaminibꝰ. i. hñt foꝛamina per que faciliter mā euacuať vt ſūt illa q̄ interius hñt cõcauitatē: aut exterius hñt loca vacua. i. cuȝ eis ꝯiungiť exterius cõcauitas ꝑ que euacuanť humoꝛes medicina ſubtili debili. i. quedā aūt hec nõ habēt ⁊ īdigēt medicina foꝛtiori. ⁋ Scđa diſtinctio ē ꝙ mēbꝛoꝝ quoddaȝ rarū: quoddā ē ſpiſſuȝ. Rarū īdiget medicina ſubtili. i. debili. ſpiſſū alijs paribus foꝛtioꝛi medicina. Et ideo notāter alijs paribus: qꝛ vltra receptacula ⁊ viā ſunt plura indicātia de foꝛtitudine aut debilitate medicine. Et ideo ſtat ꝙ mēbꝛū raruȝ nõ inquantū ē rarū īdiget medicina foꝛti: ſed ꝓ quāto diſtat a loco vbi medicīa recipiť vel alia cauſa. Et ideo vni mēbꝛo merito vnius medicina foꝛtis cõuenit cui merito alterıꝰ cõuenit debilis vt pulmoni vt patebit: nec iſta repugnāt. Et qꝛ rarū vt hic ſumiť ſignificat hñs multos poꝛos: denſuȝ vero habēs paucos vel ſtrictos: ideo patet ꝙ iſte diſtinctões ſumūtur ex parte vie aut receptaculi. 2º ēt videť cā cañ. nā ꝑ vias manifeſtas faciliꝛ fit eūatio: ⁊ ī mēbꝛis hñtibꝰ multa ⁊ magna foꝛaīa faciliꝰ agēs īpꝛimit. Ecõtra autem difficulter fit in oppoſito modo diſpoſito.

Quod aūt foꝛti medicina magis indiget: eſt illud qđ in nulla duarū partiū ventriculuȝ habet neqȝ receptaculū. Et poſt ipſuȝ ē illđ qđ hȝ in vna parte. Et poſt illud ē quod a duabꝰ partibus hȝ receptaculuȝ ſed ē ſolidum ⁊ ſpiſſuȝ ſicut rigno: poſtea eſt illud qđ ea habet a duabus partibus ⁊ eſt rarum ſicut pulmo.

⁋ Hic facit qđ dictū eſt: dicēs ꝙ īter mēbꝛa ſupple que merito dictaꝝ diſpõnuȝ indigēt foꝛtioꝛi medicina eſt illud qđ nõ hȝ receptaculū aut vehiculū manifeſtū in vna duarū partiuȝ: puta nec intra nec extra manifeſte ſicut ſūt nerui. ⁊ iõ medicine que a neruis euacuant ſunt foꝛtiſſime vt eufoꝛbiuȝ coloquintida ⁊ ſimilia. ⁋ In 2º loco ē mēbꝛum qđ hȝ receptaculū manifeſtū ⁊ viā ab vna parte tm̄. ſ. aut ab ītra aut ab extra: ſicut verbi grā nucha que ad cerebꝛū terminať vbi ē cõcauitas. ⁋ Et loco 3º illud qđ habet intus ⁊ extra: ſꝫ ſpiſſuȝ ē ⁊ ſolidū vt ren ſiue rigno. habȝ eiȝ cõcauitatē intra ſe manifeſtā: ⁊ ad ipſum terminātur poꝛi vꝛitides ad veſicā ducentes vꝛinā. ⁋ Quarto loco facile merito iſtaꝝ diſpõnuȝ eūatur illud qđ ē rarū ⁊ ab vtraqȝ parte hȝ cõcauitatē vt ē pulmo. hȝ eiȝ ītra ſe venas ⁊ cānulas ⁊ ad cānā terminātur. ⁋ Et nota ꝙ lȝ infra dicať ꝙ pulmo indigeat foꝛti medicina vt eūetur mā in eo ꝯtenta: diciť ꝙ hoc nõ intelligiť abſolute: ſꝫ de medicina ꝑ vētrē aut vꝛinaȝ eductiua. que qꝛ lõge a pulmone mõ ſuo poniť oȝ ꝙ ſit foꝛtis: ſꝫ merito ꝯcauitatis requiriť debilis: ⁊ ita ꝑ ſputum facili educiť medicia niſi mā in ſe multū reſiſtet. ⁋ Hic ſolet queri a quo mēbꝛo facilius eūatur mā an ab epate an a ſplene? Et diciť ꝙ abſolute ab epate. Naȝ plures vie terminãť ab epate ad īteſtina q̄ȝ a ſplene. Etiā mā eūanda ē ſubtilioꝛ plurimū ⁊ eūoni obediētioꝛ. verūtñ merito raritatis ⁊ denſitatis mēbꝛi faciliꝰ a ſplene eūareť. Ex quibꝰ collige ꝙ cū iſte plures īdicatiões quādoqȝ ſibi īuicē ꝯſequūť oȝ foꝛtioꝛē īſequi nõ dimittēdo oīo aliaȝ.

Gentilis in hoc paſſu dicit ꝙ pulmo indiget medicīa foꝛti rõne diſtantie ⁊ non ꝓpꝛie ſubſtantie ⁊ ex hoc ſaluaťGalienuȝ in tegni.

Nõ ſoluȝ ſubſtātia mēbꝛi ſpiſſa ⁊ diſtantia ipſiꝰ ſunt cauſa exhibendi foꝛtem medicinaȝ: ſed ēt ſitꝰ receptaculi vt pȝ in ītеſtino monoclo habēte ſolū ex vna pte receptaculū ꝑ qđ intrant ⁊ exeunt ſeces ideo indiget foꝛtioꝛi medicina reſpū alioruȝ inteſtinoꝝ.

Et ſitus quidem mēbꝛi: quoniaȝ per ſitū cognoſciť quēadmodū tu ſcis aut locꝰ aut ſocietas.

⁋ Nūc docet eligere quātitatē medicine ex ſitu: ⁊ diuidiť in duas partes. In pº ponit diſtinctões de ſitu. 2º ponit modos eligēdi q̄ȝtitatē medicine ex illis. ibi 2ª: vtilitas vero. ⁋ Pars pcedēs ē manifeſta qꝛ ſitus vt dixi ſupꝛa fen 2ª ſignificat locū mēbꝛi in coꝛpoꝛe ⁊ ſocietateȝ cuȝ alijs mēbꝛis vt duoꝛuȝ digitoꝝ cõiūctio eſt egritudo in ſitu ⁊ diuiſio venaꝝ īter māmillas ⁊ matriceȝ exñtiuȝ ē egritudo in ſitu ſcilicet ſumendo ſituȝ pꝛo ſocietate.

Utilitas vero que ex ſocietatis pꝛouenit cognitiõe ē magis ꝓpꝛia: ꝓpterea qđ partē magis eligis ad quā medicina trahit ⁊ ad quaȝ magis declinare facis: verbi gratia cū fuerit materia in gibbo epatis euacuabis eā ꝑ vrinā: ⁊ ſi ī epatis ꝯcauitate fuerit euacuabis eā ꝑ ventrē: qm̄ epatis gibboſitas mēbꝛis vrine eſt aſſociata: ⁊ eius concauitas eſt aſſociata inteſtinis.

⁋ Nunc docet eligere quātitatē medicīe: ⁊ diuidiť in tres. pº docet ex ſocietate ꝑ ſe. 2º ex loco per ſe. 3º ex his duobꝰ ſimul. ibi 2ª: ſꝫ eiꝰ vtilitas. ibi 3ª: q̄nq̄ȝ ēt. ⁋ De pꝛima dicit ꝙ vtilitas q̄ ſequiť cognitõeȝ ſocietatis ē magis ꝓpꝛia q̄ȝ vtilitas q̄ habeť ex cognitõe loci: qꝛ vltra quātitatē docet ⁊ locū ꝑ quē debemꝰ eūare: ⁊ mēbꝛū ꝑ qđ debemꝰ multotiēs deriuare vel facere đclinare māȝ. verbigrā cū mā ē ī gibbo epatis ſcio ꝑꝑ ſocietatē ꝙ eūare debeo per vrinā. ſed māȝ in ꝯcauo ītеſtinis aſſociatā ꝑ ventrē eūare debeo. ⁋ Ubi nota pº ꝙ lȝ hic Aui. pꝛīcipaliter q̄rat medicine quātitatē: intentioni tñ miſcuit modū cognoſcendi ꝑ quē locuȝ eūare dȝ ⁊ modos mixtiõis. Nā quaſi ad magnitudinē virtutis medicine ꝑtinere videnť: eo ꝙ ad manerıē eius virtutis attinet: qꝛ ꝑ cognitionē ſocietatis mēbꝛi ſcimus locū ꝑ quē eūandū eſt ⁊ ꝑ modū mixtiõis vniꝰ medicine cū alia. Ideo diciť hic ꝙ hec cognitio habita ex noticia ſocietatis ē magis ꝓpꝛia. i. faciet cognoſcere quedaȝ magis a ꝓpꝛietate q̄ȝ ſit foꝛtitudo q̄ pure cognoſciť ex ꝑhabitis. vel ſcđo intelligiť ꝙ iſta vtilitas ē magis ꝓpꝛia q̄ȝ que ex loco ſumiť. Nā iſta tantū in eūone ⁊ mālibꝰ egritudinibꝰ videmꝰ iuuare: ſꝫ locus in oībus tā in mālibꝰ q̄ȝ nõ. ⁋ Nota 2º ꝙ alijs īpedimētis deductis mā eſt potiꝰ ꝑ loca ꝓpinqua q̄ȝ remota eūanda: ⁊ iõ mā in gibbo epatis exiſtēs ꝑ vrinales vias eūatur tanq̄ȝ ꝓpinquioꝛes niſi fuerit ꝯtrīuȝ īdicās. Nā qꝛ vie vrinales ſunt ſtricte ⁊ multū ſenſibiles ⁊ eoꝝ vlcera ſūt difficilis ſanatõis: ideo mām multā in gibbo epatis ꝯtenta: nõ per vias vrine ſed ꝑ inteſtina eūamus. ⁊ hoc voluit Gal. 7º de īgenio ſanitatis: cū docuit eā eūari per viā ſeceſſus. ſꝫ cū eſt pauca ⁊ nõ ē alia intētio q̄ȝ eūatio: nec eſt timoꝛ de nocumētis in vijs vrine eſt per vrinā eūanda. ⁊ hoc voluit Aui. ⁋ Ultimo nota ꝙ lȝ medicina poſſet trahere mās ad mēbꝛa ⁊ facere đclinare quodāmodo: tñ poſſemꝰ dicere ꝙ cū mā repugnat multotiēs motui ad mēbꝛū ad qđ mouet ipſa medicina: tūc tractio videť īpoꝛtare quādaȝ moleſtiā. ſed qñ mā nõ multuȝ reſiſtit: īmo quodāmodo īclinať: tūc dicimus ꝙ medicina declinare facit. vel qñ trahiť ad locuȝ vbi poniť medicina dř trahi. qñ vero ꝓpelliť vt in ꝑcuſſiuis fit: tunc deriuať.

Sed eiꝰ vtilitas que ex ꝑte ſciendi locū ꝓuenit: eſt triuȝ modoꝝ. vnus eoꝝ eſt eiꝰ lõgitudo ⁊ ipſiꝰ ꝓpīquitas: quoniā ſi fuerit ꝓpinquū ſicut ſtomacus peruenıēt ad ipſuȝ medicine tēperate ⁊ operabunť ī ipſo: ⁊ ſi longinquū fuerit ſicut pulmo: medicinaꝝ tēperataꝝ virtutes coꝛrūpenť antequā ad ipſum perueniāt: quapꝑ erit neceſſariū vt in eaꝝ virtutibꝰ augmētū fiat. Opȝ itaqȝ vt cū mēbꝛuȝ ē ꝓpinquū cui obuiat medicina ſit virtus medicine ipſiꝰ ſm menſurā que egritudini ſit oppoſita: ⁊ ſi īter ea fuerit lõgitudo ⁊ ſpaciū ⁊ eſt egritudo cui eſt medicina neceſſaria q̄ȝ virtꝰ ꝓfundans penetrare faciat: tūc neceſſariū ē in virtute medicine plus addere q̄ȝ pꝛius erat ei neceſſariū ſicut acetuȝ in emplaſtro ſciatice ⁊ reliquis. Et ſcđs modus ē vt ſciať quid medicinis ſit admiſcēduȝ: vt per illud velociter ad mēbꝛum ꝑueniat quēadmodū medicinis mēbꝛoꝝ vrine admiſcētur diuretica ⁊ medicis coꝛdis crocus. Et tertiꝰ quideȝ modus ē vt ſciamꝰ qua parte medicinā ad ipſuȝ trāſire faciamꝰ: verbigratia ſi ſciuerimꝰ ꝙ vlcera in īferioꝛibꝰ exñt inteſtinis per cliſteria iniciemꝰ: ⁊ ſi ſciuerimꝰ ꝙ ſint in ſupeꝛioꝛibꝰ: per illud qđ bibūt afferemus.

⁋ Ponit modū cognoſcēdi nām medicine ex loco mēbꝛi: ⁊ facit quattuoꝛ. Pꝛimū eſt ꝙ ex loco hēmꝰ tres modos vtilitatis. Scđȝ eſt ꝙ pꝛimꝰ hoꝛū modoꝝ eſt cognoſcere vtrū ſit mēbꝛū vicinū loco appꝛoximatõis medicine an longinquū? Nā ſufficit medicina tēperata in moꝛbo ꝓpinquo ⁊ mēbꝛo ꝓpoꝛtiõata. ſed lõginquo oȝ offerre multo foꝛtioꝛē: ita ꝙ ad mēbꝛū eum ſufficiēti virtute ad opus ꝑueniat. Et hoc fit duobꝰ modis vel addēdo in quātitate vel gradū medicīe appꝛoximāde aut miſcēdo cuȝ medicina aliquid qđ ipſaȝ penetrare faciat cito. Exēplum pꝛimi vt ſi mā eſt a pede eūanda dabo foꝛtioꝛē medicinā q̄ȝ ſi a ſtomaco. Exēpluȝ ſcđi vt ſi diſſoluēda ſit mā ſciatice: miſcebo ī emplaſtro acetū ad faciendū penetrare. ⁊ hos ī exēplis Aui. tetigi. ⁋ Scđs modus ē ſcire quid medicinis eſt

UVA. BHSC. IyR_006_1

admiſcēduꝫ vt medicine ad mēbꝛuꝫ cū ſua virtute perueniant vt miſcemꝰ crocū in medicis coꝛdialibꝰ ⁊ nucē muſcatā in medicinis capitis. ¶ Tertius modus eſt ſcire per quā viā medicina faciliꝰ ad locū deducit̃: puta cliſteri aut potu: vnde inteſtinoꝝ groſſoꝝ vlcera cliſteri medicamur: ſed ſubtiliū cū aſſumptōe medicine ꝑ os ꝓ quāto ꝯſideramus locū. Cōſideramꝰ enīꝫ locū vt abſolute ita diſtantē a loco medicine: q꞉ tūc eligimꝰ pꝛimā vtilitatuꝫ iſtaꝝ triuꝫ. Cōſideramꝰ ēt locū ꝓ quāto eſt ad hoc determinatū mēbꝛū ſicut cerebꝛū: ⁊ ſic eſt ſcđa vtilitas. Sed ꝓ quāto ꝯſideramꝰ locū mēbꝛi quibuſdā determinatis ductibꝰ eē ita vicinū aut remotū hēmus tertiā vtilitatē. ¶ Sed ꝓpter exēpla nota ꝙ pulmo ē lōginquus a loco vñ ſumit̃ medicina q̄ bibit̃. Nā pꝛimo trāſit ad ſtomacuꝫ. 2° ad epar. 3° ad coꝛ. 4° ad pulmonē ꝑ venas. Cū aūt medicina lābendo ſumitur nō eſt pulmo longe. ⁊ de hoc dictum eſt ſupꝛa quō ſibi foꝛtis ⁊ debilis medicina eſt neceſſaria.

Qn̄qꝫ cōfert loci ⁊ ſocietatis ſimul ſollicitudinē habere: ⁊ hoc quidē eſt in eo qđ facere debemꝰ cum fuerit materia tota iā in mēbꝛo euacuata: ⁊ in eo qđ facere debemus cuꝫ materia adhuc euacuatur.

¶ Docet vtilitates que habent̃ ex ꝯſideratōe loci ⁊ ſocietatis ſimul: ⁊ diuidit̃ in duas. p° facit hoc. 2° ponit cañ. erroꝝ coꝛrectiuos. ibi 2ª: cuꝫ ad diuerſum. Pꝛima adhuc in duas. p° enumerat cās aut modos in quibꝰ ꝑ hec duo ſimul ꝯſideranda inuenit̃ modus in eligēdo medicinā vel admīſtrādo. 2° hoc declarat. 2ª ibi ꝓpe: quoniā cū fuerit. ¶ Dicit p° ꝙ habemꝰ vtilitatē in iſta ꝯſideratōe in ſciendo qđ facere debemꝰ cum mā peccās tota ē ī mēbꝛo eūata ⁊ fluxit ⁊c̃. 2° iuuamur in ſciēdo quid debemꝰ facere cum mā adhuc fluit. ¶ Sꝫ ſi querat̃ vtrū per hoc iuuemur cū mā ꝑtim fluxit ⁊ partiꝫ eſt in fluxu: ⁊ ſil'r qñ mā eſt parata fluere ſꝫ nōduꝫ fluit: ⁊ 3° qñ mā eſt mēbꝛo ꝯtenta nō ꝑ fluxuꝫ ſed per paulatinā congeſtionē: Dicenduꝫ ꝙ ſic: vnde idē quoad hoc dicēduꝫ de mā que tota fluxit ⁊ de illa q̄ tota parata ē fluere in mēbꝛo: ⁊ de aggregata ꝑ paulatinaꝫ ꝯgōneꝫ: ⁊ de illa q̄ actu fluit. In illa aūt q̄ partim fluxit ⁊ partim eſt in fluxu iudicia ſunt oppoſita vt cōſtat. Et ideo per hec dicēda datur intelligi qualiter ex hac ſocietate loci noticia inuenit̃ in quolibet iſtoꝝ modoꝛuꝫ.

Quoniā cuꝫ ſciuerimꝰ ꝙ materia fuerit adhuc in deſcenſu: a ſuo loco materiaꝫ extrahemꝰ poſtquā quattuoꝛ ꝯditionū curā habuerimꝰ. Una ē ꝑtis diuerſitas quēadmodū a dextra ad ſiniſtrā trahimꝰ ⁊ a ſuperioꝛibus ad inferioꝛa. Et ſcđa eſt vt ſocietatis curā habeamꝰ ſicut mēſtrua vētoſis retineamꝰ quas māmillis ſupponimus ſocio attrahētes. Et tertia rectitudinū curaꝫ hēre quēadmodū oꝫ ī egritudinibꝰ epatis: ī dextra minutioneꝫ facimꝰ baſilica: ⁊ in egritudinibꝰ ſplenis in baſilica ſiniſtra. Et quarta quidē eſt cū ſollicitudine elongatōis ne qđ extrahit̃ valde ſit ꝓpinquū ei a quo extrahit̃.

¶ Nunc declarat: ⁊ diuidit̃ in duas ꝑtes. p° docet qđ faciendū ſit cū mā fluit. 2° quid faciēduꝫ cū fluxit tota. 2ª ibi: ſed cū hic accidit. ¶ De pꝛima ꝑte dicit ſic qđ eſt veꝝ ꝙ cognitio ſocietatis ⁊ loci nos iuuat ad cognoſcēdū moduꝫ medicatōis cuꝫ fluit a mā. Et rō eſt q꞉ cū ſcimꝰ ꝙ mā adhuc fluit: nos debemꝰ eūare taleꝫ mām: ſꝫ cū cura ⁊ ſollicitudine quattuoꝛ ꝯditionū. ¶ Pꝛima ē vt trahat̃ ad locuꝫ diuerſuꝫ ab illo mēbꝛo ad qđ fluit: puta ſi mēbꝛuꝫ eſt ſurſuꝫ trahat̃ deoꝛſuꝫ: ⁊ ſi a dextro trahat̃ ad ſiniſtrū. Et hoc non poſſumꝰ ſcire niſi noticia loci vel mēbꝛi. ¶ Scđa cōditio eſt hēre curā ſocietatis: ita ꝙ poſſumꝰ ꝑ mēbꝛum vel ad mēbꝛuꝫ ſocietatē habēs attrahere: ſicut māꝫ a matrice trahimꝰ cuꝫ vētoſis q̄ māmillis ſupponunt̃. ¶ Tertia eſt hēre curā rectitudīs vt mām epatis ꝑ dexterā baſilicaꝫ euacuemꝰ ⁊ mām ſplenis cū flobotomia ſiniſtre baſilice. ¶ Et 4ª eſt videre ne attractio fiat ad locū valde vicinū mēbꝛo patienti: ⁊ ſi ē in oculo nō trahat̃ ad nares: ⁊ ſi eſſet ī amigdalis ⁊ vua vt in ſquinātia nō trahat̃ ad venas que ſunt ſub līgua. ¶ Circa partē nota ꝙ cuꝫ mā adhuc fluit duplex ē medici intētio. vna eſt ad fluxū ꝓhibendū: alia ē ad materie eūoneꝫ. In ꝓhibēdo fluxuꝫ debemꝰ ad oᵐ loci: ⁊ quoad hoc adhibet̃ intentio pꝛima ⁊ ſollicitudo de quattuoꝛ iā dictis. Nā ſi trahat̃ ad locū valde vicinū ſolū nō ꝓhibet̃ fluxus īmo auget̃ ⁊ ꝑcipue in coꝛꝑe plectoꝛio. Et ego plures vidi ex ſquinātia qui moꝛtui ſūt ꝓpter medici īpericiā cito ad flobotomiā venaꝝ ſub lingua tranſeuntis quoad eūoneꝫ materiei. Scđa intētio eſt materiā eūandaꝫ ꝑ aptiſſima loca ducere que melius apta ſūt ⁊ ſocietatē hn̄t viaꝝ manifeſtaꝝ vt māmillaꝝ cuꝫ matrice ⁊ loca directe aſpiciētia vt baſilica cū epate. ¶ Sꝫ hic cadūt tres dubitatōes. Pꝛima vtrū mā fluente ſit attractio fienda ad partē diuerſam. Scđa quare non fecit mentionē de diametro ꝓfunditatis. Tertia vtrū in paſſiōe ſplenis magis ꝯueniat eūatio baſilice ſiniſtre q̄ꝫ dextre. ¶ Ad negatiuā pꝛimi dubij arguit̃ ſic. Mā eſt eūanda ꝑ locū ad queꝫ nā trāſmittit: ergo nō per locū diuerſum a mēbꝛo recipiēte. Aſſumptū ē Hyp. ī illo affo. Quecūqꝫ ducere oꝫ vn̄cūqꝫ natura repit ⁊c̃. ⁊ Gal. in ꝯmēto: Confirmat̃ q꞉ humores qui inferiꝰ cadunt cogente nā ſunt per inferiꝰ eūandi: ergo nō per partē oppoſitā. Cōſequētia nota ⁊ aſſumptuꝫ eſt Hyp. ſuper illo affo. Super diafragma doloꝛes ⁊c̃. Et Gal. in ꝯmēto duꝫ dixit: Que vero inferiꝰ cogunt̃ in his aperiat̃ poꝛta inferioꝛ. Et idē vult ī illo affo. Nō febꝛicitātibus ſi fiat. ⁊ idē in illa particula: nō febꝛicitātibus ſi fiat faſtidiū. Et Gal. in ꝯmēto vult ꝙ his ſignificātibꝰ mām colericā in oꝛe ſtomaci ꝯtineri debemꝰ euacuare vomitu ⁊ nō per partē diuerſaꝫ ſed eādeꝫ. Et hoc vult Aui. pª quarti de cura putridaꝝ in gn̄ali cū dixit: Qđ ſi īuenies humoreꝫ pꝛimo declinare ad ſtomacū: tunc fac vomere cū eis in quibꝰ nō ſit diuerſitas ꝯſuetudini: īmo cū eis q̄ ſunt ſirupus acetoſus cū aqua calida cū natura mouet humoꝛē ad vomitū ⁊ nō verſifices eaꝫ. Qđ ſi illic fuerit declinatio ad īteſtina ⁊ ſenſeris rugitū ad deſcēſuꝫ fecis: tūc adhibe qđ diſſoluat ventrē. Idē 16ª tertij. c. de cura colice paſſionis vbi vomitꝰ appꝫet. Et idē Raſis 9° almāſo. c. ſimili. ⁊ 10ª tertij. c. de aſmate. Materia aſmatis eūatur tuſſi ⁊ ſputo 16°. c. de colica fit eūatio cū cliſtere ex mā fluente. Et ī peſtilentialibꝰ fit eūatio per parteꝫ eandem: ⁊ cū materia mittitur a pꝛincipali mēbꝛo ad emūctoꝛiuꝫ euacuamꝰ non diuertendo. Iteꝫ in criſi non diuertit̃ materia.

In oppoſitum eſt Aui. hic. Circa huius dubij ſolutionem nota pꝛimo ꝙ quedaꝫ ſunt materie quaruꝫ fluxuꝫ non intēdimus pꝛohibere: ſed ſoluꝫ intēdimus ad earum eūoneꝫ. Et ratio eſt: naꝫ qn̄qꝫ materie ſuꝑfluunt per loca eūoni eaꝝ ꝯueniētia: qn̄qꝫ aūt per loca incōueniētia. ⁊ cuꝫ concurrūt ad loca cōueniētia: non intēdimꝰ fluxū merito huiꝰ ꝓhibere ſꝫ iuuare. Medicus eīꝫ ē adiutoꝛ nāe. Cum aūt ꝑ loca incōueniētia fluunt qn̄qꝫ ꝓhibēdo fluxū poſſumus ꝓhibere magna nocumēta ſolū mīma faciēdo. Qn̄qꝫ autē faceremꝰ maioꝛa nocumēta fluxū ꝓhibēdo. verbigrā cū mā eſt ventoſa ⁊ currit ad mēbꝛa extrinſeca: ſi diuertit̃ periculū eſt ī trāſitu eius ꝑ loca ītrinſeca ⁊ in hoꝛa illa nocumēta magna ſunt. Et ita cū materia ē valde mala a mēbꝛo pꝛīcipali ad emūctoꝛia trāſmiſſa ⁊ in multis alijs caſibus quibꝰ nō obſtāte ꝙ mā per mēbꝛa ſiue incōueniētia loca ducat̃: tñ q꞉ in ꝓhibitōe fluxus eēt maius ꝑiculū: nos illuꝫ nō ꝓhibemꝰ. Simil'r qn̄qꝫ mā peccās eſt digna euacuatōe qn̄qꝫ nō. Nā qñ ſanguis nō eſt peccās ⁊ virtꝰ valde debilis: etiā ſi per ꝯueniētiſſima loca fieret eūatio tñ ꝓhibemus: q꞉ non dignus eſt eūone. Quādo aūt eſt malus ⁊ cuꝫ talibꝰ circūſtantijs an in coꝛpoꝛe iuuenili eſt dignus euacuari ⁊ nō ꝓhibemus ſed iuuamꝰ: ⁊ ſi natura per conueniētia loca facit iuuamus etiā. Ex his ponunt̃ ꝯcl'ones.

¶ Pꝛima nō ſemꝑ mā ad mēbꝛum fluente fluxus ē ꝓhibēdus. pꝫ q꞉ multotiēs iuuamꝰ qñ eſt ꝑ loca conuenientia vel qñ in ꝓhibitōe creſceret ꝑiculuꝫ. Ex hoc pꝫ ꝙ nō ſemper ē in colica ſimera. hec intētio habet̃ ad fluxuꝫ ꝓhibēduꝫ. ¶ Scđa ꝯcl'o: vniuerſal'r mā currente ad mēbꝛuꝫ ita ꝙ intētio ſit rōnalis fluxū ꝓhibēdi a mā exn̄te multa ī fluxu dꝫ attractio fieri ad partē diuerſam. ⁊ hec ſit ꝓ mente Auic. hic. Et ſi bene ꝯſideras oīa argumēta ante oppoſitū pꝛobāt cōcl'oneꝫ pꝛimā. ¶ Ad 2ᵐ dubiū rn̄det̃ ſine argumēto ꝙ nō facit mētionē de diametro ꝓfūditatis: q꞉ multotiēs nimis ē parua: vt in digito: gula: aure ⁊ ſimilibꝰ: ⁊ ī locis vbi nō ſit multū parua dat̃ intelligi ꝑ alias. Nā qn̄qꝫ iuuat: vñ Hyp. in affo. dixit poſterioꝛa capitis dolentia recta vena īciſa in fronte iuuat. ¶ Ad 3ᵐ dubiuꝫ dicit ꝙ cōuenit eūatio per ſiniſtrā magis q̄ꝫ per dextrā. ſꝫ de hoc dicā ī. c. de flobotomia vbi dicet̃ ꝙ de iuuamento flōmie vene ſciatice ⁊ ſaphene q̄ ita ab vno truncho oꝛiunt̃ ſicut baſilica dextra ⁊ ſiniſtra: q̄ ſiniſtra cū ſplene hꝫ ſocietatem vicinā quā nō hꝫ cuꝫ dextra ⁊ eꝫ reſpectu epatis.

Sed cū accidit vt tota materia iam ſit eūata: vtreqꝫ res ei cōferūt ex parte: quoniā ſi voluerimꝰ accipiemus eam ex ipſo mēbꝛo: ⁊ ſi voluerimꝰ trahemus ipſa ad mēbꝛum ꝓpinquū qđ aſſociatū eſt: ⁊ eam ab eo extrahemꝰ quēadmodū in duas minuimꝰ ſaphenas ī matricū egritudinibus: ⁊ venā que eſt ſub lingua cuꝫ medicari volumus apoſtema duarum amigdalaꝝ.

¶ Hic declarat quid faciēdū qñ mā tota ad mēbꝛuꝫ fluxit ⁊ nō ē timoꝛ de fluxu noue māc dicēs ꝙ qñ ita ē poſſumus mām ꝑ ipſaꝫ partē patientē eūare: ⁊ poſſumus eūare per mēbꝛuꝫ vicinū ſocietatē tñ habēs cū mēbꝛo patiente. ¶ Et ponit exēpluꝫ Auic. de euacuatiōe per mēbꝛuꝫ ꝓpinquū. naꝫ ē egritudo ex plenitudine ſanguīs in matrice ⁊ putamꝰ nō eē in fluxu aliā mām eūamꝰ ꝑ flobotomiā ſaphene. Et cū eſt apā calidū in gutture ⁊ nō timemꝰ de fluxu alterius materiei: eūamus per flobotomiā venaruꝫ ſub lingna exiſtētiuꝫ: ⁊ emplīm reſolutiuū ponimꝰ ⁊ ſimile facimus. Et cā cañ. eſt clara q꞉ huic intentōi non eſt ꝓhibitio fluxus neceſſaria ſed pura eūatio: ⁊ ideo dꝫ fieri ꝑ partem aptioꝛeꝫ que eſt vna iſtarum.

Per partē ꝓpinquā intellige partem colligataꝫ q꞉ ſaphena nō ē matrici ꝓpinqua quoad ſituꝫ.

Cūqꝫ

UVA. BHSC. IyR_006_1

Cũq; ad diuerſum trahere volueris membꝛi: a quo protrahis doloꝛem pꝛius ſeda.

¶ Ponit cañ. duos verificatiõis erroꝛis circa dicta. 2ª ibi: caue tibi. ¶ Dicit pº q ſi volueris mãm diuertere a mẽbꝛo: ſi mẽbꝛuʒ doluerit: pº opʒ ſedare doloꝛẽ. ⁊ cã ẽ qꝛ doloꝛ trahit. ⁊ qñ mã diuertit ponit in motu ⁊ fit facilioris attractõis q̃ʒ ſi qeta eẽt: ⁊ iõ ſi diuertimꝰ niſi fieret vltima diuerſio ſumꝰ cã maioꝛis fluxꝰ ad mẽbꝛũ. ⁊ iteꝝ qꝛ doloꝛ ẽ cã fluxꝰ: pº ẽ remouẽdus ex dicẽdis .i.c.vl. huiꝰ fen.

Utrũ ante diuerſionẽ materie membꝛo dolẽte ſit doloꝛ ſedandus?

Arguit negatiue. In acutiſſimo doloꝛe nulla melioꝛ medicina eſt q̃ʒ eũatio vſq; ad ſincopiʒ: ergo ante ſedatõeʒ doloꝛis eſt admĩſtrãda medicina eũatiua: ⁊ ꝑ cõſequẽs ſit diuerſio añ ſedationẽ doloris. Aſſumptũ eſt Gal. pª affo. illo affo. Que egerũt. Idẽ ꝯfirmat in doloꝛibꝰ pectoꝛis faciẽda eſt flobotomia ſaphene cũ materia ſit calida. ⁊ eſt oĩno a ſtupefactiuis cauẽdũ: ergo doloꝛ nõ erit pꝛius ſedandus. Et aſſumptũ eſt Aui. decima tertij. c. de cura doloꝛis pectoꝛis.

In oppoſitum eſt Aui. hic.

Pro dubio eſt notandũ pº q doloꝝ quidã eſt multũ foꝛtis ita vt ſit timoꝛ de virtutis defectu: qdã vero mediocris ⁊ nõ tã foꝛtis. ¶ Nota 2º q cura quedã ẽ regularis quedã coacta. Intẽdendo ꝑ regularẽ illã q̃ fit ſine notabili nocumẽto vel ꝑiculo. Per coactã vero ĩtelligo que fit cũ notabili nocumẽto vel periculo: ⁊ ſi infirmo maius ide ſequat iuuamẽtũ ſuo nocumẽto. ¶ Tertio nota q ꝑ ſedationẽ doloꝛis duo intelligere debemꝰ. pº totalẽ doloꝛis reuocatõeʒ. 2º eiꝰ mitigatõeʒ. ¶ Nota 4º q ex valde foꝛti doloꝛe ſequit per ſe debilitatio virtutis cũ doloꝛ ſit maxĩe de ꝓſternẽdo virtutẽ. Sequit 2º materie attractio ad locũ dolentẽ: ⁊ augmẽtũ apoſtematis ſi ibi fuerit: ⁊ ſic augmẽtũ doloꝛis augmẽtata cã maxĩe qñ humoꝛ auget ꝑ illḋ. ¶ His habitis ſit pª ꝯclõ. Nõ ſemꝑ in mediocri doloꝛe vel paruo a mã pẽdente ĩ mẽbꝛo contenta doloꝛ eſt pꝛius ſedandus q̃ʒ diuerſio fienda. Pꝛobat: qꝛ in multis caſibꝰ per talẽ diuerſionẽ doloꝛ vere curat eius cã remota: ergo nõ opʒ aliã operationẽ p̃cedere. ¶ Scḋa ꝯclõ: nõ ſemꝑ in acutiſſimo doloꝛe ẽt mãli priꝰ ẽ fiẽda eũatio q̃ʒ ſedãdus doloꝛ. Pꝛobat ꝯclõ qꝛ multotiẽs virtꝰ eſt tantũ debilis q foꝛtẽ eũoneʒ tollerare non poſſet. modo ꝯſtat q mediocris diuerſio ⁊ eũatio adderet in fluxu ad locũ doloꝛis mãm ponẽdo ĩ motu: ergo nec mediocris nec foꝛtis eũatio ante ſedatõeʒ doloꝛis fiẽda ẽ. Et p̃terea ꝯtingit mãm facientẽ doloꝛẽ quoad ꝑtẽ q̃ fluxit eſſe ineptã eũoni: ita q ẽt eũatio vſq; ad ſincopiʒ nõ ſufficeret illã eũare: ergo in tali caſu ante ſedationẽ doloꝛis nõ euacuandũ. Cõſequẽtia pʒ ex p̃dictis. ¶ Tertia ꝯclõ: qñq; in acutiſſimo doloꝛe ẽ pꝛius eũandũ q̃ʒ doloꝛ ſedãdus. pʒ qꝛ qñq; per talẽ eũoneʒ tollit doloꝛ ⁊ curat: vt poteſt ſumi ex Gal. pª ꝑticula affo. loco allegato. ¶ Quarta ꝯclõ: talis eũatio diuerſiua ꝯpetẽs in acutiſſimo nõ eſt regulr fiẽda. Pꝛobat: nulla eũatio vltimata eſt fiẽda regulr vt põt colligi ab illo affo. In exercitatõibꝰ ad ſũmuʒ. ſed oĩs eũatio in tali foꝛtiſſimo doloꝛe ꝯueniẽs eſt vltimata: ergo ⁊c̃. Minoꝛ vero pʒ: qꝛ mediocris nõ ſufficeret ad oppoſitã parteʒ ducere quãtũ doloꝛ traheret. Et hoc ſequit q regulr operãdo in cura foꝛtiſſimi doloꝛis mãlis eſt doloꝛ pꝛimus ſedãdus qñq; ĩmo ſemꝑ. ¶ Sequit 2º q nõ eſt ante doloꝛis ſedationẽ diuertẽduʒ regulr. ¶ Sequit 3º q ĩ aliquo caſu nec regulr operãdo eſt pꝛius ſedãdus doloꝛ nec priꝰ eſt eũanduʒ. pʒ qꝛ qñq; nõ eſt pꝛius ſedãdus: puta cũ periculuʒ ẽ ſubiti augmẽti moꝛbi in ap̃ate in tp̃e ſedatiõis doloris: ſʒ eũandũ: ⁊ hoc irregulr. ¶ Ad argumẽta. Ad pꝛimũ pʒ q eſt verum irregulr. Ad 2m dicit q in foꝛtiſſimo doloꝛe illaruʒ partiũ qñq; eſt pꝛius eũanduʒ irregulr tamen. Qñq; doloꝛ oĩno nõ eſt foꝛtiſſimꝰ: ⁊ tũc nõ oʒ ſedare priꝰ vt dicit qꝛ de tali nõ intelligit in cañ.

Et caue tibi ne trãſitus ſuper pꝛĩcipale fiat.

¶ Nũc ponit 2m cañ. ſ. q ĩ tali diuerſiõe cauẽdũ ẽ ne fiat trãſitꝰ ſuꝑ mẽbꝛuʒ pꝛĩcipale. Cã ẽ qꝛ ꝑiculũ ẽ ĩ tali trãſitu ne cõicet nocumẽtũ magnũ ipſi membꝛo pꝛĩcipali.

Utrum medico liceat diuertendo ſuꝑ mẽbꝛo pꝛĩcipali facere trãſituʒ?

Affirmatiue arguitur ſic. Per cerebꝛuʒ lʒ hoc facere. Nã poſterioꝛa capitis dolentia recta vena in frõte inciſa iuuat: ſed tũc ꝯſtat q trahit ſuꝑ cerebꝛũ: ergo ⁊c̃. ¶ Confirmat qꝛ peccãtes materias in capite ꝑ inferiꝰ eũamus: ſed ꝯſtat q inferiꝰ ad inteſtina veniũt trãſeundo ꝑ epar: ergo ⁊c̃. ¶ Tertio in pleureſi dextri lateris flobotomamus baſilicã ſiniſtrã: ſʒ tunc fit tranſitus ſuper coꝛ: ergo ⁊c̃.

In oppoſitum eſt Aui.

Circa dubiuʒ nota pº q materieꝝ que per diuerſionẽ trahunt: quedã ſunt vehemẽter coꝛrupte: quedã nõ ſũt coꝛrupte. Exẽpluʒ pꝛimi: vt ĩcipiẽte ap̃ate ex mã febꝛis peſtilẽtialis. Exẽpluʒ ſcḋi: vt facta ꝑcuſſiõe doloꝛoſa in coꝛpe pꝛius ſano: ꝯſtat humoꝛes qui trahũtur nõ eſſe coꝛruptos. ¶ Nota 2º q tranſitꝰ ſuꝑ mẽbꝛo pꝛĩcipali põt fieri duplr. pº ita q mẽbꝛuʒ pꝛĩcipale ſit ille terminus ad quẽ trahit ⁊ in quo figit. 2º mõ q pꝛĩcipale mẽbꝛũ ſit via per quã trãſit: hoc ẽ ſatis notum. ¶ Tertio nota q mẽbꝛa pꝛĩcipalia quedã ſunt tollerãtia materieꝝ trãſitum ſine moꝛtis ꝑiculo: quedã aũt nõ ſunt tollerãtia. Exẽpluʒ pꝛimi ſicut cerebꝛũ ⁊ epar. Exẽplũ ſcḋi ſicut coꝛ qḋ ꝓpter eius neceſſitatẽ ⁊ nobilitatẽ ſui coꝛꝑis nõ tollerat. ¶ Tũc ſit pꝛima ꝯclõ. In diuerſiõe mãe non coꝛrupte lʒ fieri trãſitus per mẽbꝛuʒ pꝛĩcipale tanq̃ʒ per viã: qꝛ in tali tranſitu non eſt nocumẽtuʒ. ¶ Scḋa ꝯclõ eſt Dy. Nunq̃ʒ attractio cuiuſq; mãe diuertẽde fieri dʒ ad membꝛuʒ pꝛĩcipale tanq̃ʒ ad terminuʒ. Pꝛobat qꝛ ſemꝑ attractio fieri dʒ de nobili ad ignobile: ſed pꝛĩcipalia ſunt alijs nobilioꝛa: ergo ⁊c̃. Salua Dy. reuerẽtia hec ꝯclõ videt mihi falſa. Nã in fluxu ſanguis nariuʒ ponimꝰ vẽtoſas ſuper epar vt mã ad epar tanquã ad terminũ trahat: ⁊ idẽ in fluxu mẽſtruoꝝ. Pꝛopterea in vulnere vbi multus ſanguis fluit a ſuperioribus vt a capite ꝓuocamꝰ timoꝛeʒ vt inde ſanguis ad coꝛ tanquã ad terminuʒ trahat. Et pꝛobat rõne quia ſtat attractionẽ factã ad pꝛincipale mẽbꝛũ tanq̃ʒ ad terminũ eſſe ipſius pꝛĩcipalis mẽbꝛi ꝯfoꝛtatiuã ⁊ ei ꝯuenientẽ ⁊c̃. Aſſũptũ ꝓbo qꝛ ſanguĩe exñte bono ⁊ hoĩe exñte vulnerato: ita vt plurimꝰ ſanguis fluxerit a coꝛde ⁊ epate: claꝝ eſt q attractio ſanguis ḋ alijs mẽbꝛis ad pꝛĩcipalia erit iuuatiua. Et multi ſũt caſus in quibꝰ ideʒ ꝓbat: ⁊ ideo meliꝰ ponit ꝯclõ oppoſita q mã exñte nõ male qualitatis ꝯtingit cõuenienter a membꝛo ignobili fieri attractionẽ ad coꝛ tanq̃ʒ ad terminũ ad quẽ. pʒ qꝛ ꝯtingit illaʒ mãm in mẽbꝛo ignobili ſuꝑfluere ⁊ pꝛĩcipale eadeʒ indigere. ¶ Tertia ꝯclõ: materia exñte coꝛrupta qñq; ꝯueniẽter trahit ad mẽbꝛuʒ pꝛincipale nõ tanq̃ʒ ad terminũ ad quẽ: ſʒ per viã trãſitus. Iſta patẽt per argumẽta facta ante oᵐ p̃cipue de epate ⁊ cerebꝛo. ¶ Quartã ꝯclõnẽ ponit Dy. Mã coꝛrupta nõ eſt ducẽda per coꝛ tanq̃ʒ per viam: qꝛ coꝛ nõ patit tranſitũ talis mãe ꝓpter eiꝰ nobilitatẽ. Et iõ Gal. in ꝯmẽto illius affo. Que ducere oʒ. vituperat eũonem mãe factã ſuper coꝛde. Ego tñ puto nõ eſſe incõueniẽs qñq; coꝛruptã mãm ire ꝑ coꝛ vbi per aliã viã nõ ſit poſſibile trahere ⁊ nocumẽtum remouere. Eius tñ iuuamẽtũ erit maius nocumẽto: ⁊ ideo pono aliã ꝯclõneʒ. Ceteris paribꝰ ⁊ deducta ĩdigẽtia ĩ pꝛĩcipali mẽbꝛo meliꝰ eſt nõ trãſire per ipm mẽbꝛuʒ pꝛĩcipale q̃ʒ trãſire. pʒ qꝛ ſi mẽbꝛum pꝛĩcipale nõ indiget tali humoꝛe ĩ trãſitu ꝑ ipʒ aliqḋ recipit nocumẽtũ: ſʒ ceteris paribꝰ magis ẽ euitãdũ nocumẽtũ pꝛĩcipalis mẽbꝛi q̃ʒ alioꝛum: ergo ⁊c̃. Hãc ꝯclõneʒ puto voluiſſe Aui. nõ q non poſſumꝰ trahere vel q ꝑ pꝛĩcipale nũq̃ʒ ſit trahẽduʒ: ſed de hoc cauere debemꝰ: aut ceteris paribꝰ ꝑ aliã viaʒ euacuare ſi poſſumꝰ. Et ſʒ hoc pʒ argumẽtoꝝ ſolutio.

Pro iſto notato vide Gẽtilez in iſto loco.

Et vtilitas quidẽ que ſequit ex ꝑte virtutis mẽbꝛi ẽ triuʒ ſemitaꝝ. Una ẽ dignitatis ⁊ pꝛĩcipatꝰ curaʒ hẽre: quoniã ſuper mẽbꝛa pꝛĩcipalia nõ faciemꝰ aliquid cũ foꝛtibꝰ medicinis in quo ſit ambigẽdũ quãtomagis potuerimus ne nocumẽtum toti coꝛpoꝛi cõe faciamꝰ. Quaꝑꝑ ex cerebꝛo ⁊ epate nõ euacuabimꝰ illud qḋ ab eis eũare debemꝰ ĩ vna hoꝛa: neq; vllo mõ vehemẽti infrigidabimꝰ ĩfridatõe: ⁊ cũ epati emplm̃ ſupponemꝰ ex medicis reſoluẽtibꝰ nõ relinquemꝰ quin ĩ eo res retẽtiuas ⁊ boni odoꝛis ponamꝰ ꝑꝑ v̓tutẽ cuſtodiẽdã. ⁊ ſilr ĩ eis q̃ ꝑꝑ eã ad bibeñ. damꝰ. Qḋ aũt inter oĩa mẽbꝛa hac tota cuſtodia digniꝰ exiſtit ẽ coꝛ ⁊ poſtea cerebꝛũ ⁊ pꝰ ipʒ epar.

¶ Nunc docet eligere modos admĩſtrãdi foꝛtes ac debiles medicinas virtute mẽbꝛi attinẽtis ꝓ maioꝛi parte: ⁊ hic nõ ſumit virtꝰ ꝓ ruboꝛe ſʒ ꝓ aĩa vt ẽ determĩate operatõis factiua: ⁊ diuidit in tres ꝑtes. pº ponit numeꝝ modoꝝ quibus iſta vtilitas ſumit dando pꝛimũ. 2º ſcḋm. 3º tertiũ. ibi 2ª: ⁊ duo quidẽ. ibi 3ª: ⁊ ſemita. ¶ De pª dicit quattuoꝛ. Pꝛimũ ẽ q vtilitas cognoſcẽdi virtuteʒ mẽbꝛi eſt triũ modoꝝ. Scḋʒ dictũ ẽ vnꝰ modus ⁊ eſt habere curã pꝛĩcipalis mẽbꝛi hoc mõ q ſuper mẽbꝛũ pꝛĩcipale nõ faciamꝰ aliquid ſuꝑ quo ſit ãbiguitas: aut eũando: aut alterãdo cũ medicis foꝛtibꝰ quãto magis poſſumꝰ: ⁊ hoc ne fiat nocumẽtũ toti cõicans. Tertiũ dictũ eſt q ꝓpter hãc cãm quoꝛũdaʒ modoꝝ operatõuʒ medici potes aſſignare cãʒ. Nã hic eſt q a cerebꝛo ⁊ ab epate nõ eũamus vna vice illud qḋ ẽ eũandũ: ſupple ſi fuerit multũ. Et ꝑ ideʒ non ĩfrigidamꝰ hec mẽbꝛa vehemẽti ĩfridatiõe. Et ꝓpter idẽ ĩ epithimatibꝰ que ponunt ſuꝑ epar nõ eſt relinquẽdũ quin ponant res boni odoꝛis ꝓpter mẽbꝛi ꝯfoꝛtatõeʒ. Et cũ in potu medicĩas damus ſolutiuas educẽtes ab epate: miſcemus res boni odoꝛis. Quartũ eſt q ĩter mẽbꝛa digniꝰ tãta cuſtodia eſt coꝛ. 2º eſt cerebꝛũ. 3º eſt epar. ¶ Circa ꝑteʒ nota pº q pꝛincipaliũ mẽbꝛoꝝ virtutes ⁊ opatões faciunt ad ĩdiuidui ꝯſeruationẽ p̃cipue nominatoꝝ: ⁊ iõ maxĩe eſt hñda illoꝝ cuſtodia. ¶ Nota 2º q virtꝰ illoꝝ maxĩe debilitari videt deductis agẽtibꝰ a ꝓpꝛietate per medicinas eũatiuas aut ſolutiuas: ⁊ iõ iſta genera mediciaꝝ ſũt no-

UVA. BHSC. IyR_006_1

minata per Auic. Nã hec mẽbra indigẽt pñtia multi ſpũs ⁊ debita ꝯpagine ſui caloris ſiue fortitudine. Et q꞉ euone ſpũs diſſoluit̃ ⁊ mollificãtia ꝓpriã ſubſtantiã mẽbri relaxãt ⁊ ita reſolutiua reſoluũt ſpũm ⁊ maxie calida. frida autez calorẽ nãlez debilitãt: Jdeo iſtis medicis exiſtẽtibꝰ neceſſarijs cauẽduʒ eſt ab eaꝝ fortitudie ſuꝑ pricipalibꝰ ĩ adminiſtrãdo. Qđ ſi neceſſaria fuerit adminiſtratio fortiũ: tũc miſcẽda ſunt cũ iſtis que reſiſtũt effectibꝰ eaꝝ in ſubſtãtia mẽbri vel ſpũs. Et hoc mõ reſiſtẽtes ſunt ſtiptice ſubſtantiã mẽbri vniẽtes: ⁊ medicine odorifere ſpũs confortãtes. Et iõ hic Auic. plures enumerat ꝯmiſcẽdas ꝑdictis. Sed hic cadũt due difficultates. Pria q꞉ ꝑmixtio ſtipticoꝝ cũ ſolutiuis videt̃ irratõabilis. Nã quãtũ iuuat medicĩa ſtiptica ad mẽbri ꝯfortatõez: tantũ ꝓhibet humoꝝ diſſolutionẽ: quare melius videt̃ ſolutiuũ ſine ſtipticis ſm tenorẽ virtutis adminiſtrandũ. ¶ Huic dicit̃ ꝙ mẽbroꝝ virtus ẽ magis apta ꝯſeruari per ſubſtãtiaʒ medicinaꝝ ſtipticaruʒ ex leui adiutorio habito ꝗ̃ʒ humor ſit aptꝰ igroſſari vel cõſtringi ꝑ illã medicinã. Nã cũ humor ẽ maius diſſolutõe indigẽs: natura nõ conat̃ ad illius diſſolutionẽ quin ẽt ad ꝓprij mẽbri ratificatõez. ¶ Scđa dubitatio quõ aromatica cal'a cõfortãt mẽbra pricipalia. Nã Aui. in. c. de viribꝰ cordis. ponit aromatica cal'a cõfortare mẽbra pricipalia. ſ. virtutẽ vitalez. ¶ Huic rñdet Dy. ꝙ medicine odorifere ſunt cõfortãtes virtutẽ duobꝰ modis. Unꝰ ẽ q꞉ multiplicant ſubſtãtiã ſpũs. Scđs ẽ contẽperãdo ꝯplõnem coꝝ ⁊ equando. Et ꝯceſſo mõ primo vr̃ ꝙ aromatica cal'a nõ cõfortãt 2° mõ cor ⁊ ſpũs calefactos: ꝗ̃ tñ ſunt cõmiſcẽda in epithimatibꝰ frigidis: vt pʒ. xj^a tertij. Nã hec aromatica ſpũs nõ adequarent: imo calefacerẽt. Dicẽdũ ergo alr̃ ꝙ quẽadmodũ cor per pñtiaʒ ꝯueniẽtis quãtitatis ſpũs ẽ fortiꝰ ad ſua ꝑpamẽta faciẽda: ita per pñtiã vaporis ab aromatico eleuati ad cor petẽtis: aut pñtiã ꝗ̃litatis ipreſſe ab aromatico eſt potẽtius tã in agẽdo ꝗ̃ʒ in reſiſtẽdo. Jſta autez ꝗ̃litas ẽ de genere ꝓprietatis. Qđ aũt aromatica calida ĩ epithimatibꝰ cordis ꝯmiſcent̃ cũ medicis fridis ẽ ad reſiſtendũ ipreſſioni medicinaꝝ fridaꝝ ne ꝑ illas ſpũs ꝯgelarent̃. veꝝ ĩfrigidãdo cor vtimur fridis aromaticis qm̃ ĩfrigidãdo ĩprimũt qualitatẽ occultã ꝯfortatiuã vt predicit̃.

Cõfortatio ſpirituuʒ ex aromaticis ꝓueniẽs reducit̃ ad ꝓprietatẽ occultã.

¶ Tertia dubitatio ẽ de ordine mẽbroꝝ in dignitate cuſtodie. ſ. vtrũ primũ ſit cor ſcđm cerebrũ ⁊ tertiũ epar. Et mouet̃ dubiũ 7° terapẽtice a Gal. vbi dicit ad litterã: Jn egritudinibꝰ magis ĩdigemꝰ cuſtodia epatis ꝗ̃ʒ cerebri. Et ita dicit Gal. xj° de igenio ſanitatis ꝙ nõ ĩdigemꝰ ĩ egritudinibꝰ virtute pulſatili multũ robuſta ſicut nec motiua ſʒ digeſtiua ĩdigemꝰ robuſta: ⁊ q꞉ digeſtiua ẽ virtꝰ ꝑẽdẽs ab influxu epatis relique dicte a corde ⁊ cerebro: videt̃ ꝙ magis debemꝰ virtutẽ epatis cuſtodire ꝗ̃ʒ cordis aut cerebri: ⁊ magis ĩdigemꝰ illius mẽbri virtute robuſta. ¶ Sʒ nota p° ꝙ aliud ẽ dicere indigere virtute mẽbri: ⁊ aliud ĩdigere illiꝰ mẽbri virtute robuſta. Nam ſtat virtutẽ ſatis debilẽ operatõez tñ facere ſatis neceſſariã ad ĩdiuidui vel ſpẽi ꝯſeruationẽ. ¶ Jtẽ 2° aliud ẽ dicere ĩdigere pulſatili virtute in mẽbro robuſto ⁊ aliud vitali. Nã virtꝰ pulſatilis multotiẽs in mẽbro eſt debilis: q꞉ artarie ſunt ĩpedite que tñ nõ erit debilis vt vitalis. ¶ Nota 2° ꝙ a cerebro ꝑẽdet motus anhelitꝰ: ⁊ iõ abſolute deſtructa cerebri virtute tollit̃ anhelitꝰ: ⁊ iõ hõ morit̃. ſed virtute epatis ablata q꞉ ĩfluxus eiꝰ ẽ magis mẽbris gnãlis ⁊ diutiꝰ ꝑſeuerãs ꝗ̃ʒ cerebri ĩfluxus: ideo hõ diutius viueret ſine epatis ĩfluxu ꝗ̃ʒ ſine ĩfluxu cerebri. ¶ Ex quibꝰ pʒ ꝙ abſolute plus ĩdigemꝰ cuſtodia virtutis cordis: q꞉ corde deficiẽte ſtatiʒ morit̃ hõ. 2^a cuſtodia virtutis cerebri: q꞉ illa deficiẽte deficit anhelitus ⁊ cito morit̃. 3° epatis virtute ⁊ eius defectu mors tardius aduenit. ⁊ hoc vult hic Aui. ¶ Patet 2° ꝙ virtute epatis ĩ morbis magnis indigemꝰ vt ſit robur ꝗ̃ʒ virtute cerebri: q꞉ debilis virtꝰ cerebri ſufficit ad anhelituʒ faciendũ. ¶ Pʒ 3° ꝙ virtute epatis digeſtiua indigemus fortiori in mẽbro patiente ꝗ̃ʒ virtute cordis vt pulſatili: ſed nunquã vt virtute cordis vitali. Et hec duo vltima voluit Gal. loco allegato.

Ratio q꞉ ſi eẽt debilis virtus epatis nõ poſſʒ digerere materiã morbi.

Et ſcđa quidẽ ſemita ẽ curaʒ habere operatõis mẽbro aſſociate licet non ſit principale ſicut ſtomacus ⁊ pulmo. Quapꝑ in febribꝰ cum ſtomaci debilitate aquã frigidaʒ in potu que ſit vehemẽtis frigiditatis non damꝰ. Et ſcias ꝙ dare ea pura que laxa faciũt pricipalibꝰ mẽbris ⁊ eis que ſũt corã ipſis ẽ valde timoroſum ĩ re vite.

¶ Ponit 2^m modũ quo iuuamur per virtutis mẽbri cõſiderationẽ: ⁊ dicit tria ¶ Primũ eſt ꝙ iuuamur per cognitionẽ virtutis mẽbri: q꞉ oʒ habere curã nõ ſolũ de mẽbro pricipali ſed ẽt de mẽbro qđ hʒ virtutẽ aſſociatã mẽbro pricipali: vt ſtomacus ⁊ pulmo. Nã ſtomacus preparat epati ⁊ pulmo cordi. Et hic ſumit̃ oꝑatio large ꝓ operatõe ⁊ ꝓ iuuamẽto nõ vt iuuamẽtũ. Cõtra oꝑationẽ diſtinguit̃: vt videt̃ prima huiꝰ ſũma de mẽbris. ¶ Dicit 2° ꝙ ꝓpterea in febribꝰ cũ debilitate ſtomaci nõ damꝰ aquã frigidã vt nõ deſtruamꝰ ſtomaci virtutẽ. ¶ Dicit 3° ꝙ approximare ea que faciũt laxuʒ mẽbris principalibꝰ ẽ maxime ꝑiculoſuʒ ĩ re vite. ¶ Circa partẽ p° nota ꝙ talia mẽbra ⁊ ſi nõ ſint pricipalia: tñ eoꝝ ſeruitiũ eſt neceſſariũ pricipali ad bene operãdũ. Jdeo illoꝝ nocumẽtũ mẽdiãte nocumẽto operatõis pricipalis mẽbri ita cõicat̃ toti ſicut nocumẽtũ pricipalis: lʒ ex toto nõ equalr̃. Et ideo in his mẽbris magna debet adhiberi cautela de eoruʒ cuſtodia. Et propterea laxa faciẽtia puta que valde virtuteʒ debilitant ſunt cauenda ſicut in principali diximus.

Et ſemita tertia eſt hẽre ſollicitudinẽ acuitatis ſenſus ⁊ eiꝰ hebetudinis: debet nãqʒ ſibi cauere ne mẽbris acuti ſẽſus neruoſis det medicĩas malaꝝ ꝗ̃litatũ ⁊ mordicatiuas ⁊ nocitiuas ſicut ſũt titimali ⁊ reliꝗ̃ ab eis.

¶ Ponit tertiũ mẽbruʒ: ⁊ diuidit̃ in tres ꝑtes. p° facit hoc. 2° enumerat medicinaꝝ virtutes a quibꝰ in mẽbris dictis eſt cauẽduʒ. ibi 2^a: medicinaꝝ vero. ¶ De p^a dicit ꝙ tertia via ẽ habere curã ſenſibilitatis mẽbri. ſ. acuitatis ſenſus ⁊ hebetudinis. Nã in mẽbris acuti ſenſus nõ ſunt ponẽde medicine malaꝝ quãtitatũ ⁊ mordicatiue ⁊ vomitiue ſicut ſũt titimalus ⁊ ſibi ſil'es. ¶ Ubi nota ꝙ ꝑ mẽbra acuti ſenſus nõ debemꝰ ĩtelligere mẽbra rectioris iudicij ĩ ſenſu: ſʒ mẽbra magis recipiẽtia ĩpreſſionẽ ſenſibiliũ: ⁊ ita ex leui ꝯtrario approximato apta dolere ſicut ſũt loca neruoſa ⁊ capita muſculoꝝ ⁊ os ſtomaci ⁊ pellicule oculi. Membra aũt dicunt̃ recti ſenſus tactꝰ q꞉ apta de ſenſibꝰ recte iudicare. Et hoc modo inter mẽbra noſtri corporis eſt rectiſſimi ſenſus tactus vola manus os ſtomaci ⁊ caput virge vt dicit̃ prima huiꝰ. ¶ Ex quibꝰ pʒ cã verificãs partem: q꞉ medicine ille in talibus mẽbris ex vehemẽtia doloris multa nocumẽta facerent: ⁊ ideo talia valde raro ponuntur in vlceribꝰ oculoruʒ: q꞉ plus valde nocent in vlceribus oculoꝝ ꝗ̃ʒ alioruʒ mẽbrorum.

Vide a Gentili.

Mediciaꝝ ṽo a quaꝝ datõe nobis cauemꝰ ſpẽs ſunt tres reſoluẽtes ⁊ vehemẽter ĩfriantes ⁊ ꝯtrias hñtes ꝗ̃litates ſicut flos eris ⁊ ceruſa ⁊ calcecumenõ ⁊ eis ſilia: ⁊ hoc quidẽ ẽ electõez medicie diuidere ſʒ mẽbri naturã.

¶ Nunc enumerat qualitates ⁊ diſpõnes medicinaꝝ a quaꝝ exhibitõe eſt cauendũ. Et puto ꝙ hec referat̃ ad pricipalia mẽbra ⁊ ſibi ſeruiẽtia ⁊ acuti ſenſus. Et dicitur ꝙ ſunt triũ modoꝝ. ſ. vehemẽter reſoluẽtes: fortit̃ ĩfridãtes ⁊ qualitates ꝯtrias hñtes. ¶ Nota hic ſm Dy. ꝙ per hec verba ĩtelligunt̃ medicine oẽs magnũ exceſſuʒ hñtes ĩ aliqua virtute. Et q꞉ virtutes medicinaꝝ quedã ſunt prime ꝗ̃dã ſunt ſcđe ꝗ̃dã tertie: vt dicit̃ 5° collʒ. ⁊ ĩfra in 2°: ideo dicet̃ de vehemẽter reſoluẽtibꝰ loco ſecũdaꝝ virtutũ: de vehemẽter ĩfrigidãtibus loco primarũ: ⁊ ꝯtrias qualitates hñtibꝰ loco tertiaꝝ virtutũ occultaꝝ. ¶ Aliter aũt poſſumus dicere ꝙ medicine calide ⁊ ſtiptice humide ⁊ ſicce ille nõ ſunt multũ ꝑiculoſe ipreſſionis vt ſic: ⁊ iõ de illis nõ intẽdit ſed de his que aliquo dictoꝝ modoꝝ ſũt fortes. viride aũt es eſt corroſiuũ ⁊ vehemẽter diſſolutiuũ: ⁊ ceruſa eſt vehemẽter frida: ⁊ calcecumẽ qđ eſt giſſuʒ hʒ ꝗ̃litates ꝯtrias ⁊ malas: niſi abluat̃: vnde vehemẽter dolorẽ cauſat ⁊ ꝑcipue in oculoꝝ medicis. Ex quibus oĩbus pʒ quõ debemus eligere medicinã ſm mẽbri naturaʒ.

Secũdũ vero egritudis quãtitatẽ quãtuʒ illi: verbi gratia cuiꝰ corpis caliditas egrotatiua ẽ fortis: ⁊ neceſſariũ ẽ ipſaʒ extiguere cũ medicina que ſit ĩ ĩfrigidãdo fortiſſima: ⁊ illi cuiꝰ accidẽtalis friditas ẽ fortis ẽ neceſſariũ eã tale facere cũ medicĩa fortis calefactõis. ſi vero nõ fuerint fortes: medicie debilioris qualitatis nobis ſufficiẽt.

¶ Nunc docet eligere medicinã ſm quãtitatem morbi. Dicit ꝙ medicina merito huius debet morbo proportionari. Et ideo ſi fuerit egritudo calida multũ indiget medicina fortis infrigidatõis. ⁊ ſi fuerit multũ frigida indiget medicina fortis caliditatis. ⁊ ſi fuerit leuis caliditatis: tũc medicina leuioris friditatis ſufficit ⁊ ecõtra. Et hec pars eſt nota: quoniã cũ ꝯtrariũ debet eſſe ſufficiẽs ad morbuʒ remouẽduʒ: morbus qui eſt maioris reſiſtẽtie fortiorẽ indicat offerri medicinã. ¶ Et q꞉ ſolet hic dubitari vtruʒ oĩs cura fiat per ꝯtriuʒ equalis gradus cũ morbo: põt hoc itelligi duobꝰ modis. Uno modo ꝙ illa tantũ diſtãt per contrariã qualitatẽ denomiatiue a cõplõne nãli corporis curandi quãtuʒ corpus a proprio tẽperamẽto eſt remotum. Scđo modo ꝙ effectiue ſit tãti gradus qualitatis oppoſite inductiua in tale corpus egrũ: quanto gradu illud eſt lapſuʒ: ⁊ ita dicit̃ tanti gradus effectiue ⁊ nõ formalr̃. Jtez medicinaꝝ taliuʒ effectiue: quedã ſunt effectiue tales ĩ applicatiõe vna: quedã in pluribꝰ: tũc dicẽdũ eſt ꝙ nõ ſemꝑ fieri dʒ cura per ꝯtria formalr̃ ⁊ denominatiue tãti gradus ꝗ̃ʒti ẽ egritudo. Jſtđ pʒ ex vſu practicãtiũ. ¶ Scđa ꝯcl'o nõ ſemper dʒ fieri cura per ꝯtria effectiue in gradu quo ad vnaʒ applicationẽ. pʒ q꞉ in cura egritudinũ nos multotiens remedia applicamus. ¶ Tertia ꝯcl'o: cuilibet ꝯpl'oni gradualr̃ a tẽperamento diſtanti: cura eſt faciẽda per ꝯtria ſibi effectiue equalia in vna applicatõe vel in pluribꝰ. hoc pʒ q꞉ tandeʒ oportebit per actum curatiuũ totam malam

Nota ꝙ ex parte ꝗ̃titatꝭ egritudis cognoſcit̃ quãtitas medicie magis ĩmediate ꝗ̃ʒ ex natura membri.

Pro hoc dubio recurre ad Gẽtilẽ in iſto loco ⁊c̃.

ꝯplexionẽ

UVA. BHSC. IyR_006_1

cōplexionē abijcere ⁊ ad terminū naturalem deducere.

Ex pte aūt egritudis ē vt ſciamꝰ in quo ſuoꝝ tēporuʒ ſit egritudo: verbigratia cū apoſtema ī pꝛīcipio fuerit ſuper ipſuʒ ponemꝰ qꝺ ſolū repercutiat. ⁊ ſi ī cōi ſtatu fuerit: ponemꝰ illud qꝺ ſolūmō reſoluat: ī medio aūt miſcebimꝰ vtraqʒ. Et ſi egritudo fuerit acuta: ipſa ī pꝛīcipio exiſtēte tēperate regimē ſubtiliabimꝰ: ⁊ ſi in ſtatu fuerit: in ſubtiliādo ſtudebimꝰ. ⁊ ſi fuerit ꝓlixa nō tātuʒ in pꝛīcipio ſubtiliabimꝰ: ſʒ ī ſtatu tꝑata vtemur ſubtiliatōe: lʒ ml̄tas ꝓlixaꝝ egritudinū ꝑter febꝛes ſubtiliatiuū reſoluat regimē. Egrituᵒ quoqʒ ſi ml̄te ebulliētis fuerit materie ī pꝛinᵒ eā eūabimꝰ ñ expectātes maturatōeʒ. ⁊ ſi mediocris fuerit maturabimꝰ eaʒ ⁊ poſtea eūabimus.

¶ Superiꝰ Aui. docuit eligere medicīe qualitatē ⁊ quātitatē: nūc docet eligere tp̄s appꝛoximādi qꝺ fuit tertiū: ⁊ maxīe in quo tpe de tpibꝰ moꝛbi: an hec vel illa ſint appꝛoximāda. Et puto hāc introductōeʒ iſtius ptis notā: lʒ poſſet dici ꝙ hic ex q̄ʒtitate moꝛbi variata ſm tp̄s docet eligere quātitatē medicine. Et diuidit̃ hoc reſiduuʒ capl̄i in tres ꝑtes. pᵒ facit qꝺ dictū ē. 2ᵒ reuertit̃ ad docēdū qūo medicīe q̄ʒtitas ex rebꝰ q̄ ex ſua ꝯueniētia ſignificāt ſuꝑ illud eligat̃. ⁊ hec ꝑs ꝑcedē ꝺbuit: ſʒ ē īoꝛdinatio vt dixi ſupꝛa. 3ᵒ ponit quoſdā īoꝛdinatos cañ. ī mō medicatōis ſeruādos ⁊ gnāles. 2ª ibi: cognitio aūt. ibi 3ª: ⁊ dicemus ꝙ in egritudinibꝰ. Et q̄ꝛ in eligēdo ꝯueniētē hoꝛā in admīſtratōe medicinaꝝ rōne tpis moꝛbi nō fuit facile gnāles cañ. facere: ideo tm̄ per exª. Jn hac pte pᵒ declarat qūo ex tpe iudicamꝰ de dando medicinā: imo nō ſolū de medicīa appꝛoximāda: ſed ēt de mō diete oꝛdinādē. ⁊ ſm hoc ſūt tria exª. ¶ De pª parte dicit ꝙ ex ꝑte egritudis eligimꝰ hoꝛā exhibēdi medicinaʒ. verbigr̄a in apatibꝰ calidis a pꝛīcipio appꝛoximamꝰ reꝑcuſſiua: in augmēto ꝑmiſcemꝰ reſolutiua cū iſtis: in ſtatu vero pꝛecipue quoad vltimā ꝑtem eius appꝛoximamꝰ pure reſolutiua. Et ꝓ nunc de veritate exēpli nō curo. naʒ infra in. c. de apatibus de hoc dicemus.

¶ Scꝺʒ exᵐ eſt de dieta ⁊ dicit ꝙ ī egritudinibꝰ abſolute acutis ī pꝛīcipio ſubtiliamꝰ regimē tꝑate. i. vtimur dieta q̄ abſolute vocat̃ tenuis: ⁊ ē exhibitio ptiſane oꝛdeacee: ⁊ ī eadē egritudine ī ſtatu magis ſubtiliamꝰ. Si vero egritudo fuerit ꝓlixa in pꝛinᵒ nō tantū ſubtiliamꝰ: lʒ in ſtatu ſubtiliemꝰ tēperate. i. mediocriter. Subtiliamꝰ. ſ. pluſq̄ʒ ī pꝛīcipio quāuis ēt multas egritudines alias a febꝛibꝰ ſubtiliantiū regimē reſoluat. i. deſtruat. ¶ Exēpluʒ 3ᵐ eſt de medicina euacuante: ⁊ dicit ꝙ ſi egritudo pendet a multa ebullitōe mãe ſtatiʒ a pꝛīcipio eūamus nō expectādo digeſtionē. Sʒ ſi egritudo fuerit mediocris nō vltimate malicie: pꝛius mām maturabimꝰ poſtea eūabimus. Et per hoc exēpluʒ pʒ ꝙ cōſideratio tēpoꝝ egritudis quibuſdā alijs circūſtantijs faciet nos cognoſcere vtrū hoc vel illud farmacū ſit exhibeñ. Et ſic ēt pʒ qūo eligimꝰ hoꝛā. i. tp̄s ꝓut ad egritudinē refert̃ ī quo medicīa eſt appꝛoximāda: lʒ hoc in ſpālibꝰ ſit clarius exponēdū. ¶ Circa quā parteʒ pᵒ nota ꝙ rōne tpis in ſe ꝯſiderati q̄ꝛ ſit longū aut bꝛeue nō oʒ medicinā variare dūmodo oēs diſpōnes eēnt eedē: vt ſumit̃ 3ᵒ ⁊ 4ᵒ de igenio ſanitatis. Sʒ rōne tpis vt ē tale tp̄s moꝛbi: puta pꝛincipiū aut augmētū ⁊c̄. variant̃ medicine appꝛoximāde. ⁊ hoc q̄ꝛ in talibꝰ tpibus moꝛboꝝ diuerſi ſunt moꝛbi ⁊ cāruʒ diſpōnes. Et inde eſt ꝙ Gal. nō vult tp̄s indicare de mō medicatōis niſi ſʒ ꝙ in eo īuenit̃ varia moꝛbi ⁊ cāꝝ ⁊ mēbꝛoꝝ diſpō. Ab illis qñ ſumit̃ īdicatio de qualitate ⁊ quātitate farmaci offerendi: voluit ꝙ has duas intētōes habemꝰ ⁊ tpis cōſideratio includit̃ in his: tm̄ fecit ad doctrine facilitatē diſtīguere ſʒ tꝑa: vt ſūt moꝛbi tꝑa ⁊ cañ. curatōis. Et iō facit illud Aui. hic: q̄ꝛ ſm diſpōnes dictas in moꝛbi tpibus nō variant̃ applicatōes mediciaꝝ alteratiuaꝝ: ſed variat̃ modus dietādi ⁊ appꝛoximādi medicinas eūatiuas q̄ a ꝓpꝛietate hoc faciunt. Et de iſtis dedit exēpluʒ 3ᵐ ꝙ cām verificatōis pꝛimi exēpli habemꝰ in. c. de cura apatis. ⁊ qūo hoc dictum ītelligat̃. nā nō ſemꝑ eſt in ſtatu eoꝝ taliter operādū. Sed verificationeʒ ſcꝺi exēpli habuiſti ſupꝛa in. c. ⁊ ex pª q̄rti de regimine febꝛicitātiū. Verificationē aūt tertij exēpli habes pª q̄rti. c. de cura putridaꝝ in gnāli ⁊ pª pticula affo. ¶ Sʒ dubitat̃ quare in fine ſcꝺi exēpli dixit Aui. ꝙ multas ꝓlixas egritudīes ꝑter febꝛes ſubtiliantiuʒ regimen reſoluit.

¶ Ad hoc rñdet Dy. ꝙ illud pōt ītelligi vno mō: ne videat̃ ꝙ ſolū in febꝛibꝰ ⁊ ſolū in acutis ſit vtendū ſubtiliatiuo regimīe: dixit ꝙ multas pꝛolixas egritudines ꝑter febꝛes. i. a febꝛibꝰ reſoluit regimē ſubtiliantiū: vt idropiſim paraleſim ⁊ alias egritudines. ⁊ hic modus placet mihi.

¶ Scꝺo mō pōt exponi ꝙ li ꝑter excipiat febꝛes. ⁊ rō eſt: q̄ꝛ in moꝛbis in quibꝰ expectat̃ criſis futura a lōge ī pꝛinᵒ magis ingroſſamꝰ: vt virtꝰ ſit tpe criſis ꝯſtans cū maioꝛi ſubtiliatōe que tūc erit neceſſaria. Et iō in febꝛibꝰ ꝓlixis ī quibꝰ criſiʒ expectamꝰ nō eſt a pꝛīcipio ita regimē ſubtiliādū. Et q̄ꝛ in febꝛibꝰ maxime īter alios moꝛbos accidit criſis: iō illas excipit. vel iō q̄ꝛ in febꝛibꝰ nō tātū ſubtiliamus ſicut in alijs mālibꝰ ꝓlixis egritudinibꝰ. Et iō hoc ē q̄ꝛ febꝛes ſunt cū maioꝛi diſſolutōe ꝑꝑ caliditatē ꝑternaturalē: ⁊ iō virtꝰ tantā regimīs ſubtiliationē tollerare nō pōt. Sʒ iſta expoſitio ē ambigua. Nā videt̃ ꝯcludere ꝙ in pꝛinᵒ febꝛiū in quibꝰ nō ē futura criſis: nō oʒ groſſius dictare q̄ʒ in augmēto vel ſtatu. qꝺ tm̄ nō vʒ Aui. velle vlr̄ pª q̄rti. c. de cibatōe febꝛicitātiū. Et rō q̄ꝛ caloꝛ febꝛilis ꝑter nāʒ magis coꝛrūpit cibū ⁊ debilitat digeſtiuaʒ q̄ʒ alij moꝛbi eque lōgi: iō in febꝛibꝰ erit qñq̄ʒ magis ſubtiliādum: ergo mihi placet pª expō. ¶ Circa exēpluʒ 3ᵐ nota ꝙ mā exñte multa ⁊ ebulliēte ipſa eſt mobilis ⁊ maligna ⁊ ē illa q̄ vocat̃ furioſa: ⁊ de eiꝰ remanētia in coꝛꝑe eſt timoꝛ de curſu ad aliqꝺ mēbꝛuʒ pꝛīcipale. Et q̄ꝛ ipſa ē mobilis ⁊ virtꝰ eius expulſionē facere conat̃: iō cū farmaco aut flobotomia eſt a pꝛīcipio eradicāda. Si vero mā fuerit ml̄ta ⁊ nō ebulliēs: eſt in pꝛinᵒ ſaltē minoꝛāda vt virtꝰ ſit ſuꝑ reſiduuʒ potēs. Sʒ ſi nō ē multa nec furioſa: eſt digeſtio expectāda ad hoc vt nō ſequant̃ nocumēta q̄ ponunt̃ pª q̄rti. c. all̄.

Nota ꝙ qñ dixit ebullientis duo tāgit: furioſaʒ mām ⁊ multitudinē: licet reſpectu furioſe competat eūatio eradicatiua: ⁊ reſpectu multe: minoꝛatiua: nō tm̄ illa minoꝛatiua que euacuat partē moꝛbi: ſʒ q̄ partē materiei: quare ⁊c̄.

Cognitio aūt reꝝ que ſua ſignificāt ꝯueniētia eſt ad ſciendū tibi facilis. ⁊ aer quidē qui ex eaꝝ exiſtit ſūma eſt dignioꝛ: cuius rem cuſtodiri opʒ: ⁊ an ſit medicine iuuamētuʒ pꝛeſtans an egritudini.

¶ Hic reuertit̃ ad dicendū qūo iudicamꝰ de quātitate medicine ꝑ res q̄ illud ſignificāt ſua cōueniētia: ⁊ ē ꝑs que dʒ ꝑponi ī oꝛdine: ⁊ dicit duo. Pꝛimū ē ꝙ cognitio iſtaꝝ reꝝ per quā cognoſcimus qūo quātitatē medicine merito eaꝝ ꝑmutari oʒ facilis ē: ⁊ iō nō īdiget cañ. Naʒ ſi res iſte iuuāt moꝛbū ī reſiſtēdo: tūc augēda eſt virtus medicine. ſi vero nō: nō. ⁊ ſi iuuant medicinā minuēda eſt virtus eius alijs paribꝰ. Dicit̃ 2ᵒ ꝙ aer qui ē de hac ſūma: eſt vnū qꝺ eſt magis ꝯſiderāduʒ ſi iuuat mām moꝛbi aut nām medicine oꝑantis in moꝛbū. ¶ Circa pᵐ dictū nota ꝙ res iſte vt ſupꝛa diximꝰ ſunt etas: ſexus: ꝯſuetudo: tēpꝰ: regio: virtus: aer ⁊ habitudo coꝛꝑis. Jſta aūt aſſentiūt cū foꝛti medicina appꝛoximāda ſicut etas iuuētutis ⁊ virtus foꝛtis ⁊ tp̄s tꝑatuʒ ꝯſuetudo eas ſumēdi. aut ēt diſſentiūt ſicut oppoſita iſtis. qñq̄ʒ auteʒ diſſentiūt in foꝛtitudine alterātis: imo indicāt foꝛtitudinē alterātis cū ſint diſcraſie augmētatiua: ⁊ qñq̄ʒ indicāt debilitatē cum ſint eius remiſſiua. ⁊ hec ſūt facilia ad cognoſceñ. De mō ꝯſentiēdi ī eūone vel diſſentiēdi in qua ē plus ſtudij: dicet̃ in. c. iij. ſigillatiʒ ſm vnūqꝺq̄ʒ iſtoꝝ. ¶ Circa 2ᵐ attēde ꝙ vt dicit̃ 9ᵒ de ingenio: Sine aere nō eſt poſſibile eē ſanū nec eſſe egrū: ⁊ ideo aeris alteratio eſt ꝯtinua ꝑmutatio coꝛꝑis nr̄i: ab ipſo permutatio eſt foꝛtis ⁊ foꝛte magis q̄ʒ aliaꝝ rerū extrīſecarū: ⁊ ideo īter res extrīſecas oʒ magis eius diſpōneʒ ꝯſiderare. Sʒ virtus coꝛpoꝛis multo pꝛīcipalius eſt cōſideranda: de qua Aui. non dixit q̄ꝛ eſt intrinſeca ⁊ nota.

Et ex his collige ꝙ iſte res nō ſunt pꝛincipalr̄ indicātes in electōe quātitatis medicine.

Et dicemus ꝙ in egritudinibꝰ in quibus eſt timoꝛ ⁊ non ſumus ſecuri ex defectu virtutis: ſiqꝺ facere debemus tardauerimus: aut ex eo aliquid alleuiauerimꝰ: a foꝛti medicamine pꝛimo incipere debemus. Jlle vero in quibus non exiſtit timoꝛ ſecūduʒ oꝛdinem ad foꝛtioꝛeʒ procedet ſi non ſuffecerit eis debilis.

¶ Jn iſta tertia parte pꝛīcipali ſcꝺe partis huiꝰ capl̄i ponunt̃ quidā cañ. vl̄es ſed nō oꝛdinati: ⁊ habēt aliquā particularitatē: ⁊ diuidit̃ in tot ꝑtes quot ſunt cañ. ¶ Pꝛimꝰ cañ. ē ꝙ ī egritudinibꝰ timoꝛis in quibꝰ. ſ. dubitādū ē ne infirmꝰ cito pereat ſi nō ſuccurrat̃ ei oī modo poſſibili debemꝰ īcipere a foꝛti medicamīe. ſed in illis que nō ſunt huiuſmodi timoꝛis incipiēdū eſt a debili ⁊ gradatiʒ veniēdo ad foꝛtē ſi debilia nō ſufficerēt. ¶ Nota ꝙ moꝛboꝝ qdā ſunt velociſſime actōis ad perimēdū: qdā nō tā cito ꝑimere pñt. Exᵐ pꝛimi: ſicut ſquinātia accñs in muſculis intrīſecis epigloti: q̄ꝛ illa ꝑꝑ nocumētū anhelitus qꝺ ſequitur ſubito īterficit. Jn talibꝰ ergo moꝛbis nō expectādū ī foꝛti medicatōis applicatōe aut flobotomie vſq̄ʒ ad ſincopim ⁊ attractōeʒ cū foꝛtiſſimis doloꝛibꝰ. Et pariter in apoplexia in pꝛīcipio freneſis cū foꝛtibꝰ medicis ē operāduʒ. ⁊ cā ē q̄ꝛ aliter magnū periculū nō poſſumꝰ euitare. Sʒ cū huiuſmodi timoꝛis nō fuerit egritudo: pᵒ incipiēdū eſt a debili. Qꝺ ſi ſufficit: bñ eſt. ſi nō: gradatiʒ ad foꝛteʒ veniēdū eſt. Et cā eſt q̄ꝛ nocumētū eſt in appꝛoximatōe foꝛtis medicine cū nā nō tolleret foꝛtes ⁊ repētinas mutatiōes ſine nocumēto. Vt igit̃ hoc euitet̃ incipiemꝰ a debilibꝰ: q̄ꝛ cū ad foꝛtioꝛa venerimꝰ nā erit magis aſſuefacta. Scꝺa cā ē q̄ꝛ multotiēs a pꝛīcipio egritudinē nō ita cognoſcimꝰ ⁊ pꝛecipue debilē. Si ergo a foꝛti medicina īceperemꝰ ⁊ ibi erroꝛ eſſet ſequeret̃ magnū nocumētū: qꝺ nō ſit īcipiēdo a debili vt infra dicet̃. ¶ Nota 2ᵒ ꝙ talis admīſtratio medicaminis a pꝛīcipio ē irregularis: q̄ꝛ ꝑ ipſaʒ ſit notabile nocumētuʒ: vel poſſet īcurrere ꝑiculū notabilis nocumēti. Et ſit hec admīſtratio ꝑꝑ maius ꝑiculum euitāduʒ. ſed alius modus operatōis ē regularis. Et ex hoc vide modū exponēdi illud qꝺ dicit̃ 22ª tertij de cura doloꝛis iūcturaꝝ cuʒ dicit̃: Et incipe a re foꝛti ſi nō ꝓhibeat pꝛiuatio maturitatis ⁊ groſſitudo materierū quāuis facilis ſit incolumioꝛ ⁊

UVA. BHSC. IyR_006_1

gradatio ꝯueniētioꝛ. Nam a re forti euātiua īcipiēdū ē qꝛ debilis mouet ⁊ nō euacuat ita qn multū ad locū doloꝛis fluat. fit ergo nocumētū ꝑꝑ maius euitāduꝫ: ſꝫ gradatio eſt īcolumioꝛ. Nō igit̄ incipiēdū ē a forti abſolute ſed vbi ꝯuenit: qꝛ eſt irregularis. Scđo vide ꝙ licet qñqꝫ medico ꝯ̄uium egritudini maioꝛis gradus q̄ꝫ ſit egritudo approximare: vnde multo foꝛtioꝛē facim⁹ attractiōeꝫ ad ꝯ̄uium in ſquināntia dicta q̄ꝫ ſit motus māe ad locū apoſtematis.

Preter hoc quoqꝫ tibi caue ne a rectitudine recedas lꝫ videris ꝙ ipſoꝝ tardat̄ iuuamētū neqꝫ in erroꝛe moreris: ⁊ ſi videris ꝙ ei⁹ nō appeat īpedimētuꝫ.

Affoꝛiſm⁹ ꝓpoꝛtōalis huic ſententie ē.52. ⁊ dicit ſic: Oīa ſm rōneꝫ facienti nō eueniētibus que ſūt ſꝫ rōnem nō opꝫ tranſire ad aliud manēte eo qđ viſuꝫ eſt a principio.

❡ Hic ē ſcđs cañ. ī quo dicit ꝙ nō recedas a rectitudine tui opis quāuis tuaꝝ opatōuꝫ tardet̄ effectus reſpectu ei⁹ qđ intēdis. Neqꝫ ꝓſequaris ī erroꝛe tui opis q̄uis nocumētū ei⁹ nō appeat: ⁊ ē hic cañ. ꝓpoꝛtōalis illi affo. ſcđe ꝑticule: Oīa ſm rōneꝫ faciēti. ❡ Sꝫ hic ē difficultas quō poſſum⁹ ſcire ꝙ faciam⁹ ſm rōneꝫ: ſi inde nō ſequit̄ iuuamētū manifeſtū. Nā in ꝯmēto illi⁹ affo. vbicūqꝫ cibi ꝑter nām intrāt. Gal'. dixit ꝙ ex ſuo effectu omīs futura actio ꝓ̄pꝛobat̄. huic dicit̄ ꝙ non oꝫ vt recte iudicem⁹ opationē eē ꝯueniētē ꝙ videam⁹ ſenſu ei⁹ vtilitateꝫ: ſꝫ ſufficit ꝙ in ſimili viderim⁹ ꝯtuliſſe ⁊ effectū bonū cōſequutū fuiſſe: ⁊ iō cū nō appet ī egritudine ⁊ alijs diuerſitas ab eo qđ cogitauerim⁹ facim⁹ opa ſimilia illis q̄ in ſimili diſpōne facienda eē ſciuerim⁹ ex alijs: ⁊ dicim⁹ eē recta. ⁊ ſi eoꝝ non cito appareat ſenſibile iuuamētū expectātes qđ in futuro appebit. Gutta eiꝫ cauat lapidē nō vi ſꝫ ſepe cadēdo. Et pariformiter dicēdū ē de erroꝛe cui⁹ nocumētū nōdū apparet. Oīs eiꝫ futura medici opatio appꝛobat̄ ex ſuo effectu ⁊ ex effectu quē ſcim⁹ ſibi ſil'ꝫ feciſſe: nō ꝙ ei⁹ effect⁹ expectādus ſit ī nr̄o iudicio: tūc eiꝫ prius opāremur q̄ꝫ artificial'r ſcirem⁹ nos cōueniēter opari, qđ eſt abſurduꝫ.

Hec ē ſentētia Gal. in ſcđa particula affo. ꝯmēto. xvij. ideo nota ipſi⁹ expoſitionem.

Et cū hoc ñ ſꝫ vnā medicatōꝫ cū vna tibi īſtādū ē medicia: īmo ī vna medicatōe medicinas ꝑmuta quātū ab īpo qđ ꝯſuetū ē ñ fit paſſio: ⁊ vnicuiqꝫ quidē coꝛpi: īmo oī mēbꝛo: īmo vni coꝛpi ⁊ vni mēbꝛo ī vna hoꝛa ⁊ nō ī altera ineſt ꝓpꝛietas ab vna medicia pati ⁊ ñ ab altera.

❡ Hic ē cañ. tertius q eſt coꝛrectiu⁹ erroꝛis q poſſet circa cañ. ꝑcedentē accidere. Et dicit ꝙ in vna medicatōe nō eſt inſiſtēdū cū vnica medicia: īmo ꝑmutare debes medicinas: ⁊ hoc ꝓpter duas cās. pͣ eſt qꝛ medicia qñqꝫ eſt ex nimio vſu facta ꝯſueta: ⁊ iō coꝛp⁹ nō recipit ab ipſa īpꝛeſſionē qm̄ ab eo qđ ꝯſuetū eſt nō patit̄ coꝛp⁹. 2ͣ cā ē qꝛ qñqꝫ vna medicina hꝫ ꝓpꝛietates currētes ad bñ operāduꝫ in coꝛp⁹ ⁊ qñqꝫ nō. ❡ Nota ergo pᵒ ꝙ medicatio dr̄ vna qꝛ reſpectu vni⁹ moꝛbi. Modo ꝯſtat ꝙ moꝛb⁹ exñs vnus variat̄ in diſpōnib⁹ ſuis ⁊ in mō cure ⁊ ēt cā: vt pꝫ in ꝓceſſib⁹ āpātis a pꝛīcipio vſqꝫ ad declinatōeꝫ ⁊ ī ꝓceſſu fe. putride. Ex hoc patet ꝙ moꝛb⁹ vnus variat̄ ſm diſpōnē cāe: ⁊ in ſe quoad intēſionē ⁊ remiſſionē ſui ⁊ ſuoꝝ accidētiū. Ex quo pꝫ ꝙ in vna medicatōe medicine ſunt permutāde qñqꝫ in quāto: qñqꝫ in quali. Pꝛecipue tñ mutant̄ in quāto medicie q̄ ꝓ moꝛbi cura ſimpl'r exhibent̄. Nā aliā appꝛoximam⁹ in pꝛinᵒ: aliā in ſtatu: aliaꝫ ī declinatōe. ſed hoc nō erat de mēte Aui. vt pꝫ in aſſignatōe cāe. ſimil'r ēt ꝯtingit appetitū infirmi ꝑmutari ⁊ reꝫ vnā ſibi fieri abhominabilē: ⁊ tūc erit ꝑmutāda medicina. Sꝫ id qđ vr̄ Aui. velle eſt ꝙ ſtante eadē moꝛbi ⁊ ſuaꝝ cāruꝫ ⁊ accñtiuꝫ indicatōe ⁊ ſimili īfirmi appetitu multotiēs in vna medicatōe nō eſt ſolū ſuꝑ vno medicamīe ſtandū: ⁊ ꝑcipue cū egritudo fuerit cronica: ⁊ illud medicamē fuerit aſſuefactū: ⁊ videam⁹ medicinas nō manifeſte ꝓdeſſe vt ī caſu dicit̄ īmediate ꝑcedenti: īmo ꝙ his ſtantib⁹ multotiēs eſt medicina ꝑmutanda. ❡ Nota 2ᵒ ꝙ hec mediciaꝝ ꝑmutatio pōt intelligi quo ad quantitatē vel quo ad q̄litatē. vel 3ᵒ quo ad nām vel ſpecificā nām medicine: lꝫ gradus potētia ⁊ qualitas nō permutent̄. verbigr̄a: ſi pꝛīo appꝛoximabat̄ diafinicon mō appꝛoxiabis mixtiōeꝫ ad electuariū de ſucco roſaꝝ ⁊ de electuario īdō ita vt eque ſit tā cole q̄ꝫ flegmatis euātiua ſicut diafinicō. ⁊ ſi pꝛius dabā ad alterādū aromaticū roſatū: poſtea dabo diamuſcū: aut loco ei⁹ turbit. Et tūc pꝫ ꝙ tā moꝛbo q̄ꝫ cā q̄ꝫ accñtib⁹ ⁊ virtute cū extrinſecis ſil'r indicātib⁹ nō dꝫ fieri ꝑmutatio ī q̄ꝫtitate vel ī q̄litate: qꝛ ſtātib⁹ eiſdē a qbus īdicatio ſumit̄ nō dꝫ medicatio variari. ⁊ hoc vt Hyp. 2ͣ ꝑticula affo. illo affo. Oīa ſm rōneꝫ faciēti. Et idē ītēdit 2ᵒ ꝓnoſticoꝝ vituꝑans ꝑmutatōeꝫ mediciaꝝ. ſꝫ tñ oībus iſtis īdicatiōib⁹ ſtātib⁹ oꝫ fieri qñqꝫ ꝑmutatōeꝫ medicie 3ᵒ mō. ſ. quoad nāꝫ ſpecificā medicie lꝫ ñ quoad q̄ꝫtū vel q̄le ⁊ maxīe cū manifeſtū iuuamētū ñ ꝑcipit̄: tūc eiꝫ due cāe ī lr̄a aſſignate locū hñt. ❡ Sꝫ tūc cadit dubitatio đ cōſuetudīe. Utrum ꝑꝑ ipaꝫ ꝯſuetudinē medicie min⁹ patiat̄ coꝛp⁹: đ q̄ vide ī illo affo. Et multo tp̄e aſſueta. Et qñō ꝓpꝛietates ſūt currētes nō tm̄ ſm ſpēꝫ: ſꝫ in ꝯparatōe ad indiuiduū ſuꝑ affo. allegato.

Uide hoc a Gētili clarius in hoc paſſu.

Cum auteꝫ ignoꝛas que ſit egritudo relique eaꝫ nature ⁊ non ꝓperes: quoniā aut natura ſuperabit egritudineꝫ aut ipſaꝫ manifeſtabit.

❡ Hic ponit aliuꝫ cañ. dicēs ꝙ cū ignoꝛas egritudineꝫ nō ꝓperas ad opandū: ſed relinque eā nature: quoniā aut nā curabit aut manifeſtabit eā tibi. Sꝫ iſte cañ. videt̄ ꝯ̄dicere ei qđ dicit̄ pͣ q̄rti de cura putridaꝝ in gn̄ali. ſ. cū dicitur: Cū ignoꝛas egritudinē ſubtilia regimē. Subtiliare eiꝫ regimē ē aliqd facere. ❡ Huic dicit̄ ꝙ ignoꝛare egritudinē intelligit̄ duob⁹ modis. Uno mō ꝙ oīo gen⁹ egritudinis ignoꝛetur. ⁊ iſto caſu nihil eſt agenduꝫ ſicut hodie multotiēs accidit ꝙ a rure poꝛtat̄ vrina nō īdicās de moꝛbo: aut ille q poꝛtat nihil ſcit aut nihil vult dicere: ⁊ in illo caſu dicit nihil agēdū. Multotiēs eniꝫ ſūt multa accñtia cognita: ſꝫ adhuc egritudo quoad gen⁹ ⁊ cām ignoꝛat̄: vt ſtāte doloꝛe ſub coſtis: ignoꝛam⁹ qñqꝫ an ſit pleureſis aut vētoſitas. ⁊ in iſtis caſib⁹ ſunt debilia quedā appꝛoximāda que faciēt ad manifeſtāduꝫ moꝛbū: ⁊ dicunt̄ a medicis medicia tēperatiua: ſicut hic calefactionē appꝛoximam⁹: ſed foꝛtia dimittim⁹. Qñqꝫ aūt cognoſcit̄ genus egritudinis ſed non cognoſcit̄ ſpēs: vt qñ ſcis ꝙ ſit febꝛis putrida ſꝫ neſcis cui⁹ ſpēi: vt vtrū ꝯtinua vel īterpollata quartana aut tertiana. Et in iſto caſu multa ꝯueniūt q̄ ex genere indicant̄. Et in hoc caſu dixit Aui. pͣ quarti ſubtiliādum eē regimē: īmo in ſimili caſu fiūt cliſteria vētris ſolutiōes ⁊ flobotomie: qñqꝫ multa q̄ ex hoc qđ ē putrida indicant̄ ī pꝛinᵒ q̄cūqꝫ fuerit nā ei⁹. Et ſꝫ cōeꝫ modū exponēdi Aui. ītelligit hic 2ᵐ modū. ſ. ꝙ nō ſit vtēdū medicaīe foꝛti euātiuo ſed tētatiuo: qꝛ iſta faciēdo aut nā vicit aut māifeſtat.

Cūqꝫ egritudo doloꝛi cōiuncta fuerit aut cauſe doloꝛis aut a quo pꝛouenit doloꝛ ſicut eſt percuſſio aut caſus: incipies ſedare doloꝛem.

❡ Hic ponit cañ. dicēs ꝙ cū egritudo fuerit ꝯiūcta doloꝛi aut cauſis doloꝛis aut rei a qua ꝓuenit doloꝛ: pᵒ doloꝛ eſt ſedādus. ❡ Ubi nota pᵒ quātū ꝓpoſito ꝑtinet cōtingit egritudinē ꝯiūgi cū doloꝛe. vno mō qꝛ doloꝛ ſit ei⁹ accñs ſicut ꝯiungit̄ cū ſolutōe ꝯtinuitatis ⁊ cuꝫ āpāte aut cū tertiana doloꝛ capitis. 2ᵒ modo qꝛ doloꝛ ab alia cā ꝓueniat: vt ſi ꝯiūgunt̄ colica ⁊ febꝛis aut calculus ⁊ febꝛis. 3ᵒ mō ꝙ ſtante moꝛbo ſuꝑueniat cā extrīſeca doloꝛeꝫ faciens ſicut ꝑcuſſio. Et hec tria voluit dare ītelligi Aui. in ſua replicatōe verboꝝ. ❡ Nota 2ᵒ ꝙ cā verificās cañ. eſt qꝛ doloꝛ eſt de maxīe ꝓſternētib⁹ virtutē. Et etiā exacuit reuma ⁊ facit fluxū humoꝝ: ⁊ ideo videt̄ hēre cañ. rōnem qꝛ ſine ei⁹ cura reliqua egritudo curari nō pōt: aut magis ꝑiculoſe ſaltē curat̄: ⁊ iō ab eius remotiōe eſt incipiēdum.

Et dicit ſedādus qꝛ nō dꝫ oīno remoueri ſed ſedare ipſaꝫ poſtea intēdere egritudini.

❡ Sꝫ ꝯ̄ hoc videt̄ eē illud qđ dicit̄ pͣ quarti de cura putridaꝝ in gn̄ali cuꝫ dicit̄: Et ſcias ꝙ cū aggregant̄ doloꝛ capitis ⁊ febꝛis: tūc cura febꝛis eſt dignioꝛ. ❡ Dicēdum ē ꝙ doloꝝ quidā ſunt leues: vt doloꝛes febꝛes ꝯſequētes in augmēto ⁊ diminutōe ſua: ⁊ iſti curāt̄ cura febꝛis. ⁊ cura febꝛis ē dignioꝛ vt Aui. ibi dicit. Sꝫ qñqꝫ doloꝛ eſt foꝛtis ⁊ tunc pᵒ ſedari debet vt eodeꝫ loco ſtatim ſubdit̄. Et ſcias ꝙ doloꝛ capitis quādoqꝫ alias foꝛtaſſe facit redire febꝛem declinatā ad augmētuꝫ: quare oꝫ vt ſedet̄: ⁊ ita hic intelligit̄ de foꝛtibus doloꝛibus.

Et ſi tibi neceſſe fuerit ſtupoꝛeꝫ inducere non tranſcendas tale quale eſt papauer albū: quoniā cū ſuo ſtupoꝛe eſt etiaꝫ domeſticuꝫ.

❡ Ponit aliū cañ. dicēs ꝙ ſi eſt neceſſe ſtupoꝛē īducere non trāſcendas tale quale eſt papauer albū: qm̄ cū ſua ſtupefactōe eſt domeſticū. ❡ Nota ergo ꝙ iſte cañ. cōiter ītroducit̄ tanq̄ꝫ coꝛrectiuus erroꝛis potētis ꝯtingere ex ꝑcedēti. Docet eiꝫ cū oꝫ doloꝛē ſedare per ſtupefaciētia nō trāſcēdere papauer albū. ❡ Et hoc mō ītroducēdo cadit dubiū. Nā Aui. ꝑcepit ī doloꝛib⁹ qñqꝫ opiū admiſtrare: qñqꝫ mādragoꝛā q̄ ſūt multū foꝛtioꝛa q̄ꝫ papauer. ❡ Huic rñdet̄ dupl'r. vno mō ꝙ hic dr̄ regul'r operando. Modo quādo Aui. docet foꝛtioꝛa appꝛoximare dico ꝙ eſt coacte. Naꝫ ſemꝑ eſt cū notabili nocumēto virtutis. ❡ Uel 2ᵒ cū dicit̄ ꝙ non debem⁹ trāſcendere papauer albuꝫ: intelligit̄ ſolum aut ſimpl'r adminiſtrādo. Sed in cōpoſitionibus cuꝫ coꝛrectiuis adminiſtram⁹ dicta foꝛtioꝛa. ſ. opiū qđ non in ſua ſimplicitate adminiſtrat̄.

Nota ꝙ ſūt q̄dā medicie que vere ſedant doloꝛē. ⁊ ſūt ille que hñt ſubſtātiaꝫ ſubtilē cuꝫ caliditate in pꝛio: ⁊ iſte auferūt doloꝛeꝫ vel minuunt cāꝫ doloꝛis. Alie ſūt que ñ vere ſedāt doloꝛē ſꝫ moꝛtificāt ſenſuꝫ mediāte ſua intēſa frīditate ſtupefaciēdo mēbꝛū: ſed tu latius hec vide a Gal. quito de ſimplici medicina. c. xx.

Cūqꝫ vehementiā caloꝛis mēbꝛi tibi nocumētuꝫ fecerit nutri ex eo qđ ſanguinē vehemēter ingroſſat ſicut frumētū coctū. Et ſi ex hoc quidē regimie nō alleuiabit̄ nutri cū īfrigidātib⁹ ſicut lactucis ⁊ eis ſimilib⁹.

Uide a Gētili in loco ꝓpꝛio qui dat tertiam rationē.

❡ Hic ponit aliū cañ. ⁊ dicit ꝙ cum vehemētia caloꝛis mēbꝛi tibi nocumētū fecerit: tūc debes nutrire cū reb⁹ vehemēter ſanguinē īgroſſantib⁹ ſicut eſt frumētū coctum. Et ſi hoc nō ſufficit: tūc nutriēdus ē eger cū infrigidātib⁹ ſicut lactucis ⁊ ſimilib⁹. ❡ Circa queꝫ cañ. nota ꝙ vehemētia caloꝛis mēbꝛis nocumētū facit maxīe attrahēdo humoꝛes ad locū: ⁊ qꝛ groſſus ſanguis difficili⁹ attrahit̄ q̄ꝫ ſubtilis: iō danda ſunt ſanguinē īgroſſantia. ❡ Nota 2ᵒ ꝙ infrigidātia foꝛtius ꝓhibent̄: ⁊ iō cū iſta nō ſufficiunt: dam⁹ īfrigidātia. ❡ Cā aūt quare ab īgroſſantib⁹ poti⁹ īcipim⁹ q̄ꝫ ab īfrīdātib⁹: eſt qꝛ cibi īgroſſatiui ſūt cibi ⁊ vt ſic nō hñt rōnē medicie. Et qꝛ poſſum⁹ cū reb⁹ cibalibus cibare

Quidaꝫ text⁹ hñt vehemētiā ſēſus mēbꝛi ⁊ ītellige ꝑ vehementiā ſenſus mēbꝛi acutiſſimum ſenſum oꝛis ſtōaci leſi a colera defluēte ad ipm vel a cibo vel potu colerizato in ſtomaco pꝛe nimio caloꝛe

UVA. BHSC. IyR_006_1

cibare meliꝰ ꝙ̃ cũ medicinalibus: ⁊ iõ ab iſtis incipimus.

Et ſcias preterea ꝙ ex ꝯgruis medicatõibus que cõferunt ẽ iuuamẽtũ qđ fit ex eo qđ virtutes ꝯfortat animales ⁊ vitales ſicut leticia: ⁊ obuiare ei qđ ſibi placet: ⁊ aſſidue ſedere cuꝫ eo cum quo gratulaẽ: qñqꝫ etiaꝫ confert ſedere cũ eo a quo verecũdaẽ ⁊ queꝫ erubeſcit: quoniaꝫ egrũ ꝓhibet a rebus que ei nocent.

¶ Nunc ponit aliũ cañ. dicẽs ꝙ iuuamẽtũ qđ fit cõfortando virtutes aĩales ⁊ vitales per leticiã ⁊ pñtiã ꝯtinuaꝫ dilectoꝝ: eſt ex rebꝰ in cura egritudinũ corporaliũ magis ꝙ̃ per aliũ modũ ꝯferentibꝰ. Et qñqꝫ ẽt ꝯfert ſedere cum eo a quo verecundaẽ. ⁊ hoc ꝓhibet egrũ a rebus ſibi nociuis. ¶ Ubi nota ꝙ cõfortatio nãlis virtutis eſt multũ neceſſaria in cura morboꝝ. ſꝫ qꝛ id manifeſtuꝫ eſt nõ curauit Aui. manifeſte hoc exprimere: ſꝫ dixit hoc qđ minus erat notũ. ¶ Nota 2º ꝙ ꝑ experiẽtiã viſuꝫ eſt virtutẽ motiuã ⁊ pulſatilẽ confortari gaudio tẽperato ⁊ delectatiõe. Sed modus quo fit hec ꝯfortatio diuerſimode variatur. Dyeiꝫ dicit ꝙ ꝑ iſtas paſſiões cor generat plus de ſpũ ⁊ plus ad alia mẽbra trãſmittit: ⁊ poſſemꝰ hoc imaginari hic ꝙ ex his paſſionibꝰ ſequiẽ cordis applicatio ad mãꝫ generatõis ſpirituuꝫ ꝑꝑ quã melius generanẽ ſpũs cordis: ⁊ ita imaginãdũ ĩ delectatõe q̃ per odorabilia ꝑcipiẽ. ¶ Scđs modus ẽ ꝙ ſicut lumẽ adiuuat colores ad agẽdũ ĩ mediũ ſpẽꝫ coloris: ita iſta paſſio iuuat cor ad reſiſtẽdũ cãis ꝓternãliter ĩprimentibꝰ ⁊ ad agẽduꝫ actões ſibi debitas: ẽtiaꝫ ſi de ſpũ nihil plus habuerit. ⁊ hoc videẽ veriꝰ. ¶ Et cõſimilr̃ triſticia eſt ſpirituũ diſſolutiua vel cordis ĩ ſuis nãlibus operatõibꝰ ĩpeditiua: etiã ſi multoꝝ ſpũuꝫ eẽt pñtia.

Et qñ dixit Aui. qñqꝫ ꝯfert egro ſedẽ ⁊c. dixit qñqꝫ qꝛ aliqñ nocet egro ſedere cũ eo de quo verecũdatur: qm̃ ꝓpter verecũdiaꝫ retinebit eger multas ſuꝑfluitates vt ructus: feces ſputa: vrinã: ſudores ⁊ reliqua huiuſmodi: q̃ ſi a corꝑe educãtur multũ ei ꝓderit: ergo ⁊c.

¶ Nota 3º ꝙ iſtaꝝ virtutũ ꝯfortatio cõuenit ĩ morbo: qꝛ ꝑ hanc alie oꝑatões nãles fiũt meliores ⁊ morbi mãlis impreſſio ꝓhibeẽ. Et ad ſimileꝫ modũ pure reducunẽ epithimata ⁊ poma odorifera. Reliqua hic dicta patent.

Et ex rebus preterea que huic mõ medicatiõis ſunt ꝓpinque ẽ mutatio de terra ad terrã ⁊ de aere ad aerẽ ⁊ de formis ad formas ⁊ precipere eũ formas efficere ⁊ motus qui mẽbrũ dirigãt aut ꝯplõneꝫ mutẽt queadmoduꝫ puero luſco precipiẽ vt ſcintillas intueaẽ aut rẽ que ei apparet: aut ſicut ꝑcipiẽ torturã patiẽti ⁊ vt ſpeculum intueaẽ calibis quoniã hoc ꝑducit eũ ad hoc vt laboret in rectificãdo faciẽ ſuaꝫ ⁊ frontẽ ⁊ oculũ ⁊ fortaſſe inuitus redibit ad hoc vt melioretur.

¶ Hic ponit aliũ cañ. dicẽs ꝙ mutatio de terra ĩ terrã ⁊ de aere in aerẽ ⁊ de formis in formas. i. de figuris ꝓſpiciẽdis ad alias figuras ꝓſpiciẽdas: hec ſunt de rebꝰ que ꝓpinquo mõ ꝯferũt ei qui predictꝰ eſt in ꝑcedẽti cañ. ⁊ ꝑ̃cipue cũ facimꝰ efficere formas reꝝ ꝓſpiciẽdaꝝ q̃ dirigũt ꝯplões mẽbroꝝ ſicut ꝑcipiẽ puero luſco vt intueaẽ ſcintillã aut rem q̃ ſibi apparuit: ⁊ precipiẽ hñti torturã faciei vt ꝓſpiciat ĩ ſpeculo anguſto. Hoc eniꝫ ipꝫ ad hoc deducit vt laboret ad rectificandũ faciẽ ⁊ frontẽ ⁊ oculũ: ⁊ fortaſſe ẽt ĩuitꝰ redibit ad hoc vt melioreẽ. ¶ Nota ergo ꝙ mutatio de terra in terrã ⁊ de aere in aerẽ ⁊ de formis ad formas hꝫ quãdaꝫ delectationẽ: ⁊ in hoc ꝯfert ſicut illa q̃ in ꝑcedẽti cañ. dicunẽ. Sꝫ mutatio de aere in aerẽ hꝫ etiã aliũ modũ ꝯferendi: qꝛ in quodã aere inueniẽ qñqꝫ ꝯſtellatio iuuãs egruꝫ: ⁊ in quodã ꝯ̃ria. vñ cõiter videẽ aer natiuus ꝯueniẽtior. Et ex cã hac vidi ego quoſdaꝫ ſtudẽtes q cũ bononie morabanẽ ĩfirmabanẽ: nec poterant a diuturnis morbis liberari ⁊ ad patriã redeũtes curabanẽ. Sꝫ in mutatõe formaꝝ ĩſpiciẽdaꝝ tres ſũt modi iuuamẽti. Unꝰ qꝛ fiat delectatio vt diciẽ. Scđs qꝛ imago forme hꝫ virtuteꝫ ĩmutandi mãliter: vt dictũ ẽ ĩ 3º tegni ⁊ 2ª huius. ⁊ habeẽ ab Ariſtotele in de cãis motus aĩaliuꝫ. Tertiꝰ qꝛ qñqꝫ per imaginẽ ꝓſpectã fit quidã motus exercitij mẽbri per quẽ ꝯfortaẽ. Et hoc mõ 3º luſcus reſpiciẽs ſcĩtillã exercet oculũ: vñ plus de ſpũ tranſmittiẽ ⁊ ꝑmutaẽ cõplõ ſua. Et patiẽs torturã faciei reſpiciẽs ſpeculum paruũ in quo ſibi nõ apparet alia figura ꝑ̃ter figurã ſue faciei cũ videt illam torturaꝫ conaẽ dirigere: imo muſculos patiẽtes exercet. Et tu hic hoc vide quare ſpeculũ opꝫ paruũ eſſe.

Hoc ẽ qꝛ ĩ ſpeculo paruo fit reflexio radioꝝ viſualiũ magis vnite quo fit vt ſtraboſitas ſiue faciei tortura appeat clariꝰ vnde eger magis conaẽ ad reductõeꝫ.

Ex regulis ꝑ̃terea q̃s obſeruare debes ẽ fortes dimittere medicatões ĩ tꝑibꝰ fortibꝰ quãto plus poteris ſicut ventrẽ vehemẽter ſoluere aut prouocare vomitum aut aperire ⁊ adurere in eſtate ⁊ hyeme.

¶ Nunc ponit aliũ cañ. dicẽs ꝙ ꝓpter hoc opꝫ ꝙ dimitatur medicatio cũ medicinis fortibꝰ in tẽporibꝰ fortibꝰ ſicut in eſtate ⁊ hyeme exñte multa caliditate aut frigiditate: ſicut verbigrã ſoluere ventrẽ fortiter aut vomitũ ꝓuocare fortiter aut diſſoluere aut vrere. Et rõ eſt qꝛ virtus ĩ eſtate eſt debilis ⁊ nõ tollerat fortes ĩmutatiões. in hyeme vero niſi cõſerueẽ fortis calor nãlis per ſuaꝫ multitudinẽ non reſiſtet ſufficiẽter frigori: ideo nõ dꝫ virtꝰ debilitari. Et per hoc vide que dixi in cõmento illius afo. Uentres hyeme ⁊ vere calidiſſimi ſunt natura ⁊c.

Hũc etiã canonẽ ꝑdocuit Hyp. quarta ꝑticula afo. afo. illo: Sub cane ⁊ añ canẽ moleſte ſũt farmacie: ⁊ huiꝰ cãs vide a Gal. in ꝯmento preallegati afo.

Ex rebus quoqꝫ in quaꝝ medicatõe ſubtile ẽ adhibendũ ſtudiũ ẽ cuꝫ in vna ꝯiungunẽ egritudie duo qua fieri debẽt ꝯ̃ria: qꝛ opꝫ verbigratia vt egritudo ĩfrideẽ ⁊ eius cã calefiat aut ecõuerſo: qꝛ opꝫ vt egritudo calefiat ⁊ eius cã ĩfrigideẽ ſicut materia colice indiget calefactiõe ⁊ inciſione ⁊ ſubtiliatõe: ⁊ opꝫ vt fortitudo doloris eius infrigideẽ ⁊ ſtupefiat ⁊ econuerſo.

¶ Hic ponit aliũ cañ. dicẽs ꝙ cũ in egritudine duo cõiungunẽ q̃ ꝯ̃rio mõ indicãt ſicut ſi vnũ indiget calefactõe ⁊ aliud ĩfrigidatõe: iſte tũc ſunt res in quaꝝ medicatõe eſt ſubtile hñduꝫ ſtudiũ: verbigrã cũ colica eſt vehemẽtiſſimi doloris ⁊ ꝑ̃dẽt a mã frida tũc eius cã qꝛ flegma ĩdiget calefactõe cũ calidis ⁊ dolor ĩdiget ſtupefactiõe cũ frigidis: ⁊ ita in febribꝰ putridis ꝯtingit vt quartana ⁊ flegmatica. Et qũo fit in hoc caſu faciẽdũ habeẽ in generali. c. vltimo huius fen quarte: ſpãliter aũt in capitulis ſpãlibus.

Amplius ſcire debes ꝙ nõ oĩs repletio neqꝫ omis cõplõnis malicia ſuo medicaẽ cõtrario ex euacuatiõe ⁊ oppoſitiõe: imo multotiẽs ſufficit multa regimis bonitas in repletione ⁊ malitia cõplexionis.

¶ Ponit aliũ cañ. dicẽs ꝙ nõ oĩs egritudo nec oĩs cõplõnis malicia ſuo medicaẽ ꝯ̃rio. ſ. ꝑ approximatiõem ꝯ̃rij alterãtis vt medicine euãntis: imo qñqꝫ ſufficit ſola regiminis bonitas. Hic intelligẽdo per regimẽ admĩſtrationẽ reꝝ non nãlium. Et qũo iſte cañ. intelligiẽ vidiſti ſupra: ⁊ qũo ex hoc non ſequiẽ ꝙ omĩs cura fiat per ꝯtrariuꝫ. naꝫ ĩ iſtis caſibꝰ ꝯ̃riuꝫ ẽ virtꝰ cũ ſuis ĩſtrumẽtis que vnicuiqꝫ morbo effectiue eſt cõtraria. ⁊ hec de iſto caplõ.

Caᵐ 2ᵐ de medicatõibꝰ egritudinũ malicie ꝯplõnis.

q

Ue ex eis quidẽ ſine materia exiſtit ꝯplõ tantũ ꝑmutaẽ: ſꝫ ſi cũ materia fuerit ipſa euãbitur. ⁊ plerũqꝫ quideꝫ ei ſola ſufficit euãtio ſi ꝯplõnis infuſe q̃ ꝑ̃terita ẽ maliciã nõ ibi reliq̃rit. ⁊ qñqꝫ nõ ſufficit nobis iſtõ ſi cõplõnis dimiſerit maliciã: imo erit nobis neceſſe ꝯplõneꝫ permutare cũ in euãndo finẽ fecerimꝰ.

¶ Poſitis canonibꝰ valde gnãlibus in ꝑcedenti caplõ: nũc quo ad ſequẽtia magis ſpãliter determĩat de morboruꝫ cura: lꝫ illud ſpãle ſit multũ cõe reſpectu eoꝝ q̃ in particularibꝰ libris dicunẽ. Diuidiẽ autem hec pars tota ſequẽs in duas. ꝑ̇º eniꝫ docet curã egritudĩs. 2º docet qđ faciẽdũ eſt cuꝫ plures egritudies cõiungunẽ. Scđa ꝑs eſt in pricipio vltimi capli fen huius. Prima pars iteꝝ diuidiẽ in duas. Nã ꝑ̇º determĩat de curis taliũ egritudinũ. 2º accñtiũ. ibi 2ª: iã ſciuiſti doloꝝ cãs. Prima diuidiẽ in quattuor: qm̃ ꝑ̇º ponit q̈ttuor modos gnãles cure. ſ. triuꝫ geneꝝ ſimpliciũ morboꝝ ⁊ vniꝰ generis ꝯpoſitoꝝ vt apoſtematũ. ꝑ̇º ergo ponit male ꝯplõnis curã. 2º male cõpoſitõis. 3º curã apoſtematũ. 4º ſolutõis ꝯtinuitatis: nec ꝑ̃tetaẽ cã ordis. 2ª pars ẽ ibi: oppilatiões vero. 3ª ibi: apoſtematũ quedã. 4ª ibi: ſolutio cõtinuitatis. Prima in duas. ꝑ̇º ponit cañ. cure male cõplõnis. 2º qꝛ multotiens mala cõplexio eſt nãlis ⁊ curaẽ per euonem. dat cañ. de modis euonuꝫ. 2ª pars ĩcipit in prinº ſequẽtis. c. Res que demõſtrant. Preſens caplm̃ diuiditur in partes duas. ꝑ̇º ponunẽ quidaꝫ generales cañ. 2º magis ſpeciales. 2ª ibi: cuꝫ in aliqua egritudine. Prima in duas. ꝑ̇º ponit generaleꝫ cañ. 2º enumerat modos debitos ĩ cura male ꝯplexionis. 2ª ibi: dicemus. ¶ Dicit primo ꝙ mala cõplexio ſine mã ꝑmutaẽ ſolũ ꝑ alterationẽ. Sꝫ ſi fuerit mala cõplexio cuꝫ materia: tũc mã euacuabiẽ. Sꝫ ſi mã nõ relinquit malitiã ꝯplexiõis facte tũc ſola euacuatio ſufficit. Et ſi mã relinquit malitiã cõplexiõis infixe. i. facte tũc non ſufficit ſola euacuatio: imo ẽ neceſſariũ permutare ꝯplexionẽ poſt euacuationẽ. ¶ Circa quã partẽ nota ꝑ̇º ꝙ malitia cõplexionis diciẽ ſine mã que nõ dꝑ̃ẽdet a mã ſpãli depẽdẽtia nec foueẽ ab ea. Et ꝑ materiã intelligo mãm in qua nõ ẽ ꝯplõ illa. Et dico notãẽ nec ab illa foueẽ: qꝛ ex dictis pꝫ ꝙ mã relinquit aliqñ malã cõplexionẽ factã poſt eius remotionẽ: ⁊ certũ ẽ ꝙ talis non depẽdet ineſſe a mã ſed foueẽ ab ea: ⁊ iõ nõ diciẽ pñte materia mala ꝯplexio ſꝫ ſine mã. Et tu ex iſto potes oñdere ꝙ aliqua febris ethica eſt materialis. Diciẽ aũt ſpãli depẽdẽtia eo ꝙ qualitates depẽdẽtes a pñtia hũoruꝫ requiſitoꝝ ad ſanitatẽ ⁊ vitã nõ vt ſic dicũtur cũ mã. nã ethica depẽdet a ſpũ ⁊ ſanguine per quos ſtat vita ⁊ tamẽ diciẽ ſine materia. ¶ Scđo nota ꝙ mala ꝯplexio cũ mã diciẽ illa que ſpãli depẽdentia depẽdet mã corpulẽta aut ab ea cõſeruaẽ ⁊ foueẽ. Ex quo patet ꝙ licet effimera vera a ſpũ ⁊ vapore depẽdeat: eſt tamẽ ĩmaterialis: qꝛ nõ depẽdet a mã corrupta. ¶ Nota tamẽ 3º ꝙ cõplexionũ quedã eſt facta ſꝫm modũ loquẽdi medicorũ ⁊ q̃dam fiẽs ⁊ quedã futura fieri. facta aũt diciẽ tribus modis. Uno modo ꝓprijſſime qꝛ ẽ qualitas ꝓducta ⁊ nõ de

UVA. BHSC. IyR_006_1

pēdens in eſſe ſpāli dependētia ab aliquo corporeo ſiue ſub
tili ſiue groſſo diſticto a ſuo ſubiecto ⁊ apta conſeruari. ⁊
hoc mō febris ethica ē facta: ⁊ febris effimera eſt morbus
fiens q: pēdet a calefacto eſſe ſpūs vel vaporis. Scdo mō
dicit̄ aliqua mala ꝯplō facta: q: ineſſe ꝓducta: ⁊ hoc mō
oēꝫ qualitatē actu exñteꝫ dicimꝰ factaꝫ. Et mō huic oppo
ſito capiēdo fiens dicimꝰ ꝙ mala ꝯplō fiens nō ē facta ſꝫ
eſt cōpoſita ex parte facta ⁊ ex pte futura fieri. Tertio mō
dicit̄ aliq̄ mala cōplō facta: q: ꝓducta eſt: ⁊ cū hoc nō de/
pēdēs a re corpulēta groſſa: ⁊ hoc mō febris effimera di/
cit̄ facta a Gal. credo 8° terapen. circa finē cū dicit: Q̄d
cōc eſt ethicis ⁊ effimeris adhuc nō fieri. Et dicit̄ ita pp ſi
milē modū eſſe curatōis in iſta ⁊ ī facta: q: ſine intētiōe ad
mām. Fiens aūt dicit̄: q: aut ſm partē ꝓducēda cū actua
li tēdētia ad ꝯplemētū. Aut q: lꝫ tota ꝓducta ſit: tñ q: de/
pendēs ſpāli dependentia ſiue a re corpulēta ſiue nō. Ter/
tio q: dependēs ſpāli dependentia a corpulēta mā. Futura
aūt fieri dicit̄ qđ nōdū eſt ſm aliquid ſui ꝓductā: ſꝫ in cor
pore eſt cā parata ipm facere. Hic ſumit̄ tñ 3° mō factuꝫ:
⁊ tūc pꝫ verificatio dictoꝝ Aui. Nā mala ꝯplō ſine mā ſi/
ue facta ſiue non: in cura dꝫ pmutari per alteratione. hoc
eiꝫ ſufficit ſolū. ¶ Mala aūt ꝯplō mālis q: in eiꝰ cura eſt
indicatio a cā tanq̄ꝫ a re ꝑter nām remouēda: pꝫ ꝙ eūatio
eſt oportuna. Et hoc mō ſumēdo eūoneꝫ ꝓ oī māe a corpe
eductione ſiue hoc fiat per dietā ſiue per flobothomiā ſiue
alr. ⁊ hoc ītellige vbi materia peccās non fuerit reducibi/
lis ad benignū. Nā in reducibili nō ſemꝑ ē materia eua/
cuanda vel neceſſaria euacuatio materie: ſed ſufficit recti/
ficatio. Senſus igit̄ dicti Aui. ē ꝙ ſi mala cōplexio fuerit
cū mala materia nō reducibili ad benignū ꝙ materia dꝫ
euacuari. Sed vt dicit̄ mala cōplō materialis qñq̄ꝫ dicit̄
materialis q: dependet a mā ⁊ nō eſt apta ſine materie pre/
ſentia cōſeruari. In illius ergo cura ſufficit ſola euacua/
tio materie. ¶ Et ſi dicat̄ euacuata mā quid remouet illā
malā cōplexionē: dicit̄ ꝙ virtus mediātibus ſuis natura/
libus īſtrumētis que remāſerūt: aut mediantibꝰ rebus nō
nālibus ꝯbite applicatis que neceſſario nos alterāt: vt di
xi ſupra 3° tegni. Et ſic patꝫ tertij dicti verificatio. ¶ Sed
ſi mala cōplexio mālis nō dependet ex toto a mā īmo tātū
fouet̄ ⁊ ē iam facta: tūc nō ſufficit ſola euacuatio: īmo cum
hoc requirit̄ alteratio poſt euacuatiōeꝫ. ⁊ hoc voluit Aui.
in 4° dicto. Et cā ē q: etiaꝫ euacuata illa mala mā adhuc
remanet illa mala cōplexio quā virtus ſine adiutorio non
pōt remouere. ⁊ ideo indicat de ſui remotiōe per adiuto/
riū medici. Ex quibus vides quō intelligi dꝫ Gal. in illo
c. Ad manifeſtos vero egros. ¶ Pꝫ 2° ꝙ nō ſemper ī cu/
ra male cōplexiōis materialis poſt euacuationē oꝫ medicū
alterare. ſ. malā cōplexionē ī parte factā puta qñ tēdit ad
corruptiōeꝫ. ⁊ ad hoc ſufficit virtus ſine medici adiutorio
q: nihil de illa erat factū mō primo. ⁊ tu hāc diſtinctiōeꝫ
de facto ⁊ fiēte tene mēti ꝓpter multa Gal. dicta que ꝓ/
pter hanc equiuocatiōeꝫ vident̄ ambigua. ¶ Ultimo no/
ta ꝙ in mala cōplōne māli que hꝫ partē īfixaꝫ ſiue factam
īnuit Aui. ꝙ primo ſit faciēda euacuatio ⁊ ſcdo alteratio.
Et ita Gal. 3° tegni loco allegato. cuius tamen oppoſituꝫ
īnuit Aui. prima quarti de cura putridarū in generali vbi
vult ꝙ febris putrida que ē mala cōplexio materialis ⁊ fi/
ens qñq̄ꝫ ē tante intēſiōis ꝙ nō lꝫ vti regimine cāe īmo eſt
ꝑ cōtrariū alterāda: ⁊ poſtea cāe vacādū: ꝓpter qđ dicūt
quidā ꝙ Aui. hic ⁊ Gal. loco allegato nō intēdūt deno/
tare ordinē opatōis ſed ordinē intētiōis q: primo debemꝰ
remouere cām cōplete q̄ꝫ effectū remoueamus. vel dicūt
ſcdo ꝙ denotāt modū ⁊ ordinē qui vlr debet teneri cōſi/
derādo māꝫ vt ē cā: ⁊ morbū vt ē effectꝰ: lꝫ qñq̄ꝫ habēdo
reſpectū ad morbi magnitudinē ⁊ accñtia ab eo īcipiemꝰ.

Dicemꝰ ergo ꝙ malicie ꝯplōnis medicatio multis fit
modis. Cōplōnis nāqꝫ malicia aut erit īfuſa ⁊ erit ip/
ſiꝰ medicatio ex ꝯrio abſolute: ⁊ hec ē medicatio abſolu
te. aut erit ī termino vt ipſa generet̄: ⁊ erit eius ſanatio
ſanatio que fit cuꝫ premiſſione ſeruatōis.

¶ Hic enumerat modos cārum qui debētur ī remotiōe
male cōplexiōis ꝓ quāto ille cāe dicūtur aut curantes aut
ꝑſeruātes aut vtrūq̄ꝫ. Et pōt diuidi in duas. Nā prio fa/
cit hoc. 2° ponit exēpla. ibi quēadmoduꝫ. Dicit primo ꝙ
medicatio. i. medici opatio ꝑ remotionē malitie cōplexio/
nis ē multis modis. Et rō. nā mala cōplō aut ē facta ⁊ nō
pendēs a mā: ⁊ tūc opatio medici circa illā eſt ſolū curatio
ꝑ adminiſtrationē cōtrarij. Aliquādo aūt mala cōplexio
ē in termino vt generet̄: ⁊ tūc eius ſanatio. i. remotio ē cū
ꝓuiſione preſeruationis. i. iſta non ē curatio ſola īmo ſem/
per ē cōiuncta preſeruatio. ¶ Ubi nota ꝙ mala cōplexio
que ē in termino vt generet̄ ē duobus modis. Naꝫ qñq̄ꝫ
īncluſiue ē in termino vt generet̄: ⁊ illa ē mala cōplexio fi/
ens q: iam generat̄: qñq̄ꝫ vero ē in termino vt generet̄ ex/
cluſiue q: nō generat̄ ſed parata ē generari: ⁊ illa dicitur
mala cōplexio futura fieri. Et iō in iſtarū vtriuſq̄ꝫ ꝓuiſiōe
vtitur medicꝰ ꝑſeruatiōe: lꝫ in prima vtat̄ remotiōe cū ꝑ/
ſeruatiōe ⁊ curatiōe. in ſcda aūt inhibitiōe vtit̄ tantū ⁊ ꝑ/
ſeruatiōe. ⁊ Aui. hic de ābabꝰ intelligit. nā de vtroq̄ꝫ mō

Nota ꝙ mala mā tri/
plici de cā poſt ciꝰ eūoneꝫ
reliquit habituꝫ male cō/
plexionis ī membris. p°
ex violētia cauſe fortiter ī/
primētis vt cauſone. 2° ex
diuturna pmanētia ipſius
male māe ī mēbris. 3° ex
diſpōne vehemēti mēbro
ruꝫ ad recipiēduꝫ talē ha
bitū male ꝯplōnis.

ponit ſtatim exēplū. Nomē ergo curationis dicit̄ de ope
medici per qđ diſpō que ē morbus remouet̄. Sed nomen
ꝑſeruatiōis dicit̄ de ope qua ꝓhibet̄ futurus morbꝰ ⁊ vo
catur ꝓuiſio. Cū ergo morbꝰ ē factus ⁊ nihil eius ē futuꝝ:
tūc ſola opatio ē neceſſaria per quā hic morbus remouet̄
⁊ ē curatio ſola ⁊ medicine vt ſic aproximate dicūtur cau/
ſe curatiue. Sed qñ ē diſcraſia fiēs: intētio medici dꝫ eſſe
ad remotionē partis facte. ⁊ illa ē curatio ⁊ ad ꝓhibitiōeꝫ
ꝑtis future. ⁊ illa ē preſeruatio ſiue ꝓuiſio. In mala aūt cō
plexiōe futura fieri ſolū q: nullus morbus remouēdus eſt
nullus ē actus quin debeat̄ curatio: ſed ſolū prohibēdum
ē ne ipa eueniat. ⁊ ideo illa opatio medici dicit̄ preſeruatio
ſola. ⁊ hec habētur 3° tegni loco allegato.

Quēadmoduꝫ putrefactionē que eſt cū febre quar/
tana medicant̄ cū tyriaca: ⁊ aquā frigidā in tertiana da/
mus vt extinguat. Et exēpluꝫ premiſſiōis ſeruatiōis eſt
eūatio in quartana que fit cū heleboro: ⁊ in tertiana cū
ſcamonea: cuꝫ principiū interpollatōis que accidit pro/
hibere volumꝰ. Et exēplū ꝑmiſſiōis ſeruatōis ſolūmō
ē eūatio q̄rtane apte ꝓpter melācolie ſupationē cū he
leboro: ⁊ febri tertiane ꝓpter colē dñium cū ſcamonea.

¶ Hic ponit exēpla ⁊ eſt ītrincatus modus ponēdi exē/
pla ⁊ reducēdi ad ꝓpoſitū. Ideo notate modū ītroductōis
Dy. deīde meuꝫ. ¶ Dy. ergo dat duos modos ītelligēdi
hunc textū. Unus ē ꝙ Aui. dat hic tātū exēpla ⁊ modos
remotōis male ꝯplōnis fiētis ⁊ future fieri: ⁊ dimittit exē/
pluꝫ curatōis male ꝯplōnis facte notū per curā: ⁊ tunc di
cit ꝙ intētio q̄ habet̄ ad cām in putrida febre eſt duplex.
Una ē ad digeſtionē humoꝝ: alia ē ab eūoneꝫ: vt dicit̄ 3°
tegni illa ꝑte: Ferūt eiꝫ ſi ita ꝯtingit. Et ideo dicit hic pri/
mū exm de exhibitōe tyriace in q̄rtana eē de digeſtiōe ma
teriei q̄rtane: ⁊ iō intelligit̄ de tyriaca veteri q̄ eſt ſubtilia
tiua ⁊ calefactiua. Et 2m de exhibitōe aque fride ī tertiana
eē ēt de digeſtione materiei. Nā humor ſubtilis ⁊ calidus
digerit̄ ꝑ aquā frigidā: vt dicit̄ ab Aui. pa q̄rti. c. ꝑallega
to. Duo vero ſequētia ſunt exa de ꝑſeruatōe reſpectu ꝑtis
future fieri in morbo fiente per eūoneꝫ. Naꝫ ſi ꝑceſſit pa/
roxiſmꝰ tertiane vel q̄rtaue ita ꝙ ē q̄rtana vel tertiana fi/
ens: tūc exhibitio ſcamonee ꝓ eūone colere in tertiana ⁊
helebori in quartana ꝓ eūone melācolie ē ꝓuiſio reſpectu
futuri qđ eſt pars fiētis. naꝫ ꝓhibemꝰ per hoc pricipiū pa
roxiſmi futuri ⁊ ſic febrē futurā: cui tñ ſimilis iā accidit: ⁊
iō illud futuꝝ qđ ꝓhibet̄ dicit̄ pars fiētis. Alia vero duo
exa. ſ. eūonis cuꝫ ſcamonea in tertiana que nondū eſt: ſed
corpus paratū eſt eaꝫ pati. ⁊ in quartana que nondū eſt: ſꝫ
corpus eſt aptū eaꝫ pati ꝓpter ſuperationē melācolie a de
bito modo qui in corpore dꝫ eſſe: ſunt exēpla ꝓuiſiōis re/
ſpectu futuri fieri qđ nō ēſt pars fiētis. Et hic modus nō
videt̄ mihi verus q: duo prima exēpla ſm modū loquēdi
Aui. ſunt exempla curatiōis non preuiſionis. Nam dicit
textus quēadmodū putrefactionē que ē in quartana medi
camur ⁊c. Et nota ꝙ dixit ſupra de medicatione abſolute
⁊ nō dixit de cura que fit ꝑ cōtrariū. Et in ſcdo exēplo di
cit Aui. ꝙ aquā frigidaꝫ in tertiana damus vt extinguat̄
⁊ nō dixit vt materia digerat̄. ¶ Scdo mō exponit Dy.
ꝙ hec duo exēpla ſunt de cura male cōplexionis facte q̄ ē
pars fiētis: ⁊ ꝙ Aui. relinquit exēplū male cōplexionis fa/
cte q̄ nō ē pars fiētis q: ꝯuenit cū iſta: ⁊ tūc dicit ꝙ tyria/
cam exhibemꝰ ī quartana ad ipaꝫ extinguēdā. Et ē ītelli/
gēdum de tyriaca noua ī qua ē virtus ſtupefaciēdi ꝑ opiū
ibi exñs. De tertiana dicit aqua frigida dat̄ ad extinguē/
dū factū ex ea. Et iteꝝ hic modus nō videt̄ mihi verus q:
tyriaca quātūcūq̄ꝫ noua: ē electuariū calidū: ⁊ nullibi le/
git̄ ꝙ ad extinguēdū calorem febrilēꝫ exhibeat̄. Quō aūt
ſtupefacit nō ꝑtinet nūc dicere. Et iō quo ad quattuor vl/
tima exa puto Dy. optime dicere: ⁊ quo ad introductionē
ſcdi exēpli de aqua frigida eligo ſcdꝫ modū introductiōis
Dy. ſed quo ad primū non. Sꝫ quo ad ītroductiōeꝫ primi
exēpli de tyriaca nō eligo primū nec ſcdm modū. Nā ne/
q̄ꝫ dico ꝙ ſit exēplū ꝓuiſionis quo ad digeſtionē materie
vt ipē dicit in prio modo: nec dico ꝙ ſit exēplū extinctio/
nis vt ipē dicit ī ſcdo modo. Nam Auic. dicit ꝙ putrefa/
ctionē que ē in quartana medicamur cū tyriaca ⁊ nō dicit
ꝙ extinguamus quartanā. Dico ego ꝙ putredo materiei
quartane multotiēs remouet̄ ꝑ ſeparationē partis putre/
facte a reſiduo ⁊ per euaporationē eius. ⁊ hoc facit tyriaca
ī quartana reſpectu materie. iō illa diſpoſitia que ē putre/
do cū ſit facta ꝑ exibitionē tyriace remouet̄ ſimili mō quo
mala cōplexio facta remouet̄ per ſuū cōtrariū. Et iō non
obſtante ꝙ iſta nō ſit vera curatio: q: illa putrefactio for/
taſſe nō ē morbus: tamē hoc exēplum curatiōis male cō/
plexionis facte: quia cū iſta cōuenit pro quāto eſt remotio
diſpōis ꝑter naturā exñtis.

Cuꝫ autē in aliqua egritudine dubitaueris an ſit eiꝰ
cauſa caliditas an frigiditas: ⁊ ſi experiri volueris non
experiaris cum ſuperfluo: ⁊ caue tibi ne decipiat te im/
preſſio que erit accidētalis.

Hic Aui.

Nota ꝙ in febre
melancolica ⁊ fleg/
matica nō ꝯuenit ty/
riaca in pricipio ſed
poſt digōneꝫ ⁊ eua/
cuationē māe vt di/
cit Aui. prima quarti
tractatu. ij. ca. lix. ſed
tyriaca q̄ dat̄ gratia
reprimēdi putredinē
dari oꝫ in principio
paroxiſmi: vt ēt quin
to canonis ſūma pri/
ma. c. j. de tyriaca di
cit Auic.

Circa ſcdm exē/
pluꝫ multa ſūt ꝯſide
randa priuſq̄ꝫ exhi/
beatur aqua frida in
tertiana: vt vult Aui.
prima quarti tracta/
tu. ij. c. vij.

¶ Hic Aui. exequit᷑ cañ. min⁹ vl̃es ponẽdo: ⁊ diuidit᷑ in duas. Nam p̄ᷓo p̄mittit quedã ad ꝓpoſitũ vtilia. 2° cañ. alios curatiõis ponit. ibi 2ª: cum aũt caliditas. Prima in tres ſm̃ tres regulas vtiles. ibi 2ª: ⁊ debes ſcire. ibi 3ª: vna queq; p̄terea. ¶ De prima dicit q̄ cũ dubitas vtrũ egritudinis cã ſit caliditas aut frigiditas ⁊ volueris hoc p̄ iuuãtia ⁊ nocẽtia cognoſcere: nõ experiaris cũ reb⁹ ſupfflue frigiditatis aut ſupfflue caliditatis. ¶ Dicit 2° q̄ ĩ ferẽdo iudicio caue tibi ne p̄ ĩpreſſionẽ accñtalẽ decipiaris. ¶ Circa quẽ cañ. nota p° q̄ maxime certitudo qualitatis morbi ſumit᷑ a iuuãtibus ⁊ nocẽtib⁹: ⁊ iõ multotiẽs ſtante ignorantia eius exp̄imur. ¶ Nota 2° q̄ cã dicti eſt vt dicit᷑ 2° regis acutoꝝ. q: illa que ſunt vehemẽtis virtutis ⁊ applicant᷑. ſi nocẽt: nocẽt nocumẽto magno. ſ; ſi applicant᷑ debilia ⁊ nõ ꝓſunt nõ p̄nt nocumẽto magno nocere. ¶ Circa ſcdm dictũ nota q̄ medicine multotiẽs accidẽtaliter ĩprimũt qualitatẽ oppoſitã cõpl̃oni ſue. ⁊ põt hoc cõtingere multis modis. Nã quãdoq; ex ꝓprietate medicina calida euacuat colerã ⁊ poſtea infrigidat ꝓpter defectũ calidi humoris vt ſcamonea. ex eius ergo iuuamẽto in tertiana nõ eſt putandũ tertianã eſſe egritudinẽ frigidã. Qñq; cõtingit ꝓpter vnã qualitatẽ ſuũ cõtrarium cõfortari vt aqua frigida ſup̄infuſa in corp̄e ſanguineo iuuenili in tp̄e eſtatis facit vnire calorẽ naturalẽ ⁊ diſſoluit materiã frigidam ĩ neruis. Quãdoq; vero ꝯtigit ex approximatõe medicine remoueri accñs morbi cõſimilis qualitatis cũ complexiõe medicine vt ſi ĩ colica a mã frigida ſit dolor fortis ⁊ remoueat᷑ per ſtupefaciẽtia: aut ſi ſit ventoſitas in calida epatis cõplexiõe ⁊ per dyaciminũ diſſoluat᷑. Et multi ſũt tales modi accidẽtales quos ad determinatũ numerũ eſt impoſſibile reducere: q: ea que ſunt p̄ accñs ſunt infinita. Sed ſcire debes modos quib⁹ cognoſcim⁹ qñ medicina p̄ ſe operat᷑ ⁊ quãdo nõ. ⁊ cũ videmus nõ ita fieri dicim⁹ impreſſionẽ eẽ accidẽtalẽ. ⁊ tu vide in vl̃ibus cañ. de ꝯditionibus experimẽti ꝓ ꝯplexiõe medicine cognoſcẽda. ¶ Ex his p; quare oꝫ cauere deceptionẽ que ex parte accidẽtalis ĩpreſſiõis contingere poſſ; ne fieret error iudicij d̃ qualitate medicine vel materie.

Impreſſio accidẽtalis dupl̃r poteſt medicũ decip̄e in iudicio de cã morbi in frigiditate ⁊ caliditate ei⁹: vno modo ex p̄te medicie vt q̄ medicia ſit calida ⁊ morb⁹ credit᷑ q̄ ſit fridus ⁊ nõ ẽ: ⁊ ſic ecõuerſo dicat᷑ de frigida. Alio mõ ex p̄te egritudis vel cãe vel accidẽtiũ ei⁹ que ꝓpter vehemẽtiã ſuã ꝯmouẽt calorẽ extraneũ ĩ membro egro vel in parte ꝓxĩa l; mã ſit frigida. Pro primo vide Aui. xxij. fen tertij. c. vj.

Et debes ſcire q̄ infrigidatiõis ⁊ calefactõis tẽpus eſt vnuꝫ: ſ; in ĩfrigidãdo ẽ plus timoris: quoniã caliditas ẽ amica nature. ⁊ ĩ humectãdo quidẽ ⁊ exiccãdo ẽ timor ẽqualis: ſ; humectãdi tẽpus eſt longius.

¶ Hic ẽ ſcdš cañ. de vl̃ib⁹ ⁊ cõprehẽdit quattuor cõcluſiones. ¶ Prima ẽ tp̄s calefactiõis ⁊ infrigidatõis ẽ vnũ i. equale. ¶ Scda ꝯcluſio: maior timor ẽ ĩfrigidãdo q̃ ĩ calefaciẽdo. Et rõ ẽ quia frigiditas ẽ inimica oib⁹ virtutib⁹ ⁊ caliditas ẽ amica nature. ¶ Tertia cõcluſio: timor humectandi ⁊ timor exiccãdi ſunt equales. ¶ Quarta ꝯcluſio: tp̄s humectãdi ẽ longius tp̄e exiccãdi. ¶ Et nota q̄ vltra has quattuor cõp̄atiões fiũt alie due a Gal. vna de tp̄e calefaciẽdi ⁊ infrigidandi cõp̄ando ad tẽpus humectandi ⁊ exiccandi. 2ª ẽ de periculo calefaciẽdi vel infrigidãdi cõparãdo ad p̄iculũ exiccãdi ⁊ humectãdi. ⁊ ideo vt ille res melius intelligant᷑ ad moduꝫ Dy. iſtas ſex regulas breuiter queſtionabimus.

Queritur igitur primo vtrum tempus calefaciẽdi ⁊ ĩfrigidãdi ſit min⁹ tp̄e humectãdi ⁊ exiccãdi ſtante eque equali quãtitate denſitatis ⁊ gradu cãꝝ:

Nõ diſputet᷑: ſed ex his que dicũtur 8° terapẽ. teneam⁹ q̄ tẽpus calefaciẽdi ⁊ ĩfrigidãdi ſit min⁹ q: multo veloci⁹ agũt actiua paſſiuis ceteris parib⁹. Et in cõp̄atiõe actiuarũ ad paſſiuas cõſtat q̄ p̄iculũ ẽ maius ĩ approximatõe calefaciẽtiũ ⁊ ĩfrigidãtiũ vt ſic q̃ ĩ approximatiõe humectãtiũ ⁊ exiccãtiũ per ſimplicẽ alterationẽ q: forti⁹ iſte actiue agũt alijs paribus. Qd̃ ergo tenet Dy. q̄ quo ad leſionẽ p̄ qualitates introductiuas ꝯſequẽtes tm̃ ẽ periculũ ĩ actiuis quãtũ in paſſiuis q: eque cõtingit mori ꝓpter nimiũ actiuorũ ⁊ paſſiuorũ exceſſuꝫ: hoc ẽ ambiguũ. Uidemus enim multos in ſiccitate ꝓcedere ſine multa op̄ationũ leſiõe ⁊ multũ in humiditate diſtare ab optimo tẽp̄amẽto ſine multa op̄ationũ ĩperfectiõe vt p; in trãſitu etatiuo: de pueritia ad ſenectutẽ p̄mã. Et iõ illius cõcluſionis ſcde oppoſitũ teneo. ⁊ videt᷑ de mẽte Gal. 8° de regimine ſanitatis. c. 3° cũ dicit: In euerſiõe vero que ẽ ſ; calidũ ⁊ frigidũ ꝯtrariorũ oblatio ſemp̄ cõuenit. Efficaciſſime enim ſunt: ⁊ vt ita dicã virtuoſiores his que ſunt ſm̃ ſiccitatẽ ⁊ humiditateꝫ diſcraſijs. Hec tales facili⁹ deniq; a ſimilib⁹ cibis ĩ morboſaꝫ diſcraſiã deueniũt ſicciorẽ nõ operãs quecũq; particularuꝫ nullo mõ manifeſto nocebit ſicut neq; cuſtodiendo humidã. ¶ Euidenti⁹ aũt cibi augmẽtuꝫ etatis fiat hoc quidẽ a prima gñatiõe vſq; ad pueritiã humidiſſimã habẽtes carnẽ ſiccã aũt ſufficiẽtẽ q̃ ſeniles. ¶ Hec Gal. expreſſe vbi vult q̄ acquiſitio equalis ſiccitatis ſupra tẽp̄amẽtũ ñ ẽ ita nociua ſicut caliditatis ⁊ frigiditatis: ideo Dy. nõ cõueniẽter dicit. Sed nunc veniam⁹ ad cõp̄ationes ĩ littera poſitas.

Queritur ergo vtrum tempora calefaciẽdi aut ĩfrigidãdi ſint equalia: negatiue arguitur ſic.

Quodlibet corpus viuẽs reſiſtit calefaciẽtib⁹ minus q̃ ĩfrigidantib⁹ cãis. ⁊ cãe caliditatis ſunt per ſe velocius alteratiue: ergo alijs paribus ſemp̄ in viuẽte calefactio ẽ velocior q̃ ĩfrigidatio. Cõſequẽtia nota: ⁊ minor p; cũ maiori q: in quolibet viuẽte caliditas ẽ intenſior frigiditate. ⁊ cũ hoc frigiditas ẽ magis inimica nature: ergo fortius reſiſtit viuens ĩfrigidantib⁹ q̃ calefaciẽtib⁹. Cõſequẽtia tenet: q: per caliditatẽ reſiſtit ĩfrigidantib⁹ que ẽ itẽſior: ⁊ p̄ frigiditatẽ calefaciẽtib⁹ que ẽ remiſſior in eo. Si igit᷑ calefactio ẽ velocior ergo tẽpus calefaciẽdi ẽ min⁹ q̃ tẽpus ĩfrigidãdi. ¶ Scdõ ſic: ſi tempus calefactiõis ⁊ infrigidatiõis ẽ vnũ: aut hoc ẽ generaliter reſpectu cuiuſlibet calefaciẽdi ⁊ infrĩdandi: aut reſpectu temp̄ati: aut reſpectu calefacti: aut reſpectu ĩfrigidati nõ gñaliter: q: calidũ multo citius labit᷑ ĩ lapſuꝫ calidũ q̃ ĩ frigidũ: nec reſpectu tẽp̄ati: vt p; ĩ p̄cedẽti argumẽto: nec reſpectu ĩfrigidati: quia frigidũ ĩ vltimo difficili⁹ calefit q̃ calidũ ĩ vltĩo ĩfrigidet᷑: ⁊ frigidũ ĩ vltimo facilius ĩfrigidet᷑ q̃ calidũ in vltimo infrigidet᷑: vt p; ĩ iſto. c. ⁊ per ꝯſequẽs frigidũ ĩ vltimo multo difficilius calefit q̃ ip̄mmet ĩfrigidet᷑. ¶ Tertio ſic: ſi aliqd̃ corp⁹ ẽ qd̃ eque velociter ĩfrigidet᷑ ſicut calefit: tũc oẽ illo calidi⁹ ceteris parib⁹ veloci⁹ ⁊ citius calefiet. ⁊ oẽ illo frigidius veloci⁹ ĩfrigidabit᷑. ⁊ p̄ cõſequẽs reſpectu multo pluriũ nõ erit tẽpus equale calefaciẽdi ⁊ ĩfrigidandi q̃ ſint illa reſpectu quorũ ſunt eq̃lia. ¶ In oppoſitũ ẽ Gal. 8° terapẽtice. ¶ Pro dubio nota p̄ᷓo q̄ tẽpus infrigidationis eẽ equali tẽpori calefactiõis põt dupl̃r ĩtelligi. Uno mõ pũctual̃r. Alio mõ cũ quadã latitudine q: vnũ nõ ẽ notabil̃r alio maius. ¶ Nota 2° q̄ hoc põt ĩtelligi ẽt aut generaliter reſpectu cuiuſlib; corp̄is q: ĩ oĩ tali tp̄s calefaciẽdi ⁊ ĩfrigidãdi ſit vnũ: aut tãtũ reſpectu tẽp̄ati: aut 3° q̄ ĩ iſto. c. loquit᷑ de infrigidatiõe calidi ſiue calefactiõe frigidi itelligit᷑ iſta ꝯp̄atio ꝯparãdo tp̄s calefaciẽdi ĩfrigidatuꝫ ad tp̄s ĩfrigidãdi calefactũ alijs parib⁹. ⁊ hoc ꝓputo fuiſſe de ĩtẽtiõe Aui. ⁊ tũc ſunt duo mõi reſpõdẽdi. Primus ẽ Dy. quẽ quaſi Marſi. tenet l; nõ limitet ſe ita: ⁊ cõſiſtit ĩ q̄buſdã ꝯcluſiõib⁹. ¶ Prima ꝯcluſio: quodlibet humanũ corp⁹ tẽp̄atũ facili⁹ ẽ calefactibile q̃ infrigidabile. p; q: ĩfrigidãtib⁹ reſiſtit p̄ ſuũ calorẽ vt calor eſt ⁊ vt nãlis ẽ. Et q: frigiditas ẽ magis nature inimica: ideo calor temp̄atus ideſt naturalis magis repugnat ĩductioni frigidatis q̃ caliditatis. ¶ Scda ꝯcl̃o: quocũq; corp̄e frĩdo dato in quo frĩditas nõ ſit facta illud facili⁹ ⁊ citius calefit q̃ corp⁹ cõſimil̃r calidũ ĩfrigidet᷑. Iſta ẽ de mẽte Aui. ĩfra: q: calidũ ĩ primo difficili⁹ ĩfrigidat᷑ q̃ frigidũ ĩ p̄ᷓo calefiat. ¶ Tertia ꝯcl̃o: quodlibet corp⁹ ĩfrigidatũ frigiditate facta difficilius ⁊ ĩ maiori tp̄e eſt calefactibile q̃ cõſimil̃r cal̃m ſicut ipſuꝫ frigidũ eſt ĩfrigidabile. p; ex Aui. ĩfra: ⁊ q: ĩ tali frigido virt⁹ eſt magis mortificata: ⁊ q: tale corp⁹ eſt multũ cõdenſatũ ⁊ ĩdiſpoſitũ pati a calido. ¶ Quarta cõcl̃o: l; tp̄s calefactõis frĩdi ⁊ ĩfrigidatiõis calidi nõ ſit vnũ pũctual̃r: põt tñ dici vnũ latitudinal̃r. Et iõ Gal. 7° terapeu. nõ dixit abſolute q̄ eſt vnũ ſ; vnũ quodã modo: q: nõ tm̃ vnũ iſtoꝝ excedat reliquũ ſicut iſta excedunt᷑ a tp̄e humectãdi vel exiccãdi: vel ſicut tp̄s humectãdi excedit tp̄s exiccãdi. Marſi. aũt nõ dicit gñaliter q̄ difficili⁹ ſit ĩfrĩdatũ ĩ facto eſſe calefacere q̃ calefactũ ĩfrigidare. ſ; dicit vnã particularẽ ꝯcl̃oneꝫ. Qd̃ aliqd̃ corp⁹ p̄ternãliter lapſuꝫ difficili⁹ ſm̃ aliqua mẽbra calefit q̃ infrigidet᷑: vt in patiẽte apoplexiaꝫ dicit eẽ claꝝ. ¶ Cõtra ꝯcl̃oneꝫ penultimã Dy. ⁊ vltimã Marſi. arguit᷑ ſic: Et ſuppono q̄ oẽ corp⁹ viuẽs quãtũcũq; lapſuꝫ ad frigidũ ſiue nãliter ſiue p̄ternãliter eſt calidũ a dñio: ⁊ hoc ipſi ꝯcedũt q: vita ꝯſiſtit p̄ calidũ ⁊ humidũ. ¶ Suppono 2° q̄ cãis ĩfrigidãtib⁹ reſiſtit corp⁹ p̄ caliditatẽ ⁊ calefaciẽtib⁹ p̄ frĩditatẽ. ¶ Suppono 3° q̄ magis actiua ſit caliditas q̃ frĩditas. ¶ Suppono 4° q̄ reſiſtere reducet᷑ ad vitã actiuã. nã per virtutẽ mãe paſſiuam nulla habet᷑ reſiſtẽtia: vt p; de mã prima. Et tunc arguit᷑ ſic: Omne mẽbrũ humanũ viuens ⁊ oĩs hõ magis reſiſtit cãis ĩfrigidãtib⁹ q̃ calefaciẽtib⁹: ergo a debiliorib⁹ calidis põt calefieri q̃ frĩdis ĩfrigidari. ⁊ p̄ ꝯſequẽs min⁹ potẽtes cãe calefaciẽtes req̄runt᷑ ad calefaciẽdũ q̃ req̄rãtur frĩde ad infrigidãduꝫ: ⁊ iõ facili⁹ vnũquodq; corp⁹ calefit q̃ ĩfrigidet᷑: ⁊ p̄ ꝯſequẽs veloci⁹ alijs parib⁹. ¶ Et ex iſto arg° arguit᷑ ſic: Capio corp⁹ ĩfrigidatuꝫ ĩ vltĩo ⁊ ſequit᷑ q̄ hoc facili⁹ calefit q̃ ĩfrigidet᷑ ip̄m. S; hoc difficili⁹ calefit ⁊ facili⁹ ĩfrigidat᷑ q̃ corp⁹ calefactũ in vltĩo. Igit᷑ hoc idẽ corp⁹ frigidũ multo facili⁹ calefit q̃ calefactũ in vltĩo ĩfrigidet᷑. Cõſequẽtia p; ĩtelligẽti ⁊ põt poni in termĩs ⁊ erit clarior. Mihi aũt videt᷑ ſuppoſito q̄ ego nõ puto verũ q̄ oẽ corpus viuẽs plus hẽat de caliditate q̃ de frĩditate vt iſti tenẽt. ¶ Dicẽdũ p° q̄ corp⁹ ĩfrĩdatũ calefieri: põt intelligi duob⁹ modis. Uno mõ abſolute: q: fieri cal̃m ſiue caliditate accñtali ſiue nãli: ⁊ corpus ĩfrĩdari eodeꝫ modo. Scdõ mõ calefieri frĩdũ caliditate nãli ⁊ ꝯueniẽte ita vt p̄ illaꝫ ad ſanitatẽ reducat᷑: ⁊ ecõuerſo cal̃m ĩfrĩdari ita vt p̄ illã fiat ſanũ. ¶ Nota 2° q̄ corp⁹ frĩdũ p̄ purã calefatõeꝫ ab igne cũ reducit᷑ ad gradũ equalẽ tp̄ato nõ oꝫ q̄ p̄p̄ hoc ſit factũ tp̄atuꝫ ⁊ ſanũ: q: iſta caliditas nõ debite dep̄ẽdet

Pro iſto argumẽto facit vna ſententia Gal que dicit q̄ nulla actiua qualitas ſibi rem vicinaꝫ adeo mutat ſicut calor.

Suppoſito q̄ frigidũ ĩ vltimo facili⁹ calefiat q̃ ipſũmet infrigidet᷑: ⁊ difficilius calefiat ⁊ facili⁹ infrigidet᷑ q̃ corpus calidũ in vltĩo: pone ſic in termĩnis. Calefiat facilius tale frigidũ ĩ vltĩo q̃ infrĩdet᷑ facilitate vt. iiij. ⁊ infrigidet᷑ facilitate vt. ij. ⁊ calidũ ĩ vltimo q̄ facilius calefit ⁊ min⁹ facile infrĩdat᷑

UVA. BHSC. IyR_006_1

frigido in vltio:calefiat fa cilitate vt.vj. ⁊ infrigidet̄ facilitate vt.j. ⁊ ſequit̄ ꝙ frigidū i vltimo calefit facilitate vt.iiij.⁊ calidū in vltio frigeſit facilitate vt j.ergo frigidū in vltio facilius calefit ꝙ̄ calidū in vltimo infrigidet̄:qḋ erat ꝓbandū quare ⁊c̄.

a ſpū ⁊ humorib⁹. ¶ Nota 3° ꝙ in corꝑe vltiate īfrigidato ē ſanguis ⁊ ſpūuꝫ magna defectio:⁊ tūc pono duas cōclōnes illi penultime corrn̄dentes. ¶ Pria abſolute loqn̄do de calefactōe ⁊ īfrigidatiōe qḋlibet corp⁹ viuēs facili⁹ calefit ꝙ̄ infrigidet̄.pꝫ per rōnes ſupra poſitas. ¶ Scḋa ꝯclō loquēdo de calefactōe ⁊ īfrigidatōe q̄ eſt cū reductōe ad ſanitatē:calefactū in vltio facili⁹ deducit̄ vel īfrigidat̄ ꝙ̄ īfrigidatū in vltio calefiat. Iſta ꝯclō pꝫ q: ad reducēdū īfrigidatū in vltio reqrit̄ regnātio ſpūuꝫ ⁊ ſanguis boni:⁊ adhuc reqrit̄ virt⁹ q̄ in īfridatiōe vltia eſt multū defecta. ⁊ hoc voluit Aui.in ꝯparatōe q̄ ponet̄ īfra. Sꝫ ī iſtis rōnibus hic poſitis vult ꝙ poſita paritate in cāis calefaciētib⁹ ⁊ īfrigidātib⁹ ad modū medicorū: q: approximent̄ medicine ꝯſimilis gradus ⁊ in ꝓportōali doſi:eque velociter fit calefactio corꝑis lapſi a tꝑato ꝑ frigidū cōi lapſu ſicut infrigidatio corꝑis lapſi a tꝑato per calidū cōi lapſu: q: nō multū in velocitate diſtāt:⁊ q: tꝑatuꝫ min⁹ acqrit de frigiditatis latitudine ad hoc vt ſit fridū ꝙ̄ de caliditate ad hoc vt ſit calm̄ cū latitudo tꝑamenti a medio verſus calm̄ fit maior ꝙ̄ a medio verſus frigidū. ¶ Et ꝑm viaꝫ meam attēde ꝙ ponēdo vt ego dico tēperamētū de ſcḋo modo correſpōdere tēperamēto ponderali: iſte regule multo facilius ſaluant̄ ⁊ ꝑcipue ponēdo ꝙ plus pōt corp⁹ tꝑatum labi ad frigidū ſtāte vita ꝙ̄ ad calidū vt ſupra dixi. Argumentoꝝ ſolutiones penes dicta ſunt faciles.

Pōt tn̄ ꝓbabilr̄ teneri iſta ꝯclō ꝙ tēpus calefaciendi ⁊ infrigidādi ſit equale:q: ⁊ ſi caliditas ſit frigiditatis actiuior: q: tn̄ ſubiectū qḋ debet īfrigidari eſt calefactuꝫ ⁊ per ꝯn̄s rarꝫ:⁊ qḋ dꝫ calefieri ē infrigidatū ⁊ ꝑ ꝯſequēs dēſuꝫ ⁊ ſpiſſuꝫ:⁊ merito huius diffor mitatis paſſorꝫ: ⁊ ſi agētia ſūt inequalis actiuitatis non repugnat quin poſſit ꝓuenire mot⁹ equalis velocitat̄: ⁊ hoc tanꝙ̄ ꝓbabile docuit preceptor meus magiſter Ceſar de landulphis.

Queritur cōſequenter vtruꝫ ſit maius ꝑiculuꝫ in īfridādo ꝙ̄ i calefaciēdo:

Negatiue arguit̄ ſic. Eque ledere pōt diſcraſia cal'a ſicut frīda: ergo nō maius ꝑiculuꝫ ē in īfrigidādo ꝙ̄ in calefaciēdo nec cꝫ. Cōſequētia nota:q: i vtrobiqꝫ ē timor eque mali finis. Et aſſūptū pꝫ q: per vtrūqꝫ illoꝝ pōt īfirmus ad morteꝫ deduci. ¶ Scḋo ſic: i illius approximatiōe timor ē maior ad queꝫ ſequit̄ lapſus magis difficili⁹ remouibilis vt plurimū. ſed ꝑ approximatiōeꝫ calidoꝝ ſequit̄ lapſus difficili⁹ remouibilis vt plurimū:ergo in calefaciēdo ē timor maior. Cōſequētia nota:⁊ aſſūptū pꝫ ꝓ maiori ⁊ a Gal.2° regi.acuto. cōmeto 37° ꝑꝫ meā quotatiōeꝫ. Et minor pꝫ:q: i calefaciēdo plurimū ſequit̄ lapſus ad calidū qui difficili⁹ remouet̄ ꝙ̄ ſibi equalis ad frigidū vt plurimū. Nā vt plurimū iſti lapſus nō ſunt facti niſi ī vltio mō caliditatis:ergo īfrigidare ē difficili⁹ cū fuerit tale ī vltimo ꝙ̄ frigidū calefacē vt i iſto.c. ¶ Cōfirmat̄ q: morbi frigidi ſūt min⁹ ꝑiculoſi calidis: vt dicit Ioānes damaſcen⁹ i affo. ¶ Tertio i illa alteratiōe ē timor maior ꝑ quā facili⁹ labit̄ corpus a ꝓprio tēperamento: ſed per caliditateꝫ corpus facilius a proprio tēꝑamēto labit̄:ergo ī calefaciēdo ē maior timor. Aſſūptū ꝓ maiori notū:⁊ minor ꝓbata ē in ꝑcedēti dubio. nā minus reſiſtit corp⁹ calefaciētib⁹ ꝙ̄ īfrigidātib⁹: ⁊ caliditas ē frigiditate actiuior vt dicit̄:ergo minor cā requirit̄ ad faciēdū corp⁹ tēꝑatum labi ad calidū ꝙ̄ ad frigidū. ¶ In oppoſitū ē Aui. ī lr̄a. ⁊ Gal. 7° terapē. ¶ Pro ſolutōe dubij nota ꝑrio ꝙ i calefaciēdo quātū oꝫ: aut īfrigidādo ꝙ̄tū oꝫ. ſ. quātū dictat artificialis rō multotiēs magnū facim⁹ nocumētū vt iuuamēta maiora ſequāt̄: ſicut qn̄ ꝓpter doloris vehemētiā ſtupefacim⁹: aut qn̄ ꝓpter humoꝝ feruorē ⁊ caliditatē aquā frigidā multam dam⁹ i potu: aut qn̄ ꝓpter ſpaſmū ꝓuocamus febrē: aut ꝑꝑ humores crudos digerēdos approximam⁹ calida vehemēter vſqꝫ ad cauteria: i quib⁹ oīb⁹ ⁊ ſi ſciam⁹ fieri notabilia nocumēta tamē eligim⁹ ita oꝑari ꝑꝑ iuuamētoꝝ ſequētiū ide maioritateꝫ. Qn̄qꝫ aūt calefaciēdo aut īfrigidādo quātū oꝫ nō ē timor neqꝫ magna facim⁹ nocumēta vt i paulatina alteratōe verſus tēꝑamētū. Ex quo pꝫ ꝙ mēs Aui. nō ē ꝙ ſit maior timor ī calefaciēdo frigidū cū ad tēperamentū reducit̄. In his eiꝫ cāib⁹ raro ꝯtingit cū ſolā alteratiōeꝫ querimus ꝙ admiſtram⁹ medicias mltū fortes. ſꝫ plurimū ē cū ꝓpter aliquā cāꝫ vltra ꝓpria tēꝑamēta alteram⁹ mēbra aūt multū ⁊ repēte. ¶ Nota 2° ꝙ magnitudo timoris ī talib⁹. ſ. calefaciētib⁹ ⁊ īfrigidātib⁹ admiſtrādis ē maxime reſpcū ꝑricipaliū mēbroꝝ aut nobilē habētiū oꝑationē vt habitū ē ī ꝑrecedēti.c. ¶ Tertio nota ꝙ ꝑ īfrigidatōꝫ ⁊ calefactionē nō oēs corꝑis oꝑatiōes equalr̄ ledunt̄: īmo quedā ſunt que ꝑ īfrigidationē ſupra tēꝑamētum multū ledunt̄: ⁊ ille eedē ꝑ ſuꝑcalefactiōeꝫ ſupra tēꝑamētū nō multū lederent̄ īmo forte fortificarent̄. hoc notatū ſumit̄ a Gal. 6° de accidēti ꝓꝑe finē ꝑ cartā. Naꝫ digeſtio ⁊ nutricatio ⁊ ſil'es ex frigido ledūtur multū. que tn̄ a calido ſupra tēꝑamētū nō tn̄ nimiū excedēte iuuant̄ vt ibi ad lr̄aꝫ dicit̄. ¶ Nota 4° ꝙ mēbroꝝ principaliū ⁊ ſibi ſeruiētiū oꝑatōes cōes q̄ vidētur eē īter nāles magis corpori toti vtiles plurimū idigent calore: ⁊ ꝑ paucū frigoris excedētis mēſurā ledunt̄ multū: vt digō ſtomaci ⁊ epatis ⁊ ſpūuꝫ gnātio ⁊ trāſmiſſio tā a corde ꝙ̄ a cerebro. ⁊ ille eedē per aliquātulū calorē ſupra tꝑamentū nō ita lederent̄: aut ꝑm ꝙ ego puto eē de mēte Gal. iuuant̄. ¶ Quīto nota ꝙ de calido lapſu ⁊ frigore cōiter tenet̄ ꝙ paruus lapſus ad frīdum eſt deterior ꝙ̄ ſibi ſimilis vel eq̄lis in gradu q̄litatū ad calidū lꝫ in magnis ſit ſec⁹ penes me. Ex iſtis pn̄t poni ꝯclōnes. ¶ Prima: nō ſemꝑ ī frigidādo aut calefaciēdo eſt timor. pꝫ cū illis ſolū ad tꝑamētū corp⁹ paulatiꝫ reducit̄ vt ī admiſtratōe exercitij tꝑati aut qetis tꝑate. ¶ Scḋa ꝯclō: oē corp⁹ tꝑatū ꝑ eq̄leꝫ tn̄ ⁊ ꝑuaꝫ ⁊ ꝑternāleꝫ infrīdationē plus ledit̄ ꝙ̄ per equaleꝫ calefactionē alijs paribus lederet̄. pꝫ q: labit̄ peiori lapſu. ¶ Tertia ꝯclō: per calefactionē principaliū mēbroꝝ vltra ꝓpria tꝑamēta ꝑuaꝫ ⁊ ꝑternāleꝫ minus totū corp⁹ ledit̄ ꝙ̄ ꝑ equaleꝫ īfrīdationeꝫ. pꝫ q: ꝑ infrigidationē ledunt̄ oꝑationes cōes: ⁊ per paruā calefactioneꝫ non ita ledunt̄. Modo ꝯſtat ꝙ deficiētib⁹ cōib⁹ oꝑatōib⁹ totū corpus alijs parib⁹ maiora nocumēta incurrit ꝙ̄ per ꝓprīaꝝ oꝑationū lapſuꝫ. ¶ Quarta ꝯclō: abſolute īfrigidādo plus timendū eſt ꝙ̄ ī calefaciēdo alijs parib⁹ operatione medici rōnabili exn̄te. pꝫ q: ī tali oꝑatiōe nō eſt vltimate calefaciēdū aut īfrigidādū ꝑm principalia mēbra in quoꝝ alteratiōib⁹ maxim⁹ ē timor. ſꝫ in eorū non vltīata īfrigidatiōe vel calefactiōe maior ē timor īfrigidādi cū inde maius totū corpus īcurrat nocumētū. Sequit̄ ergo cōcluſio. Dico ergo notāter ī nō vltimata infrigidatōe vl' calefactiōe q: vt alias dixi ī pria huius cōcluſiōe: aliqua ē īfrigidatio cū qua ſtat vita ⁊ cū ſibi equali calefactōe ſupra tēꝑamētū nō ſtaret vita. Ex his pꝫ ad qōeꝫ ſolutio ⁊ ſuppoſito ꝙ nō quilibet lapſus ad frigidū ſit deterior ꝙ̄ ſibi equalis ad calidū. pꝫ argumēta facta nō cōcludere ex alio capite: niſi ſic dicat̄ ꝙ ī ꝑricipalib⁹ mēbris quilibet lapſus ad frigidū ſit deterior ꝙ̄ ſibi equalis ad calidū: iō nō repugnares poſitiōi tue ⁊ ſolutio fieret clarior.

Dubitatur vtruꝫ tempus humectationis ſit maius tꝑe exiccatiōis:

⁊ videt̄ ꝙ nō q: morbi humidi ſubito fiūt ſicci aut paulatine: vt pꝫ ḋ ſpaſmo humido aut ſicco 2ª tertij. ¶ In oppoſitū ē Auic. hic. ¶ Pro dubio nota ꝑrio ꝙ vt ſupra dicit̄ ītelligimus de iſtis alterantib⁹ ī dictis cōꝑatiōib⁹ ꝓut nō ſunt nāles nec ſequūt̄ nāe ꝑn̄tiaꝫ: ita ꝙ humectari intelligit̄ fieri humidi⁹ qualitatiue ⁊ nō ꝑticipare materia humida. ¶ Scḋo nota ꝙ humiditas īter qualitates paſſiuas ē minus actiua cū magis hēat materiā paſſibilitatis ⁊ actiōes aliarū obtundat. ¶ Tertio nota ꝙ caliditas iuuat ad exiccāduꝫ ⁊ frīditas per accn̄s ad humectādū. ⁊ multo forti⁹ agit caliditas exiccādo ꝙ̄ frigiditas humectādo. ¶ Ex his pꝫ ꝙ cāis eq̄liter applicatis citius fit exiccatio ꝙ̄ humectatio. Tēp⁹ ergo exiccādi ē min⁹ mō dicto tꝑe humectādi. Argumētuꝫ autē ꝓbat ꝙ morbi humidi qui dicūtur humidi q: a mā humida pēdētes ſunt citi⁹ ꝯtigētes ꝙ̄ q dicūt̄ ſicci: q: ſequētes hūidi ſubſtātifici ꝯſumptiōeꝫ ḋ qb⁹ hic nō loquit̄.

Dubitatur ultimo utrum ſit timor equalis ī humectādo ⁊ ī exiccādo:

⁊ videt̄ ꝙ nō. Nā ſicut caliditas ē magis actiua ⁊ magis amica nāe ꝙ̄ frigiditas ita ſe hꝫ humiditas reſpectu ſiccitatis. ⁊ iō timor ī exiccādo dꝫ eē maior. ¶ Cōfirmat̄ q: morb⁹ ſicc⁹ tardi⁹ curat̄ cū curet̄ ꝑ humectātia que tardi⁹ cōplēt ſuam oꝑationē. ¶ In oppoſitū ē Aui. ¶ Rn̄det̄ ꝙ timor ē maior ī exiccando qualitatiue ꝙ̄ ī humectādo. ſꝫ per modicū exceſſuꝫ reſpectu ei⁹ ꝙ timor īfrigidādi excedit timorē calefaciēdi: ⁊ iō reſpectu īequalitatis illorū timorū iſti dicūt̄ equales q: valde modicū ſe excedētes.

Aduerte ꝙ duplex ē humectatio. ſ. ſubſtātifica qua humiditas ipſa ſubſtātialr̄ incorporat̄ rei que humefit. Alia ē hūectatio madefactiua penetrans in poros vel adherēs ſuꝑficiei rei hūectate abſqꝫ hoc qḋ ei ſubſtantialr̄ incorporet̄: ⁊ hec diſtictio ſuit ḋ mēte Aui. pria primi doctrina tertia.c.ij. Et vlteri⁹ aduerte ꝙ quādo dicit Aui. equalē eē timorē in humectādo ⁊ deſiccādo: intelligit̄ de humectatōe ⁊ deſiccatiōe nō qbuſcūqꝫ ſꝫ de modeſte ⁊ medicinalr̄ adhibitis ꝯtra diſcraſias corꝑis ⁊ quoad modum operis: ⁊ iuxta hec dic duo. ꝑm ꝙ equalis ē timor humectatōis ⁊ deſiccatōis moleſte ꝓueniētū a medicis quoad modū operis: ſꝫ maior ē timor ī imoderata deſiccatōe ꝙ̄ in ꝯſimili humectatiōe ceteris parib⁹. 2m ꝙ tꝑs humectatōis ſubſtantifice lōgius ē tēpore deſiccatiōis: lꝫ tꝑs humectatōis madefactiue ſit breuius tꝑe deſiccatōis.

Unaq̄qꝫ ꝑterea hūiditas ⁊ ſiccitas ꝯſeruat̄ ꝑꝑ ſuarū cāruꝫ ꝯfortatōeꝫ ⁊ ꝑmutat̄ ꝓpter cāꝝ ꝯrij ipſi⁹ fortitudinis augmētū. Et caliditas quidē fit fortior cauſis quaꝝ iam expleuim⁹ ſermoneꝫ: deinde per mūdificātia ⁊ ē ſuperfluitates expellere ⁊ repletionē ⁊ oppilationē aperire. deinde ex eo qḋ ipſaꝫ ꝯſeruat: ⁊ hec ē hūiditas tꝑata: frīditas vero fortior ex eo ꝙ ipſius ꝯfortat cās ⁊ ꝙ caliditatē ſuffocat: ⁊ ex eo ꝙ ipſaꝫ ſuperflue reſoluit: ⁊ ē ſiccitas ꝑm eſſentiā ⁊ caliditas ꝑm accidēs.

¶ Hic ponit tertiā regulā dicēs ꝙ vnaqueqꝫ hūiditas aut ſiccitas cōfortat̄ ad ꝯfortatiōeꝫ ſuaꝝ cārū ⁊ remouet̄ ꝑ augmētū fortitudis cārū ſui cōtrarij. ¶ Dicit 2° ꝙ caliditas fit fortior ꝑ cās dictas ſupra fen 2ª.c. de cāis calefaciētibus. 2° ꝑ mūdificatiua. 3° ꝑ apertiōes oppilationū. 4° ex illo quo caliditas cōſeruat̄ ⁊ hec ē humiditas tēꝑata. ¶ Dicit 3° ꝙ fit frigiditas fortior ꝑ cās īfrigidantes ⁊ ꝑ cās ſuffocātes caliditatē ⁊ ꝑ cās caliditatē reſoluētes. i. faciētes caliditatē paucā ꝓpter reſolutiōeꝫ. ⁊ de iſtis ē cā ſiccitas ꝑ ſe ⁊ caliditas per accidēs. ¶ Circa primū dictū attēde ꝙ res ē clara. nā qn̄ res aliq̄ ē apta ab aliquo depēdere ⁊ ſequi ad ipaꝫ tāquā ad cām ꝑ illud ē aptū cōfortari ⁊ intēdi. Et intellige hic ꝑ cōfortari fieri fortius ꝙ̄ eſſet ſi talis cāe applicatio nō fieret alijs parib⁹. ⁊ nō ītelligo abſolute ītēdi. Et cā ē q: humiditas radicalis pōt cōfortari ꝑ huiuſmodi cārū ſuarū cōfortationē. ſed intēdi non pōt vt oñdit̄ ꝑrio affo. illo affo. Digeſta medicari. ⁊ iſta 2ª pˢ ē clara: q: q̄litates remouēt̄ ꝑ applicationē ſui cōtrarij. ¶ Circa ſcḋm dictū nota ꝙ cārū calefaciētiū quedā ſunt ꝑ ſe calefaciētes. ⁊ de iſtis dictū ē fen 2ª loco allegato. ſed quedā calefaciūt per accidēs ⁊ q: iſte ſunt īfinitorū modoꝝ: Aui. nō poſuit oēs modos: ſꝫ illos qui magis contingūt ⁊ ſunt tres.

UVA. BHSC. IyR_006_1

tres. ¶ Primꝰ ē mūdificatio corꝑis: ⁊ dꝫ itelligi iſta mū dificatio ab hūoribꝰ frigidis. Nā illorū euacuatio ē cā vt corpꝰ calefiat: qꝛ calidi hūores magis redeūt ad caliditatē ⁊ facilꝰ ab illis alterant̄. Cōtingit ēt euacuatiōe calidorū humorū qñ ſuffocāt ſua quātitate corpꝰ calefacere per accñs. ¶ Scđs modus ē aꝑiendo oppilatiōes: ⁊ ꝑ hunc modū calefiūt mēbra ad que debēt mitti ſpūs ⁊ ſanguis: ſꝫ trāſmitti nō pōt ꝓꝑ oppilationē. Illa vero mēbra i qbꝰ claudit̄ ſanguis ⁊ ſpūs ꝓhibētur ꝑ oppilationē euentari. Multotiēs ēt per oppilatōem calefiūt mēbra. ⁊ hoc modo febres ⁊ putredo plerūqꝫ ꝯtingūt. ¶ Tertiꝰ modus eſt ꝑ ꝑñtiā ſubiecti caloris qđ ſubiectū ē hūiditas tēꝑata. nam hūiditas frigida aut nimia multotiēs ſuffocat. Et tu cōſidera etiā ꝙ alijs modis fortificat̄ caliditas ꝑ accidēs vt ex effuſiōe aque frigide ſuꝑ corpus ſanguineū vt i illo affo. ē aūt vbi i tethano. Itē cōſidera ꝙ ſemꝑ nō ex aꝑtiōe oppilationū corpus calefit imo qñqꝫ īfrigidat̄: vt pꝫ in cura effimere ex oppilatiōe. ⁊ iō hec cāe hic poſite nō ſoluꝫ per accidēs calefiūt vt ſemꝑ: ſed ſūt ille ꝑ quas vt plurimū fit talis calefactio ꝑ accidēs. ¶ Circa 3m dictū ē clarꝫ ꝙ frigitas fit fortior ꝑ cās ꝑ ſe īfrigidātes vel ſaltē ē apta fortificari lꝫ qñqꝫ cōtingit oppoſitū ꝑ accidēs. Sꝫ modi quibꝰ ꝑ accñs plerūqꝫ fortificat̄ ſunt ſuffocatio caloris a multo humido ꝑ oppilationē ⁊ reſolutionē multi humidi qđ ēꝰ caloris ſubiectū. Nā frigus fit forte ꝑ cās per quas calor extinguit̄. Calor autem extinguit̄ per ſe a cōtrario corrūpēte ⁊ ſuffocāte: vt dixi ſupra i. c. de etatibꝰ. ⁊ iō cāe hoc faciētes extinguūt calorē. Sunt aūt qñqꝫ calidi humores ⁊ cibi ſua nimia quātitate ſuffocātes: ⁊ iō per accñs extinguētes. Qñqꝫ aūt cāe alie calide nimiū reſoluētes. ¶ Nota ꝙ reſolutio ē cōuerſio humiditatis corpulēte i vaporē: ⁊ iō reſolutio ꝑ ſe fit a caliditate ⁊ nō a ſiccitate cū ſtet cauſas fortiter reſoluētes eē humidas. Qđ ergo dicit Aui. fieri a caliditate ꝑ accñs ⁊ a ſiccitate ꝑ ſe nō itelligat̄ de reſolutiōe ſꝫ de remiſſiōe caloris que ꝑ ſe ſequit̄ paucificatiōꝫ humidi ⁊ ſiccitatis cū nō poſſit actualis calor i mixto niſi i humido fundari. Siccitas ergo ē ꝑ ſe cā remiſſiua caloris ⁊ caliditas ꝑ accñs. ſiccitas eniꝫ ē imediata cā: ⁊ caliditas mediāte ſiccitate. vel ſiccitas ē diſpoſitio i ſubiecto mixto quā per ſe ſequit̄ diminutio caloris: ſꝫ caliditas non ſeqt̄ per ſe diminutionē caloris.

Cōtra ſētētiā Aui. hic ē auctoritas Galieni in ſcđo tegni ꝙ quedā a ſimilibꝰ ſue craſi facile mutāt̄ aut a ꝯtrarijs moderato vſu: ⁊ qꝛ ſimile additū ſuo ſimili facit ipſum furere: ſed credo ꝙ hoc itelligit̄ de ſimilibꝰ nō quideꝫ in gradu ſꝫ in qualitate que ſupexcedit actu vel virtute.

Qui aūt caliditatis ſuperfluitatē cū oppilatōibꝰ medicat̄ ſibi cauere dꝫ ab īfrigidatōe ſuperflua ne in ꝯuertēdo oppilationē in lapidē augmētuꝫ faciat ⁊ ne calide ꝯplōnis maliciā augmētet: imo paulatiꝫ primo medicari dꝫ cū eo qđ abſtergit. ⁊ ſi qđ īfrigidat ei ſuffecerit ſicut aqua ordei ⁊ ſuccus ſcariole erit cōueniens. ⁊ ſi nō ſuffecerit iſtud: tūc cuꝫ illo qđ tēꝑatū exiſtit. ꝙ ſi hoc nō ſuffecerit: tunc cum eo in quo ſubtilis exiſtit calor vꝫ ex hoc ſis ſollicitꝰ quoniā iuuamētū eius diaphoreſis īfrigidādo plus cōfert q̄ꝫ ſit nocumentū qđ facit ei calor qui ad extinguendū eſt facilis poſt aꝑtioneꝫ.

¶ In iſta ꝑte ponit cañ. magis ſpāles: ⁊ diuidit̄ in tres: Prio ponit quedā cañ. in modo cure qñ cū mala ꝯplōne calida ꝯiūgūtur res q̄dā ꝓter naturā. Scđs cañ. in modo cure qñ cū mala ꝯplōne eadē cōiungit̄ res nālis merito cuius variat̄ modus cure. 3o oñdit cañ. merito māe applicāde vel īſtrumēti cū quo fit curatio. 2a ibi: ampliꝰ ſcire debes. 3a ibi: ſcire quoqꝫ debes. Pria i duas. po ponit duos cañ. 2o remouet quedaꝫ dubia circa ſupradicta. ibi 2a: cōplōnē vero frigidā. pria i duas ſm duos cañ. ibi 2a: ⁊ eſt etiā. ¶ In pria parte dicit cū aliquis curat malā ꝯplōnē calidā cōiūctā oppilatōi dꝫ cauere a re nimiūꝫ īfrigidāte: ne cōuertēdo mām oppilāetm i lapidē. i. i rē durā ⁊ ne oppilatiōes faciāt augmentū. ¶ Scđo dꝫ cauere a re nimis calefaciēte ne augmētet malitiā cōplexiōis calide: ſed paulatim icipere ⁊ prio cū frigidis abſterſiuis ⁊ aꝑitiuis ſicut aqua ordei ⁊ succꝰ ſcariole. Qđ ſi nō ſuffecerit faciat cū tēꝑatis aꝑitiuis ſicut bugloſa. Qđ ſi ēt nō ſuffecerit faciat cū hñtibꝰ paruā caliditatē: nec in hoc timeat. nā iuuamētū qđ fit aꝑiēdo ē maius nocumēto calefactiōis pauce. Et facta aꝑtione ⁊ reſoluta mā illa facilr̄ ille ꝑuus calor remouet̄. fundat̄ aūt cañ. ſuꝑ regula poſita. c. vltimo huiꝰ tractatus. ¶ Cū due diſpōnes ꝯtrario mō indicātes ꝯiūgāt̄ attēdere oꝫ fortiori altera nō neglecta ⁊ icipe a ſecuriori. Cōſtat aūt ꝙ ſi inciperē a calefaciētibꝰ certe ſcio me facere nocumētū calefaciēdo: ⁊ neſcio certe ꝙ illđ potero euitare: ſꝫ cū po ꝑ aꝑitiua frīda ⁊ tꝑata ñ remouet̄ ad calā tꝑata ꝯuenire. ¶ Scđo nota ꝙ aꝑtio oppilatōuꝫ ē cā reſolutionis hūoris facilꝰ peccātis: ⁊ iō aꝑtio iuuat i mala ꝯplōne calā īfrīdādo ꝓ quāto facit reſolui materiā calefaciētem.

Nota ꝙ medicie aꝑitiue ⁊ medicine abſterſiue ſūt eiuſdē generis: differunt tñ penes magis ⁊ minus vt vlt Serapio in ſermone quarto. c. vj. ſui aggregati. Et Aui. ſcđo huiꝰ. c. iiij.

Et iō dixit Auenzoar i ſuo theiſir tractatu ix. c. xij. etiaꝫ ſi tu eſſes ſicut Eſculapius i ſciētia medici ne nō poteris diminuere vehemētiaꝫ febris putride cū re infrigidatiua ⁊ offendet ⁊c̄.

Et eſt etiā cum acutorū humorꝫ digō extinguēdi ſuperfluitatē ꝓhibet: licet quidā hominū ſint qui proteruiant ad hanc deſtruendā ſentētiaꝫ ⁊ ignorent ꝙ fortis extinctio deijcit virtutē ⁊ quātomagis i corporibꝰ que ab egritudine debilitata fuerūt licet aliquo directōis modo materiaꝫ rectificet qđ eſt cū poſt ipſaꝫ alie proueniūt egritudines aut ex malicia cōlpexionis ſimplicis aut ex materijs frigidis cōplexionis ꝯtrarij quā rectificauit.

¶ Hic ē ſcđs cañ. Et dicit Aui. ꝙ qñqꝫ digeſtio hūoruꝫ acutoruꝫ ꝓhibet extinguēdo ſuꝑfluitatē ⁊ dicit eē verum nō obſtāte ꝙ quidā ꝓterui dixerūt tenēdo oppoſitū. Cañ. aūt ꝓbat̄ duplr̄. ¶ Primo ſic: acutorꝫ hūorum digeſtio ꝓhibet oēꝫ admiſtratiōeꝫ rei plurimū deijciētis virtutē: ſꝫ fortis extinctio ē huiuſmodi p̄ſertiꝫ i corꝑe debilitato ꝑ alios morbos: igit̄ ⁊c̄. Maior pꝫ qꝛ digerēs ē virtꝰ ⁊ nō purus calor: ⁊ mior ē de ſe nota. Cū ergo virtꝰ ē dbilis ⁊ acuti humores indigēt digeſtiōe: cauebimꝰ a nimia extictiōe vt cū potu nimie aque frigide. ¶ Scđa rō ē qꝛ acutoruꝫ humorū digeſtio ꝓhibet oēm admiſtratiōeꝫ rei que ꝓducit ad egritudinē frigidā aut cū mā frigida aut ſine: ſꝫ multū fortis extinctio ē huiuſmodi: ergo ⁊c̄. ¶ Nota ergo circa iſtū cañ. vt dicit̄ pa quarti. c. de putridarū i gnāli ꝙ digeſtio acuti hūoris ſubtilis ē vt īfrigidet̄ ⁊ igroſſet̄: ⁊ hoc fit ab aqua frigida. Et iō multotiens ꝓpter humoris mali digeſtionē indigemꝰ forti extinctiōe. Sꝫ qñqꝫ corpꝰ ē ita diſpoſitū vt nō obſtāte ꝙ ſit humor acutꝰ digerēdus non debemꝰ dare aquā frigidā: vt ſi eēt aꝑa in viſceribꝰ aut cōplexio inata debilis ⁊ i caſibꝰ ibi narratis. Quidā vero nō cōſentiētes ꝙ nō ſemꝑ ē admiſtrāda fortis extictio qñ ſūt humores digerēdi acuti: dicūt tñ cū hoc ꝙ non ꝓhibetur exhibitio fortis extictiōis ꝓpter humores acuti digeſtionem: ſꝫ ꝓpter vitare alia nocumēta q̄ ſequūt̄. Ad hoc ergo remouēdū dixit Aui. ꝙ qñqꝫ digeſtio hūoris acuti ꝓhibet exhibitionē fortiter īfrigidantiū qꝛ indicat virtutem nō debilitari multū ⁊ nō debemꝰ multiplicare humores faciētes morbū cōtrariū qꝛ tūc virtꝰ ēt ē magis intēta i digerēdo eos: ergo idicatōe ſumpta a digeſtiōe acuti humoris ꝓhibemꝰ fortē extinctōeꝫ qñ. ſ. aliqđ iſtorū timeremꝰ. Nec valet argumētū: humoris acuti digeſtio idiget igroſſatiōe ⁊ īfrigidatiōe: ergo nō ꝓhibet fortē extictiōeꝫ. Nā qualēcūqꝫ īfrigidationē idicat: ſꝫ cū virtutis ꝯſtantia tāta vt meliꝰ q̄ꝫ prius digerat. ⁊ tu ſuꝑ iſto fundamēto fabrica ꝙ morbꝰ mālis acutus idicat cibi ꝓhibitionē ⁊ virtus debilis idicat cibi exhibitiōeꝫ: ſꝫ nō imediate ⁊ directe.

Gal. i ꝯmēto illiꝰ affo. prime ꝑticule. Que egerūtur ⁊c̄. dixit ꝙ extictio nō ſolū fit ex potu aque fride vel alijs potibꝰ fortis frigiditatis: ſed ēt ex eūatione vſqꝫ ad ſincopim.

Et Gal. ēt. xij. de ingenio ſanitatis dixit ꝙ in febre acuta virtute exiſtente forti ⁊ mā digeſta aq̄ frigida dari poteſt ⁊c̄.

Cōplōnē vero friaꝫ calefacere q̄ſi difficile ē cū iā eſt īfuſa ⁊ multū facile in pricipio ⁊ ad vltimū calefacere frigidū in pricipio rei ē facilius q̄ꝫ calm̄ in pricipio infrigidare: ſed calidūꝫ in fine īfrigidare licet ſit difficile: eſt tamē facilius q̄ꝫ frigidū i fine calefacere: quoniā ſuperflua friditas ē ipſa mors inati caloris aut ei ꝓpinqua.

¶ Remouet hic quedā dubia: ⁊ diuidit̄ in duas ſꝫ duo dubia. ibi 2a: ⁊ debes ſcire. Primū dubiū dictū eſt ſupra ꝙ tp̄s calefaciēdi ⁊ īfrīdādi ē vnū. ¶ Dubitat̄ ergo vtrū ſit tāta difficultas calefacere corpꝰ īfrigidatū ſicut calefactū īfrigidare: Et rñdens pono tres ꝯclōnes. ¶ Pria eſt: difficile ē calefacere ꝯplōneꝫ frigidā cū iaꝫ ē īfixa. i. facta: ſed facile ē calefacere frigidū cū ē in prino. ¶ Scđa ꝯclō: facilꝰ eſt calefacere frīdū in prino q̄ꝫ īfrigidare calm̄ in pricipio. ¶ Tertia ꝯclō: lꝫ ſit difficile īfrigidare calꝫ in fine: tñ ē facilꝰ ipꝫ īfrigidare q̄ꝫ calefacere frīdū in fine. Et cā ē qꝛ qñqꝫ ſuꝑflua friditas eſt ipſa mors inati caloris aut ei ꝓpinqua. Prima ergo ꝯclō nō hꝫ difficultatē cū mala ꝯplō frīda facta ſit magis habituata. Sꝫ dubiū preſertiꝫ ē in 2a ⁊ 3a quō ſaluent̄ ſi ponamꝰ oē viuēs a p̄dominio eſſe calm̄ ⁊ humidū vt pleriqꝫ volūt. Videt̄ eiꝫ hoc mō ꝙ oē viuēs quātūcūqꝫ frigidū in fine ſtāte vita eſt facilꝰ alterabile ad calm̄ q̄ꝫ ad frigidū. Nā minus reſiſtit calefaciētibꝰ q̄ꝫ īfrigidātibꝰ ꝑ ea q̄ dicta ſunt ſupra. Nā caliditas fortius reſiſtit q̄ꝫ friditas alijs paribꝰ: ⁊ eſt intēſior: ⁊ friditas ē magis inimica nāe: vnde magis eiꝰ inductōi reſiſtit. Cū ergo ſit difficilꝰ infrīdare calm̄ in fine q̄ꝫ calefacere frigidū in fine: ſequit̄ ꝙ difficilꝰ eſt īfrigidare calm̄ in fine q̄ꝫ calefacere frigidū i fine. Nec valet rō Dy. nec aliorꝫ modernorꝫ dicētiuꝫ ꝙ ꝓpter cordis dēſitatē ꝯſequēteꝫ friditatē ⁊ ꝓpter virtutis debilitatē q̄ eſt maior cū frīda ꝯplōne q̄ꝫ cuꝫ calā: ꝯtingit ꝙ frīduꝫ difficilꝰ calefit. Primo eiꝫ ex hoc ſequit̄ ꝙ nō oē corpꝰ viuēs humanū facilꝰ alterat̄ ad calꝫ q̄ꝫ ad frīduꝫ vel ꝙ corpꝰ qđ īfrigidat̄ minus ſit cāis reſiſtēs infrigidātibꝰ q̄ꝫ corpꝰ qđ calefit calefaciētibꝰ: cuiꝰ oppoſitū volūt oēs medici. ¶ Iō po dico ꝙ corꝑa humana q̄dā ſūt frīda reſpectu medij i vniuerſa ſubſtātia vt dixi i q̄one de eq̄li ad pōdus. ¶ Et dico 2o ꝙ plus pōt diſtare corpꝰ hūanū ꝑ friditatē a tꝑamento q̄ꝫ ꝑ caliditatē: vt dixi. c. de ꝯplōnibꝰ. ⁊ iō videmꝰ corꝑa debite recta i ſenectute labi ꝯtinue ad frīduꝫ. ¶ Dico 3o ꝙ Aui. per calefacere vel infrīdare nō itelligit abſolute calefacere vel īfriare: ſꝫ ita vt corpus calefactū talr̄ vel īfrigidatū ſit nālius diſpoſitū q̄ꝫ prius imo nāliter diſpoſitū quāuis forte prius preternaturalr̄ fuiſſet diſpoſitū. loquit̄ eiꝫ de illa calefactiōe ⁊ de īfrīdatiōe que ē cura morborꝫ. Et iō diſputatiue defendi pōt. prio quedā mēbra viuētia eē ita itēſe frigida ꝙ difficilꝰ ſit illa accidētalr̄ calefacere q̄ꝫ quocūqꝫ calida infrigidare. ſꝫ ego puto expiētiā vidiſſe ꝯtrariā. Nā vidi in

Dicit tñ Gal. x. de igenio ſanitatis. c. ix. ꝙ ſi paciens ethicā febrilē vehemēter infrīdet̄ prius q̄ꝫ veniat ad ꝑfectaꝫ ꝯſūptionē: ita vt ethicet̄ ethica ſenectutis qđ diutiꝰ viuit q̄ꝫ ſi ꝑmaneret i ethica febrili.

UVA. BHSC. IyR_006_1

quodā cū icurriſſet fluxū ſanguīs nariū ꝙ per horas tres
fere infudimꝰ aquā frigidā ſup caput capite ꝯtinue fumā-
te ⁊ vehemēter exiſtēte calido. nec memini ī aliquo mēbro
ēt mortuo tāto tp̄e īfuſam aquā feruentē quin poſtea eſſet
actu calidū. hoc dimittamus. diceret̄ forte ꝙ plus reſiſtit
friditas q̄ꝫ caliditas in illo rōne ſue intēſiōis. ¶ Scḋo ma
gis ad mētē Aui. rn̄dēdū vt dixi in. q. p̄cedēti ꝙ difficiliꝰ
ē fridū ī fine ita calefacere vt maneat ſanū q̄ꝫ īfridare cali
dū ita vt ſanū remaneat. Nā calefaciēdo fridūꝫ oꝫ vt fiat
ſpūuꝫ ⁊ ſanguīs gn̄atio qbꝰ īdiget virtꝰ q̄ iā ē ꝯfecta ī vltī
mo frido. In p̄rinº aūt frigidū calefacere ē leuiꝰ: nō q: fri-
gidū hꝫ plus caliditatis q̄ꝫ friditatis: ſꝫ q: virtꝰ magis in
tendit caliditatē q̄ꝫ friditatē q: minus eſt nāe rebellis. Et
addi pōt ꝙ ſtāte equali lapſu perfectōali a tp̄amēto minꝰ
gradualr̄ diſtat frigidū paꝝ lapſuꝫ q̄ꝫ aliqđ calīn: lꝫ ī mul
tuꝫ lapſo ſit ꝯ̄riuꝫ: vt oſtēdi ſupra. c. de ꝯplexionibus.

Et debes ſcire ꝙ īfrigidatio qn̄qꝫ ſiccitati ꝯiūgitur ⁊
qn̄qꝫ humiditati ⁊ qn̄qꝫ ab vtriſqꝫ ſeparat̄: verūtn̄ ſic
citas magis ſit mā̄ſiua cū frigiditate q̄ ſenuit ⁊ humidi-
tas ē magis adducēs frigiditatē que accidit.

¶ Hic remouet dubiū ſcḋꝫ: ⁊ ē de cōpatiōe qualitatuꝫ
actiuarū ⁊ paſſiuaꝝ ad inuicē ī cauſando ſe. Et diuidit̄ ī
tres. Prīo oñdit quō ſe hꝫ frigiditas in fieri ab aliq̄ paſſi-
uarū. 2º quō ſiccitas fiat a caliditate. 3º quō hūiditas fiat
a frigiditate. 2ª ibi: ⁊ iam quidē. ibi 3ª: ⁊ qn̄qꝫ ēt oēs. Pri-
ma a quibuſdā ītroducit̄ vt textꝰ iacet: ⁊ ita dicūt ibi tria.
¶ Primū ē ꝙ qn̄qꝫ frigiditas ꝯiungit̄ ſiccitati: q: qn̄qꝫ ē
mala ꝯpl̄o frigida ⁊ ſicca: ⁊ qn̄qꝫ cōiungitur hūiditati q: ē
aliqua mala cōpl̄o frigida ⁊ hūida: ⁊ qn̄qꝫ ſepat̄ ab illis q:
ē frigida tm̄. ¶ Scḋꝫ dictū ē ꝙ ſiccitas fit mā̄ſiua ꝑpter
frigiditatē ſenilem. i. cōfirmat̄ ⁊ fit ſiccitas maior frigidi-
tate ſenili. ¶ Tertiū dictū ē ꝙ frigiditas accn̄talis fit ab
humiditate: ⁊ hic modus expoſitiōis nō ē ſm̄ modū diui-
ſionis ſupra poſite īmo videt̄ ſupfluꝰ ⁊ diminutꝰ. ¶ Pri
mū eīm dictū iā fuit expoſitū ſupra pª huiꝰ. c. de ꝯpl̄oni-
bus. ¶ Scḋm dictū ē ſi ītelligat̄ ꝙ ſiccitas magis ſit mā
ſiua cū frigiditate ſenili. i. ſit magis fixa q: in ethica tertie
ſpēi cū caliditate ſiccitas ē ita mā̄ſiua ī calida ſicut frigidi-
tas in ſenectute. qđ ſi nō tantū duret hoc nō eſt q: ſiccitas
nō ſit mā̄ſiua: ſed q: vita deficit citius. ¶ Tertiū dictuꝫ
ēt nō ē verū ꝙ magis humiditas faciat frigiditatē accidē
talē. nā hūiditas ſtat cū frigiditate nāli magis q̄ꝫ ſiccitas
vt in ꝯpl̄one flegmatica nāliter tali ⁊ cōiter magis nāliter
ponit̄ ⁊ vite cōueniētior q̄ꝫ frigida ⁊ ſicca. p̄terea deficeret
Aui. dicēdo quō frigiditas fiat a ſiccitate magis. Iō aliȷ̄
hūc locū aliter ītroducūt vt Aui. velit quinqꝫ. ¶ Primū
ꝙ qn̄qꝫ ſiccitas eſt cā īfrigidatiōis ita ꝙ cū dicit cōiungit̄
ītelligit̄ in cauſanda. ¶ Scḋꝫ ē qn̄qꝫ ſiccitas cōiūgit̄ hu
miditati tāquā cāe. ¶ Tertiū ē ꝙ infrigidatio qn̄qꝫ eſt a
neutra iſtaꝝ ſed ꝑ frigiditatē ſolam. ¶ Quartū ē ꝙ lꝫ ita
ſit vt p̄dicit̄ tn̄ ſiccitas ē magis apta manere ⁊ facere fri-
giditatē ſimilē ſenili q: facit frigiditatē ꝑpter defectū hu-
midi ī quo calor dꝫ fundari ⁊ hoc mō ē frigiditas ſenilis.
¶ Quintū ē ꝙ humiditas ſit magis apta facere frigidita
tē accidētalem q̄ꝫ ſiccitas. Nā hūiditas quodāmō ſuffo-
cādo ⁊ ꝓhibēdo digeſtionē eſt cā frigiditatis accidētalis.
¶ Ex quibꝰ pꝫ ꝙ frigiditas cōſequēs ſiccitatē difficiliꝰ
remouet̄ vtplurimū q̄ꝫ ꝯſequēs hūiditatē. nā iſta nō re-
mouet̄ niſi ꝑ regeneratiōeꝫ hūidi nālis: ⁊ ſcḋa ꝑ euacua-
tionē hūoris accn̄talis que euacuatio ē valde facilior.

Et iam quidem omnes caloris cauſe cum ſupfluunt
in exiccando iuuant.

¶ Hic docet qūo ſiccitas fit a caliditate: ⁊ dicit ꝙ oēs
cāe caloris qn̄ ſuperfluūt iuuāt in exiccādo: vbi nota ꝙ ca
liditatis ꝑ ſe ē calefacere. ꝙ ergo exiccet eſt per accn̄s pro
quāto reſoluit humiditatē corpulētā. Modo caliditas cū
nō ſit ſupflua in digerēdo multiplicat hūiditates attrahē
do ad locuꝫ ⁊ diffundit eas in totū: vn̄ ⁊ calida balnea po-
nunt̄ in numero īpinguātiū. Nō ergo caliditas ſemꝑ exic
cat cū aliqn̄ humectet: ſed ſemper cū ſuperfluit exiccat q:
nō tam bene digerit: ⁊ plus reſoluit q̄ꝫ attrahat.

Et quādoqꝫ etiā omēs frigiditatis cauſe cuꝫ ſuper-
flue fuerint in humectādo iuuant.

¶ Hic oſtēdit qūo humiditas fit a friditate: ⁊ diuidit̄ in
duas. Primo facit hoc. 2º incidētalr̄ ponit modos quoſ-
daꝫ vehemētis humectatōis. 2ª ibi: ⁊ nulla quidē. ¶ Di-
cit pº ꝙ qn̄qꝫ oēs cauſe ſupflue friditatis iuuāt in hume-
ctādo. vbi nota ꝙ lꝫ cāe ſupflue caloris ſemꝑ exiccent: tn̄
nō oꝫ ꝙ oēs cauſe ſupflue friditatis humectēt ſemꝑ. naꝫ
quibuſdā modis humectāt ⁊ quibuſdā exiccāt. Et hinc ē
ꝙ dixit qn̄qꝫ qđ nō dixit in cāis calidis ſupfluis ī exiccā-
do nimiū: ergo frigus hūectat ꝓhibēdo reſolutōeꝫ ⁊ mul
tiplicādo indigeſtionē: ſꝫ qn̄qꝫ intantū ꝓhibet aut minuit
digōneꝫ vt exiccat. vn̄ dimittens exercitiuꝫ qn̄qꝫ cadit in
ethicā: ſimilr̄ exp̄rimēdo humidū ꝑpter ſui fortitudinem
exiccat. Tertio ꝓhibendo attractionē ad mēbra. ideo non
ſemper friditas humectat cū ēt exiccet. Quarto nimiū in-
durando in lapidoſitatē cōuertit cōdenſando. Frigiditas

Vult dicere ꝙ cāe īfri-
gidātes aliqn̄ humectant
debilitando digeſtiuā vn̄
multiplicātur ſupfluitates
crude: etiam aliqn̄ exiccāt
vt qn̄ ex multo frigido ex
p̄rimit̄ hūiduꝫ: hec Gētil̄
⁊ clarius q̄ꝫ hic magiſter

eniꝫ fortis qn̄qꝫ exiccat: ſed infrigidādo non ſuperfluit.

Et nulla quidē res ad hoc tantū ꝑuenit quātū ocioſi
tas ⁊ aſſidua balneatio ē q̄ facilis in tina. Et nos qui-
dem te fecimus ſcire hoc ī eo ꝙ premiſſum eſt. vinū pre-
terea tēperate bibituꝫ in humectādo eſt forte.

¶ Narrat hic quaſdā cās humiditatis. ¶ Et dicit p̄rīo
ꝙ nulla ē cā que humectet tantū q̄ꝫtum quies: ocioſitas:
balneatio aſſidua facilis ī tina. ⁊ hoc fuit dictum ſupra 2ª
huiꝰ de balneo. ¶ Dicit 2º ꝙ bibere vinū tēꝑatū ē forte ī
hūectādo. Pōt ergo hoc ītelligi duobꝰ modis. Uno mō
ꝙ nulla res tantū humectat q̄ꝫtū aggregatū ex his. ſ. qe-
te ⁊ balneo facili ī tina. Et pōt ītelligi primum ſigillatiꝫ ꝙ
nulla res tātū hūectet vt quies. Et vtrū ſic ītelligat̄? cer-
tū ē ꝙ nō. ideo iſta maxime humectāt q: per ſe humectāt
vt īnuit Dy. Nā quies nō humectat ꝑ ſe ſꝫ ꝓ quāto ꝓhi-
bet̄ per eā reſolutio facta ꝑ motū vel que fieret ex calore ī-
tēſo. ¶ Balneū aūt aque dulcis nō multo tp̄e durās ⁊ ī
hora cū ſuis oportunis circūſtātijs que dicūt̄ 7º terapen.
⁊ pª quarti. c. de cura ethice. ꝑ ſe humectat q: aqua ꝑ ſe ē
humectatiua: ⁊ q: diffundit nutrimētū ꝑ corpus. Uia aūt
ad ſciēdū ꝙ iſta ſint maxīe humectatiua fuit expiētia āti-
quorū q: nulla ratio ꝓbandi hoc ſufficiēs afferri poſſet ad
hoc ſine experientia.

Licꝫ ocioſitas fa
ciat ad humectatōeꝫ
vt dicit Auic. hic in
lr̄a: Qn̄qꝫ tamē ꝯſic
cat ⁊ ad ethicā per-
ducit: vt idē vult ter-
tia primi doctrina ſe
cūda. c. j.

Dubitatur vtrum uinū ſit humidū

vel ſiccū? Et videt̄ ꝙ ſit ſiccū. Prīo auctoritate Iſach in
de dietis ꝑticularibꝰ qui dicit ꝙ vinū ē calidū ⁊ ſiccuꝫ. ⁊
rōne ꝓbat̄. Uinū ī vulneribꝰ ſimplicibꝰ applicatū exteriꝰ
ē cōueniēs: ergo exiccat. Patet ꝙ talia indigēt exiccatōe
⁊ nō humectatiōe. Aſſumptū ē Gal. 3º de ingenio ſanita
tis. Cōfirmat̄: vinum ī fine paleſis ē cōueniēs ⁊ nō niſi vt
exiccat ⁊ ꝯſumit mās: ergo ⁊c̄. Aſſūptū ē Aui. 2ª tertij. c.
de cura paleſis. ¶ Tertio vinū ē acuti ſaporis p̄ſertiꝫ vi-
noſum: ergo ē calidū ⁊ ſiccū. ¶ Quarto vinū facit īcurre-
re egritudīes colericas calidas ⁊ ſiccas: vt freneſiꝫ febres
acutas heriſipilā ⁊c̄. ¶ Quinto vinū curat appetitū cani-
nū ꝑueniētē ab humoribꝰ frigidis ī ſtomaco: vt affo. 2º il
lo affo. Potꝰ indigētiā ſoluit. ¶ In cōtrariū arguit̄ ſic:
vinū ē plurimi nutrimēti ergo ē hūidū. Aſſumptū ē Gal.
⁊ fere oīuꝫ medicoꝝ. ⁊ cōſequētia tenet q: humidiora ſūt
magis nutritiua aliȷ̄s paribꝰ: vt 2º affo. illo affo. ⁊ ꝯmēto.
Facilius ē repleri potu q̄ꝫ cibo. Preterea vſus vini ducit
ad egritudīes humidas vt paraleſim ⁊ apoplexiā: ergo eſt
humidū. ⁊ videt̄ hoc Aui. inuere hic. ¶ Rn̄dēdo ad hāc
q. noto pº vt pōt colligi a Gal. 2ª affo. cōmēto illo allega-
to. Uina nō oīa ſunt eiuſdē ꝯpl̄onis reſpcū tēꝑamēti. naꝫ
quedā ſunt frigida aquea ī colore: ſapore: ⁊ mō ſubſtantie
aque penes ſimilia. quedaꝫ ſunt calida acuta vt illa q̄ ſūt
aromatica. quedā medio mō ſe hn̄t. Itē de mediocribꝰ in
caliditate: quedā ſunt ſine ſtipticitate ⁊ quedā ſunt ſtipti-
ca ī ſapore. ⁊ iō q̄dā magis ad ſiccū declinant: quedā vero
minꝰ. Et iō in. q. nō poſſꝫ rn̄ſio gn̄alis dari niſi ad termi-
natā mām nos limitemꝰ. Nota 2º ꝙ nō ſolū vinū ſꝫ ēt
multe alie medicine alio mō opant̄ qn̄ ſumūt̄ īteriꝰ. ⁊ alio
mō dū exteriꝰ applicant̄: vt cepe alleū ⁊ multa talia ⁊ ſili
vinū. ¶ Nota 3º ꝙ vinū ⁊ ſpāliter dū ī nutrimētū cōuer
tit̄ dat̄ pº q: ꝯuertit̄ ī ſanguinē qui ē calidus ⁊ humidus
reſpcū cutis. Et iō quēadmodū iuxta mētē Aui. oē nutri-
mētū ad ſanguinē cōuerſuꝫ calefacit: ita oē tale cū cōuer-
ſum ē ad ſanguinē humectat. Nec rō ē ad vnū horū ꝓbā
dū quin ꝑ idē reliquū ꝓbet̄. Nam ſicut lactuca qn̄ ē facta
ſanguis ⁊ ſua frigiditate ſpoliata ē ⁊ ad ſanguinē cōuerſa
recipit caliditatē. Ita lētes cū ꝯuerſe ſunt ad ſanguinē ſua
ſiccitate ſe ſpoliauerūt ⁊ in ſanguinē cōuerſe receperūt hu
miditatē. ¶ Nota 4º ꝙ res que dicūtur calide vel frigi-
de medicinalr̄ dicūtur tales merito qualitatū q̄ calefaciūt
ꝑ ſe: vel īfrigidāt: vel apte ſunt hoc facere cū ſunt reducte
ad actū mō ſupradicto. Nā purū calidū cū tēꝑamēto paſ
ſiuorū exiccat reſoluēdo nō per ſe intēdēdo ſiccitatē ſꝫ ca-
liditatē. Iſtis ita notatis ſit p̄ria cōcl̄o. ¶ Nō oē vinū ap
plicatū ī vulneribꝰ ē conueniēs ⁊ exiccatiuū. Pꝫ de vino
aqueo: hoc eniꝫ eſt aquee nāe: vt vult Gal. loco allegato.
¶ Secūda cōclusio: vinū vinoſuꝫ ſtipticitate participās
exterius applicatū exiccat. hoc ē ꝺ mēte Gal. 3º de inge-
nio. ¶ Tertia cōcluſio: dabile ē vinū qđ ē in ſiccitate ⁊ hu
miditate extra applicatū n̄ alteratiuū ꝑ ſe extra tꝑamētū.
Pꝫ ex quo ē dabile humectatiuū ⁊ exiccatiuū: ergo n̄ re-
pugnat dari medio mō ſe habēs. ¶ Quarta cōcl̄o: oē vi-
nū puꝝ mediocris ſubſtātie datū ī forma nutrimēti ē mul
tū hūectatiuū. Pꝫ q: oē tale ē plurimi nutrimēti. ¶ Qui
ta ꝯcl̄o: nō ꝑpter hoc vinū nutritiuū ē dicēdū humidum
medicialr̄ vel q̄litatiue q: ī ſanguinē ē cōuertibile. Pꝫ q:
res extra applicata nō dr̄ humectatiua ⁊ opatiua a quali-
tate q: poſſit cōuerti in ſanguinē hūidū aut calidū. nā tūc
lactuca eēt calida ⁊ cucurbita cū in ſanguinē poſſent ꝯuer
ti qui calefacit. ¶ Sexta ꝯcluſio: vinoꝝ īterius ſumptoꝝ
quoddā ē aptū exiccare: quoddā humectare: quoddā me-
dio mō ſe habere. Pꝫ vt ꝺ exteriꝰ applicatis. ¶ Septīa
ꝯcl̄o: vina mediocria parū ī humiditate ⁊ ſiccitate a tēpa-
mēto

Hoc idē dubiūꝫ
mouet̄ ēt a Gentili ī
loco proprio: vide ſi
placet.

Pro hac mā de
ſpeciebꝰ vini recur-
re ad Gal. in tertio
regiminis acutoꝝ ⁊
maxime in cōmento
primo.

UVA. BHSC. IyR_006_1

ēmto diſtāt cōplōnaliter. Pꝫ ex quo iueniūť hūida ⁊ ſicca. illa ſunt dicēda mediocria que ſunt tꝑamēto vicina. pꝫ ēt cōclō q꞉ cōplō tꝑata vel tēꝑamēto vicina ē cā nutrimēti vini. ¶ Octaua cōclō: vinū ſumptū cū aqua ē vehemēter humectatiuū q̄litatiue. Pꝫ q꞉ aqua facit vinū penetrare: vñ meli⁹ pōt humectare. ⁊ hoc vult Aui. hic. ⁊ ideo tēꝑatū dixit. ¶ Per hoc eiꝫ rñdeť ad argumēta. Nā qui dixerūt vinū ſicce cōplōnis dixerūt de vino acuto qđ maxime ē vinoſuꝫ qđ ſicce ē cōplōnis quāuis exhibitū ī forma nutrimēti multū hūectet. Nō eim humectat dū ꝑmanet ſub ꝓpria forma actuatū ſꝫ exiccat. hūectat aūt poſtq̄ꝫ ī ſanguinē ē ꝯuerſuꝫ. Illi vero qui dicūt vinū eē humidū aut tēꝑatū ꝓ ꝑte veꝝ dicūt cum aliqua ſint talia ex nimia q̄ꝫtitate exhibita. Intelligunt qđ ſit ꝓ ꝑte mixtū aque: q꞉ nō ſoluꝫ ſanguis ex eo genit⁹ penetrat in corpus ſꝫ multa aquoſa ſuꝑfluitas ex eo ſimul penetrat que ē frigida: ideo īfrigidat ⁊ hūectat. Etiā vinoſuꝫ vinū hoc mō nocet neruis. ⁊ hūidū generat egritudīes hūidas ī cerebro ⁊ nucha venis ⁊ neruis. hec oīa nō fiūt dū vinū ē actuatuꝫ: ſed qñ ꝓpriā ꝑdidit cōplōnē per quā prius operabať.

Ampli⁹ ſcire dbes ꝙ cū ſenex īfridatōe īdiget ⁊ humectatōe nō ſufficit ad hoc illđ qđ ipꝫ ad eq̄litatē reducit: īmo qđ ipꝫ trāſire facit ad ꝯplōnē fridā ⁊ hūidā q̄ ei debeť: quoniā ipſa lꝫ ſit accñtalis: eſt tñ ei q̄ſi naturalis.

¶ Hic ponit cañ. ī cura cōplōnū darticulatū ad egritudinē cōplōnalē cuꝫ qua cōiungiť nālis res coadiuuās aut ānexa nāli. Et dicit ꝙ tu dbes ſcire ꝙ qñ ſenex indiget ī frigidatiōe ⁊ hūectatiōe nō ſufficit ad hoc illud qđ reducit ipm ad cōplōnē tēꝑatā equalē: īmo requiriť illud qđ facit ipm trāſire ad cōplōnē fridaꝫ ⁊ humidā que ei debeť. Et rō ē q꞉ quāuis humiditas ſit accidētalis ei: eſt tñ ei tāquā cōnaturalis. ¶ Ubi nota p̊ ꝙ ꝑ equalitatē intelligit hic Aui. optimā equalitatē gradualē que ē illa quā hꝫ hō in iuuētute. Mō conſtat ꝙ q꞉ talis cōplō ita gradualr̄ calida nō eēt cōueniēs ſeni vt diſputaui ſupra. c. de etatibus. Non eiꝫ eēt curat⁹ ſenex ad hāc reduct⁹: ſꝫ oꝫ vt ad maiorē gradū ducať frigiditatis q꞉ illa ē ſeni nālis. ¶ Secūdo nota ꝙ Cōci. dīa 174ª ⁊ Dy. ex hoc loco ipꝫ ſeq̄ns dicūt ꝙ ſene ⁊ iuuene febriētibus frigidiora cōueniūt ſeni q̄ꝫ iuueni. Et ſiquis notat modū loquēdi Cōci. videť velle ꝙ fortiora frigida ſunt merito cōplōnis ſeni q̄ꝫ iuueni applicāda. Dicūt 2° ꝙ merito virtutis: frigidiora nō ſunt applicāda ſeni q̄ꝫ iuueni. ¶ Mihi aut videť p̊ ꝙ Aui. hic ⁊ Gal. 8° terapē. hec nō volūt. dicūt eniꝫ ꝙ frigidiora aut fortia frigida debēt applicari ſeni q̄ꝫ iuueni. īmo nec Aui. hoc dicit ꝙ maiori īfrigidatiōe idiget ſicut ſupra dixi de eo qui ē frigide cōplōnis ⁊ calefact⁹ accñtalr̄. ſed tantū dicit ꝙ debꝫ duci ad maiorē gradū frigiditatis. Et iſto mō ē veꝝ ſi curari dꝫ: nec ī hoc repugnat virt⁹ que ad hoc cōſentit ꝙ ad tātā frigiditatē ducať: īmo indicat cū ꝑ illud fortificať ſi debite fiat. ¶ Aliud eiꝫ eſt ad maioris frigiditatis gradū deduci: ⁊ aliud plus īfrigidari: ⁊ aliud a fortioribus infrīdantib⁹ īfrīdari vt pōt colligi ex his que diſputaui ſupra. c. p̊ ī. q. vtrū colerico ⁊ flegmatico equalr̄ febrientibus ⁊c̄. Ex qua q̄ōne collige tu cū his que dico hic verā ſolutiōeꝫ. ¶ Aliud dubiū hic moueri ſolitū: vtrum dcrepito ⁊ iuueni equalr̄ febriētib⁹ quo ad tactū maiori īfrigidatiōe īdigeant decrepiti q̄ꝫ iuuenes? ¶ Rñdetur ꝙ iſtis equalr̄ febriētib⁹ quo ad tactū maiori infrīdatiōe indiget decrepitus q̄ꝫ iuuenis. ſꝫ min⁹ fortia īfrigidātia ſūt neceſſaria ī decrepito q̄ꝫ ſint ī iuuene. ⁊ tñ neceſſariū ē maiorib⁹ ⁊ ītēſiorib⁹ frigidis vti in cōplemēto cure decrepiti q̄ꝫ iuuenis. Et hoc vltimū eſt verū: ſiue equalr̄ quo ad tactū: ſiue reſpcū ꝓprij tꝑamēti febricitent. Sꝫ de humiditate decrepitorū ē alius ſermo. vnde nota hic Marſi. ſuꝑ hoc loco dicere ꝙ hūiditatē decrepitoꝝ quā hñt a multo flegmate: iō dici accñtalē q꞉ facta ē a catarris ⁊ flegmatib⁹ ēt nō ē bona: īmo ipediēs ī opatiōib⁹ nālib⁹ exercēdis. Et huic ſile dicūt multi de cōplōne pulmonis ſm quā dr̄ humidus: quā Aui. pª primi. c. de cōplōnib⁹ mēbrorū dicit accñtalē. Ego aūt nō puto eē verū hoc. nā ſi iſta cōplō ſenilis humida ꝑꝑ flegmata eēt īpediēs nō adiuuās ī opatiōe: tūc ſenex curādus nō eēt cū reducētibus ad illā: īmo eēt abijciēda. qđ ē falſum. Et ꝯtra Aui. hic. Preterea ī ſenectute debite regēda admiſtranť illa q̄ huiuſmōi faciunt humiditatē: vt 3ª primi de regie ſenū vt lectus mollis: qes ⁊ vinū. ⁊ Gal. cōmēdat lactucas cū aromatib⁹ q꞉ cōferebat ſibi hūiditas quā lactuca facit. Diciť ergo illa cā accidētalis q꞉ nō exñs in mēbro merito ꝓportiōis elōꝝ cōponētiū ipm ītrinſece aut merito ſpūs ⁊ ſanguis ī ipo que ſunt virtutis īſtra: tñ ē quaſi nālis: q꞉ facta ex nāli ⁊ cōuenieti actione caloris nālis nāliſſime agētis. Et q꞉ ꝯueniēs ē ꝓ opatiōe ⁊ cōſeruatiōe vite ſenis: ideo ad iſtam reducēdi ſunt ſenes.

Dicit Gentilis in hoc loco ꝙ duplex ē equalitas abſoluta ſcꝫ que debeť corpori tꝑato: ⁊ alia īdiuidualis pariū corporū ſm quā dicim⁹ ꝙ alia ē equalitas corporis colerici: alia melācolici ⁊ alia ſenis: ⁊ iuxta hoc dicem⁹ ꝙ cū ſenex erit ī illo gradu frigiditatis ⁊ humiditatis ſibi cōueniēti vltra tēperamentū abſolutū: tunc erit ductus ad equalitatē ⁊ ſuā naturalē ꝯplōnē quare ⁊c̄.

Hanc mām diffuſe ꝑtractat Auerrois ſeptio colliget. c. ij.

Scire quoqꝫ debes ꝙ ſepe ē nobis neceſſariū ī permutādo ꝯplexionē dare illud qđ huiuſmodi ꝯfortat cōplexionē queadmodū ē nobis neceſſariū dare acetū cū medicis calidis alicui mēbro: iō vt ipſaꝝ penetrēt virtutes: ⁊ ſicut ē nobis neceſſariū dare crocū cū medicis īfrigidantib⁹ cor ꝓpterea vt eas ad ipſuꝫ ferat.

¶ Hic ponit cañ. ꝑticulares rōne medicie applicāde vel inſtri curatiui: ⁊ diuidiť ī duas partes ſicut ſūt duo cañ. ibi 2ª: ⁊ multotiēs quidē. ¶ Dicit p̊ ꝙ tu debes ſcire ꝙ ī permutādo ꝯplōneꝫ multotiēs eſt nobis neceſſariū. i. vtile ꝑmiſcere illa q̄ illaꝫ ꝯplōnem quā volum⁹ ꝑmutare ſeu remouere augmētāt. i. ſunt apta augere: ſꝫ admiſcenť cuꝫ ꝯ̄rio dicte ꝯplōni. Et ponit duo exª. Unū eſt ꝙ multotiēs ꝑmiſcem⁹ acetū cū medicis calidis vt faciat medicias penetrare. Scđꝫ exᵐ eſt ꝙ in medicis īfridīdātib⁹ cor ꝑmiſcem⁹ crocū: q꞉ hꝫ virtutē ducēdi ad cor. ¶ Ubi nota ꝙ hic poniť cañ. ī quo oſtēdiť ꝙ ꝑꝑ ducere virtutē medicie ad vnū mēbrū qñqꝫ ꝑmiſcem⁹ medicinā in ꝯplōne ꝯ̄riam ei ꝯplōni quā itendim⁹ ītroducere. Medicine aūt huiuſmodi ſunt duoꝝ modoꝝ. quedā eniꝫ hoc faciūt per virtuteꝫ indifferēter reſpicientē oē mēbruꝫ vt acetū qđ virtutē medicine ſecū ꝯiuncte facit penetrare ꝓpter ſui ſubtilitateꝫ q̄ equalr̄ reſpicit oīa mēbra. quedā aūt medicie faciunt hoc ꝑ virtutē a ꝓprietate reſpicientē mēbrū determinatū vt croc⁹ reſpicit cor. Et iō Aui. duo exª ponit. ¶ Sꝫ tu diceres cū multe medicie ſint medicine penetratiue calide ⁊ ſubtiles: quare nō ita ꝑmiſcem⁹ illas cū volum⁹ penetratiōnē ⁊ curā ꝯplōnis fride ſicut ꝑmiſcem⁹ acetuꝫ. Similr̄ cū ſint medicine cordiales fride vt docet Aui. ī de virib⁹ cordis. ⁊ 12° tertij. quare nō ita ꝑmiſcem⁹ illas cū volum⁹ penetratōeꝫ ⁊ curā male cōplōnis calide cordis ſicut crocuꝫ. ¶ Ad pᵐ dicit Dy. ꝙ hoc ē q꞉ acetū eſt magis penetratiuū. ⁊ hoc ego nō puto veꝝ ꝙ oī re acetū ſit magis penetratiuū: vel 2° ꝙ hoc ē vt acetū remittat caliditatē aliarū mediciaꝝ. ⁊ iſto mō ēt nō ē putādū q꞉ poſſent poni alie magis frigide. Meli⁹ ergo ē vt puto ⁊ veri⁹ ꝙ ſi intantū volum⁹ addere ī calidis vt fiat penetratio illa calā: nimiū alterarēt loca ītermedia per q̄ deberet fieri trāſitus ad loca ſuꝑ que īmediate ponunť: ne ergo hoc nocumētuꝫ fiat: potius poniť acetuꝫ qđ multū eſt penetratiuū ⁊ nō eſt caliduꝫ. ¶ Ad 2ᵐ diciť ꝙ frigida non ſunt ſic penetrātia vt crocus: quare poniť ēt ꝓpter alia iuuamēta q̄ ſunt in croco inter q̄ eſt ſpūs cōfortatio: vt vndecima tertij.

Nota ꝙ in ſciatico dolore qui accidit in iūctura anche que ē maxime ꝓfūditatis frequēter admiſtramus cū medicamine acetū: vt id ad intima illi⁹ iuncture faciat penetrare: ⁊ đ hoc meminit Auic. xxij. tertij tractatu. ij. c. x. ⁊ ēt in eodē tractatu. c. xxvj. vbi ponit medicamia ī quib⁹ igrediť acetū quare ⁊c̄.

Et multotiēs quidē ē medicina vehemētioris operatōis ī permutādo ꝯplōnē: ſꝫ ꝓpter ſui ſubtilitatē nō permanet donec ſuā perficiat opatiōeꝫ: eſt ergo nobis neceſſariū ei aliquid admiſcere qđ ipſam īſpiſſet ⁊ retineat: lꝫ ex ea ſue operatōis ꝓueniat ꝯtrariū ſicut balſamo admiſcēs ceraꝫ ⁊ reliqua ad hoc vt ipſuꝫ tāto tēpore retineatur in quo ſuā perficiat operatōeꝫ.

¶ Ponit 2ᵐ cañ. dicēs ꝙ multotiēs eſt medicina vehemētis operatōis ſꝫ noſtrā ītentionē: ſed eſt tā ſubtilis ſubſtātie ꝙ cito reſolviť vt oleū balſami qđ multū eſt ſubtiliatiuū ſꝫ cito reſoluiť. In hoc ergo caſu oꝫ iteꝝ ꝑmiſcere aliquid huic medicie qđ ꝓhibeat ei⁹ reſolutiōeꝫ quāuis tale qđ miſceť ſit quodāmodo ꝯ̄riuꝫ opatiuū ad illud qđ operať balſamū: ſicut verbigrā permiſcem⁹ cū balſamo cerā ad hoc vt tāto tꝑe retineať vt ſuaꝫ perficiat operationeꝫ. Et tu ex hoc cañ. vide cauſam quare adminiſtranť multe medicie in forma ceroti. Nō eiꝫ ob aliud calida reſolutiua in hac forma adminiſtranť niſi vt diu ſtet medicia loco applicata ſine ſui diſſolutōe. ⁊ hoc de iſto caplō.

De balſamo dicit Aui. ſcđo canonis. c. ꝓprio ꝙ mūdificat vlcera ⁊ ꝓprie cū ireos: ⁊ extrahit fracturas oſſiuꝫ: ⁊ abſtergit pānuꝫ oculi: ſed cum ſimplr̄ exhibeť ⁊ ſine aliqua alia re: cito euaneſcit ꝑꝑ ſubtilitatē ſue ſubſtātie: ideo dixit Auic. hic ꝙ ſibi modicuꝫ cere admiſceať q̄ ipm retineat circa partē leſam donec ꝯpleuerit opus qđ queritur.

Caᵐ 3ᵐ ad ſciēduꝫ qualr̄ ⁊ qñ oportet euacuari.

r

Es q̄ dmōſtrāt rectitudinē iudicij ī eūando ſūt. x. replō ⁊ virtus ⁊ cōplō ⁊ accñtia ꝯueniētia ſicut ſi ꝯtigeret ꝙ naturaꝫ ſoluere vellemus: deide accideret vētris ſolutio: quoniā vētreꝫ ſoluere ſuper vētris ſolutōeꝫ eſt timoroſuꝫ: ⁊ figura ⁊ etas ⁊ tēpus ⁊ aeris ⁊ regiōis diſpō ⁊ ꝯſuetudo eūandi ⁊ ars eūandi.

¶ In hac ꝑte ſuperi⁹ diuiſa ī prin° ſcđi. c. vt ibi Aui. ponit cañ. de modo eūonis humoꝝ qui indigēt euacuatiōe: ⁊ q꞉ modi euacuationū ſunt multi. ſ. ſeceſſu: vomitu: flobotomia: vētoſis: ſanguiſugis: ideo ponit Aui. gnāles regulas nō limitādo ſe ad particulares modos euacuatōis. 2° ſpāles. ibi 2ª: in ſe. c. oꝫ vt illius ⁊c̄. Preſens. c. vt pꝫ in rubrica ē ad docēdū cañ. đ hora eūonis ⁊ cañ. de mō eūatōis: ideo ītitulať caᵐ đ qualr̄ ⁊ qñ eūare oꝫ. Et diuidiť in duas ꝑtes. In pª ponit cañ. de hora euacuatōis. 2° cañ. đ mō euacuatiōis. Sub quo mō cōprehendiť oīs maneries cōſiderāda gnālr̄ ī euacuādo. 2ª ibi: ꝓpe per colūnā. Scias ꝑterea ꝙ ītērio pª diuidiť ī duas. Nā p̊ enumerat cōditiōes cōſiderādas ad debite euacuādū ⁊ cognoſcēdū tēpus euacuatiōis. 2° ꝑ illas docet cognoſcē hec. ibi 2ª: hoc nāqꝫ. ¶ De pria dicit ꝙ decē ſunt res que demōſtrāt rectitudinē iudicij ī genere de euacuādo vel nō: ⁊ ſunt iſta. Repletio: virt⁹: cōplō: accñtia: cōueniētia: forma: etas: diſpoſitio aeris: diſpō regiōis: ꝯſuetudo euacuandi ⁊ ars: ⁊

UVA. BHSC. IyR_006_1

⁊ ꝯp̄rehēdunt̄ his verſibꝰ. Ars etas forma regio ꝯplō virtus: Mors ⁊ ſinthoma repletio tp̄s ⁊ vſus. Hec ſunt penſanda medico purgare volēti. ❡ Nota ergo p̄ᵒ ꝙ hoꝝ.x. quedā ſunt principalr̄ īdicātia: quedā vero coindicātia ꝓ quāto indicāt diſpōneʒ illoꝝ primoꝝ. Nā repletio ſi fuerit mala īdicat de ſuo oppoſito qđ eſt eūatio. virtus auteʒ nō īdicat ita directe: ſʒ indicat ꝯſentiēdo vel nō ꝯſentiēdo ſi fuerit multū debilis: vel futura ſit debilis propter eūationē. Reliqua tn̄ ſignificāt ſuper eūoneʒ vel ſup eūatōis ꝓhibitōeʒ inquātū ſignificāt ſupra virtuteʒ vel ſupra repletionē. ⁊ hoc patebit īfra in declaratōe ab Aui. ❡ Nota 2ᵒ ꝙ in lr̄a dicit̄ ꝙ ſoluere ventrē ſuper vētris ſolutōeʒ eſt timoroſuʒ. Et pōt p̄ᵒ modo intelligi ꝙ nō dʒ quocūqʒ mō fieri fluxus ſup fluxū ventris. ⁊ hoc eſt falſuʒ. Nā vt hʒ videri 16ᵃ tertij.c. de cura fluxus vētris. oīuʒ modorū fluxus curat̄ fluxu. ⁊ ſm mentē Gal. p̄ᵒ affo. ꝯmento illiꝰ affo. Que reliquūt ī morbis poſt criſiʒ ⁊c̄. Intētio Hyp. ibi eſt ꝙ nā eūante īcōplete medicus dʒ ſuā eūonē ꝯplere. ⁊ in cōmento illiꝰ affo. Ea quoꝝ criſis fit ⁊c̄. Et idem vult Aui. 2ᵃ quarti de iudicijs eūonis cū dixit: Et cū abbreuiat̄ eūatio poſtqʒ perficit̄ qđ effici oʒ: tūc oʒ ꝙ adiuuent̄. Et ſimilr̄ fluxus ſanguis nariuʒ ⁊ fluxus emoroidaꝝ ſupfluꝰ ⁊ mēſtruoꝝ ⁊ vomitꝰ in colirica paſſione: ꝯſtat ꝙ multotiens curat̄ flobotomia ⁊ vomitu. Nō ergo gnāliter debemus abſtinere ab admīſtratōe ſoluentis ventreʒ dū adeſt fluxus: nec etiā gnāliter qn̄ ꝯpletꝰ eſt qui p̄ceſſit. ❡ Nota 3ᵒ ꝙ ſi per fluxū vētris eūamus ſoluendo: hoc pōt eſſe dū eſt fluxus ab aliq̄ cā: ⁊ pōt eſſe ꝯpleto p̄ᵒ fluxu. ꝯſtat auteʒ ꝙ ſecuriꝰ facimꝰ operationeʒ ꝯpleto p̄rio fluxu: qꝛ in caſu nr̄o nō ꝯiungent̄ ſimul due cāe fluendi pp quā aggregationē timeamꝰ de ſupfluitate. ⁊ hoc videt̄ īnuere Aui. loco allegato. Qn̄qʒ tn̄ nō poſſumus hoc facere. ſ. expectare ꝯplemētuʒ primi fluxus qꝛ adſunt ſigna durabilitatis fluxus niſi cām remoueamꝰ per fluxū factū a farmaco: ⁊ tūc eūamꝰ cū adeſt primꝰ. Sʒ in vtroqʒ caſu cū timore ⁊ cautela ꝓcedendū eſt ne nimiū ſupfluat dādo. ſ. ſolutiua ī quibus eſt virtꝰ relinquēdi veſtigia corrugatiōis ⁊ ſtipticitatis: vt ſūt mirabolani ⁊ reubarbaꝝ diminuēdo doſim. Et hoc mō ītelligendū eſt hic ꝙ fluxū facere ſuper fluxū eſt timoroſuʒ. Et hic eſt modus practicādi: qꝛ cū video fluxū ī īfirmo aut eſt a farmaco exhibito aut a nā. Si a farmaco: aut eſt exhibitū in doſi ꝯpleta aut diminuta. Si ī doſi cōpleta: non eſt dādū aliqđ ſolutiuū niſi videat̄ tota ſequēti die quō ope͛t: qꝛ qn̄qʒ opatio differt̄ vſqʒ ad ſequētē diē. Si fuerit doſis diminuta poſſumꝰ cōplere doſim. Si eſt a natura: aut ē creticꝰ vel nō. Si creticus expectamꝰ cōplemētū dici cretice vt videamꝰ cōplemētū operis nāe ne aliqđ addēdo facaremꝰ ſupfluere. Si aūt nō ē creticꝰ non ſtatim ī p̄ricipio euacuamꝰ niſi prius cōprehēdamus manerieʒ fluxus: qꝛ ſepe īcipiūt leues ⁊ fiūt mortales. Sʒ cognita cā ⁊ manerie qn̄qʒ eūamꝰ nō expectādo finē. ❡ Ultimo nota ꝙ lʒ p̄ter virtutē ⁊ repletōeʒ Aui. nō ponat niſi viij. res: alias tn̄ oēs ꝑ iſtas voluit ītelligi q̄ magis ⁊ tantūdeʒ hn̄t ſignificare ſup repletionē aut virtutis diſpōnē ſicut pulſuʒ: vrinā: venaꝝ tumoreʒ: ciboꝝ ⁊ potuū manerieʒ. Hec eiʒ dant̄ ītelligi cū dr̄ ꝙ ꝯſiderāda ſūt virtꝰ repletio vel ꝯplō. Specificauit auteʒ illa alia. viij. qꝛ vident̄ gnālia ⁊ lōgingora ad ſignificādū ſup huiuſmōi diſpōnē.

Nota ꝙ in fluxu ventris ex oppilatōe ſiue epatis vel meſaraicaꝝ vel ex lubricitate īteſtinorum pp flegma tegens ea cū fortitudine virtutis cōpetit farmatica que tollat oppilationē: vel ab inteſtinis abſtergat flegma remota in hac cā remouebit̄ fluxus

Et ſi talis fluxus eſſet fortis ⁊ cuʒ cita violentia ſiue eēt nālis ſiue artificialis: tūc nulla medicina ſolutiua cōpeteret qꝛ cū hic fluxus ꝯtinue naturā procedat debilitando: modo ſi adueniret medicina ſupradicta deijceret eā: quare ⁊c̄.

Hec nāqʒ cū fuerint ꝯtraria ſignificatiōi ꝓpter quā eūatio facienda erit prohibebūt euacuationē.

❡ Hic docet modū iudicādi ꝑ cōſideratiōeʒ haꝝ deceʒ rerū. Et diuidit̄ ī duas. p̄ᵒ facit hoc ī gnāli. 2ᵒ ī ſpāli magis. ibi 2ᵃ: vacuitas itaqʒ. ❡ De prima dicit ꝙ iſte decem res demōſtrāt rectitudinē iudicij ī euacuādo. Et rō ē qm̄ qn̄ iſte fuerint cōtrarie ītētiōi ꝓpter quā fiēda ē euacuatio ꝓhibebūt euacuatiōʒ. ❡ Ubi aduertēdū ex mō loquēdi Aui. vʒ ꝙ ſit aliqua ſignificatio ſupra euacuatiōeʒ vltra has decē res numeratas. Nā niſi eēt aliqua alia tunc iſta ꝯtraria nō eēnt ſignificatōi pp quā faciēda eēt euacuatio: qꝛ idē nō ē ſibi cōtrariū: ergo ⁊c̄. Et iō locus iſte triplicem hʒ expōnē. ❡ Una ē ꝯcedēdo ꝙ p̄ter iſtas. x. ē vna gnālis ſignificatio. ſ. morbi eēntia q̄ ꝓ quāto depēdet a cā ſignificat euacuationē fieri debere. ⁊ iſte res pn̄t eē cōtrarie. ſ. iſte. x. ſignificatōes. Sʒ hec rn̄ſio nō plʒ mihi. ⁊ rō ē quia ab eēntia morbi nō ſumit̄ īdicatio đ euacuādo niſi morbꝰ eēt repletiōalis: ⁊ ſic eēt aliqua de nomiatis ſignificatiōibus. ❡ Scđa rn̄ſio, cū dicit̄ ī textu. hec fuerit cōtraria ſignificatiōi ⁊c̄. debemꝰ ꝑ li ſignificatiōi ītelligere ītentioni. vt ſiquis ītēderet euacuare ꝓpter p̄ſeruare ab aliquo morbo ſi examinat iſtas. x. ꝯditiōes ⁊ inuenit eas cōtrarias huic ītētiōi tūc dʒ euacuationē dimittere. ⁊ hoc ē ſatis ꝓbabile. ❡ Tertiꝰ modus ē ꝙ qn̄ hēmꝰ ſignificationē aliquaʒ ꝙ euacuatio fiēda ē q̄ ſumit̄ ab aliqua iſtarū. x. veputa repletiōe que ē ſignificatio principalis ſup euacuatiōe fiēda ⁊ alia decē nō cōſentiūt nō ſigillatim ſʒ ſimul ꝯpenſanda: tūc magis arguūt ꝙ nō ē faciēda euacuatio ipa: ſʒ dimittēda. Hec eiʒ decē ſimul qn̄qʒ vigoroſius ſignificāt ꝙ nō fiat euacuatio qn̄ repletio tibi aliđ ſignificat. qđ fiat: dicūtur tūc cōtraria ſignificatiōi ꝓpter qđ faciēda ē euacuatio: ſupple que fiēda eēt ſi nō eēt cōtrariū īdicās. ⁊ hoc puto eē verū. Pōt tn̄ dici ꝙ repletio ſignificat euacuatiōeʒ qn̄ ē đ malis hūoribꝰ. ⁊ qꝛ ſtat ꝙ fiat iſta cū nimia vacuitate humoꝝ ⁊ ſpirituū que ſignificat ꝙ n̄ fiat euacuatio: ideo ſtat ꝙ repletio ſit: ⁊ alia nouē ſignificent cōtra repletionē ſignificātem euacuationē. ⁊ iō repletio diminuta ex bonis ſignificat cōtra repletionē ex malis hūoribꝰ ſup euacuatiōe faciēda. ⁊ ſic oīa iſta decē ī genere ſibi inuicē contradicunt ratiōe alicuiꝰ ꝯtēti ſub eis ⁊ ratiōe alteriꝰ ſignificarēt aliqua eorū ſup euacuatōe. nec ē illud incōueniēs. Scđm tamē modum puto veriorē.

Un̄ nota ꝙ q̄libʒ iſtaꝝ reꝝ hʒ duo extrema. vnū indicat eūationē: ⁊ aliud non: vnde fortitudo virtutis indicat ⁊ debilitas ꝓhibet eūationeʒ: ⁊ ſimilr̄ eſt de alijs: quare ⁊c̄.

Uacuitas itaqʒ ſine dubio euacuatōeʒ fieri ꝓhibet.

❡ Hic ſigillatim ꝓſequit̄ oñdēdo quō cuiuſlibet iſtoruʒ cōſideratio cōferat ī rectificādo iudiciū euacuatiōis docēdo ꝙ vnūqđqʒ ſigillatim īdicet. Et diuidit̄ ī decē partes q̄ patebūt legendo. ❡ De p̄ᵃ dicit ꝙ vacuitas ſine dubio ꝓhibet euacuationē fieri. ❡ Ubi notādū ſʒ Dy. quātū attinet ꝓpoſito ꝙ tres ſūt diſpōes corpis humani diuerſe. ❡ Una ē repletio: ⁊ iſta indicat de euacuatōe. cū ſit res p̄ter naturā īdicat de ſui remotōe que fit ꝑ eūonē. ❡ Scđa eſt mediocritas: ⁊ iſta nō ſemꝑ ꝓhibet euacuationeʒ fieri. Nam 3ᵒ de īgenio vult Gal. ꝙ ꝓpter magnitudinē paſſionis nō exiſtēte plectoria debemꝰ euacuare. ⁊ hoc idem vult Gal. 4ᵒ regi. acu. cōmēto illiꝰ partis: Acutas egritudines flobothomabis. ⁊ hoc ēt vult Aui. īfra. c. de flobotho. ❡ Tertia diſpō ē vacuitas: ⁊ iſta ꝓculdubio prohibet euacuationē. ⁊ hoc mō loquit̄ hic Aui. Nā cū ſit p̄ter naturā īdicat de ſui remotiōe ⁊ ſic īdicat de replēdo ⁊ ꝓhibēdo id qđ ipam auget ſicut eēt euacuatio. ❡ Sed ſi Dy. ītelligeret ꝙ ſtāte vacuitate nullo mō debēt fieri euacuatio a mēbro vacuo: hoc eēt falſuʒ qꝛ nō ſolū mēbra q̄ mediocriter ſe habēt in plenitudīe euacuant̄ ſʒ ēt multū inanita: vt pʒ ī ſputo ſanguis ⁊ ꝑcuſſiōe ī capite ⁊ in pleriſqʒ caſibꝰ. Si vero ītelligit vt ē ītelligēdū ꝙ vacuitas ꝑ ſe indicat de nō euacuādo: hoc ē verū: ſʒ tn̄ tūc nō ē ad ꝓpoſitū illa diſtinctio. Tollerat ergo ꝓpter ꝯtrariā indicationē vacuitas qn̄qʒ euacuationē: qn̄qʒ tn̄ indicat de nō euacuādo a loco vacuo. ❡ Scđo nota ꝙ repletio ⁊ vacuitas qn̄qʒ ē cōis: ⁊ qn̄qʒ ē in ꝑticulari mēbro. Modo vacuitas determinati mēbri nō indicat de nō euacuādo ab aliquo alio: ſʒ a ſe vel ab alio ad qđ ſeq̄t̄ maior illius mēbri vacuitas. verbigr̄a plenitudo ſtomaci p̄ter nām ſtat cū vacuitate venaꝝ. illa tn̄ venaꝝ vacuitas de nō euacuādo ſtomacū nō īdicat: ſʒ ꝙ nō euacuēt̄ vene. ❡ Silr̄ nota ꝙ nō ē īcōueniēs ꝙ vacuitas īdicet ꝑ accidēs ⁊ mediate de euacuatiōe illius mēbri cuiꝰ ē vacuitas: vt cū mēbrorū attractiua ē debilitata ꝓpter flegmatis pn̄tiā: vnde mēbra facta ſunt macra ⁊ vacua: illa vacuitas īdicat de remotiōe cauſe debilitātis attractiuā ⁊ digeſtiuā ⁊ ſic đ euacuatione flegmatis ab eiſdē membris: cū hoc tamē prohibet fieri euacuationē ad ſenſum ſupradictū.

Et ſimilr̄ cū debilitas cuiuſcūqʒ triuʒ virtutū fuerit.

❡ Hic docet quō virtutis cognitio recipiat iudiciuʒ de euacuādo. Et diuidit̄ in duas. Nā p̄ᵒ facit hoc. 2ᵒ remouet tacitū dubiū. ibi 2ᵃ: verū tamē qn̄qʒ. ❡ Dicit p̄ᵒ ꝙ ſimiliter debilitas cuiuſlibet triū virtutū prohibet ab euacuatiōe: ⁊ per ꝯſequēs ꝑ coutrariū fortitudo cōſentit euacuationē fieri. ❡ Un̄ nota p̄ᵒ ꝙ per has tres virtutes ītelligimꝰ aīalem nālē ⁊ vitalē p̄ſertim cōes. nam debilitas virtutis vitalis nālis ⁊ aīalis in vno mēbro qn̄qʒ indicant de euacuatiōe ab alio vt ī mēbro cācrenato ad mortē tēdēte p̄cipiunt̄ ſcarificatiōes. ❡ Nota 2ᵒ cām huiꝰ dicti. naʒ cū iſte virtutes ſint res nālis indicāt de ſui cōſeruatiōe ⁊ prohibēt eaꝝ remotionē: ⁊ ꝓhibēt ab eis que ipas tollūt aut diminuūt. Modo ipe ſunt fortes ꝑ debitā pn̄tiā ſanguinis ⁊ ſpūuʒ. ⁊ cū ſunt debiles ſunt tales ꝑ ſanguinis ⁊ ſpūuʒ paucitatē vel ſaltē per talē paucitatē ſunt apte debilitari. Modo omīs euacuatio qūocūqʒ fiat ē ſpirituū reſolutio ēt ſi ſit ſaniei euacuatio aut aque aut ſtercorū: vt ſumit̄ ī cōmēto illiꝰ affo. Quicūqʒ idropici vel ēpici ⁊c̄. Humor enim vel ſanies cōtenta vel aqua ī mēbro quomōcūqʒ oppilādo poros ſui corpulētia quodāmodo ꝓhibēt exitū ſpirituū quo humore euacuato pori apiūt̄ ⁊ effluūt ſpūs: vn̄ oīs euacuatio abijcit de ſubſtātia ſpūum. ❡ Nota 3ᵒ has virtutes eē debiles qn̄qʒ per viā reſolutiōis: ⁊ iſta eſt cū paucitate ſpirituū ⁊ ſanguinis cōueniētis. ⁊ hoc ē qđ maxime ꝓhibet euacuatiōʒ. Alia ē debilitas ꝑ viā aggrauatiōis tm̄: ⁊ hec indicat potiꝰ euacuationē q̄ʒ prohibeat: cū iſta tn̄ multotiēs ſtat debilitas per viā reſolutiōis.

Et vlteriꝰ hic nota ꝙ debilitas harū virtutū prohibet euacuationē in ſua radice: vt vitalis ī corde: naturalis in epate ⁊ animalis in cerebro. Aliqua tn̄ iſtaꝝ ī pede vel in manu debilitata nō ꝓhibet euacuationem.

Uerūtn̄ qn̄qʒ plus eligimꝰ alicuiꝰ virtutis debilitatē q̄ʒ īpedimētū reliquēdi eūoneʒ. ⁊ hoc quidē ē ī virtutibꝰ ſenſibilibꝰ ⁊ motiuis cū fiduciā habuerimꝰ ſuccurrēdi rei timoroſe ſi acciderit ⁊ ſimilr̄ in oībus virtutibus.

❡ Remouet hic dubiū vnum quomō poſſet quis dicere ſi virtutis debilitas ꝓhibet euacuationē videt̄ ꝙ nūqʒ debemus euacuare. ꝓbat̄ qꝛ virtus per illā euacuationeʒ multū debilitaret̄: ergo ſequit̄ ꝙ debilitas virtutis n̄ poſſit ꝓhibere euacuationē. Ad qđ rn̄det̄ dicendo ꝙ nō obſtante

UVA. BHSC. IyR_006_1

ſtante q virtutis debilitas indicet de nõ euacuãdo: tamẽ magis eligim⁹ qñq₃ debilitatẽ oium iſtarũ virtutũ q̃₃ impedimẽtum relinquẽdi euacuatiões: maxime tñ verificat̃ de virtutib⁹ ſenſibilib⁹ ⁊ motiuis q eligim⁹ illarũ debilitationem potius q̃₃ ĩpedimẽtũ relĩquẽdi euacuationẽ: vt qñ euacuam⁹ vſq₃ ad ſincopim: qñ hẽm⁹ fiduciã poſt euacuationẽ potuerim⁹ ſuccurrere rei timoroſe. ſ. ſincopi ſi acciderit. ⁊ ſimiliter pôt eẽ ĩ aliis virtutib⁹: q₂ poti⁹ eligim⁹ iſtarũ debilitatẽ repabilẽ q̃₃ dimittam⁹ euacuationẽ ĩ quibuſdã caſib⁹. Nota ergo p° q quedã ẽ debilitas notabilis alicui⁹ iſtarũ triũ virtutu₃ añ euacuationẽ ⁊ aliqua ẽ ſeq̃ẽs euacuatiõe₃. mõ ſm Dy. tales debilitates pcedẽtes ꝓhibẽt euacuatiõe₃ oio. vñ dicit q non eligim⁹ tales debilitates deficiẽtes potius q̃₃ ĩpedimẽtũ derelinquẽdi euacuatiõ₃. Vñ Hypo. pª pticula affo. voluit q tales euacuatiões nõ fiant niſi ĩ corpe forti: vbi dixit: ⁊ hoc facere ſi ſufficiat egrotans. Ego tñ puto q pp debilitatẽ magnam virtutis aialis pcedẽtis euacuatiõe₃ debem⁹ qñq₃ fortiter euacuare vt ĩ forti apoplexia ĩ qua pcipit̃ euacuatio cũ pillis de euforbio ⁊ ſimilib⁹. S₃ veritas ẽ q exiſtente magna debilitate alicui⁹ iſtarũ virtutũ per viã reſolutionis ꝓhibem⁹ a forti euacuatiõe oĩno q₂ illa ĩterficeret. ſed nõ ſemp ꝓhibem⁹ fortẽ euacuationẽ a faciẽdo magnã debilitatẽ virtutis: ĩmo qñq₃ facim⁹. ſ₃ de hoc magis infra in q. videbit̃. Vlteri⁹ nota q quidã ẽ taliũ defect⁹ virtutũ cũ quo nõ eſt fides de ſuccurẽdo ſibi: ⁊ ſic ad talẽ nullo mõ ẽ ducẽdus eger a medico. Quidã aũt ẽ repabilis ⁊ ad talẽ l₃ qñq₃ medico ducere ĩfirmũ. ⁊ iõ Aui. dicit cũ fiduciam habuerim⁹ ſuccurẽdi rei timoroſe. Qđ qdã hoc dicũt quo ad defectũ cũ difficultate repabile₃ nõ debemus ducere: puto falſu₃. nã ꝓpter vitare morte₃ facim⁹ talem defectũ cum ſit recupabilis: l₃ tñ cũ difficultate: ⁊ cõſtat q facim⁹ meli⁹. Tertio nota q ex dictis Aui. poti⁹ eligimus ĩ morbis defectũ aĩalis virtutis q̃₃ vitalis aut naturalis. ⁊ hoc dicit Gal. 3° terapen. Et rõ eſt quia ĩ morbis indigemus fortitudine virtutis naturalis vel vitalis ad digeſtionẽ humorũ ⁊ ciborũ ⁊ nõ ita animali.

Cõplo quoq₃ calida ⁊ ſicca ad hoc ꝓhib₃: ⁊ frida ⁊ hũida caliditatẽ nõ hñs aut debilẽ hñs ab ea ẽt ꝓhibet. in calida aũt ⁊ hũida facile faciemus illud ⁊ fortiter.

Hic docet rectificare iudiciũ euõnis p cognitionẽ cõplonis. Et dicit hic tres ꝯclões. Prima: calida ⁊ ſicca ꝯplo ꝓhibet ab euõne. Scđa ꝯclo: cõplo frigida ⁊ humida nõ hñs caliditatẽ aut hñs eam debilẽ ꝓhibet ab euõne. Tertia cõclo: calã ⁊ humida facilr̃ tollerat euacuationẽ ⁊ fortẽ. Rõ prime ꝯclonis eſt q₂ in ꝯplone calida ⁊ ſicca plerũq₃ ẽ paucus ſanguis ⁊ paucũ humidũ: ⁊ ſpũs ⁊ humores ex motu q fit in euõne ſunt facilr̃ in eis ĩflãmabiles ⁊ ex farmaci caliditate qđ vtplurimũ eſt calm ſunt etiam facilr̃ reſolubiles: propter iſta igit̃ nocumenta indicãt q nõ fiat euatio. verũ eſt tñ q pôt aliqñ ſignificare q fiat euatio ꝓ quãto ĩdicat humorẽ colericũ abũdare in corpore qui euari d₃: ⁊ iõ qñq₃ tales ſunt euandi: tñ qñ euacuant̃ fit leui⁹ q̃₃ ĩ aliis ſimilr̃ ĩdigentib⁹ eque fortib⁹. ⁊ hoc ĩtelligit Auic. Rõ aũt ſcđe ꝯclonis eſt iſta: p° tenẽdo q aliqua eſt ꝯplo frida ⁊ humida ⁊ non multũ tñ diſtãs a tpamento: ⁊ eſt talis p pñtiã humorũ flegmaticorũ: ⁊ talis nõ ꝓhibet euõnẽ. Et qñq₃ eſt radicalr̃ calã: ſ₃ multiplicatis flegmatib⁹ ꝓpter ĩdigeſtionẽ tendit ad frigus: ⁊ iſta ĩdicat de euõne: nec ẽ cũ tãta debilitate q euõne₃ ꝓhibeat. Alia ẽ frida ⁊ humida radicalr̃ in mẽbrorũ ſubſtãtia ⁊ multũ recedens a tpamento: ⁊ q̄ paucu₃ h₃ de ſpũ ⁊ ſanguine: ⁊ iſta ẽ de qua loquit̃ Aui. vnde dicit caliditatẽ nõ hñs ſed debilem hñs. Tũc rõ eſt q iſtorũ corporũ virt⁹ eſt debilis ⁊ humores ⁊ mẽbra cũ ſpiritib⁹ facilr̃ reſolubiles. quicqd aũt a ſubſtãtia humida reſoluit̃ ẽ multo plus q̃₃ qđ a ſicca diſſoluit̃ ẽt ſi in calore ſint pia p° affo. ꝯmẽto 14°. ꝓpter has ergo cãs nõ bene tollerat hec ꝯplo euacuationẽ. Et tu ex hoc idẽ potes dicere de melancolicis q multũ ſunt diſtãtes a tpato: tñ ꝓpter ſiccitatẽ ſuã non ita cito diſſoluunt̃. Rõ tertie ꝯclonis eſt q₂ in ꝯplone calida ⁊ humida virt⁹ nãlis eſt fortis ⁊ humores multi nõ facilr̃ inflãmabiles ꝓpter multitudinẽ: ergo ĩdigent euõne: ⁊ pp alia duo dicta tollerãt forte₃ euatione₃. S₃ ĩ hac 3ª regula cadit dubiũ. Nã Gal. 9° terapẽ. c. vltio. dicit cõtrariũ vbi ad lrãm. Subſtãtia igit̃ puerorũ facillime euaporat̃ ⁊ ſpargit̃: q₂ oiu₃ ẽ hũidiſſima: frĩdiſſima vero nullius: q̃re nõ indiget euatiuo farmaco hñs ĩnatũ euari. vñ parũ poſt vult q in talib⁹ ĩ quib⁹ eſt multa euaporatio corpore ĩdigẽte ſanguĩs diminutõe: q euatio aut nõ fiat aut fiat parua flobothomia. Arguit̃ ergo ſic. Illa ꝯplo minus indicat de euõne ĩ qua plurima fit diſſolutio: ergo ⁊c̃. maior ⁊ minor ſũt Gal. loco allegato. Ad hãc difficultatẽ rñdet̃ ſ₃ Dy. duplr̃. Vno mõ q ꝯplo humida q̃dã ẽ talis nãlr̃: q̃dã aũt accñtalr̃. mõ corpora humida accñtalr̃: ⁊ cũ hoc calã ſũt illa de qb⁹ loq̃t̃ hic Auic. Gal. aũt loquit̃ de hũidis nãlr̃. Scđa rñſio eſt q̃ſi declaratiua prime: ⁊ eſt q corporũ humidorũ quedã ſũt talia quoad ſubſtãtiã mẽbrorũ principaliũ: q₂ habẽt illa mollia ⁊ hũida. quedã aũt ſunt humida nõ quo ad mẽbra ſolida ⁊ eorũ ſubſtãtiã: ſ₃ iõ dicunt̃ humida q₂ in venis multũ hñt de humoribus. ⁊ de primis loquitur Gal. vñ exemplificat de pueris. ⁊ de ſcđis ĩtelligit Aui. q₂ ꝓpter multũ humorẽ indicat đ euacuatiõe: ⁊ pp caliditatẽ indicat virtutẽ eẽ fortẽ que pôt tollerare. Qđ aũt hec rñſio nõ ſit de mẽte Aui. p₃ ex his que dicit 3° huius doctrina 4ª. c. p° vbi loquit̃ de regie corporũ hñtiũ cõplonẽ naturalẽ recedẽtẽ a tẽpamẽto. nam ĩ nullis precepit euatões fieri p flobothomiã aut aliter. mõ hic precipit fieri ĩ calida ⁊ humida. pterea docet hic Aui. rectificare iudiciũ euationis p indicatiõe₃ cõplonis nãlis: ⁊ nõ ꝓpter multitudinẽ humorũ aut plenitudinẽ venarũ. ⁊ iõ Auic. loquit̃ vere de cõplone calida ⁊ humida membrorũ ſimpliciũ naturali. Puto ergo q in cõplone calida ⁊ humida nãli qñq₃ fit p humiditatẽ mẽbrorũ tãta mollities q₂ calor ſupfluitates ſufficit reſoluere ſolũ debite abſtinẽdo: ⁊ hoc non inuenit̃ cõiter in pueritia. qñq₃ aũt ia₃ ingroſſatis humiditatib⁹ calore nõ aucto nõ ſufficit ita reſoluere ſicut multiplicare vt in iuuẽtute ⁊ in ſequẽtib⁹ etatib⁹: ⁊ iõ cõplo calida ⁊ humida cũ multa ſubtilitate ſubſtãtie mẽbrorũ ⁊ hũorũ ꝓhibet ab euatiõe vt puerorũ: ſ₃ ſic nõ indicat hic. ⁊ de iſta loquit̃ hic Aui. Nã de ꝯiuncta multe ſubtilitati dicet ĩfra cũ loquet̃ de etate ĩ hoc caplo.

Figura autẽ. ſ. ſuperfluitas maciei aut raritas ab ea prohibet ꝓpter timorem ne ſpirit⁹ reſoluat̃: ⁊ ſimiliter oportet in regẽdo debile₃ ⁊ macru₃ multã coleram rubeam in ſanguine habentẽ vt ei blandiaris ⁊ nõ ipſum euacues: ⁊ vt eum nutrias ex eo qđ bonu₃ generat ſanguinem ad frigiditatẽ ⁊ humiditatẽ declinantem: quonia₃ ex hoc ſui humoris cõplexio rectificabit̃ aut fortaſſe ipſum forte₃ efficies ⁊ euacuatiões tollerabit: ⁊ ſimiliter oportet ne illu₃ euacuare ſis auſus qui ex cõſuetudine paru₃ comedit quãdiu ab eius euacuatiõe abſtinere poteris. Superflua quoq₃ piguedo ab eo ꝓhibet ꝓpter timorẽ ne frigiditas dominet̃ ⁊ ne caro venas cõprimat ⁊ eas extiguat cu₃ vacuas ĩuenerit ⁊ calorẽ ſuffocet ĩnatu₃ aut ſuperfluitates exprimẽdo ad interiora expellat.

Hic docet rectificare iudiciũ euatiõis p indicatiõe₃ a figura. Et cõſtat q Aui. hic p figurã nõ intelligit proprie figurã: ſed illud qđ nos cõiter vocam⁹ habitudinẽ. ⁊ hoc reſpicit duo genera diſpõnũ. vnũ ẽ piguedis maciei ⁊ carnoſitatis: aliud ẽ denſitatis ⁊ raritatis. Innuũt hic etia₃ Aui. incidẽter de quadã cõſuetudine. ⁊ dicit in toto concluſiões quattuor. Prima ẽ iſta: figura ſupflue maciei ⁊ raritatis ꝓhibet ab euatõe. Et rõ ẽ q₂ in iſtis timetur ne ſpũs reſoluant̃ in euatione ſupple ita vt virtus ide nimiũ debilitet̃. Scđa cõclo: corpus debile ⁊ macrũ multam colerã hñs ſanguini admixtã: o₃ vt regat̃ blãdiẽdo ſibi ⁊ nõ euacuãdo ipam ⁊ nutriẽdo ipm cũ eo qđ generat ſanguinẽ bonũ tẽdentẽ ad frigiditatẽ ⁊ humiditatẽ. Et rõ eſt q₂ per hoc regimẽ: aut rectificat̃ malus humor: aut fit fortis ad tollerandũ euacuatõe₃. Tertia cõclo: nõ ſis auſus euare illũ qui ex cõſuetudine parũ comedit quãtũ potes abſtinere ab euatiõe. Quarta ꝯclo: ſupflua pinguedo ab euatione prohibet. Et cã ẽ q₂ timet̃ ne facta euatõe dominet̃ frigus: ⁊ ne caro cõprimat venas cũ inuenit eas vacuas: ⁊ ita ſuffocet calorẽ ĩnatũ: aut exprimat ſupfluitates ad ĩteriora. prima regula ẽ ſatis clara. In ſcđa regula nota q blandiri ẽ leui via ĩcedere mitigãdo malitiã morbi aut mãe ĩpreſſionẽ cũ re que facit tarde effectũ: ⁊ ita facit regimẽ de quo hic dicit regula euationis. Nota 2° q nõ ſolũ qñ colera ẽ peccãs ĩ corpe valde macro: ſed etiã cũ ẽ peccatũ aliorũ humorũ cũ debilitate ⁊ macilẽtia blãdiẽdũ eſt. ⁊ regẽdus ẽ homo cũ eo qđ generat ſanguinem bone ſubſtãtie: declinãtẽ tñ ad ꝯrias q̃litates quaſlibet humoris peccãtis. Et iõ hoc ẽ dictũ vt p hoc alia ĩtelligant̃: reliqua ſũt clara. 4ª aũt regula h₃ veritatẽ quoad pᵐ timorẽ: q₂ ĩ oĩ ſupflua piguedie abũdat friditas. ideo dĩ 7ª q̃rti ĩ. c. de maculis piguedis. Euãdo ergo hũores calidos aut reſoluẽdo ſpũs ẽ timor de nimio exceſſu frigoris. Scđs ẽt timor ẽ rõalis: q₂ vene plene magis reſiſtũt ꝯprimẽti q̃₃ vacue. Timor ẽt eſt de ſuffocatõe caloris nãlis ſicut timet̃ de ſuffocatõe ignis cu₃ ẽ pu⁹ ⁊ ligna ſũt viridia multa ſuppoſita ita ĩ expſſiõe hũorũ ad ĩteriora. res ẽ clara. Nota tñ hic q pinguedo ⁊ graſſitĩes illorũ q a nã oĩno ſunt calidi ⁊ que ẽ facta artificialr̃ ex multo cibo indicat đ euatione: vt dicit̃ illo affo. In exercitantib⁹ ad ſummũ. ⁊ cõſtat q iſta ſit ſupflua. illorũ aũt graſſities qui ſunt graſſi ſm nãm qñ eſt valde extrema ꝓhibet ab euatione.

Accidentia quoq₃ mala ſicut aptitudo colirice paſſioni ⁊ ſpaſmo ab ea prohibent.

Hic docet dictũ iudiciu₃ rectificare per cõſiderationẽ accñtiũ dicẽs: Accidẽtia mala ſicut colirice paſſiõis: ⁊ aptitudo ad ſpaſmũ ꝓhibẽt ab euatiõe. Vbi nota q colirica paſſio ẽ motus materierũ corruptarũ nõ digeſtaru₃ ad ſepationẽ ex via ĩteſtini ⁊ redeuntiũ ad ipm a corpe ſm

Triplici de cã debilitas virtutis ꝓhibet euõnẽ. pª q₂ virtus iã debilitata per euationẽ deiiceret̃ ⁊ mortis ĩmineret periculũ. 2ª q₂ đbilis virtus nõ ſufficeret regẽ ⁊ reducere medicinam de potentia ad actu₃. 3ª q₂ virtus p euõne₃ debilitata citius morbo ſuccũberet ⁊ min⁹ poſſet ei reſiſtere. Et ex oibus euõnib⁹ plus prohibet virt⁹ debilis illa₃ q̄ fit p flobothomiã q̃₃ aliquã aliã predictarũ: eo q plus virtutẽ debilitat teſtante Gal. ix. megatẽgi. c. vj.

Nota q Aui. nõ ĩtẽdit hic remouere oẽm euõne₃ artificiale₃ a colericis: ſ₃ magnas flobothomias ⁊ fortes farmacias: pôt eni₃ in his dum colera ex vẽtre nõ ſatis purgatur vel cu₃ vrina ipſa ꝓuocari etiã cũ vomitu cum aqua calida vel laxari venter cũ lenitiuis: vt ide₃ dicit tertia primi doctrĩa q̃rta. c. j.

Et tu clarius dic ꝑ iſta ꝯplõẽ q Galien⁹ loquit̃ de humi

dis teneris raris ⁊ facilr̃ reſolubilib⁹ ſicut ſũt pueri Aui. v° intẽdit hic đ calã ⁊ hũida ꝯplone in corpe ſolido muſculoſo ⁊ forti.

Nota q nõ eſt oĩno verũ qđ dicit hic magiſter de mente Auic. v₃ q₃ huiuſmodi corpora calida ⁊ humida nõ ſint aliquo modo euanda. nã ipſe dicit ĩ fine illius capli q talia corpora tpe veris debẽt ſe temperate ꝯſeruare minutõe ⁊ euõne.

Iſta ꝯclo habet veritate₃ de quocũq₃ corpe macro ſiue melancolico ſiue quodcũq₃ ſit: ſ₃ debẽt applicari ꝯtraria diſpoſitõi q₂ aut curat̃ aut fortificat̃ vt dicit. hec Gẽtilis.

Ratio tertie ꝯclonis ẽ qm̃ ille nõ aggregat ſupfluitates: vnde in eo nõ eſt repletio: aliqñ tñ eſt euandus vt cũ errat in regimine vel ſi hẽret malã diſtẽperãtia₃ epatis vel ſtõaci.

UVA. BHSC. IyR_006_1

acuitatē ⁊ laborē expulſiue. Et per viā inteſtini itelligim⁹ nō ſolū cōcauitatē inteſtini ſꝫ ſtomaci etiā q: ē via ad inteſtinū. Cauſa aūt eius ē multiplicatio corruptiōis digeſtionis ⁊ materierū corruptarū ī venis ⁊ fortitudo expulſiue venarū ⁊ debilitas inteſtinorū ⁊ ſtomaci quib⁹ trib⁹ cōiūctis accidit ꝙ fiat multiplicatio materiei corrupte ī venis: deinde ꝙ nā forti motu īſurgat ad expellēdū: 3° ꝙ ad ſtomacū ⁊ inteſtina tāquā debilia expellat. Ex quib⁹ pꝫ ꝙ pati colirice paſſiōi ꝓhibētur ab eūatione ꝑcipue per ſeceſſum aut vomitū: q: in illis ē ꝑiculū ſuperabūdātis fluxus aut vomit⁹ ⁊ accidentiū malorū que ī ea īueniunt vt potes legere 16ª tertij. c. de fluxu vētris. oīuꝫ modorū maxie ꝓpter fortē motū ⁊ ſubitū conatū quē in iſtis ē parata facere expulſiua mēbrorū: vn̄ qn̄qꝫ quaſi ſubito pereunt ⁊ īcidūt ſincopim ⁊ acutiſſimos dolores. ¶ Nota 2° ꝙ pati ad ſpaſmū qdā ſūt parati ad ſpaſmū de repletōe: qdā aūt ad ſpaſmū de inanitōe. Et p̄mi q: hn̄t multas hūiditates ⁊ neruos debiles ad reſiſtēdū mēbris trāſmittētib⁹. ⁊ ī iſtis eſt timor de eūone ne agitato humore currat ad neruos. Alij aūt hn̄t ſubſtātiā neruorū reſolubilē ⁊ ꝯſūptaꝫ paratā ꝯbi ex pauca eūone. ⁊ in iſtis eſt clara cā timoris. Qui etiā hn̄t neruoſa mēbra nimis ſenſibilia vt ſtomacū ſunt parati cadere in ſpaſmū nō ꝓportionatū ad mām. In iſtis ergo q: ſpaſmus cuiuſcūqꝫ modi eſt accn̄s valde maluꝫ: ꝓhibent eūones ille precipue per quas timeret de caſu in ſpaſmuꝫ ⁊ īdicat eaꝫ ꝓhiberi niſi ſit aliud forti⁹ indicās ꝯriuꝫ.

Et fit potiſſime tūc iſta paſſio qn̄ mala mā generat in ſtomaco vnde mēbra renuunt ⁊ mittitur ad ſtomacū ⁊ inteſtina vnde fit vomitus ⁊ flux⁹ vētris.

Etas p̄terea ēt q nōdū ad augmēti ꝯplemētū puenit aut ad ꝯſūptōis terminū ē trāſiēs ab ea prohibet.

¶ Hic docet ex etate dicēs ꝙ etas que nōdū ꝑuenit ad finē augmēti: ⁊ etas que trāſit ad terminū conſumptiōis ſicut decrepitas ābe ꝓhibēt ab euacuatōe. Et cā q̄re etas pueritie ꝓhibet ab eūatiōe ē multa reſolutio ſuorū ſpirituū. precipue tn̄ ꝓhibet a flobothomia cuꝫ ſanguis facile paratus ſit reſolui ī eis. decrepitas autē etas ꝑꝑ virtutis ꝺbilitatē. Attēde tn̄ ꝙ ſupra .14. ānū ꝯcedit flobothomia: ⁊ tūc nōdū ꝑuenerūt ad finē augmēti. Similiter ī decrepita etate ꝑꝑ pleureſiꝫ aut ꝑiplemoniā cōcedit: vt Raſis 7° cōtinētis. ⁊ narrat Auer. ꝙ ꝯoar flobothomauit filiuꝫ triū ānorū. Ex quibus elicias ꝙ nō ita ꝓhibetur ꝙ nullo modo ī eis ſit faciēda: ſed nō fit niſi forti cā indicāte: ⁊ tūc fit minor ⁊ leuior q̄ꝫ in alijs etatibus ceteris paribus.

Et idem dicit Gal. xj. terapētice. c. iij.

Sicut fecit Auenzoar vt refert Auerrois qui flobothomauit filiū triū vel quattuor annorum.

Hora quoqꝫ multum calida aut multuꝫ frigida ab ea prohibet.

¶ Hic docet ꝑ regimē hore ſiue tpis iudiciū illud rectificare dicēs ꝙ hora multū calida ⁊ multū frigida ꝓhibet ab eūatiōe. ⁊ dicit in affo. quarte ꝑticule. Sub cane ⁊ āte canē. de farmaco tantū. ſed de flobothomia ⁊ vomitu nō ē verū. nā ī hora multū calida timet de nimia reſolutiōe. ⁊ in hora multū frida humores ſunt ꝯgelati īepti eūatiōi. ⁊ ratio que eſt de regiōib⁹ fere eſt de hora.

Et regio quidē meridionalis vehemēter cal'a ab ea ꝓhibet qm̄ plurima eorū q̄ ventrē ſoluūt ſūt cal'a: ⁊ duarū acuitatū ꝯiunctio tollerari nō pōt qm̄ virtutes ī eis ꝺbiles erūt ⁊ diſſolute: ⁊ q: exterior calor materiā ad exteriora trahit ⁊ medicina ipſaꝫ trahit ad iteriora: q̄re ide ꝓuenit in diuerſas ꝑtes ꝓtractio ⁊ ad reſiſtētiaꝫ perducit: ⁊ ſeptētrionalis multū frigida ab ea prohibet.

¶ Hic docet rectificare iudiciū euacuatōis ꝑ cognitōeꝫ regiōis dicēs ꝙ regio meridionalis multū calida ꝓhibet ab eūatione. ſ. cū farmaco ꝑꝑ tres cās. Prima q: farmacū calidū ē ⁊ ſiccū ⁊ cōiunctio duarū acuitatū nō pōt tollerari. Scḋa ē q: in iſtis regiōib⁹ habitātes ſūt debiles ⁊ diſſoluti ꝓpter multā euaporationē. Tertia ē q: aer calidus trahit ad exteriora: ⁊ farmacū trahit ad iteriora. ⁊ iſtꝺ ꝑducit ad reſiſtētiam q:. ſ. reſiſtit humor euacuatiōi magiſqꝫ ſi nō traheret ad exteriora: ⁊ ſic impedit farmaci operationē. Et addit ꝙ regio multū frigida ꝓhibet ēt ab ea ⁊ nō aſſignat cās: ſed ſunt ꝑdicte cū dixit de hora. Et tu ēt itellige ꝙ iſta ꝓhibitio pōt habere cām oppoſitam maiorem ſc: vnde fieret eūatio ſꝫ nō ex toto regularis.

Vide Gal. in cōmento preallegati affo. ſ. ſub cane ⁊c.

Parua quoqꝫ eūandi ꝯſuetudo ab ea prohibet.

¶ Hic docet iudiciū de eūatione ſumptū a cōſuetudine que ſupra dicit. Et dicit ꝙ parua cōſuetudo euacuādi ꝓhibet eūationē. ¶ Sꝫ arguit cōtra q: parua conſuetudo eūatiōis ſignificat multā repletionē: ſꝫ ꝓpter multā repletionē fiēda ē euacuatio: ergo ꝑua cōſuetudo euacuādi indicat eē eūationē fiēdaꝫ. ¶ Hic rn̄det ꝙ parua cōſuetudo euacuādi merito ſui nō cōiuncta cuꝫ alio indicāte euacuationē īdicat eūatiōeꝫ ꝓhiberi: q: cōſuetudo indicat ꝺ ſui ꝯſeruatiōe ſicut res nālis: vt pꝫ in illo affo. Scḋꝫ multum ⁊ repēte. ⁊ ꝑcipue in cōmento. Sꝫ qn̄qꝫ ꝑua cōſuetudo euacuādi cōiungit cū alio merito cui⁹ īdicat eūatiōeꝫ fieri oportere vt ſi cōiungat cū malo regimie vt ī ſuꝑflue ſe replēte. ⁊ ſic parua cōſuetudo eūandi ſignificat eūatiōꝫ ꝑ quāto cū illo ſignificat repletionē. verūtamē ēt īquātū ē cōſuetudo ī cōtrariū ſignificat nō fieri: ⁊ iō non tā fortiter eūamus īconſuetos: ſed ī pluribus vicib⁹. ¶ Nota tn̄ īcidēter ꝙ ꝯſuetudo euacuādi aut cū flobothomia aut cū alio tn̄ nō ſignificat corp⁹ cū ſimili tpe debere euacuari ſi permutet regimē ad id qꝺ prohibet aggregari multitudinē: ⁊ maxime de flobothomia vult hic Gal. ꝙ ꝯſueti flobothomari nō ideo ſunt flobothomādi q: cōſueti ſed q: ſimili cā ꝑcedente que preceſſit, al's q: in regie facta ē repletio in alijs euacuatiōibus forte nā ex cōſuetudine fit pigra ſine adiutorio ad euacuādū: ⁊ ſic illa cōſuetudo poteſt ſignificare plenitudinē per aliud.

Ad hoc ꝓpoſitū multuꝫ facit ſentētia Gal. i cōmēto afforiſmi. xlix. ſcḋe particule. ſ. Aſſueti ⁊c.

Ars etiā qua multa fit euacuatio ſicut ſeruiēdi in balneo ⁊ onera dorſo deferentiuꝫ ab ea prohibēt ⁊ ad vltimuꝫ omnis ars laborioſa.

¶ Hic docet ſumere rectificationē iudicij ī eūando ab arte. Et vult ꝙ ars per quā fit multa corꝑis euacuatio ſicut ars ſeruiēdi in balneo. ſ. ī ſtuffa ⁊ ars portandi onera ī dorſo prohibet ab euacuatiōe. Similiter oīs ars multi laboris: q: oīs talis ſignificat paucitatem humoruꝫ. Alique tn̄ tales ſignificant corpora eē debilia vt ars ſeruiēdi in balneo: ⁊ aliqua fortia vt ars portandi.

Scias p̄terea ꝙ intētio in oī eūone ē vna quiqꝫ rerū.

¶ Vſqꝫ ad p̄ntem ꝑtē Aui. dedit can̄. de quādo ſiue ꝺ tēpore eūationis. ⁊ ſūt illi ꝑ quos cognoſcitur corꝑis diſpō: an requirat ⁊ tolleret euacuatōeꝫ: aut nō per debitā conſiderationē decē rerū iam dictarū. ¶ Hic ponit can̄. ꝺ mō eūatiōis. i. de cōditionibus obſeruādis circa euacuationē ⁊ intētiōibus hn̄dis tā de qualitate q̄ꝫ ꝺ quātitate ⁊ loco eūationis. Et diuidit ī duas. p° ponit numerū itentionū hn̄darū ī eūatione. 2° exequit circa illas ponēdo can̄. 2ª ibi ꝓpe: aut euacuatio illi⁹. Primo dicit ꝙ in oī euacuatione intētio ē vna quinqꝫ rerū. ¶ Vbi nota ꝙ Aui. vult ꝙ ī oī euacuatione fiēda artificial'r oꝫ cōſiderare iſtas qnqꝫ res īmo eas intēdere opꝫ quas ipe narrabit ſm̄ modos quos ipe ſpecificabit: ⁊ ſunt ſpēs hūoris ſiue malitia: declinatio ei⁹ ad partē corporis: diſpoſitio mēbri per qꝺ fit aut fieri dꝫ euacuatio: tēpus euacuatiōis in comꝑatiōe ad ꝑparatōeꝫ hūorū ad exitū ⁊ quātitas eūandi. Nā eūatio ſꝫ Gal. ē totā a corꝑe educēs humorū ſubſtātiam: vt 3° tegni. Primo ergo q: id qꝺ a corꝑe educit dꝫ eē p̄ter nām: aut actu aut ꝓpinqua potētia: ⁊ oē tale ē nociuū oꝫ ꝙ cōſideret humorū malitia. Scḋo q: humor malus qn̄qꝫ ē ineptus eūationi: oꝫ ꝙ cōſideret aptitudo. Tertio q: dicit totā ſubſtātiā educēs: oꝫ ꝙ cōſideret quātitas educēdi. Quarto q: per aliquā viā dꝫ eūari: oꝫ ꝙ cōſideret ſi hūor a nā ad aliquē locū vel viā ꝺriuat ⁊ ſic mot⁹ hūoris. Quinto oꝫ cōſiderare mēbrū per qꝺ fiēda eſt euacuatio. In illa ergo euacuatiōe bene artificialiter facienda poſſumus aliquod iſtoruꝫ negligere.

Aut euacuatio illius qꝺ eſt eūandum ⁊ ſequit ipſum proculdubio trāquillitas niſi ꝙ receptaculorū laſſitudo ipſuꝫ ſequatur aut caliditatis ebullitio aut febris effimera aut alie egritudines que comitantur ſicut excoriatio quā ventris ſolutio in iteſtinis facit: aut vlcera que vrine prouocatio in veſica facit: ⁊ hoc quidē licet iuuamentuꝫ ꝯferat. eius tamē vtilitas nō ſentitur: īmo quādoqꝫ preſential'r dolet donec accidens remoueat.

¶ Hic exequit ⁊ diuidit ī quinqꝫ. Primo oñdit que ſit ītētio hn̄da ī malitia hūoris eūandi. Scḋo que ſit intentio ī declinatiōe humoris ad aliqꝺ mēbrū. Tertio que ſit itētio hn̄da ī membro ꝑ qꝺ fit eūatio. Quarto que ſit intētio ī diſpōne humoris quo ad obediēdū eūationi. Quinto que ſit intētio ī quātitate hūoris eūandi. 2ª ibi: ⁊ ſcḋa. 3ª ibi: ⁊ tertia. 4ª ibi: ⁊ quarta. 5ª ibi: oīs p̄terea eūatio. ¶ In prima parte vult iſtā cōcl'onē. In eūando oꝫ intēdere ꝙ euacuet humor nociuus ita vt ſit dign⁹ euacuari. ¶ Probat ſic: illū hūorē debem⁹ euacuare ad cuius eūationē ſequit trāquillitas: ſꝫ ad eūonem hūoris digni euacuari ſequitur trāquillitas: igit ⁊c. verū ē tamē hoc dicit Aui. niſi ꝓpter eūationē hūoris ſequat accidēs aliud ſicut laſſitudo receptaculorū: aut ebullitio caliditatis: aut febris effimera: aut excoriatio quā aliqn̄ facit fluxus ventris: aut vlcus in vijs vrine: qꝺ fit dum ꝓuocat vrina aliqn̄. Nam ī iſtis caſib⁹ lꝫ eūatio afferat iuuamētum tn̄ non ſentit ei⁹ vtilitas: ſed qn̄qꝫ dolet principal'r donec remoueat accidēs illud. ¶ Nota ergo p° ꝙ inter cetera que in humore eūando ꝯſiderant ē qualitas eius. Et hec regula ꝺ qualitate humoris eūandi: ē ſn̄ia affo. prime ꝑticule. In perturbatiōibus vētris ⁊c. ¶ Scḋo nota ꝙ duob⁹ modis cōſiderat q̄litas hūoris eūandi. Vno mō ſpāliter queadmodum dicim⁹ hūorē aliquē calidū aut frigidū aut putridū: ⁊ ſic de alijs ſpālibus denomiatiōib⁹. Scḋo mō ꝯſiderat qualitas gnāl'r inquātū humor ē nociuus aut cōueniens ⁊ hoc ex quocūqꝫ capite fuerit nociuus ſiue ꝓpter qualitatē ſiue ꝓpter quātitatē. ⁊ hoc mō loquit hic Aui. ⁊ Hy. loco allegato. Et hoc maxie pꝫ q: etiā de flobothomia hic itellligit que principal'r cōuenit peccato humorū ī quāto. vn̄ humor peccās in quali ſpāli ē humor qui cuiuſcūqꝫ eēt quātitatis tamē ē in ſpāli nociu⁹. peccās aūt in quāto ſpeciali

Et nō ſolum hoc verificat de eūatione artificiali per medicinā: ſꝫ ēt de euacuationib⁹ ſpontaneis ⁊ per nām: vt vult idē Hyp. in codeꝫ affo. allegato a magiſtro.

UVA. BHSC. IyR_006_1

ciali ē qui dato ꝙ eēt alteriꝰ qualitatis ſtante quātitate ī eo loco vbi nūc ē eēt nociuus. In quāto aūt gnāli peccat oīs humoꝛ malus quātꝰ ⁊ ī quali gnāli ſilr. Et iō quilibet peccās ī quāto peccat ī quali ſaltē gnāli. Et quilibet peccās ī quali peccat ī quāto gnāli. Sꝫ nō eſt incōueniēs aliquē hūoꝛē in foꝛte nūc peccare ī quāto ſpāli ſuꝑfluo ⁊ qui a caliditate ſuꝑflua ꝑ totā hoꝛā calefiet ⁊ augmētabit̃ ⁊ ī fine peccabit ī quātitate diminuta ⁊ caliditate diminuta.

¶ Tertio nota ꝙ Aui. dicit vnam intētionē circa hoc ꝙ euacuet̃ hūoꝛ qui ē eūandus ⁊ nō dicit peccans ī quali. ⁊ iō Hypo. loco allegato dixit: qualia oꝫ purgari. ⁊ ratio ē qꝛ nō quilibet hūoꝛ peccās ī quali ſpāli notabili peccato ē dignꝰ eūari queādmodū ē de ſanguine colerici aut flegmatici febꝛiētis tertiana pura cū paucitate ſanguinis ⁊ īflāmatione colere: aut quotidiana de flegmate crudo cuꝫ ſanguīs paucitate. Ille eīm ſanguis ita peccat cū ſit pꝛeternālr calidus ꝙ eo mediante defert̃ ad mēbꝛa febꝛis: tñ nō ē eūandus. Et iō dicit Aui. ꝙ intētio ē euacuare illuꝫ qui peccat ſi ſit eūandus: īmo cōcedēdū ē ꝙ eſt aliquis humoꝛ peccās peccato īferente nocumētū moꝛtale ꝗ tñ ſi poſſet euacuari abſqꝫ alio humoꝛe ⁊ ſpū nō eſſet eūandus. ⁊ multa talia vide pª affo. affo. 2º. Ex his ꝯpꝛehendit̃ inſufficiens illoꝛum poſitio qui dicunt omēꝫ humoꝛem peccantem ſi non fieret alteriꝰ euacutio eſſet dignū euacuari: īmo peccās etiā peccato incoꝛrigibili multotiēs non eſſet euacuandus qñ ibi non eēt melioꝛ: vt multotiēs de lepꝛa accidit in ſanguīe. Ex his ēt apparet verificatio antecedentis ſcḋi. Nā ſi humoꝛ ita peccat vt ſit dignus eūari: tunc pꝛeſentialiter nocumētū remanētie eſt maius iuuamēto. ⁊ iō ꝑ remotionē eiꝰ niſi aliud accñs eueniat remouet̃ plus de nocumēto: ⁊ ꝑ ꝯſequēs infirmꝰ alleuiat̃ a ſuis nocumētis. ⁊ hoc ē qḋ Aui. vocat hic trāquillitatē. Hyp. aūt loco allegato dixit: conſerētia ⁊ addidit bonā tollerātiā: qꝛ duꝫ nō euacuat̃ niſi ſit dignus eūari: iuuamētuꝫ eſt maius nocumēto ⁊ nocumētuꝫ nō eſt notabile: ⁊ iō bñ tollerat̃ qꝛ infirmꝰ non multū debilitat̃. ¶ Ulterius nota ꝙ lꝫ nō euacuet̃ humoꝛ dignus eūari: tñ multotiens accidit ex alia re ꝯiuncta cū tali eūone nocumētū occultās iuuamētuꝫ euacuatōis illiꝰ: vt in caſibꝰ narratis ab Aui. in lr̃a. Nā multotiens cū maligno humoꝛe eūatur bonus aut reſoluunt̃ ſpūs vñ mēbꝛa q̄ ſunt receptacula relaxant̃ ⁊ ſequit̃ ſincopis aut alia accñtia. ſ. debilitas: ⁊ qñqꝫ accidit ī trāſitu humoꝛis eūandi per viā aliquā ꝙ nocumentū infert in via: qñqꝫ ēt ex motu agitant̃ hūoꝛes aut ſpūs ⁊ accidunt calefactio ⁊ febꝛis: ⁊ qñqꝫ ex nā farmaci cū quo fit eūatio accidit ideꝫ: vnde oīa iſta ſūt ꝯſiderāda ⁊ ꝓ poſſe in eūone vitāda niſi ꝑꝑ neceſſitatē maioꝛis iuuamēti: vñ cauere debemus quātū poſſumꝰ ꝯueniētē hūoꝛis eūoneꝫ: ⁊ ne trāſeat ꝑ mēbꝛa q̄ hēat ledere: ⁊ ne ī coꝛpoꝛe fiāt aut ī farmaco nocumenta merito quoꝝ ſit apta ſequi aut febꝛis aut alia īflāmatio vel debilitas ſm qḋ in partibꝰ ꝯſiderat̃. ¶ Ulterius nota ꝙ cuꝫ talia accidētia ſuperuenerint ipſa occultant iuuamentū euacuatōis. ſed illis remotis niſi aliud ſuperuenerit: tunc percipit̃ euacuatōis iuuamentū.

Et ſecūda eſt ꝯſideratio partis ſue declinatōis ſicut nauſea que vomitu mundat̃: ⁊ moꝛdicatio in vētre que ventris ſolutōe remouetur.

¶ Hic declarat ſcḋaꝫ ītentionē dicēs ꝙ ſcḋa intētio ē eūare humoꝛē per viā ad quā declinat ꝓpoꝛtionatā nāe ſicut nauſea que mūdat̃ vomitu: ⁊ mā faciens moꝛdicatōeꝫ in ventre q̄ remouet̃ ſolutōe vētris. vñ Aui. inuit ꝙ medicus dꝫ eūare per partē ad quā nā declinat humoꝛeꝫ. ⁊ eſt ſnīa pꝛime ꝑticule affo. Que ducere oꝫ. ¶ Ubi nota ꝙ ī humoꝛibus eūandis qñqꝫ ītēdimꝰ ſolū ad eūonē: ⁊ tūc hꝫ veritatē regula Aui. hic ⁊ affoꝛiſmꝰ allegatꝰ. Qñqꝫ ītendimus ad diuerſionē: ⁊ tūc non oꝫ eūare per loca ad que nā declinat humoꝛē: īmo ad oppoſitū. ⁊ hoc hēbis īfra ī pleriſqꝫ locis. ⁊ Gal. dicit 13º de īgenio ſanitatis idē. ¶ Nota 2º ꝙ qñqꝫ loca per q̄ nā euacuat vel ad que nā declinat ſunt ꝯueniētia illi eūoni ⁊ qñqꝫ non. Sꝫ ſi loca fuerint cōuenientia per illa fieri dꝫ. Si aūt non: dꝫ ꝓhiberi potius illud qḋ nā tentat. vnde Hyp. dixit: Et per cōueniētia loca ducere. que aūt ſunt ꝯueniētia loca ſtatiꝫ dicet̃.

Et tūc vtēdū ē diuerſione illiꝰ materiē ab illis locis potius ꝙꝫ per ea purgare: ⁊ dicit̃ tūc mā declinare ad talia loca duꝫ declinat ad mēbꝛum nobiliꝰ vel ſuſpectꝰ ad patiēduꝫ: vt dicit Gal. in cōmēto allegato affo. Que ducere oꝫ quare ⁊c̃.

Et tertia ē mēbꝛū egreſſiōis eiꝰ a ꝑte declinatōis eiꝰ ſicut baſilica dxtra ī egritudīe epatis ⁊ nō cephalica dextra: quoniā ſi erroꝛ ꝓuenerit ī tali q̄le ē illḋ qñqꝫ ſequet̃ ide timoꝛ. ⁊ oꝫ quidē vt ſit mēbꝛū egreſſiōis ignobiliꝰ illo a quo fit eūatio ne materia ad illḋ declinet qḋ ē nobiliꝰ. Opꝫ ꝑterea vt ſit eiꝰ exitꝰ naturalis ſicut mēbꝛa vrine gibboſitati epatis ⁊ īteſtina ꝯcauitati ipſiꝰ: eſt tñ cum mēbꝛū a quo expellit̃ eſt ipꝫ mēbꝛū ꝑ qḋ eūatio faciēda ē: ſꝫ ē ī ipſo egritudo vetꝰ aut recēs ꝑꝑ quā ē timēdum de curſu humoꝝ ſuꝑ ipꝫ. Ipſi ergo ad aliud qḋ ſit melius trāſponēdi ſunt: ⁊ ē ēt cū ex ſuperatiōe humoꝝ timet̃ ſuper ipꝫ egritudo ſicut cum tractus ſit ab oculo ad gulā: quoniā timet̃ ne illi qñqꝫ ſuperueniat ſuffocatio: ideo quale eſt huiuſmodi ſuauiter ⁊ molliter fieri debet.

¶ Hic narrat tertiā rē ad quā medici hñt ītentionē ī euacuatiōe. ⁊ diuidit̃ ī duas. Nā pꝛio facit hoc. 2º ꝓbat vnū ſuū dictū. 2ª ibi: nā quidē. ¶ Dicit pº ꝙ tertia res quam ītēdimus ī eūatione ē ꝙ mēbꝛū per qḋ fit eūatio ſit cōueniēs illi eūationi. Eſt aūt cōueniēs qñ in eo cōiungūt̃ quīqꝫ cōditiōes. pª ꝙ mēbꝛū egreſſiōis ſit a parte ḋclinationis eius. ſ. hūoꝛis eūandi. i. ſit ad qḋ facilr̃ declinat talis hūoꝛ. aut ſꝫ qḋ exponit Dy. hēat ad humoꝛē eūandū declinationē rectā. i. viā recti inceſſus vel vicinā rectitudini ſicut baſilica dextra ī eūando humoꝛes ab epe. Nam ſi erret̃ ī tali quale ē iſtud qñqꝫ ex illo ſequit̃ timoꝛ. Et cauſa ē qꝛ nō eūat̃ illud qḋ oꝫ eūari niſi tāta facta eūatiōe vt ide virtus nimis debilitet̃. Scḋa cōditio eſt ꝙ mēbꝛuꝫ ꝑ qḋ fit eūotio ſit ignobiliꝰ mēbꝛo a quo fit eūatio ne mā declinet ḋ ignobilioꝛi ad nobiliꝰ. Tertia ꝯditio ē ꝙ ꝑ illḋ mēbꝛū illi hūoꝛes ⁊ ī tali loco peccātes ſoleāt egredi nāliter. Nā mēbꝛa vrine euacuāt mās gibboſitatis epatis ⁊ īteſtina ꝯcauitatis eiꝰ. Quarta cōditio ē ꝙ nō ſit ī mēbꝛo egritudo vetꝰ aut noua ꝑꝑ quā ſit timēdū de curſu humoꝛuꝫ ſuꝑ illo mēbꝛo. nā qñ eſt ita: humoꝛes ſunt trāſponendi in ſuō motu ad aliud mēbꝛum qḋ ſit melius. Quinta cōditio ē ꝙ nō ſit periculū ī tractu humoꝛis ad mēbꝛuꝫ ita ꝙ humoꝛes ſuperēt virtutē mēbꝛi ⁊ faciāt ī eo egritudinē. Sicut qñ trahitur hūoꝛ de oculo ad guttur ꝑ gargariſmata quoniā timet̃ ne ſuperueniat ſ̄ffocatio ꝓpter ſquinātiaꝫ. Et qñ ē opoꝛtunū fieri ꝙ ad tale mēbꝛū trahat̃ oꝫ ꝙ fiat ſuauiter ⁊ molliter. ¶ Ubi nota pº ꝙ iſta 3ª res ad quam intēdūt medici lꝫ multū videat̃ cōuenire cū 2ª qꝛ vtraqꝫ ē de mēbꝛo ꝑ qḋ fit eūatio: tñ ē dr̃ia. Nam ī 2ª cōditiōe cōſiderat̃ declinatio hūoꝛis ad mēbꝛū. ī hac cōſiderat̃ diſpō mēbꝛi ⁊ habitudo eiꝰ ad illud a quo dꝫ fieri eūatio vel dꝫ euacuari. ¶ Circa primā tñ cōditiōeꝫ cōſidera ꝙ lꝫ multotiēs ab humoꝛe leſio ſit ꝑciſe ī vno mēbꝛo verbigr̃a ī capite nō opoꝛtet ꝙ ſemper fiat eūatio per mēbꝛuꝫ recte declinatiōis ad illud. Naꝫ ſtante ī toto repletiōe ſanguīs doloꝛe nō exiſtēte niſi in capite: tūc pº flobothomamus baſilicā aut cōem: vt dicūt Me. ⁊ Aui. ī caplis de cura mlie ⁊ manie. ⁊ ſilr qñ intēdimꝰ eūare ⁊ cū hoc diuertere. ſꝫ veritatē habꝫ vbi ab illo ſit ītētio euacuādi ⁊ nō ab alijs nec ſit intētio diuertēdi. Secūda aūt ꝯditio obſeruat̃ ꝑcipue qñ in mēbꝛo per qḋ fit eūatio dꝫ figi mā: ſed de hoc alibi. Tertia cōditio ē clara qꝛ ſi ſit via nālis exitus erit cōueniens. ¶ Nota tñ ꝙ nō oīum materieꝝ que ī gibbo epatis cōtinētur cōueniēs via exitus ſit via vꝛine. Nā cū ſunt multe ⁊ groſſe cōueniētius eūant̃ ꝑ ſeceſſuꝫ. Quarta cōditio ītelligit̃ vbi foꝛtioꝛ īdicatio eēt de faciēdo illā eūationē ꝑ illū locū quē dimittemꝰ. Et cū eadē limitatiōe ītelligit̃ quinta vt pꝫ pª tertij illo. c. cū materiā.

Poteſt ab ignobili ꝑ nobile fieri euacuatio nō tāqꝫ per viaꝫ ſed tanquaꝫ per terminuꝫ.

Natura quoqꝫ plerūqꝫ taliter operat̃ ⁊ euacuat non per parteꝫ qua cōſueuit ideo vt mēbꝛum cuſtodiat cum debile fuerit: ⁊ plerūqꝫ etiā eſt vt ſit illud qḋ natura euacuat partis longinque ⁊ oppoſite ⁊ remaneat cum ipſo ambiguitas ſicut cuꝫ a capite ad anum aut crus aut pedeꝫ euacuat: non eniꝫ pꝛo certo ſcitur ſi ex toto ſit cerebꝛo aut ex vno ventriculo.

¶ Pꝛobat quartā cōditionē intēdi a medico per operationē nāe dicēs ꝙ nā plerūqꝫ taliter oꝑat̃ ꝙ ꝓpter cauere nocumētū mēbꝛi debilis euacuat per ꝑtē conſuetā. Et in iſto cāu cōtingit ꝙ illud qḋ nā eūat ſit per partē nō cōſuetam ⁊ per ꝑtē longinquā ideſt a ꝑte longinqua ⁊ oppoſita ⁊ remaneat ābiguitas ī tali oꝑe ſicut videt̃ qñ nā a capite ad anū aut ad crus aut ad pedē trāſmittit mām: tūc eiꝫ ꝓ certo neſcit̃ vtrū a toto capite fluat vel ab vno vētriculo. Ex quibꝰ apparet ꝙ cū medicꝰ ḋbeat eſſe īmitatoꝛ nāe ꝙ ipe aliqñ dꝫ cōſuetā viā dimittere ꝓpter egritudinē ī ea exiſtentē ꝑꝑ quā lederet̃ mēbꝛū. Cōtra tamē hoc videt̃: qꝛ nāliter mēbꝛa foꝛtia trāſmittūt ad debilia: vt pꝫ ex Gal. 2º de differētijs febꝛiū. c. vltimo. ⁊ 3º nāliū virtutū. Si ergo ī mēbꝛo accidit debilitas nā mēbꝛoꝛuꝫ alioꝛū magis īclinabit̃ tranſmittere ad ipꝫ. Hic dicit̃ ꝙ mēbꝛa foꝛtia ad debilia mittūt. ſꝫ debilia aliqñ magis conant̃ reſiſtere ne recipiāt ꝙꝫ nō debilitata ꝓpter magnū nocumētū doloris qm̄ materie recepte facerent. Unde videmus ꝙ ſtante vlcere ī pꝛicipio meri acuto multotiēs ſi volumꝰ nō poſſumus deglutire. Sꝫ ſi nō ſit maioꝛis conatꝰ debile magis recipit: aut ſi plus facit debilitas ad impotētiā reſiſtendi ꝙꝫ conatꝰ ad reſiſtēdū. Sꝫ tibi dimitto ꝯſiderationē ꝑticulariū caſuum in quibꝰ hoc accidit: cū ſm Aui. membꝛa dolētia facilius recipiūt vt hēbitis infra. ¶ Debes auteꝫ ꝯſiderare nō ſolū mēbꝛi dolētis diſpōneꝫ: ſꝫ ēt mēbꝛi mittētis oꝑationē vel paſſionē. ¶ Ulterius nota ꝙ ad lōginqua ꝓpter tales ⁊ multas alias cāas qñqꝫ nā euacuat ita vt relinquat̃ ābiguitas nō ſolum vtrū ab vno vētriculo vel ab alio cerebꝛi eueniat mā: ſed vtrum ab alio mēbꝛo: remoto a cerebꝛo. ⁊ hoc voluit Aui. ¶ Et tu ēt nota quō mēbꝛa conueniētia Aui. limitauit per ꝯditiones poſitas a Gal. ī ꝯmēto illiꝰ affo. Que ducere oꝫ. ⁊ aliq̄ dedit ibi notanda.

Stāte doloꝛe in iteſtinis vel habitudine ad doloꝛem ex diaria exiſtente tñ obtalmia in oculis nō ceſſabimꝰ huiuſmodi fluxum ꝓuocare vt oſtendit Hypo. ſexta ꝑticula affoꝛiſmoꝝ affo. illo. xvij. In oculis patiēteꝫ diariā accepi bonū. ⁊ lꝫ hoc ſit cōtra quartā ꝯditionē dignitas tñ operatōis oculi ad hoc nos cogit. ſimilē ſententiā inuit Aui. tertia tertij. c. de obtalmia.

UVA. BHSC. IyR_006_1

Et quarta quidē eſt hora eũonis ipſius. nam dicit Gal.penitꝰ ꝙ ĩ cronicis egritudinibꝰ maturatio tãtũ ⁊ nihil plus expectãda ē. Et tu quidē iã ſciuiſti quid ſit maturatio: ⁊ añq̃ꝫ euacues pꝰ maturatõeꝫ ex ſubtiliatiuis ĩ potu tribuere ȯbes ſicut aquã iſopi ⁊ halaſe ⁊ ſeminũ.

¶ Hic ponit quartã rem ad quã intẽdit medicꝰ. Et diuidit ĩ duas ptes. Prĩo ponit hãc rē. Scḋo remouet dubia q̃dã ĩcidentia circa alias res. 2ª ibi: ⁊ ſcias ꝙ materie eũatio. Prĩa iteꝝ ĩ duas. Nã prĩo facit qḋ dictũ ē. 2º remouet dubiũ circa hãc rē. 2ª ibi: ⁊ ſilr. Prima ĩ duas. pº oñdit ꝓpoſitũ cũ hũor ē ſparſus ĩ ãbitu totiꝰ vel ĩ venis. 2º qñ ē ĩ vno mẽbro. 2ª ibi: cũ aũt humor. Prĩa ĩ duas. pº docet quid circa hãc quartã rem intẽdimꝰ ĩ cronicis morbis. 2º quid ĩ acutis. 2ª ibi: ſed in acutis. Prĩo dicit quattuor. Primũ eſt ꝙ quarta res ad quã eſt intentio in euacuatione eſt eius hora. Dicit 2º explanãdo hoc in cronicis morbis ꝙ Gal. dicit ĩ illis morbis ē tm̃ expectãda maturatio ⁊ nihil plus. Tertio dicit ꝙ tu iã ſciuiſti quid ē maturatio. Quarto dicit ꝙ poſt maturatiõeꝫ ⁊ ante euacuationē debemus tribuere ĩ potu ſubtiliatiua ſicut aquã iſopi ⁊ halaſe ⁊ decoctionē ſeminũ. ¶ Ubi nota prĩo vt ſuperius dictũ ē ꝙ ꝑ cõſiderationē decē rerũ cognoſcimꝰ: vt Aui. docuit ſcire qñ eũari debet hũor. ⁊ hic dicimꝰ ꝙ vna ĩtẽtio ē hora eũationis. ⁊ docet hanc horã cognoſcere ex alijs q̃ꝫ ex his decē vt pꝫ. ⁊ videt̃ ꝙ ex illis nõ ſcimus qñ eũare oꝫ. Ad hoc rñdet Dy. ꝙ qñ eũare oꝫ: ĩportat tempus: ⁊ hoc vt ꝓpoſito attinet põt cognoſci duobꝰ modis. vno mõ gnãliter q: ſciat̃ qñ competit eũatio ⁊ qñ nõ. ſcḋo mõ ſpãliter ita ꝙ ſciat̃ ĩ quo tẽpore morbi cõpetat eũatio. Et hoc Aui. ponit in iſta ꝑticula. Et hoc qñ potius ꝑtinet qualitati: q: cognoſcit̃ per hũoris diſpõnē. Poſſumꝰ tñ dicere ꝙ per res decem ſupradictas addiſcimꝰ qñ eũare oꝫ: ⁊ que ſunt corpa indigẽtia euacuatiõe idest qñ ē indigẽtia eũatiõis. ꝑ hoc aũt qḋ hic dicit̃ cognoſcimꝰ non ſolũ qñ ē indigẽtia: ſed qñ ē cõueniẽs eũatio. Nam aliqḋ corpꝰ nũc indiget eũatione aliqua cui tñ nõ eēt cõueniẽs ꝙ nũc fieret. verbigrã ſit corpꝰ repletũ hũore malo nõ reducibili ſed ſit crudus groſſus quietus cũ canaliũ ſtrictura. ĩ iſto cãu iſte nũc indiget eũatione q: remotõe mali humoris: ſꝫ nõ ē ſibi nũc cõueniẽs talis eũatio q: ſi fieret eēt cũ maiori nocumẽto nũc q̃ꝫ eēt iuuamẽtũ. ¶ Nota 2º ꝙ ſꝫ Gal. ad debite regẽdũ corpꝰ requirit̃ cognitio q̃litatis ⁊ quãtitatis eiꝰ qḋ admĩſtrat̃ ⁊ ſm ipm tps nõ ē quid tertiũ diſtinctũ ab his vt dicit̃ 3º tractatu tegni: ſed cõprẽhẽſuꝫ in iſtis. Et iõ Aui. hic nihil dicit de tpe in cognoſcẽda hora eũonis: ſed de diſpõne hũoris ⁊ diſpõne corporis cui debet adminiſtrari talis eũatio. ¶ Nota 3º ꝙ ſenſus ſecũdi dicti ē ꝙ in cronicis oꝫ expectare maturatiõeꝫ ⁊ non opꝫ expectare aliud. ⁊ iſte ſenſus videt̃ clarꝰ: q: quãdo ē maturatio fiat euacuatio. Et appet maxime hoc per vnũ additũ ⁊ nihil plus. Aliqui tamē volũt ꝙ poſſit li tantũ ꝯſtrui cũ li egritudinibus ⁊ erit ſenſus ꝙ tantũ ĩ cronicis egritudinibꝰ ē expectanda maturatio. Mihi tamē videt̃ ꝙ li nihil plus eēt quaſi ſupfluũ. Et iõ puto ꝙ Aui. velit in cronicis expectare maturationē ⁊ quaſi non aliud. in acutis aut oꝫ expectare multotiẽs qḋ nõ ſit feruor magnꝰ morbi: ⁊ multotiẽs ꝙ videat̃ quid faciat nã in die crerica cũ ē valde ꝓpinqua que ĩ cronicis nõ expectat̃. ¶ Nota 4º ꝙ quid ſit digeſtio ē dictũ prima primi. c. de virtutibꝰ miniſtrãtibꝰ. Eſt eniꝫ digeſtio ꝑparatio ad digeſtionē ĩ nocitiuo nõ reducibili ad benignũ ſm modũ loquẽdi medicoꝝ: ⁊ ideo eſt tranſmutatio ſm quã mã ſit facilis egreſſionis a mẽbro in quo cõtinet̃. ¶ Quinto nota ꝙ lꝫ tã in acutis q̃ꝫ in alijs expectãda ſit maturatio niſi ꝓpter cãs dictas. minus tñ maluꝫ ē euacuare ĩ acutis añ digeſtionē q̃ꝫ in cronicis vt plurimũ: q: mã ē ſubtilior ⁊ per hoc eũationi paratior: ⁊ q: ſtimulãs virtutē agitat̃: ⁊ iõ facilꝰ eũat̃. ¶ Ultimo attẽde ꝙ Aui. videt̃ ĩcõueniẽter illã partē addere. Et antequã euacues poſt maturatõeꝫ ſubtiliatiui in potu tribuere debes. Nã ſubtiliatiua exhibẽtur ad ſubtiliãdũ: ſꝫ digeſtio materiei ĩ cronicis ē ſubtiliatio: ergo qñ ſubtiliatiua tribui debẽt nõ dꝫ eē poſt maturationē. Preterea hoc ē aliud ĩcõueniẽs q: ſi poſt maturatiõeꝫ debes tribuere ſubtiliatiua: ergo ĩ eũatione illa aliquid plus q̃ꝫ maturatio expectari dꝫ: puta illud qḋ debẽt facere ſubtillatiua poſt maturationē. Hic rñdet̃ ꝙ horũ verborũ ſenſus põt eſſe duplex. Primꝰ ꝙ non denotet̃ ſubtiliatiua debere adminiſtrari poſt maturatõeꝫ: ſed ãtequã euacues poſt maturationē. i. ãtequã facias illã eũationē que dꝫ fieri poſt maturationē q: cũ illis ſit digeſtio: ⁊ hic ſenſus ē clarus. Alius ſenſus põt eē denotãs hũc ordinē eē ſeruandũ ꝙ prĩo maturet̃. 2º exhibeat̃ ſubtiliatiua. 3º fiat eũatio. Et ſi hoc non intelligat̃ intẽdit Aui. in cronicis prĩo adminiſtrari debere maturatiua que tamē nõ ſunt multũ ſubtiliatiua ſicut aq̃ iſopi. nec cõi noĩe dicũtur ſubtiliatiua q: nõ fortiter ſubtiliant. talia enim fortia facerẽt mãꝫ ebullire ⁊ agitari ⁊ augmẽtari ⁊ reſoluerẽt ſubtile remanẽte groſſo ⁊ multas vẽtoſitates augerẽt ſi in prĩcipio exhiberent̃. ſed poſtq̃ꝫ iſta ſunt adminiſtrata antequã fiat eradicatiua eũatio debent tribui ſubtiliatiua fortia que hic ſcribũtur. Tũc eniꝫ mã ē ita ꝑata vt ſubtiliet̃ ꝙ nõ ita ebulliet ⁊ reſoluet̃ ꝑs ſubtilis dimiſſa groſſa ⁊ plerũq̃ꝫ tũc ē pacificata debito ꝓcedẽte regie. Ex q̃bꝰ pꝫ huiꝰ ſcḋi ſenſus vificatio q: nõ ĩtelligit̃ ꝙ iſta exhibeat̃ poſt ꝯpletã maturatõꝫ: ſꝫ poſt aliq̃lē.

Sꝫ ⁊ ĩ acutis etiã egritudibꝰ maturationē expectare meliꝰ eſt ⁊ ꝑcipue cũ quiete fuerit. Qḋ ſi mobiles fuerit: tũc ad eũandũ materiã feſtinare erit meliꝰ: qm̃ ĩpedimẽtũ motꝰ eius ē maius q̃ꝫ ſue eũonis añquã ipſa ſit matura ⁊ ꝓprie cũ humores fuerit ſubtiles: ⁊ ꝑciuue cuꝫ ĩ cõcauitatibꝰ venaꝝ fuerint ⁊ non in mẽbris ingredientes.

¶ In iſta parte facit qḋ dictũ ē dicẽs ẽt ꝙ ĩ acutis egritudinibꝰ eſt meliꝰ expectare maturationē ⁊ ꝑcipue cũ mãe taliũ morboꝝ fuerint quiete. ſed ſi fuerint mobiles meliꝰ ē feſtinare ad eũanduꝫ mãs: q: nocumẽtũ ſui motꝰ ē maius q̃ꝫ ĩpedimẽtuꝫ ſue eũonis ante digõnē: ⁊ ꝓprie ſi tales humores ſint ſubtiles: ⁊ magis ſi ſint in ꝯcauitatibꝰ venaruꝫ nõ egrediẽtes eas ad mẽbra. ¶ Ubi nota pº vnã eſſe cãꝫ ꝓpter quã oꝫ expectare maturatõeꝫ ante eũoneꝫ in cronicis ⁊ acutis. ſ. vt humor ſit obediẽs eũoni ⁊ ne ĩcõplete digeſtus remaneat agitatus. nã qñ hoc mõ remanet eſt magni nocumẽti: ⁊ qñ humor nõ eſt obediẽs nõ euacuat̃ ſine multo labore ⁊ multa eũone boni. Siguũ aũt ꝙ nõ debet eũari regulr̃ ante digõneꝫ eſt q: nã nõ facit bonã eũonem ante digõneꝫ nec in cronicis nec in acutis. Nam qñ facit criſiꝫ ante digõneꝫ: aut criſis eſt ad mortē: aut incõpleta: aut cũ ſeuiſſimis ⁊ prauis accñtibꝰ. qñ aũt eſt cũ ſignis cõplete digõnis: tũc eſt criſis bona. Et iõ cũ medicus ſit nature imitator faciet euacuatiõeꝫ poſt digõneꝫ regulr̃ tã in cronicis q̃ꝫ ĩ acutis ꝓpter cãm aſſignatã in ꝑcedẽti parte. Minus tñ nocumẽtuꝫ euacuãdi ante digeſtionē eſt in acutis alijs paribꝰ. ¶ Scḋo nota ꝙ egritudo dicit̃ q̃eta aut mobilis hic rõne cãe. que eiꝫ ē ab hũore quieto eſt quieta: ⁊ q̃ ab hũore mobili eſt mobilis. ¶ Tertio nota ꝙ quedaꝫ ſunt mãe multũ malignãtes ⁊ multe mobilitatis q̃ dicunt̃ furioſe a medicis. ⁊ cũ ꝑmanẽt in corpore eſt ꝑiculũ ne moueant̃ ad aliqḋ principale mẽbruꝫ: ⁊ iõ ad hoc vitãdũ accelleramꝰ eũoneꝫ. Timemꝰ eiꝫ multo maius periculuꝫ de ꝑmanẽtia materiei ĩ corpore q̃ꝫ ĩ eũatione eius ante digeſtionē vt Auic. dicit. Accidit etiã ꝙ talē mãm mobilē medicina facilius trahit q̃ꝫ ſi eēt fixa: ⁊ cũ hoc mẽbrorũ virtꝰ expulſiua adiuuat ad hãc mãm expellẽdã. ¶ Nota 4º materierũ furioſarũ quedã ſũt ſubtiles ⁊ quedã groſſe: q̃ꝫuis enim plurimũ mã groſſa ſit minꝰ mobilis q̃ꝫ ſubtilis. data tñ nõ incõuenit aliquã groſſaꝫ ꝓpter ſui malignitatem cũ ē in venis vbi ſunt late vie eē mobilē de mẽbro ad mẽbrũ. Nã materia podagre que eſt groſſa percipit̃ tñ multotiẽs de mẽbro ad mẽbrum pelli. ſubtiles ſunt facilioris eũonis q̃ꝫ groſſe alijs paribus. Et iõ Auic. dicit ꝙ ꝑcipue debẽt eũari materie mobiles q̃s hic ĩtelligimꝰ furioſas qñ ſunt ſubtiles magis q̃ꝫ qñ ſunt groſſe. Dynꝰ aũt hic dicit ꝙ oĩs furioſa mã eſt ſubtilis. ⁊ hoc ego non puto verum. ¶ Dicit 2º ꝙ ĩter iſtas ſubtiles ille que ſunt magis ſubtiles ſunt facilioris eũationis. ⁊ hoc ē qḋ voluit Auic. hic. Sed hoc ſcḋꝫ ē expreſſe ꝯtra Aui. pª quarti. c. de cura putridaꝝ in gnãli vbi vult aliquē humorem eſſe ineptũ euacuari ꝓpter ſubtilitatē q: facile imbibit̃. ⁊ ideo talis nõ eſt facilioris eũationis q̃ꝫ minus ſubtilis. ¶ Quinto nota ꝙ humores qui ſunt ĩ venis facilius eũant̃ q̃ꝫ humores qui ſunt in mẽbris imbibiti aut in iuncturis: non tamē facilꝰ q̃ꝫ illi qui ſunt in cõcauo ſtomaci vel inteſtinorũ. Illorum ergo in cõparatiõe qui ſunt ĩ membris longinquis a vijs ductuũ vult Aui. ꝙ precipue hi qui ſunt in venis. ſ. in cõcauitate earũ facilꝰ eũent̃ q̃ꝫ hi qui ſunt ĩ mẽbris. Tu vero ſi vis videre vtrũ digeſtio humoris ĩ nocitiuo ſit pura ĩgroſſatio ſubtilis: aut ſubtiliatio groſſi: aut ĩciſio viſcoſi: vide ea que dixi prima particula affo. affo. 22º.

Cuꝫ autē hũor ĩ vno fuerit mẽbro ꝯprehẽſus nullo mõ moueat̃ donec maturet̃ ⁊ eſſentiã hẽat ꝑatã quã tu ſciuiſti ĩ ſuo loco. Et ſilr cũ ñ fuerimꝰ ſecuri ꝙ virtꝰ vſq̃ꝫ ad maturitatis horaꝫ ꝑduret: eũabimꝰ eã poſtq̃ꝫ nobis cauerimꝰ vt eiꝰ ſubtilitatē ⁊ groſſitiē ſciamꝰ: qm̃ ſi ſpiſſa fuerit ⁊ groſſa ĩpaꝫ mouere nõ debemꝰ niſi poſt ſubtiliatõeꝫ. Eiꝰ vero groſſitiē cognoſcemꝰ ꝓpterea ꝙ faſtidiũ preteritũ iaꝫ ꝑceſſit aut ſub ipocũdrijs dolor extẽſiuus aut aduẽtus ãꝑatis in interioribꝰ. Qḋ aũt magis cuſtodire debemꝰ ⁊ huiuſmodi diſpõne ē hitudo cãnaliuꝫ ne ĩpi ſint clauſi: ⁊ poſt hoc quidē totũ poſſibile tibi erit vt añ maturatõeꝫ vẽtrē ſoluas. Et ſcias ꝙ materiei eũatio ⁊ ipſiꝰ de ſuo loco eradicatio ē ſꝫ vnũ duoꝝ modoꝝ. Unꝰ eoꝝ ē ꝑꝑ artationē q̃ ſit ad lõginquã diuerſitatē: ⁊ alter ꝓpter eã q̃ ad ꝓpinquã. Et ſuaꝝ quidē horarũ dignior ē cũ ĩ corpore nullo mõ ē alicuiꝰ materiei repletio. Ponamus itaq̃ꝫ ꝙ ab ore viri ſuperiꝰ multus fluat

sanguis

Et eſt in ꝯmẽnto. xiiij. prime particule affo. Similem ſentẽtiaꝫ etiã dicit in ꝯmẽto illius affo. ſcḋe particule. Corpa vbi q̃s vult purgare.

UVA. BHSC. IyR_006_1

ſanguís ⁊ ab emoꝛoidibꝰ mulieris ſupflue fluat ſãguis.
Unũ itaqꝫ duoꝝ faciemus aut trahemꝰ ꝑ declinationẽ
q̃ fit ad ꝓpiquã diuerſitatẽ: ⁊ opoꝛtebit tũc vt materiã
ad nares declinemꝰ faciẽdo ſanguineꝫ ex naribꝰ fluere
⁊ ĩ altero ad matriceꝫ ꝓuocãdo mẽſtrua: aut ſi voluerí
mꝰ ad lõgiquã diuerſitatẽ attrahere eũabimꝰ in pꝛimo
ſanguinẽ a venis ⁊ locis q̃ ſũt in iferioꝛe pte coꝛpis: ⁊ ĩ
ſcdõ a venis ⁊ locis q̃ ſunt in ſupma parte coꝛpoꝛis.
❡ Docet modũ eligẽdi hoꝛã qñ humoꝛ ẽ cõpꝛehenſus in
vno mẽbꝛo dicẽs ꝙ qñ humoꝛ fuerit cõpꝛehenſus in vno
mẽbꝛo nullo mõ dꝫ moueri donec maturet̃ ⁊ hẽat eſſen/
tiam tẽpatã de qua eẽntia tempata iã ſciuiſti in alio loco.
❡ Ubi nota ſm cõiter exponẽtes ꝙ materia que ẽ cõten
ta ĩ vno mẽbꝛo intelligit̃ ab Aui. mã faciẽs apa ĩ dtermina
to mẽbꝛo vel flegmonẽ vel ſimile aliud. Et idẽ ĩnuit Auic.
ꝙ talis mã nullo mõ moueat̃ añ maturationẽ. Et ẽ cã qꝛ
cũ mã ſit fixa ⁊ vnita ĩ vno loco ſtricto ⁊ ſtrictarũ viarum
ſicut ſunt poꝛi: videt̃ ꝙ nõ tam faciliter debeat educi. Uñ
Hyp. 4° regiminis acutoꝛũ: dicit quecũqꝫ mẽbꝛa flegmo/
nantia in pꝛincipio nõ curãtur cũ farmacia.

Qꝛ ſciuiſti ex pꝛia pꝛimi doctrina ſexta c. iij. verbo illo. Digeſtiua vero ⁊c̃.

Poſſet ẽt exponi d mã quieta ĩ vno mẽbꝛo collecta oppoſita furioſe nõ tñ faciẽte nec apta facere apoſtema: ⁊ hoc eſt veriſimilius cũ ſuperius de furioſa meminerit.

Similiter remouetur dubium.

Nam dubi/
tatur vtrũ in alio cãu q̃ꝫ cũ mã ẽ mobilis ſit eũandũ ante
digeſtionẽ? Rñdet̃ ꝙ ſicut oꝫ eũare qñ mã ẽ furioſa ⁊ mo
bilis ita oꝫ eũare qñ nõ fuerimus ſecuri ꝙ virtꝰ poſſit du
rare vſqꝫ ad hoꝛã integre maturatiõis. ❡ Sed oꝫ ꝙ hic
duo ↄſideremꝰ. p° vtrũ materia ſit groſſa aut ſubtilis. qđ
ſciemus cõſiderãdo vtrũ p̃ceſſerit faſtidiũ ⁊ ĩ ipocũdrijs
doloꝛ extẽſiuus aut apa euenerit in ĩterioꝛibꝰ. nã tũc nõ ẽ
eũanda niſi poſt ſubtiliatõeꝫ. Scđꝫ qđ oꝫ magis ↄſidera/
re ẽ habitudo canaliũ ⁊ viarũ ꝑ quas mã dꝫ trãſire ⁊ eua
cuari. Nã ꝓuidẽdũ ẽ ne ſint clauſi: ⁊ poſt hoc totũ erit ti
bi poſſibile ſoluẽ ventrẽ. ❡ Ubi nota ꝙ qꝛ Aui. ſolũ poſue
rat vnũ cãuꝫ purgãdi añ digeſtionẽ. ſ. materiei furioſita/
tem: ideo ne quis credat ꝙ nullo alio mõ hoc fieri debeat
dixit hic cañ. generalẽ. Et ẽ ꝙ diſpõ ſit talis ꝙ nõ ſumus
ſecuri ꝙ virtus poſſit vſqꝫ ad ſtatũ ⁊ materiei digeſtiõeꝫ
ꝑdurare cũ tali moꝛbo ⁊ ſequẽtibꝰ ad ipm: ꝓpter hoc eiꝫ
eũamus ĩ furioſa mã. ❡ Scđo nota ꝙ alij tres modi po/
nũtur ĩ ſpãli a doctoꝛibus ꝓpter quos nõ ſumus ſecuri.
Unus ẽ materie multitudo vt plerũqꝫ ẽ in pꝛincipio fleg/
matice. Scđs eſt materie occulta malignitas ⁊ venenoſi/
tas vt in peſtilẽtialibꝰ. Tertiꝰ ẽ locus vbi peccat mã vt in
apoplexia ⁊ ſquinãtia. Sꝫ ꝓ maioꝛi hoꝝ cañ. declaratio/
ne dubitatur.

Nota ꝙ materierum clauſarũ in vno mẽbꝛo: quedaꝫ magis indigẽt extractõe q̃ꝫ maturatõe ⁊ euacuatõe ſicut ẽ mã heriſipile. quedaꝫ magis indigẽt maturatõe ⁊ eũone vt materia flegmonis: vt dicit Aui. tertia quarti tractatu pꝛio. c. v. vñ in mã heriſipile opꝰ ẽ pꝛius euacuare: deinde infridare: vt idẽ eodeꝫ tractatu. c. iij. dico ẽt ꝙ maturatio pfecta hũoꝛis in vno mẽbꝛo cõpꝛehẽſi nõ eſt expectãda añ digeſtionem vbi ſit timoꝛ ipſius ex cõuerſione in ſaniẽ: vt pꝫ ĩ pleureſi. ſed bene expectãda ẽ maturatio que ẽ quedã habilitatio ad expulſioneꝫ etiam ſi talis humoꝛ clauſus nõ daret inducias ad maturationẽ pꝛemittẽdã: tũc eſſet euacuatio: vt pꝫ in ſquinãtia.

Utruꝫ materia ſit euacuanda ĩ moꝛ

bis ante digeſtionẽ mãe ↄpletaꝫ? Arguit̃ pꝛio ꝙ nõ. Nã/
quã nã in bona ⁊ laudabili eũatiõe euacuat añ digeſtionẽ:
ergo nec medicꝰ añ digeſtionẽ debet eã eũare: cuꝫ medicꝰ
ſit imitatoꝛ nature bene ⁊ recte opantis: vt p° affo. cõmẽ/
to 2° ⁊ pª q̃rti de cura putridaꝝ ⁊ multis alijs locis. ❡ Cõ
firmat̃ 2°. Humoꝛ ↄpꝛehẽſus ĩ vno mẽbꝛo nõ ẽ mouẽdus
aliquo mõ vſqꝫ ad digeſtionẽ cõpletã: ergo nec hũoꝛ ſpar/
ſus in toto. Patet aſſumptũ parũ ãte ex Aui. Et tenet cõ
ſequẽtia qꝛ multo minoꝛa nocumẽta ſequũtur ex eũatiõe
humoꝛis ĩ mẽbꝛo vno exiſtẽte alijs paribꝰ q̃ꝫ in toto: cum
iſta ſit multo amplioꝛ mã ⁊ eius agitatio magis nociua ⁊
virtus minus foꝛtis. Nec valet ſi dicat̃ ꝙ humoꝛ cõpꝛe/
henſus ĩ vno mẽbꝛo facit minus piculũ q̃ꝫ ſi in toto ↄpꝛe/
hẽdat̃. Nã in vno mẽbꝛo cõpꝛehẽſus facit piculũ moꝛtis
repẽtine vt in ſincopi ⁊ apopleſia ⁊ ſquinãtia ⁊ ſimilibus.
❡ 3° humoꝛ groſſus crudus nõ ẽ eũandus añ cõpletaꝫ di/
geſtionẽ ꝓpe ſtatuꝫ: ergo nec vnq̃ꝫ ãte digeſtionẽ ↄpletã.
Aſſumptũ pꝫ pꝛima quarti. c. de cura putridarum ĩ gnãli
cũ dixit: Et ſi non ẽ digeſtus non moueas niſi ĩ pꝛincipio.
apud ſtatũ vero nõ moueas niſi nã vincat ⁊ digerat. Cõſe
quẽtia tenet qꝛ ĩ illa hoꝛa ãte digeſtionẽ ẽ maxime digeſta
mã ⁊ minus ĩnobediẽs: iõ minus nociua ẽ eũatio eius ⁊ fa
cilioꝛ. ❡ Cõfirmat̃ in moꝛbis quoꝛũ mã ẽ groſſa ante eiꝰ
eũationẽ: aliqua digeſtio aut ſaltẽ ſubtiliatio ẽ expectãda:
vt patet pª quarti. c. de flegmatica. ⁊ ex Auer. 7° colliget.
ergo minus nociua ẽ eũatio poſt talẽ paruã digeſtionẽ ⁊
facilioꝛ. Sꝫ qua rõne ẽ iſta facilioꝛ aut minꝰ nociua q̃ꝫ dũ
materia erat cruda: eadẽ ratõe ẽ eũatio facta facilioꝛ ĩ aug
mẽto q̃ꝫ in pꝛĩcipio: ergo ĩ augmẽto ẽ faciẽda. ⁊ per idẽ ꝓ/
pe ſtatũ magis q̃ꝫ in pꝛĩcipio. Minoꝛ pꝫ qꝛ ĩ quolibꝫ iſtoꝝ
tẽpoꝛũ virtꝰ cõſtat: vt ſuppono: ſꝫ ẽ paꝝ debilioꝛ q̃ꝫ añ ⁊ mã
magis pata. Sꝫ ĩ equali tpe ↄtinue poſt pꝛincipiũ ĩ ſalubꝛi
plus de digeſtiõe ⁊ p̃paratiõe acquiſiuit vt materia com/
mota ſit a maioꝛi ꝓpoꝛtiõe. Igit̃ ſemp ĩ pte poſterioꝛi erit
meliꝰ p̃parata q̃ꝫ ĩ añrioꝛi. Foꝛte diceret̃ ꝙ lꝫ mã ſit facta
obediẽtioꝛ tñ virtꝰ ẽ facta debilioꝛ in maioꝛi pꝛopoꝛtione.
Sed ↄtra magis facta eſt mã ꝓpoꝛtionata ⁊ obediẽtioꝛ q̃ꝫ
virtꝰ facta debilis (ſi moꝛbꝰ ſit ſaluber) ⁊ ꝑ ↄſequẽs me/
lius poterit eũari ꝑ farmacũ debile. ❡ Quarto arguit̃. in
pꝛĩcipio exñte mã furioſa nõ ẽ faciẽda eũatio eradicatiua:
ergo nec minoꝛatio: ergo nulla. Pꝫ aſſumptuꝫ per oẽs ex
modo loquẽdi Auic. quarti. c. de flegmatica. vbi dicit ꝙ
oꝫ vt euacuet̃ de mã aliqđ ⁊ in reliquo expectat̃ quouſqꝫ
digerat̃. Cõſequẽtia arguit̃ qꝛ ſequit̃: eſt facienda eũatio
minoꝛatiua: ergo ꝑ illã creſcit maioꝛ ꝓpoꝛtio virtutis ad
mãm: ergo illa facta virtꝰ ad mãm maioꝛẽ hꝫ ꝓpoꝛtionẽ:
ergo tũc per equalẽ eũoneꝫ codẽ mõ creſcit ꝓpoꝛtio virtu
tis ad mãm: ⁊ ſic quouſqꝫ tota mã euacuet̃: ergo facienda
eẽt eũatio eradicatiua qđ fuit oppoſitũ añcedẽtis. ❡ In
oppoſitũ eſt Aui. hic ĩ caſu quo mã ſit furioſa: ⁊ ĩ caſu quo
nõ fuerimꝰ ſecuri ꝙ virtꝰ poſſit durare vſqꝫ ad hoꝛã di/
gõnis cõplere. ⁊ Hyp. 2° affo. Incohoantibꝰ moꝛbis. ⁊ p°
affo. Digeſta medicari. ⁊ in acutis paſſionibꝰ raro. ⁊ omẽs
doctoꝛes medicine. ❡ In q̃onis determinatõe p° ponã
notabilia pertinẽtia ad illã. 2° ponã illa in quibꝰ medici cõ
ueniũt. 3° ponã illa in quibꝰ differũt auctoꝛes. 4° dicaꝫ
in hac differẽtia qđ videt̃ mihi ꝓbabiliꝰ. 5° rñdebo ad ar
gumẽta pꝛĩcipalia. ❡ Pꝛo p° eſt notãdũ ꝙ eũatio deſcri
bit̃ a Gal. 3° tegni ꝙ eſt opatio totã a coꝛpoꝛe educẽs ſub
ſtantiã humoꝛis. ẽ ergo opatio ꝑ quã educit̃ ſubſtãtia hu
moꝝ a coꝛpoꝛe: ⁊ hoc ſiue humoꝝ ſubſtãtia educat̃ ĩ ꝓpꝛia
foꝛma ſicut accidit in fluxu vẽtris ⁊ in fluxu ſanguĩs: ſiue
educat̃ in foꝛma vapoꝛis. vñ Gal. 2° affo. inſenſibilẽ reſo/
lutionẽ vocat eũoneꝫ. Et põt qñqꝫ dici vlis eũatio reſpe/
ctu totius qñ a toto coꝛpoꝛe educit̃. ⁊ põt dici particularis
reſpectu particularis mẽbꝛi vt qñ ab vno mẽbꝛo ad aliud
trãſducit̃. Qñqꝫ tñ Gal. in 2ª pticula: eũationi alioꝛũ hu/
moꝝ a ſanguine nõ dat eũonis ſꝫ purgatõis nomen. ſed
hic ſumit̃ vt dictũ eſt. ❡ Nota 2° ꝙ de eũone humoꝝ in
vijs ductuũ exiſtentiũ vel de eũone que fit per flobotho/
miã vel ſcarificatõẽs vel ſanguiſugas vel inſenſibilẽ reſo/
lutionẽ ⁊ penitꝰ de oĩ alia excepta eũone q̃ fit per farmacũ:
hic nõ intẽdo. Pꝛimo qꝛ de flobothomia ⁊ alijs in ꝓpꝛijs
locis dicẽduꝫ erit. Scđo qꝛ de iſta q̃ fit per farmacũ intel
ligit Auic. qđ pꝫ cũ dixit in fine huius paragrafi. Et poſt
hoc totũ poſſibile eſt tibi vt vẽtreꝫ ſoluas. Illud eniꝫ fuit
limitans de qua eũone intẽdit. ❡ Tertio pꝛĩcipalr notã/
duꝫ eſt ꝙ lꝫ Aui. dicat pª quarti. c. de cura putridaꝝ ĩ ge
nerali ꝙ digõ in mã groſſa ẽ ſubtiliatio cũ equalitate ⁊ in
ſubtili ĩgroſſatio tñ nõ ſufficit ad hoc vt humoꝛ nociuꝰ di
cat̃ digeſtus digõne q̃ expectat̃ in nociuo nõ reducibili ĩ/
tegre ꝙ hẽat in ſubtilitate ⁊ groſſitie mediocritatẽ: ſꝫ pꝛe/
ter talẽ mediocritatẽ adhuc aliud requirit̃. Iſtud notabi
le ꝓbat̃ ſic. Cõpleta digõ in venis humoꝛis nõ reducibi/
lis ad benignũ eſt per ↄuerſionẽ eius ad mãm ipoſtaſis ap
parẽtis in vrinis albe ⁊c̃. Sed ad taleꝫ ↄuerſionẽ nõ ſuffi/
cit mediocritas in ſubtilitate groſſitie: ergo ⁊c̃. Minoꝛ pꝫ
qꝛ humoꝛ ĩ foꝛma humoꝛali ꝑmanẽs põt eſſe mediocris in
ſubtilitate ⁊ groſſitie: ⁊ tñ nõ ẽ digeſtus hac digõne. Ma
ioꝛ pꝫ ex Gal. p° de differẽtijs febꝛiũ. c. vj. vbi dixit ꝙ pu
tredo que fit in arterijs ⁊ venis dominãte certiſſime nã ẽ
id qđ in vrinis ſubſiſtit. Foꝛte dicit̃ ꝙ non dꝫ intelligi ꝙ
humoꝛ digeſtus digõne in nocitiuo ſit ipoſtaſis: ſed ꝙ ſit
talis vt per digeſtionẽ ſuã tanq̃ꝫ ſuperfluũ ſeparet̃ mate/
ria ipoſtatica. hoc tñ non tollit ꝓpoſitũ. Nã non ſufficit
ad hoc vt natura ſeparet mãm illaꝫ ipoſtaticã albaꝫ leuẽ ⁊
equaleꝫ ⁊ aptã deſcendere ꝙ ſit humoꝛis mediocritas in
ſubtilitate ⁊ groſſitie: ergo nõ ſufficit ad eius ĩtegrã dige
ſtionẽ vt dicit̃ ꝙ habeat talẽ mediocritatẽ. Aſſumptũ pꝫ
qꝛ humoꝛ põt recipere a cruditate putreſcere ſub ſubtilio/
ri mõ ⁊ ſub groſſioꝛi: ergo põt ſub mediocri. Pꝛeterea ſe/
queret̃ ꝙ in febꝛibꝰ q̃ inciperẽt a putrediẽ taliũ humoꝝ a
pꝛinº deberet appere ipoſtaſis laudabiliſſima. qđ ẽ falſuꝫ.
Pꝛeterea ſeq̃ret̃ ꝙ oĩs hũoꝛ ſubtilioꝛ mediocri q nõ eſſet
ꝓpter ibibitionẽ difficilis euacuatõis eſſet digeſtus. Itẽ
ſequeret̃ ꝙ melancolia nũquã eẽt ĩ ſũmo gradu digeſtio/
nis: nec flegma groſſuꝫ cũ nunquã ad hanc mediocritatẽ
veniãt. Itẽ hoc inuit Aui. pª quarti de natura febꝛiũ pu/
tridarũ in gnãli cõtra ponẽtes ꝙ humoꝛes ſubtiles ſunt
digeſti cũ dicit ꝙ tũc ſequeret̃ ꝙ in pꝛincipio febꝛis đ co
lera vel de ſanguine dꝫ apparere digeſtio. Naꝫ hoc ideꝫ
ſeq̃ret̃ ſi diceremꝰ ꝙ ſola mediocritas ĩ ſubtilitate ⁊ groſ/
ſitie ẽ digeſtio dicta. qđ ẽ falſuꝫ. Pꝛeterea ſiſita eẽt ĩ quo
libet paroxiſmo pꝛĩcipij flegmatice de mã groſſa q̃ſi tota/
lis mã fieret ſumme digeſta qꝛ q̃ſi totũ flegma ad hãc me/
diocritatẽ veniret añq̃ꝫ reſolueret̃. Requirit̃ ergo alia di
ſpoſitio ꝑ quã expulſioĩ parat̃ magiſq̃ꝫ ꝑ groſſitiẽ vel ſub/
tilitatem vel mediocritatẽ in modo ſubſtantie. Et hec ẽ di
ſpoſitio per quã mẽbꝛa hñt ad ipm habitudinẽ facile pellẽ
di que nõ põt poni niſi ꝓpꝛietas occulta ſequens modũ
determinatũ mixtionis. Et nos cõpꝛehẽdimus ꝑ ipoſta/
ſim apparentem in vꝛina ꝙ talẽ diſpoſitionẽ acq̃ſiuit hu/
moꝛ ꝑ quã patꝰ ẽ hoc mõ obedire virtuti. ❡ Quarto nota
ꝙ huiuſmoĩ ꝓpꝛietates nõ oꝫ ꝙ ptibilr ſm gradũ acqui/
rant̃: ſicut ptibiliter acquirũt̃ diſpõẽs ad ipas p̃parãtes.
Sequũtur eiꝫ determinatã ꝓpoꝛtionẽ que ſubito reſultat
ex pꝛioꝛibꝰ diſpõnibꝰ ſicut foꝛma ſubſtãtialis. Nec ĩ hoc
ĩtendo litigare vtruꝫ aliqua talis ꝓpꝛietas hoc mõ poſſit
acquiri ſucceſſiue quo ad gradus. Sꝫ ſufficit mihi ꝙ plu/
rime hoc mõ nõ acquirant̃ de quibꝰ videt̃ eẽ ĩtentio nr̃a:
⁊ ita pꝛo nũc ſuppono. Nã aliter nõ video quin añ ↄpletã

Sufficit tñ mediocritas in groſſitie ⁊ ſubtilitate: viſcoſitate ⁊ aquoſitate

Credo ꝙ Gentilis fuerit pꝛioꝛ in iſta opiniõe de digeſtione vt põt patere ꝑ eum iuxta finẽ illius queſtionis de maioꝛitate moꝛbi quare ⁊c̃.

UVA. BHSC. IyR_006_1

digestionē materici mediocris nō deberet nā facere crisiʒ
ꝑfectā sicut post cōplemētū digestiōis materie grosse cum
tūc equale vel maius dñiuʒ haberet: vt pʒ sciēti ꝯducere.
qꝺ tñ ē falsuʒ. ¶ 5º nota ꝙ hec ꝓprietas sequit̄ ꝯplemētū
digōnis in nocitiuo nō reducibili ad benignū. Istud cōce
dit̄ ab oībus q: oēs cōcedūt ꝙ tūc ē optime disposita ad
obediēdū virtuti eūanti. Et ex hoc sequit̄ ꝙ talis ꝓprie/
tas acquiritur in statu taliū morborū cū in illo ꝯpleat̄ di/
gestio: vt dicit Auic. pria quarti. Et ex hoc sequit̄ scꝺo ꝙ
nō ē incōueniēs ī aliquo morbo a principio vsqꝫ ad statuʒ
digōne ꝯtinue ꝓcedēte materiā tñ fieri magis resistentē
eūatiōi: vt qñ eēt ī principio minus grossa ⁊ cōtinue gros/
sior eēt in sequētibus tꝑibꝰ: īmo plerūqꝫ hoc accidit ꝙ pu
tredo prīo inuadit id qꝺ ē magis subtile vt plurimū ⁊ ma/
gis calidū. Et hoc tāgit Aui. prima quarti. c. ꝺ signis fleg
matice cū dixit: Etiā apparet ī ea ī prinº calor vehemētior
⁊ in postremis minorat̄: ⁊ ē simile vt sit cā in hoc quoniaʒ
putredo añcedit prius ad magis dulce ⁊ magis salsum ⁊
magis subtile: deinde ad magis grossuʒ ⁊ frigidū. ¶ Sex
to nota ꝙ euacuationū quedā ē eradicatiua totā vel quasi
totā substantiā materie faciētis morbū respectu cuius di/
cit̄ eradicatiua a toto corꝑe educēs: ⁊ quedaʒ minoratiua
que notabilē ꝑtē relinquit. ¶ Nota vlteriꝰ ꝙ nocumen/
ta eūatōis añ digōnē sunt: q: euacuat̄ humor qui forte nō
erat futurus malus. 2º q: difficiliꝰ eūat̄ ⁊ virtus plus de/
bilitat̄. 3º q: agitat̄ humor nō egrediēs a corꝑe. ⁊ iō eius
digō ꝓhibet̄. 4º ꝑmiscet̄ malignū cum bono: ⁊ malignat̄
bonus: ⁊ agitat̄ taliter ꝙ si aliqꝺ mēbrū nobile sit ꝺbile ad
ipm humores agitati facilius pellūt̄ maxime si fuerit apa
in īterioribꝰ. 5º q: motus calefacit. nā ī tali agitatiōe mate
ria putrida calefit magis: ⁊ si aliqua alia ad hec nocumēta
sequūtur. ¶ Ulterius nota ꝙ materiez peccantiū q̄dam
sunt furiose quedā nō. Dicūt̄ aūt furiose ille que sunt mul
te malitie manifeste vt plurimū de vno mēbro ad aliꝺ mē
brum mobiles. ⁊ hoc loquēdo ꝺ ꝓprio modo furiositatis.
Nec Gal. videt̄ aliū modū excepisse ꝑticula pria afforis/
morū illo affo. Digesta medicari. verūtamē doctores ad/
dunt oēm mām eē furiosaʒ: ex cuiꝰ remanētia in corꝑe per
nō multū tēpus īminet magnū ꝑiculū siue hoc sit propter
multitudinē: vt in sinoca. siue sit ꝓpter occultā ꝓprietatē:
vt ī pestilētiali ⁊ venenosa. siue sit ꝓpter locū ī quo ꝯtinet̄:
vt in squinātia ⁊ apoplesia ⁊c. Alie aūt dicūtur nō furiose.
⁊ hoc de primo articulo. Nā de diffinitiōe digōnis ⁊ cō
paratōe materierū ī facilitate eūandi ⁊ multis talibꝰ si vis
videre vade ad ea q̄ dixi pria ꝑticula afforismoz affo. 22º.
¶ Quantū ad scꝺm articulū ꝯsiderādū ꝙ oēs medici vo
lunt ꝙ qñ mā ē digesta si natura nō mouet ⁊ virtus ꝯstat
⁊ nō sunt alia īdicantia oppositū ⁊ mā ē nociua siue nō re/
ducibilis ad benignū oʒ ꝙ eūet̄. ¶ Cōcedūt scꝺo ꝙ māʒ
furiosam oʒ eradicalr̄ eūare añ digestionē: ⁊ oēs moderni
cōsentiūt in eūatiōe cuiuslibet māe quōcūqꝫ furiose. Sed
in illa que propter multitudinē dicit̄ furiosa: qñ non pec/
cat sanguis dicūt sufficere minoratiuā ⁊ nō oportere era/
dicatiuā facere eūationē añ digestionē. ¶ Tertio cōueni/
unt ꝙ melior hora faciēdi tales eūationes ē hora principij
vlīs si putamus ꝙ mā talis ⁊ tā multa sit ꝙ nisi virtꝰ exo
neret̄ nō posset aliquā bonā dispōnē agere: tunc eiʒ q̄ꝫto
magis expectaret̄ tanto virtus esset debilior ⁊ mā ieptior.
Et quidā putāt in hac solū cōditiōe concessisse Hypo. in
prin. cū dixit: inchoantibꝰ morbis siquid videt̄ mouēdū
moue: in statu vero silentiū habere meliꝰ ē. Et Aui. prima
quarti. c. de cura febriū ī gnāli dixit: Et si nō ē digestus ñ
moueas nisi ī prin. apꝺ statū vero nō moueas. ¶ Quātū
ad 3m ē sciēdū ꝙ de eūatione materiez ī pricipio morbo/
rū cronicorū differūt ab inuicē antiqui. Nā Gal. in epl'a
ad Glauconē vult ꝙ nullo mō in principio quartane ē fa/
ciēda euacuatio nec ante digestionē. ⁊ ꝙ hec sit eius mēs
pʒ ꝑrīo ex Aui. parū ante. Dicit nāqꝫ Gal. penitꝰ ꝙ ī cro/
nicis egritudinibꝰ tantū maturatio ē expectāda ⁊ nō ali/
ud. Iteʒ hoc dicit Auerrois esse de mēte Gal. 7º colliget
cū dicit: Sed in melācolicis ⁊ flegmaticis febribus raro ī
principio earū purgabat. ⁊ erat illud eius opinio purgare
s. in principio febriū. tñ Gal. manifeste dicit cōtrariū. s. ꝙ
minime debemus in pricipio febriū melācolicaz ⁊c. Hoc
idē habet̄ ab eodē Gal. in epl'a ad glauconē de cura quar
tane: dicēs: curabis quartanā: sic mox in principio diligē/
ter ꝓuideas ⁊ mediocriter ⁊ patienter agas neqꝫ medicine
aliquid tamē des neqꝫ purgationē vel defectionē ventris
aut sanguinis facias. Rasis aūt in pricipio tertiane ⁊ fleg
matice ⁊ quartane audaciter ꝯcessit farmaca: vt 10º alman
soris. ⁊ 16º cōtinētis. ⁊ ī diuisionibꝰ habet̄. Aui. aūt ī pri/
cipio flegmatice cōcedit: ⁊ etiam ī pricipio quartane: vt pʒ
ī caplis ꝓprijs: ⁊ ita Auerrois loco allegato. Uez Aui. vr̄
īnuere ꝙ hoc fiat qñ timet̄ victoria humorū ⁊ non aliter.
Auerrois aūt absolute ⁊ Rasis cōcedūt ꝓ meliori ī quar/
tana que ē salua: esto ꝙ medicus nullā faciat euacuatōeʒ.
vñ. c. de q̄rtana dicit Aui. Et ē fm plurimū egritudo sal/
ua. De eūatiōe aūt ī augmēto adhuc doctores diuersifi/
cant̄. nā Rasis ⁊ Auer. ꝯcedūt eūatiōes ī augmēto fleg/
matice. vñ Aui. cōcedit ī fine scꝺe septimane ī flegmatica

purgatōʒ cū solutiuo ⁊ vituꝑat q hoc faciūt dicēdo ꝙ ni/
hil faciūt: nisi ꝙ dāt īfirmo bona vba. Sʒ siqs ꝯsiderat
dcā Aui. vr̄ ꝙ ñ ꝯcedat eūatōʒ hūoz ñ furiosoz ī augm̄to
Naʒ in. c. de cura putridaz in gnāli dixit: ⁊ si nō est dige
stus nō moueas nisi in prinº: apud statū vero nō moueas.
In. c. de flegmatica dicit ꝙ nō diligit expectatōeʒ digō/
nis ⁊ lenificatiōis cū eis q̄ diximꝰ prius: īmo oʒ vt eūetur
ex ea aliqd ⁊ expectet̄ in reliquo vsqꝫ quo digerat̄. ⁊ ī eo/
dē. c. cū loquit̄ de augmēto dicit: Et multotiēs qdeʒ eua/
cuatio ꝯcedit̄ flegmatici humoris ⁊ crudi in hac hora: sed
meliꝰ est vt expectet̄ in eo ꝯplementū digōnis. Gētilis au
teʒ suꝑ pª quarti imaginat̄ ꝙ mā in prinº qñqꝫ est tāta ꝙ
nō sperat̄ in ea ꝙ cū illa multitudine natura totū aut par/
teʒ possit digerere: aut in totā aliquē gradū digōnis indu
cere: ⁊ tunc eūandū est solū in prinº: q: si expectamꝰ aug/
mentū nō iuuabit̄ infirmꝰ: īmo moriet̄. Sed vbi pōt virtꝰ
partē notabilē digerere: aut ī totaʒ aliquē gradū digōnis
īducere: ⁊ tūc est melius in augmēto q̄ꝫ in prinº euacuare.
¶ Cōciliator aūt dr̄ia 16ª vult ꝙ in augmēto nō est faciē/
da eradicatiua eūatio. Et rō: q: si mā furiosa fuerit: faciē/
da est in prinº. ⁊ si vsqꝫ ad augmentū expectauissemꝰ: du/
duʒ iā ītulisset ꝑiculū. Sʒ qñ mā nō est furiosa: q: ī aug
mēto virtꝰ magis est aggrauata a morbo q̄ꝫ in pricipio: ⁊
mā magis inserta in ꝑte: iō tūc non ꝯpetit eradicatiua. qñ
vero statꝰ est lōginquus eūatio ꝯpetit minoratiua sicut in
diuturnis morbis ī qbꝰ ꝑ oīa tꝑa ꝑtiʒ digerimꝰ ⁊ partim
eūamꝰ vt mā remaneat magis alleuiata. ¶ Ueniendo ad
quartū articuluʒ iā ꝓpono ꝙ nō ītendo hic loq nisi ꝺ eua
cuatōe facienda ꝑ farmacū solutiuū materiei appropriate
morbi nō collecte ad apa faciendū: ⁊ que nō sit in vijs du/
ctuū nec valde vicina. Et quo ad hāc non disputo de ali/
quo ꝯcesso cōiter ab oībus: verbigr̄a ꝙ sit in prinº euacuā
da mā furiosa eradicatiue: ⁊ qñ mā est ita multa ꝙ virtꝰ nō
posset suparare eā nisi p̄cedēte eūone esto ꝙ sit q̄cta dʒ añ
digōnē ⁊ iu prinº fieri eūatio minoratiua. ¶ Sʒ restat vi
dere prīo: vtrū in morbo aliquo sit eūandū ante digestiōʒ
mō dicto: ī quo tamē ē spes ꝙ virtus vincat mām ⁊ dige
rat cōplete nō p̄cedēte tali eūatiōe vel alia. ¶ Scꝺo vtrū
ī pricipio vel ī augmēto fieri possit debite. ¶ Tertio ī quo
tꝑe est melius eūare. ¶ Prima ergo cōcl'o ē ista: semper
morbi mā exñte grossa ⁊ multa: ita vt inde īfirmꝰ sit ꝑiturꝰ
nō facta eūatione artificiali: vbi per eūationē infirmus sit
euasurus faciēda ē eūatio ī principio. Hāc non probo q:
supra posita ē ꝑ alios ⁊ cā est manifesta. ¶ Scꝺa cōcl'o: in
aliquo cāu mā exñte grossa ⁊ multa: vt dicit p̄cedēs cōcl'o
nō tñ ita multa vt īde īfirmꝰ sit ꝑiturꝰ faciēda ē ī prinº eua
cuatio saltē minoratiua. Probat̄ q: ī oī cā in quo mā ē tā
multa ꝙ īfirmꝰ sine eūatiōe ꝑiret ⁊ facta eūatiōe euaderet
faciēda ē eūatio: vt dicit pria ꝯcl'o. Sit ergo sortes cū mi/
nima mā quā nō sufficit virtꝰ suꝑare cū cōditiōibꝰ dictis:
⁊ sequit̄ ꝙ ī eo faciēda ē eūatio per farmacū minoratiua ⁊
nō quātalibʒ modica ergo certe q̄ꝫtitatis: ergo postq̄ꝫ erit
aliqd eūatū adhuc aliquid euacuabit̄ recte: sʒ qñcunqꝫ in
isto casu erit aliquid euacuatū nō remanet ampliꝰ tanta ꝙ
cū illa sit ꝑiturus infirmꝰ: ergo aliqñ nō tanta exñte mā vt
sine eūone sit ꝑiturus faciēda ē eūatio ī pricipio. ¶ Cō/
firmat̄: nocumētū eūonis ante digōneʒ est minꝰ q̄ꝫ nocu/
mētuʒ dimissiōis talis māe: aliter eīm potius eēt dimittē
da: ergo sequit̄ ꝙ nō est tantū quātuʒ est nocumētū mor/
tis aut ꝯtinui morbi vel insanabilis. Nā non obstante tali
nocumēto. s. eūonis ante digōneʒ tandē infirmꝰ sanat̄: vt
ꝑonit ꝯcl'o precedēs: ergo pōt eē aliqꝺ nocumētū remanē
tie alicuiꝰ materiei nō inferētis mortē maius illo. Sit er/
go primū nocumētū. a. scꝺm nocumētū. b. ⁊ sequit̄. a. est
minus nocumētū q̄ꝫ. b. sed per aliquā remanētiaʒ māe nō
inducētis mortē fieret. b. nocumētuʒ nisi fieret euacuatio:
ergo qñ mā nō est factura morteʒ faciēda est eūatio añ di/
gestionē. Dico: ⁊ tu ꝓ sophistis reducas hanc ad termios
⁊ fac p̄missas vt scis. ¶ Tertia ꝯcl'o: ī aliquo casu mā exi/
stente nō tā multa nec tā maligna ꝙ nō sit factura mortē
nō est faciēda eūatio ante digōneʒ ꝯstante virtute. Ista est
Aui. ⁊ Gal. ⁊ oīuʒ medicoz. Probat̄ ab Aui. prima q̄rti
c. de cura febriū putridaz in gnāli per nocumenta q̄ taleʒ
eūoneʒ sequunt̄ ⁊ ꝑ similitudinē de oꝑatiōe nāe ⁊ ꝑ aucto
ritatē Hyp. ⁊ Gal. ¶ Quarta ꝯcl'o: nō pōt bñ demōstra/
ri qñ maius ē iuuamētū faciendo eūoneʒ ante digōneʒ q̄ꝫ
nocumētuʒ. pʒ q: istaz certa quātitas non pōt sciri a no/
bis: vt 13º terapētice. ¶ Quita ꝯcl'o: qñ morbꝰ est futurus
valde diminutꝰ aut est facturꝰ valde magna nocumēta: ⁊
nō sumus ita ꝓpe statū ꝙ verisimilr̄ īpediat̄ crisis pluri/
mū morbo exñte māli de mā nō furiosa esto ꝙ sine euacua/
tione infirmꝰ liberaret̄: tñ faciēda ē eūatio ante digōnē. s.
qñ futurus ē breuis ⁊ leuiū accñtiū: aut qñ putamꝰ ꝙ īpe/
diremꝰ bonā crisiʒ ꝑ eūonē ñ ē faciēda eūatio añ digōnē.
Ista est ꝓ mente doctoz qñqꝫ ꝯcedentiū eūoneʒ ante di/
gestionē in mā nō furiosa ⁊ qñqꝫ negantiū illā. Ex q̄ appet
ꝙ multotiēs bonꝰ medicus ꝑplexus est vtrū debeat eua/
cuare an dimittere eūoneʒ: De euacuatōe autē in augmē
to vident̄ mihi iste ꝯcl'ones ꝯcedēde. ¶ Prima qñqꝫ ma/
teria ē eūanda in augmēto. pʒ q: pōt fieri furiosa ī augmē
to. pʒ

to. pꝫ etiā; q: ſtat ꝙ ī pricipio nō fuerit ita ſufficiēter eua cuata quin timeat adhuc humoris victoria. Sed quotiēs timetur humoris victoria magis neceſſaria cautela ē euacuatio: vt pria quarti ⁊c̄. ¶ Scḋa ꝯcluſio: cū medico dat habilitas melius eſt in principio ita euacuare q̄ꝫ expectare augmētu;. Iſtā ꝯclōnē puto ītellexiſſe Hyp. pª particula affo. Incboantibꝰ morbis ⁊c̄. Et Aui. pª quarti loco allegato ſupra cum dixit: Qḋ ſi nō eſt digeſtus non euacues niſi in principio. apud ſtatu; vero non moueas niſi natura vincat ⁊ digerat. Et ide; pª quarti. c. de cura flegmatice. vbi vult ꝙ ex mā in prinº euacuet aliquid ⁊ ī reliquo expectet vſquequo digerat: ⁊ dixit ꝙ melius eſt ī augmēto ꝙ expectet ꝯplementū digōnis. Et hoc videtur Auer. velle qñ in flegmatica docet tantū duas eūones facere añ ſtatū in duabꝰ ſeptimanis. ¶ Tertia ꝯclō: in morbis valde diuturnis q: multotiēs renouat mā per regeneratōe; ꝯtingit ꝙ in augmēto eſt fiēda eūatio: vt ī quartana ⁊ epilenſia ⁊ paraleſi. pꝫ q: cu; augmētu; quo ad digōnem ſit valde longū ⁊ mā de nouo generet niſi fieret eūatio periculu; eſſet ne nimiū augeret materia. ¶ Quarta ꝯclō: in morbis acutis ⁊ peracutis ⁊ tropicis vtplurimu; maiora ſunt nocumēta eūonis ī augmēto q̄ꝫ in pricipio. pꝫ q: virtus eſt debilior ⁊ materia putridior: flāma maior: digeſtio velocior: ꝑparatio ad eūandū multotiēs minor: vt patuit ī vna ſuppoſitōe ſupra poſita. Et hec ꝓ iſtiꝰ q̄onis dterminatōe ſufficiāt. Solerti ei; appet q̄uō argumēta ſoluāt. Redeamꝰ ergo ad textū cū dicit.

Et ſcias ꝙ materiei. Hic textus cōprehēſus eſt ſupra ī deſcriptōe textus p̄cedētis: q̄re ī fine vniꝰ antecedētis folij.

¶ Nota ꝙ ſm qḋ ſupra diuidēdo dixit intēdit Aui. remouere dubia nō circa re; vltimā dictā quā medicus ꝯſiderat: ſed circa alias dictas. Et remouet dubia pº q̄ pñt ꝯtingere rōne tractus materiei ad mēbrum diuerſum. 2º ponit quoſdā incidētes cañ. 2ª ibi: ex materijs aūt. In prima parte pº ponit diſtictionē. 2º cañ. vnū. 3º exēplū vnū diſtinctōis. Sed dicā totū abſq; diuiſione alia. ¶ Dicit pº ꝙ tu debes ſcire ꝙ materiei eūatio ⁊ ipſiꝰ de ſuo loco eradicatio eſt ſm vnū duoꝝ modoꝝ. Unus eſt ꝑ quē trahimꝰ mā; ad diuerſitatē lōgiquā. Scḋs ē ꝑ quē trahimꝰ ipſa; ad ꝓpinquā diuerſitatē. ¶ Dicit 2º ꝙ ꝯuenientior hora huiꝰ eūonis ē qñ nullo mō fuerit ī corꝑe repletio alicuiꝰ materiei. ¶ Dicit 3º ꝙ ꝓ ītellectu huiꝰ diſtictōis ponemꝰ talē caſu; ꝙ ab ore viri ſuperiꝰ fluat multꝰ ſanguis ⁊ ab emoroidibꝰ mulieris fluat ſanguis ſuꝑfluꝰ. In vtroq; iſtoꝝ poſſumꝰ trahere ad lōgiquā diuerſitatē ⁊ ad ꝓpiquā. Et ſi ad ꝓpiquā diuerſitatē volumꝰ trahere: tūc facimꝰ fluere hōi ſanguinē ex naribꝰ: ⁊ ī muliere ꝓuocabimꝰ mēſtrua. Et ſi ad lōgiquā trahē volumꝰ: eūabimꝰ ī viro ſanguinē a venis q̄ ſūt in īferiori ꝑte corꝑis: ⁊ ī muliere a venis q̄ ſūt ī ſuꝑiori ꝑte corꝑis. ¶ Notādū eſt hic in pº ꝙ vt ſupra tāgit qñq; mā trahit ad diuerſum: ſicut facit qñq; nā. De hoc tractu poſſet qs dicere vtrū ſemper fiat ad longinquū aut ad ꝓpiquū? Et rñdet Aui. ꝙ qñq; fit ad locū diuerſu; ꝓpiquū ⁊ qñq; ad lōginquū. ⁊ cauſe dicēt.

¶ Nota ſcḋo ꝙ Aui. dicit materiei eūatio aut ipſius eradicatio de ſuo loco. Qḋ pōt tribꝰ modis exponi. Unus ē ꝙ per eūationē abſolute dictā ītelligimus eūationē minoratiuā. Et per eradicationē intelligimꝰ eūationē eradicatiuā. Et hoc mō ītelligēdo voluit Auic. dare ītelligi ꝙ nō ſolū minoratiua fit per partē diuerſa;: ſed etiā eradicatiua. Scḋus ē vt per eūationē intelligamus eductionē materiei a corꝑe ita vt egrediat totū corpus. Sed per eradicationē ītelligimus remotionē materiei a ſuo loco vbi videt fixa ⁊ quaſi eradicata: eſto ꝙ nō a toto corꝑe educat. Tertius modus ē ꝙ per eūationē intelligamꝰ eūationē a lōgiquo ⁊ ꝑ eradicationē a ꝓpinquo. Ego aūt puto ſcḋ; modū eē veriorē. ¶ Tertio no. circa cañ. nā nō videt verū ꝙ ꝯueniētior hora eūandi ꝑ partē diuerſa; ē cū nullo modo fuerit in corꝑe mā: quia eiꝰ eūatio conueniēs ē propter repletionē: vt dictū ē ſupra in iſto. c. ꝙ principale indicans eūationē ē repletio. Preterea cū cura nō fiat niſi ꝑ ꝯtrariū ⁊ eūatio nō cōtrariet niſi repletioni: ſequit ꝙ ſi non ē repletio nō dꝫ fieri eūatio. ¶ Pro dubio nota pº ꝙ duobus modis poſſumus dicere ī corꝑe noſtro nō eē repletionē. vno modo ꝙ nō ſit in toto. 2º mō ꝙ non ſit in toto nec in aliqua ꝑte. ¶ Nota ſcḋo ꝙ eūationū quedā ē per quā ītēdimus hūorē a corꝑe educere. quedā aūt per quā ītendimꝰ aliter puta diuertere vel aliquē motū ſiſtere. ¶ His habitis dicit Dy. ꝙ nō exiſtente repletiōe ī toto nec ī ꝑte nō cōuenit eūatio. ꝓbatur ꝑ duas rōes ſtatim factas. Sꝫ eūatio bene cōuenit exiſtēte repletiōe in parte lꝫ non ī toto ſit repletio. Et hoc 2ᵐ voluit Aui. hic: ⁊ dꝫ intelligi prima ꝑs ꝯcluſionis de eūatōe ꝑ quā intēdimus educere materiam a corꝑe. Nā per diuerſionē nō ē dubiū in caſibus hic narratis ab Aui. ꝙ fit eūatio corꝑe nimiū inanito ſm oīa mēbra: vt cū fluxerit decem libre ſanguinis a naſo qñ flobotbomamus. ¶ Quarto nota ꝙ pars iſta cañ. ḋ hora cōueniētiori pōt referri tantū ad eūationē per partē ꝓpinquā q: cōueniētior hora ad ipa; faciēda; ē cū nulla in corpore fuerit repletio. Nā corpore plectorico exiſtente nō cōuenit eūatio ꝑ partē ꝓpiquā: q: multo plus noceret atrahēdo ad locū egritudinis: vñ ille qui flobotbomāt venas ſub lingua in ſquinātia corꝑe multu; repleto multotiens ꝑducūt ad mortē infirmum. Scḋo modo pōt referri ad vtrūq; modū eūonis ſiue ꝑ ꝓpinquā ſiue ꝑ longinquā partē. ⁊ tūc nō erit mens Aui. ꝙ cū corpꝰ eſt repletū non ſit facienda eūatio ꝑ partē longinquā: q: cū hac repletiōe facienda eſt eūatio ñ ē faciēda plurimū niſi per longiquā. Sꝫ ītendit ēt ꝙ ꝯuenientior ſit talis eūatio: q: magis per illā ſequit ītentū qñ totū nō eſt repletū. Et rō eſt: q: ī hoc caſu euacuata mā a loco longiquo remanet locus vacuꝰ: ⁊ ideo trahit a vicino: ⁊ ſic ꝓcedit attractio quouſq; veniat ad mēbrū patiens. Sꝫ ſi totū ſit repletū eūata tota mā a loco remoto: nō tñ pars illa remanet ianita vel nō tm̄: ⁊ ideo non tā bona ſit attractio a parte patiente.

Et nō oꝫ quidē vt ī duas diametros ꝓlōgatōe; facias: ſꝫ ī vna tm̄ q̄ ſit diameter magis lōgiqua. nā ſi mā fuerit ī ſupmo dextre ꝑtis nō erit trahēda ad īfimū ſiniſtre: īmo ad īfimū ipiꝰ dxtre. Et hoc quidē ē illḋ qḋ ē magis neceſſariū aut ad ſiniſtrā a ſupmo ſi fuerit tm̄ lōginqua q̄ꝫtū ē ab humero ad humeꝝ ⁊ ñ fuerit diſpō eiꝰ ſicut diſpō duoꝝ lateꝝ capitis. mā ñāq; ſi in dextra capitis fuerit eā ad inferiora ⁊ nō ad ſiniſtrā trahēs capitis.

¶ Hic remouet dubia vt dictu; eſt. Et diuidit ī quattuor ſm q̄ttuor dubia. 2ª ibi: cūq; materiā. 3ª ibi: cūq; ad locū. 4ª ibi: ⁊ forſitan tibi. In pª remouet huiuſmodi dubiū: poſſet qs dicerē ī trahēdo mā; ad partē lōginquā debemus ne ad longiſſimā diſtantia; facere euacuationē: vt verbigratia per duas dyametros? Rñdet ꝙ nō oꝫ ꝙ fiat talis elōgatio ꝑ duas dyametros: ſꝫ oꝫ tātū facere ꝑ vnā dyametrū que ſit magis longiqua dyametri. Et cā dicti ē: q: ſi materia fuerit ī ſuprema parte dextra nō oꝫ ꝙ euacuatio trahat ad infima ſiniſtre: īmo ſufficit ꝙ trahat ad ꝑtē īfimā dextre. Et hoc ē illḋ qḋ ē magis neceſſariū: aut oꝫ ꝙ a ſupremo. i. a ꝑte ſuꝑiori trahas ad ſiniſtrā. ⁊ hoc ſi fuerit ſiniſtra pars a dextra tantū lōginqua ſicut ē ab humero ad humerū: ⁊ nō fuerit ī loco illo diſtantia a ſiniſtro ad dextrū ita parua: ſicut ē diſtantia dextre partis capitis a ſiniſtra. nā talis mā oꝫ ꝙ trahat a ſuperiori ad īferiꝰ: ⁊ nō ad ſiniſtrā capitis ꝑtē. ¶ Nota ergo prio qḋ ꝑ dyametrū ītelligere debemꝰ corporis dimēſiōes. ſ. lōgitudinē latitudinē aut ꝓfunditatē. ¶ Nota 2º ꝙ ñ debere fieri tractū per duas dyametros: pōt intelligi de ītegris: ⁊ pōt ītelligi de partialibꝰ. verbigratia: pōt intelligi ꝙ qñ egritudo ē ſurſum ī dextro nullo modo ſit eūandū inferiꝰ ī ſiniſtro: aut ſi fuerit in ſupremo dextri nō ſit ꝓlongatio faciēda ad inferius ſiniſtri. Et cōſtat ꝙ Aui. intelligit de dyametris cōpletis. Nā in ſua ratiōe arguit: q: mā que eſt a ſupremo dextre partis non debet trahi ad īfimū ſiniſtre. ⁊ hoc īnuit de diametris completis. ¶ Nota 3º ꝙ cā ē q: qñ fieret hoc modo attractio ad tā diuerſu; nō fieret notabilis eūatio vel motus ī parte egritudinis niſi per tantā euacuationē ꝙ inde eēt ꝑiculū de nimia debilitate. Et faciendo ꝑ vnā dyametrū mō dicto facimꝰ eūationē ⁊ diuerſionē a patiēte mēbro ſine tāta debilitate. Et ex hoc pꝫ ꝙ ꝓlongatio pōt licite fieri ab extremo dextri āteriꝰ ad extremū ſiniſtri verſus poſterius: ⁊ erit ſm duas dyametros ꝯpletas cū inter iſta nō ſit plīma diſtātia: īmo ñ tāta q̄ꝫta ē a ſurſu; in deorſu;. Ex quo pꝫ ſcḋo ꝙ mēs Aui. fuit ꝙ nō fiat attractio ad cōtrariū ſm duas dyametros cōpletas qñ vna illaru; fuerit lōgior ſicut corꝑis dyametri: vel quaſi ſicut dyameter lōgitudinis. ¶ Nota vlteriꝰ circa id qḋ dixit ꝙ dꝫ fieri ꝓlongatio tātū in vna dyametro q̄ ē magis lōginqua alijs. cōſidera qḋ Auic. nō vult ꝙ ſemꝑ faciēda ſit elōgatio ꝑ vnā dyametrū magis longinqua;. Nā vt ſtatim dicet qñq; ſufficit vt ſm dyametrū latitudinis que nō ē magis longinqua. Sꝫ intēdit ꝙ maior diſtātia ad quā dbes facere attractionē ē diſtātia dyametri lōgioris: ⁊ vltra illā nō oꝫ facere lōgius attractionē: nō tamē negat quin poſſit ꝑ ꝓpinquiorē. ¶ Quinto nota ꝙ id qḋ dicit poſt ꝙ mā in ſummo dextre ꝑtis exñs dꝫ trahi ad īfimū dextre: ⁊ hoc ē illud qḋ ē magis neceſſariu;: dꝫ intelligi ſm Dy. ꝙ diſtātia huiꝰ dyametri longitudinis ē maior diſtātia ad quā oꝫ trahere ī quocūq; cāu ſit ad longinquā diuerſitatē trahēda; eligēdo. Et poſtea ſubdit ꝙ qñq; ſufficit trahē ad ſiniſtrā a ſupremo. i. a ſuprema ꝑte. ⁊ hoc ē qñ ibi fuerit diſtātia tāta q̄ꝫta ab hūero ad hūerū. Nā in minori diſtātia qñ ē ītētio fortis ad trahēdū ad lōginquū nō ē ſufficiētia: ſicut ī capitis lateribꝰ. Et ſi forte qñ intētio diuertēdi nō ē fortis ſit fiēda queadmodū in ea q̄ ē a poſterioribꝰ ad añriꝰ iuxta ſñia; afforiſmi: Poſteriora capitis dolētia recte in fronte vena inciſa iuuat. Tamē vt hec dicta magis appareāt dubitat.

Utrum in trahendo ad longinquū ſit faciēda ꝓlongatio ſꝫ duas diametros? Affirmatiue arguit ſic: Ad illū locū debet fieri attractio ꝑ que; attractio

Et iuxta iſtū primu; modū precipit Aui. prima tertij tractatu prio. c. xxix. in diuerſiōe ſanguis a capite flobothomare ſaphenā. Et iuxta ſcḋ; modū landat ēt Aui. decimaſeptima tertij. c. ij. ꝓuocatōe; mēſtruorū in mulieribus patiētibꝰ emoroidas.

UVA. BHSC. IyR_006_1

fit magis ad partē longinquā: ſed ꝓlongatione facta ſm duas dyametros fit ꝓlongatio ad partes magis lōginqͣs: igit̄ ⁊c̄. ¶ Cōfirmat̄ ꝯ: euātio diuerſiua nō iuuat niſi ꝑ q̄zto euato mēbro diuerſo ipm̄ trahit ad ſe a loco vbi ē egritudo ꝑ mēbra ītermedia. ſꝫ hoc fit eque bene: vel melius qn̄ fit ꝓlongatio ſm duas dyametros: igit̄ ⁊c̄. Maior ē clara ⁊ minor pꝫ: q: quātūcūqꝫ mēbrū ſit longinquū qn̄ ē ianitū trahit a vicino: ⁊ vicinū ab alio: ⁊ ſic quouſqꝫ veniamꝰ ad partē patiētē. Preterea hoc vult Aui. 10ª tertij. c. d̄ cura dolorū partiū pectoris. ꝙ incipiēdū ē a flobothomia ſaphene ꝑtis oppoſite ī longitudine. Et ideꝫ vult Meſue. c. de cura pleureſis. ꝙ incipiēdū eſt multa exn̄te plenitudine a flobothomia ſaphene ꝑtis oppoſite. Et Raſis precipit ī apate dextri iguinis flobothomiā fieri de ſaphena ſiniſtri ⁊ in obtalmia. Meſue ⁊ Raſis 9° almāſoris: ⁊ cōiter practicantes p̄cipiūt fieri flobothomiaꝫ in brachio oppoſito. Et conſtat ꝙ brachiū ē inferius oculo: ⁊ iō erit in latere īferiori ⁊ oppoſito ſm latitudinē: ⁊ per ꝯn̄s euatio iſta erit ſm duas dyametros. ¶ In iſta qōne eſt primo notādūꝫ qd ē dyameter: ⁊ ſcd̄o quō ꝓlōgatio pōt fieri ſm dyametros itegras: ⁊ ſm ꝑtiales: ⁊ quō integrarū quedā ꝑticipant maxima longitudine: quedā ſunt integre: ſed nō cuꝫ tanta longitudīe. ⁊ hec ſunt dicta ſupra. ¶ Scd̄o nota ꝙ curſus materiei ad mēbrū a quo diuertere volumꝰ: qn̄qꝫ ꝯiungit̄ plenitudini qn̄qꝫ nō. ¶ Tertio nota ꝙ qn̄qꝫ locꝰ ad quē materia currit ē ī parte corꝑis a qua ꝑ vnicā dyametrū poſſumus ſatis longe trahere mām: ſicut qn̄ ē in capite poſſumꝰ trahere ad pedes ⁊ ecōtra. Qn̄qꝫ aūt ē ī parte a qua ꝑ vnā dyametrū nulla pars multū diſtat: ſicut qn̄ ē ī medio corꝑis vel inguine: tūc eīꝫ ꝑ vnā dyametrū nulla ꝑs diſtat a loco paſſiōis pluſquā ꝑ medietatē totius dyametri longitudinis. ¶ His notatis ſit hec pͥa cōcluſio: nō exn̄te repletiōe totius ī diuertendo mām non oꝫ ꝑ duas dyametros totales vel partiales ꝓlongare. pꝫ q: ī hoc cāu aut parua aut mediocris fieret euatio: ſꝫ hoc nō ꝑtingeret trahēdo a loco paſſiōis. nā cū ītermedia mēbra ſint auara nō permittūt a ſe trahi māꝫ que nō ſuꝑfluit: ⁊ ſic ēt nō traheret̄ a loco paſſiōis. Aut multa mā euatur: ita ꝙ ēt a mēbris vicinis loco paſſiōis fiat euatio: ⁊ tūc erit ſuperflua: ⁊ qua corpus nō indiget cū nō ſit multū repletū: nullo mō ergo ē faciēda hec ꝓlongatio. ¶ Scd̄a cōcl̄o: corpore quātūcūqꝫ plectorico: aut nō plectorico nō debemꝰ ꝑ duas dyametros itegras cōprehēdētes dyametrū longitudinis facere ꝓlongationē. Hec ē Aui. ⁊ ꝓbat̄ q: ī tāta ꝓlongatōe nō fieret diuerſio a loco paſſiōis: niſi ꝑlīma facta euatiōe quā virtus nō bn̄ tollerarct. naꝫ mēbris plenis pꝫ ꝙ anteq̄ꝫ inanitio cōicaret̄ ad tantā diſtantiā oporteret quātitatē euatā eē multā. ¶ Tertia cōcl̄o: ſtāte repletiōe multa ⁊ nobis nō potētibꝰ per vnā dyametrū multū longe trahere faciēda ē euatio ꝑ duas dyametros icōpletas. pꝫ q: in hoc cāu indigemꝰ trahere multū longe ne ex curſu humorū ad locū euatiōis poſſit aliquid trahi ad locū ꝑaſſiōis: ⁊ vt fortiter ad cōtrariū trahat̄ mā currens ad mēbrū patiēs. Si ergo diſtantia ad hoc requiſita nō īuenitur in vno dyametro: oꝫ tūc ꝙ aliquid capiat̄ de reliqua. ⁊ hoc ē qd̄ faciūt medici ī obtalmia ⁊ in apate inguinis non venenoſa ⁊ paſſiōibus capitis. Ex his pꝫ ſolutio qōnis. ¶ Ad argª aūt dr̄ p° ꝙ nō obſtāte plenitudīe primū mēbrū ianitū nō multū trahit a vicino: ⁊ ita diuidēdo nō ꝓcedit attractio vniꝰ ab alio: ita ꝙ ab illo vbi paſſio ē n̄ fit attractio: ⁊ multomagis qn̄ corꝑꝰ ē plenū. ⁊ iō a mēbro a quo intēdimꝰ diuertere nō trahit̄ nimis lōge: q: ab ipſo nō trahit̄: aut ſi trahit̄ ē parū: aut ſi ē multū ſaltē ſuꝑfluit euatio ī toto: qd̄ vitandū ē. Et per hoc pꝫ ſol̄o ſcd̄i. ¶ Ad auctes Aui. ⁊ Meſue de pleureſi dicit Dy. ꝙ dꝫ fieri ſtante repletiōe in toto euatio de ſaphena dextra ſi pleureſis ē in ſiniſtra ⁊ ecōtrario. Sed mihi videt̄ ꝙ hoc dictū nō ē Aui. imo Aui. dicit de ſaphena oppoſita ī lōgitudine: ⁊ nō dicit in latitudine. ſed eodē mō itelligo dictū Meſue. Si tn̄ fuerit cōſtat ꝙ nō ē ſm duas dyametros cōpletas.

Cūqꝫ materiā ad longinquū trahere volueris loci dolorꝫ prio ſedabis vt ipſius minuatur cōpreſſio per attractionē quoniā dolor eſt trahens.

¶ Remouet aliud dubium. Naꝫ poſſet quis querere. Si mā curreret ꝑ̄ternaturalr̄ ad mēbrū d̄bemꝰ trahere ad longinquū: oꝫ ne ꝙ prius aliqd fiat? Rn̄det ꝙ ſi ī mēbro fuerit dolor ille prius ē ſedādus vt minuat̄ cōpreſſio membri dolētis per attractionē: q: dolor trahit. Et ſenſus eſt ꝙ dꝫ ſedari prius dolor ne moto vel agitato hūore trahatur ad mēbrū dolēs. Nā per talē attractionē ꝯprimit̄ magis mēbrū ⁊ mā ī eo: vt ergo illa minoret̄ dꝫ ſedari dolor. Sed de hoc ſatis diximus ſupra capl̄o primo.

Cūqꝫ ad locuꝫ nō obedit ad quē ipſam trahis non violēter agas: quoniā quādoqꝫ violētia illa ipſam mouebit ⁊ ſubtiliabit ⁊ nō trahetur ⁊ fiet velocius declinās ad dolentem locum.

¶ Remouet tertiū dubiū ponēdo introductionē vnaꝫ. Nā qn̄qꝫ māe non obediūt in veniēdo ad locū ad quē conamur eas attrahere. Et dubitat̄ tunc vtrū ſit maior violentia faciēda vt attrahant̄? Et rn̄det Aui. ꝙ nō: q: inferēdo talē violentiā mā ſubtiliat̄ ⁊ currit magis ad locū dolēteꝫ: ⁊ iō oꝫ vt dimittat̄ ⁊ prius preparet̄: ita ꝙ ſi nō ē obediens ꝓpter viſcoſitatē incidat̄. ⁊ ſi ꝓpter groſſitiē ſubtiliet̄. ⁊ ſi ꝓpter alteriꝰ mēbri attractionē ꝯ̄riam illa prohibeat̄ ⁊ poſtea poterit fieri diuerſio. Pōt ēt legi locꝰ vt ſit pars alteriꝰ ꝑ̄terite d̄claratōis addita: ī qua dicat ꝙ ſi dolēte mēbro traxiſſet ad ꝯ̄riū ⁊ mā nō obedit: tūc non agas violēter ī attrahēdo q: nō obediet: īmo ſubtiliet̄ vt magis currat. Et hūc moduꝫ Dy. putat meliorē. Hic tn̄ modus ſi bene ꝯſideres poneret oppoſitū eiꝰ qd̄ dictū ē ſupra ꝙ ī fortiſſimo dolore eſt euanduꝫ vſqꝫ ad ſincopim.

Duo ſūt q pricipalr̄ reddūt mām inobedientē eiꝰ tractui ad ꝯtrariū: primū eſt indiſpoſitio māe trahēde: vt q: eſt nimis groſſa ⁊ viſcoſa ⁊ vehemēter adherēs: ⁊ tunc prius q̄ꝫ trahat̄ eſt ſubtiliāda vel icidenda. 2m ē obſtructio viaꝝ īter locum vn̄ trahit̄ ⁊ locū ad quē trahit̄: ⁊ tūc ſunt aperiende prius q̄ꝫ tractio fiat.

Et forſitan tibi ſufficiet vt trahas licet nō euacues: quoniā ipſa attractio eius iter ad mēbrum prohibet licet non extrahat̄: per ipſam ergo attractionē ad intentioneꝫ perueniemꝰ licet cū ipſa nō euacuaueris ſed declinatione contētus fueris que fit ligando mēbra oppoſita aut vētoſis ⁊ medicinis rubificātibus: ⁊ ad ſūmū cuꝫ omni qd̄ dolorꝫ efficit.

Nota ꝙ Auic. nō intēdit hic ꝓhibere tractū velocē ⁊ violentū ī parte ad quā querit̄ tractus māe: ſꝫ in parte a qua trahit̄ vel ꝓpe ipſam: imo violēter ꝯuenit ⁊ velociter agē circa partem ad quā trahitur: vt applicare vētoſas vel doloroſe ligare: ⁊ hoc frequēter ꝓficit ad attractioneꝫ.

¶ Remouet quartū dubiū. Poſſet qs dicere vtruꝫ in oī attractiōe ad ꝯ̄riū ſit oportunū humorē q trahit̄ euariͣ a corpore? Ad qd̄ rn̄det ꝙ non: q: forſitā qn̄qꝫ ſola attractio abſqꝫ euōne tibi ſufficiet: q: lꝫ humor non extrahat̄ a corpore: tn̄ ꝓhibebit nocumētū preexiſtēs in humore quāuis ſit ꝯtentꝰ ſola declinatōe humoris abſqꝫ euōne: ⁊ fit iſta attractio cuꝫ ventoſis: cū ligaturis ⁊ cū fricatiōibus ⁊ cū oī qd̄ efficit dolorē ſicut emplaſtra rubificātia ⁊ percuſſio ⁊ cauteriū ⁊ ſimilia. Et pars iſta tota eſt clara ⁊c̄.

Ex materijs aūt que ad euanduꝫ ſūt faciliores ſunt ille q̄ ſūt in venis: deīde ille que ī mēbris ⁊ iūcturis: qm̄ qn̄qꝫ eſt difficile eas extrahere ⁊ euare: ideoqꝫ neceſſe ē vt cū euacuabunt̄ alie cuꝫ eis egrediātur.

¶ Hic vt ſupra dicit̄ Aui. ponit quoſdā icidētales can̄. circa dicta. Et diuidit̄ in tres ꝑtes ſicut ſunt tres can̄. 2ª ibi: curatio p̄terea. 3ª ibi: minutio quoqꝫ ¶ Dicit p° ꝙ materie q̄ ſunt faciles ad euanduꝫ ſūt ille q̄ ſunt in venis: deinde q̄ ſunt ī mēbris: ⁊ q̄ ī iūcturis ſunt difficiliores. Et iō qn̄ euant̄ iſte due neceſſe ē vt alie cū eis euacuent̄. ¶ Sed ꝯ̄ hoc videt̄ eē id qd̄ dicit Meſue in ſuo de ꝯſolatione ꝙ māe in ſtomaco ⁊ iteſtinis ſūt faciliores ad euandū q̄ꝫ māe q̄ ſunt ī venis. Hic rn̄det̄ duplr̄. p° ꝙ Aui. hic non ītelligit vlr̄ ꝙ oēs māe que ſunt in mēbris ſint difficilioris euacuatōis q̄ꝫ ille q̄ ſunt ī venis. Nā ille q̄ ſunt ī venis ſūt bn̄ in mēbris: q: vene ſunt mēbra. voluit ergo ꝙ ille q̄ ſūt in mēbris difficilioris ſint ad euanduꝫ q̄ꝫ ille q̄ ſunt ī venis: ſed nō oēs: īmo ille q̄ ſūt ī mēbris valde remotis a vijs ductuū. ¶ Scd̄o mō pōt dici ꝙ mās ꝯtētas in mēbris non vocat Aui. illas q̄ ꝯtinent̄ in latis ⁊ manifeſtis ꝯcauitatibus: tunc eīꝫ ille q̄ ꝯtinent̄ in iūcturis ꝯtinerent̄ ī mēbris. ⁊ tn̄ Aui. videt̄ hic īnuere diuerſitatē cū dixit: In mēbris ⁊ iūcturis. ſꝫ illas dicit in mēbris que ſunt ī poris mēbroꝝ diſſeminate. modo iſte ſūt difficiliores in euōne q̄ꝫ ille q̄ ſunt in venis eiuſdē mēbri. ⁊ ſm hunc modū ille q̄ ſūt in ꝯcauo iteſtinoꝝ ⁊ ſtomaci nō dicunt̄ ī mēbris. ille aūt que ſūt ībibite ī poris iſtoꝝ mēbroꝝ difficilius euant̄ q̄ꝫ ille q̄ ſūt in venis. Cā aūt verificās canonē eſt q: māe q̄ ſunt in mēbris hn̄t trāſire ꝑ ſtrictiores vias: ⁊ cū hoc plerūqꝫ nō ſūt ita fluide ⁊ ſubtiles ſicut in venis. Reliqua patēt.

Euacuatio preterea eſt neceſſariū ne ꝓperet comedere nutriētia multa ⁊ mala q̄ natura indigeſta trahat. Quod ſi aliquid ex hoc fieri neceſſe fuerit oportebit vt paulatiꝫ ⁊ ſuauiter fiat donec fit ſm ordineꝫ: ⁊ vt ſit qd̄ corpus ingredit̄ digeſtū ⁊ conueniēs.

¶ Preterea ponit 2m can̄. dicēs ꝙ neceſſariū eſt illi qui euatus eſt ne p̄paret comedere nutrimēta multa ⁊ mala q̄ trahat ad ſe nā idigeſta. ꝙ ſi fuerit neceſſariū facere aliqd̄ iſtoꝝ: oꝫ ꝙ fiat paulatiꝫ ⁊ ſuauiter ⁊ ſm ordinē ita ꝙ illud qd̄ igredit̄ corꝑꝰ de cibo ſit digeſtū ⁊ ꝯueniēs. Ubi nota ꝙ Aui. intētio ē ꝙ nō ſumat̄ nutriēs malū poſt euōnē: nec etiā multū ita ꝙ vtrūqꝫ dꝫ vitari ⁊ malicia ⁊ multitudo cibi. Et cā ē q: poſt euōneꝫ mēbra inanita fortiter trahūt a ſtomaco: ⁊ ſtomacus ꝑ ianitōeꝫ nō tā bene digerit. iō qn̄ res eſt mala trahit̄ facilr̄ a ſtomaco ꝓpter ipſaꝫ non retineri fortiter. ⁊ ſimilr̄ qn̄ eſt multa. ⁊ iteꝝ malus cibus plerūqꝫ nō facile digerit̄. Nā plerūqꝫ ex vtriuſqꝫ aſſumptōe ⁊ multi ⁊ mali ſequit̄ id qd̄ Aui. dicit ꝙ nā trahit īdigeſtū ad mēbra: qd̄ poſtea eſt cā putredinis ⁊ malaꝝ diſpōnuꝫ. ſi tn̄ dꝫ ſumere aliqd̄ iſtoꝝ: ſumat paulatim ita ꝙ vincat̄ a virtute ⁊ digerat̄: ⁊ tūc eſt ꝯueniens.

Minutio quoqꝫ ē euatio hūoribꝰ equalr̄ augmētatis ꝓpria. Euatio vero humori qui in quātitate ſolum augmētat̄ aut corrūpit̄ ꝓpria eſt alia a minutōe.

¶ Ponit tertiū can̄. dicens: ꝙ minutio ē euatio proprie humoribꝰ equalr̄ augmētatis: ſꝫ euatio humoris q ſolus augmētat̄

UVA. BHSC. IyR_006_1

Nota ꝙ minutio pōt accipi proprie.ſ. ꝓ ſola artificiali vene vel artarie iciſiōe. ⁊ iproprie ⁊ latiꝰ.ſ. vt ſub ea ꝯtinet extractionē ſanguis cū vētoſis vel ſāguiſugis. Et nō dicit minutio propria eūatio ex eo ꝙ humoribꝰ equalr̄ augmētatis ſolū cōpetat repletōi in qua quilibꝫ humoꝝ vniformiter ꝓpriaꝫ mēſuraꝫ in ꝯparatōe ad alios ⁊ totū corpus ſuperexcedit. imo ſi ſolus ſanguis excedat ꝯpetit flobothomia: ⁊ qñqꝫ ēt ipſo ſāguine nō excedente nec diminuto ꝯuenit flobothomia ſi humores peccantes fuerint vehemēter mixti cuꝫ ſāguie: vt dicit Aui. pria tertij tractatu primo. c. vltio. Cū materiam eūare volueris ⁊c. Sed dicit ꝓpria vel q: hūoribꝰ equaliter augmētatiſ ñ educit electiue aliquem humorē determinatuꝫ: ſed oēm idifferēter qui ex parte ſui ſit aptus fluere ꝑ foramen vene: vel dicitur ꝓpria q: nulla medicinalis eūatio educit indifferēter omnē humorē excepta flobothomia: vel dicit ꝓpria q: ſibi ꝓprie ⁊ per ſe cōuenit ſanguinē educere i quo cōtinentur humores actu vel potentia: vel dicit ꝓpria q: prompte ſine adiutorio ⁊ mora educit oēs humores: vt pꝫ vidēdo ſanguinē extractum.

augmētatᷣ in quātitate ē alia a minutione. ¶ Ubi nota ꝙ humoribꝰ equalr̄ augmētatis maxime cōueniēs eūatio eſt flobothomia ſiue minutio qꝺ idē ē: q: illos oēs eūat. Et ēt flobothomia maxie ꝯuenit tali augmēto humoꝝ: q: ipſa de ſe nō eligit determinatū humorē: ſꝫ quē vel quos i venis reperit hos trahit. Et hoc tñ nō vult Aui. ⁊ alij docto res ꝙ nō ꝯueniāt niſi qñ humores ſūt equalr̄ augmētati. Nā in tertiana ⁊ flegmatica ⁊ q̄rtana ⁊ multis caſibꝰ ꝯuenit i quibꝰ ꝯſtat ꝙ hūores nō ſunt equalr̄ aucti: ⁊ iō nō dꝫ ita ꝓpria ſicut ꝓprie ꝓpria. Qñ aūt vnꝰ humor peccat ſolus in quāto ſi fuerit aliꝰ a ſanguine eūatio eſt alia a minutōe q̄ merito illiꝰ ē ꝯueniēs: eſt eiꝫ purgādus cū medicina illū hoīeꝫ purgāte ſiue eūante electiue: ſꝫ flobothomia nō facit illꝺ. Si vero fuerit ſanguis ille humor vnꝰ peccans nō eēt illa eūatio ꝯueniēs: niſi flobothomia aut ꝓuocatio fluxꝰ ſanguis ꝑ aliquā viaꝫ vt emoroidaꝝ vel venaꝝ naſi vel menſtruoꝝ. Et iō non puto Auic. velle ꝙ nulla eūatio vnius hūoris vel ꝓ vno humore tantuꝫ ſit flobothomia. Poſſet tñ dici ꝙ nō eſt poſſibile naturalr̄ ſoluꝫ ſanguinē trahi per flobothomiā: ⁊ ideo illa non eſt euacuatio vnici humoris licet non ſuperfluat niſi vnus.

Omnis preterea euacuatio que eſt ſuperflua ſꝫ plurimum febres generat.

¶ Hic ponit quintā rē quā oportet cōſiderare i eūatiōe ⁊ cañ. circa illius cōſiderationē: ⁊ ē res iſta quātitas euacuandi. Et diuidiᷣ in duas partes. pᵒ facit hoc. 2ᵒ ponit cañ. alios incidētalr̄. 2ª ibi: ⁊ ꝺbes ſcire ꝙ vētris. Prima diuidiᷣ in ſex ꝑtes: ſicut ſunt ſex regule ſiue ſex canones. ſecūda ibi: cūqꝫ vētris. 3ª ibi: ⁊ ſcito. 4ª ibi: cūqꝫ humor. 5ª ibi: cūqꝫ alicuius. 6ª ibi: ⁊ ſimiliter cū mā. ¶ In prima ꝑte puto ipm velle iſtā conclōnē. Medicus nō dꝫ regulr̄ opando ſuꝑfluā facere eūationē. ꝓbatᷣ q: medicꝰ nō dꝫ illud regulr̄ facere qꝺ ſit cum ꝑiculo notabilis nocumēti vt plurimū: ſed ſuꝑflua eūatio eſt huiuſmodi: igiᷣ ⁊c. Minor pꝫ q: oīs eūatio que ē ſuꝑflua vtplurimū generat febreꝫ. Et ē hic cañ. ex ſnīa Hypo. pria ꝑticula afforiſmoꝝ affo. 3ᵒ illa parte. Neqꝫ ꝯpreſſiōes ad vltimū ducere fallax eiꝫ ē. ¶ Nota ergo prio ꝙ eūatio pōt dici ſuꝑflua aut reſpectu quātitatis quā cōiter hoīes poſſint bene tollerare: aut reſpectu humoris digni euacuari: aut reſpcū cōtinētie vaſorū: aut reſpcū virtutis debētis talē eūationē tollerare. Exemplū primi vt ſi cōiter hoīes tollerāt eūationē ſex vnciaꝝ ſanguinis: oīs flobothomia ꝑ quā plus euacuaretur diceretᷣ ſuꝑflua tali mō. Exemplū ſcꝺi: vt ſi hūor dignus eūari ſit libre vniꝰ oīs eūatio per quā plus euacuatᷣ q̄ꝫ libra diceretᷣ ſuꝑflua. Exemplū tertij: vt ſi vaſa nō ꝺbēt ita eūari quin cōtineāt certā quātitatem ſanguinis ī fine: oīs eūatio per quā duceretᷣ ad minorē eēt ſuperflua. Exēpluꝫ quarti: vt qñ per eūationē debilitatᷣ notabiliter virtꝰ: puto tamē hoc maxime verificari cañ. de ſuꝑflua eūatiōe reſpectu humoris eūandi: aut reſpcū virtutis. vide ſcꝺa primi. c. de his que ꝓueniūt ex retētiōe ⁊ eūatiōe. ¶ Scꝺo principalr̄ nota ꝙ ſuꝑflua eūatio qñqꝫ īfrigidat ⁊ qñqꝫ calefacit. nā qñ eūatur humor fridus vt flegma aut humor tēꝑatus vt ſanguis cōtingit ꝙ humores calidi remanentes ſupercaleſiāt ⁊ īflāmentᷣ. Qñ aūt eūantᷣ humores calidi vt ſanguis ⁊ colera ſimul īfrigidāt ꝓpter extractionē rei calefaciētis. ⁊ hoc habetᷣ ab Aui. ſcꝺa primi loco allegato. ¶ Cōtra cañ. arguitᷣ ſic. Illud non generat febres ſm plīmū qꝺ infrīdat: ſed ſuꝑflua eūatio infrīdat: ergo ipa nō ſm plurimū gnāt febres. Maior pꝫ: ⁊ minor ē Aui. c. ſtatim allegato ſcꝺa primi. ¶ Hic diciᷣ ꝙ nō oīs eūatio infrigidat: imo aliqua calefacit: ⁊ aliqua infrīdat. Sꝫ ſuperflua eūatio q: vtplurimū cōiungiᷣ cū multa agitatiōe humorū ⁊ motu: iō tꝑe ſue duratiōis calefacit caliditate accidentali vt plīmū tanta vt inde ſequatᷣ febris: ⁊ hoc ſufficit Aui. Tu tñ potes arguere ꝙ oēm ſuꝑfluā eūationeꝫ ſi ſuꝑflue eūetur ſequitur ipam frigiditas ⁊ ſiccitas in ſubſtantia mēbrorū ⁊ in eorū natura: vt Aui. loco allegato dicit: ⁊ per cōſequēs nō caliditas. Etiā neganda ē cōſequētia: vt patet ex Aui. ibidem.

Cūqꝫ ventris conſtrictio qui fluere ſolebat: aliquaꝫ egritudinē poſſidere fecerit: illiꝰ euacuatōis reuerſio ſm plurimū ipſuꝫ medicabitᷣ ſicut ab eo quē cōſtrictio ſaniei auriuꝫ aut mucoruꝫ nariū vertigineꝫ poſſidere fecit eiꝰ reuerſio ipſaꝫ remouebit.

¶ Ponit 2ᵐ cañ. dicens ꝙ qñ ꝯſtrictio vētris qui fluere ſolebat facit poſſidere aliquā egritudinē: tunc eiꝰ reuerſio facit illā egritudinē remoueri ſm plurimū ⁊ eradicari. Et cā pꝫ. nā egritudines q̄ ꝯſequuntᷣ ꝯſtrictioneꝫ vētris q fluere ſolebat plurimuꝫ pendēt a mā que retinetᷣ ⁊ ſolebat expelli ſicut in duobus exēplis poſitis ab Aui. ī littera de vertigine ex retētione ſaniei auriū ⁊ mucoꝝ ⁊ mēſtruorū. mō eūata mā per ſiłem ventris ſolutōeꝫ prior cā remouetᷣ ⁊ ꝑ ꝯñs etiā egritudo. ¶ Diciᷣ aūt notāter ſm plurimū: q: qñqꝫ egritudo ē ꝯfirmata aut malicia alijs hūoribꝰ ita cōicata ꝙ ēt remoto hūore q fuit pª cā corꝑalis: effectꝰ tñ remanet: ſicut ſi poſt cōſtrictōꝫ emoroidaꝝ accidēt ꝑtiſis aut mania aut idropiſis nō ſemꝑ per earū aꝑitionē remouerentᷣ. ¶ Nota tamen hic tria. Primū ꝙ vēter non ſumiᷣ hic pro ſtomaco aut cōcauitate inteſtinoꝝ: ſed gnālr̄ ꝓ oī cōcauitate hūorū receptiua. vñ Aui. exēplicauit ꝺ ſanie auriū ⁊ muco. ¶ Scꝺo nota ꝙ reuerſio eūationis ꝑterite pōt eē duobꝰ modis. vno mō: ſilis i forma ⁊ loco: vt ſi fluebat ſanies ab aure iterū ita fluat. 2ᵒ mō pōt eſſe ſilis loco vel virtualr̄: vt ſi mucꝰ ꝑ nares fluebat: nūc per gargariſmata expellatᷣ ⁊ ꝑ os: ⁊ vtroqꝫ mō verificatᷣ ꝙ vtplurimū talis reuerſio curat egritudineꝫ. Ego aūt teſtor me vidiſſe plures i quibꝰ ab vlceribus auriū ſolebat fluere ſanies ⁊ facta cōſolidatiōe icurrebāt febres mortales: a quibus neqꝫ per cauteriū factū in loco: neqꝫ alio mō euadere potuerūt. Alios aūt in ſimili cāu vidi vtētes eūationibus frequētibꝰ cū ſolutiuis qui ñ ꝑceperūt nocumētū ſtrictionis ſaniei. ¶ Tertio nota quꝺ hic cañ. ꝑtinet ad quātitatem eūatiōis: q: reuerſio deberet eē illiꝰ ſolōnis ꝯſuete: ⁊ ſic dꝫ eē quāta illi ꝯſuete ad hoc vt ꝑ ipaꝫ mā eūetur.

Et ſcito ꝙ reſiduum materiei dimittere qꝺ neceſſe erat euacuare minus nocumētuꝫ ē q̄ꝫ exquiſitiſſime euacuare ⁊ peruenire i ipſa ad hoc vt virtꝰ terreatᷣ quoniā multotiēs natura hoc reſoluit reſiduuꝫ.

¶ Hic ponit tertiū cañ. ⁊ dicit Aui. ꝙ tu ſcias ꝙ dimittere reſiduū materiei qꝺ neceſſe erat eūare ē minꝰ nociuū q̄ꝫ exquiſitiſſime eūare ⁊ ꝑuenire in ipa eūatiōe ad hoc vt virtꝰ terreatᷣ: q: nā multotiēs hiꝰ reſiduū reſoluit. ¶ Ubi pᵒ nota hūc cañ. eē de quātitate eūatiōis cōparate ad peccantē hūorē. ¶ Scꝺo nota cōiter hūc locū ita exponi: ac ſi Aui. vellet gnāliter ꝙ meliꝰ ē dimittere reſiduū q̄ꝫ exquiſitiſſime eūare ꝓpter duas cās. pria q: i exquiſitiſſima euacuatiōe terrefit virtꝰ. 2ᵒ q: nā multotiēs hoc reſiduū reſoluit ſine artificiali alia eūatiōe: ⁊ hoc ē melius q̄ꝫ qꝺ fiat arte. mihi aūt videtᷣ ꝙ multe ſint materie que ita parate eūantᷣ: ⁊ cū tā pauco nocumēto ꝙ bonū ē eas exquiſitiſſime eūare: cū inde nō ſequatᷣ nocumētū: vt feces dure in īteſtino recto: vt colera natās ī ſtomaco: vt flegma ī fūdo trachee artarie: aut ſanguis coagulatus in ore aut in iteſtino: ſanies pauca ī paruo vlcere manifeſto. Sed videtᷣ ꝙ Aui. vult ꝙ tūc meliꝰ ē dimittere reſiduū materiei qñ exquiſitā eūationē ſequiᷣ terrefactio virtutis ⁊ multa debilitatio. vñ nō diciᷣ ꝙ meliꝰ ē reſiduū dimittere q̄ꝫ exquiſitiſſime eūare ſꝫ q̄ꝫ exquiſitiſſime eūare ⁊ ꝑuenire i hoc vt virtꝰ terreatᷣ. qñ eniꝫ exq̄ſitiſſima eūatio eēt cōiūgenda cū hoc qꝺ ꝑ ipaꝫ ꝑueniretᷣ ad terrefaciēdū virtutē: tūc meliꝰ eēt nō exquiſitiſſime eūare.

Cūqꝫ humor illiꝰ fuit generis cuiꝰ eē oportet ⁊ eger tollerare pōt nō terreri debes ex ſuperfluitate: qñqꝫ ēt cōtingit cū te euacuare oꝫ vſqꝫ ad lipotomiaꝫ.

¶ Hic ponit 4ᵐ cañ. dicēs ꝙ qñ hūor fuerit illiꝰ generis cuius eē oꝫ vt eger pōt tollerare nō debes terreri de ſuꝑfluitate eūationis: imo qñqꝫ cōtingit ꝙ egro tollerāte oꝫ euacuare vſqꝫ ad lipotomiā. Et vt pleniꝰ cañ. itelligatᷣ dubitatur primo.

Utrum in aliquo caſu ſit euacuādū

artificialr̄ a medico vſqꝫ ad ſincopiꝫ. ¶ Negatiue arguiᷣ ſic. primo qꝺ medicꝰ nō dꝫ eūationeꝫ facere ꝑ quā virtus plīmū debiliteᷣ: ſed hec eūatio vſqꝫ ad ſincopiꝫ ē talis: igitur ⁊c. maior pꝫ q: cōis intētio vtriuſqꝫ opoſculi ē vite cuſtodia. ¶ Scꝺo illa eūatio nō ē faciēda ꝑ quā plīmū ꝺ humore bono eūatur. talis aūt ē ducēs ad ſincopim cū aliter ad ſincopim nō deduceretᷣ. ¶ Tertio illa eūatio nō debꝫ fieri ꝑ quā corpus exponiᷣ ꝑiculo vt ꝑ paruū accidēs moriatᷣ. talis aūt ē eūatio vſqꝫ ad ſincopim: igiᷣ ⁊c. ¶ Quarto q: per talē eūationē aliqñ humores mouētur ad putredinē cū deſinat virtꝰ ab eoꝝ regimīe debilitato calore īnato qui regebat. ¶ Quinto q: medicꝰ non dꝫ vti remedio qꝺ iuuat ꝑ accidēs: vt per ſe valde notabile faciat nocumētū: ſed eūatio vſqꝫ ad ſincopiꝫ ē hiꝰ: igiᷣ ⁊c. Qꝺ enim per ſe faciat nocumētū magnū nō ē dubiū. Sꝫ ꝙ faciat iuuamētū ꝑ accidēs: pꝫ maxime ī ſinoca in quo magis ꝯcediᷣ: q: in illa iuuat īfrigidādo. nā talis eūatio infrigidat ꝑ accidēs ⁊ nō per ſe. ¶ Sexto q: nā nūquā ī bona ⁊ laudabili criſi facit ſincopiꝫ: ⁊ medicꝰ debꝫ eē imitator nāe in operibus bonis: igiᷣ ⁊c. Et pro hac ꝑte ē Auer. 7ᵒ colliget icrepans Gal. ⁊ cōtra ipm arguēs in hoc ꝓpoſito. ¶ In oppoſitū ē Aui. hic ⁊ Gal. 9ᵒ terapētice. ⁊ Aui. pria quarti. ⁊ Hypo. prima ꝑticula affor. illo affo. Que egerūtur ⁊c. Gal. i cōmēto ⁊ fere oēs medicīe doctores excepto Auer. ¶ In hoc dubio nota prio ꝙ lipotomia ꝓprie ē defectus aioſitatis. ⁊ cōiter intelligūt medici eſſe eā cuꝫ per aliquā cām deficit ab audendo tētare oꝑa ꝯſueta ī robore ꝓprio: lꝫ loquatur vt audiat ⁊ videat ⁊ cognoſcat. ⁊ hec differt a ſincopi. Sincopis aūt a Gal. 12ᵒ terapētice. deſcribiᷣ ꝙ ē caſus virtutis ſubito: ⁊ itelligit de virtute vitali. nā ī epilenſia eſt caſus ſubitus aīalis virtutis quā nō dicit ſincopim. Sꝫ apud Aui. xjª tertij. c. ꝓprio. deſcribiᷣ ſincopis ꝙ ē ꝺſtructio maioris ꝑtis pluriū virtutis ſenſibilis ⁊ mo

UVA. BHSC. IyR_006_1

tiue ꝓpter debilitatē cordis ⁊ aggregationē totaleꝫ ſpūs
ad ipm̄. Et ponit tres cās aggregatiōis huius. Pria ē cā
mouēs ipꝫ ad interiora. 2ª ē prefocās ipm̄ interiꝰ: ita ꝙ ñ
īuenit ſpiraculū. 3ª ē debilitas ⁊ ſubtilitas ſpūs quare nō
ſupfluit vltra illū qui repitur ī minera. Et conſtat ꝙ apud
Aui. ſincopis ē accidēs cuiꝰ cā ē defectus virtutis cordis
cū cōditione dicta. Sꝫ apud Gal. ſincopis ē ille defectꝰ
virtutis ad quē ſequit̄ dictum accidēs. ¶ Scd̄o nota ꝙ
ſincopis quedā ē recupabilis: ⁊ quedā irrecupabilis: īmo
mortalis. Et ego declaraui cām̄ huius pria particula affo
riſ. illo affo. Que egerunt̄. ¶ Tertio nota ꝙ ſꝫ Dy. q̄daꝫ
ē ſincopis vera ī qua nō ſolū ē debilitas ī membris igno/
bilibus: īmo etiam in principalibꝰ incipit cōicari. Quedaꝫ
aūt ē nō vera ⁊ ē qñ cōicat̄ debilitas multa aīaliū opatio/
nū mēbris ignobilibꝰ: ſed principalibꝰ fortibꝰ remanētibꝰ.
¶ Quarto ē memorandū ex ſepe dictis quādā eē opatiōꝫ
regularē: quādā coactā. ¶ Tūc ſit pria ꝯclō: nūq̄ꝫ eſt eua
cuandū vſqꝫ ad ſincopim irrecupabilē. hāc nō ꝓbo. ¶ 2ª
ꝯclō: medicus dꝫ eūare qñqꝫ vſqꝫ ad lipotomiam ſiue ſin/
copim nō verā recuperabilē. Iſta pꝫ q: qñqꝫ eūatōes alie
nō ducētes vſqꝫ ad hāc ſincopim nō ſufficiūt mortale pe/
riculū euitare: ⁊ iſte ſufficiūt. Mō cōſtat ꝙ qñ aliter ñ pōt
maius dānū euitare: niſi aliquid aliud ſubeūdo qd̄ ſit mi/
nus: ꝙ illud minꝰ ē ſubeūduꝫ. Et pꝫ añs ex Gal. ⁊ aliis ⁊
Hypo. ⁊ Aui. q experti ſunt ī caſibꝰ quibuſdā iſtas euacua/
tiones cuꝫ ſincopi ꝯtuliſſe vbi alie ſine ſincopi nō cōtule/
runt. Vñ Gal. loco allegato dicit ꝙ in fortiſſimo dolore
⁊ in acutiſſimo apate ⁊ ī febre ardētiſſima nulla melior in/
uenit̄ medicina q̄ꝫ eūatio vſqꝫ ad ſincopiꝫ: vt ſupra dictū
ē qñ in fortiſſimo dolore eūatiōes que hoc nō fecerint nō
ſufficerēt ꝓhibere curſum ad locū doloris ⁊ ꝑiter nō ſuffi
cerēt ꝓhibē augmētū acutiſſimi apatis aut ardorē febrilē
ꝑmutantē hūorē corpis ī malā putredinē niſi eūatio vſqꝫ
ad ſincopim: q: facit cor vehemētiſſime attrahere: ⁊ ſtu/
pefacit ſenſitiuā virtutē ⁊ īfrigidat totū corpus: Iſtis tri/
bus caſibus fere cito opitulat̄. Accidit hoc quādo ē vera
lipotomia abſqꝫ plurimo defectu pricipaliū: ⁊ ſi accidens
illud ſit terribile preſertiꝫ vulgo. medico tamē erudito nō
ita q: ſcit cū pauco adiutorio ⁊ in pauco tpe accidēs remo
uēdū. Ego aūt puto ꝙ ex ꝓbatiōe huiꝰ cōcluſiōis ſequit̄
ꝙ aliqñ medicꝰ dꝫ ducere vſqꝫ ad verā ſincopiꝫ ſꝫ repabi
lē. Et ꝓbat̄ ſic iſta ꝓſertiꝫ qñ ſcit̄ ꝙ aliter oīno infirmus
piclitat̄ ⁊ morit̄. Hec eiꝫ remedia ñ ſunt admiſtrāda ī leui
bus morbis ſꝫ in piculoſis. Et ad verā ſincopiꝫ ī q̄ ē ſpes
recupatōis dicimus ꝓpter vitare piculuꝫ certe mortis. ⁊
hec eſt ſnīa Gal. 10° terapē. c. x. In alio tñ ꝓpoſito cū di/
cit: Ergo quāto meliꝰ cū ſpe benigna efficiētes q̄ꝫ pericli/
tari. i. īcurrere piculum q̄ꝫ ſine ſpe perire certiſſime tanto
potiꝰ et cuꝫ magnis auxiliis agonizari q̄ꝫ nihil gerere. Et
ꝓpter hoc puto Dy. hic non bñ dixiſſe cū voluit ꝙ nullo
mō ad verā ſincopiꝫ ducēdus eſt eger niſi forte ꝑ verā in/
tellexerit irrecupabilē: qd̄ nō appet ex ſuis verbis. Et ex
hoc videt̄ mihi facile ſoluere dubiū qd̄ ſolet moueri circa
ꝓcedentē cañ. ſ. vtrū ſit vltimate eūandū reſpectu quātita
tis humoꝝ: Nā ex quo qñqꝫ eſt eūanduꝫ vſqꝫ ad ſincopiꝫ
in qua virtꝰ multū debilitat̄: videt̄ ꝙ ēt multotiēs virtus
ad hec ducēda eſt vt terreat̄ eūando totū: qñ. ſ. in nō eua/
cuādo totū eēt piculū. Sꝫ vtplurimū īfra ſubſiſtere ē me
lius q̄ꝫ terrefacere virtutē: q: raro eſt neceſſitas huius fe/
ſtinatōis. ⁊ hoc vult Auic. ſupra. ¶ 3ª ꝯclō: nunq̄ꝫ talis
eūatio vſqꝫ ad lipotomiā ē regularis. pꝫ q: eſt cū notabili
nocumēto. ¶ 4ª ꝯclō: nō ſoluꝫ ꝑ flobotbomiā lꝫ vſqꝫ ad
ſincopiꝫ cūare: ſed ēt per farmacū. hoc pꝫ ex Gal. in fine
ꝯmēti illius affo. Que egerunt̄ nō multitudinē cōſiderare
oꝫ. Nā qñ talis mā nō eſt ſanguis neqꝫ ſanguini ita mixta
ꝙ per flobotbomiā educat̄ eūanda eſt ꝑ farmacū. Et hoc
eſt qd̄ dicit Gal. in 10° terapē. ad fugienduꝫ certā mortē.
¶ 5ª ꝯclō: ſecuriꝰ eſt cū flobotbomia eūare vſqꝫ ad ſinco/
piꝫ q̄ꝫ cū farmaco. Iſta pꝫ per duas cās. pª eſt q: illi qui
fortiꝰ indigēt eūone cū farmaco ſunt neceſſario grauati: ⁊ ī
eis ē repletio quo ad virtuteꝫ ⁊ humor peccās cōiter ē ma
lignior. 2ª eſt cā q: flobotbomiā poſſumꝰ ad libitū reſtrin
gere ſtatiꝫ incipiēte ſincopi: ſed farmacie opus nō eſt ita.
¶ Nota tñ ꝙ ex his duabꝰ cauſis nō ſequit̄ quin eūatio
qñqꝫ ſit faciēda cū farmaco vſqꝫ ad ſincopiꝫ. Et vult Dy.
ꝙ in ſinoca cū putredine ē virtꝰ onerata ⁊ eſt repletio quo
ad virtutē: ⁊ tñ fit flobotbomia vſqꝫ ad ſincopiꝫ. ⁊ hoc ha
bet̄ 9° terapētice. Sꝫ 2ª cā nō plus ꝓbat niſi ꝙ cuꝫ flobo/
thomia ſecurius fit eūatio vſqꝫ ad ſincopiꝫ q̄ꝫ ꝑ farmacū.
⁊ hoc ꝯcedit̄. Qd̄ ſi dicat̄ quid voluit Aui. cū dixit in iſto
cañ. Cūqꝫ humor illiꝰ fuerit grauis cuiꝰ eſſe oꝫ niſi ꝙ hec
eūatio vſqꝫ ad lipotomiā nō eſt faciēda niſi qñ humor eſt
determinati generis. ſ. ſanguis: ⁊ ſic īnuit ꝙ ſoluꝫ eſt flo/
botbomia q̄ dꝫ fieri vſqꝫ ad ſincopiꝫ. Hic pōt dici ꝙ nō ē
mens Aui. ꝙ ſoluꝫ ſanguis ſit illiꝰ generis cuius eē oꝫ ad
faciendū eūoneꝫ vſqꝫ ad lipotomiaꝫ. Sꝫ humor in quo oꝫ
hoc facere oꝫ ꝙ ſit facilis ad currēdum aut multe īflāma/
tionis aut venenoſitatis: aliter eiꝫ ſi nō eſſet tantū piculū
in mora quin poſſet eūari in pluribꝰ vicibꝰ melius q̄ꝫ non
ducēdo vſqꝫ ad ſincopiꝫ: oꝫ 2° talē humorē non eē ita ma

Eſſet dicēdū ſm̄ mētē Gal. ī hoc dubio. xi. terapentice. c. ii. ꝙ ſi medico parato ꝯſtaret māꝫ peccāteꝫ eē penitus irreducibileꝫ ad benignū ⁊ cū hoc eſſe digeſtam ⁊ ſeparataꝫ a bonis humoribus ⁊ ip-

lignū ꝙ nullo mō ſperet̄ de euaſione. nam tunc iſta reme/
dia nō ſunt faciēda: q: qñ certiſſime ſūt morituri ibi nō ſūt
experimētāda remedia bona ne poſtea vituperent̄ cū non
operant̄ intentū. ⁊ hoc dicit Gal. 9° terap. Ex his pꝫ ar/
gumētoꝝ ſolō cū dicit̄ ꝙ medicus dꝫ imitari naturā na/
turalr operāteꝫ ⁊ nō ſinthomatice. Dicit̄ eiꝫ ꝙ nā ēt qñqꝫ
ꝑꝑ meliꝰ euacuat vſqꝫ ad ſincopiꝫ ⁊ liberat īfirmū: ⁊ ita fa
cit qñqꝫ medicꝰ. ſꝫ ſicut nā nō facit illd̄ niſi qñ ex toto do/
minat̄: ita nec medicꝰ qñ pōt regulr̄ opari. Alii ſunt modi
rñdendi aut ſolutōes quos ꝓ nūc dimitto: igit̄ ⁊c̄.

Cūqꝫ alicuiꝰ virtus fortis fuerit ⁊ ipſoꝝ humorum
materia multa ⁊ mala ipſaꝫ paulatiꝫ euacua.

¶ Ponit Aui. hic quintū cañ. dicēs: Cū alicuiꝰ virtꝰ fue
rit fortis ⁊ hūorū ipius mā multa ⁊ mala dꝫ paulatiꝫ eua/
cuari. ¶ Et nota ꝙ dixit cū virtꝰ fuerit fortis: vult ꝑ hoc
nō ꝙ qñ virtus fuerit d̄bilis ſit multū ī vna vice eūandū.
Sed pro hoc dat̄ intelligi quid faciēdū ſit virtute debili:
q: aut nō ē eūandū: aut multo minꝰ ꝓ vice q̄ꝫ in forti vir/
tute. ¶ Nota 2° ꝙ cū mā multa ⁊ mala nō pōt eē virtus
abſolute fortis: ſed dicit̄ hic fortis reſpcū mediocris eua/
cuatiōis tollerāde. ¶ Tertio nota ꝙ lꝫ virtꝰ ſit fortis: tñ
qñ mā ē mala ⁊ multa ipa nō pōt ī vice vna eūari quin duo
ſequātur nocumēta. vnū ꝙ virtꝰ nimiū debilitat̄: ſcd̄ꝫ ꝙ
nimiū de bono eūat̄. Primū iō accidit q: virtus nō ē ab/
ſolute fortis. nā in multa eūatione multū deficeret. Scd̄ꝫ
accidit iō: q: mā multa ⁊ mala de neceſſitate multū reſiſtit
⁊ medicina faciēs violētiā ad multū de ea euacuāduꝫ tra
hit etiam de bono.

Et ſimilr cuꝫ mā vehemēter fuerit penetratiua aut
cuꝫ ſanguine multū mixta nō poteris ipſā vna vice eua
cuare ſicut eſt in ſciatica ⁊ artetica lōgi tēporis ⁊ cācro ⁊
ſcabie antiqua ⁊ carbūculis veteribus.

¶ Ponit ſextū cañ. dicēs: ꝙ ſilr qñ mā fuerit multa pe/
netratiua: aut mltū mixta ſanguini dꝫ paulatiꝫ eūari. nec
poterit in vna vice debite eūari: ſicut ē in ſciatica ⁊ ī arte/
tica longi tꝑis: ⁊ in cācro ⁊ ſcabie antiqua ⁊ carbūculis ve
teribus. ¶ Vbi prio nota ꝙ mā ītelligit̄ multū penetrati/
ua: q: multū īfixa ī mēbris ⁊ fortiter adherēs: ſicut ea que
multū penetrat: ⁊ talis bñ ē in artetica longi tꝑis ⁊ ſciati/
ca longi tꝑis: q: mā ē in mēbris patiētibus multū fixa. ſ.
ī iuncturis ⁊ vicinis mēbris vt ligamētis. In ſcabie autē
antiqua ⁊ mala: ⁊ dicit in lr̄a: ⁊ carbūculis veteribus. ⁊ nō
ē intelligendū de carbūculis veris: ſed de carbūculis. i.
furūculis veteribꝰ. i. qui fuerūt multo tꝑe: mō in iſto tꝑe
mō in alio: ſicut multotiēs accidit in vna nate hinc ad quī/
deciꝫ dies in vna coſſa: ⁊ ī carbūculis ⁊ cancro. Iterū mā
ē multū ſanguini mixta illa que ē ſub forma cāe āteceden
tis: ⁊ que ē ſub forma cāe cōiūcte eſt mēbris fixa multum.
¶ Nota 2° ꝙ iō nō pōt vna vice totū eūari: q: plurimuꝫ
reſiſtit ꝑꝑ ſui adherētiaꝫ. Sūt eiꝫ qdā hūores qui facilr̄ a
mēbris ſeparāt̄: ſicut lutū purū a pānis. quedā vero diffi/
culter: ſicut humiditas coloris cū pāno vel lana ſiue ſciti/
co que nō ſepant̄ niſi cū ſubſtātia pāni. de quibꝰ hūoribꝰ
loquit̄ Gal. ī cōmēto ſuper illa pte alienatōes indeclara/
te palpabiles valde frenetice.

Et debes ſcire ꝙ vētris ſolō a ſupioribꝰ trahit ⁊ ab
īferioribꝰ eradicat. Duabꝰ ergo attractōibꝰ ē apta cōue
niēti ⁊ diuerſe: q̄ ēt eſt poſt materieꝝ quietē ē ꝯueniens.

Cū ergo māe fuerint a ſuperioribꝰ ad diuerſuꝫ tra/
het eas: ⁊ ipſas etiā eradicabit a locis vbi ſūt: vomitu ve
ro fit attractio ⁊ eradicatio ecōuerſo.

¶ Hic ponit cañ. incidētalit̄. Et diuidit̄ in quattuor ſi/
cut quattuor ſunt cañ. Primꝰ de ſolōne ⁊ vomitu. Scd̄s
de flobotbomia. Tertius de corporibꝰ nō eūandis. Quar
tus de locis vbi minus ē faciēda eūatio. ibi 2ª: minutiōis.
ibi 3ª: minus itaqꝫ. ibi 4ª: in regionibus. ¶ De primo di/
cit ꝙ tu debes ſcire ꝙ vētris ſolutio trahit a ſuperioribꝰ
⁊ eradicat ab īferioribꝰ: ⁊ iō ē apta duabꝰ attractiōibus. ſ.
cōuenienti ⁊ diuerſe: ⁊ ē ēt cōueniēs eūatio poſt humoruꝫ
quietē. Ex quo ſequit̄ ꝙ ſi humores fuerint ī ſuperioribꝰ
ē apta eos attrahere. ⁊ ſi fuerint in īferioribꝰ eos eradica/
bit a locis vbi ſunt: ſed in vomitu fit attractio ⁊ eradica/
tio ecōuerſo. ¶ Vbi primo nota ꝙ eradicatio ⁊ attractio
quādoqꝫ ſumūtur large ſm̄ ſuam cōem acceptionē ⁊ vim
vocabuli: ita ꝙ dicatur attractio oīs motus factus a mo/
tore q rē mouet ad ſe. eradicatio dicatur omīs eūatio per
quaꝫ radicitus ⁊ integre eūatur materia a loco ſuo in quo
erat tanq̄ꝫ in radice. ¶ 2° mō ſumūt̄ iſti termini ſtricte: vt
dicat̄ attractio omīs motus humoris qui ad aliū locū tra
hitur notabiliter diſtanteꝫ ante ſui attractionē. ⁊ hoc mo
do nō dicit̄ attractio niſi de illo motu quo mouet̄ humor
a longinquo. ille eiꝫ humor trahit̄ pº ad locū poſtea eua/
cuat̄. eradicatio auteꝫ ſtricte de euacuatiōe q̄ non fit per
attractionē a longīquo. ⁊ hoc non ītelligit Aui. hic ꝙ ven
tris ſolō eradicabit ab īferioribus ⁊ trahet a ſuperioribꝰ.
nam loquendo cōiter ab vtroqꝫ loco poteſt eradicare ⁊ ab
vtroqꝫ trahetur: ⁊ vomitu fit econtrario.

Minutōis

ſam in venis ꝯtinerē: ipſa tunc tota eēt exquiſitiſſima euacuāda. Sꝫ ſi mā peccās ſm̄ aliquid ſui ſit reducibil̄ ad benignū nō eſt exquiſitiſſime eūanda: vt etiā Gal. codē libro. c. codeꝫ. Dicēdū ē tñ ꝙ ī quibuſdā ſꝫ paucis caſibꝰ a medico prouido fieri pñt eūones exquiſite perducētes vſqꝫ ad ſincopiꝫ reparabilem excluſiue virtute exñte forti ⁊c̄. loquēdo tñ de eūone que ſit cū flobotbomia ⁊ nō cū ſarmacia. Primꝰ autē auctorizans in hac mā fuit Hyp. ī pria particula affo. affo. illo: Que egerunt̄ ⁊c̄. Et Gal. in ꝯmēto illius affo. docet ī quibꝰ caſibꝰ ꝯpetat talis euacuatio. Et ēt nono terapētice meminit aliqualiter d̄ hoc. c. iii. Auer. tñ. vii. colliget c. ix. adducit ad hoc opinionē Gal. ⁊ caꝫ reprobat q̄ttuor rōnibꝰ q̄s vide ſi placet.

Nota ꝙ vbi virtꝰ eēt debilis in aliquo corpore ⁊ humores mali eēnt multi: tunc tale corpus nō eſſet eūandū ſed nutriēdū bonis cibis vt virtꝰ ꝑ eos corroborata de ſe valeat expellē humores peccātes vel ſufferre medicinā aliquā qua purgaret̄. ⁊ hoc videtur de mēte Aui. tertia primi doctria ſcd̄a. c. illo Qd̄ comedit̄ ⁊ bibit̄ ⁊c̄.

UVA. BHSC. IyR_006_1

Minutiōis preterea diſpō diuerſificatur ſm loca a quibus ſanguis accipitur ſicut ſciuiſti.

¶ Ponit 2m cañ. dicēs ꝙ diſpō minutōis diuerſificat̃ ſupple in attrahēdo ⁊ eradicādo ſm diuerſitatē locoꝛuз a quibus ſanguis excipit̃. ⁊ hoc eſt clarum.

Minus itaqз cũctis hoibus euacuatōe dignus ē il le cuius cibus bonus fuerit ⁊ digeſtio bona.

¶ Canon terti⁹ eſt clarus: qꝛ in iſtis nō multiplicant̃ ma li humores. ⁊ per hoc potes itelligere de alijs diſpōnib⁹ ꝑ quas corpus caret malis humoꝛib⁹. ⁊ intelligat̃ bonus ci bus in quāto ⁊ quali ⁊ modo adminiſtratōis.

Hoc ē Hyp. in ſcda particula affo. affo. illo: Sana ha bētia corpora ⁊c. Et Gal. ēt in cōmēto il li⁹ cuз dicit: Ex his verbis ⁊c.

In regiōib⁹ quoqз calĩs morātes eũone paꝝ idigēt.

¶ Ponit vltimuз cañ. ⁊ cauſa eſt: qꝛ virtus in illis eſt debilis ⁊ humores reſoluũtur faciliter.

¶ Caplm quartũ de regulis cōibus ſolõni vētris ⁊ vo mitui: ⁊ qualr̃ trahat id qꝺ ventreз ſoluit ⁊ vomere facit.

Portet vt illius cib⁹ cuius ſoluēdus ē ven ter aut vomit⁹ ꝓuocandus partiat̃ vt qꝺ ei ĩ vna die ſufficiebat multis comedat vi cib⁹: ⁊ vt ſint cibi diuerſi ⁊ potus etiaз di uerſi. Ex hac nāqз diſpoſitōe accidit ſto maco vt expellere deſideret qꝺ eſt in eo ſuperius aut in ferius. Ex cibo auteз nō diuerſo neqз ſuper aliuз cibũ ingrediēte ſtomacus eſt auarus ⁊ ipſuз forti cōtinet retē tione ⁊ ꝓprie ſi fuerit eius quãtitas parua. Molleз ve ro habēs ventreз nihil ex hoc facere debet.

¶ Aui. ĩ precedēti. c. poſuit regulas gnāles in rectifican do vlĩter oēm modũ artificialē eũationis ſiue cũ flobotho mia ſiue cũ aliquo. hic exequit̃ magis ſpãliter docēdo re gulas obſeruandas in eũationib⁹. Et diuidit̃ pars iſta in ꝑtes duas. p̊ facit hoc quo ad eũatiōes ꝑ vias ordinatas a nã ſicut ſtomacus iteſtina ⁊ pori. 2° quo ad eũationes ꝑ vias factas ꝑ artē ſicut ĩ flobothomia ⁊ ſanguiſugis ⁊ vē toſis. 2a ibi: flobothomia. Pria ĩ duas. p̊ docet regulas eũonis per vias latas ⁊ per medicinas ĩtus aſſumptas. 2° per vias ſtrictas ⁊ medicinas extra applicatas. 2a ibi: epi thimata. Prima in duas. Primo docet regulas per ea que ſumũtur per os. 2° per ea que applicant̃ per inferi⁹. 2a ibi: enema. Pria in duas. p̊ ponit regulas cōes ſolõni vētris ⁊ vomitui. 2° ſpãliter ponit ĩ vtroqз iſtoꝛũ modoꝛũ eũationis. 2a ē in principio ſequētis capli. Pñs caplз di uidit̃ ĩ duas ꝑtes. p̊ ponit regulas dictas. 2° docet mo dũ per quē medicina vomitiua aut vētris ſolutiua eũat. 2a ibi: prope finē capituli: ſcito etiã. Prima ꝑs diuidit̃ in tot partes quot ſunt canones: ⁊ ꝑtes patebũt in legendo. Prim⁹ cañ. ē de regimĩe cibi eius qui dз ſumere medici nã. ¶ Dicit ergo Aui. ꝙ oз vt illi⁹ cuius vēter ſoluēdus ē aut vomitus ꝓuocandus cibus diuidat̃: ita ꝙ illud qꝺ ipe ſolebat ſumere ĩ vice vna: ſumat in plurib⁹ vicibus: ⁊ ſint cibi ſui diuerſi ⁊ pot⁹ diuerſi. Et cã ē qꝛ ex hoc modo fit ꝙ ſtomacus deſiderat expellere id qꝺ ē in eo aut ſupi⁹ aut inferius. Sed ex cibo nō diuerſo ⁊ nō ingrediēte ſuꝑ aliũ cibũ: imo ingrediēte ſtomacũ vacuũ: ſtomacus ē aua rus ⁊ retinet ipm forti retētiōe ⁊ ꝑcipue qñ ē paucus. Sз illũ cuius vēter ē mollis nihil ex hoc oз ſoluere. ¶ Circa cañ. nota ꝙ corpoꝛũ q̃dã ſũt quoꝛũ ſtomacus ⁊ iteſtina fa ciliter obediũt farmaco: ⁊ iſti dicũtur habere vētrē mol lē: ⁊ in iſtis nō indigem⁹ ꝑparatiōe reddēte iſta mēbra pa rata ad expellēdũ. Et iō Aui. dixit ĩ fine cañ. ꝙ qui hз vē trem mollē nihil ex dictis in iſto cañ. facere dз. Quidam autē hñt ſtomacũ ⁊ inteſtina inobediētia eũoni ⁊ dure di gōnis ⁊ fortiter ēt retinētia. In iſtis ergo anteq̃з dat̃ far macũ ſolutiuũ aut vomitiuũ oз ſtomacuз ⁊ iteſtina para re vt facilr̃ expellãt. nã aliter lōgo tꝑe retēto farmaco aut humoꝛib⁹ qui attrahunt̃ ꝑ ipm ad ſtomacuз ⁊ iteſtina no cumētuз ſequeret̃ magnũ. Et iō faciendu з eſt ꝙ ſtomac⁹ ⁊ iteſtina iclinent̃ ad expellēdũ id qꝺ in eis ꝯtinet̃. ¶ No ta 2° ꝙ regimen faciēdi ꝙ hoc mō inclinet̃ eſt qñqз ꝑ me dicinas: qñqз cuз cibo ⁊ potu. ſed Aui. hic tm̃ poſuit illud qꝺ fit ꝑ cibos ⁊ potus. ¶ Nota 3° ꝙ qñ cibi ſumunt̃ di uerſi ⁊ in plurib⁹ vicib⁹ accidit ꝙ cibus ponit̃ ſuꝑ alium non digeſtũ: ⁊ ꝓpter ciboꝝ diuerſitatē accidit ſtomaco di uerſitas trãſmutationũ ꝓpter quas non pōt cibũ ſuo mō amplecti: ⁊ ad hoc ſequit̃ iclinatio ad expellēduз aut ſupe rius aut iferi⁹. ſed qñ cib⁹ eſt paucus aut ex ordĩe debito ſumpt⁹ ⁊ nō diuerſus ſtomacus voluptat̃ in eo ⁊ vno mō amplexat̃ ipm: ⁊ iō difficulter ipm derelĩquit. ⁊ hoc ē ipз eſſe auaꝝ eius qꝛ auidũ: ⁊ iō nō euacuat medicina niſi dif ficulter. ⁊ ꝓpter hoc ad euitãduз nocumēta q̃ poſſent cō tingere ex remanētia farmaci ⁊ humoꝝ ĩ ſtomaco: oз hec corꝑa regi regimĩe dicto. ¶ Nota 4° ꝙ ex hoc regimine dicto ſi diu aut multis dieb⁹ ſeruaret̃: ſequerent̃ magna nocumēta. Nã p̊ cibi ñ digerũt̃. 2° multiplicaret̃ humor malus ꝑ idigeſtionē. 3° ab his humoꝛib⁹ cum vtplurimũ ſint viſcoſi vie oppilarent̃. 4° humores alij quos intendi mus eũare igroſſarent̃ ⁊ icrudarent̃. 5° eũatio fieret diffi cilior. Et ex hoc pз ꝙ ante eũoneз hoc regimĩe nō vtēduз eſt multo tꝑe: imo vno die imediato eũoni. Añ vero illuз dieз ſumēdi ſunt cibi nō multe quãtitatis nec male quali tatis ⁊ debito ordine ⁊ ſubtiliatiui ⁊ abſterſiui vtplurimũ. ⁊ hoc facit humorē digeſtũ ⁊ canales apertos: qꝺ medic⁹ multuз deſiderat ĩ eũone: qñ ante per vnuз diem tm̃ vti mur hoc regimĩe: qꝛ cibi ⁊ res male ex illis gnãte non va dũt cuз ꝑte notabili extra ſtomacũ ⁊ iteſtina ⁊ ſequēti die eũant̃: ⁊ illoꝝ nocumētuз nō ē notabile nec ipediunt vias ſtrictas ad q̃s ñ vadũt ⁊ fit iuuamētũ relaxãdi ſtomacũ: iō ſequit̃ ĩ corꝑib⁹ dictis iuuamētuз ſine notabili nocumēto ad moduз loquēdi medicoꝝ: ⁊ ē faciendũ. Et tu ex hoc ſol ue dubiuз hic moueri ſolituз de virtute cañ.

Et ſcias ꝙ vomit⁹ ⁊ vētris ſolutio ⁊ q̃ eis aſſimilãt̃ nō attinēt ei qui bono vtit̃ regimĩe: qm̃ ille qui bñ regit̃ nō idiget niſi eo qꝺ ſit iſtis leui⁹: ⁊ fortaſſe excuſabũt ea exercitiũ ⁊ fricatio ⁊ balneũ. Ampli⁹ ſi ei⁹ corp⁹ repletũ fuerit plurimũ talis repletōis q̃lis eſt ipſi⁹ erit ex eo qui humoꝝ melior ē. ſ. ex ſanguine. Minutio igit̃ ē illō qꝺ ad ipm mũdificãdũ erit neceſſariũ ⁊ nō vētris ſolutio.

¶ Hic ē cañ. 2⁹ ⁊ ē de corꝑibus ineptis ad vomitũ ⁊ ſo lutiōeз vētris: dicens ꝙ vomitus ⁊ ſolutio vētris ⁊ alia que iſtis aſſimilant̃ nō ſunt cōueniētes illi qui bono regi mine vtit̃. ⁊ rō ē: qꝛ ille qui bene regit̃ nō idiget niſi leuio ribus ad ſuꝑfluitates expurgandas: ſicut exercitio ⁊ frica tionib⁹ ⁊ balneo. Itē etiã ſi pur iſti corꝑi accidat repletio eũanda: tũc repletio nō ē niſi ex hũore laudabili qui ē ſan guis: nō ad eũationē talis repletiōis: ita ꝙ corpus mũdi ficet̃ ſufficit flobothomia: ⁊ nō reqrit̃ vētris ſolõ. ¶ No ta igit̃ p̊ ꝙ corpus vti bono regimĩe icludit duo. p̊ ꝙ il lud regimē ſit bonũ abſolute. 2° ꝙ ſit bonuз illi q eo vtit̃. Ex eo ſequitur ꝙ ille qui vtit̃ abſolute bono regimine dз eē tꝑatus. Nã regimē ſimplr̃ bonũ nō ē cōueniēs niſi tē perato: qꝛ diſtēpata idigēt regimine alio qꝺ tꝑato non eēt cōueniēs. Et ex hoc ſequit̃ canonis verificatio. nã ſi cor pus ē tēꝑatuз ⁊ vtit̃ regĩe tꝑato tũc ſeruat̃ in ſuo tēpera mēto: ⁊ ꝑ cōſequēs nō indiget eũatione niſi nãliũ ſuꝑflui tatũ que eũant̃: aut nãli calore: aut ſi ē alteri⁹ indigentia ē exercitiũ ⁊ fricatio ⁊ balneũ ⁊ alia que ad regimē ipз qua ſi ꝑtinere vident̃. Et hec ſunt habita tertia primi. ¶ Se cũdo nota ꝙ ſi in regimĩe bono ĩ quali quo ad cibos acci dat error ĩ quãto: tũc fit repletio ſanguis laudabilis ĩ iſtis corꝑib⁹: ⁊ ꝑ cōſequēs talis repletio dз moueri cũ eũatiōe ſibi ꝓpria que ē flobothomia. ⁊ iō Hy. putauit hãc partē ſcdaз cañ. debere intelligi ꝙ ſi accidit error ĩ regimĩe bo no ĩ quali: qꝛ abũdat in quãto tũc ꝯuenit flobotomia. Hec tamē expō mihi nō placet. Nã Aui. in iſto cañ. appropria te loquit̃ de corꝑib⁹ veterib⁹ bono regimĩe: ſз regimē pec cans ĩ quãto nō ē regimē bonũ: iō nō loquit̃ de his quoꝝ regimē peccat ĩ quãtitate. Cōfirmat̃. Ex augmēto ĩ quã to cibi quãtũcũqз boni ſequit̃ indigeſtio vel ſequi pōt: ſз ad idigeſtionē ſequit̃ augmētũ flegmatis qꝺ digne eũat̃: aut farmaco: aut vomitu: ergo ad augumētũ cibi pōt ſeq neceſſitas alteri⁹ eũatōis a flobothomia. Puto ergo Aui. loqui de regimĩe tꝑato ⁊ bono in quãto ⁊ quali. Sз qꝛ re gimē bonũ ſm aliquos medicos nō ē in pũcto: imo aliqꝺ tale magis declinat ad latus groſſi: ⁊ aliquod magis ad la tus ſubtilis. Et ſilr̃ corꝑa tꝑata nō ſunt pũctualiter vni⁹ modi ſm medicos: ſed quedã parũ ad extremitatē decli nantia. Ex quib⁹ cãis accidit ꝙ magis replet̃ vnũ corpus bñ rectũ q̃з reliquũ. Accidit ēt ꝙ regimē dз variari ĩ eſta te ⁊ vere ⁊ hyeme: qꝛ in hyeme cibi debēt eſſe ampliores ⁊ ſanguis ãplior. Uult ergo Aui. ꝙ ex his oib⁹ varietatib⁹ regimĩe exñte ĩfra latitudinē regimis tꝑati nō inſurgit ne ceſſitas farmacãdi aut vomitũ ꝓuocãdi: imo plĩmũ ſuffi cit exercitiũ: fricatio ⁊ balneũ: ⁊ quibuſdã fortius: ⁊ qui buſdã debili⁹. Qꝺ ſi ex nã ſua corp⁹ ſit aptũ cadere ĩ reple tioneз ĩfra iſtã latitudinē ꝑcipue ꝓpter hyemis diſpōnē: tũc illꝺ qꝺ mltiplicat̃ ē ſanguis. Si eiз tm̃ excederet q̃ʒti tas aſſumptoꝝ ꝙ alius hũor plus multiplicaret̃ aut ſeor ſum: tũc illud regimē nō eēt bonũ ſed ſtat ꝙ cũ bono re gimine ĩ quanto ⁊ quali multiplicat̃ ſuꝑfluitas expellenda fricatiōe ⁊ balneo ⁊ exercitio. Stat ēt tantũ ſanguinē mul tiplicari in hyeme vt in vere ſit poſtea repletio indigēs flo bothomia. Et iō Aui. tertia primi nō negauit ex toto vſuз balnei ĩ regēdo tꝑatũ: nec vſum fricationũ: nec exercitij: ſed vſum farmaciaꝝ. Dixit purgare ⁊ inueterare: ⁊ iō cor pora exerceri debēt. Gal. vero 2° regiminis ſanoꝝ dixit ꝙ artis cōſeruatiue non ē noſcere motus qui a farmacis. Et iō dixit ſcda ꝑticula affo. Sana hñtes corꝑa farmacis purgari exoluũtur. ſed flobothomia nō negat̃. ⁊ hoc puto verũ: ⁊ hanc eē veram expōnem.

Cōtra ſentētiam huius ſcdi canonis ē prio ſentē tia Gal. quarto de vtilita te particulaꝝ. c. xxvij. dicē tis ꝙ bñ faciebãt illi me dici ãtiqui qui ſanos a ci barijs vti vomitu ſingulo mēſe conſulebãt ⁊ plura alia. Eſt ſcdo ſentētia Ra ſis quarto almãſoris di cētis: Uomitu vero ſemel in mēſe vel bis vtēduз eſt ⁊c. Poſſumus dicere ꝙ Gal. ⁊ Raſis loquunt̃ de vomitu prouocatiuo leni ter cuз cibarijs vel ipoſi tōe digiti in ore vel pēne intincte in oleo. Auic. ve ro loquitur hic de vomi tu q ꝓuocat̃ cũ farmacia.

Cũ aũt miutio neceſſaria fuerit ⁊ vētris ſolõ: ex ali quo qꝺ ſit vt helebor⁹ ⁊ violēte medicĩe: a minutōe icipe debes qm̃ hoc ē ex ꝑceptis Hyp. ĩ li. epidimiaꝝ. ⁊ hec ē

UVA. BHSC. IyR_006_1

veritas. Et ſilr ſi humores fuerīt flegmatici cū ſanguīe mixti: ꝙ ſi viſcoſi ⁊ fridi fuerit fortaſſe miutio groſſitudinē ⁊ viſcoſitatē eis augmētabit. Incipiendū ergo erit a ſolutione vētris ⁊ ad ſūmū ſi humores fuerit equales ꝓmitte minutiōeȝ: ⁊ ſi poſtea ſuperabūdauerit euacua: ꝙ ſi equales nō fuerit ī primis ſuꝑabūdāteȝ euacua humorem donec equeť: poſtea minue.

¶ Hic ē tertius cañ. ⁊ ē de cōparatiōe farmacie ī prepo/nendo ad flobothomiā. Et diuidiť in tres ꝑtes. Prīo ponit cañ. ſiue regulā. 2° oñdit quid faciēdū ē quādo vnum iſtorū ē premiſſum ⁊ remanet alterius indigētia. 3° docet cognoſcere qñ ē erratū ī ꝓponēdo qđ poſtponēdū erat. 2ª ibi: ⁊ ſi. 3ª ibi: preterea multotiēs. In prima ꝑte Auic. ponit quinqȝ ꝑtes ex quib⁹ cōpleť regula. ¶ Primo dicit ꝙ qñ in vno ē neceſſariū flobothomia ⁊ vētris ſolō ſiue vomitus cū aliqua violētia vel violēti medicīa ſicut helleborus: tu debes incipe a flobothomia: qm̄ ē ex ꝓceptis Hypo. in libro epidimiaruȝ: ⁊ ē veritas. ¶ Scđo dicit ꝙ ſilr dȝ ꝓmitti flobothomia ſi hūores ſunt flegmatici ꝑmixti cū ſanguine. ¶ Tertio dicit ꝙ ſi humores fuerīt viſcoſi fortaſſe minutio impedit q: augmētabit coꝝ viſcoſitatē ⁊ groſſitiē: ⁊ ideo in hoc incipiēdū erit a ſolutione ventris.

¶ Quarto dicit ī ſūma ꝙ ſi hūores peccātes ſunt equales ꝓmittēda ē minutio: ⁊ poſtea ſi aliqđ ſuꝑabūdabit euacua ipm̄. ¶ Quinto dicit ꝙ ſi humores nō ſunt equales euacua dñantes donec equeť poſtea minue. ¶ Circa ꝑtē ergo nota ꝙ corꝑa indigētia flobothomia ⁊ farmacia dicunť talia: q: tūc debite vtraqȝ iſtarū adminiſtrāda ſit. ſȝ q: in corꝑe ſint diſpōes actu vel ꝓpinqua potētia ꝑꝑ q̄s vt ꝓhibeanť vel remoueanť: iſte due ſunt faciēde. ¶ Nota 2° ꝙ in vidēdo qñ debet premitti flobothomia antequā farmacū: oȝ examiare nocumēta que ſequūť ex ꝓmiſſione ⁊ videre que ꝑōderāt. Et q: ī ſolōne qōis hic moueri ſolite manifeſtabūtur: iō pro dubio queriť ⁊c̄.

Hoc ideȝ dubiuȝ mouetur ēt a Gentili in loco ſimili.

Utrum exiſtente neceſſitate flobothomie ⁊ farmacie ſit ſemꝑ ꝓponēda flobothomia:

Ad ꝑtē affirmatiuā arguiť p° ſic. Euātio vlis ē ꝓponēda ꝑticulari: ſȝ flobothomia eſt euātio vlis: ergo ⁊c̄. Minor pȝ ex diffinitiōe flobothomie. maior ē Meſue in. c. de cura ſode abſolute cū dicit: in oī quidē ꝑticulare vlī poſtponi debere. ¶ Confirmať ideȝ ex Aui. prima tertij. c. illo. cū materiam. Naȝ ibi dixit ꝙ ſi aliqñ hūores ſunt ſanguini mixti: tūc dȝ ꝓmitti flobothomia ⁊ dat cām: qm̄ flobothomia ē cōis humoꝝ euātio. ¶ 2° ſic: in cura egritudinū incipiēdum ē a faciliori remedio ⁊ tutiori: ſed flobothomia ē facilius ⁊ tutius remediū q̄ȝ farmacia: ergo ab ipa ē incipiendū. Maior patuit ſupra. c. prīo. minor pȝ ex Gal. 2° regiminis acutorū. ſuꝑ illo paſſu ſic dicēte: Porro ſi paſſio ſuꝑ dyafragmate ⁊c̄. ¶ 3° ſic: illarū euationū ea dȝ ꝓmitti que plura facit iuuamenta. hec aūt ē flobothomia: igiť ⁊c̄. minor pȝ: q: medic⁹ nō dȝ differre auxiliū: vt dicitur a Meſue in ſuo de appropriatis. Minor pȝ q: cōuenit peccato ī quāto ⁊ pc̄to ī quali: ſed farmacia ſolū pc̄to ī quali.

¶ In oppoſitū ꝙ nō ſemꝑ ſit ꝓmittēda flobothomia eſt Aui. qui ī plurib⁹ caſib⁹ farmacū ꝓmittit. ¶ Pro ſolōne dubij nota p° ꝙ vētris ſolō cui⁹ neceſſitas cōiungiť neceſſitati flobothomie qñqȝ ē fiēda cū farmaco forti euacuante exoluēdo: ſicut qñ humores multi fixi aut multū diſtātes ſunt euādi. qñqȝ aūt ē ſolūmō cū medicīa leni oꝑante leniēdo aut lubricando aut labificādo: ſicut verbigratia: cū ē neceſſitas euandi mās ī vijs ductuū exñtes cū pulpa caſſie: aut ſirupo violato: aut cliſteri lenitio ⁊ ſilib⁹. ¶ Scđa diſtinctio: neceſſitas humoꝝ euandoꝝ per farmacū ī cāu neceſſitatis flobothomie ⁊ farmacie: qñqȝ ē hūoꝝ mixtorū cū ſanguine intra venas: ⁊ qñqȝ extra venas exñtium.

¶ Tertia diſtinctio: humores peccātes intra venas cum ſanguīe qñqȝ ſunt valde vicini nāe ſanguīs ⁊ ſanguini mixti multū: ⁊ qñqȝ multū a ſanguīs nā recedētes. ¶ Quarta diſtinctio: humorū euātio ī hoīe euando īdigēte flobothomia: ſicut farmaco: aut ē gr̄a minorādi: aut gratia eradicādi: aut gratia diuertēdi ab aliquo mēbro. Exēpla ſatis patēt in dictis ſupra. ¶ Quinta diſtinctio: hūores mixti cū ſanguīe aut ſunt equalr augmētati. i. eque ꝓportionabiliter: aut inequalr. hec pȝ ex mō loquēdi Aui. ¶ Prima ſuppō: flobothomia lȝ ſit cōis humoꝝ euatio in venis exñtiū: tñ plurimū qđ ꝑ ipaȝ euāť ē ſanguis qui ē ſicut frenū extremorū humoꝝ. ſ. colere ⁊ flegmatis. Prima pars pȝ per expiētiā ⁊ ꝑ diffinitiōeȝ flobothomie ⁊ per Aui. ⁊ Gal. in capl̄is ⁊ locis de flobothomia. Et 2ª pars pȝ: q: aliter ex flobothomia nō timerem⁹ ebullitionē colericorū aut incrudationē flegmaticoꝝ: vt īfra diceť in. c. de flobothomia. ¶ Scđa ſuppō: lȝ tā a flobothomia q̄ȝ farmacia fiāt humoꝝ agitatōes: tñ magis agitanť humores ⁊ ſpūs a farmaco forti q̄ȝ a flobothomia forti. Prima ꝑs pȝ quia 22ª tertij. diciť ꝙ flobothomia facit arceſcere humores. 2ª ꝑs pȝ: q: oȝ cū violētia trahi humorē qui in ſuis qualitatibus alterať: ⁊ humores ad ſtomacū attrahūtur multotiēs cā fortis agitatiōis. ¶ Tertia ſuppō: hūores nō multū groſſi nec viſcoſi in venis exñtes citius ⁊ facili⁹ euanť ꝑ flobotomiā q̄ȝ ꝑ farmacū. pȝ q: per breuiorē ⁊ latiorem viam. ¶ Quarta ſuppō: nūquā ē ꝓmittēda flobothomia farmacie aut econtra a medico: niſi q: melius ē ita facere. hoc nō probať: q: nō ſolū ars ſȝ nā ipa ſemꝑ agit propter melius. ¶ His hītis ſit prīa cōclō: ſtāte neceſſitate farmaci ſoluȝ leniētis ⁊ flobothomie ē ꝓmittēda farmacia. Hec cōcluſio ꝓbať q: incipiēdū ē a leniori adiutorio: ⁊ lenitiuū farmacū ē huiuſmodi: igiť ⁊c̄. Scđo pȝ q: ꝑ talē farmacū euanť māe cōes ī vijs ductuū exñtes quarū magna ꝑs trahereť ad venas ipis inanitis: vt ergo hoc nocumētū viteť ꝓmittēda eſt hi⁹ farmacia. vnde Aui. infra videlȝ in. c. de flobothomia. vult ꝙ qñ vēter ē ſtipticus ꝓmittať cliſtere aut lenificatio. ¶ 2ª ꝯclō: exñte neceſſitate farmacie fortis ⁊ exoluēdo euantis ⁊ flobothomie ꝓmittēda eſt flobothomia. Hec ꝓbať duplici cā: vna q: flobothomia eſt leuius auxiliuȝ. Et 2ª q: ꝑ ipſaȝ ꝓhibeť ꝑiculuȝ fortis agitatōis in talib⁹ humorib⁹ q ꝑ ipſaȝ ſunt euati: vtputa ſanguine ⁊ colera. nā nō ꝓcedenti tali euōne cū illi ſint ſuꝑflui ⁊ a farmaco fortiter augenť ꝑiculuȝ ē de caſu in febrē: aut de humoꝝ ebullitōe ⁊ malignatōe. ⁊ hanc voluit Aui. auctoritate Hyp. ¶ 3ª ꝯclō: in euonib⁹ faciendis gr̄a minoratōis māe aut gr̄a diuerſionis: dȝ ſemper flobothomia ꝓmitti. Iſta ꝓbať q: in alijs euonib⁹ q̄ ꝓmittunť quāto euatio ē vniuerſalior tāto magis ꝓmittiť. ſȝ iſte euones minoratiue aut diuerſiue ꝓmittunť alijs: ergo quāto euatio ē vniuerſalior tāto magis ꝓmitti dȝ. Itē q: ꝑ ipſas citi⁹ ſequiť ītentuȝ diuertēdi aut minorādi: ⁊ iō Auic. pª tertij voluit ēt ꝙ ſi humores alij a ſanguīe peccēt ⁊ ſanguini mixti: incipiēduȝ eſt a flobothomia. ſ. ꝓ diuerſiōe aut minoratōe.

¶ 4ª ꝯclō: in euonib⁹ faciēdis eradicatiue ſi humor peccans ali⁹ a ſanguine euandus eſt extra venas ⁊ in vijs ductuū ꝓmittēda eſt farmacia. hec pȝ ex prīa. nā farmacum ī iſto caſu ꝯueniēs eſt lenitiuū aut valde leue: qđ ꝓmitti dȝ vt dictū eſt in pª ꝯclōne. ¶ 5ª ꝯclō: tali humore exñte longe a vijs ductuū ꝓmittēda eſt flobothomia. pȝ q: in talis humoris euōne īdigem⁹ forti farmaco. ⁊ in iſto caſu īcipiēduȝ ē a flobothomia vt dixit 2ª ꝯclō. ¶ 6ª ꝯclō: ſtante dicta neceſſitate vtriuſqȝ euonis ſi humores fuerīt ſanguini mixti ⁊ nō multū a nā ſanguis diſtātes ꝓmittēda eſt flobothomia. ꝓbať q: ꝑ ipſaȝ tales humores euanť. ⁊ hanc voluit Aui. in lr̄a cū dixit: Qđ ſi fuerit flegma mixtū cū ſanguine īcipiēduȝ eſt a flobothomia. ſ. qñ fuerit vicinuȝ nāe ſanguis. ⁊ tu idē ītellige de colera. ¶ 7ª ꝯclō: ſtante tali neceſſitate ⁊ humorib⁹ multū a ſanguīs nā diſtātib⁹ ꝓmittēda eſt farmacia. Et hoc ē qđ Aui. ītelligit cū dicit īfra ī c. de flobothomia. Caue ne egrū ad alterā duaꝝ reꝝ ꝑducas: aut ad humoꝝ flegmaticoꝝ īcrudationeȝ: aut colericoꝝ ebullitionē. ⁊ hoc vult hic cū dicit: Qđ ſi viſcoſi ⁊ frigidi fuerīt ⁊c̄. Et per has ꝯclōnes putat Dy. ſatiſfactū eē dubio ⁊ canoni. ¶ Sȝ ꝯ̄ primā ꝯclōnē arguiť ſic. Poſſibile eſt eē egritudinē ꝑēdentē a ſanguīe ī qua ē timor de morte infirmi ſi qđ facere debemus diſtulerimus: ſed in tali īcipiēdum ē a forti medicina qđ ē flobothomia reſpcū lenitiōis ventris: ergo poſſibile ē ꝙ ſtāte neceſſitate lenificatiōis ⁊ flobothomie īcipiēdū ē a flobothomia. Aſſumptū pȝ ī acutiſſimo apāte ⁊ in vera ſqnātia ⁊ apoplexia ſanguinea ⁊ ſilib⁹. Et minor ē Aui. ſupra quarta huius. c. p° huius. vñ Aui. dicit prima tertij. c. de apoplexia. Regimen vero huius que fit ex ſanguine ē flobothomia in hora illa. ⁊ ꝑ ꝯñs nō oȝ tardare ꝓmittendo lenificatiua ꝓcipue ſi neceſſaria ſit lenificatio ꝓ ſtomaco aut ꝓ īteſtinis gracilib⁹ quib⁹ cliſtere non ſufficit: ⁊ in multis ſimilib⁹ caſib⁹: vt ꝑcuſſionib⁹ ⁊ vulnerib⁹ ꝑmittiť flobothomia lenificatōi ne ꝓpter tp̄is lapſuȝ multū augeať diſpō timoroſa dū fit lenificatio. ¶ Cōtra ſcđaȝ ꝯclōneȝ arguiť ſic. Humore aliquo alio a ſanguīe multuȝ ſuparāte: īcipiendū eſt a farmaco ⁊ ab alia humoris euōne: ſȝ ī hoc caſu eſt neceſſitas farmaci fortis exoluēdo euantis: puta ſi humor ſit melācolia aut flegma groſſuȝ: ergo ſtante neceſſitate fortis farmaci aut flobothomie incipiēdū eſt qñqȝ a farmaco. pȝ ꝯñtia ⁊ maior ē Auic. in cañ. ⁊ ꝓ aſſūpto eſt 7ª ꝯclō quā etiā Dy. ꝯcedit. ¶ Cōtra tertiā arguiť ſic: In febre flegmatica humorib⁹ flegmaticis multū dñantib⁹ euōnes faciēde ī prin° ſunt gr̄a minoratōis vt ꝯſtat ꝑ oēs auctores: ſȝ ꝓmittēdū eſt tunc farmacū ne flegmata euato ſanguīe īcrudarenť: ergo ſuppoſita hoꝝ neceſſitate pro minoratiua euōne non ſemꝑ īcipiēduȝ eſt a flobothomia. 4ª ꝯclō ſic īprobať ſicut prīa hec ⁊ multa ſimilia. Videť mihi ꝙ iſte ꝯclōnes ñ ſint ita abſolute ꝯcedende: vt fecit Dy. ſed Aui. voluit ꝙ ſtāte equali neceſſitate flobothomie ⁊ farmacie ⁊ eq̄li periculo tā in mora q̄ȝ ī ꝓtermiſſione vni⁹ eaꝝ ſicut alteri⁹ ſūt regule ſupra poſite ſeruāde ꝓpter veritatē nocumētoꝝ ⁊ iuuamētoꝝ que ſequunť ad ꝓpoſitionē vel poſtpoſitioneȝ alteri⁹ eaꝝ. Videť 2° ꝙ ad integre ſaluāduȝ oȝ addere īdicatōe ſūpta a diſpōne illa quā Aui. narrat ī lr̄a. verbigr̄a indicatōe ſūpta ab hoc qđ ē neceſſitas farmaci fortis ſicut hellebori: ⁊ flobothomie premittēda ē flobothomia. poſſet tamē eſſe ꝙ premittēda eēt farmacia ex alia cā: puta q: ſi flobothomia

Cauſa aūt neceſſitatis farmacie fortis ⁊ exoluēdo euacuātis pōt eſſe q̄druplex pª eſt fortitudo viſcerum in reſiſtēdo laxationi. 2ª ē groſſities ſeu viſcoſitas humoruȝ euacuādoꝝ. 3ª ē coꝝ infiltratio ī mēbris in quib⁹ ſūt. 4ª poteſt eē magna coruȝ diſtātia a vijs expulſionis ⁊c̄.

flobothomia ꝑponeret humoꝛ ĩcenderet ⁊ fieret eũationi
inceptioꝛ. Et hec gloſa poſita conſtat ꝙ hec argumẽta fa/
cta contra ꝯcluſiones non procedũt.

Et ei qui añ minutõez ꝑmiſerat medicinã cũ minu/
tõez ꝑmittere debebat poſtponat minutõez dieb⁹ pau/
cis: ⁊ cui paruũ ĩtercеſſit ſpaciũ exquo minut⁹ fuit ⁊ eua
cuatõe ĩdiget medicinã ſumere ẽ ei cõuenientius.

¶ Hic docet qd ſit faciẽduz qñ vnuz iſtoꝝ eſt ꝑmiſſum
⁊ alteꝝ iſtoꝝ dz ſequi qd erat ꝑmittẽduz. Et ſz Dy. expo
ſitõez ponit duos cañ. quoꝝ vn⁹ eſt correctiu⁹ erroꝛis pte
riti. Ali⁹ ẽ ad vitãdũ erroꝛẽ q ꝯtigẽ poſſz. ¶ Prim⁹ ẽ iſte.
Siqs dz ꝑmittẽ flobothomiã ꝑmiſit farmacũ: ñ ſtatiz poſt
farmacũ dz flobothomare: ĩmo dz flomiaz poſtponere: ſz
paucis dieb⁹. ¶ Scds cañ. ẽ ꝙ illi qui ꝑmittũt flobotho
miã ⁊ indigẽt eũatiõe cõueniẽti⁹ ẽ ſumere medicinã. Pri
mus cañ. intelligiẽ vt iacet. Et ſunt due cãe poſite ſue ve
ritatis. Prima qꝛ in farmaco fit foꝛtis mot⁹ ⁊ in flobotho
mia ẽt fit motus ⁊ duo mot⁹ nõ ſunt inuicẽ cõiungẽdi qꝛ
nã nõ bñ tollerat. 2ª ẽ qꝛ farmacũ facit ĩ ſanguĩe agitatio/
nẽ: flobothomia ẽt cõmouet ſanguinẽ. Timẽdũ ergo ẽ ne
ex motus nimietate accidat furia. ꝓpter has ergo cãs nõ
dz cito poſt farmacũ flomothomari: verbigratia: ſequẽti
die: ſz qꝛ iſte ĩdigebat flobothõia: certuz ẽ ꝙ ibi ẽ ſanguis
indigẽs eũatiõe: iõ nõ dz multũ expectare ſz paucis die/
bus dz poſtponere flobothomiã. ¶ Sed dicet aliqs mi/
hi videẽ ꝙ per has duas cãs ẽt ſi ꝑmiſſa eſt flobothomia
poſtponẽdũ eẽt diebus paucis ĩ farmaco: qꝛ duas cauſas
debilitatis ⁊ duos motus agitatiõis: oz hunc ita tollera/
re ſicut primũ: ⁊ per ꝯñs ſi illa nõ ſit eadẽ die faciẽda nec
iſta eadẽ eẽt faciẽda. Dicẽdũ ꝙ nõ ẽ ſile. ⁊ cã ẽ: qꝛ motus
qui fit a farmaco ẽ foꝛtis: ⁊ poſt foꝛtẽ nõ ita ſtatim tolleraẽ
mediocris ſicut ecõtra. Unde poſt foꝛte ⁊ velox exercitiuz
ſi precipiaẽ ĩmediate ẽt leuis curſus aut leuis colluctatio
nõ tolleraẽ ſz bene poſt. Uix enim ſufficit virtus cũ quie/
te ad regẽdum coꝛpus: nec ſufficit parua moꝛa ad redituz
ad notabilẽ vigoꝛẽ: ſilr ligna poſtq̃z ſunt vehemẽter diſpo
ſita ad accẽdẽdũ oĩs ꝑua ſcintilla ſufficit accendere ⁊ oĩs
ꝑuus cõtactus a flãma ſufficit inflãmare: ſicut videm⁹ in
cãdella nouiter extincta. Et ſi ſit facta prius ꝑua calefa/
ctio modica incurrente moꝛa redit ad ſimilẽ reſiſtentiam
prioꝛi: ⁊ iõ põt tanta tollerare flãme approximationẽ q̃ztã
prius antequã incẽdereẽ: Qꝛ ergo neceſſitate exñte flobo/
thomie ꝑmiſſo farmaco ſanguis ⁊ alij humoꝛes agitantur
⁊ calefiũt multũ ⁊ virtus multũ debilitaẽ: oz interuenire
aliquos dies añquã tolleret aliuz motũ debilitatiuũ ⁊ in/
flãmatiuũ: ſz qꝛ flobothomia nõ ita agitat nec ita debili/
tat: iõ poſt illã puto nõ ita eẽ indigẽtiam tanti tpis ad tol/
lerandũ farmacũ: ⁊ iõ ẜm hanc introductionẽ patet cañ.

¶ Scdo ĩtroduceẽ facilr ĩ ꝓpoſito: dicẽdo ꝙ mẽs Auic.
eſt: ꝙ ſiquis indigẽs farmaco ſolutiuo ⁊ flobothomia: de/
buiſſet premittere ipm flobothomie: ſed añ farmacũ ꝑmi/
ſit flobothomiã ita ꝙ facit ecõuerſo q̃z ille de quo in p° ca
none dixerat. Iſti enim ẽ cõueniẽtius ſumere farmacũ q̃z
prioꝛi eẽt ꝯueniẽs facere flobothomiã: ⁊ iõ min⁹ tps oz ĩ/
teruenire: qꝛ motus a flobothomia ẽ minoꝛ ⁊ debilitatio: ⁊
iõ minoꝛ moꝛa ſufficit ad ſuſtinendũ modũ ⁊ reſtaurandũ
debilitatẽ. ¶ Dyn⁹ aũt hũc cañ. ĩtroduxit duob⁹ modis.
vn⁹ ẽ ꝙ ſi ꝑceſſerit per paruũ ſpaciũ flobothomia in illo q
indiget alia eũatiõe: eo ꝙ alius humoꝛ a ſanguine ĩ eo eſt
multiplicatus: ⁊ de hoc pz ĩ eo ꝙ ẽ cõueniẽti⁹ adminiſtra/
re medicinã q̃z flobothomiã: aut dictũ fuit in pte precedẽ
te. Et qꝛ hic ſenſus ſupradict⁹ erat nõ ẽ putandũ ꝙ Aui.
hic intẽderit iſtd. ¶ Scds ſenſus cañ. põt eẽ ꝙ ſiquis ꝑ/
miſit flobothomiã ꝑuo tpe: ⁊ ſuperuenit ſibi cãus aliquis
ab extrinſeco puta ꝑcuſſio in aliquo mẽbro ꝓpter quẽ ca/
ſum eũandus ſit: nam iſti eũandi ſunt vt habebitis infra:
tũc ꝯueniẽti erit ei ſumere medicinã q̃z flobothomari. Et
cã eſt ne accidat nimia eũatio ſanguis ⁊ virtutis ꝓſtratio
cũ ꝑmiſerit flomothomiã parũ añ: ⁊ vt ſupponiẽ in cañ. ⁊
iõ dicit Dy. ꝙ ille ẽ vn⁹ d caſib⁹ ĩ quib⁹ farmacia excuſat
a flobothomia. Sed ego hũc 2m ſenſum nõ puto verũ. p°
qꝛ facit Aui. diminutũ qui cũ docuiſſet quid faciẽdũ in eo
qui ĩdigẽs vtraq̃z eũatõe premiſit farmacũ nõ diceret qd
faciẽdum ſi ꝑmiſiſſet flobotomiã. Scdo qꝛ magis debi/
litatur virtus ex farmaco ꝑcipue ſolutiuo q̃z ex flobotho/
mia. Et iõ ſi ꝓpter debilitatẽ dimittiẽ flobothomia mlto
magis dimittẽdũ ẽ farmacũ ĩ cãu ſuo. 3° qꝛ hũoꝛ currẽs
ad locũ percuſſiõis ẽ ſanguis: ⁊ ꝑ farmacũ agitaẽ ⁊ nõ eua
cuaẽ: ⁊ iõ magis curret ad locũ ꝑcuſſiõis. 4° qꝛ ſi poſſz ve
rificari cañ. ĩ aliquo cãu nõ tñ vtplurimũ ñ verificareẽ: vt
qñ flobothomia ñ prefuiſſet multum copioſa. nã poſt ſan/
guĩs multũ fluxũ ex naribus vel ex vulnere videmus pre/
cipi flobothomiã. ⁊ iõ puto expõnem meam melioꝛẽ.

Nota tñ ꝙ ſi ꝯſta
ret medico p⁹ factaz
flobothomiaz ex ꝓ
prijs ſignis ſignificã
tibus dominiuz ſan
guis: ⁊ ꝙ humoꝛ ſu
perexcreſcẽs eẽt ſan
guis: tũc eẽt faciẽda
flobothomia ⁊ non
purgatio cuz farma
cia: vt vult Gal. ix. te
rapẽ. c. iij. cuz dicit:
Plenitudinẽ autem
⁊c. Qũo autẽ nuper
flobothomat⁹ põt in
ſanguine abũdare ⁊
indigere iteꝝ flobo
thomia: collige ex ſi
gnis poſitis ab Aui.
tertia primi doctrina
ſcda. c. vij. cuz dicit:
Amplius qui cõſue
uit multũ comedere
carnem ⁊c.

Multotiẽs preterea ex hauſtu medicine ille qui mi/
nui debebat peruenit ad febrez ⁊ ad eſtuationez. Et ſi
ex eis que quieſcere faciũt non quieuerit ſcias ꝙ minu/
tionez premittere debebat.

¶ In iſta pte docet cognoſcere ꝑ ſigna vnũ erroꝛẽ ĩ oꝛ/
dine hax eũonum. Et dicit ꝙ multotiẽs ex hauſtu medi/
cine ꝑueniẽ ad febrẽ ⁊ eſtuatõem. ⁊ ſi febris nõ quieſcit ex
illis q̃ quieſcere faciũt: tũc ſcias ꝙ ille dbebat ꝑmittere flo
bothomiã. ¶ Nota ergo ꝙ multotiẽs farmacũ admĩſtra
tũ ĩ coꝛꝑe ĩdigẽte flobothomia facit febrẽ ꝑꝑ caliditatẽ ſu/
az ⁊ agitatõz humoꝝ: ⁊ ꝓpter caliditatez aeris ⁊ ſimiliũ.
Sz qñ nõ ẽ humoꝛ parat⁹ ĩflãmari plurimũ facit effimerã
ex ſpũuz ĩflãmatõe. talis aũt ſedaẽ cuz illis q̃ aperiũt leui/
ter ⁊ ĩfrigidãt vt aq̃ oꝛdei ⁊ ſilia. Sz ſi febris accidit q̃ per
iſta ñ ſedaẽ: tũc ẽ humoꝛalis: ĩmo ſignũ eſt ꝙ qñ farmacũ
fuit datũ erat ibi humoꝛ apt⁹ ĩflãmari q farmaco nõ eua/
cuaẽ: ⁊ talis ẽ ſanguis: ⁊ iõ debuit ꝑmitti flobothomia ne
ĩflãmareẽ. ⁊ ſic pz veritas cañ. vt ĩ plib⁹. Nã nõ ẽ dubiũ
ꝙ poſſent eẽ alij humoꝛes a ſanguine q agitati mouenẽ ad
putredinẽ ⁊ abſq̃z agitatõe non fuiſſent moti.

Nota tñ ꝙ nõ obſtanti
b⁹ febꝛe ⁊ aduſtione ⁊ far
macia ꝙ flobothoman
dus ẽ eger paucis diebus
poſt farmaciã aſſumptaz:
⁊ hoc ſi virtus eius ferre
ſufficiat vt nã fiat attẽtioꝛ
⁊ potẽtioꝛ ſuꝑ reſiduo ſã
guinis regẽdo ⁊ defendẽ
do a putrefactione.

Non omnes preterea euacuatões ſunt neceſſarie ꝓ
pter ſuperfluitatẽ repletõis: ĩmo quãdoq̃z ſunt neceſſa
rie ꝓpter egritudinis magnitudinẽ ⁊ ꝓpter repletionẽ
ẜm qualitatez ⁊ non ẜm quãtitatem.

Hic ẽ 4⁹ cañ. de pꝛĩcipalib⁹ ĩ quo videẽ enumerare cãs
ꝓpter quas faciẽda ẽ eũatio: ⁊ dicit ꝙ nõ oĩs eũatio ẽ ne/
ceſſaria ꝓpter ſuꝑfluitatẽ repletiõis. ĩmo qñq̃z ẽ neceſſa/
ria ꝓpter magnitudinẽ egritudĩs. qñq̃z ex ſuꝑfluitate re/
pletiõis ẜm qualitatẽ ⁊ nõ ẜz quãtitatẽ. ¶ Circa quẽ cañ.
nota primo ꝙ iſte cañ. ẽ cõis oĩ eũatõi: nõ obſtãte ꝙ Aui.
hic pꝛincipalr intẽdat de vomitu ⁊ ſolone. ¶ Nota 2° ꝙ
oĩs euacuatio debeẽ rõne alicuius ꝑter nãm remouẽdi qd
aut ẽ actu ꝑter nãm: aut in ꝓpinqua potẽtia. ⁊ qꝛ oẽ tale
ẽ replẽs ⁊ quãtũ: iõ oĩs eũatio ꝯueniẽter debeẽ ratiõe re/
pletiõis ĩ quãto. Qꝛ tñ aliquis humoꝛ lz ſit quãtitate ſua
magna nocens: hoc facit per qualitatez non ꝙ quãtitatis
excedat menſurã ſub qua dz eẽ humoꝛ nãlis. iõ dicimus
qñq̃z eũationẽ cõuenire ꝓpter repletionẽ ĩ qualitate ⁊ nõ
ĩ quãtitate qꝛ nõ ẽ ibi peccatũ ĩ quãto ſpãliter. ſz ad ĩtelli
gẽdum quõ aliqua eũatio ẽ neceſſaria ꝓpter magnitudi/
nẽ egritudĩs nõ ꝓpter repletionẽ ĩ quãto ⁊ quali non opz
credere ꝙ magnitudo egritudĩs indicet eũationẽ debere
fieri ſine peccato hũoꝝ ĩ quãto ⁊ quali ꝙ ſit pñs aut ĩ po/
tẽtia ꝓpinqua. nã hoc eẽt falſuz. Humoꝛ enim nõ eũatur
niſi faciat nocumẽtũ: aut ſit in ꝓpinqua potẽtia ad hoc fa
ciẽdum: ⁊ hoc erit ꝑꝑ quãtitatẽ aut ꝓpter qualitatẽ: ⁊ iõ
erit ꝓpter peccatũ in quãto aut ĩ quali: ſed ĩtelligiẽ ꝙ nõ
exñte pꝛincipalr pcõ ſpãli ĩ quali: nec in q̃zto. qñq̃z ꝑꝑ ma
gnitudinẽ egritudinis eũandũ eſt: qꝛ timeẽ ne ꝓpter illud
humoꝛ fiat hoc mõ peccans: verbigratia ſi ſuꝑueniat ma
gna ꝑcuſſio ĩ coꝛꝑe mũdo: vel ſi in coꝛꝑe pauci ſanguinis
ſuꝑueniat pleureſis vera foꝛtis: ĩ qua ꝓpter doloꝛẽ timeaẽ
de curſu ſanguĩs ad locũ eũabiẽ ſanguis ⁊ ĩ multis ſilib⁹
in quib⁹ ſi paſſio eẽt ꝑua nõ timerem⁹ ꝙ hũoꝛes maligna/
renẽ aut currerẽt ad locũ vbi poſt eẽnt ſuꝑflui: ⁊ per hunc
modũ ĩtelligiẽ cañ. Et patet ſolõ dubij hic moueri ſoliti. ſ.
vtrũ magnitudo moꝛbi indicet de eũatiõe nõ exñte pcõ ĩ
quãto ⁊ qualitate humoꝛũ. Dicẽdũ eniz ꝙ nõ exñte actua
li pcõ magnitudo moꝛbi mediate ſignificat ⁊ ĩdicat d eua
cuatiõe: qꝛ indicat futurũ eẽ tale peccatũ niſi fiat eũatio:
lz ꝓ tũc nõ ĩmediate hoc ĩdicaret vt magnũ vuln⁹. ¶ Sz
qꝛ hic dicit Aui. moꝛbi magnitudo vt ĩtelligaẽ quõ a me/
dicis diciẽ moꝛbus magn⁹: notãdum ꝙ diciẽ magn⁹ im/
pꝛopꝛie: qꝛ intenſus: ⁊ ſic habeẽ ꝑticula pꝛĩa affo. ĩ cõmẽto
illi⁹ afforiſmi: Qui creſcũt. Medici aũt vocãt moꝛbũ in/
tẽſum qꝛ multũ ledẽtes opatiões. Nõ enim qua ẽ moꝛb⁹
ẽ ꝙ ledat opatiões. hoc aũt accidit tribus modis ĩ genere
⁊ diciẽ 3° ⁊ 10° de ĩgenio. p° qꝛ eſſentia moꝛbi ĩ ſe ſit ĩten/
ſa vel magna ſicut intenſum caloꝛẽ febꝛilẽ dicim⁹ magnũ
rõne ſue eẽntie ⁊ magnũ vulnus ⁊ magnũ apa. 2° moꝛb⁹
diciẽ magn⁹ rõne dignitatis leſe actiõis: ſicut oppilatiõz
ĩ meri dicimus maioꝛẽ moꝛbũ oppilatiõe naſi: qꝛ lediẽ de/
glutitio ĩ pꝛĩa que ẽ nobilioꝛ odoꝛatu qui lediẽ in ſcda. 3°
diciẽ magn⁹ ratiõe defectus virtutis diſponẽtis coꝛpus
aut totũ aut ꝑtem mẽbꝛĩ ſicut cãcrena: qꝛ in ca plurimuz
in mẽbꝛo cancrenato deficit virtus vitalis dicimus moꝛ/
bum magnũ: ⁊ quelibet iſtarũ magnitudinũ põt ſignifi/
care de eũatiõe humoꝛis nõ actu inferẽtis nocumentũ ſz
pati inferre nocumẽtũ: ⁊ iõ ſine actuali peccato ĩ quãto ⁊
quali ꝑꝑ talẽ magnitudinẽ faciẽda ẽ eũatio.

Et ꝓpter hoc Gal. in
pꝛima ꝑticula affoꝛiſmo
rum in ꝯmẽto illius affo.
Que egerũtur. cõſulit flo
bothomiã vſq̃z ad ſinco
pim.

Et multotiẽs quidẽ ẽ euacuatio neceſſaria ſz ſuper/
uenit aliquid qd pꝛohibet: ⁊ nõ eſt ibi ingeniũ niſi in ie/
iunando ⁊ doꝛmiẽdo ⁊ in emũdando cõplexionis ma/
liciam que ex repletione pꝛouenit.

¶ Hic ẽ quintus cañ. pꝛĩcipalis. ⁊ dicit Auic. ꝙ multo/
tiẽs eũatio ẽ neceſſaria: ſz ſuꝑuenit aliqd accidẽs qd ꝓhi
bet fieri: ⁊ in iſto cãu nõ ẽ aliud ingeniũ niſi ieiuniũ ſomn⁹
⁊ rectificare malitiã cõplõnis que pꝛouenit ex humoꝛe re/
plẽte. ¶ Nota ꝙ accidẽs ſuꝑueniẽs qd ꝓhibet eũatiõz
ẽ: ſicut verbigrã: ĩpꝛegnatio aut vomitus per quẽ nec ci/
bus nec medicina retineẽ: aut abhomĩatio infirmi: aut vo
mitus: aut nimia debilitas: aut pꝛeparatio ad ſincopim.
¶ Nota 2° ꝙ Aui. in iſto cañ. tria docet remedia. p^m ẽ ie/

UVA. BHSC. IyR_006_1

iuniū: ⁊ iſtud cōſumit oēs humiditates ꝑ accidēs: vt dicit Gal. in cōmēto illius affo. Ex plenitudine. 2m ē ſomnus: ⁊ iſte ſuper ieiuniū reſoluit ⁊ digerit trahēdo calorē ad itериora: vt dicit̄ 2a primi. c. de his que ꝓueniūt ex ſomno ⁊ vigilia. ⁊ iō iſta opponūtur replōni. 3m eſt rectificare cōplōnē: ⁊ hoc reſiſtit male qualitati mãe ne mltū ducat corpus extra latitudinē tꝑamēti ſiue extra ꝓpriū tēꝑamētū.

Iſtud tertiū notatū intelligit̄ potiſſime de duobꝰ primis remedijs. ſ. ieiunio ⁊ ſomno. Somnꝰ eīꝫ ſupra ieiuniū digerit flegma ꝯuertēdo ipſuꝫ ad naturā ſanguinis niſi plus debito ꝓlonget̄ quare ⁊c̄.

¶ Tertio nota ꝙ iſta remedia cōueniūt qn̄ iſti humores peccātes fuerint crudi flegmatici vel ſemicocti. nā ꝑ ſomnū ⁊ ieiuniū iſti reſoluūtur ⁊ maturant̄: nec inde ſequitur magnū nocumētum. Cū aūt hi qui ſunt ī venis humores eēnt colerici fortaſſe ieiuniū ipos īflāmaret: ⁊ ſilr̄ ſomnus ſuper ipm̄. Vn̄ in his ſomnꝰ facit caliditatē extraneam: vt apparuit ſupra ī. c. d̄ his que ꝓueniūt ex ſomno ⁊ vigilia. Et hic ē ꝙ Gal. 4o de regimīe ſanitatis approbatuꝫ hūc can̄. his ī quoꝝ venis ſunt hūores crudi ⁊ ſemidigeſti q̄ꝫuis extra venas abūdēt humores acres quos vocat origines. Quod ſi querat̄ quid faciēdū ē ſi hūores ī venis ſunt colerici ⁊ eūari nō pn̄t? Dicēdū ꝙ facimꝰ vt in macilēto: de quo dictū ē in. c. de qn̄ ⁊ qualr̄ eūare oꝫ. ⁊ iō Aui. de iſto non intelligit.

Amplius euacuatōis quedā ē que ſm̄ modum preſeruatiōis ſicut indiget ille cui podagra euenire ſolet ⁊ epileſia ⁊ reliqua ab his in hora cognita ⁊ ꝓprie in vere. Ei ergo neceſſariū eſt vt preſeruatōe vtatur ante ſuaꝫ horā ⁊ euacuet ea que ꝓprie in ipſius egritudine ſūt euacuāda ſiue ſit minutio ſiue ventris ſolutio.

¶ Hic ponit 6m can̄. pricipalē. Et vꝫ mihi ꝙ q: ī quarto can̄. īuebat ꝙ oīs eūatio eēt faciēda aut ꝓpter plenitudinē ī quāto aut in quali: aut ꝓpter magnitudinē morbi: ne putemus ꝙ propter morbum nō ſit faciēda eūatio niſi qn̄ adeſt: docet quō ⁊ qn̄ nō exn̄te morbo in actu ſit facienda euacuatio. Et dicit tria. Primū ē ꝙ quedā eūatio ꝑ ſolā preſeruationē fit nō admixtā curatiōi: ſicut in illo ī quo ſolet accidere egritudo ī hora determinata ⁊ cognita qn̄qꝫ a medico: vt verbigrā epilēſia ⁊ podagra ⁊ relique egritudines ⁊ ꝓprie ī vere. in his eīꝫ oꝫ eūationē ꝑſeruatiuā facere. 2m ē ꝙ iſta eūatio dꝫ fieri an̄ tp̄s illud ī quo ſolet egritudo accidere. 3m ē ꝙ dꝫ eūari humor qui ē eūandus qn̄ actu ſunt in ip̄a egritudine ſiue eūatio illius hūoris ſit flobothomia: vt qn̄ ſanguis vel maſſa ſanguinea fuerit ī ea: ſiue fuerit vētris ſolō ⁊ ſupple vomitꝰ ⁊ qn̄ alij hūores ſūt cāe. ¶ Nota p̄o ex his que dicta ſunt. c. p̄o huius fen: ꝙ eūatio fit ſemꝑ grā p̄ſeruatōis: ēt ſi aliqn̄ p̄ſeruatio ſit curatiōi cōiuncta: vt qn̄ de facto morbus pēdet a mā q̄ euacuat̄. Aui. vult hic ꝙ qn̄qꝫ eūatio ē pp purā p̄ſeruationē ſ. qn̄ morbꝰ nōdū adeſt. cā aūt ē clara: q: cū morbi aliqui pēdēt a mā que cōgregat̄ an̄quā illos faciat: cōſtat ꝙ per illius mãe eūationē an̄ morbi aduētum erit ꝓhibitio eius.

¶ Scd̄o nota ꝙ dixit in hora cognita ꝙ morboꝝ qui ſolēt paroxiſmaliter affligere: quidā ſunt qui ī determinato tꝑe affligūt ex cōſuetudīe: ⁊ iſti qn̄qꝫ habēt hoc tp̄s reſpectu hoīum gnāliter: quidā aūt eoꝝ reſpcū huiꝰ particularis hoīs hn̄t certā ꝑiodum: quidā aūt ſunt alij ī quibꝰ non ē notū tēpus in quo ſolēt affligere ꝑiodice: q: ē eoꝝ aduētus nō ꝓpter ān̄i tp̄a: ſꝫ forte ex inordinato regimīe. Exēplū primi: ſicut mania ⁊ podadra que ſolēt ī vere ⁊ autūno ꝑiodice moueri. Exēplū ſcd̄i: ſicut quoſdā aſmaticos videmus qui patiūtur magis in eſtate: plīmi aūt in hyeme. In illis ergo quibꝰ eſtate accidit erit ex ꝓpria cā. Exemplum tertij: ſicut ſunt quidā qui q̄ꝫq̄ꝫ īcurrāt aut epilēſiā: aut tremorē cordis: aut colicā paſſionē: neſciūt tamē dicē quo tꝑe nec quāto īteruallo hoc accidat. Aui. hic n̄ dedit exm niſi ī illis ī qbꝰ ē cognita eſtimatiue hora aduentꝰ egritudinis. nā in iſtis clariꝰ poſſumus ſcire qn̄ faciēda ē euacuatio preſeruatiua. ¶ Tertio nota ꝙ tēpus ī quo plurimū accidūt egritudines que ſolēt exacerbare ſiue ꝑiodice moueri ē in vere. ⁊ iō lꝫ nō oēs exacerbent̄: tn̄ dicimꝰ ꝙ ī eo ꝓprie ſiūt tales exacerbatōes q: magis. ⁊ hoc ē qd̄ Hypo. 6a ꝑticula affo: dicit. Quibꝰ flobothomia aut farmacia cōfert hos oꝫ flobothomari aut farmacare in vere. Cā aūt quare magis in vere ē: q: in hyeme humores oēs qetant̄. ī vere aūt ē oīum cōmotio. Et ob hanc cām quidam medici vocant hāc talē preſeruationē vlēm: q: ſeruantē a morbis qui eueniūt a cā vlī reſpcū hoīum ⁊ reſpcū humorū. ¶ Quarto nota ꝙ ī quacūqꝫ hora cognitū ſit egritudinē debere cōtingere niſi alia cā prohibeat dꝫ medicus illā horā preuenire ad eūandum: ⁊ tm̄ ꝑuenire ꝙ ſufficiēter fecerit eūationeꝫ an̄ tēpus illius aduētus: q: an̄ morbi aduētū eūatiōes ſecuriꝰ fiūt q̄ꝫ īchoāte morbo cū hūores ſint vtplīmū maligni ⁊ virtus fortior. ¶ Quinto nota ꝙ in tali eūatione eūandi ſunt hūores factiui morbū: ⁊ quia ꝗdē illi eēnt eūandi ī morbo: iō oꝫ ꝙ ꝓ p̄ſeruatōe eūentur hūores qui pn̄te morbo eēnt euacuandi.

Ad Hyp. ſexta particula affo. affo. lv. ⁊ Gal. in ꝯmēto illius affo. dicit ꝙ paſſio podagrica maniaca ⁊ artetica mouētur vt plurimū in vere: q: in illo tēpore humores liqueſiūt ⁊ de fortibus locis ad debilia currunt.

Et fortaſſe deſiccātia exteriꝰ apponē ⁊ medicías abſtergētes ē eūare queādmodū idropiſiꝫ patiētes faciūt.

¶ Hic ponit iudicio meo remotionē dubij: q: poſſet qs dicere: Debet ne ſemꝑ ꝓ omni eūatiōe faciēda dari farmacū aut fieri flobothomia? Rn̄det ꝙ nō: q: fortaſſe apponere exteriꝰ medicias exiccatiuas ⁊ abſterſiuas ē eūare. i. facit eūationē ſupple ſufficiētē. Nā nō cadit dubiū ꝙ aliquo mō eūat medicia exiccatiua: ſꝫ dubiū ē vtrum ſufficienter ſicut balnea ſulfurea ⁊ aluminoſa ⁊ ſaculi ⁊ fomētatiōes ⁊ ēplaſtra ⁊ vnguēta. Cū ergo Aui. dicat fortaſſe ſequit̄ ꝙ loquit̄ de eūatiōe ſufficiēti. ¶ Nota ergo ꝙ licꝫ iſte medicine exteriꝰ applicate eūent: q: tn̄ hoc faciūt ꝯuertendo hūorē ī vaporē ⁊ educēdo ꝑ poros: iō nō multū humorē eūant: nec ī ꝓfundo poſitū. Sꝫ qn̄ ē paucꝰ aut poſitus in ſupꝼicie pōt eē ſpes ꝙ per talia eūetur. Voluit ergo Aui. ꝙ hec diſtinguamꝰ nos lꝫ nō explicite dixerit. Farmacū aūt ⁊ flobothomia eūatiōes ī forma hūorali ⁊ ꝑ latas vias ſufficiūt ī multo ⁊ etiā poſito in profundo.

Iſte medicine exterius applicate ī declinatiōibꝰ totiꝰ morbi febriū periodicaliū: in rigoribꝰ: horripilatōibus ⁊ in frigoribꝰ cutaneis ſine febre valde proſunt. Nā cū mā ī illis declinatōibus reperiat̄ paucificata veriſimile ē ꝙ a leui quacūq̄ꝫ cā abſtergat̄ ⁊ penitus abijciat̄: iō ⁊c̄.

Quādoqꝫ etiā neceſſe ē te dare medicinā que ſit ex genere euacuādi humoris ī qualitate: ſicut cū ſcamonea eſt tibi neceſſaria ad euacuāduꝫ coleraꝫ rubeaꝫ. ei ergo admiſcēdum eſt illud qd̄ ipſaꝫ in qualitate diuerſificet ⁊ in ventrē ſoluendo cum ea cōueniat ⁊ ipſaꝫ ab euacuatione nō ꝓhibeat ſicut mirabal̄. Et emēdetur complexionis malicia ſi poſt acciderit.

¶ Ponit can̄. 7m ⁊ eſt ꝙ cuꝫ dāda eſt medicina ſimilis humori eūando: ſicut verbigrā ſcamonea ī eūando colerā rubeā: tūc oꝫ duo facere. Primū eſt ꝯmiſcere cū ea aliqd̄ qd̄ ei ꝯriet̄ in ꝯplōne ⁊ nō diuerſificet̄ ab ea in eūone ⁊ ipſaꝫ non ꝓhibeat ab eūone. 2m eſt ꝙ poſt eūoneꝫ emendes maliciā ꝯplōnis ſi acciderit ex potu farmaci. Facimꝰ autē p̄m ī potu farmaci ꝯmiſcēdo cū ſcamonea mirabolanos citrinos q̄ ſunt fridi ⁊ eūant colerā ſicut ſcamonea. ¶ Notāduꝫ hic ꝙ Aui. intētio fuit docere gnāliter occurrē malicie ꝯplōnis medicie q̄ malicia maxīe nocet qn̄ eſt ſimilis ꝯplōni farmaci ⁊ hūoris dn̄antis: tūc eīꝫ ꝓpter humoreꝫ corpꝰ eſt iā alteratū ad talē ꝯplōneꝫ: ⁊ iō ex farmaco illius ꝯplōnis exhibito patū eſt noceri ei: ⁊ quo ad hoc ſūt duo modi. Vnꝰ eſt tꝑare farmacū cū ꝯmixtione alteriꝰ: ⁊ illud alteꝝ tꝑatuꝫ ſi tꝑare dꝫ oꝫ ꝙ ſit ꝯrīe ꝯplōnis. Sꝫ ne īpediat opus pricipale: aut ne pp ſui ꝯrietatem in eūando ſit oportunū augere doſiꝫ maligni: bonū eſt ꝙ ꝯueniat ſibi ī eūando ⁊ nō īpediat. Qn̄qꝫ tn̄ ex alijs cauſis alibi dicēdis ꝑmiſcemꝰ medicinas non ſolutiuas nec ꝯueniētes cū farmaco pricipali in eūando: īmo pure ſtipticas: vt hꝫ videri a Meſue in ſuo de ꝯſolatōe medicinaꝝ. ſꝫ hoc magis dicemꝰ īfra in. c. de diſpōnibꝰ medicinaꝝ ventrē ſoluentiū.

¶ Nota 2o ꝙ ꝓpter exēpluꝫ Aui. ꝙ in ſcamonea quinqꝫ corrigēda ſūt. Primū eſt ꝯplō q̄ nimis eſt calida. 2m ē virtus vētoſitatis gnātiua. 3m eſt ſeroſitas excoriatiua. 4m ē virtꝰ acuta apꝛitiua orificioꝝ venaꝝ. 5m eſt ꝓprietas mala debilitādi mēbra q̄ ſunt minera virtutū. Mirabolani aūt corrigūt p̄m 3m 4m ⁊ 5m: ⁊ iō ſunt correctiui valde ꝯuenientes. Qd̄ ſi dicas q̄re Aui. hic n̄ docet remouē malā ꝯplōneꝫ ſi fuerit derelicta? dicit̄ ꝙ hoc docuit ſupra ī. c. j. ⁊. ij.

Nota ꝙ nō ſoluꝫ hoc hꝫ veritatem de ſcamonea ſꝫ de quocūq̄ꝫ farmaco hn̄te ꝯuenientē qualitateꝫ cū humore eūando: tn̄ qn̄ volumꝰ minorare medicinā debemꝰ miſcere aliqd ꝙ tēꝑeret: non tn̄ ꝙ īpediat opatiōeꝫ. poſſūt ēt aliter temperari tales medicine vt lauādo eas vel aliter preparando.

Habētiuꝫ quoqꝫ in īteriorībꝰ apa ventrē ſoluere eſt difficile ⁊ facere vt vomāt. Qd̄ ſi tibi neceſſariū fuerit da eis qd̄ ſit ſicut volubilis ⁊ ſemē croci hortenſis ⁊ apozima polipodij ⁊ caſſiāfiſtulaꝫ ⁊ his ſimilia.

¶ Hic eſt octauꝰ can̄. in quo docet qn̄o ſunt purgādi q̄ patiunt̄ apa in īteriorībꝰ. ⁊ dicit ꝙ difficile ē ſoluere ventrē hn̄tis apa in īteriorībꝰ: ⁊ ſilr̄ difficile eſt vomitū ꝓuocare. ⁊ iō ſi ſoluēdi ſūt pp aliquā neceſſitatē da eis q̄ ſunt debilia ſicut volubilis ⁊ ſemē croci hortēſis qd̄ ē cartamꝰ ⁊ apozima polipodij ⁊ caſſiāfiſtulā. ¶ Sꝫ circa iſtū can̄. nota p̄o ꝙ ꝓuocare vomitū aut fluxū facere ī hn̄tibꝰ apa in īteriorībꝰ eſt difficile. p̄o q: in vtraqꝫ iſtaꝝ eūonuꝫ oꝫ muſculos vētris ⁊ dyafrāma fortis moueri: vn̄ loca apata fortiter ꝯprimūt̄ ⁊ ſic agitāt̄ ⁊ dolor magnificat̄: vnde qn̄qꝫ anguſtia anhelitꝰ: qn̄qꝫ ſincopis ſupuenit. ꝓpter ergo accn̄tia difficilia q̄ has eūones ſequunt̄ ſunt ipſe difficiles. 2o q: ſi eūatio fiat grā mãe exn̄tis ī fluxu ad apa agitat̄ mā: ⁊ currit ad locū apatis vn̄ magnificat̄ apa. 3o q: ī talibꝰ vtplurimū ē febris acuta: ⁊ ꝑ vomitū ⁊ ꝑ agitatōeꝫ magis acuit̄ calor. ¶ Scd̄o pricipalr̄ nota ꝙ vomitꝰ eſt difficilior q̄ꝫ vētris ſolō: vt dicit̄ 2a ꝑticula affo. in ꝯmēto illiꝰ affo. In oībus morbis ea q̄ circa vmblicū ⁊c̄. ¶ Tertio nota ꝙ his nō obſtātibꝰ tn̄ oꝫ qn̄qꝫ ꝓuocare vomituꝫ aut ventrē ſoluere ꝓpter nocumēta materieꝝ q̄ ꝑ has duas eūones remouent̄. hec aūt neceſſitas pōt eē pluribꝰ ex cauſis. nā qn̄qꝫ eſt reſpectu mãe alteriꝰ ab illa q̄ facit apa ſiue an̄tis ſiue ꝯiūcte: vt cū ī pleureſi ſupuenerit flegma in īteſtinis: aut ſtomaco faciēs rugitū vel nauſeā. Pōt ēt eē neceſſaria eūatio materie q̄ eſt cā apatis aut an̄s aut ꝯiuncta: ſicut cuꝫ mām colericā aut flegmaticā in pleureſi cōtētā ī venis ſub forma cāe antecedētis eūare ē oportunū.

¶ Quarto nota ꝙ plurimū mā que ē ſub forma cāe an̄tis taliū apatum eſt ſanguis in venis: ⁊ ideo melius ē vt cum flobothomia ⁊ non farmaco eūet̄. Qd̄ ſi pur ſit mā alia a ſanguine ⁊ multū diſtans a ſanguinis nā: raro dat neceſſitatē cito ⁊ fortiter eūandi niſi fuerit colerica. Nā reliqua

apata

apata ſunt nō acuta vtplurimū: ⁊ dāt tp̄s ad paulatiꝫ eua cuāduꝫ. Colera aūt ē plurimū facilis eductōis ⁊ eūaṫ cuꝫ violis ⁊ cum māna ⁊ pulpa caſſie ⁊ volubili facil'r. Ex his videṫ mihi verificatio cañ. vt i pluribꝰ. Nā nō debēt eua euari apa patiētes cuꝫ farmaco forti niſi magna adſit neceſſitas cū ad talē eūoneꝫ ſequaṫ notabile nocumētuꝫ vt dictū eſt. Sequiṫ ēt notabile p̄iculuꝫ ſi medicia non op̄aṫ vt dꝫ: qꝛ fit agitatio mala ⁊ maxie nociua: ⁊ ſi excedit virtus debilitaṫ: ⁊ hec ſunt timoroſa i acuta egritudine. Caſus aūt i quo dꝫ eūari cuꝫ forti farmaco eſt maxia neceſſitas eūandi: q̄ cuꝫ eſt apa in iterioꝛibꝰ raro accidit: vt ꝯſtat ex q̄rto notabili: ⁊ iō raro dꝫ i illis eūari. Et plurimū cum ſunt ſoluēdi nō trāſcendimꝰ graduꝫ icolumiū medicinaꝝ q̄les ſunt ille noiate ab Aui. Et hoc pōt colligi ex his q̄ dicunṫ p̄ᵃ affo. in ꝯmēto illiꝰ affo. In acutis egritudinibꝰ raro ⁊ i pꝛicipijs farmacis vti. Et ſubdit p̄p periculū qd̄ ibi eſt. ⁊ hoc pꝛius bñ iudicātes facere. ¶ Ultio nota q̄ euacuatio cū farmacis noiatis hic: qꝛ ipſa leuiter ⁊ paulatim op̄anṫ ⁊ ñ calefaciūt: nō ē notabilis nocumēti vbi virtꝰ ſit foꝛtis ⁊ facit notabile iuuamētum niſi fuerit idicatio ꝯꝛia.

Hyp. quoqꝫ iquit: qui fuerit macer ⁊ fuerit nāe cui vomere ſit facile meliꝰ erit i mūdādo ip̄ꝫ vt ad vomitū adducaṫ ⁊ vt ſit hoc i eſtate aut vere aut autūno ⁊ nō i hyeme. Ei vero qui mediocris fuerit figure ꝯueniētioꝛ ē vētris ſol'o. q̄ ſi ſibi eūatio q̄ fit vōitu neceſſaria fuerit vſqꝫ ad eſtatē expectet: ab ip̄o tñ ſibi caueat cū eo ñ idiget.

¶ Ponit cañ. de vſu vomitꝰ ⁊ ſol'one ventris idicatiōe ſumpta ab habitudine coꝛp̄is ⁊ tp̄e anni dicēs q̄ Hyp. dixit q̄ q fuerit macer ⁊ facilis ei fuerit vomitꝰ: meliꝰ ē ſi dꝫ mūdificari q̄ p̄uoceṫ ad vomitū: ⁊ maxie in eſtate ⁊ autūno ⁊ vere: ſꝫ cauēdus eſt ei vomitꝰ i hyeme. Qui aūt fuerīt mediocris habitudis meliꝰ ē vt farmaco purgenṫ p̄ ſolutōeꝫ vētris. ⁊ ſi ſit ei neceſſariꝰ vomitꝰ: expectet vſqꝫ ad eſtateꝫ: ⁊ meliꝰ eſt ei q̄ abſtineat a vomitu quātū pōt. Ubi ꝯſidera q̄ Auic. videṫ velle ponere ſniaꝫ duoꝝ affo. q̄rte p̄ticule. vnꝰ ē: Graciles ⁊ facile vomētes ⁊c̄. Aliꝰ ē: Difficile vomētes ⁊ medie carnoſos. ¶ Nota ergo q̄ graciles d̄ qbꝰ Hyp. loquiṫ ſunt colerici: qꝛ ſūt tales p̄ p̄ꝛiuatōem multe carnis: ſꝫ hñt mēbꝛa ſpermatica: mēbꝛa groſſa: ⁊ carent p̄iguedie. Aliqui ſunt graciles ſubtilia hñtes mēbꝛa ſp̄matica q ſunt colerici ⁊ carēt p̄iguedine. Aliq aūt ſunt graciles hñtes ſp̄matica mēbꝛa ſubtilia q ſunt melācolici: de quibꝰ hic nō itendit Aui. ¶ Scd̄o nota q̄ iſtis ꝯuenire vomitū vel iſtos debere vomitu mūdificari: pōt itelligi duobꝰ modis. Uno mō q̄ ipſi potiꝰ ſunt purgādi per vomituꝫ q̄ꝫ p̄ ſeceſſuꝫ: ⁊ hoc nō eſt veꝝ. nā abſolute difficilioꝛ eſt vomitꝰ. 2° mō qꝛ reſpectu coꝛpoꝝ aliaꝝ habitudinuꝫ ⁊ ſunt magis purgādi vomitu. ⁊ hoc eſt veꝝ ſi eis maxime ſit facilis vomitꝰ: qꝛ a leui cā vomāt: ⁊ non ledit eos vomitꝰ nec accñtia vomitꝰ ledunt eos: hi ſoli vere dicunṫ facil'r vomere. Et hoc mō itelligendo cā eſt clara: qꝛ i iſtis multiplicaṫ humoꝛ leuioꝛ ⁊ paratioꝛ vomitu expelli: ⁊ oꝫ vt itelligaṫ alijs paribꝰ. Qd̄ aūt diciṫ in eſtate autūno vere ⁊ ñ i hyeme: iō diciṫ q̄ his tp̄ibꝰ i iſtis coꝛp̄ibꝰ plus multiplicaṫ de colera: ⁊ qꝛ eadē colera nō eſt coagulata ⁊ imobilitata a frigoꝛe hyemis: in hyeme auteꝫ eſt imobilitata ⁊ paucioꝛ gnāliter. Et iō itelligunṫ i dictis Aui. due ꝯparatōes. Una ē graciliū ad alios in vſu vomitꝰ: ⁊ 2ᵃ eſt graciliū ad ſeipſos i diuerſis tp̄ibꝰ. Nā ſi ēt ill'd qd̄ diciṫ i hyeme itelligereṫ ꝯparatōe alioꝝ nō eſſet veꝝ. eſſet eiꝫ ſenſus q̄ cauēdus eſt vomitꝰ i hyeme i colericis reſpectu alioꝝ: qd̄ falſuꝫ eſt.

Facile vomentes ſūt hi qui naturaliter oꝛificiū ſtomaci debile ⁊ fundū foꝛtē ⁊ iſophagum latum ⁊ pectoꝛalia foꝛtia: vel ſūt hi qui ſibi cōſuetudinē fecerūt facileꝫ vomēdi ex frequentia vomitus: vel ſunt hi quibus colera vel aliꝰ humoꝛ moꝛdax ⁊ acutꝰ ad os ſui ſtomaci freq̄nter affluit.

¶ Scd̄o p̄ꝛicipal'r nota q̄ medie carnoſi ſūt flegmatici cōiter nō multū a tp̄amento diſtātes loquēdo de his q purgatōe non idigēt: ⁊ ſanguinei plus abūdāt in carne. Medie ergo carnoſi ſi ſūt flegmatici vt dixi ſupꝛa i his ergo abūdāt cōiter humoꝛes flegmatici q faciliꝰ farmaco educunṫ. Et iō iſti ſunt magis ſoluēdi q̄ꝫ ad vomitū p̄uocādi ſiue itelligaṫ ꝯparādo ipſos ad ſe ſiue ad colericos: de quibꝰ oībꝰ i p̄te p̄cedenti dixi. Sꝫ attēde q̄ Aui. non dixit hic de difficulter vomentibꝰ aliqd: qꝛ iſti medie carnoſi vtplurimū ſunt magis ſoluēdi ſiue facil'r vomant ſiue difficulter: ⁊ ideo hic non fuit opoꝛtuna illa additio. ¶ Nota vlteriꝰ q̄ vbi Hyp. dixit timētes eſtateꝫ. Auic. dicit q̄ ſi ſit eis eūatio p̄ vomitū neceſſaria: meliꝰ ē q̄ expecteṫ hoc i eſtate: qꝛ tūc hūoꝛes ſūt leuioꝛes. Et ſi ad hūc ſenſuꝫ exponaṫ 2ᵃ ꝯcl'o affo. Hyp. non hꝫ difficultatē nec itricationeꝫ itellectꝰ vt cōiter ibi exponiṫ ⁊c̄.

Uerūtñ añq̄ꝫ vētris fiat ſol'o aut vomitꝰ p̄mittēda ē hūoꝛis ſubtiliatio qui ē eūandus ⁊ āplificatio cānaliū ⁊ ipſoꝝ aptio: q̄m hoc ē ex eo qd̄ coꝛpꝰ a pena ſecuꝝ reddit. Et ſcito q̄ facē nāe ꝯſuetudinē lenitatis ⁊ obediētie ei qd̄ vis ex ſolutōe vētris ⁊ vomitu facili anteq̄ꝫ medicina deṫ: aut vomitꝰ ē ex regiminibꝰ aperiētibus.

¶ Hic ponit cañ. decimū: ⁊ ē de modo p̄parādi coꝛpus qd̄ dꝫ ad vomitū p̄uocari aut purgari. Et dicit tria. Primū ē q̄ anteq̄ꝫ fiat vētris ſol'o aut vomitꝰ p̄uocatio debꝫ p̄mitti ſubtiliatio hūoꝛis ⁊ ipſiꝰ inciſio. 2ᵐ ē q̄ debēt amipliari cānales ⁊ ap̄iri p̄ quos hꝫ trāſire mā eūanda: qꝛ hec faciūt coꝛpꝰ ſecurū a pena. 3ᵐ ē q̄ tu ſcias facere cōſuetudinē nāe ad obediēdū eūatiōi i quā intēdis ſiue cū lenificatione ſiue cū vomitu facili p̄miſſo ē ex regimie apparente. ¶ Ubi no. q̄ tria oꝫ p̄parare añ eūationē. p̄ᵐ ē hūoꝛ ip̄e i ſuo mō ſubſtātie: ⁊ qꝛ plurimū humoꝛ ē ineptus eūatiōi p̄ groſſitiē ⁊ viſcoſitatē: iō Aui. dixit de ſubtiliatiōe ⁊ inciſione: volēs q̄ per hoc itelligamꝰ q̄ ſi qñq̄ꝫ eēt ineptꝰ p̄p ſubtilitatē q̄ ingroſſeṫ: vt diciṫ p̄ᵃ quarti. c. de cura fe. putridarū i gnāli. 2ᵐ qd̄ oꝫ p̄ꝛep̄are ſunt vie trāſitus: vt vene ⁊ poꝛi: ⁊ iſti ſunt āp̄lificandi ⁊ ap̄iēdi. 3ᵐ ē ip̄m mēbꝛū per qd̄ fit eductio: vt inteſtina ⁊ ſtomacus ⁊ meri: ⁊ hoc fit aſſuefaciēdo ad fluxū p̄ ea que leniūt ⁊ lubꝛicāt: ⁊ p̄ ea que vomitū leuiter p̄uocant. Et ſꝫ mētē Gal. hec tota ē ſnīa Hypo. i illo affo. Coꝛp̄a vbi quis vult purgare oꝫ pꝛiꝰ fluxa facere. Aui. aūt ſpecificauit totū. ¶ Sed vlterius attēde q̄ dñs Dy. vult hic q̄ iſtaꝝ triū p̄parationū due i quibuſdā caſibus nō ſūt neceſſarie. ſ. materiei qñ eēt furioſa: ⁊ inteſtinoꝛū ⁊ ſtomaci quādo de ſe eēnt molles ⁊ obediētes: ſꝫ p̄patio cānaliuꝫ ē ſemp̄ neceſſaria vt ap̄iāṫ. Et hoc ē qd̄ Aui. dixit in. c. 3° qñ loquiṫ de eūatōe materie furioſe: Qd̄ aūt hac tota cuſtodia dignꝰ exiſtit ē hītudo cānaliū. Mihi aūt vꝫ q̄ ſicut qñ mā ē digeſta nō oꝫ pꝛeparare: qꝛ parata ē: ⁊ qñ vēter ē mollis nō oꝫ facere cōſuetudineꝫ qꝛ aptus ē obedire: ita qñ vie ſunt ap̄te a nā nō oꝫ q̄ ap̄iantur. ⁊ ſicut ex neceſſitate i furioſa mā non poſſumꝰ expectare digōenm: ita in multis caſibꝰ non poſſumus expectare ap̄tionē viaruꝫ. Uerū ē q̄ Gal. putat hāc nobilioꝛē p̄parationē q̄ꝫ ſit p̄paratio ductuū: vt pꝫ i cōmēto affoꝛiſmi allegati. Et iō qñ ē neceſſitas eūandi cū farmaco p̄pter furioſitatē māe: ſꝫ cānales ſint clauſi: ſi ita clauſi ſint q̄ mā nō poſſit trāſire neceſſario ap̄iendi ſunt: qꝛ fruſtra laboꝛaremꝰ vt in colica a fece dura vel ab apate. Si aūt ita clauſi nō ſint ita q̄ aliqd trāſire poſſit: tūc oꝫ medicū eē boni iudicij ⁊ iudicare qd̄ ē maius p̄iculū: an expectare vlterioꝛē ap̄tionē: an eūare cū tanta clauſura ⁊ facere minꝰ malum p̄ regulā cōtrariaꝝ indicationū. Ulteriꝰ attēde q̄ qñ ſunt ap̄ti cānales ⁊ mā pꝛep̄ata: coꝛpus fit ſecuꝝ a pena. i. a difficilioꝛibꝰ accidētibus que ſolēt accidere in op̄atōe farmaci: qꝛ mā exñte p̄parata facil'r trahiṫ a farmaco ⁊ a bona ſeparaṫ: ⁊ fit ſolūmodo eūatio abſq̄ꝫ notabili q̄ꝫtitate iuuatiui: vnde mala accidētia nō ſuperueniūt: vt infra habebiṫ. Sūt ēt ſecuri a periculo agitatiōis abſq̄ꝫ eūatiōe ⁊ periculo cōuerſiōis operis farmaci in carnē ⁊ adip̄ē: qd̄ facit qñ mūdo coꝛp̄i ē appꝛoximatū ⁊ p̄iter i nō p̄parato.

Amplius vētris ſolutio ⁊ vomitus cum macredine vētris eſt difficilis ⁊ laboꝛioſus ⁊ timoꝛoſus.

¶ Hic ē vndecimꝰ cañ. i quo Aui. docet quoſdā ipꝛep̄aratos eē ad has purgatiōes ex hītudine determinate partis coꝛp̄is: dicēs q̄ vētris ſol'o ⁊ ēt vomitus ē difficilis: ⁊ ēt laboꝛioſius ⁊ periculoſus i his quoꝝ vēter ē macer. Et hic per vētrē intelligamꝰ cōcauitatē inferioꝛē i qua cōtinētur mēbꝛa nālia: ſicut ſtomacꝰ: epar: iteſtia: ſplen: renes ⁊ veſica: que cōcauitas coop̄iṫ muſculis ⁊ pāniclis ⁊ pinguedine ⁊ cute: vt diciṫ 22ᵃ tertij. c. p̄°. De hoc ventre itelligēdo cōſtat q̄ hec ē ſnīa affo. ſcd̄e particule. In oībꝰ moꝛbis ea que ſunt circa vmblicum ⁊c̄. Cā aūt poniṫ ibi a Gal. qꝛ iſte eūationes fiunt iuuātibus muſculis ventris. Mō iſti qñ ſunt macri ñ pñt iuuare medicinā i expellēdo: ⁊ iō diutiꝰ moꝛanṫ ⁊ ip̄a ⁊ humoꝛ attractus ad inteſtina ⁊ ſequūtur inde mala ⁊ timoꝛoſa accidētia. Ex hoc pꝫ quare dixit difficilis: qꝛ cū laboꝛe muſculi pellūt hūoꝛes euacuādos. Laboꝛioſus aūt diciṫ qꝛ in eis accidit doloꝛ ventris: qui doloꝛ qñq̄ꝫ vocaṫ laboꝛ: qꝛ ſequūṫ nocumēta que nocumēta vocanṫ laboꝛes. Et qꝛ nocumenta ſunt magna plerūq̄ꝫ iferētia p̄iculū: iō diciṫ timoꝛoſus aut p̄iculoſus modus eūatiōis. difficilioꝛ tñ ē vomitꝰ: vt dicit Gal. i cōmēto allegato dū dicit: Accidit eniꝫ q̄ tenui ⁊ macro exiſtēte vētre virtus digeſtiua nutritiua materieꝝ ⁊ diſſolutiua vētoſitatis ē debilis: ⁊ iō nō pōt bñ a natura debili i locis illis regulari farmacū. Et 3° quia medicina trahit a locis p̄pinquis ip̄e venter extenuatur magis vnde magnificatur nocumentū.

Medicina quoqꝫ vomituꝫ faciens quādoqꝫ fit ventris ſolutiua cuꝫ ſtomacus fuerit foꝛtis aut bibita fuerit ſuper foꝛteꝫ famē: aut qui eaꝫ bibit habuerit paſſionem coliricaꝫ ⁊ nature lenitatē: aut ſi vomere nō cōſueuerit: aut ſi medicina in ſua ſubſtātia grauis fuerit ⁊ velocis deſcenſionis. Et vētris ſolutiua facit vomituꝫ pꝛopter debilitatē ſtomaci: aut pꝛopter multā fecis ſiccitateꝫ: aut pꝛopterea q̄ medicina abhoꝛꝛeṫ: aut pꝛopterea q̄ bibitoꝛ faſtidiuꝫ habere ſolet.

¶ Ponit cañ. in cāis quare medicia vomitiua fit ſolutiua aut ecōtra. Cāe aūt quare vomitiua fit ſeceſſiua ponūṫ ab Aui. quinq̄ꝫ. Prima ſi ſtomacus fuerit foꝛtis pꝛecipue quo ad ſup̄ioꝛē partē. nā tūc pellit deoꝛſuꝫ ad fundū. Aut qꝛ cū ē foꝛtis pellit ad modū expulſiōis ſibi nālem qui va

UVA. BHSC. IyR_006_1

dit p portanariū ad iteſtina. 2ª cā ē: ſi bibita fuerit ſuper vehemētē famē. Et cā in hoc ē q: tūc ſtomac⁹ ē auarus in expellēdo: ⁊ iō medicina trahiť deorſuz: q: iſte ē nālis modus q partes iferiores trahāt a ſuperiorib⁹: ⁊ iō fit ſeceſſiua. 3ª cā eſt: ſi quis ſumpſit medicinā ⁊ patiať coliricam paſſionē ⁊ vētris lenitatē. Et credo q p li ⁊ itelligēdū ſit copulatiue: q: paſſio colirica multotiēs ē cū vomitu. ideo vult Aui. q in colirica illa paſſiōe in qua vomituū fit ſeceſſiuū ſupet lenitas inteſtinoꝝ: tūc eīm facile lubricat mā que trahiť a medicina ⁊ deſcēdit. 4ª ɔditio ē q ille q ſumpſit medicinā nō cōſueuit vomere. nā in illo ē difficile vomere mā3 p ſupiora: ⁊ iō tunc ſurgit virt⁹ ⁊ pellit p iferiora nocumēto ɔcepto. ⁊ oēs iſte cōditiones ſunt ex pte ſumētis. 5ª cōditio ē q farmacū ſit graue facilis dſcenſus. Et iſtius cā ē clara: q: vadit facilr ad fundū ſtomaci ⁊ trahit deorſum. Et iſta cōditio ē ex parte medicīe. vñ qñ volo dare agaricum ita vt nō vomať: ⁊ ſimilr alias medicinas amaras ī habētib⁹ facile ſtomacū ad nauſeādū do in forma pillulata vt deſcēdant ⁊ nō natēt in ſupficie. Et nota q Meſue addit alios duos modos ī de cōſolatiōe medicinarū intētōe pª. c. 2º vnus ē ex parte diſpōis farmaci: q: mixtū ſit cū re boni ſaporis ⁊ delectabilis: tūc eīm ſtomacus āplectiť eū ſicut cibū ⁊ verſus fundū mouet. Secūdus modus ē q ipe ibi dixit ꝑpter diſpōnē3 cōtingentē ſup vtrūq3. ſ. farmacū ⁊ ſumētē ipm: ⁊ hoc accidēs qđ pōt ſupuenire: ē ſicut ſi diſtrahať intētio eius qui ſumpſit farmacum ad alia: vt aliqñ ad res exteriores delectantes. Nā in iſtis cāib⁹: q: nā oīa regulās ſapiētib⁹ decreuit facere de re vomitiua ſolutiuā: iō fit fluxus ⁊ nō vomit⁹. Et puto q intētio Meſue fuit q qñ hō diſtrahiť a cōpꝛehēſione nocumēti medicine vomitiue: q: tunc fit expulſio ac ſi eēt pure nālis a ſtomaco: ⁊ talis expulſio fit ſapiēter a nā magis per iferi⁹: iō accidit q nā talē hūoꝛē talē medicinā euat ad iferioꝛa. Et ex his p3 q iſte cāe reducūtur ad tres maneries: quedā ſumūť a diſpōne medicie: queda3 a diſpōne ſuſcipiētis: quedā ab accidēte ſupueniēte: aut ſuſcipiēte: aut farmaco: aut vtroq3. ¶ Nota vlteri⁹ q cāe quare medicina ſeceſſiua vomitiua fit: numerat Aui. quattuor. pª ē debilitas ſtomaci. ſ. ptis ſupioris: vñ facilr recipit qđ ad ipm pelliť leui agitatiōe. 2ª ē ſiccitas ſecū ī iteſtinis: vñ inteſtina nō recipiūt. 3ª ē q: medicina ē abhominabilis: aut pp ſapoꝛē: aut ꝑpter alias cās. Nā talis du3 recipiť iclinat ſtomacū ad expulſionē p os ⁊ remanet talis inclinatio. 4ª cā ē: ſi ille qui recipit cōſueuit pati faſtidiū: vñ abhoiť ⁊ bona ⁊ mala. S3 tñ Joānes meſue loco allegato reducit cās ad tres maneries dictas ſupra. Et ī ſpeciali de hac ɔmutatiōe ex pte hui⁹ diſpōnis addit duas. vna ē q medicina ſit leuis ſupnatās. 2ª q ſit cōturbatiua generās vētoſitatē agitatē3 ⁊ ſubleuantē ipā3 ſurſu3. Ex pte aūt coꝛpis ſuſcipiētis addit ſtricturā ⁊ oppilatiōe3 meatuū. Et addit ī 3ª. ſ. ex parte reꝝ accidētalr ſupueniētiū motū foꝛte coꝛpoꝛū: aut aialem ⁊ fetoꝛē ⁊ aſpectu3 rei abhominabilis vt patēt ⁊c̄.

Ois ꝑterea medicīa q vētris ē ſolutiua cū nō ip3 ſoluit: aut ſoluit ſ3 nō id qđ ē matuꝝ mouet hūoꝛē quē d3 ſoluē ⁊ dilatat ip3 ī coꝛpe: ſupat ergo coꝛp⁹ ⁊ ɔuertunť ad ip3 hūoꝛes alij qre humoꝛ iſte in coꝛpe multiplicať.

Nota q ſex poſſunt eē cāe quib⁹ mediātibus medicina exhibita nō ſoluit pª pp debilitate3 virtutis nō potētis opari ī medicinā: ⁊ iō nec ea in ipſa3. 2ª pp vētoſitate3 groſſam ſubleuāte3 coꝛpus medicine aut occultāte3 in occultis vacuitatibus ⁊ poris coꝛpis. 3ª ꝑpter debilitate3 virtutis expulſiue. 4ª ꝑpter oppilatione3 ⁊ ɔſtipationē ī vno ex cānalibus expulſionis. 5ª pp inobediētiā materie ad expulſionē vnde fit ɔmotio ⁊ agitatio in ea ⁊ nō expelliť: ſed dilatať ⁊ multiplicať ī coꝛpe. 6ª q: medicina eſt debilis in ſe ⁊ remiſſa ī opere ſuo: ⁊ iſtaru3 medicinaꝝ ſic nō ſoluentiū quedā paꝝ nocēt: īmo quaſi nihil q: vincūť a virtute coꝛpoꝛis ⁊ fiunt cib⁹. Alie nocēt nocumēto plurimo quas nec virt⁹ vincere ſufficit nec eas regulare: vt vult Gal. tertio đ ſimplici medicīa. c. xx. cū dicit: Et pp illđ qđ ia3 narraui ſit qđ de medicinis ſolutiuis ⁊c̄.

¶ Hic ponit cañ. de nocumētis medicie ſolutiue qñ exhibeť ita q nō pōt euare humoꝛē: aut q: ſit nō maturus: aut ex alia cā: aut eū euat ſ3 imatuꝝ. Et dicit q omis medicina vētris ſolutiua cū ñ ſoluit: aut ſi ſoluit euat illđ qđ nō ē maturū: facit hec nocumēta. pᵐ ē q hūoꝛē quem d3 euare agitat. 2ᵐ q dilatat ipm ī coꝛpoꝛe. Ex quo fit 3ᵐ q hūoꝛ ſupat coꝛp⁹. Et īde ſeqť 4ᵐ q alij hūoꝛes ɔuertūť ad ip3. i. ɔuertunť ad nā3 illi⁹. 5ᵐ ⁊ vltimū ē q hūoꝛ iſte quē ītēdim⁹ euare mltiplicať ī coꝛpe. ¶ Ubi no. q ītētio Aui. ē oñdere q ad farmaci exhibitionē ad aliquē hūoꝛē euacuandū ſi ip3 nō euat quoquo mō: aut ſi aliquid euat ⁊ euat de crudo ſequiť multiplicatio ⁊ nō diminutio illi⁹. ⁊ cā ē: q: ille hūoꝛ ſpargiť p coꝛp⁹: ⁊ alij hūoꝛes ex hoc ɔuertūť ad ſui nā3. ¶ Nota 2º q hoc pōt intelligi duob⁹ modis. vn⁹ ē q multiplicať hūoꝛ quē ītēdim⁹ euare. i. hūoꝛ illi⁹ ſpēi: ita q ſi ītēdim⁹ euare flegma ex hoc cāu flegma multiplicať: q: alij hūoꝛes cōuertūť ad flegma: ⁊ hoc puto falſum. Nā nō pōt hūoꝛ magis digeſt⁹ īmediate in talē humoꝛē min⁹ digeſtū cōuerti ꝑcipue cū ab hūoꝛe ñ genereť hūoꝛ. Scđs modus ē quo multiplicať talis hūoꝛ: q: ſi ille hūoꝛ h3 aliquā malitiā: aliqñ hūoꝛes coꝛpis recipiēt illā ⁊ fiet q in coꝛpe ī fine talis opis erit plus de hūoꝛe habēte talē maliciā: ⁊ hoc puto verum ⁊ bñ vificať p cās ab Aui. tactas. Quod aūt dicit Dy. hic q medicina ſolutiua vni⁹ humoꝛis ſi digeriť cōuertiť ad ſpēm illius nō puto veru3 oīo: ſed de hoc magis infra.

Ex humoꝛib⁹ quoq3 ē qui eſt velocioꝛis obedientie vomitui ſcḋm plurimū ſicut colera: ⁊ ex eis eſt qui vomitui rebellis exiſtit ſicut melācolia: ⁊ ex eis ē qui iter hoc ⁊ hoc eſt medius ſicut flegma.

¶ Hic Aui. dat cañ. de cōpatiōe hūoꝝ inobediētiū ad vomitū dicēs q quidā hūoꝛ ē magis obediēs vomitui ſicut colera vt plurimū. Alius eſt qui ē rebellis vomitui: ſicut melācolia. Et ali⁹ ē qui medio mō ſe h3 ſicut flegma. ¶ Ubi nota q aliquē humoꝛē eē iobedientioꝛē ad vomitū q3 ſit alius: pōt eē duab⁹ de cāis quātū attinet ꝑpoſito. vna ē ex diſpōe intrinſeca humoꝛis: ⁊ hoc mō ītelligit Aui. 2ª ē ex parte loci vbi cōtineť humoꝛ: ⁊ hoc mō ɔtingit aliquē humoꝛē melācolicū facilius euari per vomitu3 q3 colerā vel flegma: q: exñs in oꝛe ſtomaci facilius vomitu pelliť q3 colera exiſtēs ī pulpone vel venis magnis. Et ſilr melācolia regurgitās ad ſtomacū ī prin° poxiſmi q̄rtane facili⁹ pelliť q3 colera que moueť ad cutē in poxiſmo tertiane faciēs ſudoꝛē. Quare aūt magis ꝑcipiť vomitus in moꝛbis a melācolia pendentibus etiā ſi locus leſionis ſit longe a ſtomaco q3 pꝛecipiatur a colera: dicetur īfra loco ſuo. Sed ſufficit hic q facilius vomitur colera merito diſpoſitionis ſibi intrinſece.

Et febꝛē quidē hñtis ventrē ſoluere meli⁹ eſt q3 facere vt ipſe vomat: ⁊ cui⁹ humoꝛ deſcēdēs fuerit ſicut lienteriā hñtis facere vt vomat eſt incōueniens.

¶ Cañ. ſcimuſquart⁹ ē de cōpatiōe haꝝ euationū idicatiōe ſūpta a certis moꝛbis. Et duo ſūt pticulares. Primus q meli⁹ ē ī hñte febꝛē facere ſol'onē vētris q3 ꝑuocare vomitū. Scđs eſt q facere vt vomat ille cuius humoꝛ fuerit deſcēdens: ſicut habētis liēteriam ē incōueniens. Sed ꝑpter cañ. dubitať ⁊c̄.

Utrū melius ſit in habente febꝛem

ſoluere ventrē vl'r q3 vomitū ꝑuocare: Et arguiť q non. Euōne vltima ī bonitate nulla ē melioꝛ: ſ3 in aliq̄ febꝛe vomit⁹ eſt vltīa euonu3 in bonitate: ergo ſequiť q nulla erit melioꝛ. maioꝛ eſt clara: ⁊ minoꝛ eſt Aui. pª quarti. c. de cura flegmatice cū dixit: Et vomit⁹ qde3 cū eo qđ eſt ī eo de debilitate eſt vehemētis iuuamēti valde ⁊ eſt vltim⁹ huic egritudini. Et ɔſtat q nō dicit vltimū ī tpe ſ3 ī bonitate. ¶ 2º arguiť ſic: In multis tpib⁹ ɔuenit ī febꝛe vomit⁹ ī qb⁹ nō ɔuenit ventris ſol'o: ergo vomit⁹ ſaltē ꝑtunc ⁊ cū illis ɔditionib⁹ eſt ɔueniētioꝛ. Aſſumptū p3 q: ī die poxiſmi cōuenit vomit⁹ ⁊ in augmēto vl'ī qñ tñ nō ɔcediť vētris ſolutio. Qđ aūt in die poxiſmi nō ɔueniat ventris ſol'o: p3 ex pª quarti. c. de cura putridaꝝ in gnāli cū dixit: Et nō moueas ī die poxiſmi aliqd quātū tibi plus poſſibile eſt. Qđ aūt in augmēto nō ɔueniat: p3 ex eodē. c. de cura flegmatice cū dixit: Et multotiēs euatio ɔcediť flegmatici humoris ⁊ crudi ī hac hoꝛa: ſ3 meli⁹ eſt vt expecteť ɔplementu3 digōnis. Qđ aūt his tpibus ɔueniat vomit⁹: p3 in. c. de cura quartane cū dicit: Et vomit⁹ iteꝝ ꝑpꝛie añ cibum ⁊ poſt cibu3 eſt conueniētioꝛ: ⁊ pꝛopꝛie in paroxiſmo ⁊ ante paroxiſmū: ⁊ ꝑpꝛie quādo mā eſt flegmatica ⁊ de reb⁹ iuuātibus in ea ⁊ nō in prin° tm̄: īmo ī qualibet hoꝛa. Qđ ēt gnāliter ɔferat vomit⁹ in omī febꝛe: p3 ex his q̄ dicit ī eode3. c. Et vomit⁹ añ poxiſmū qcūq3 humoꝛ ſit alleuiat paroxiſmū aut eradicat eū. ¶ In oppᵐ eſt Aui. hic: ꝑ ſol'one hui⁹ Dy. bꝛeuiſſime ſe expedit: q: aut ɔparam⁹ vomitū ⁊ fluxū in ſeipſis ⁊ cu3 febꝛe aut rōne lapſus humoꝝ. Si cōſideram⁹ iſtos mot⁹ ī ſeipſis: tunc vomit⁹ ē iconueniētioꝛ: q: ī eo eſt maioꝛ agitatio: ⁊ iō maioꝛ additio ad caliditatē ⁊ īflāmatōe3. Si autē ɔſidereť ſcḋm q eis eſt rapt⁹ humoꝛ ad aliquā pte3: tunc aliqñ ɔueniētioꝛ vomit⁹ eſt: qñq3 aūt cōueniētioꝛ eſt fluxus. Si ei3 repit nā ad ſuperi⁹: tūc eſt magis ɔueniens vomit⁹. Si ad īferi⁹: tunc magis ɔuenit ventris ſol'o. S3 ſi ſit paritas in agitatiōe humoꝝ: q̄re q̄ euatio ſit ɔueniētioꝛ: qđ Dy. nō ſoluit. Preterea ad hūc ſenſu3 nō eſſet plus ī febꝛe q3 ī alijs moꝛbis ſolutio vētris magis q3 vomit⁹ ɔueniens: cu3 vomit⁹ ſit gnāliter difficilioꝛ ſol'one. Et videť q Aui. iſtud ſūpſit a Raſi 6º ɔtinētis. c. đ tenuitate ⁊ lenitōe. vbi auctoꝛitate Gal. dixit q ī qōne epidimie de tractatu 2º dixit: Euatio cu3 laxatiuo ī febꝛib⁹ erit vtilioꝛ euōne cu3 vomitu: qm̄ euatio in febꝛib⁹ ſi fuerit cū vomitu eſt fallax. In quib⁹ verbis videť Raſis loq nō de agitatōe: ſ3 de ipſa euōne: cui⁹ ɔꝛiū videť Raſis dixiſſe eo. li. c. de minutōe repl'onis. cū dixit: S3 cauēda ē laxatio ī dieb⁹ poxiſmi ⁊ creticis cū humoꝛes ſint đclināte ad ſurſu3: nec difficilis laxatio fiat: ſ3 ſtude ī eis vti vōitu. Cū ergo febꝛis aut ſit ɔtinua aut poxiſmalis: ſi ī poxiſmo nō d3 fieri laxatio: ergo nec in ɔtinua. q ſi extra poxiſmū fiat: nō fiet ī febꝛe. Credo ergo q ad ſoluēdū qōnē alia via ſit ꝑcedēdū. ¶ Pro' quo' nota pº q in febꝛibus multotiēs ex cibo indigeſto mā remanet in ſtomaco: q: in illis īdigeſtio multiplicať: multotiēs ēt coꝛrupte māe quas alia mēbꝛa abhoꝛrēt ī eo gnāť p coꝛruptiōe3 digōnis: ⁊ in eo remanēt. Accidit aūt multotiēs ⁊ 3º q: tpe poxiſmi cōmota foꝛtiter mā ſcḋm partē moueť ad ſtomacū per venas que ad ipm terminanť: aut p poꝛū felleū multotiēs etiā ad inteſtina moueť: ſ3 pluries ſupꝛa. Et hoc voluit Raſis cū dixit ſupꝛa loco allegato q tpe poxiſmi mot⁹ māe ē ad ſuperioꝛa. ¶ Nota 2º q ī febꝛib⁹ putridis de quib⁹ eſt maxime ſermo mā plurimū ɔtineť in venis illa cui⁹ īdigem⁹ euōne cū farmaco. nā ſi febꝛis eſt ɔtinua: mā putrefit ī venis.

nis. Et ſi interpolata mā plurimū que eſt ſub forma cauſe
antecedētis ē ī venis: ⁊ hoc nō loquēdo de febribꝰ apatū.
¶ Nota 3° ꝙ māe q̄ in ſtomaco ꝯtinent faciliꝰ artificialr̄
euāntᷣ ꝑ vomitū: qꝛ via eſt breuior. nec ad hoc īdigemꝰ far
maco forti qꝺ dicitᷣ vomitiuū: imo ꝑ debilia īciſiua ⁊ leni/
tiuo apppoſito incitamēto euātᷣ. Sꝫ ſi ꝑ ſeceſſuꝫ euāri de
beret tanta vt per vomitū: oporteret vti ſolutiuo: qꝺ ſatis
forte eēt ⁊ agitationē totiꝰ faceret. ¶ Quarto nota ꝙ ſolu
tiuū. i. medicamē qꝺ ſoluendo ꝓuocatiuū ē vomitꝰ mā nō
exn̄te ī ſtomaco nec in viȷs ductuuꝫ: oꝫ ꝙ ſit violentiꝰ q̄ꝫ
medicamē qꝺ eſt ſolutiuū vētris equalr̄: ⁊ oꝫ ꝙ ſit magis
ꝑmutās mēbra. ⁊ 3° ꝙ magis debilitet ea. ⁊ 4° ꝙ magis
agitet mām euāndā ⁊ aliā q̄ remanet. ⁊ 5° ꝙ plus de ſpū
reſoluat. ⁊ 6° ꝙ magis inflāmet. ⁊ 7° ꝙ eius īflāmatio ſit
magis verſus ſupiora. ſ. cor ⁊ caput q̄ꝫ a ſoluēte ventreꝫ.
Iſte ꝯditōes fere oēs patēt ex ſe p̄ter primā iſtaꝝ. primaꝫ
aūt hēbimꝰ īfra. His ergo hitis ſit p̄a ꝯclō. ¶ Pro eua/
cuatōe materieꝝ que aut ꝯgregantᷣ in ſtomaco ⁊ viȷs du/
ctuū in febribꝰ: aut illuc agitate currūt: aut parate ſūt cur
rere: vtilior eſt vtplurimū in febre vomitꝰ q̄ꝫ ventris ſolō.
Conclō ꝓbatᷣ: qꝛ talis purgatio cū vomitu fit cuꝫ maiori
iuuamento ⁊ minori nocumēto. Nā iuxta notatū 3m ⁊ 2m
plurimū tales māe ī ſtomaco ꝯgregantᷣ ⁊ ab illo cū leuiori
medicina euāntᷣ: ⁊ plures tales ꝑ vomitū q̄ꝫ ꝑ fluxuꝫ ven/
tris. Et ad hāc intētōeꝫ vult vomitū ꝯuenire ī febribꝰ: p̄a
quarti ī locis allegatis: ⁊ eſſe vltimū. Et Raſis p̄cipit vo/
mitū ī die paroxiſmi ī p̄n°. Nā iter euōnes q̄ ꝯueniūt: tūc
eſt vtilior ⁊ melior regulr̄. ¶ Scḋa ꝯclō ꝓ euāndo mās q̄
nō ſūt ī ſtomaco aut ī viȷs ductuū: euātio cū vomitu ī fe/
bre ē difficilior ⁊ minꝰ bona q̄ꝫ fluxus ventris. Hec ſit ꝓ
mēte Aui. ⁊ Raſis loco allāto. Et ꝓbatᷣ ꝑ nocumēta maio
ra q̄ ad eq̄lē euōnē taliū materieꝝ ſequūtᷣ ī vomitu q̄ꝫ ī flu
xu vētris: ⁊ ſunt narrata ī q̄rto notabili. Ex his pꝫ ſolō ad
argu. Circa 2m cañ. particulareꝫ dubitatur ⁊c̄.

Utrum vomitus conueniat patien

ti liēteriā: Affirmatiue arguitᷣ ſic. Illa euātio ē cōueniēs
que mouet ad cōtrariū ꝑtis fluxꝰ. ſꝫ vomitꝰ ē huiuſmōi:
ergo ⁊c̄. Maior ⁊ ꝯn̄tia patēt ex Aui. 16a tertȷ. c. de fluxu
vētris oīum modorū cū dixit: Et qn̄qꝫ curatᷣ fluxus ven/
tris cū diureticis ⁊ ſudare faciētibꝰ ⁊ dilatātibꝰ poros ⁊
vomitū faciētibꝰ. oīa nāqꝫ hec mouent māꝫ ad cōtrarium
ꝑtis fluxus. In his verbis innuit Aui. ꝙ cā quare iſta cōue
niāt: ē qꝛ mā mouetᷣ ad cōtrariū ⁊c̄. ⁊ innuit ꝙ hoc facit vo
mitus. ¶ In oppm ē Aui. hic ⁊ Hypo. quarta ꝑticula af/
fo. illo affo. quibꝰ vētres liēterici. Et Auic. 16a tertȷ. c. de
cura fluxus vētris lubricatiui. ¶ In iſto dubio rn̄dēt cō/
muniter doctores ſuꝑ affo. allegato ꝙ euātionū que fiunt
ꝓ cura liēterie: quedā fiūt intētiōe diuertēdi mām a loco
ad quē fluit vel fluxit: quedā fiūt principalr̄ intētiōe eua/
cuādi mām. Tūc ergo dicūt ꝙ in intētiōe diuertēdi mām
fluētē aut iam fluxā cōuenit vomitꝰ. Sꝫ ī itētiōe euāndi n̄
cōuenit: qꝛ meliꝰ ꝑ fluxū euātur cū illic mā declinet. Sed
hec rn̄ſio nō videtᷣ ad mētem Aui. 16a tertȷ. c. allegato: qꝛ
ipe vult vomitū nō cōuenire: qꝛ nō pōt bene per vomituꝫ
trahi mā que ē in inteſtinis. Et iō intētiōe diuertēdi illā
mām que fluxit nō ꝯuenit. Nā dicit Aui. verū: euātio ma
terie huiꝰ egritudīs cū vomitu eſt difficilis mala. Et raro
vomitꝰ euāt flegma deſcēdēs ad inteſtina. Silr̄ Raſis 6°
cōtinētis aucte Gal. dixit ꝙ euāndū ē per vomitū qꝺ in
ſtomaco fuerit. ſed qꝺ in iteſtinis ē: impoſſibile erit euāre.
¶ Dynus aūt ſuper iſto loco dixit ꝙ vomitus ī cura lien/
terie duplr̄ dꝫ adminiſtrari. Unꝰ modus ē ꝓ fluxu īquātuꝫ
fluxus ē vt ſiſtatᷣ: ⁊ iſto mō vomitꝰ bn̄ pōt cōferre: īmo eēt
iuuatiuꝰ: qꝛ in iſtis fluxibꝰ vna intētio ē ad cōtrariū trahē
do ſiſtere. Scḋs ē intētiōe hita ad cām: ⁊ hoc mō ſi cauſa
ſit mālis tūc ipa nō dꝫ euāri ꝑ ſuperiꝰ. Quod Dynꝰ ꝓbat
qꝛ mā que mouetᷣ ad inferiꝰ nō dꝫ euāri per ſupius: qꝛ vn̄
nā repit ⁊c̄. Si aūt fuerit ſine vitio humoris n̄ dꝫ fieri eua
cuatio cū ibi nō ſit mā. Sꝫ meo iudicio hec rn̄ſio nō ſatiſ/
facit: qꝛ p̄a cōclō nō videtᷣ vera qꝛ ī liēteria currit cibꝰ. Si
ergo intēdimꝰ illū fluxū curare trahēdo ad cōtrariū ꝑ vo
mitū cōſtat ꝙ facimꝰ maius nocumētū reſpectu illiꝰ quia
cibū a corꝑe educimꝰ vbi non fuiſſet eductꝰ: ⁊ ſic de eo nō
plus habetᷣ vtilitas: ⁊ fit hoc cū maiori labore: ⁊ ſic nō fit
iuuamētū ſed nocumētū. Taliter auteꝫ nō remouetᷣ mala
diſpō faciēdo deteriorē ī ea ⁊ ſic n̄ ē curare: vt dicit Gal.
ī cōmēto illius affo. Quibꝰ in cauſone rigores fiunt ſoluit
alienatio. 2a ēt cōclō nō probatᷣ bn̄: qꝛ qn̄ intēdimꝰ diuer/
tere nō euāmus vnde repit nā: vt ſupra dixi de iſta mate/
ria. Credo ergo Aui. hic ⁊ 16a tertȷ. c. allegato. ⁊ ſilr̄ Hy/
po. in affo. allegato velle ꝙ per vomitū trahere mām que
ē in inteſtinis ad ſupiora: ⁊ maxie flegmaticā ſit valde dif
ficile: adeo ꝙ meliꝰ ſit illā mām nō euāre per viā illaꝫ. Et
hec fuit intētio Aui. ꝙ qn̄ humor ē deſcēdens ꝑ inteſtina
quiſquis ſit ille gr̄a euāndi illū nō ſit ꝓuocādus vomitꝰ:
Quia aut nō educetur vomitu ſi vomitiuū ſit leue: aut ſi
ita forte vomitiuū detᷣ ꝙ ipm euēt erit plus nocumētum
iuuamēto. Et hoc mō intelligēdo dicit ꝙ ī patiētibꝰ lien/
teriā in inteſtinis ꝑꝑ flegma poſſumus habere duplicē. i/

Nota ꝙ ſi lienteria ꝓceſſerit ex vulneribꝰ ſiue ex vlceribꝰ ſtomaci plus valet in ea vomitꝰ q̄ꝫ ſeceſſus: vt vult Gal. ī ꝯmēto affo. q̄rte particule. Gibbꝰ vo ⁊c̄. cuꝫ dicit vulnera auteꝫ ex humoribꝰ fiūt calidis ⁊c̄. Sꝫ ſi liēteria ꝓcedat ex mala ꝯplōne predominante ſtōaco ſine mā nō ꝯpetit in ea vomitus neqꝫ ſeceſſus: ſed ſi a flegmate fuerit inducta: tūc ꝯpetet medicina educēs illud flegma ꝑ īferiora: vt ibidē vult Gal. cum dicit: Humores vo flegmatici ſi ſunt ⁊c̄. Et ſi datᷣ medicīa ſic educēs per īferiꝰ tali liēterie facte ex flegmate debet dari ī principio dū virtus ē fortis: qꝛ ſoluere ventreꝫ ſupra vētris ſolutioneꝫ virtute iā debilitata eſt timoroſuꝫ ⁊ ī illo farmaco dꝫ eē aliquid qꝺ poſt eductionē flegmatis dereliquat aliq̄d ſtipticitatis vt mirabolāi kebuli ⁊ huiuſmōi.

tētionē: aut ad euāndum mām que nōdū ē in inteſtinis: ⁊
fluit ad illa: ⁊ ē cā añs: ⁊ hoc mō pōt vomitus conuenire.
Alio mō poſſumꝰ intēdere ad euātionē humoris qui actu
eſt in iteſtinis: ⁊ hoc modo ī liēteria nō ꝯuenit vomitus: ⁊
hec ē itētio Aui. hic ⁊ alioꝝ auctoꝝ ſilr̄ dicētiū. ¶ Ad ar
aūt cuꝫ dī ꝙ vomitꝰ trahit ad ꝯ̄riū: dicēdū ꝙ pōt eē aliq̄s
q̄ hoc mō trahit: ſꝫ facit nocumētū aliꝺ. In aliȷs aūt fluxi
bꝰ ſtat vomitū ꝯuenire ꝓ mā fluēte: nōdū tn̄ ī iteſtinis exi
ſtēte: ⁊ forte ſi ē colera adhuc ꝓ mā exn̄te in inteſtinis. ⁊ iō
Hyp. dixit ꝙ liēterici hyeme ⁊ non dixit vlr̄ de oībus.

Medicinaꝝ preterea ventris ſolutioneꝫ facientiuꝫ
deterior eſt que ex medicinis eſt cōpoſita multe diuerſi/
tatis in tēpore in quo ſoluēdus eſt venter: quoniā ven/
tris ſolutio ꝯturbatᷣ: ⁊ prima ventrem ſoluit anteq̄ꝫ 2a: ⁊
quādoqꝫ prima ipſaꝫ ſecūdaꝫ expellit.

¶ Hic eſt quintuſdecimus cañ. de vno malo modo ꝯpo
ſitionis medicinaꝝ. Et dicit Auic. ꝙ illa medicina de ſo/
lutiuis cōpoſita eſt deterior que ē cōpoſita ex diuerſis me
dicinis que diuerſificātur in tempore ſue operatōis: quia
ex hoc ſequitᷣ ꝙ turbatᷣ ſolō vētris ⁊ ſoluit vna añ aliam:
⁊ forte vna euāt aliā a corꝑe. ¶ Ubi nota p̄° ꝙ medicine
ſicut diuerſaꝫ hn̄t diuerſitatē ītra: ita pn̄t diuerſimode cō
miſceri ſtāte varietate virtutū earū. Nā aliq̄n differūt in
ſpē hūoris euāndi: qꝛ vna euāt colerā: alia flegma. Diffe/
rūt 2° in manerie euātiōis: qꝛ vna euāt ſoluēdo: alia lubri/
cando aut cōprimēdo ⁊c̄. 3° differūt rōne mēbrorū a qui/
bus principalr̄ euānt. 4° ī tꝑe qꝛ quedam tarde ⁊ quedaꝫ
cito. 5° ī incolumitate accidētiū: qꝛ quedā facilem faciunt
ſolōnē: quedā difficilē. ¶ Nota 2° ꝙ nō ē aliqua iſtaruꝫ
diuerſitatū ſm̄ quā nō cōcedatᷣ aliq̄n cōmixtio. vnde no/
bis idigētibꝰ ſolōne ⁊ cōfortatiōe miſcemꝰ ſolutiua cū ſti/
pticis ſolōnis ꝯpſſiuis: vt ſcamoneā cū mirabolanis. No
bis aūt indigētibꝰ euātione diuerſorū humorū ꝑmiſcemꝰ
medicinas que illos habēt euāre. Nobis īdigētibus a di/
uerſis mēbris euāre permiſcemꝰ medicīas que diuerſa mē
bra reſpiciūt. Si ēt medicina ſit nimis tarde opationis mi
ſcemꝰ ad opus ſuū accelerandū multotiēs medicinaꝫ cito
opatiuā. Accidit ēt ī intētionibꝰ prioribꝰ ꝑmixtionū aliaꝝ
ꝙ medicine ille n̄ ſunt equalis tꝑis in euāndo. Sꝫ ꝙ hoc
vltimū fiat pꝫ ex Meſue ſuo de cōſolatiōe medicinarum
ſumma 2a. c. p̄io. ⁊ cañ. p̄io ī fine. ⁊ iō nō ē intētio Aui. ꝙ
nō fiat vn̄q̄ꝫ talis cōmixtio. ¶ No. 3° ꝙ ex cōmixtiōe ali
quarū diuerſitatū inquātū ē cōmixtio talis nō ſequitᷣ no/
tabile nocumētū: verbigratia ex cōmixtiōe mediciarū ſol/
uētiū diuerſos hūores: aut a diuerſis mēbris: aut diuer/
ſis modis: ſi īpreſſiua aut lubricatiua: de quibꝰ infra dicā
nō ē nocumētū. Sed in ꝯpōne medicinaꝝ que ſunt diuer
ſe ī tēpore ē nocumētū iam dictū ī cañ. Et iſta ē deterior
aliȷs cōpōnibus ad hūc ſenſuꝫ īquātū. ſ. ē ꝯpō talis habꝫ
nocumētū diuerſuꝫ a nocumētis cōponētiū. ¶ Et ex hoc
p̄° habes ſolōnē dubȷ querētis: Utrū liceat facere talem
cōmixtionē: qꝛ dicēdū ꝙ ſic qn̄qꝫ ꝓpter iuuamēta maio/
ra. ¶ Sequitᷣ 2° ꝙ iſte cōmixtiōes ſunt faciēde cū debi/
ta cautela: qꝛ cōmiſceantᷣ tales ſi fieri pōt ꝙ ſigillēt ſibi ī/
uicē virtutē ita ꝙ vna nō acceleret opus alteriꝰ: ſicut ver
bigrā: ſquilla ⁊ hermodactilus. Nā qn̄ nō habēt īuicē ta/
lem ꝓportionē vt ſint apte ex ꝓprietate ſigillare ſibi īuicē
tales virtutes ꝯpō vitāda ē inquātuꝫ ē poſſibile: vt dicit
Meſue loco allegato. ¶ Tertio pꝫ modū ſolōnis Dy. nō
ex toto verum eſſe. Nā ⁊ ſi nocumenta dicta timentᷣ tn̄ lꝫ
multotiēs ꝓpter melius cōmiſcere talia. Sꝫ in cōpōne te/
ne mēti ꝙ ſi vna medicīa tarde opatᷣ ⁊ alia velociter nō tn̄
ē ad accelerādū opationē tarde ſemꝑ talis cōpō vtilis ni/
ſi ille ſe cū ꝓprietate reſpiciāt. īmo etiā ſi vna ſit calida ⁊
reliqua adminiſtrāda ſit frigida ad tꝑandū: nō ſufficit ad
debitā faciēdam cōmixtionē ꝙ frigida ſit illa que admiſce
tur niſi ſit cū ꝓprietate ita tꝑandi: vt pꝫ ex Meſue loco al
legato cū dixit: Et adhuc verificatᷣ ꝙ ſcamonee ꝓpriū ē
ledere cor: ⁊ ꝙ ē habilis inflāmari: ēt ꝙ multe diſſolutio/
nis. verū ambra ꝯfortat cor: ⁊ criſtallus extinguit īflāma/
tionē: ⁊ galla cōgregat diſſolutionē mēbroꝝ: ſed nō ē ꝯdi
gna eius permixtio cū ſcamonea. nō eniꝫ ſibi inuicē ſigil/
lant ad cōcordiā. Que aūt ſint medicīe que ſibi inuicē hoc
mō ſigillāt: querēdū ē in locis ꝑticularibus.

Amplius qui biberit aliquid vētris ſolutiōeꝫ aut vo
mitum ſibi faciēs corpore ipſius lipido: neceſſe erit vt ei
vertigo accidat aut mordicatio in vētre ⁊ anguſtia: ⁊ qꝺ
ab eo expelletᷣ egredietᷣ cuꝫ difficultate.

¶ In iſta ꝑte oñdit que accidētia ſequūtᷣ aſſumptionem
farmaci vomitiui vel ſolutiui ī corpore mūdo: dicēs: q̄ bi/
bit farmacū vomitiuū vel ſolutiōeꝫ faciēs corꝑe mundo:
neceſſe ē vt ei accidat vertigo: aut mordicatio: aut āguſtia
ī vētre: ⁊ illꝺ qꝺ ab eo expellitᷣ egreditᷣ cū difficultate. Et
ſi cōſideras: iſta eſt ſn̄ia Gal. in cōmēto illius affo. Sana
hēntes corpa farmacis vti difficile ē. ¶ Nota ergo ꝙ iſte
medicine ſolutiue cū hēant euāre cōſtat ꝙ hoc nō faciunt
niſi alterādo humorē quē euāre debēt ⁊ agitando ipꝫ. Et
qꝛ mēbra humorē retinebāt aliquā mēbris faciūt violen/

Nota ꝙ Auic. hic ſoluꝫ loquitᷣ de medicis ſolutiuis vētris ⁊ non vomitiuis qꝛ vomitiue cōplent ſuuꝫ opus cū turbatōe ſtomaci ad quaꝫ coadiuuat diuerſitas medicinaꝝ.

Nota ꝙ due ſūt cauſe ꝓpter q̄s indigēt medicie vt iuuētur in ope laxādi. ſ. debilitas ⁊ tarditas: ⁊ de his cāis meminit Meſue ī primo canone primi caplī ſcḋe intētionis.

UVA. BHSC. IyR_006_1

tiam. Et q: he virtutes nō inueniūtur niſi in medicis for/titer alteratiuis: iō he medicine alterāt mala qualitate mēbra. Ex quibꝰ pꝫ ꝙ qñ medicia agit cū forti reſiſtentia mēbrorū ꝙ oꝫ multū humores alterari ab illis medicis ⁊ agitari antequā eūent: ⁊ iō plurimos vapores iā factos ma/los eleuari: ⁊ ſpūs mltū agitari. Oportet 2° trāſire ꝑ vias ſtrictas cū mēbro nō facilr cedāt: imo reſiſtant bonorum hūoꝝ eūationi. Oportet 3° multas ꝑtes taliū humorū vē/toſari ⁊ multū acui antequā eūent. 4° oꝫ medicinaꝫ diu manere: ⁊ ſuā qualitatē malā fortiter īprimere ī mēbra ꝑci/ꝑue ſibi vicina. Et quibꝰ pꝫ veritas cañ. nā propter mul/tos vapores ad caput eleuatos ⁊ motꝰ ſpūum fit vertigo: ⁊ ꝓpter acuitatē ⁊ vētoſitatē ⁊ trāſituꝫ per vias ſtrictas ⁊ malas qualitates īpreſſas in ſtomaco ⁊ īteſtinis fit mor/dificatio: ⁊ ꝓpter mēbrorum multā reſiſtētiā expellit cum difficultate magna id qđ eūatur.

Et ad vltimū quidē duꝫ medicina ſupfluitates euacuat nō erit ī ea eſtuatio. cūqꝫ qui medicinā biberit eſtuationē hēre ceperit: iaꝫ euacuat qđ ſupfluuꝫ non eſt.

¶ Hic ē. xvj. cañ. ꝑ quē docet Aui. cognoſcere qñ medicina eūat hūorē nō dignū eūari: dicēs ꝙ vltimate ꝓ regula teneri dꝫ ꝙ dū medicina ſolū eūat ſuperfluitates ñ erit cū ea eſtuatio: ⁊ ita ecōtra cū incipit eſtuari qui bibit me/dicinā: tūc medicina eūat illud qđ nō ē eūandū. Et cōſtat ꝙ hoc pōt eē ſine ſufficientia oꝑis farmaci: ⁊ iō ego iſtum cañ. nō puto de ſignificantibꝰ ſufficiētiā oꝑis farmaci: ſed maliciā oꝑatiōis: ⁊ iō potius puto ꝯiungēdū cū precedēti qꝫ cū ſequētibꝰ. vñ ēt Aui. dixit ad vltimū ꝙ videt denotare hītudinē ad precedētia. ¶ Nota ergo ꝙ eūatio humoris digni eūari nō moleſtat notabilr: imo tolleratꝰ bene vt fuit dictū in. c. 3°. Sꝫ ſi accidat moleſtia: erit aut ex ꝑte qualitatis medicie: aut ex ꝑte diſpōis corꝑis: aut ex parte rei accidētalr cōiūcte. Et iō ſuppono ꝙ ſi corpꝰ ſit debite ꝑparatū ⁊ medicia nō ſit multū maligne qualitatis ꝙ nō ſequit eſtuatio niſi qñ eūat humor bonus. Jn illo eiꝫ reſi/ſtit nā inquātū pōt: ⁊ fit eūatio difficilis vt dictū ē ſtatiꝫ. Qđ aūt Dy. dicit hic ꝙ eſtuatio ſignificat ſupfluitatē euacuatiōis quo ad tenorē virtutis cōſtat ꝙ nō ē ad mentem Aui. Nā Aui. dicit ꝙ ſignificat ꝙ medicina eūat qđ ſup/fluuꝫ nō ē: ⁊ nō dixit ꝙ virtꝰ nō bene tollerare pōt.

Hūor ꝑterea qui vomitu aut vētris ſolone eūat cū ad aliū mutabit hūorē ſignificabit ꝙ iā corpꝰ ē mūdificatū a ſupfluo hūore quē eūare volumꝰ. Qđ ſi mūdifica/tio vſqꝫ ad īteſtinoꝝ raſurā ꝑuenerit ⁊ ad rē nigrā feti/duꝫ hñteꝫ odorē erit malū. Sōnus quoqꝫ cū poſt ven/tris ſolonē aut vomitū fuerit multꝰ demōſtrabit ꝙ eūa/tio iā ꝑfecte mūdauit corpꝰ ⁊ ꝯtulit. Et ſcias ꝙ cū ſitis poſt vētris ſolutionē aut vomitū fuerit fortis: maximaꝫ ⁊ vltimaꝫ purgatōis bonitatē ſignificabit.

¶ Hic ponit. xvij. cañ. ⁊ ē iudicio meo de modis cognoſcēdi ſufficiētiā ⁊ ſupfluitatē eūationū: ⁊ cōtinet tres canones: quorū primꝰ ē iſte: ꝙ qñ hūor qui purgat aut vomitu aut fluxu mutat ad aliū homorē ſignificat ꝙ corpus ē iaꝫ mūdificatū a ſupfluo hūore quē volumꝰ eūare. Et ſi ī hac ꝑmutatiōe ducat ad excoriationē īteſtinoꝝ ⁊ exitū rei ni/gre fetide ē malū. Scđs ē ꝙ qñ poſt eūationeꝫ cū vomitu aut fluxu ſuperuenit ſomnꝰ ꝓfundus ſignificat ꝙ eūatio ꝑfecte mūdificauit corpꝰ ⁊ ꝯtulit. Tertiꝰ ē ꝙ tu debes ſcire ꝙ cū ſitis poſt vomitū aut vētris ſolonē fuerit fortis ipſa ſignificat bonitatē purgatiōis. ¶ Circa primū ſignuꝫ nota ꝙ humorē mutari ad aliū hūorē pōt intelligi tribus modis vt ꝓpoſito ꝑtinet. Uno mō ꝙ mutet ad humoreꝫ alterꝰ ſpēi: puta ſi primꝰ fuerit colera: ſcđs ſit flegma. Secūdo mō pōt ītelligi q: mutet ad humoreꝫ alterꝰ q̄litatis gnālis: puta ſi p° eūet colera nociua ꝙ poſtea euacuet humor nō nociuꝰ ſiue ſit flegma ſiue colera. Tertio intelligit ꝑmutari humorē ad aliū. ſ. ab illo quē eūare ītendit medicus: ⁊ hoc diuiſiōis mēbrū eſt ꝯſonuꝫ Aui. ⁊ Raſi 6° ꝯtinētis. De pª mutatōe dicit Dy. Aui. nō ītelligere. qđ probat duobꝰ modis. Prio q: ſi multa colera ſit in corꝑe ſed mala nō ſit multa: tunc farmacuꝫ poſtqꝫ eūauit malā ſtat ꝙ eūet bonā: quo caſu nō mutabit humor ſm ſpēꝫ ⁊ tñ ſuperfluet. Scđs caſus ē ꝙ multotiēs peccāt in corꝑe ſimul duo humores mali diuerſi ī ſpecie quos ītendimꝰ cū vno farmaco eūare: ⁊ ideo ſi poſt vnuꝫ ſequit aliꝰ diuerſe ſpēi non ꝑꝑ hoc erit ſupflua eūatio: nec oꝫ ꝙ corpꝰ eſſet mun/dificatuꝫ. Sꝫ de 2ª ītelligit ꝙ qñ mutat in aliā qualitateꝫ gnāleꝫ: tunc iā ſupfluit q: eūat qđ nō eſt eūanduꝫ qđ non ſit poſt humoreꝫ eūandum niſi illo euacuato: ⁊ iō iſta eſt ſignuꝫ ſufficiētis eūonis īcipientis ſupfluere aut ſupfluen/tis. Hec expō non puto ꝙ ſit vera: nec ad menteꝫ Aui. p° nō eſt vera: q: poſſibile ē cū humore peccāte eūari humorē non peccāteꝫ anteqꝫ mundificatū ſit corpꝰ a malo: ⁊ ſic iſta mutatio non erit certuꝫ ſignū. Et pꝫ aſſumptū: q: pōt eūari humor non peccās abſqꝫ peccāte: ergo ⁊ cū aliq̄ ꝑte peccātis ⁊ poſt illā. 2° q: humores qñ ſunt extra corpꝰ fere oēs q ꝑ ſeceſſuꝫ aut vomitū expellūt vident peccātes: vñ male cognoſcunt non peccātes. Sꝫ ꝙ non ſit ad mētē Aui. pꝫ: q: dicit ꝙ ſi hec eūatio ꝑuenerit vſqꝫ ad rē nigrā fetiduꝫ hñteꝫ odorē ⁊c̄. vbi videt velle ꝙ aliqñ ē iſta ꝑmutatio ad reꝫ nigrā fetiduꝫ hētē odorē ⁊c̄. Sꝫ ꝯſtat ꝙ hec res nigra nō eſt alterꝰ q̄litatis ab humore malo q̄litate generali: ergo non ītelligit de illa mutatōe de qua dicit Dy. ſed de pª. Itē Aui. 2ª quarti. c. de ſignis ſumptis ab egeſtione dicit: diuerſitas caloris eiꝰ qđ egredit de digōne ē laudabilis in duabꝰ horis: quaꝝ vna eſt diuerſitas creti/ca poſt digōneꝫ in die cretico: ⁊ altera eſt poſt potionē ſo/lutiuā. Ecce ꝙ loquit de diuerſitate coloꝝ aperte. Preterea hoc eſt ſumptū a Raſi 6° ꝯtinētis. c. de motibꝰ labo/rioſis. cū dicit auctoritate Hyp. c. j. libri epidimiaꝝ. di/cit ꝙ trāſmutatio hūoris ꝑ laxationē aut ꝑ vomituꝫ miſſi ad aliuꝫ facta ſignificat ꝙ purgatuꝫ eſt corpꝰ de humore q̄ſito: iō talis eūatio ꝯfert. Sꝫ trāſmutatio eiꝰ ad raſurā: aut ad colaꝫ rubeā: aut ad colerā nigrā: aut ad aliq̄d ſim/plex: aut fetēs ſignificat ſuꝑ malū ītēſū. Hec Raſis. Ubi ꝯſtat ꝙ Raſis vocat trāſmutatōeꝫ qñ eſt ad colaꝫ aut ad melācoliā: ⁊ talis nō eſt ī q̄litate alia gnāli ad moduꝫ Dy. ⁊ vtreqꝫ ſunt male. Puto ergo ꝙ ſi dat medicia huiꝰ humoris eūatiua ⁊ poſt illiꝰ humoris eūationē ſequit eūatio alteri qui differt ſpē ꝙ iſta mutatio ſignificat ꝙ corpꝰ eſt mūdificatū ab illo humore quē per talē farmacū intēdebamus eūare: ⁊ iō ē eūatio ſufficiēs pro eo quē eūare ītēde/bamus. Sed tñ nō oꝫ ꝙ corpus ab oī malo hūore ſit mū/dificatū. vñ Auic. nō dicit ꝙ ſignificat integrā mūdifica/tionē: ſꝫ ꝙ corpus ē mundificatū ab hūore ſupfluo quem volumꝰ eūare ſupple ꝑ illud farmacū. Qđ aūt dicit Dy. facile ſoluit. nā qui dat medicinā duoꝝ humoꝝ eūatiuā: ⁊ intēdit illos eūare: iā ſi ſcđs differt a prio: nō ſit eūatio ad aliū hūorē ab illo quē intēdit medicꝰ ⁊ quē de ꝓprietate principali reſpicit medicia: cū vtrūqꝫ intēdat euacuare ⁊ vtrūqꝫ reſpiciat medicia: de qua tñ mutatiōe nō intelli/git Aui. vt pꝫ ex mō loquēdi Raſis qui dicit corpꝰ mūdi/ficatū nō abſolute ſꝫ ab humore q̄ſito. Tu etiā ex verbis Raſis ꝯprehēdas veritatē ſcđe partis. nā raſura ē mala. fetēs aūt res nigra ſignificat iuxta Raſim loco allegato putrefactionē ſupple malignā: ⁊ nigra humoꝝ aduſtionē ꝑcipue cū victoria caloris preternālis qñ ē cū fetore. Ex q/bus vides nō bñ expoſitū affo. In vētris fluxibꝰ ⁊c̄. a Dyno quo ad illā ꝑtē: Si ñ ad malā ſe trāſmutauerit ⁊c̄. Qui ītelligit ſi nō trāſmutet ad eūationē rei iuuatiue. nam iſta expō ē ēt expreſſe ꝯtra Gal. ī cōmēto dicti affo. Et quia eūatio quā intēdimꝰ ē cōpleta qñqꝫ trāſmutat: iō tunc eſt cohibēda niſi per ſe reſtringat vt infra dicet. ¶ Circa 2m nota ꝙ eūatio fortis nō facit ſomnū niſi q: ꝓpter eūatōꝫ maligni humoris corpus remanet cū benignis mundificatū a quibꝰ nō ſurgunt mali fumi excitantes: ⁊ q: virtus ē debilitata ſicut poſt forte exercitiū: iō reuocat ſpūs ad in/tus ⁊ fit ſomnus qui iō ſignificat cōpletā eūationē ſi ē multus: q: ſignificat reuocationē caloris ⁊ nō maloꝝ humorū agitationē a quibꝰ eleuant vapores excitantes ⁊c̄. Sed ſi fumi aliqui eleuant ſunt mulcebres: ⁊ ſic ſufficit ad veri/tatē ꝙ hoc ſit ſemꝑ aut in plibꝰ verum: ⁊ ſm hūc modum ſomnꝰ iſte ſignificat ꝙ medicia ꝑfecte mūdificauit corpꝰ ⁊ cōtulit vt Aui. dicit. Ex quo ſequit ꝙ hāc partē minus Dy. bñ expoſuit. voluit eiꝫ Dy. ſomnū nō ſignificare ſuꝑ cōpletā eūationē reſpcū hūoris ſꝫ reſpcū virtutis q: vir/tus nō ampliorē tollerat. Cōſtat eīm ex hoc nō ſignificari qđ cōtulit: q: pōt accidere talis debilitas ex eūatōe humoris nō peccātis. Cōſtat etiā ꝙ nō ē dicere ꝙ perfecte mū/dificauit. i. qđ vltimo quo ad virtutē eūauit. Ex quo ergo vides ꝙ hec tria ſignificāt cōplementū eūationis quo ad humorē eūandū: ⁊ nō ē vt Dy. dicit ꝙ aliqua iſtaꝝ ſigni/ficat cōpletā eūationē reſpectu tollerātie virtutis: vt pm ⁊ 2m dicta: iaꝫ. ſ. mutatio egeſtionū ⁊ ſomnꝰ. Et ſoluꝫ 3m. ſ. ſitis ſignificat ꝯplemētuꝫ eūonis reſpectu humoris peccātis. Rō auteꝫ Dy. facile ſoluit lꝫ ſit equalr ꝯtra ipm. Ar/guit eiꝫ ſic: Somnꝰ poteſt accidere in prin° eūonis ꝓpter vapores eleuatos ab humoribꝰ agitatis: ergo non ſignifi/cat ꝯplemētuꝫ eūonis. Dicit hoc accidēs eſſe raro. Dicit 2° ꝙ ītelligimꝰ ſomno accñte poſt notabileꝫ euacuationē. Tunc eniꝫ ſi mali ſint humores q: iā ſunt multuꝫ agitati fumi eoꝝ q̄ꝫplurimuꝫ īpedirēt ſomnuꝫ: aut nō ꝑmitterent ipꝫ eſſe multuꝫ ēt plurimuꝫ. Circa 3m cañ. de ſiti nota ꝙ eſt ſumptus ex affo. quarte particule. Quibuſcūqꝫ ex far/macis cum purgant ⁊c̄. Et ideo intelligitur eo modo quo Gal. eum affo. exponit. ¶ Scđo nota ꝙ poſt aſſumptōꝫ farmaci pōt accidere ſitis. Prio ex diſpōne ſtomaci: quia ſtomacꝰ ſit calidus ⁊ ſiccꝰ. Scđo pōt accidē ex qualitate farmaci: ꝙ ſit acutū factiuū ſitis: vt ſpēs ſalis ⁊ euforbiuꝫ ⁊ ſimiles medicine. Tertio pōt accidere ex qualitate hu/moris qui a farmaco trahit ad ſtomacū qui ſit acutus vt colera: aut ſalſus vt flegma ſalſuꝫ. Et ſitis accñs ab iſtis cāis nō eſt ſignū cōplete oꝑationis farmaci. Qñqꝫ accidit ſitis q: farmacū eūauit: ita ꝙ roridū humidū oris ſtoma/ci: ⁊ id qđ eēt loco roridi humidi eēt ꝯſumptū ⁊ eūatum: ⁊ iſta eſt que ſignificat euacuatiōis complemētuꝫ. Et ratio eſt q: medicina trahit tempore ſue oꝑationis humoreꝫ ad ſtomacū

Cauſa vltimi dicti iſtiꝰ primi canonis ē q: ex raſura ſignificat ꝙ eūatio iā ſuperfluit: ⁊ ꝙ inteſtina ꝑdunt ſuaꝫ tunicā ⁊ diſponunt ad diſinteriā: ſed per reꝫ nigrā fetidi odoris ſignificat cancer vlceroſus in īteſtinis iuxta illđ Gal. quarta affo. cōmēto illius affo. Diſinteria ſi a felle ī/groſſa. ⁊c̄. ⁊ Aui. xvj. ter/tij tractatu primo. c. ij. ⁊ iuxta hec. Et nota ꝙ egeſtiones nigre in principio morbi ante digōneꝫ ſemꝑ ſignificāt maluꝫ: ſed qñqꝫ poſt digōneꝫ māe morbi ſignificāt bonū: vt eſt ſentētia Gal. quarta affo. cōmēto illius affo. Egeſtiones nigre ⁊c̄.

De hoc ſigno meminit Gal. pria affo. affo. illo: Que cgerūtur.

Nota ꝙ ſitis ī farmaco qñqꝫ preuenit eūoneꝫ moderatam qñqꝫ ſuccedit quādo qꝫ ſequit eūonis exceſſuꝫ: vt vult Meſue. c. vj. quarte intentōis ſuoꝝ ſimpliciū. Nota ꝙ Gal. in cōmēto ꝑallegati affo. tres dicit eē cās ſitis que preuenit ſufficiētē: quas Meſue. i. c. ꝑallegato diffuſe declarat: ⁊ dicit ibideꝫ

UVA. BHSC. IyR_006_1

ſtomacū ⁊ plurimū a capite ē cauſa deſcenſus partis ſub/ tilis roꝛide: vn̄ fere ex cuiuſlibʒ ſolutiui potu hoīes multū ſpuūt: talis aūt humiditas ꝓhibet ſitim. ſʒ qn̄ medicamē plene euāt in opere ſuo ſtomacū: ⁊ ab iſtis humoꝛibꝰ rema net depauperatū ſignificat ꝙ coꝛpus ē mūdificatū: ita ꝙ ab ipo nō ſunt āplius humoꝛes trahēdi ad ſtomacū. ⁊ hoc ē in pluribꝰ vex: nō obſtante ꝙ in quibuſdā caſibꝰ acci/ dat oppoſitū. Et hec ē Aui. ſnīa hic ad quā verificandam dicat̄ ꝙ ſicut ſitis que fit ꝓpter humoꝛē calidū aut ſalſuʒ remouet̄ humoꝛe illo euāto: ⁊ ſic poſt euātionē niſi eēt cā derelicta ex tali humoꝛe raro remanet ſitis. ita accidit de farmaco. ⁊ iſto mō pʒ verificatio cān̄. ¶ Circa iſtos cān̄. dubitat̄ quō per iſtas ſignificatiōes medicꝰ in ope ſuo co gnoſcere pōt ſufficiētiā euātionis. Nā aut deducit coꝛpꝰ ad has diſpōnes aut nō. ſi nō deducit: ergo ꝑ illas nō co/ gnoſcit ſufficiētiā euātionis. ſi deducit ad eas cuʒ iſte non appareāt niſi quādo ſupfluit euātio: ergo medicꝰ facit ſu/ ꝑfluere euātōʒ: ⁊ per ꝯ̄ns errauit: qꝛ nō ē ſupflue euandū.

¶ Ad hoc dubiū rn̄det̄ cōiter ꝙ iſte diſpōnes. ſ. mutatio egeſtiōis ⁊ ſomnꝰ ⁊ ſitis: ſi ꝑſeuerāt poſt euātionē ſignifi/ cant ſupfluitatē ſimplr. Si aūt incipiāt ⁊ nō ꝑſeuerant ⁊ ſignificāt ſupfluitatē illa ē talis ſm quid: ⁊ vt nūc que fa/ ciliter remouet̄. Et iō dicit̄ ꝙ lʒ ducere vſqʒ ad manifeſta pꝛincipia taliū diſpōnuʒ. nō lʒ aūt ducere vſqʒ ad ꝑſeue/ rantiā: imo ſi in cāu aliquo ꝑſeueret ꝑcipit̄ ꝙ dʒ reſtringi vt infra habebit̄. Nec valet argumētū: aliqd̄ nocumētuʒ ē i tali purgatōe: ergo ē mala vel icōuenient̄ admiſtrat̄: qꝛ id nociuū nō ē notabile ⁊ iuuamētū eſt plurimū. Id tn̄ qd̄ Aui. dicit de ſiti ꝙ maximā bonitatē purgatiōis ſignifi/ cat nō intelligit̄ tāquā ſuꝑlatiuū: ſed vt dicit bonitatē no tabilē valde. Et hec eſt cōis dubij ſolō. Si quis tn̄ diceret ꝙ ſomnꝰ multꝰ nō accidit ꝑꝑ ſupfluentē euātiōeʒ: imo ad ſufficiētē ⁊ nō ſupfluētē: ſequitur ſimilr ꝙ vt plurimū de ſiti non videt̄ quō impꝛobet̄: nec valet ꝙ ſi euātur aliquid benignū ꝙ pꝛopter hoc ſupfluat. In oī enim euātione ali quid benignū euātur ⁊c̄.

Ut cicue ꝙ hūoꝛes flegmatici pigues vi ſcoſi nō educūt ex ſe ſitim. Sʒ ſi ſitis ſup/ ueniat poſt hoꝝ pur gationē ſignificat cō plemētuʒ bone pur/ gatiōis. Sʒ ſitis ſuc cedens exceſſui pur/ gatiōis nō eſt bonuʒ ſignū nec ē illa vſqʒ ad quā ꝑcipit Hyp. Et ſitis d̄ qua Hyp. ⁊ Auic. intēdunt di/ cit Meſue ꝙ nō eſt ꝯpeſcenda potu ſed potius ſōno. Siti au teʒ pꝛeuenīeti ꝯpletā purgationeʒ cōuenit blandiri cum aliquo humido retēto i oꝛe donec medicina cō/ pleuerit ſuaʒ opera/ tionem.

Scito etiā ꝙ medicina vētris ſolutiua expellit illud qd̄ euacuat cū virtute attractiua q̄ attrahit hūc eūdē hu moꝛē: ⁊ foꝛtaſſe attrahit groſſum ⁊ reliquit ſubtilē quē/ admoduʒ facit illa que melācoliā expellit.

¶ Iſta ē ſcd̄a pars pꝛicipalis huiꝰ capl̄i i qua Aui. docet modū quo euāt medicina vētris ſolutiua ⁊ vomitiua. Et diuidit̄ in duas ꝑtes. Nā pꝛimo facit qd̄ dictuʒ ē. Scd̄o ponit vnū cān̄. non ꝓpꝛie de hac mā: ſed de aliquo modo euātionis. 2ª i fine capl̄i: ⁊ debes ſcire. Pꝛīa diuidit̄ i du as partes. Nā i pꝛio docet que virtꝰ ſit in medicina per quā euāntur hūoꝛes. Scd̄o docet a qua virtute pꝛopꝛie euānt̄. 2ª ibi: ⁊ debes ſcire ꝙ humoꝝ. Pꝛima i duas. pº facit qd̄ dictū ē. 2º ponit ⁊ remouet quoſdā errroꝛes cir/ ca hāc māʒ. 2ª ibi: illiꝰ ꝑterea. In pª ꝑte dicit ꝙ medicina expellit illd̄ qd̄ euāt cū virtute attractiua q̄ attrahit hunc eūdeʒ hūoꝛē a ꝓpꝛietate. ⁊ ꝙ hēat a ꝓpꝛietate aliquē dter minatū humoꝛē euāre ꝓbat: qꝛ medicīa foꝛtaſſe. i. qn̄qʒ at trahit hūoꝛē groſſuʒ ⁊ relinqt ſubtilē ſicut facit medicīa q̄ euāt melācoliā: ſʒ hoc nō poſſet facē niſi ꝑ virtutē q̄ a ꝓ/ pꝛietate illū attrahēt: ergo ſeqt̄ ꝙ hēat virtutē a ꝓpꝛieta/ te attrahēdi talē hūoꝛē. ¶ Circa iſtā ꝑtē nota ꝙ medicīa ſolutiua euāt hūoꝛē ꝑ accn̄s. Nā vt patebit paulo poſt me dicīna trahit humoꝛē aut ad ſtomacū aut ad iteſtina: ⁊ qn̄ hūoꝛ fuerit ibi: qꝛ nocet mēbꝛis: iſurgit virtꝰ expulſiua nā/ lis mēbꝛi ⁊ expellit hūoꝛē. Ex quo pʒ ꝙ medicīa i euando ꝑ accn̄s talē hūoꝛē: nō vtit̄ alia virtute niſi virtute attra/ ctiua. Et iō Aui. dicit ꝙ expellit cuʒ virtute attractiua: qꝛ virtꝰ ſua attractiua ē cā per accn̄s expulſiōis illiꝰ hūoꝛis. Et iō poſito ꝙ attractio fieret ſoluʒ rōne ſimilitudis ⁊ ex/ pulſio ꝑ diſſimilitudinē nō oʒ humoꝛē q a medicīa attra/ hit̄ eē ſil̄eʒ ⁊ diſſil̄eʒ medicīe: qꝛ illa diſſimilitudo ē ad illd̄ qd̄ ꝑ ſe expellit: puta ad mēbꝛū. Modus ergo opatōis me dicine ſolutiue ē ꝙ ipſa attrahit hūoꝛē ad locū vbi ipa ē: ⁊ cū humoꝛ ē ibi expellit̄ a virtute. ¶ Scd̄o pꝛicipalr no. ꝙ attractio q̄dā fit a vacuo: q̄dā a calido: q̄dā a virtute ꝑ ꝓ/ pꝛietatē vt dictū ē doctrīa 6ª pꝛimi cān̄. Et attractio a ca lido vel a vacuo ſemꝑ ē illiꝰ qd̄ faciliꝰ eſt attrahibile: ⁊ ta/ le alijs paribꝰ eſt id qd̄ eſt ſubtiliꝰ. Attractio aūt q̄ fit a vir tute eſt illiꝰ qd̄ virtuti ē pꝛopoꝛtionatuʒ ſiue ſit groſſuʒ ſi ue ſubtile. Ut ergo Aui. on̄deret ꝙ medicīa attrahit ꝑ ꝓ/ pꝛietateʒ: dixit ꝙ qn̄qʒ attrahit groſſuʒ ⁊ reliquit ſubtile: qd̄ non fieret alioꝝ ſtante paritate, niſi a ꝓpꝛietate trahe/ ret. Sʒ ſi dixiſſet ꝙ attrahit ſubtile ⁊ reliquit groſſuʒ vt etiaʒ ſepe cōtingit non potuiſſet per hoc itentuʒ ſuum ꝓ/ bare. Dixit aūt foꝛtaſſe: qꝛ non oīs medicina attrahit hu/ moꝛē groſſuʒ ⁊ relinqt ſubtilē. Nā multe ſunt q̄ reſpiciūt plures humoꝛes vt agaricus. Alique tn̄ ſūt q̄ attrahūt hu moꝛeʒ groſſuʒ ⁊ non ſubtilē: vt coloquītida ⁊ alie ſimiles. Et hec ſufficiant ad ꝓbanduʒ intentum.

Tangit hoc etiaʒ Meſue in ſcd̄o. c. i/ tentionis pꝛime ſuo/ ruʒ ſimpliciū cuʒ di/ cit: Medicina laxa/ tiua ꝑueniens ad ſto macum ⁊c̄.

Illius pꝛeterea verbū qui dicit ꝙ ipſa generat illud qd̄ attrahit: aut ꝙ in pꝛimis attrahit id qd̄ eſt ſubtile nō eſt aliquid. Et Gal. quideʒ hoc ſentiat: penitus tn̄ dicit ꝙ medicina vētris ſolutiua in qua nō ē venenoſitas cū ventrē nō ſoluerit ⁊ digeret̄ generabit humoꝛē queʒ at trahere ſolebat: ſʒ huiuſmodi dicta nō ſunt cōueniētia.

¶ Hic ponit cān̄. ⁊ remouet quoſdam erroꝛes circa hāc māʒ: ⁊ pꝛio duo ſimul: 2º vnū. 2ª ibi: ⁊ mā qdē. ¶ In pª ꝑte dicit ꝙ vbū illiꝰ q dicit ꝙ medicīa gnāt illd̄ qd̄ attra hit aut qd̄ ipa ſemꝑ attrahit pꝛiꝰ illd̄ qd̄ ē ſubtile nō ē ali/ quid: ſupple nō verum. ¶ Dicit 2º quoad hāc partem ꝙ licet. G. hoc ſentiat: tn̄ penitꝰ ⁊ vltimate dicit ꝙ medici/ na ſolutiua in qua ē vētoſitas cū nō ſoluit vētrē genera/ rabit humoꝛē quē attrahere ſolebat. ¶ Dicit 3º ꝙ hec di/ cta nō ſunt cōueniētia. ¶ Circa pꝛimū dictū cōſidera ꝙ quidam fuerūt qui dicebant ꝙ medicina que ſoluit ven/ trē generat humoꝛē quē attrahit. Alij autē dixerūt ꝙ iſte virtutes attractiue a ꝓpꝛietate nō dant̄ imo qd̄ fit attra/ ctio a vacuo aut a calido: ⁊ qꝛ vacuū ⁊ calidū nō faciūt at/ trahi niſi pꝛimo id qd̄ eſt ſubtile: iō iſti dicebāt ꝙ trahit pº ſemꝑ id qd̄ ē ſubtile medicīa ſoluēs. Dicit ergo Auic. ꝙ iſtoꝝ opīo quoad āhas ꝑtes ē falſa. ¶ 2m aūt dictū pōt multiplr intelligi. Unus modus ꝙ licet Gal. ſentiat hoc ſ. ꝙ iſtarū opinio ē falſa: tamē ipſe dicit ꝙ medicina ſolu tiua vētris cū nō euāt ⁊ i ea nō ē venenoſitas: gnāt humo rē quē ſolebat attrahere. Et iō lʒ nō ex toto cōcedat iſtoꝛū opinionē quoad pꝛimū: tn̄ appꝛopinquat quodāmō cōce/ dēdo ꝙ aliquo mō medicina gnāt humoꝛē queʒ attrahere ſolebat. Et poſſʒ intelligi ꝙ Gal. lʒ ſentiat hoc. ſ. ꝙ me/ dicina gnāt hūoꝛē quē euāt: tamē non ſentit hoc gnālr vt iſti dixerūt: ſʒ cū ꝯditiōibꝰ puta qn̄ nō euāt ⁊ cū hoc nō ē cū ea venenoſitas. ¶ Tertiū aūt dictū pōt itelligi duobꝰ modis. Unꝰ ē ꝙ hec dicta Gal. ſunt falſa ita ꝙ qn̄ dicit nō ſunt cōueniētia itelligat̄ ꝙ nō ſint vera. 2º pōt itelli/ gi ꝙ nō ſunt cōueniētia cū opiniōe ſtatim dicta. nā diffe rūt in multis vt pʒ in expoſitione. Et vt iſta dicta ſint ma gis clara dubitat̄. ⁊c̄.

Nota ꝙ Aſclepiades ⁊ Heraſiſtratꝰ medici fa/ moſi tpe Gal. affirmaue/ rūt medicinas attractiuas humoꝝ cōuertere humo/ reʒ quecūqʒ attingūt in ꝓ/ pꝛiaʒ ſpēm humoꝛis illiꝰ cuius dicunt̄ euātiue: vt re fert Gal. in libꝛo medici/ naꝝ. c. ij. Nota ēt ꝙ qdaʒ inſequēs doctrinā Hera/ ſiſtrati publice diſputans cuʒ Gal. dixit vnāquāqʒ ſpēm hūoꝛis trahi a qua/ cūqʒ medicina ⁊ ſimpli/ citer vnāquāqʒ ipſarū at/ trahere ſicut ſanguiſuge: vt ideʒ Gal. dicit in codē libꝛo. c. v. ⁊ multa alia de his refert in iſto libꝛo ca/ pitulis plurimis.

Utrū medicina ſolutiua vel vomitiua cōuertatur ad hūoꝛē quē hʒ euāre?

Negatiue arguit̄ ſic. Medicina plurimū differt i cōplōne ab hūoꝛe quē hʒ attrahere: ergo nō dʒ in ipm cōuerti. tenet cōſequētia qꝛ cōuertit̄ in illū i quē faciliꝰ trāſmutat̄: ſʒ faciliꝰ trāſmuta tur i illū a quo minime differt in cōplōne. Aſſumptū patet qꝛ viole ⁊ mucilago pſilij ⁊ pꝛuna ⁊ roſe ⁊ mirabolani citri ni ⁊ huiuſmōi medicine frigide attrahūt colerā calidam ⁊ mezereon ⁊ eufoꝛbiū ⁊ ſerapinū ⁊ oppoponacū ⁊ ſarcocol/ la ⁊ turbit ⁊ coloquintida ⁊ cucumer aſininꝰ ⁊ plurime ta/ les que calidiſſime ſunt attrahūt flegma ⁊ humoꝛes frigi/ dos. ¶ 2º ſic: ſi ita eēt hoc maxie eēt qꝛ medicina ſolutiua hʒ ſimilitudinē cū hūoꝛe quē attrahit ⁊ ꝓpter hoc faciliꝰ in illū ē trāſmutabilis. ¶ Sed cōtra. Pꝛopꝛietas medi/ cine per quā attrahit nō ſequit̄ ſil̄itudinē ſubſtātificā vel cōplōnalē: ſʒ medicina nō attrahit niſi ꝓpter talē ꝓpꝛie/ tatē ergo ⁊c̄. Minoꝛ ē Aui. ⁊ ꝑcipue Meſue i ſuo de cōſo/ latione. Et maioꝛ ꝓbatur. Pꝛimo ꝙ non ſequit̄ ſimilitu/ dinē cōplōnalē: pʒ qꝛ medicine cōplōnaliter calide trahūt hūoꝛes frigidos ⁊ frigide calidos. Secundo ꝙ nō ſequit̄ ſimilitudineʒ in ſubſtātia qꝛ plurime ſunt res ſimiles ma/ gis q̄ʒ talis medicina ⁊ datꝰ hūoꝛ qui trahit̄: i quibꝰ tamē hec ꝓpꝛietas attrahēdi nō inuenit̄: qꝛ vna ſpēs nō attra/ hit aliā vt ſilueſtris domeſticā nec calibs ferrū ⁊ argētum viuū aliquod metallū nec ſanguis chilū nec chilus cibuʒ.

¶ Tertio ſic. Si ꝓpꝛietas iſta eēt ꝓpter ſil̄itudinē i ſub/ ſtantia cuʒ iſta nō ſit idētitas ſubſtātifica vt Gal. vult 3º de ſimplici. ſequit̄ ꝙ erit quedā ꝓpinquitas ꝓpter quā vnū ē paratū imediate ad aliud aut ſaltē faciliter cōuerti: cū alia nō videat̄ rō ſimilitudinis i ſubſtātia: ſed plurima ſunt quoꝛū vnuʒ eſt aptū imediate ad aliud cōuerti inter que nō currit hec ꝓpꝛietas ⁊ ecōtra. Inter multa currit quoꝛū vnū nō eſt aptū imediate ad aliud cōuerti: ergo nō ꝓpter ſil̄itudinē i ſubſtātia ē inter medicinā attrahēteʒ ⁊ hūoꝛē attractū hec ꝓpꝛietas. Et minoꝛ pʒ qꝛ charabe nō pōt per aliquā nālē virtutē ꝯuerti i paleā imediate: ⁊ ada/ mas nō pōt imediate i ferrū cōuerti nec ecōtra: iter quos tn̄ currit ꝓpꝛietas attrahēdi. Patet ēt quo ad aliā partē ꝑ dicta i ꝑcedēti rōne. ¶ Quarto ſic. Si ēēt hec virtꝰ at/ tractiua ꝑ ſil̄itudinē i ſubſtantia cū equalis ſit ſil̄itudo in ſubſtātia: poſtquaʒ medicine a noſtro caloꝛe ſunt actuate ſicut antequā ſint actuate: ſequit̄ ꝙ anquā actuent̄ a no/ ſtro caloꝛe haberēt hanc virtutē attrahēdi. hoc aūt ē ma nifeſte falſuʒ in multis medicinis: ergo falſuʒ ē ꝙ hec ꝓ/ pꝛietas ſit ꝑꝑ ſimilitudinē i ſubſtantia. ¶ Ad partē affir/ matiuā ē Gal. 3º de ſimplici diſtinctiōe 4ª. c. 4º cū dixit: Et illud ē qm̄ iter vnā quāqʒ medicinarū ſolutiuarū ⁊ hu moꝛē ꝓculdubio ē aſſimilatio ſʒ nō ſequit̄ eā neceſſario vt ſit ei aliquid cōmixtum de virtute interficiēte: ⁊ ꝑꝑ illud ſit ꝙ nō ē cōſequēs ei vt noceat ꝓculdubio qn̄ nō ſoluit: imo digerit̄ ⁊ generat̄ ex ea ille humoꝛ de ꝓpꝛietate cuiꝰ ē vt attrahat eū. Hec Gal. ¶ In ſoluēdo iſtā qōnē pꝛio ponā ſolutionē Cōciliatoꝛis ⁊ Dy. que videt̄ cōfoꝛmis di ctis. G. 2º ponaʒ illud qd̄ ego puto fuiſſe de mente. G.

UVA. BHSC. IyR_006_1

3° illud qđ puto voluiſſe Aui. ¶ Quātū ad primū ſuppono ꝙ oīs res ī qua eſt virtꝰ attractiua alicuiꝰ loquēdo de attractione a virtute ⁊ nō de illa que fit a vacuo aut caliditate ē ꝑꝑ aliquā cōueniētiā ⁊ ſilitutē eius attractiuam. Hec ſuppō ē primo Gal. 3° virtutū nāliuȝ. c. 6° cū dixit: Nullū enīȝ entiū attrahit ꝑꝑ ipm attrahere ſed vt voluptuetꝫ ex eo cuius ꝑꝑ attractionē copiā hȝ. Cōſtat etiā ꝙ nō voluptuatꝫ ꝓprie ſicut ſenſitiuū aut īproprie ſicut non ſenſitiuū nec ex aliquo niſi ꝑꝑ cōueniētiā: ergo oīs attractio ē cum cōueniētia. ¶ Scđo ꝓbatꝫ idē rōne ſupponēdo ꝙ entia nālia agūt ꝓpter finē. Supponēdo 2° ꝙ appetūt permanere. Supponēdo 3° ꝙ res conſeruās facit illđ ꝑ quādā cōueniētiā cum ſeruato. Ex quibꝰ ſequitꝫ ꝙ attrahēs aliquid mere nāliter trahit ꝑꝑ finē intētū a nā trahēte ⁊ nō intēdit niſi ꝑꝑ bene eē ⁊ ꝯſeruationeȝ ſui: ⁊ non cōſeruatꝫ niſi ꝑ id qđ ē aliquo mō cōueniēs: ergo in attractione attrahitꝫ aliquo mō hñs cōueniētiā. ¶ Tertio ꝓbatur q: mēbra attrahūt nutrimētū ꝓpriū aut cōe aut ſuꝑfluitates ꝓpter aliquā cōueniētiā quā hñt ad illa vel ad illā. Silr magnes attrahit ferꝝ: ⁊ īter magnetē ⁊ ferꝝ eſt multa ꝯuenientia ī modo ſubſtātie ⁊ alijs: nam non trahit niſi ferꝝ: ergo pariter erit ī oī alia attractōe. ¶ Quarto ad res īconueniētes declinatꝫ virtꝰ ad eas expellēdas: ergo ille ad quas attrahēdas īclinatꝫ ſunt aliquo mō conuenientes. ¶ Scđa ſuppoſitio: nō oȝ ſimilitudinē īter attrahēs ⁊ attractū eſſe ſimilitudinē ꝯplōnaleȝ. Hoc pȝ q: plurime medicīe homogenee ſunt attractiue ⁊ ꝯplōnis calide ⁊ ſicce: cuȝ tñ humores q ꝑ illas attrahuntꝫ ſunt fridi: vñ colloquītida ⁊ euforbiū ⁊ multa talia q̄ ſunt calida ⁊ ſicca ⁊ homogenea trahūt flegma. ¶ Tertia ſuppoſitio: ſimilitudo ⁊ ꝯuenientia īter attrahēs ⁊ attractuȝ oȝ ꝙ ſit ſimilitudo ſm ſubſtātiā. Probatꝫ ſic: q: oīs ſimilitudo aut eſt ſȝ ſubſtantiā aut ſm q̄litateȝ: ſȝ ſimilitudo īter medicinā attrahentē ⁊ humorē attractū: ⁊ ſilr de alijs non oȝ ꝙ ſit ſȝ q̄litatē: tunc eīȝ maxīe eſſet ſm ꝯplōneȝ: ergo dȝ eſſe ſȝ ſubſtātiā. Eſt ēt vnica rō ſimilitudīs īter attrahēs ⁊ attractū ſicut eſt vnica rō attractōis. Et iſta ſuppō ē de mēte Gal. 3° de ſimplici diſtictione 4ª. c. iiij. cum dixit: Uerꝝ poſtq̄ȝ nos oñdimus ꝙ ſpēs attractionū non ſunt niſi ꝑꝑ ſimilitudineȝ ſubſtātiaꝝ ad ſubſtātias. ¶ Quarta ſuppō: faciliꝰ trāſmutatꝫ res in ſimileȝ q̄ȝ diſſimilē. Pȝ q: ꝯuerſio ī genere ꝓportionali eſt facilior ⁊c̄. ¶ Quita ſuppō: medicis attrahentibꝰ humores qñq̄ȝ ſunt permixte ꝑtes venenoſe ꝯrie nāe hūane: vt pȝ in ere ⁊ multis talibꝰ: qñq̄ȝ ñ ſunt ꝑmixte: vt pȝ ī cartamo ⁊ roſis ⁊ violis ⁊ prunis ⁊ multis ſimilibus. ¶ His habitis rñdeo ꝑ ꝯcluſiones Cōciliatoris ⁊ Dy. qui ipm ſequi voluit. ¶ Cōclō ergo rñſiua Cōciliatoris ē iſta: Medicina ſolutiua nō venenoſa q̄ ſumitꝫ ⁊ non ſoluit: pōt ꝯuerti in humorē queȝ hȝ a ꝓprietate attrahē. Iſtā ꝓbat multis rōnibus 42ª differētia. Et p° q: conuenit cū humore in mā ⁊ differt in forma: ſȝ oīa q̄ in genere eodē ꝯueniūt ⁊ diuerſa ſunt ī ſpecie trāſmutantꝫ adiuiceȝ ꝓrio de gnātione: ergo medicina pōt in humoreȝ trāſmutari quē attrahit. Scđo q: ī medicīa ē mixtio elemētoruȝ poſſibiliū expoliari q̄litatibꝰ ꝯriātibꝰ hūori. 3° q: medicīa ē ſimilis humori tali: ⁊ ꝑ ꝯſequēs faciliꝰ ī illum q̄ȝ ī alium trāſmutatꝫ. Cōfirmatꝫ: q: hñtia ſimilitudinē in q̄litate pñt adiuiceȝ trāſmutari: ergo multo magis hñtia in ſubſtātia ſimilitudinē. Idē ꝯfirmatꝫ q: mēbruȝ ꝯfortat ſibi ſilē maxime vt ꝓbatꝫ ꝑ multa expta: ⁊ ꝑ ꝯſequens faciliꝰ trāſit in illiꝰ nāȝ ⁊ nō niſi ꝑ ſimilitudinē: ergo a pari medicīa trāſmutabilis ē in humorē quē trahit. Dynus aūt dixit duas cōclōnes. ¶ Prīa ꝙ medicina ſolutiua pōt ꝯuerti ī humiditatē corporis humani. ꝓbatꝫ q: venenū pōt in taleȝ humiditatem ꝯuerti ⁊ nutrire. ſȝ ꝯſtat ꝙ minꝰ hoc repugnat medicīe ergo ⁊c̄. Scđo ſic: medicīa aliqua pōt eē ī potētia paſſiua ſilis hūiditati nr̄i corꝑis: ⁊ hūor nr̄i corꝑis ē ī potētia actiua ⁊ pōt eē horū ꝯueniēs applicatio: ergo pōt eē medicīe ī taleȝ hūiditatē ꝯuerſio. Cōſequētia clara q: alia nō reqruntꝫ ad actionē: ⁊ pȝ aſſūpti poſſibilitas ſuppoſito ꝙ medicina nō ſit venenoſa. nā ꝓpter venenoſitatē tolleratꝫ ꝓportionalitas patiēdi cōuerſionē ad humorē. ⁊ ſi caret venenoſitate ſequitꝫ ꝙ ē ꝓportionata ad cōuerſionē ī humiditatē corporuȝ noſtroꝝ. ex hoc eīm oñditꝫ ꝙ ibi non ē cōtrarietas. ¶ Scđa cōditio ꝙ accipitꝫ in parua q̄ȝtitate: ex hoc enim fit ipa paucuȝ reſiſtēs. ¶ Tertia cōditio ꝙ calor noſter ſit fortis: tūc erūt oīa dicta. ſ. medicina in potētia paſſiua ſilis hūiditati corporis: ⁊ calor noſter ī potentia actiua: ⁊ magis erit ſi ſumatꝫ ſuꝑ fortē famē ⁊ magnā īdigētiaȝ nutrimēti. ¶ Scđa cōclō Dy. ē talis: medicina ꝓportionalr cōuertitꝫ ad humorē quē trahit q̄ȝ ad alium. Iſta ꝓbatꝫ q: ī hñtibꝰ ſimbolū facilior ē tranſitꝰ. Sȝ medicina hȝ maiorem cōueniētiā in ſubſtātia vt dicit ſuppō tertia: ergo dȝ magis ⁊ facilius ī ipȝ cōuerti. ¶ Ego aūt puto Gal. voluiſſe ſuppōnes dictas: ī quibꝰ tñ nota prio ꝙ nō dȝ eē de mēte Gal. ꝙ talis medicina ſit cōueniens cū hūore in ſubſtātia attrahēdo: īmo aliqua ē cuius pars ē parua hoc mō in ſubſtātia ꝯueniēs: ⁊ aliqua cuiꝰ maior: ⁊ hoc pȝ in principio quarti capituli ſepe allegati 3° đ ſimplici diſtinctiōe 4ª cū dicit: Et ſicut nos oñdimꝰ ī ſuas aū

Gal. tertio de ſimplici medicina videtꝫ inuere ꝙ inter medicinā attrahentē humorē ⁊ humorē attractuȝ ſit duplex ſimilitudo ſeu ꝯueniētia. Una formalis quia medicina eſt apta

ꝙ nullus eoꝝ ē ſm plurimū cui nō admiſtratꝫ qualitas extranea: īmo ī arbore viridi ⁊ in fructu ē res ꝑmixta eorum ſucco: cuiꝰ genꝰ ē preter genꝰ ſuccoꝝ. Similr oȝ vt eſtimes ꝙ in medicinis ſunt ſubſtātie multe iunctoꝝ geneꝝ. hec Gal. Ex quo pȝ ꝙ nō itēdit ꝙ ſm totū ſimiliatꝫ humori: tūc enīȝ tota eēt vniꝰ generis ⁊ nō eſt. pȝ paulo poſt vbi poſtquā iā dictū ē ꝙ cartamus ⁊ ſemen vrtice ambo purgant flegma ipē dicit ꝙ inter iſta res parua eſt in qua eſt ſimilitudo in ſubſtātia: dixit eīȝ ita: ⁊ tu ſtabis ſuꝑ illud ⁊ ſcies illud per hoc vt ꝑcogites ⁊ ſemē vrtice qđ ipm nō diuerſificatꝫ a cartamo niſi ꝙ in ipō eſt plus de caliditate q̄ȝ in cartamo: ⁊ illud ē qm̄ illud qđ ē inter vtrūq̄ȝ de ſimilitudine ī ſubſtātia ē res parua. Si ergo ſemen vrtice ſȝ ſuam partē ſimilatꝫ cartamo ⁊ ſimilatꝫ ſibi ſm partē ſȝ quā ē ſilē flegmati: ⁊ ſic pȝ varietas notati. ¶ Tūc ergo ſȝ Gal. pono iſtas cōcluſiones. Medicina ſolutiua cū nō ē venenoſa poſſibile ē ꝙ non ſit ibi impediēs vt cōuertatꝫ in ſubſtantiā corꝑis: ergo poſſibile ē vt ſm partē cōuertatꝫ ī ſubſtātiam corporis nutriēdo. Probatꝫ ēt ꝙ ꝯuertatꝫ ī humorē: q: in tali medicina ē pars ſȝ ſubſtantiā ſimilis humori attrahēdo: ⁊ cū nō ē venenoſa poſſibile ē qđ nō ſit ibi impediēs a cōuerſione eius ī ſubſtātiā corꝑis: ergo poſſibile ē ꝙ ipſa ſit apta ꝯuerti ī hūores corꝑis abſq̄ȝ cōiunctōe impedimēti: ⁊ calor noſter ē cōuerſiuus eius: ergo poſſibile erit vt cōuertatꝫ. Pȝ cōſequētia q: ſunt poſſibiles ābe cāe: ex īpoſſibilitatē cauſaꝝ ſeqtꝫ effectꝰ poſſibilitas. ¶ Secūda cōclō: ſm ꝑtē ſm quā medicina principalr hȝ virtutē attractiuā magis ē cōuerſibilis medicina ⁊ faciliꝰ ī humorē quē hȝ attrahere q̄ȝ in aliū. ꝓbatꝫ q: ſm illā partem hȝ ad illū hūorē ſimilitudinē in ſubſtātia. ¶ Tertia concluſio. Cōtingēs ē medicinā ſolutiuā ſm maiorē eiꝰ partē eē cōuertibilē in humorē quē nō hȝ attrahere. ꝓbatꝫ quia ſtat ꝙ ſm cōplōnē ſit ſm plures partes magis ſimilis humori quē nō hȝ attrahere q̄ȝ illi quē hȝ attrahere vt viole ſm plures ꝑtes ſint ſilēs flegmati q̄ȝ colere ⁊ pruna ſilr ⁊ ſic de multis talibus. ⁊ hanc puto fuiſſe mentem Gal. Sȝ vt ītelligatꝫ difficultas opiniōis Gal. ⁊ illoꝝ quoruȝ opinionē Aui. ꝑnarrauit: notādum ꝙ Epicurꝰ ⁊ Aſclepiades nō poſuerūt has ꝓprietates alteratiuas ⁊ permutatiuas. nam ipi dixerūt elemēta īmutabilia ⁊ īcorruptibilia ⁊ attomalia ad modū đmocriti. Et iō Epicurꝰ cū videret attractōȝ fieri nō negauit id qđ ſēſu appꝫet: ſȝ voluit ꝙ q̄dā attomalia pricipia adunita ⁊ tortuoſa exeūt a corꝑe attrahēte ⁊ occurrūt corꝑi ꝙ attrahitꝫ ⁊ nō potētia penetraret redeūt ⁊ reſiliūt: ſȝ q: colligatꝫ ꝓpter ſuas figuras cū alijs actionibꝰ rei attracte ipm trahunt: ⁊ faciliꝰ trahunt ſubtile q̄ȝ groſſuȝ: ⁊ oīs medicīa attractiua ſm ipm eſt cuiuſlibet humoris tractiua. Aſclepiades aūt vidēs paꝝ fundamentū ⁊ īprobabilitatē huius dicti lȝ ſequatꝫ Epicurū: in iſto ꝯdixit ⁊ dixit ꝙ medicina nō trahit humorē: ſȝ ex ipſa generatꝫ humor qui expellitꝫ. Et Gal. iſtas pōnes īprobauit longe ⁊ late p° virtutuȝ nālium ⁊ in libro elemētorum ſm Hyp. ⁊ 3° de ſimplici. Et non obſtāte ꝙ nō īprobauerit alias Aſclepiadis pōnes volentis humores q euātꝫ generari ſm apparentiaȝ ex medicina ſūpta: dicit tñ ipſe hic ꝙ ex medicīa cū non ē venenoſa ⁊ non ſoluit generatꝫ humor: de cuius ꝓprietate eſt vt attrahatꝫ ab ea. ⁊ hoc voluit Aui. dicē. ⁊ hoc ꝓ p°. ¶ Pro 2° aūt pricipali. ſ. de eo ꝙ ego puto Auic. voluiſſe: nota p° ꝙ lȝ omīs attractio naturalis ſit ꝓpter ꝯmoditatē attrahentis ꝑſertiȝ attrahēte mere nāliter diſpoſitōe: tñ non oȝ oē qđ attrahitꝫ ī nāli diſpōne attrahētis attrahi ꝓpter ſimilitudinē iter ea. Prīa pars pȝ q: attractio nālis eſt opus nāe ⁊ ꝑ ꝯſequēs ꝓpter finē ⁊ non niſi ꝓpter meliꝰ operāteȝ. 2ª pars ꝓbatꝫ q: cor attrahit in nāli diſpōne aerē fridum vt refrigeretꝫ ab illo: ſȝ non poſſet refrigerari niſi propter ꝯrietateȝ: igitꝫ attrahit illuȝ ꝓpter ꝯrietateȝ ⁊ ꝑ ꝯſequens non ꝓpter ſimilitudineȝ cū illo. Et ſilr in ſiti nāliter attrahit ſtomacus aquā vt alteretꝫ ad ꝯtrariū diſpōnis quā hȝ: ⁊ hoc fit ꝑ ꝯrietatē ⁊ non ꝑ ſimilitudinē: ⁊ in multis alijs diſpōnibus eſt ſilr.

¶ Nota 2° ꝙ res exiſtēs ī diſpōne ſibi ꝑternaturali appetit ꝯria ſibi: ⁊ ꝑ ꝯſequens attrahit ꝓpter ꝓprietatē ⁊ nō ꝓpter ſimilitudinē. Unde dicitꝫ 2° tegni ꝙ diſtemperātie ꝑternāles faciunt appetere ꝯria. ¶ Nota 3° ꝙ medicie ſolutiue plurime nō trahūt humorē niſi actuentꝫ ī corꝑe a calore vt notat expientia. Ex quo ſeqtꝫ ꝙ acqrunt ꝓprietatē a calore nr̄o a quo reducūtꝫ ad actū: ⁊ illā nō hñt añ talē alterationē. ¶ Nota 4° ꝙ alteratio quā facit calor nr̄ in medicina nō ē nālis diſpoſitio ⁊ conueniens tali medicine vtplurimuȝ. nā cū a nā fiant extra corpus ⁊ ſine diſpōne quā acqrūt: ſequeretꝫ ꝙ ſi talis diſpō eēt eis naturalis: nā fuiſſet deficiēs ī neceſſarijs ī illis medicis. Preterea multe medicine ſunt ſemina que tūc ſunt in nāliſſima diſpōne cū pñt gnāre ſimile ⁊c̄. Sed qñ in tali diſpōe ſunt nō ſunt actuate a noſtro calore: ergo ſūt ī nāliſſima diſpōne abſq̄ȝ illa actuatiōe ⁊ per illā nō acquirūt diſpōnem naturaleȝ. Ex his ſequitꝫ primo ꝙ nō oīs medicīa trahēs humorem trahit ꝑꝑ ſilitudinē ī ſubſtātia. nā ſi ita eſſet: hoc maxime eēt q: medicine ī nāliſſima diſpōne ſua exiſtētes traherent humorē: ⁊ q: qñ ſic trahunt oȝ attractionē fieri ſolū rōne

talis

nata trahere ⁊ hūor attrahi ꝑ ꝓprias vītutes inuētas ī eīs actu aut potētia. Alia materialis qua medicīe ineſt ex ꝯpōne ſuorū elemētorū vt ſit apta fieri humor queȝ ſolet attrahere qñ vincitur a calore īnato ⁊ ſpoliatꝫ ſua virtute attractiua. Prīa ſimilitudo eſt vt magnetis ad ferrū. Scđa vt cibi ad corpꝰ alēdū.

UVA. BHSC. IyR_006_1

ꝯMeſue in.c.j.de rectificatiōe medicinaꝝ ſimpliciū. dicit ꝙ medicia laxatiua attrahit humoꝛē virtute celeſti ſibi deſuper ipꝛeſſa regulante mixtione ipſius.

talis ſimilitudis:mō hoc nō ē veꝝ cū hoc nō ſit opoꝛtunū
oēm talē attractionē eē ꝓpter talē ſimilitudinē. Et qꝛ etiā
medicine nō trahūt hūoꝛē dū ipe ſunt ī nāli diſpōe modo
qn̄ ſunt in p̄ternāli ſtat ꝙ trahūt potiꝰ cōtrariū. Ex quo
ſequit̄ ꝙ nō opꝫ ꝙ medicina ſit ſimilis ī ſubſtātia humoꝛi
quē attrahit de ꝓꝑietate. Sequit̄ 2° ꝙ nō oꝫ ipm̄ faciliꝰ
eē cōuertibilē in humoꝛē illū q̄ꝫ in aliū:imo medicie plurimū
eūantes flegma ſunt calide ⁊ ſicce diſſimiles ī ꝯplōne
humoꝛi illi quē attrahūt ⁊ nō oꝫ ꝙ ſint ſimiles in ſubſtan
tia. Sequit̄ ꝙ faciliꝰ cōuertūtur ad hūoꝛeꝫ cōtrariū ſi in
humoꝛe cōuerti deberēt:vel vlteriꝰ ſuppoſito ꝙ medicia
traheret humoꝛē ꝓpter taleꝫ ſimilitudinē: tn̄ ex medicina
non generat̄ humoꝛ ab illo humoꝛe: ſꝫ a virtute mēbꝛoꝝ.
Et poſſibile ē mēbꝛoꝝ virtutē magis agere ad ꝯ̄rij humo/
ris generationē q̄ꝫ ad ſimilis vt colericū epar maxie ſi ſit
p̄ternāliter diſpoſituꝫ vt in cauſonizāte ꝯuertit̄ aqua ī co/
lerā quātomagis rem habentē ſimilitudinē cuꝫ flegmate
ī ſubſtātia. Sꝫ que ſit ꝯplexionalr calida ⁊ ſicca:varietas
eiꝫ generatoꝝ nō tātuꝫ ſequit̄ varietateꝫ materie ſed va/
rietateꝫ generātis. Et ideo illa data ſimilitudine:nō tn̄ ſe/
quit̄ ꝙ ex medicia generet̄ talis humoꝛ. Accidit etiā ꝙ ſi
ex medicia dꝫ generari humoꝛ:oꝫ pꝛīo ꝙ digerat̄ digōne
pꝛima qꝛ obiectū ꝯueniēs virtuti digeſtiue ꝑ quā hūoꝛes
generant̄ ē chilus ⁊ nō quelibꝫ alia res:⁊ iō pꝛīo oꝫ ipſam
cōuerti ī chilū. Modo cōſtat ꝙ res ꝓpoꝛtiōata vni hūoꝛi
īmo ipemet humoꝛ nō oꝫ ꝙ ſit aptus ꝯuerti ī chilū aptiſ/
ſimū ad generationē hūoꝛis ſibi ſil'is: vn̄ colera nō ē apta
digeſtioni in ſtomaco ita vt in chilū cōuertat̄:⁊ ſanguis q
ē humoꝛ benigniſſimꝰ ſi comedat̄ ſicut ē plurimū cū dige
rit̄ ē aptꝰ vt ex eo chilus malus generet̄ ⁊ ſic paꝝ ſangui/
nis. Ex quo pꝫ 2° illa ſilitudine cōceſſa Gal. non oꝫ tamē
ꝙ ex medicina talis humoꝛ generet̄. videmus ēt ꝙ qꝛ di/
gerere ⁊ ſanguificare ⁊ oīno humoꝛes gnāre ſunt ꝯꝑatio/
nes que fiūt ab agētibꝰ determinatis ⁊ per vias determi
natas ꝙ ēt oꝫ ꝙ fiat ex medicinis determinatis. Nō eiꝫ
quicquid ē nō venenū pōt nutrire hoīem. nā elemēta non
nutriūt vt dicit̄ pꝛima huiꝰ:⁊ ſilr̄ ſunt multa mixta nō ve
nenoſa que nō ſunt apta eē nutrimēta. Et ex hoc ēt capite
pꝫ ꝙ ſtat medicinā nō venenoſaꝫ tn̄ nō eē in ſubſtātiā ali/
cuius hūoꝛis a nr̄o caloꝛe trāſmutabilem. Per quinqꝫ er
go vias ſatis apte oñdit̄ ꝙ ſermo Gal. quo dicit̄ ꝙ medi/
cina ſolutiua nō venenoſa qn̄ nō ſoluit ꝯuertit̄ in humoꝛē
de cuiꝰ nā ē vt trahat illū nō eē neceſſariū. p̄a ē qꝛ in nāli
diſpōe qn̄qꝫ trahit̄ cōtrariū. 2a qꝛ in p̄ternāli diſpōne tra
hit̄ ꝯtrariū ⁊ plurimū medicina nō ē attractiua humoꝛis
niſi qn̄ ipa ē iā p̄ternaturalr̄ alterata. 3a via qꝛ humoꝛ nō
gnāt humoꝛē ex medicina:ſed illud qđ pōt in aliud tranſ/
mutare. 4a via ē qꝛ nō imediate pōt talē humoꝛē trāſmu
tare ſed p° in chilū. 5a ē ꝙ nō obſtante ſimilitudine dicta
in ſubſtātia tn̄ ſtat ꝙ ipa nō ſit receptiua a nr̄o caloꝛe trāſ
mutationis iſtius terminate qua fit cōuerſio in hūoꝛes: ⁊
ꝑ ꝯſequēs ꝙ nō genet̄ ex ea humoꝛ eſto ꝙ nō ſit veneno/
ſa. Et has vias puto fuiſſe in mēte Auic. ⁊ foꝛte alias pul/
chꝛioꝛes ꝑꝑ quas fuit ſibi viſum ꝙ ſermones Gal. in iſta
mā nō ſint veri. ¶ Ego aūt tantoꝝ viroꝝ diſcoꝛdias cuꝫ
difficultate poſſeꝫ ꝯcoꝛdare. Et iō quoad iſtud magis ad/
hereo poſitioni quā puto Aui. ꝙ nō ſit opoꝛtunū medici/
nā ſolutiuā qn̄ n̄ ē venenoſa ⁊ non ſoluit eē aptā ꝯuerti in
coꝛꝑe illo ad humoꝛē de cuiꝰ ꝓꝑietate ē vt trahat̄ ab illa
nec ꝭm totū nec ꝭm maioꝛē partē ꝭm quā pꝛīcipalr̄ ē attra
ctiua. Et videt̄ mihi ꝙ bonū ingeniū ex dictis argumen/
toꝛū Cōciliatoꝛis ⁊ Dy. ⁊ Gal. ſol'ones elicē pōt. Et hec
de iſta qōe ī qua ⁊ ſolutum ſit ad queſtionē ſequētis par/
tis:vtrū medicina trahat humoꝛē ꝓpter ſimilitudinē quā
habet cum illo in ſubſtātia ⁊c̄.

Pro ꝯpletioꝛi doctrina huius materie vide que dicūtur ab Auer. quīto colliget c.xxiiij. ⁊ etiā ſeptio phiſicoꝝ ꝯmēto.vij. vbi loquit̄ de attractione.

Et videt̄ quidē ꝙ Gal. ex hoc qđ certificat ſentiat ꝙ
inter attrahētem medicinā ⁊ humoꝛeꝫ attractuꝫ ſit con/
uenientia in ſubſtātia: ⁊ ꝓpter hoc attrahit ipſum. ſed
hoc nō eſt veruꝫ: quoniā ſi attractio fieret cuꝫ conueniē/
tia ferruꝫ attraheret ferrū cuꝫ ipſuꝫ ſuperaret:⁊ aurum
attraheret auruꝫ cuꝫ ipſuꝫ ſuperaret quātitate ſua:hoc
tamen certificare nō eſt medici.

¶ Hic remouet aliū erroꝛem dicēs ꝙ vī ꝙ Gal. ex hoc
qđ certificat.i.tāquā certificatū ⁊ pꝛobatū affirmat ſen/
tiat ꝙ īter medicinā attrahētē ⁊ humoꝛē attractū ſit ſimi
litudo ī ſubſtātia ⁊ ꝙ ꝑꝑ hanc ſimilitudinē ipm̄ attrahit.
Subdit 2° ꝙ hoc nō ē verū: quoniā ſi attractio fieret cuꝫ
cōuenietia in ſubſtātia.i.propter talem conueniētiaꝫ iam
ferrū attraheret ferruꝫ:⁊ aurum attraheret aurū qn̄ ſupe
raret ipſum in quātitate. Dicit 3° ꝙ certificare illud non
eſt medici:īmo ſupple ē philoſophi naturalis. Circa qđ no
ta ꝙ Dy. hic ⁊ Cōciliatoꝛ differētia 141a dicūt Aui. hic nō
velle impꝛobare dictū Gal. ſꝫ ſenſum quoꝛūdā male ītel/
ligentiū ſicut ī ſuꝑficie verba vident̄ ſonare. Nam dicit
Aui. ꝭm hoꝛuꝫ expōnē ꝙ videt̄ quibuſdā ſupple male in/
telligētibus Gal. ꝙ Gal. velit dicere ꝙ inter medicinaꝫ
attrahētē ⁊ humoꝛē attractū ſit ſimilitudo in ſubſtātia.i.
ꝙ ſint eiuſdem ſpēi:⁊ ꝙ ꝓpter hāc ſimilitudinē attractio
fiat. ſꝫ nō ē verū ꝙ Gal. hoc velit dicere ꝙ inter medici/
nā attrahētem ⁊ hūoꝛē attractū ſit ſimilitudo ī ſubſtantia
qꝛ hoc ē falſum. nā ad hoc ſequeret̄ ꝙ ferrū attraheret fer
rū:⁊ aurū attraheret aurū cū ipm̄ excederet in quātitate.
Gal. aūt dixit ꝙ hec ſimilitudo ī ſubſtātia ē cā attractio/
nis ⁊ nō idētitatis:⁊ iſti intelligebant đ idētitate. Mō iſta
multuꝫ differūt:⁊ ꝙ Gal. loquat̄ de ſimilitudīe ⁊ non de
idētitate pꝫ in 3° de ſimplici.c.4° ī fine dū dicit: Et ego n̄
dixi ꝙ oꝫ ꝙ ſit res flegmatica vt ipamet niſi qꝛ non dixi
iterū niſi qꝛ īter ea ē ſimilitudo non ꝙ vtraqꝫ ſit res vna ⁊
eadē:⁊ illud ē ꝙ ferrū nō attrahit ferruꝫ:neqꝫ caro attra/
hit carnē:ſꝫ lapis attrahit ferrū ⁊ caro attrahit ſanguinē:
⁊ inter hec ꝙ res ē ſimilis ei eſt ſeiūctio inquātū eſtimo ⁊
differētia qm̄ flegma ⁊ flegma ⁊ cartamus ⁊ cartamus eſt
vna ⁊ eadē res: ſꝫ cartamū ⁊ flegma ābo ſunt ſimilia non
res vna. hec Gal. Et per hoc videt̄ Dy. ꝙ ſi Aui. rep̄hē/
diſſet Gal. eo qđ ipe dicat attractionē eē ꝓpter idētitatē
ī ſubſtātia iponeret falſuꝫ. Et ſi ītelligit de ſimilitudīe: vt
dicit Gal. ⁊ non idētitate tūc ad dictū Gal. nō ſequit̄ ꝙ
ferrū attrahat ferrū. ⁊ iam Aui. male infert. Nō ergo ē ī/
tentio Aui. niſi de malo intellectu dictoꝝ Gal. Ego aūt
puto hic Aui. velle ipꝛobare Gal. ⁊ ītellexiſſe ipm̄ de ſimi
litudine. Sed vult Aui. qđ ſequit̄ ad dicta Gal. ꝙ idēti/
tas ē etiaꝫ cā attractiōis ſi ſimilitudo in ſubſtātia ē cauſa
attractionis ī his quoꝝ vnū nō ē aptū rem attractā cōuer
tere in ſubſtantiā ſuā hoc eſt vt foueat̄ ⁊ cōſeruet̄ a ſimili
attracto:ſꝫ multomagis cōſeruet̄ ab eodē ſpecie:qđ peni/
tus ē ſimile:ergo multo magis attrahere idē. ¶ Addit aūt
Aui. ꝙ ferrū attraheret ferrū qn̄ ē maioꝛis quātitatis: vt
dicit Gal. ꝙ duoꝛū ſimiliū illđ attrahit qđ ē potētiꝰ: mō
ferrū maius ē potētius:qꝛ in maioꝛi quāto ē maioꝛ virtꝰ.
Et qꝛ hoc ēt apđ Gal. ē falſuꝫ viſuꝫ ē Aui. ꝙ dicta Ga.
nō ſint vera. Utrū aūt medicina attrahat ꝓpter ſimilitu
dinem viſum ē ſupꝛa.

Et debes ſcire ꝙ humoꝛū attractio que fit potu me
dicinaruꝫ ſoluentiuꝫ ventreꝫ aut vomituꝫ faciētiuꝫ non
eſt niſi in venis in quibus venerūt donec ad īteſtina per
ueniant ⁊ ſtomacum: ⁊ hic natura mouetur ad hoc vt
eos expellat extra.

¶ Cū declarauit a qua virtute fit humoꝝ attractio:hic
oñdit a qua virtute ꝓpꝛie expellūtur. Et diuidit̄ in duas
ꝑtes. Primo facit hoc ī cōi de vomitu ⁊ fluxu. 2° ſpālr̄
dat cās quare virtꝰ expellēs qn̄qꝫ expellit ꝑ fluxuꝫ qn̄qꝫ ꝑ
vomitū. 2a ibi:⁊ raro qdeꝫ accidit. ¶ Dicit p° ꝙ tu đbes
ſcire ꝙ attractio humoꝝ q̄ fit ꝑ potuꝫ medicinaꝝ ſoluen/
tiuꝫ ventreꝫ aut ꝓuocātium vomituꝫ nō eſt niſi in venis
quouſqꝫ veniat ad ſtomacū ⁊ īteſtina. ⁊ qn̄ mā eſt ibi: tunc
inſurgit nā mēbꝛi expulſiua ſiue virtꝰ eius ⁊ expellit ipm̄.
virtus ergo mēbꝛi eſt illa que expellit. ¶ Nota ergo p° ꝙ
in eūone humoꝝ per operationeꝫ medicine ꝯcurrunt due
operatiōes diuerſe ⁊ duo humoꝝ motus: quoꝝ vnus eſt
attractio:⁊ iſte perſeuerat quouſqꝫ humoꝛ veniat ad locū
vbi ē medicia aut ad locū vicinū medicie ex quo nō īcipit
a medicia elōgari. Aliꝰ ē motꝰ expulſiōis: ⁊ iſte ē poſtq̄ꝫ iā
tractꝰ ē vſqꝫ ad medicinā aut mēbꝛū ī quo īcipit a medicia
elōgari. Primꝰ ergo iſtoꝝ motuuꝫ ē a virtute attractiua
medicie. Et hoc ītēdit Aui. cū dicit: Et debes ſcire ꝙ hu/
moꝝ attractio ⁊c̄. nō ē niſi ī venis quouſqꝫ venit hūoꝛ ad
ſtomacū aut īteſtina. Nā poſtq̄ꝫ huc venerit n̄ āpliꝰ attra
hit̄:īmo īſurgit virtꝰ iſtoꝝ mēbꝛoꝝ expulſiua ⁊ illos expel
lit. 2ꝰ aūt icipit ī ſtōaco aut īteſtinis ⁊ terminat̄ ad extra:
⁊ iſte fit a virtute expulſiua ſtomaci vel inteſtinoꝝ ꝓpꝛie.
Et ſic pꝫ a q̄ virtute ꝓpꝛie fit iſta expulſio ⁊ q̄ꝫtū durat iſta
medicine attractio. ¶ Patet 2° ꝙ cū dicit ꝙ humoꝛum
attractio nō ē niſi in venis ꝙ nō fuit. A. intētio excludere
vias illas a venis ita ꝙ per illas nō velit medicinā attra/
here. Hoc nāqꝫ eēt falſum qꝛ tūc medicina nō attraheret
hūoꝛes extra venas exn̄tes:ſed per li niſi voluit excludere
terminū vel locum ad quē fit attractio:nā talis locus ē ad
quē mouet̄ humoꝛ poſtquā īcipit a ſtomaco vel inteſtinis
expelli: qꝛ n̄ ē niſi aut ad ſtōacū qn̄ illuc vadit: aut vſqꝫ ad
īteſtina qn̄ inteſtina expellūt āteqūā ad ſtomacū aſcendat
poſt aūt nō ē attractio a farmaco ſed expulſio a virtute il/
loꝛū mēbꝛoꝝ. ¶ Nota 2° ꝙ iſte motus attractiōis iuuat̄
multotiēs a mēbꝛis qn̄ humoꝛ ē malus ⁊ mēbꝛis incōueni
ens:expulſio aūt nō iuuat̄ a medicina poſtq̄ꝫ incipit niſi ꝑ
accidēs pꝛo quāto medicina ſtimularet virtutē inteſtinoꝝ
⁊ ſtomaci. ¶ Nota 3° ꝙ n̄ videt̄ incōueniēs inueniri me/
dicinā que alteret hūoꝛē alteratione ꝑ quā humoꝛ mouea
tur ad inteſtina ⁊ nō ad medicinā. nā cātarides tēte ī ma/
nu qn̄qꝫ faciūt mīgere ſanguinē ⁊ nō niſi mouēdo hūoꝛes
ad vias vꝛine n̄ obſtāte ꝙ ibi n̄ ſint. Ergo a pi n̄ repugna/
bit aliquā eē medicinā hoc mō motiuā ad inteſtinū rectū
⁊ ad extra. nec ego puto Auic. hoc velle negare:ſed voluit
ꝙ illud qđ cōiter ꝯtingit eſt modo dicto ab eo.

Et talis motus qui eſt attractio fit per venas epatis veniētes ad ſtomacuꝫ.

Intellige ꝙ lꝫ vt ī pluribus attractio humoꝝ ꝑ medicinas nō ſit niſi a venis: interdū tn̄ ꝑtrāſit vſqꝫ ad mēbꝛa plurimū remota a vijs ductuum vt vſqꝫ ad cuteꝫ: vt dicit Meſue in.c.ij.pꝛime intentōis de rectificatōe medicinarum ſimpliciū. Dicit ibidē vlterius ꝙ medicina poteſt trahere a quolibet mēbꝛo totius coꝛpoꝛis: ſꝫ diuerſificatur in facilitate attractionis ꝭm mebꝛorum diuerſitatem.

Et raro quideꝫ accidit vt cum vētris ſolutiuū bibit̄
ad ſtomacū aſcendāt: ⁊ ſi aſcēderint ad vomitū decliua
bunt. Qđ autē ad ſtomacū aſcēdere nō dimittit nō ē ni/

UVA. BHSC. IyR_006_1

ſi ꝓpter duas cāſ. Una quaꝝ ē qn̄ medicīa vētris ſolutiua velociter penetrat ad īteſtina. Et altera ē qn̄ cum medicīa vētris ſolutiua bibitur: nā ꝓperat ad hoc vt ex venis meſeraicis ad īferiora expellat ⁊ n̄ ad ſupiora qm̄ hoc ꝓpiquius ē ⁊ facilius: ⁊ qꝛ illud qꝺ eſt poſt eas nō ēt ipſas ꝯprimit. Et hoc quidē eſt ex eo qꝺ nām mouet vt ex propinquioribus expellat vijs.

¶ Hic dat cāſ quare virtus expulſiua qn̄qꝫ humorē attractū a medicina expellit ꝑ vomitum: qn̄qꝫ ꝑ ſeceſſuꝫ. Et diuidiť in duas ꝑtes. Primo declarat ꝙ multotiēs per medicinā vētris eūatur humor ꝑ ſeceſſum. 2° q̄re qn̄qꝫ ꝑ vomitū vt per medicinā vomitiuā. 2ª ibi: medicine vero. Prima in duas. p° facit qꝺ dictū ē. 2° mouet vnū errorem circa hoc. 2ª ibi: qꝺ ſi medicina. ¶ In prima ꝑte dicit Auic. ꝙ qn̄ bibitur medicina ſolutiua vētris raro accidit ꝙ hūor aſcēdat ad ſtomacū. Et ſi aſcēdat hūor ad ſtomacuꝫ declinabit iſte humor ad vomitū. i. aliquo mō iclinabit ad vomitū eſto ꝙ nō vomať. Et tūc aſſignat duas cāſ huius dicti. Prima ē ex parte medicīe qꝛ medicīa vētris ſolutiua velociter penetrat ad inteſtīa ⁊ iō ad inteſtīa trahit. 2ª cā ē ꝙ qn̄ talis medicīa labiť natura ꝓperat ad hoc vt expellat humorē ꝑ meſeraicas ad īferiora. ſ. ad inteſtina ⁊ nō ad ſupiora. Cā aūt huius ſcꝺe ē qꝛ iſta via eſt ꝓpinqor. 2ª qꝛ iſta via ē facilior. 3ª qꝛ illud qꝺ ē poſt illas meſeraicas q̄ vadunt ad īferius non ꝯprimit eas. Et hoc intelligit Dy. ꝙ illud qꝺ ē ꝓpe nō ꝓhibet eas ab expulſiōe ipſaꝝ materierū. ⁊ hoc eſt ꝙ nā mouet vt expellat ex vijs ꝓpiquioribus. Et tu ītellige ꝙ illud qꝺ eſt poſt meſeraicas ad īteſtina vadēs non ꝯprimit eas aut non ꝓhibet eas ab eaꝝ expulſione qꝛ iſta non hn̄t nām refugientē a receptiōe ſupfluitatū īteſtina ſicut ſtomacus. Et ideo ꝑtes ſtomaci ꝑ quas meſeraice ſue terminanť q̄ ſūt poſt meſeraicas ne recipiāt malas mās magis ꝯprimūt ⁊ magis ſtringūt meſeraicas q̄ꝫ ꝑtes īteſtinoꝝ. ¶ Ultimū aūt dictū qꝺ hic eſt: Et natura mouet vt expellat ex vijs ꝓpinquioribus: ītelligiť ꝙ iſta reſiſtētia ⁊ ꝯpreſſio eſt data magis a nā partibus ſuperioribus vt nā expellat ex vijs ꝓpinquioribus. ſ. partibus epatis. ¶ Circa iſtā parteꝫ nota ꝙ Aui. ponit duas cāſ. vnā ex parte medicīe: ſcꝺaꝫ ex parte nāe corpis humani. Et ex parte nāe ponit tres cāſ. Pria eſt ꝓpiquitas. 2ª facilitas: qꝛ ille meſeraice ſūt latiores. 3ª defectus ꝓhibētis. Sꝫ Meſue in ſuo de ꝯſolatiōe medicinaꝝ ītētione pria. c. ij. enumerat ſex. Quaꝝ pª eſt declinatio hūoris ad īferiora. ſunt eīꝫ graues ⁊ ideo ad īferius declināt. 2ª eſt qꝛ vie ductuū per quas mā duciť ad medicinā plures termināť ad īteſtina. vn̄ multo plures ſūt meſeraice q̄ ad īteſtina terminanť q̄ꝫ q̄ ad ſtomacū. 3ª cā eſt qꝛ īteſtina ſunt ordinata a nā vt ſint mēbra expulſionis nō ita ſtomacus. Et hec 3ª cā ītelligiť ꝙ īteſtina fortiorē habeāt virtutē expulſiuā aut ꝙ mēbra expellentia nāliter īclinanť ad īteſtina pellere. 4ª cā eſt qꝛ melius eſt pellere ad ignobilia q̄ꝫ ad nobilia. Et ideo mēbra ſua virtute expulſiua plus adiuuāt ad motuꝫ materiei ad īteſtina q̄ꝫ ad motū ad ſtomacuꝫ. 5ª cā eſt vna de cauſis poſitis ab Aui. ſ. ꝓpinquitas vie. 6ª cā eſt qꝛ dato ꝙ mā vadat ad ſtomacuꝫ: ſtomacus hꝫ eā magis expellere ꝑ īteſtina q̄ꝫ ꝑ meri: qm̄ id facit ſupfluitas. Naꝫ porta īferior deputata eſt expulſioni ⁊ ſuperior attractiōi: ⁊ ideo villi ſunt eo mō diſpoſiti quo facilius eſt ad illā trāſmutare id qꝺ dꝫ expelli. Et ſic vides ꝙ Meſue nullā ponit ex ꝑte medicīe cāꝫ deſcēſus ad īteſtina. Aui. aūt qnqꝫ cāſ enumeratas a Meſue ꝯprehendit ſub vna. ſ. ſub facilitate: propter illas tn̄ quinqꝫ cāſ facilius trahit ad īteſtina aut moueť humor q̄ꝫ ad hos. Circa ꝑteꝫ dubitať.

Contra iſtā primā cāꝫ videtur eē id qꝺ dicitur a Meſue in ſuo de cōſolatiōe medicinaꝝ ſimpliciū intentōe prima. c. ij. parapho. j. Per vētrē aūt educūt ⁊c̄. vnde ibi innuit ꝙ medicine quecūqꝫ exiſtētes ī ſtomaco attrahūt humorē ab epate ⁊ alijs mēbris quē eis eſt ꝓpriū attrahere ad īteſtina: deinde ſm exigētie modū virtutis nālis ꝯtinuať eius motus ⁊ euacuāt per inferius: ergo nō velociter deſcendūt vt dicebať. poſſet dici ꝙ medicine ſeceſſiue manent in ſtomaco donec reducte ſint de potentia ad actū: ⁊ modicū poſtea: ſꝫ nō toto tempore ſue attractionis ſicut medicina vomitiua: ſed cito labuntur ad inteſtina.

Utrum dum medicina ſolutiua trahit humorē remaneat in ſtomaco vel īteſtinis?

Qꝺ in ſtomaco pꝫ ex Meſue ī ſuo de ꝯſolatōe can̄. p°. c. ij. dum dicit: Attractio eīꝫ nō eſt niſi a venis ⁊ occultis ductibus corporis dū humor eūandus vſqꝫ ad ſtomacū repat. Et ideꝫ ſentit Serapio 7° breuiarij. c. x. ⁊ multum expſſius dixit: Aut vero remanet medicina ī ſtomaco ⁊ attrahit humorē ꝓpriū ſibi. ī primis ideꝫ pꝫ experiētia qꝛ recipiētes medicinā ſolutiuā: ſi poſtq̄ꝫ īceperit operari: ante tn̄ ꝯpletā operationē coneť vomere: videť manifeſte ſubſtātia medicīe: ⁊ ita in ore ſentiūt: ergo medicina remanet ī ſtomaco etiā duꝫ vētreꝫ ſoluit. ¶ In oppoᵐ eſt Aui. qꝛ dicit vnā cām quare ē ſolutiua vētris ⁊ nō vomitiua eſſe qꝛ velociter penetrat ad īteſtina. ¶ Cōfirmať: in illo loco dꝫ ſtare medicina attractiua ad quē terminať motus attractionis: ipſa eīꝫ trahit ad ſe ſicut magnes. Sꝫ ad īteſtina termīať motus attractionis quādo dꝫ ſoluere ventrē: ergo in īteſtinis manet medicina. Minor pꝫ qꝛ in īteſtinis īcipit motus expulſionis pluriū taliū materieꝝ vt dicit Aui. hic. ¶ Pro dubio ſequēꝺo cōeꝫ viā diciť ꝙ medicīa ſolutiua ſꝫ plurimā ſui ꝑtē remanet ī ſtomaco ꝑ maiorē ꝑtē tꝑis ſue opatiōis: ⁊ hoc notat expiētia dicta ꝺ vomitu. dico aūt ſꝫ plurimā ꝑtē ſui ⁊ n̄ ſꝫ totū: qꝛ ex reubarbaro videmus māifeſte vrinā tīgi tīctura reubarbari: ⁊ ſilr pulpa caſſie an̄ prinᵐ ſue opatōis: qꝺ nō eēt niſi ſꝫ aliquā ꝑtē penetraſſꝫ ad venas. pꝫ ēt per aliā expiētiam: qꝛ in illis medicis in quibus ſumiť pulpa caſſie qn̄ caſſia ē eūata ceſſat operatio medicine: ⁊ iō ſi medicina trāſiret cito ad inteſtina cū ab illis cito expelleręť impediręť opatio eius. Dicēdū tn̄ 2° ꝙ medicina ſolutiua nō ſtat in ore ſtomaci: īmo ſubito ad fundū ſtomaci deſcēdit ⁊ circa fundū ſunt īteſtina: ⁊ iō ipa cito deſcendit ad inteſtina nō ꝙ ſit in corū cōcauitate ſed iuxta illa. Et iō dicūt cōiter doctores ꝙ virtus eius ē in inteſtinis ⁊ ꝙ ipa illuc deſcēdit ſm virtutē ⁊ nō ſm corpulentiā. Et hec eſt cā ꝙ trahiť hūor ad inteſtina recte ſicut ſi magnes eēt in vno ſacco cui alij ſacci circūponerenť in quibus eēt ferruꝫ: ferrū in illo ſacco exiſtēs non exiret ſaccū ſuū ſed moueť ī loco ſui ſacci vſqꝫ ad vicinitatē ſaccoꝝ ī quo eēt magnes. Et per hoc pꝫ auctorū expiētia ⁊ cōcordia.

Qꝺ ſi medicina virtutē haberet attractiuā que humoreꝫ comitareť eſſet natura virtutis expulſiue magis digna vt in ſano ⁊ forti ſuperaret: licet medicina non attrahat niſi ad viaꝫ ſignataꝫ.

¶ Hic remouet vnū errorē: ⁊ error ē iſte. Quidā dicunt ꝙ medicina ſolutiua dꝫ ire ad locū vbi ē humor ad hoc vt ipꝫ melius trahat. Aui. hūc errorē remouet duabus rōibus. Prima ē iſta. Si medicīa hꝫ virtutē attractiuā que tamē ad hoc vt trahat dꝫ comitari humorē. i. dꝫ ꝯiungi cū humore: ſequereť ꝙ in ſano corpore ⁊ fortia tali medicina maior fieret eūatio. Cōſequēs falſum ⁊ cōtra ſupradicta. Et ꝯſequētia pꝫ qꝛ talis medicina nō eūaret nō qꝛ alterando hūorē faceret ipm īcōueniētē mēbro ⁊ ſic virtus mēbri expulſiua īſurgeret ad expellēdū. Sꝫ ſi ita eēt in ſano vel in forti fieret potior expulſio: qꝛ virtus expulſiua ē fortior in ſano ⁊ forti q̄ꝫ in īfirmo ⁊ debili. Dy. tn̄ hꝫ aliū motiuū in exponēdo. Nā dicit ꝙ medicina de ſe maiorē hꝫ aſpectū ad hūores corꝑis ſani q̄ꝫ ad alios ſicut magnes melius attrahit ferrū in optīa diſpōe ⁊ ſic magis eū alteraret. Ego aūt nō video quare medicina habeat maioreꝫ reſpectū ad naturalē q̄ꝫ ad preternālē hūorē: tūc enīꝫ per idē diceręť ꝙ ī corpore īfirmo magis eūaret hūores bonos q̄ꝫ malos ſi magis illos reſpiceret. nec ſolueręť hoc argumētū a Dyno qꝛ ſimili mō ſoluerē rōneꝫ Aui. intellectā vt ipe introducit. ¶ 2ª rō: medicina attrahit hūorē ad vnā viā aſſignatā. ſ. ad ſtomacū vel inteſtina: ſed hoc nō faceret ſi iret vſqꝫ ad humorē ⁊ ibi alteraret ita ꝙ virtus expulſiua inſurgeret: ergo nō oꝫ ꝙ vadat ad humorē. Minor pꝫ: qꝛ ſi humor pelliť a virtute mēbri expulſiua cuꝫ mēbra ꝓpellāt ꝑ varias vias ſibi vicinas: ſequiť ꝙ talis medicina eūaret per tales vias: qꝺ eſt falſuꝫ. Sꝫ pro maiori rei declaratione dubitatur.

Utrum medicīa ſolutiua vadat ad humorē attrahēdū?

Ad parteꝫ affirmatiuā arguiť multipliciter. ¶ Et prio ſic: medicine ꝓuocatiue vrine vel ſudoris ⁊ ſputi vadūt ad hūorē quē dꝫ eūare: ergo a ſimili ⁊ ſolutiue ventris. Aſſūptū ⁊ cōſequētia pꝫ. ¶ 2° ſic: reubarbarū ⁊ pulpa caſſie vadūt ad hūores ⁊ trāſeūt ad venas: ergo ſimilr ⁊ alie. Aſſumptū pꝫ: qꝛ tingunt vrinas mixtura ſua: qꝺ nō eēt niſi aliqua pars eoꝝ trāſiret ad venas. ¶ 3° hyere ⁊ pillule purgatiue capitꝫ dꝫēt accipi poſt cibū apꝺ ſomnū: ⁊ nō niſi vt vapor earū melius petat caput: ergo ⁊c̄. Aſſumptū pꝫ pª tertij illo. c. Cū mām eūare volueris ⁊c̄. i. §. de pillulis ⁊ hyeris: ⁊ ſexta tertij de cura egritudinū lingue. vbi poſtquā dixit ꝙ curať cū alteratiuis ⁊ ſolutiuis dicit: ⁊ oportunius quidē bibūtur hec poſt cibū. ¶ 4° ſic: poſſibile eſt in aliqua medicina eſſe vim alteratiuā per quā inducit qualitatē motiuā humoris nō ad medicinam ſꝫ ad mēbrū diſtans ab ea: vn̄ cātarides poſite in collo ⁊ ī alijs cauterijs qn̄qꝫ faciūt mingere ſanguinē ⁊ imprimunt humoris ꝓprietatē vt moueať ad veſicam: ergo poſſibile erit dari medicinā a ꝓprietate mouētē humorē ad īteſtīa: ſed tales melius eūant eūdo ad humorē: ergo ſalteꝫ ī aliq̄ ē verum ꝙ eūat eūdo ad humorem. ¶ 5° ſic: ſi medicina nō tranſiret ad humorē nō videręť cā quare cōpleta euacuatione ī duobus ſimiles medicīas ſumētibus ſi vnus eoꝝ exponat ſe aeri frigido alter vero nō: ī illo qui īfrīdabiť ſuꝑueniet fluxus vētris: ī alio vero nō. Sꝫ hoc n̄ ē veꝝ vt notat expiētia. Oꝫ ergo ꝙ ipa ad trahēdū hūorē vadat. Et pꝫ aſſumptū qꝛ nō ē alia cā niſi qꝛ īfrigidato corꝑe vapores medicīe diſpſi ꝑ corpus n̄ pn̄t exalare ⁊ remanētes alterāt hūores vt moueāť ad īteſtīa: ⁊ ſic vꝫ ꝙ medicīa vadat ad hūorē attrahēdū. ¶ In oppoſitū ē Auic. hic ⁊ Serapio 7° breuiarij. c. 10°. ⁊ Meſue ꝺ ꝯſolatiōe medicīaꝝ ⁊ fere oēs medici. ¶ In iſto dubio ſūt q̄ttuor cōes opiniōes pª ē valde antiq̄ volēs ꝙ medicīa ſolutiua vadat cū ſui corpulentia ad hūorē attrahēdū: ⁊ iſtud ī ſupficie verboꝝ videť ſenſiſſe Ariſtoteles prima particula ꝓblematum problemate 42° in dāꝺo modū quo farmaca ſoluuntur: dicit enīꝫ qn̄ ī vētres ingrediūtur: diffundūť: ⁊ ferūť: ſm quos poros nutrimētū ferť ī venas nō digeri ſm vincētes exeunt ferētes moleſtiā ipis: ⁊ appellať hec purgatio es aurū ⁊ argētū: ⁊ talia īdigeſtibilia quedā ſūt ab aliquali caliditate:

Cōſimile dubiū mouet Gētilis in expoſitōe lr̄e īmediate precedētꝭ ⁊ ponit q̄dā argumēta que nō inſerit hic magiſter.

UVA. BHSC. IyR_006_1

tate:ſʒ nõ bñ diffundũtur ĩ mẽbꝛa: vnde lege ibi ⁊ videbis
ꝙ plane vult farmaca debere diffundi ꝑ corpꝰ ⁊ nõ dige/
ri. ¶ Contra hanc opinionẽ ẽ experiẽtia qꝛ ſentimus me/
dicinã in ſtomaco tpe ſue opationis ⁊ dũ ſoluit ⁊ aliqñ vo
mitu expellit̃. ¶ Et cõtra hanc arguit Aui. hic duabꝰra/
tionibus ſupꝛapoſitis in littera qꝛ ſequeret̃ ex hoc ꝙ ma/
gis euãret ĩ ſano ⁊ foꝛti. Sequeret̃ 2° ꝙ nõ deberet trahe/
re tm̃ ad viã aſſignatã. ſ. ad ſtomacũ. Et cõtra eãdeʒ ẽ rõ
Serapionis 7° bꝛeuiarij. qꝛ ſi medicina cõiũgeret̃ humoꝛi
in venis aut in alio mẽbꝛo ibi retineret humoꝛẽ: ſicut ma/
gnes ſi cõiungit̃ ferro retineret ipm̃ ⁊ per cõſequẽs medi/
cina nõ ſolueret. vnde dixit caplõ pꝛĩo: Et ſi medicĩa eſſet
illud ⁊ penetraret ad humoꝛẽ remanerẽt ambo ſimul ĩ mẽ
bꝛo poſtquã euãret̃. Et cõtra hãc opinionẽ ſunt fere qua/
ſi oẽs famoſi medici. ¶ Scõa opinio voluit ꝙ medicina
hʒ partes diuerſas quaſdã. ſ. groſſas ⁊ quaſdã ſubtiles. ⁊
ꝙ ſm̃ ſubtiles ꝑtes penetrat vſqʒ ap hũoꝛẽ: ſʒ groſſas re/
manet aut ĩ ſtomaco: aut in inteſtinis. Et hoc declarãt qꝛ
q̃dã ſunt medicĩe magis euãtiue ab vno mẽbꝛo q̃ʒ ab alio
⁊ magis a remotis vt q̃ euãt mãm iuncturaꝝ ⁊ neruoꝝ:
ſed hoc nõ ẽ per ſolã alterationẽ cũ vndiqʒ hẽant alterare
ergo erit ꝓpter ſuoꝝ vapoꝝ delationẽ vſqʒ ad locũ vnde
dʒ fieri attractio. Cõfirmat̃ 2° ꝙ cũ intendimꝰ magis ab
vno mẽbꝛo euãre: ſi nõ habemꝰ ſolutiuum reſpiciẽs d̃ ꝓ/
pꝛietate mẽbꝛuʒ ꝑmiſcemꝰ aliquid qd̃ ducat virtutẽ ſolu/
tiuã ad mẽbꝛũ: vt puta rẽ aliquã que ad mẽbꝛũ illud attra
hat̃ ⁊ ſimul cuʒ ea aliquid de vapoꝛe medicĩe cõducat̃. ali/
ter eiʒ nõ videt̃ modus per quẽ attrahat̃ virtus medicĩe
ad locũ. Cõtra tñ hanc viã ẽ rõ Cõciliatoꝛis: qꝛ vapoꝛ me/
dicine motꝰ ad hũoꝛẽ hʒ illius humoꝛis virtutẽ attracti/
uã: ergo cũ cõiungit̃ humoꝛi ĩ mẽbꝛo ẽ cã quietis hũoꝛis
ibi ⁊ nõ motus eius ad inteſtina: ⁊ ꝑ cõſequẽs hoꝝ vapo/
rũ multitudo potius ĩpeditiua cẽt q̃ʒ iuuatiua. ¶ Tertia
opinio videt̃ Auic. ⁊ Meſue ⁊ Serapionis ⁊ Haliebatis
⁊ oium fere medicine auctoꝝ: ⁊ ẽ ꝙ medicina ſolutiua vẽ
tris hʒ virtutẽ attractiuã hũoꝛis ad ſe. Et ĩõ dicũt 2° ꝙ
nõ oʒ ꝙ medicina vẽtris ſolutiua debeat moueri ad hu/
moꝛeʒ attrahẽdũ: ⁊ hoc per rõnes que ſunt ꝯtra alioꝝ po/
ſitões. Addũt tñ moderni quidã hãc rõeʒ: Si medicĩa va/
dit ad humoꝛẽ hoc ẽ qꝛ hũoꝛ trahit medicinaʒ: aut qꝛ mẽ/
bꝛa trahũt illã: aut qꝛ ipa per ſe mouet̃ ad illũ. Sʒ nõ põt
dici vltimũ qꝛ in medicĩa nõ ẽ virtus ꝓgreſſiua: nec ſcõʒ
qꝛ tũc humoꝛ trahit medicinã: qd̃ nõ ẽ auditũ. nec põt di
ci pᵐ qꝛ fere oĩs talis medicina aliquo mõ ꝑticipat vene/
noſitate. mõ mẽbꝛa expellũt talia ⁊ ñ trahunt: ergo ſequi/
tur ꝙ nullo mõ mouebit̃ medicina ad humoꝛẽ. Et confir/
mat̃ ꝙ nec ſm̃ ſe nec ſm̃ aliquã ſui partẽ oꝑʒ ꝙ vadat ad
humoꝛẽ attrahẽdũ qꝛ medicina attrahit hũoꝛẽ ſicut ma/
gnes ferrũ. Sʒ magnes nõ vadit ad ferrũ nec ſm̃ partem
vapoꝛoſam nec ſm̃ coꝛpulẽtã: ergo nullo mõ medicina va
dit ad humoꝛẽ attrahendũ. ¶ Quarta opinio vult ꝙ licet
medicina ſm̃ partẽ coꝛpulẽtã nõ vadit ad humoꝛẽ tamẽ ñ
ẽ incõueniẽs: imo multotiẽs accidit ꝙ ſm̃ aliquos vapo/
res ab ea eleuatos verſus hũoꝛẽ moueat̃: ⁊ iſta ẽ biꝑtita.
Nã Cõciliatoꝛ differẽtia 141ᵃ vult ꝙ vapoꝛes iſti nõ ꝑue/
niũt vſqʒ ad hũoꝛẽ attrahẽdũ: ſʒ qñ medicĩa attrahit a lõ
ginquo vapoꝛes a medicina ꝓducũtur vſqʒ ad certã di/
ſtãtiã vt facilꝰ alteratio quã facit medicĩa ꝓcedat vſqʒ ad
humoꝛẽ ſʒ nõ cõiungit̃ humoꝛi. vñ dicit Cõciliatoꝛ eodẽ
mõ inquãtũ medicĩa cũ attrahit a remotis mediũ realiter
ĩmutabit: nõ tñ ꝙ hec realis ĩmutatio hũoꝛi occurrat ali/
quo mõ: naʒ tũc ꝑfata occurrerẽt accidẽtia vel incõueni/
entĩa. hec Cõciliatoꝛ. Dy. aũt ĩ huiꝰ loci explanatõe dicit
ꝙ vapoꝛes eleuant̃ a medicĩa vſqʒ ad humoꝛeʒ ꝑueniẽtes
non ad ipm̃ attrahendũ: ſʒ ad diſponẽdum vt facilius at/
trahatur. Nã ſicut ferrũ pꝛius cõfricatũ cum magnete fa
cilius attrahit̃ q̃ʒ non cõfricatuʒ alijs paribus: ita humoꝛ
alteratꝰ a vapoꝛe medicine facilius trahit̃ ad medicinã q̃ʒ
nõ alteratꝰ alijs paribꝰ. Et ideo dixit Dy. ꝙ ſi hoĩes ſcõe
opinionis hoc voluerunt dixerũt verũ. Cõtra tñ Dy. opi
nionẽ ꝓcedit rõ Cõciliatoꝛis qꝛ vapoꝛ ꝯiũctꝰ hũoꝛi agit
ad hũoꝛẽ tenẽdũ ſibi cõiũctũ: ergo potiꝰ impedit q̃ʒ iuuet
medicine attractionẽ. Cõtra Cõciliatoꝛẽ aũt videt̃ ꝙ va/
poꝛ ſi vſqʒ ad quãdam diſtantiã multiplicat̃ ⁊ dʒ attrahi
humoꝛ anteq̃ʒ ad ſtomacũ ⁊ ĩteſtina ꝑueniat dʒ ad illã di
ſtãtiã venire ⁊ ad minoꝛẽ: ergo oʒ ꝙ aliqñ vapoꝛ ꝯiungat̃
humoꝛi q trahit̃: ⁊ fit realis ĩmutatio quã facit medicĩa in
medio de neceſſitate ⁊ occurrit aliquo mõ hũoꝛi attrahen
do ⁊ ſequunt̃ ĩconueniẽtia dicta ab eo. Rñdendo ergo ad
iſtã qõneʒ dicã illud qd̃ ego puto fuiſſe de mẽte Auic. in
iſta mã: qd̃ ego puto veꝝ. Pꝛo quo dicẽdũ ꝙ Aui. ñ loq̃t
in iſto. §. niſi de medicina euãte ꝑ attractioneʒ quã dicit
vẽtris ſolutiuã: ⁊ nõ ĩtẽdit negare poſſibilitatẽ alteriꝰ mo
di euãndi ꝑ ventrẽ determinatũ humoꝛẽ: ſʒ illũ tanq̃ʒ nõ
multotiẽs ꝯtingẽteʒ dereliquit. ¶ Nota 2° ꝙ aliud ẽ di
cere medicina hʒ virtutẽ attractiuã q̃ comitat̃ humoꝛeʒ:
Et aliud eſt dicere ꝙ medicina põt aut ſm̃ ſe aut ſm̃ par/
teʒ ꝯiungi humoꝛi attrahẽdo: Et 3° dicere ꝙ ꝓpter taleʒ
ꝯiunctionẽ foꝛtiꝰ moueat̃ humoꝛ ad exitũ ꝑ fluxũ aut per
vomitũ. Nã dicere ꝙ medicina hʒ virtuteʒ attractiuã q̃

ꝯcomitat̃ humoꝛẽ: eſt dicere ꝙ hec virtus nõ trahit niſi
dum eſt comes hũoꝛis. i. dũ eſt ꝯiuncta humoꝛi. ⁊ hoc nõ
requirit̃ de alijs duobꝰ dictis. His habitis pono ꝯcluſio/
nes de queſito. ¶ Pꝛima ꝯclõ: nõ claudit repugnãtiam
nãleʒ inueniri medicinã humoꝛis ad ĩteſtina ſolũ motiuaʒ
ſiue ipſa ſit in ĩteſtinis ponẽda ſiue extra. Pꝛobat̃: põt da
ri medicina q̃ ducit virtutẽ medicine ⁊ coꝛpulentiã ſuã ad
caput ⁊ alia q̃ ducit ad coꝛ: ⁊ ſic de alijs mẽbꝛis ẽt eſto ꝙ
in pꝛĩcipio talis medicina nec ſit ĩ capite nec ſit in coꝛde: er
go pariter poterit dari medicina humoꝝ hoc mõ motiua
ad mẽbꝛũ. ſʒ nõ eſt maioꝛ rõ de capite qd̃ ĩuenit̃ medicĩa:
vel duʒ eſt extra caput mouet mãm ad ipm̃ q̃ʒ de ĩteſtinis
vel alio mẽbꝛo: ergo põt dari medicĩa: que dũ eſt extra in/
teſtina eſt ductiua hũoꝛis ad ea vel trãſmiſſiua. Foꝛte di/
cit̃ hic ꝙ tales medicine q̃ dicunt̃ ducere virtutẽ alioꝛuʒ
ad mẽbꝛa aliqua ſunt tales q̃ trahunt̃ ab illis mẽbꝛis tãq̃ʒ
ꝯueniẽtes. ſʒ nõ eſt ita de ſolutiua: qꝛ quodãmõ ẽ veneno/
ſa ⁊ non trahit̃ a mẽbꝛis: ĩmo potius expellit̃. Contra: can
tarides ducũt ad vias vrine mãs ⁊ humoꝛẽ: ĩmo mouent
ad illas: vt pʒ in cauterio qd̃ de cãtaridibꝰ poſitis in collo
facit mingere ſanguinẽ: vt pʒ ex Auic. 2° cañ. c. ꝓpꝛio au/
ctoꝛitate Gal. cũ dicit: Inquit Gal. ꝙ ipſa exulcerat ve/
ſicã: ⁊ eſt ꝓpterea qd̃ facit mãs acutas declinare ad eã. Et
ꝯſtat ꝙ ille cãtarides remanent ad veſicã: ꝓpterea ⁊ non
mouent̃ cũ ſint veſice vlceratiue nõ ſunt ei ꝯueniẽtes: ⁊ ꝑ
ꝯſequẽs non attrahunt̃: ergo ſtabit moueri medicinã ad
mẽbꝛuʒ determinatũ lʒ a mẽbꝛo non attrahat̃. Cõfirmat̃:
venenũ ꝓpꝛie ſumptũ petit coꝛ ⁊ aliud petit pulmonem ⁊
aliud alia determinata mẽbꝛa. Sʒ ꝯſtat ꝙ mẽbꝛa nõ tra/
hũt illud qd̃ eſt eis venenũ: ergo medicine mouẽt̃ ad mẽ
bꝛa: vel ſi venenũ trahit̃ ad mẽbꝛa que ledũt̃: a ſimili pote
rit medicina eſto ꝙ mẽbꝛa non trahãt illã. Pꝛeterea ali/
quis eſt magnes q expellit ferꝝ: ergo pariter poterit dari
medicina pellens humoꝛẽ. Et vltra ſicut dat̃ medicĩa at/
tractiua ita dat̃ expulſiua: ergo ſicut dat̃ medicĩa trahẽs
a determinato mẽbꝛo: ita dabit̃ pellens ad determinatũ
mẽbꝛuʒ: ⁊ ꝑ ꝯſequens erit poſſibile tale mẽbꝛuʒ eſſe ĩteſti/
na. Cõfirmat̃ qꝛ vnum ⁊ ideʒ mẽbꝛum diuerſas res trãſ/
mittit ad diuerſa mẽbꝛa: vt epar colerã ad chiſtiʒ ⁊ melã/
coliã ad ſpleneʒ ⁊ aquoſitatẽ vrinaleʒ ad renes: ⁊ coꝛ ſpi/
ritꝰ in artariã ⁊ ſanguinẽ in venã artarialeʒ: ergo poſſibi/
le erit hoc mõ medicinã trãſmittere ad determinatũ mẽ/
bꝛuʒ determinatũ humoꝛẽ. ⁊ plurime ſil'es rõnes fieri poſ
ſent ꝓ iſta ꝯclõne. Ex hoc ſequit̃ ꝙ nõ claudit repugnã/
tiã aliquã eſſe medicinã determinati humoꝛis eductiuã q̃
melius moueret humoꝛẽ ad ĩteſtina illi ꝯiuncta q̃ʒ nõ ꝯiũ/
cta. Medicina eiʒ de qua loquit̃ iſta ꝯclõ foꝛtius ĩmuta/
ret humoꝛẽ cũ eſſet illi vicina in mutatõe ꝓpellente ad ĩte
ſtina q̃ʒ duʒ eſſet diſtãs ab eo. ¶ Scõa ꝯclõ: veriſimile ẽ
multaꝝ medicinaꝝ ſolutiuaꝝ partes hoꝛa qua ſoluũt trã
ſire vſqʒ ad humoꝛẽ trahendũ ⁊ euanduʒ. Iſtud pʒ ad ex/
perientiã de reubarbaro ⁊ pulpa caſſie. Nã cuʒ eoꝝ attra
ctio ſit ab epate vſqʒ ad epar trãſeunt: ⁊ vltra cũ ſuis par/
tibꝰ ꝑmixtis ⁊ cuʒ vrina trãſeũtibꝰ tĩgunt vrinã vt notat
expientia. ¶ Tertia ꝯclõ: trãſitꝰ taliuʒ ꝑtiuʒ ad humoꝛeʒ
trahẽduʒ qñqʒ iuuat ad augẽduʒ fluxũ. pʒ qꝛ talis trãſitꝰ
facit humoꝛẽ alterari q̃litate ꝑ quã ĩclinat̃ ꝯiungi cuʒ tali
medicĩa: ⁊ poſt talẽ alteratiõeʒ vapoꝛ ille medicĩalis rece/
dit ⁊ diſſoluit̃ relinq̃ndo humoꝛẽ alteratũ q poſt ꝑ reſiduũ
remanẽs ĩ ĩteſtinis ⁊ ſtomaco multo facilꝰ trahit̃. ⁊ hanc
vult Dy. ¶ Quarta ꝯclõ: plurimũ talis ꝯiunctio ⁊ trãſitꝰ
medicine ad humoꝛẽ attrahẽdũ ẽ cã euãtionĩõis diuerſo/
rũ humoꝝ. Hec pʒ qꝛ plurimũ medicina aut vapoꝛ eius ĩ
mẽbꝛo alterat plures hũoꝛes ſicut plures inuenit nõ ſoluʒ
alteratiõe ſpãli ſed reali ꝑmutando ipos a ꝓpꝛia natura ⁊
ĩducit ĩ mẽbꝛo violẽtiã vnde mẽbꝛum conat̃ eos expelle/
re tãquã nociuos. ¶ Quinta ꝯclõ: trãſitus vapoꝛoſe par
tis medicine vſqʒ ad certã diſtantiã põt iuuare ad facien/
dũ humoꝛẽ facilꝰ trahi. Hec ẽ Cõciliatoꝛis differẽtia 141ᵃ
allegata ⁊ ꝓbat̃ per rõeʒ ſuã. ¶ Sexta cõclõ: ſi medicina
hẽret virtutẽ attractiuã que humoꝛem cõcomitaret̃: alijs
ꝑibus in malicia humoꝛis euãndi plus euãret in ſano ⁊ in
foꝛti q̃ʒ ĩ debili. Pꝛobat̃ qꝛ talis medicina ſi euãret ꝑ vir/
tutẽ attractiuã ⁊ nõ per trãſmiſſiuã: ⁊ cuʒ hoc cõcomitat̃
hũoꝛẽ nõ põt hoc facere niſi faciẽdo hũoꝛẽ extraneũ ⁊ ma
gis ſtimulantẽ virtutẽ. Aliter eiʒ nõ facit. Cũ eim̃ ſit hu/
moꝛi cõiuncta iã cõſecuta ẽ finẽ ĩtẽtũ ĩ attractiõe. ſ. ꝑ pꝛe
ſentiã attracti: ergo nõ trahit: ⁊ ſic per tractũ nõ facit mo
ueri medicina hũoꝛẽ. Si ergo moueat nõ erit niſi ſtimulã
do virtutẽ expulſiuã. Sʒ hũoꝛes qui euant̃ ꝓpter ſtimu/
lũ expulſiue virtutis foꝛtius expellũt̃ in ſano ⁊ foꝛti: ergo ĩ
ſano ⁊ foꝛti fieret hec euãtio maioꝛ. Et hoc eſt ꝙ Aui. vo/
luit in pꝛima rõne. Ex quo ſequit̃ ꝙ cuʒ nulla videt̃ talis
opatio foꝛtioꝛ in ſano ⁊ foꝛti q̃ʒ in debili: qꝛ ibi medicĩe at/
tractiue nõ comitant̃ humoꝛẽ mõ expoſito. Et tunc rñdet̃
ad argumẽta pꝛincipalia. ¶ Ad pꝛimũ rñdet̃ cõcedẽdo ꝙ
põt eẽ aliqua medicina ſolutiua vẽtris que hoc facit: ĩmo
⁊ lubꝛicatiua ⁊ cõpꝛeſſiua hoc faciũt. Sʒ nõ ſequit̃ ꝙ illa
que euãt per attractiuã virtuteʒ debeat comitari humo/
rẽ ad ſenſum datũ. Nã ille ꝓuocatiue nõ ꝓuocãt ꝑ vir/

UVA. BHSC. IyR_006_1

tutē attractiuā. ¶ Ad 2m ꝯcedit̄ totū. ¶ Ad 3m ꝯcedit̄ vt pꝫ in vna ꝯclōne: vapores cibi ducūt vapores medicīe ⁊ ꝙ iuuat̄ ad eūandū per illos mō dicto ī ꝯclōne tertia.
¶ Ego aūt puto ꝙ nō ſit ita regulare dare medicīas ſolutiuas cū cibo: ⁊ iō nō do niſi ex cā. Et dico ꝙ Auic. pª tertij loco allegato dat pillulas illas aſcyeret añ dormitionē: ſed nō dicit ꝙ priꝰ comederit. Similr̄ dico de 16ª tertij de cura egritudinū lingue qñ dicit̄ ꝙ cōmodiꝰ illa exhibent̄ poſt cibū refert̄ ad ꝓximū. ſ. ad electuaria ⁊ medicinas alterātes. ¶ Ad quartū dicit̄ ꝙ illud qꝺ ꝯcludit ē verū vt dixi ī prima ꝯclōne. Sed Auic. de illa manerie medicinaꝝ ī illo. c. nō loquit̄. ¶ Ad quintū dicit̄ ꝙ vapores medicine vadūt ad humorē qui trahi dꝫ: ſua tñ virtute attractiua nō trahūt ꝯcomitādo humorē ad ſenſuꝫ datum ī primo notabili: imo diuerſos humores alterāt vt dixit ꝯcluſio quarta. Et hec de iſta queſtione.

Medicīe vo vōitū faciētꝭ diſpō ē diuerſa ab hoc: qm̄ cū ī ſtōaco fuerit ī eo morabit̄ ⁊ hūorē ab īteſtis ad ſeipſā attrahet ⁊ ſua virtute ſupat ad reſiſtēdū virtuti nāli:

¶ Hic docet modū quo eūat per ſupius vomica medicina. Et diuidit̄ in duas. Prīo facit hoc. 2º rñdet tacito dubio. 2ª ibi: ⁊ ſcias. Primo dicit ꝙ diſpō medicine faciētis vomitū ē cōtra illud qꝺ dictū ē de medicina ſolutiua vētris q: ipa cū fuerit in ſtomaco morabit̄ in eo ⁊ trahet humores exñtes in inteſtinis ab ipſis ad ſtomacū ad ſe ipſaꝫ ⁊ ſua violēta virtute ſupabit ⁊ reſiſtet virtuti expulſiue īteſtinoꝝ inclinātiū mouere per īferiꝰ. ¶ Nota ergo ꝙ ſicut dixit de medicīa ſolutiua ꝙ velociter deſcēdat ad īteſtina ita de hac dicit ꝙ morabit̄ in ſtomaco ⁊ intelligit̄ quoad ſupiores ꝑtes. ⁊ vbi dixit de ſolutiua ꝙ velociter deſcēdit qñ bibit̄ nā ꝓperat ⁊ expellit per īferiora: hic dicit ꝙ medicina vincit virtutē hāc ⁊ ēt reſiſtit ſibi ⁊ trahit humorē ad ſtomacū: ⁊ hoc nō ē niſi ꝓpter medicine violētam virtutē. ¶ Nota tñ ꝙ vltra has duas cās: quaruꝫ vna ē morari in ſtomaco: ⁊ alia eſt ad ipm̄ ex inteſtinis trahi: Meſue addit duas alias cās: quarum vna ē ꝙ debilitet partes ſupiores ſtomaci: alia ē ꝙ ſit agitatiua ⁊ cōmotiua fortiter. Nā ventoſitas generādo ſubtilē humorē exñtem ī ſtomaco ne in fundo moret̄: ⁊ iō ſtimulās ſupiora pellit̄ vomitu. Et ſi dicat̄ ꝙ alia ⁊ tertia ſit ꝙ medicina ſit ſubuerſiua: q: valde abhomiābilis ſaporis ⁊ odoris: ita ꝙ fumi q eleuant̄ ad meri ⁊ ad os incitēt ad motū per ſupiora erit 3ª cā ⁊ ſunt oēs manifeſte.

Et dicit hoc Meſue ī c. ij. prime ītētionis de cōſolatione medicinarū parapho illo: Educūt autēꝫ per vomitū quecūqꝫ de ꝓprietate hñt vt ſtomacū ſuperius debilitēt ⁊c̄.

Et ſcias ꝙ plurimū attractōis hūoꝝ quos medicīe attrahūt nō ē niſi ex venis ⁊ ex eo qꝺ ē multe ꝓpinquitatis: qm̄ attractio ſit in venis ⁊ ī eis q̄ nō ſūt vene ſicut humores qui ſūt ī pulmone qui ꝓpter vicinitatē ad ſtomacū ⁊ īteſtina trahunt̄ lꝫ in venis nō vadāt.

¶ Hic remouet dubiū q: eiꝫ ſupiꝰ dixit ꝙ attractio humoꝝ nō ē niſi in venis ne quis putet qꝺ dicat illud excludēdo alias vias. Dicit ꝙ ſcias ꝙ attractio humoꝝ vt plurimū nō ē niſi per venas aut ꝑ illud qꝺ ē multe ꝓpinquitatis: vt verbigrā hūores exñtes in pulmone trahūtur ad ſtomacū abſqꝫ ingreſſu ad venas ꝓpter ꝓpinquitatē. Ex quo tu vides modū quo cōiter ſit eūatio ꝑ vomitū aut fluxum ꝑ medicinā ſolutiuā. Nā ſi ſunt hūores in loco multū longiquo ⁊ extra venas ingrediūtur venas vicinas per poros: deinde de paruis veniēdo ad magnas tandem veniūt ad epar ⁊ ꝑ portā ⁊ meſeraicas trahūtur ⁊ ad inteſtina in ſtomacū ⁊ poſtea a virtute expulſiua illorū expellūt̄ extra. Si aūt ſunt vicini: tūc ſi non ſunt ī venis nō ē incōueniens ꝙ per poros trāſeāt ī poros ſtomaci ⁊ inteſtinoꝝ: ⁊ per illos ſtomacū ingrediant̄.

Poſſibile tñ ē vt dicit Aui. decima tertij tractatu quarto. ꝙ mā faciēs pleureſiꝫ expellat̄ ꝑ ſeceſſuꝫ ⁊ vrinā: hoc tñ ſit ꝑ viaꝫ reductōis ad poros. Etiam ſupfluitates pl'monis pñt expelli ꝑ ſeceſſuꝫ vt dictū eſt reſudādo ad diafragma ⁊ de diafragmate ad epar: poſtea ad ſtomacū: deinde ad inteſtina: ⁊ expellit̄ per ſeceſſuꝫ.

Et debes ſcire ꝙ attractio q̄ ſit ꝑ nares ex medicīs ſiccis ē cā eūandi hūores a corpore ſicut in idropiſi.

¶ Hic vt ſupra dicit̄ ponit̄ cañ. nō ꝓprie de materia capituli ſed habēs affinitatē quādaꝫ: dicēs ꝙ tu debes ſcire ꝙ attractio que ſit ꝑ nares ex medicinis ſiccis ē cā euacuandi humores a corꝑe ſicut in idropiſi. Et vult Auic. ꝙ piper aut ꝯdiſi aut heleborꝰ qñ trahūtur euacuāt: ſꝫ iſtoꝝ eūatio ſit ꝑ ſternutationē ⁊ ꝑ exitū flegmatis in forma humorali. Odorare aūt nigellā ⁊ poma deſcripta ad catarrū ēt ſoluit hūiditates ⁊ ſic eūant corpꝰ ⁊ ꝑcipue caput. Et ē iſta eūatio ſimilis eūatōi q̄ ſit ī idropiſi cū ēplaſtro aūt exiccatiuo exterius appoſito vt arena calida aut ſaculis calidis aut balneis. Nō ergo ītēditꝭ Aui. ꝙ corpꝰ idropici eūet̄ attractōe ꝑ nares: ſꝫ ꝙ ſicut corpꝰ idropici eūat̄ ꝑ quaſdā medicīas ſiccas exteriꝰ appoſitas: ita eūatur ꝑ medicinas ſiccas attractas a naribꝰ. ⁊ hoc ē claꝝ intelligēti.

Notat Gētilis ī expoſitōe huiꝰ lr̄e differētiā eē inter iſtas medicinas ſic eūantes ⁊ medicinas ſolutiuas ⁊ vomitiuas: quia medicine vomitiue ⁊ ſolutiue trahūt a forma ſpecifica: ſꝫ ille ſic applicate trahūt ꝑ caliditatē manifeſtaꝫ: vt maiorana q̄ eūat humores a cerebro ⁊c̄.

Immo Auic. 14ª tertij tractatu. iiij. c. xiij. de cura idropiſis aſcliti circa principiū parapho jº Et ſternutatio cuꝫ medicis ⁊ inſufflatōes ⁊c̄. inuit ꝙ medicine ſicce tracte ꝑ nares ꝯferūt ī idropiſi vel excutiēdo partē māe peccātis ſicut flegma copioſū a capite vel ꝯmouēdo fortem ſternutatiōeꝫ que ſuo īpetu mouet humiditates nc dū ſuperius ſed ēt īteriꝰ coartatas eas facilr̄ expulſioni preparādo: ⁊ nō ſolū huiuſmodi medicine ſic naribꝰ applicate ꝯferūt in idropiſi: ſed ēt ī aſmate ⁊ ptiſi. De primo pꝫ ꝑ Auic. decīa tertij tractatu primo. c. xlj. parapho jº. Suffumigatio aūt ſit ſicut arſenicū. Et ſcꝺo pꝫ ꝑ eundē decīa tertij tractatu quīto. c. vj. parapho jº Et qñqꝫ adminiſtrāt̄ in hac egritudine ⁊c̄.

¶ Cam 5m de regulis ſpālibus ſolutōi ventris.

Am in precedenti ſermone oſtēdimꝰ qūo ſit corpꝰ preparāduꝫ ad recipiēduꝫ id qꝺ ventrē ſoluit anteq̄ꝫ purget̄ cū amplificatōe poroꝝ ⁊ lenificatōe nāe ⁊ ꝓprie ī egritudinibꝰ fridis: ⁊ ad ſūmuꝫ nāꝫ mollificare antequā vēter ſoluat̄ eſt ꝯpetēs regula ī qua exiſtit ſecuritas niſi ī eo qui colirice paſſioni valde ē aptus: ex hoc nāqꝫ nihil iſti ē faciēduꝫ qm̄ eſſet cauſa ſuperfluitatis que ei accidet.

¶ Poſtquā in ꝑcedēti. c. Aui. poſuit regulas cōes ſolutioni ventris ⁊ vomitui: in hac ꝑte ponit ſpāles regulas ſigillatim iſtis eūationibꝰ correſpōdētes. Et diuidit̄ in duas partes. Primo facit qꝺ dictū ē de ſolutiōe vētris. 2º de vomitu. 2ª ibi: hoīes qui ſunt. Prima in duas. pº ponit res pertinētes ſolutiōi vētris. 2º docet eligere medicinas cū quibꝰ talis eūatio ē faciēda. 2ª ibi: medicinaꝝ vētrē. Prima in duas. pº facit qꝺ dictū ē. 2º docet occurrere errori cōmiſſo vel accidētibꝰ malis ſequētibus taliuꝫ eūationes medicinaꝝ. 2ª ibi: ⁊ ſignificatōibꝰ. pª in duas. pº docet quid agēdū ante potū medicīe. 2º quid poſt eiꝰ aſſumptionē. 2ª ibi: per vnā colūnā. cū aliquis medicinarum. Prīa in duas. pº ponit cañ. vl'es fere oēs purgationes reſpiciētes. 2º ſpecialiores ſm̄ diſpōnē corporis purgandi. 2ª ibi: cū aūt aliquis. Prima in quattuor ſicut q̄ttuor ſunt cañ. 2ª ibi: ex cā ꝑterea. 3ª ibi: balneū. 4ª ibi: fricatio. Prima in tres. pº repetit quedā dicta ſupiꝰ que per cañ. ſunt hic hñda cū exceptiōe. 2º docet quid faciēduꝫ in his qui a regula excipiūtur. 3º docet ex quodā accidente cognoſcere aliquos q a regula ſunt excepti. 2ª ibi: ſolutio. 3ª ibi: trauli quoqꝫ ſunt. Prīo dicit oñſuꝫ eē in precedenti ſermone qūo ſit corpꝰ prepandū ad ſumēdū medicinā purgantē per ventrē antequā ſumat cā ex apitiōe poroꝝ ⁊ lenificatione nature ⁊ ꝓprie in egritudinibꝰ frigidis: ⁊ ſummatiꝫ mollificare nām anteq̄ꝫ det̄ ſolutiuū eſt cōpetēs regula ī qua ē ſecuritas niſi ī illis q ſunt parati colirice paſſioni. naꝫ iſtis nihil eoꝝ eſt faciēdū q: eſſet cā ſupfluitatis fluxꝰ. ⁊ hoc totū ē habitū ī capl'o īmediate ꝑcedenti. ¶ Et nota ꝙ ꝑparatio ē triplex: quedā reſpectu viaꝝ ꝑ quas ducat̄ humor: quedā reſpectu humoris ⁊ q̄dā reſpectu membroꝝ per q̄ ſit expulſio. Et exceptio illoꝝ q ſunt apti colirice paſſioni ē ꝓprie de tertia ꝑparatiōe: q: digō humoꝝ in oībus dꝫ ꝓponi. In fridis aūt egritudinibus ꝓprie dicit̄ hoc faciendū: q: fridi humores difficiliꝰ eūant̄ ⁊ ſūt cōiter magis īdigētes digōne ⁊ viaꝝ aptione vt ſupra dictū eſt.
¶ Sꝫ dubitat̄ hic vtrū digeſtio humoꝝ vel cānaliuꝫ vel poroꝝ apitio ſint ꝑmittende ī corpibꝰ paratis colirice paſſioni? Et videt̄ ꝙ nō: q: oē qꝺ ꝑparat ad magis fluēdū vel fluxū magnificāduꝫ ē multuꝫ timēdū ī iſtis añ aſſūptionē farmaci: ſed digō ⁊ cannalium aptio ſunt huiuſmodi: hec eniꝫ faciūt farmacū magis educere: ergo iſta ſunt vitāda.
¶ In oppm, tñ arguit̄ ſaltē de digōne: illud ē ꝑmittendū qꝺ ē bonoꝝ humoꝝ eūoneꝫ ꝓhibens ⁊ remouēs eūonem maloꝝ: ſed digō huiuſmodi ergo dꝫ ꝑponi. Preterea cānaliuꝫ apertio remouet maloꝝ accidentiū difficultatē cuꝫ dictū fuit ſupra ꝙ reddit corpꝰ ſecuꝝ a pena: ergo ē ꝑmittendū. In iſto dubio rñdent cōiter auctores ꝙ digeſtio ⁊ cānaliuꝫ aptio ſunt ꝑmittende in paratis colirice paſſioni ſꝫ nō mollificatio. cā eſt q: illa ſunt ꝑmittēda quibꝰ nā eſt magis potēs libere ſequeſtrare benignū a malo ⁊ ſine malis accidētibus illud libere eūare: ſed in corporibꝰ colirice paſſioni paratis: digeſtio ⁊ cānaliū aptio ſunt huiuſmōi: ergo ſunt ꝑmittēda. Minor pꝫ q: ſi humor nō ſit digeſtꝰ nō ē obediēs virtuti: ⁊ ſic nō facile ſepat̄ a benigno. Et ſi vie ſunt oppilate mali hūores in via magnificant̄: mora ⁊ ꝯiunctio cū iuuatiuo ⁊ anguſtia ⁊ dolor: nec ꝺ iſtis ſequūtur nocumēta notabilia ī iſtis corporibꝰ ꝑꝑ que dimittant̄ ergo ⁊c̄. ¶ Ad argumētū cū dicit̄ ꝙ iſta augēt fluxū dicit̄ ꝙ per iſta auget̄ fluxus mali ⁊ peccātis humoris ñ aūt boni: imo iſtiꝰ diminuit̄ cū per hoc virtꝰ liberiꝰ ſeparet bonū a malo: ⁊ q: nō tāto tꝑe malignꝰ hūor remaneat agitatus ī corpore: ſꝫ ꝑ ipſiꝰ mali humoris ⁊ farmaci citā euacuationē minus ſunt lexa lubrica mēbra. ſ. ſtomacꝰ ⁊ inteſtina q̄ꝫ ſi diu farmacū ibi ſtetiſſet. Et iō cum dicit̄ ꝙ apta augere fluxū ſunt vitāda: dicit̄ ꝙ nō oīa q: illa que mali humoris fluxum ſunt apta augere ⁊ nō boni īmo boni eūatiōeꝫ ꝓhibēt: iſta nō ſunt in iſtis corpibꝰ cauēda. Et iō in ꝑcēdētibꝰ capitulis nō dixit de digōe ⁊ aptiōe viaꝝ q: mollē hñs vētrē nō debeat eā facere: ſꝫ bñ de his ꝑ q̄ corpus mollificat̄ vt ī principio precedētis capituli patuit.

Solutorio nāqꝫ vētris alicuiꝰ talis qualis ē iſte res admiſcēda eſt in qua ſit virtꝰ vomitiua ne ꝓperet deſcēdere de ſtomaco añq̄ꝫ ſuā ꝑficiat opationē: īmo equent̄ in ipſo duaꝝ medicinaꝝ virtutes ⁊ perficiat vētris ſolutiua opationē ſuā ⁊ vomitiua ſuā ecōuerſo illius.

Scias ꝙ ille textus q dicit: īmo equētur in ipſo duaꝝ medicinaꝝ virtutes exponit̄ equētur. i. iuuātur. ſ. ꝙ virtꝰ medicine vōitiue facit morari ī ſtomaco medicinā ſeceſſiuaꝫ ne cito ꝓperet ad īteſtina

¶ Hic docet quid ſit faciēdū ī purgādo vētres iſtoꝝ paratorū colirice paſſiōi dicēs ꝙ medicine ſolutiue ventris que debent iſtis exhiberi dꝫ admiſceri aliud in quo ſit virtus vomitiua: ne medicina ꝓperet deſcēdere de ſtomaco āteq̄ꝫ ſuaꝫ ꝑficiat opatiōꝫ: īmo equēt̄ ī ipa duaꝝ medicinaꝝ vꝛtutes ⁊ ꝑficiāt vētris ſolutiua ſuā opatōꝫ ⁊ vomitiua ſuā opatōꝫ. Et pro declaratiōe iſtius regule dubitat̄.

Utrum in paratis colirice paſſioni

ſit

ſit permiſcēda medicina vomitiua cū ſolutiua vētris. Ad partē negatiuā arguit̄. Jlla nō ſunt permiſcēda que faciunt eūationē laborioſam: ⁊ ꝑturbāt oꝑatiōes. Sꝫ iſta ſūt huiuſmōi ergo ⁊c̄. Maior patuit ſupra: vbi dictuꝫ fuit ꝙ cōpoſitio medicinaꝝ ſoluētiū diuerſo tꝑe ob iſtā cāꝫ ē mala. ⁊ minor pꝫ q̄ꝛ iſta faciūt diuerſos mot⁹. vna vomituꝫ: alia fluxū. ¶ Cōfirmat̄: illa ꝑmixtio ē agitatiua ⁊ turbulatiua que de facto facit mot⁹ in ꝯtrarias ꝑtes: ſꝫ permixtio ad modū Aui. ē huiuſmodi: ergo ⁊c̄. Minor pꝫ in l̄ra. naꝫ Aui. vult ꝙ equal̄r miſceat̄ vomitiuū cum ſolutiuo ita ꝙ vterqꝫ ꝑficiat oꝑationē ſuā: ſꝫ nō ꝑficiūt he due oꝑatiōꝫ niſi ꝑ mot⁹ ī ꝯtrarias ꝑtes: ergo oꝫ ꝙ ꝑ mixtionē ſequat̄ motus in ꝑtes ꝯtrarias. ¶ Scd̄o principal̄r arguit̄ ſic. Jlla ꝑmixtio nō ē faciēda ī talibus corꝑib⁹ que ē cā maioris eūationis: ſed hec dicta ē huiuſmodi: ergo ⁊c̄. Maior ꝓbatur q̄ꝛ in iſtis ꝓhibet̄ mollificatio ꝑꝑ timorē ſuperfluitatis fluxus ⁊ ꝓhibet̄ exhibitio medicine ſolutiue vt ſupra ī c. p̄ᵒ ꝓpter eādē cām. Sed in illis ī quib⁹ ꝓpter farmacū timet̄ de ſuꝑfluitate flux⁹ ſeu eūatiōis n̄ ē faciēda ꝑmixtio medicine que ſit cā addēdi fluxui: ergo talis permixtio nō ē faciēda ī iſtis. ¶ Jn oppoſitū ē Aui. hic. Pro dubio nota p̄ᵒ ꝙ ꝑ paratos colirice paſſiōi illos ītelligim⁹ q habēt ſtomacū ⁊ inteſtina lubrica ⁊ nō aliud. ¶ Nota 2ᵒ ꝙ vomitiuū ⁊ ſolutiuū ꝑmiſceri equal̄r pōt ītelligi duob⁹ modis. Un⁹ ē ꝙ tā fortis medicina ſolutiua ponat̄ q̄ꝫ vomitiua. Alius modus ē ꝙ ſint mixta ꝓportional̄r ita ꝙ vomitiua ꝑ ſuā virtutē inclinātē ſurſum ꝓhibeat deſcēſum nimis citū farmaci ad īferiora: ⁊ hoc modo intelligit Aui.

¶ Nota 3ᵒ ꝙ vtrūqꝫ iſtoꝝ ꝑficere ſuā oꝑationē pōt ītelligi dupl̄r. Uno mō vt ſonāt verba. ſ. ꝙ ſolutiuuꝫ ſoluat vētrē ⁊ vomituū faciat vomitū. Scd̄o mō ꝙ vtrūqꝫ iſtorū ꝑficiat oꝑationē ſuā. ſ. illā quā medic⁹ intendit ī hac ꝑmixtione. Et hoc ē q̄ꝛ ſolutiuū trahat mām: ⁊ faciat fluxū ventris ⁊ ꝙ vomitiuū detineat ſolutiuū in ſtomaco ꝑ ſuū motū ſurſuꝫ eleuātēꝫ. Et hoc mō intelligit Aui. ¶ Nota 4ᵒ ꝙ in iſtis paratis colirice paſſiōi ē timor de ſuꝑfluitate fluxus: ⁊ ē timor de defectu. Nā q̄ꝛ inteſtina ſunt lubrica: ⁊ ſtomac⁹ timet̄ ne debilitet̄ ⁊ poſtea recipiat nimiū d̄ mā ⁊ ſint cā fluxus. Et q̄ꝛ nō retinēs aliq̄n medicinā tāto tꝑe qd̄ ſufficit trahere humorē peccantē: iō timet̄ de defectu oꝑatōis: medic⁹ ergo p̄ᵒ reſpcū nō addit ī mollificatione ēt ſi pōt abſtinere. ¶ Quinto nota ꝙ dato farmaco de eius ſolutiōis ſuꝑfluitate nō dubitet̄ aut min⁹ dubitet̄ ad faciēdū ꝙ oꝑet̄ qd̄ ītēdit̄: ⁊ ꝙ humorē attrahat: medicus ꝑmiſcet vomituꝫ ī tanta quātitate ꝙ eſtimet ꝙ non fiat vomit⁹ ſed retētio ſolutiui: ⁊ eo mō ꝙ vna ab ipſis ſequat̄ oꝑatio vltimata. ſ. fluxus ⁊ due īmediate quarū vna ē retētio ſolutiui ī ſtomaco: ⁊ alia ē deſcēſus debito tꝑe ad inteſtina. Et per hoc pꝫ r̄nſio ad dubiū dicēdo ꝙ ꝑmixtio iſta ad modū Aui. ē rōnalis ⁊ faciēda in iſtis corꝑib⁹. Pꝫ etiā r̄nſio ad argumēta. Nā nō fiet cōturbatio ⁊ nō fiēt illi duo motus hūoꝝ. hoc eiꝫ mō ⁊ in tali ꝓportione miſcētur iſte medicine ꝙ vnū faciūt motū hūoris. Pꝫ etiaꝫ ad 2ᵐ principale reſpōſio: q̄ꝛ retentio debito tēpore medicine bene conditionate nō facit fluxuꝫ augere reſpectu debiti ſi eſſet debite quantitatis.

Nota ꝙ operatio medicie vomitiue ē duplex. Una ē facere vomituꝫ: ⁊ de hac n̄ intelligit̄ hic. Alia ē facere merā ſiue ſubleuationeꝫ medicine ſeceſſiue in ſtomaco ⁊ ſic ītelligitur hic. hec Gentilis.

Trauli quoqꝫ ſunt ex eis qui colirice paſſioni ſunt apparati: fortē igitur non tollerāt medicinaꝫ: ipſorū tamen plurimi coliricā iucurrūt paſſionē ex reumatiſmis ſuorum capitum.

¶ Modo declarat per vnū ſignū quedā corpora eē parata colirice paſſiōi ad ſenſuꝫ datū: dicēs ꝙ trauli ſunt parati colirice paſſiōi: ⁊ iō plurimi eorū non tollerant forteꝫ medicinā. Paratio aūt ē ꝓpter reumatiſmos ſuoꝝ capitū. ¶ Ubi nota ꝙ trauli ſunt illi qui ſunt īpotētes ad exprimēdū hāc ſillabā tra. ⁊ hoc ꝓpter ſue lingue ⁊ neruoꝝ hūiditatē cuius ſignū ē ꝙ in pueris quouſqꝫ nō ſint exiccati etiā ē difficilis ꝓlatio. ¶ Nota 2ᵒ ꝙ plurimū cā nimie hūiditatis taliū neruoꝝ ē humiditas cerebri. Ex quo pꝫ ꝙ iſti vtplurimū incurrūt reumatiſmos. i. fluxus materierū de capite ad ſtomacū. Jſte aūt humide mãe debilitant digeſtiuā ⁊ retētiuā ſtomaci ⁊ inteſtinoꝝ: ⁊ iō faciūt iſta mēbra ſuſceptiua ab alijs. vnde Hypo. 6ª ꝑticula dixit: Trauli a diaria maxime capiūtur lōga. ¶ Sequit̄ 2ᵒ ꝙ iſtos dicit paratos colirice paſſiōi qui ſunt habētes lubricū ſtomacū ⁊ īteſtina nō ꝓprie ſumēdo coliricā paſſionē: vt diximus in. c. 3ᵒ ſupra. ¶ Sequit̄ 3ᵒ ꝙ nō ſolū traulos ſꝫ quoſcūqꝫ alios quos cognoſcim⁹ habere vētrē lubricū cauere debem⁹ a fortibus ſolutiuis. ¶ Dubitat̄ tamē hic: vtrū quēadmodū in paratis ad fluxū permiſcem⁹ vomitiua: ita ī ꝑꝑatis ad vomituꝫ ꝑmiſcēda ſint ſeceſſiua: ⁊ dicit Dy. ꝙ ſic per ſimilē ratiōeꝫ. ¶ Ego aūt puto ꝙ ꝑ vomitiua intelligim⁹ illa q̄ agitāt verſus ſupi⁹ ſicut verbigſa decoctio. rafani aut ſemis ei⁹. Nō auteꝫ illa ſolutiua de proprietate quorū ē cū violētia trahere vt dicit̄ ſupra: ⁊ ſic puto ꝙ cū vomitiuo ei⁹ qui facile vomit ꝑmiſcēdū ē ꝙ prohibeat vomitū qd̄ multomeli⁹ fit cū ſtipticis, ⁊ rebus boni ſaporis q̄ꝫ cum ſolutiuis. Et iō infra in caplo de vomitu nihil dicetur.

Nota ꝙ medicia dicit̄ forꝭ vel q̄ꝛ euacuat multos humores: vel quia eūat humoreꝫ groſſuꝫ ⁊ viſcoſuꝫ: modo lꝫ trauli nō egent forti medicina rōne quātitatis humoꝝ: egent t̄n medicina forti ratiōe groſſitiei ⁊ viſcoſitatis eorum.

Ex cā preterita timoroſa ē vt medicina vētris ſolutiua ſumat̄ fece in ītellinis exiſtēte ſicca: īmo expellēda ē ſalteꝫ cuꝫ cliſteri aut iure mollificatiuo.

¶ Ponit 2ᵐ cañ. dicēs ꝙ vna cā ē timoroſa dare ſolutiuū ventris fece in īteſtinis exiſtēte ſicca: ⁊ iō oꝫ vt fex illa aut cū cliſteri eūetur: aut cū aliquo iure mollificatiuo: ſicut verbigſa: cauliū: aut galli: aut mercurialis: aut volubilis: aut prunoꝝ: aut caſſiefiſtule ⁊ taliū lubricantiū. Cā aūt prime ꝑtis cañ. ē q̄ꝛ fex ſicca oppilās īteſtina ⁊ nō exiens celeriter ē cā ꝙ mali humores ⁊ agitati quos oꝫ expelli non expellūtur: ⁊ iō q̄nqꝫ regurgitāt ad ſupiora. ſ. ad ſtomacū ⁊ ſunt cā maloꝝ accidētiū. 2ª pars ſatis pꝫ: quia in iſtis mollificātib⁹ ē preꝑatio inteſtinorū: vt ꝑ ipa facil̄r fiat trāſit⁹: ⁊ nullo mō feces retineant̄: īmo per ipa habilitent̄ ad motū ⁊ exitū. Cliſtere aūt cōueniēs ē q̄n materia eſt in inferioribus inteſtinis: mollificatiuuꝫ in potu quādo in ſupiorib⁹: ⁊ cliſtere ē ſecuri⁹. Et ſi oꝫ reiteret̄. Acuta aūt cliſteria ꝯmouēdo celeriter feces ſunt ī cāu iſto periculoſa faciēdo intollerabiles dolores: debēt eē ergo mollificatiua vt dicit̄ 3ᵒ tegni: ⁊ dicit̄ ēt 16ª tertij ⁊c̄.

Balneū quoqꝫ ingredi antequā ventris ſolutio fiat aliquātis dieb⁹ eſt ex eis que bene preparāt niſi aliquid ꝓhibuerit: ⁊ oꝫ quidē vt inter balneū ⁊ hauſtū medicine paruū īteruenīat tp̄s: poſt medicinā quoqꝫ nō ingrediat̄ quis balneū q̄m trahit materiā ad exteriora: ⁊ neqꝫ eſt bonū niſi ad ventrē ꝯſtringēduꝫ p̄ter in hyeme: q̄ꝛ nō eſt timēdū primā balnei caſaꝫ igredi tali modo ne calor ſit vllo modo ipediēs ad attrahēduꝫ ſꝫ ſit ad mollificāduꝫ. Et ad vltimū oꝫ vt aer illius qui farmaciā bibit ſit caliditatis pauce ne ſudorē faciat neqꝫ turbatiōeꝫ quoniā hoc eſt ex preparatorijs.

¶ Ponit hic cañ. 3ᵐ in vſu balnei: ⁊ ſunt quattuor regule. Prima ꝙ ingredi balneū aliquātis dieb⁹ anteq̄ꝫ ſumat̄ medicina vētris ſolutiua eſt ex eis q̄ preparāt b̄n niſi aliqd ꝓhibeat. Scd̄a regula ē ꝙ oꝫ ꝙ inter īgreſſuꝫ ⁊ ſtationē in balneo ⁊ hauſtū medicine paruū tp̄s interueniat. Tertia regula eſt ꝙ nō dꝫ īgredi balneū poſtq̄ꝫ medicina eſt aſſūpta: q̄ꝛ balneū trahit mām ad exteriora: ⁊ nō eſt bonuꝫ niſi ad ꝯſtringēduꝫ ventrē preterq̄ꝫ in hyeme: q̄ꝛ tūc non eſt timēduꝫ īgredi primā caſaꝫ balnei tali mō ne calor balnei īpediat attractionē farmaci per ſuā tractionē ad exteriora: ſed b̄n iuuat ad mollificāduꝫ. Quarta regula ē ꝙ aer illius q ſumpſit farmacū dꝫ eē calidus pauca t̄n caliditate: ita vt nō faciat ſudare nec turbet corp⁹ faciēdo eſtuationē: ⁊ cā ē q̄ꝛ aer hoc mō calidus ē ex ꝑꝑatorijs. ¶ Ubi nota ꝙ balneū de quo hic loquit̄ ē balneū aque dulcis calide: ⁊ ī vſu ei⁹ ante farmacū ē vtilitas ſubtiliādi humoreꝫ ⁊ vtilitas aperiēdi vias ⁊ vtilitas mollificādi īteſtina ⁊ ſtomacū. Et iō ſi aliud nō fuerit ꝓhibēs erit de bonis ꝑparatorijs. Dies aūt iſti debēt eſſe ſꝫ Haliabatē duo aut tres aut q̄ttuor: ⁊ in hoc debēt ſtare ī arbitrio boni medici ſm q̄litatē corporis ⁊ hūoris. Jmpediētia aūt vſuꝫ balnei pn̄t eſſe multa: vt aſma ſincopis plurima plenitudo ꝯgelatoꝝ ī capite humoꝝ epilenſia ⁊ ſimilia. Raſis aūt 6ᵒ ꝯtinentis auctoritate Gal. dicit hoc mō: Aliquātis dieb⁹. Scd̄a regula clauſit duo. p̄ᵐ ꝙ ſtatiꝫ egredienti balneū nō dꝫ dare medicina. 2ᵐ ꝙ paruū dꝫ īteruenire tp̄s. Cā primi ē vt quieſcat mot⁹ ad exteriora ⁊ corp⁹ reficiat̄ a tedio balnei. Cā aūt ſcd̄i eſt vt medicina det̄ anteq̄ꝫ humores iteꝝ coagulent̄ aut vie īdurent̄. Et ſi querit̄ quātuꝫ tp̄s dꝫ eſſe īter balneū ⁊ potionē medicīe: dico cū Raſi 6ᵒ ꝯtinētis. ꝙ dꝫ eſſe media hora. vñ dixit dico ideo vtēdū eē balneo añ laxatiuuꝫ ſpacio medie hore. Cā tertij eſt clara: q̄ꝛ trahendo ad exteriora īpediret opus medicine. ⁊ iō cuꝫ fuerit aer fridus aut tꝑate calidus ita vt nō fiat ſudor nec eſtuatio: ē de his q̄ nō ꝑmittunt euaporare medicinas ⁊ humores tenere fluidos ⁊ poros aꝑtos. ⁊ hoc voluit quarta regula.

Pro hoc vide Meſue in tertia intentōe. c. iij. canone. iij. de cōſolatione medicinaꝝ parapho jᵒ. Uulgares aūt qui nō ſunt periti artꝭ ⁊c̄. ⁊ plura alia de hoc ⁊ ibi lege.

Fricatio quoqꝫ ⁊ ex oleis īungi ē ſil̄r ex ꝑparatorijs.

¶ Jſte eſt quartus cañ. in quo dicit Aui. ꝙ fricatio corporis ⁊ inunctio ex oleis ꝑparāt corpus ad acceptionē farmaci ſubtiliādo humores ⁊ mollificādo vias.

Cuꝫ auteꝫ aliquis medicine aſſuetus nō ē neqꝫ eaꝫ bibit: melius eſt medico vt ſibi caueat ne vētris ſolutiua violentas virtutes habētia ei tribuat.

¶ Hic ponit cañ. limitatos ad q̄ſdam corꝑis maneries. Et diuidit̄ in tres ſicut tres regulas ponit. 2ª ibi: faſtidiū. 3ª ibi: illi vero qui. ¶ Dicit p̄ᵒ ꝙ ille q nō eſt aſſuet⁹ aſſumere farmacū: ita ꝙ nō ſcim⁹ q̄uo tollerat oꝑationē eius melius ē ꝙ medicus nō det medicinas habentes violentas virtutes. Et cā eſt clara ſatis ſupra.

Faſtidiū vero hn̄tibus ⁊ humores viſcoſos ⁊ ī ipocūdriis tenſionē aut qui in ſuis interiorib⁹ habet inflāmatōeꝫ aut oppilatiōes: nō eſt dāduꝫ aliquid donec iſta rectificetur nutriētibus mollificātib⁹ ⁊ balneo ⁊ requie ⁊

e

UVA. BHSC. IyR_006_1

dimiſſione eius qđ mouet ⁊ eius qđ inflāmat.

¶ Hic eſt 2ᵒ cañ. quo ꝯprehēdit quinqꝫ diſpoſitões corporis: quas ſi habeat aſſūpturus farmacū aut aliquā earū oꝫ primo illas corrigere: ⁊ ſunt faſtidiuꝫ viſcoſitas humoruꝫ: tenſio ipocūdriorꝫ: inflāmatio in interiorib⁹ ⁊ oppilatio. Corrigunt̄ auteꝫ quinqꝫ adiutorijs hic narratis. ſ. nutrientib⁹: humectātibus: balneo: requie: dimiſſione ei⁹ qđ mouet qꝛ motus īpedit digōneꝫ: ⁊ dimiſſione eius qđ inflāmat ⁊ precipue ꝓpter periculuꝫ de putredine aut oppilatiõe. ¶ Ubi nota pᵒ ꝙ ꝑ faſtidiuꝫ ītelligere debem⁹ repletionē cibi facientē nauſeā aut abhominatōem cibi. Sꝫ tēſio ſub ipocūdrijs ſignificat humores groſſos viſcoſos in venis primis q ſunt rami porte ⁊ ꝙ ipſi vētoſant̄. Inflāmatio in īteriorib⁹ aut eſt cū apoſtemate aut ſine apoſtemate collecto in vno mēbro determiato. Et tu ex hoc vides ꝙ ī oībus iſtis caſib⁹ ē aut humorꝫ cruditas aut viarꝫ clauſio. Mđ ꝑ regulas ſupra poſitas iſta ſūt remouēda añ dationē farmaci. ¶ Scđo nota ꝙ Aui. hic dedit ea q̄ hec corrigūt ſine nocumēto: vt cuꝫ iſtis. ſ. cibo mollificatiuo ⁊ balneo ⁊ quiete ⁊ dimiſſione inflāmationis faciētiuꝫ periculum dictū: ⁊ cuꝫ hoc reſoluētiuꝫ ſubtile ⁊ dimittētium groſſuꝫ: tñ qñqꝫ iſta nō ſufficiūt. vñ Gal. 4ᵒ de regimīe ſanitatis in hñtib⁹ crudos humores ſm primas venas dedit dyatriton pipereon ſimplex. In hñtib⁹ autē ſm venas vlteriores dedit dyatriton pipereon farmacoſum. In his aūt qui hñt in toti⁹ ambitu hoc dedit dyacalamētuꝫ: ⁊ ita medicus qñqꝫ facere dꝫ. ¶ Nota 3ᵒ ꝙ dicit īflatio in iteriorib⁹ ⁊ pōt dici īflāmatio. nam vtrūqꝫ indicāt ꝙ nō fiat fortis laxatio cuꝫ farmaco: qꝛ motus īflāmat. ⁊ qꝛ habentibus apoſtema in interiorib⁹ difficile ē ſoluere: vt dictuꝫ eſt in p̄cedēti caᵒ. Et ponit̄ hec ſnīa a Raſi 6ᵒ ꝯtinētis auctoritate Gal. In hac forma ī qōnibus affo. dicit ꝙ ſi volueris ſequi laxationē nō dꝫ fieri laxatio in quib⁹ eſt morbus de ſacietate nauſeatiua ⁊ de nutrimētis groſſis ⁊ viſcoſis: ⁊ ī quo fuerit extenſio in locis que ſunt ſub ipocūdrijs aut īflatio: aut ſi loca ipſa fuerint intenſe caliditatis: aut ſi in aliqua parte vētris fuerit apoſtema aut humores groſſi: aut ſi meatus fuerint oppilati.

Sciās ꝙ tēſio ſub ipocūdrijs. ſ. in locis ſub coſtis aliqñ fit ex groſſa īflatiua vētoſitate cuꝫ humiditate mixta: vt vult Gal. quarta ꝑticula afforiſmorū ꝯmēto illius affo. Quibus ipocundria ſuſpenſa ſunt ⁊c̄. ⁊ hec ventoſitas dupl̄r īpedit opus farmacie. Prio qꝛ ſubleuat farmaciā ſurſuꝫ ⁊ non ſinit eā inferius labi ad inteſtina. Scđo quia torquet vias ſeu meatus ipocūdriorūꝫ: quare nō pōt virt⁹ medicine libere trāſire nec ēt humores trahēdi per eā: quare ⁊c̄.

Illis vero qui ſtātes bibunt aquas: ⁊ habētib⁹ ſplenes fortes medicine ſunt neceſſarie.

¶ Hic ē terti⁹ cañ. ī quo dicit ꝙ illis q bibunt aq̄s ſtantes vt puteales ⁊ lacunales: ⁊ ſilr patientib⁹ ſplenes groſſos fortes medicīe ſūt neceſſarie. Cā eſt clara qꝛ iſti habēt groſſos humores eūandos: ⁊ iō īdigēt farmaco forti iuxta ea que dicunt̄ ī ꝯmēto afforiſmi: Melācolicorꝫ ⁊c̄.

Cūqꝫ aliquis medicinā vētris ſolutiuā biberit: meli⁹ erit ei ſi medicīa fuerit fortꝭ vt ſup eā dormiat añq̄ꝫ opet̄ qm̄ opabit̄ meli⁹: ⁊ ſi debilis fuerit meli⁹ erit ei ne ſuper eā dormiat qm̄ nā digēt mediciaꝫ. Cū aūt medicia opari cepit meli⁹ erit ei ne ſup eā dormiat quocūqꝫ mō fuerit

¶ Hic ponūtur cañ. de his que faciēda ſunt poſt aſſumptionē farmaci. ⁊ pᵒ de faciēdis añ cōplemētū eūationis. 2ᵒ de faciēdis poſt eūationē. 2ᵃ ibi: oꝫ p̄terea. Prima diuidit̄ in tot partes: quot ſunt cañ. Primus ergo cañ. ē de vſu ſomni poſt aſſumptiōeꝫ farmaci. Et dicit ꝙ ſi medicina ē fortis melius ē ꝙ dormiat ſup eā antequā operetur: qm̄ meli⁹ opabit̄. ⁊ ſi ē debilis melius ē ꝙ non dormiat: qm̄ digereret eā ſi dormiret ſup eā. ſed poſtq̄ꝫ medicia cepit opari melius eſt ne dormiat quocūqꝫ mō fuerit ſiue fuerit fortis ſiue debilis. Cā primi ē vt medicia bñ actuet̄ reuocato calore ad interiora ꝑ ſomnū. ⁊ 2ᵒ qꝛ humor meli⁹ trahit̄ ad medicinā. ⁊ 3ᵒ qꝛ humor corrigit̄ ꝑ calorē retractū ad interiora. ⁊ 4ᵒ qꝛ malicia venenoſitatis medicīe mitiget̄ a calore naturali fortificaio in ſomno. 5ᵒ vt quieſcat hō ab abhoīatione ſaporis medicīe qui cū eructuat ꝑ ſuū ſaporē ſurſuꝫ aſcēdit ad os: ⁊ a doloribus ꝑꝑ ſtupefactiōꝫ ſenſus in ſomno. Cā ſcđi dicti ē qꝛ medicīa debilis digerit̄ a nr̄o calore ⁊ nō opat̄ vt medicia poſtq̄ꝫ digeſta ē. Sꝫ ſi dicat̄ ꝯtra qꝛ ī cura egritudinū capitꝭ p̄cipit̄ ſomn⁹ poſt medicias debiles: vt pᵃ tertij. c. illo. Cū mām purgare ⁊c̄. Hic dicit̄ ꝙ medicia pōt dici đbilis aut fortis duob⁹ modis. Uno mō ī cōpatiōe ad eūationē quā hꝫ facere: ⁊ hoc mō illa que plus eūat aut hūorē magis reſiſtētē dicit̄ fortis. 2ᵒ mō ī reſiſtēdo calori nāli trāſmutāti ipaꝫ: ⁊ hoc mō loquit̄ Aui. hic. Accidit aūt vt plurimū ꝙ medicīe q̄ ſunt fortis virtutis ī eūando ēt ſunt fortes ī reſiſtēdo calori ⁊ īdigeſtibiles ⁊ ecōtra: ſꝫ tñ nō ſemꝑ: vñ lꝫ aloes ſit đ debil̄r ſoluētib⁹ fortiter tñ reſiſtit calori ⁊ ꝓhibet ſui diſſolutionē ⁊ corruptiōeꝫ ⁊ cōuerſiōꝫ ī chilū. Aui. vero loco allegato pᵃ tertij p̄cepit ſomnuꝫ ſuꝑ debiles mō primo: tñ ſunt fortes ad ſenſuꝫ Aui. hic. Cā aūt qꝛ nō ē dormiēdū poſtquaꝫ medicina īcipit opari ē qꝛ ex ſomno īpediret̄ opatio. Naꝫ materias ad vētrē ⁊ inteſtīa delatas virt⁹ ſenſitiua nō ꝑciperet: ⁊ ſic nō ſtimularet̄ expulſiua. Accidit ēt ꝙ muſculi vētris qui iuuāt ad expulſiōeꝫ ſunt tūc ꝓhibiti ab operatiōe. Et hoc intelligat̄ vbi nō intēderem⁹ ad reſtringendū. Qđ ſi querat̄ vtrū cōpleta opatiōe farmaci ſit dormiēdum: dictum ē in precedēti caplō.

Ampli⁹ cū aliquis medicinā bibit nō illico ſuꝑ eā ſe mouē dꝫ ſꝫ dꝫ ſuꝑ eā quieſcē vt ipaꝫ nā circūdet ⁊ in eaꝫ opet̄: qm̄ niſi nā ī ipſa opata fuerit: n̄ opabit̄ ipſa ī nāꝫ

¶ Iſte ē ſcđs cañ. ꝙ cū aliquis bibit medicinā nō ſtatim ſe debet mouere ad hoc vt calor circundet medicinā: quoniā ſi calor nō opet̄ in eā ipa nō opabit̄ ī materiā. Et ꝯſtat ꝙ hoc ē verꝫ de medicis attractiuis ī potētia: ſꝫ q̄ ſunt attractiue actu n̄ oportet ꝙ calor agat ī eas. Bonū ē tñ ſuꝑ illas quieſcere ne expellat̄ cito a corꝑe vt melius trahāt.

Ratio Gētilis eſt iſta. nam ſiue natura ſtomaci digerat ſiue alteret: dꝫ medicinaꝫ ꝯplexare ad hoc vt actuet̄: modo ſi fiat motus poſt aſſūptionēꝫ medicine ſubito non amplexat̄ eā: iō nā nō agit in medicinam nec ecōuerſo: ſed poſtq̄ꝫ opari cepit moue corp⁹ qꝛ agitātur humores ⁊ melius educunt̄. Cōuenit ēt quies in hoc nō ſolum ꝓpter cāꝫ dictā: ſed etiā vt non agitet̄ os ſtomaci ne euomat̄ medicia ſūpta: ⁊ eſt quieſcēduꝫ nō ſolum quietē corporis ſed ēt aīe: motus eiꝫ aīe ſic diſtrahūt nām a reductōe medicine ad actū ſicut motus corporis quare ⁊c̄.

Odores quoqꝫ nauſeā ꝓhibētes olfacere dꝫ ſicut ē odor mēte ⁊ rute ⁊ apii ⁊ cytoniorꝫ ⁊ boli coraſceni aqua roſacea ⁊ pauco aceto aſꝑſi. ⁊ ſi ex odore medicīe quis exterrit̄ cū medicinā bibit nares ꝯſtrigat. ⁊ qui mediciaꝫ abhorret dꝫ maſticare parꝫ ex tarchon iō vt ſui oris vel odoris virt⁹ ſtupida fiat. ꝙ ſi vomē timuerit extremitates ꝯſtrigat: ⁊ cū ipſaꝫ biberit deſuper rē ſtipticā bibat.

¶ In iſto cañ. docet Aui. qd faciēdū ad hoc vt medicia melius retineat̄: ⁊ ſunt quinqꝫ. Primus ē ꝙ olfaciat odores ꝓhibētes nauſeā ſicut ē odor mēte ⁊ rute ⁊ apij ⁊ citoniorū ⁊ boli aſꝑſi aqua roſata ⁊ aceto pauco ne. ſ. aque roſe occultet̄ odor. Scđs ē ꝙ ſiquis terret̄ ex odore medicīe tūc cū ipam bibit cōſtringat nares. Tertius ē ꝙ ſiqs abhorret medicinā in ſapore maſticet pri⁹ parū ex tarcon vt ſui oris virt⁹ fiat ſtupida. Quar⁹ ē ꝙ ſiquis timuerit vomere cōſtringat extremitates cū ſtrictura doloroſa. Quītus ē ꝙ in iſto cāu bibat ſuꝑ medicinā aliquid ſtipticū ſicut citonij ſuccū aut aliud. ¶ Circa pᵐ dictuꝫ nota ꝙ ex odore delectabili ꝓhibet̄ abhoīatio. ⁊ cā ē qꝛ odor ſubordinat̄ guſtui: ⁊ abhoīatio ⁊ eius ꝓhibitio fit per habitudinē ad guſtū ⁊ ſequit̄ multitudinem odoris. ¶ Nota 2ᵒ ꝙ hic ponūtur plurima vt eligat̄ illud qđ patiēti ē placidius ⁊ cōmodius: vnde ponūtur calida ⁊ frida ī littera. ¶ Circa 2ᵐ pꝫ cā. ¶ Circa 3ᵐ nota ꝙ tarcon ē herba ſimilis multū ſaturegie ⁊ thimo ī aſpectu ⁊ in ſapore ⁊ ē cal'a. In ea tñ ē virtus quedā ſtupefactiua: vt dicit̄ 2ᵒ cañ. c. ꝓprio. ⁊ eſt infridatio quedā. ex quo dat̄ ītelligi ꝙ ſtupefactio ſua ē ꝑ partē frigidam ī eo ſicut ī filonio ⁊ tyriaca noua. Sꝫ vtrū calidū poſſit ſtupefacere ē queſtio alia. ¶ Circa 4ᵐ dictū cōſtat ꝙ dolor facit min⁹ ſentire nocumentū medicine iuxta affo. Duorꝫ dolorꝫ ⁊c̄. ¶ Circa 5ᵐ nota ꝙ dū aliquid de ſubſtātia medicīe abhoīabilis adheret meri: melius eſt ſumere abſterſiua ⁊ ſtatim cōſequenter adhibere ſtiptica.

Medici p̄terea pill'as quas ei daturi ſūt qñqꝫ ī melle voluūt ⁊ qñqꝫ ſuper eas ꝓiiciūt mel aut zuccarꝫ coctū donec eis ide faciāt tunicā. Ex eo quoqꝫ qđ ē igeniū vtile: ē vt ſuper eas ponat̄ cera cū pauco oleo mollificata. Et ex eo qđ ē magis ꝯueniēs igeniū: ē vt os aq̄ aut alia re ipleat̄: deide pillule ſicut ſūt bibant̄ ſuper ipſaꝫ: aut q̄ aliquo horꝫ ingeniorꝫ aptate fuerint: tranſglutient̄ itaqꝫ oēs ita ꝙ medicine operatio nō cognoſcetur.

¶ Dat modū cōſequēter ſumendi pillulas ad prohibēdū abhomiationē: ⁊ ſunt quattuor modi poſiti. Primo ꝙ īuoluant̄ in melle. Scđo ꝙ ſuper ipas ꝓijciat mel aut zuccarū coctuꝫ: ita ꝙ fiat eius tunica ſicut ī coriādro ꝯfecto. Tertio ꝙ ex cera ⁊ oleo fiat ei⁹ tunica: ⁊ dicit notāter cum oleo: qꝛ ſi cera ponat̄ ſola pillule nō opant̄: qꝛ cera nō facile diſſoluit̄. Sed quādo ē cū oleo facile diſſoluit̄. 4ᵐ ē ꝙ os repleat̄ aqua vel aliquo alio ſicut iulep aut vino: vt poſſint pillule cū illo trāſglutiri. nā tūc trāſglutient̄ omēs et nō percipiet̄ medicīe ſapor.

Et oportet vt apozima tepidū bibatur ⁊ pillule cuꝫ aqua tepida ſumantur.

¶ Docet qūo ſumit̄ apozima ⁊ qūo pillule: dicēs ꝙ apozima ſumat̄ tepidū ⁊ pillule cū aqua tepida. ī. leuis caliditatis: ⁊ hoc qꝛ frigiditas impedit opationē medicine attractiue. Per apozīa ergo ītellige oē qđ ī forma liqda ſumit̄ ī quo virtutes medicinarꝫ ꝯtinētur. ⁊ debꝫ ſumi caliduꝫ ⁊ non tepidum: quia tepida diſſoluunt robur ventris niſi ītendamus vomitum.

Frigidi preterea ſtomacus ⁊ pedes calefaciēdi ſunt. Cūqꝫ ipſi⁹ aīa fedata fuerit āmbulet ⁊ moueat̄ paulatiꝫ: qm̄ motus hic eſt iuuatiuus. Et iterpoſitione horarꝫ ex aqua calida tātuꝫ bibat ꝙ medicinā nō liquefaciat ⁊ expellat ipſaꝫ ⁊ eius debilitet virtutē niſi fuerit in hora qñ neceſſe eſt vt vētris ſtringatur ſolutio. In potu quoqꝫ aque calide malicie medicine exiſtit debilitatio.

¶ In iſto. §. ponit quedā reſiſtētia vomitui: licꝫ ēt alias habeāt vtilitates: ⁊ ſunt tria. Primū ē ꝙ ſi ſtomac⁹ aut pedes ſunt frigidi calefiant cū igne ⁊ pānis ⁊ alijs modis ⁊ fricatione. 2ᵐ ē ꝙ cū fuerit ſedata aīa eius. ī. cū abhominatio vel ſubuerſio aīe ceſſauerit bonuꝫ ē vt paulatiꝫ moueatur leuiter ambulādo: vt moueat̄ medicina ad funduꝫ ſtomaci deſcēdēdo ⁊ ꝓhibeat̄ vomitus. poſt hoc ēt ē iuuamentum

UVA. BHSC. IyR_006_1

mētū cõmouēdi leuiter humores vnde facilius trahūtur a medicina. 3ᵐ ē ꝙ interpoſitis quibuſdā horis bibat ex aqua calida: ſupple nõ multū: ſed paꝝ: ita ꝙ nõ liquefaciat medicinā: ⁊ ꝙ nõ expellat ipam: ⁊ ꝙ nõ debilitet eiꝰ virtutē niſi fuerit ĩ hora qñ neceſſe ē vt ſtringat̃ vēter. Et addit ꝙ in aqua calida ē virtus debilitādi malitiā medicie.

¶ Ubi nota ſm ſniam Hypo. ⁊ Gal. 2° regimīs acutorū ꝙ ſepe cū ē fortis abhoīatio vel ſit inclinatio ad vomitum accidit rigor ⁊ frigus extremitatū ⁊ ſit in calore retractio ad cor ꝓpter cõpaſſionē ſtomaci: tūc ergo calefiant pedes ⁊ ſtomacꝰ vt trahat̃ calor ad exteriora ⁊ ad ſtomacū. nam nimis debilitaret̃ ſtomacus a farmaco ſi calor nālis nõ reſiſteret: ⁊ debilitata ſuperiori ꝑte ſequeret̃ vomitus ⁊ alia mala accidētia: vt pȝ. Dinus aūt vult ꝙ hoc tpe calor trahit̃ ad interiora ad expellēdū nociuū ⁊ ꝙ ꝑ calefactionem iſtorū locoꝝ ducit̃ ad interiora vñ nõ expellit̃. ⁊ vult cõſequēter ꝙ in hoc cāu ſtomacꝰ ē infrīdatꝰ quoad ꝑtes exteriores nõ quoad interiores ad quas calor eſt attractus: ⁊ tu dic iſto mõ ſi placet. ¶ Circa 2ᵐ nota ꝙ hic motus nõ ſit ĩ prīn° vt nā bene āplectat̃ farmacū: ſed cū iā ſedata eſt aīa nec tantū timet̃ de agitatiõe farmaci: quia deſcēdit ad funduȝ cõuenit motus de quo dixit ꝑꝑ cāȝ dictā. ¶ Circa 3ᵐ dubitat̃ de aqua calida ſumēda in potu: videt̃ ꝙ nõ ſit verū: qꝛ Hypo. ⁊ Gal. 2° regi. acu. volūt ꝙ poſt potuȝ farmaci quilibet alius potus ĩterdicatur. Scđo quia poſt potū apozimatis ⁊ liquide medicine nõ videt̃ quid faciat iſta aqua niſi nimiū mollificare: ⁊ ſic facit ad exitū accelerare medicinā. ¶ Ad dubiū dicit̃ ꝙ poſt aſſumptõȝ medicine tria cõſideramꝰ tꝑa. Unū ē tempꝰ dū actu eūat: ⁊ nõ incipit ſuperfluere. Scđm ē tp̄s antequā ĩcipiat eūare. Tertiū ē tempus qñ ſufficiēter eūauerit. In tertio tꝑe nõ ē dubiū ꝙ cõuenit potꝰ aque calide ⁊ in notabili quātitate vt lauet corpus a farmaco cū iam nõ indiget eo ⁊ faciat reſiduū farmaci expelli ⁊ frāgat maliciā ſuam ⁊ potētiaȝ ſi qua remāſiſſet: ⁊ debet eē aqua potius q̃ȝ brodiuȝ. In p° tēpore. ſ. dū eūat nõ ē aliquid in potu dandū niſi forte ꝑciperet̃ eius opatio futura violēta ⁊ fortis nimis: tūc eniȝ dandū ē ſatis de aqua calida vt frāgatur virtus eiꝰ ⁊ eliquet̃ ⁊ expellat̃. Sȝ ſi medicina nõ dat ſigna ſuperfluitatis ⁊ difficultatis opatiõis nõ ē aliquis potus dādus. Et hoc volunt Gal. ⁊ Hypo. 2° regi. acu. In 2° aūt tēpore. ſ. añ opationē farmaci conuenit potus pauce aque calide ad tres intētiones. Una põt eſſe ad liquefactionē farmaci: vt fortius ſuas ſpēs multiplicet ⁊ attrahat: ⁊ hoc nõ cõuenit niſi farmacū ſit ſumptū ĩ ſubſtātia dura. Scđa ĩtētio põt eē ad debilitādū ſuā maliciā lȝ nõ intēdamꝰ debilitatem ſolonis vt ſi nimiū ĩflāmaret aut exiccaret: ⁊ hoc cõuenit liquidis ⁊ duris dūmodo malitiā hēant. Tertia intentio ē ad deponēdū partes eiꝰ a ſuꝑiori ꝑte ſtomaci: ⁊ iſta poteſt cõuenire oībus. ⁊ de iſta ꝓprie loquit̃ Aui. lȝ alias nõ neglexerit. ⁊ dȝ aqua ad has intentiões data eē pauca: qꝛ nõ intēdimꝰ ꝙ expellat medicinā: aut eius attractionē debilitet. In tꝑe eīm vltimo multa dȝ eē: ⁊ ſic pȝ argumētoꝝ ſolutio. ¶ Pro his aūt ſenſibꝰ expoſitis textus ē Raſis 6° cõtinetis dicētis auctoritate Gal. 2° regi. acutorū. c. 2° de morbo acuto. Si dederit alicui febricitāti laxatiuuȝ violēter ĩ potu cū ſcamonea helleboro aut ſilibꝰ: da ei ĩ potu poſt illđ de aq̄ ordei aut de ſilibꝰ nutriētibꝰ: qm̄ ĩducit illđ medicinā ad fundū ſtomaci. Et lauādo qđ adheſuȝ fuit iſophago de eo ⁊ ori ſtomaci in bibēdo ꝙ nõ noceat eis cõfert maximā vtilitatē: qm̄ indiget febricitās mūdificatiõe ſtomaci. Sȝ quotiēs ĩcipit laxatiuū agere noli dare đ huiuſmodi rebus ne incidat laxationē. hec Raſis.

Sciasꝰ ꝙ ſi motꝰ fiat cuȝ adeſt nauſea tūc ipa fieret maior: ſȝ ſi ſit pꝰ nauſeā: tūc talis motus vigorat calorē: vnde ſit melius reductio medicie ad actuȝ vel facit deſcendere medicinaȝ đ ore ſtomaci ad fūdum: vnde ceſſat vomitus.

Qui autem medicinam bibere voluerit calide exiſtens complexionis ⁊ debilis cõpoſitionis ⁊ debilis ſtomaci erit ei melius vt eam bibat poſtquā prius biberit aliquid qđ ſit ſicut aqua ordei aut ſuccus granati: aut vt vniuerſaliter dicaȝ cum ſtomacus receperit nutriēs ſubtile ⁊ leue: ſed qui non ita fuerit erit ei melius vt eaȝ ieiunus bibat.

¶ Ponit regulā ĩ qua docet cõueniētē diſpõnez ſtomaci in ſumēdo farmacū ſm varietatē naturaꝝ: ⁊ dicit duo. Primū ē qui vult ſumere medicinā ſolutiuā ſi ē calide cõplexionis ⁊ debilis ſtomaci: melius ē ꝙ p̄mittat potū aliquē qui ſit ſicut aqua ordei aut succꝰ granatorū. Aut ſi dicat̃ vlr̃ in ſtomaco p̄mittat̃ nutriēs ſubtile ⁊ leue. Qui aūt nõ hȝ aliq̃ȝ taliū diſpõnū melius erit vt ea ieiunus bibat. ¶ Circa hūc cañ. nota ꝙ ſtomacus inuenit̃ ieiunus ĩ duplici diſpõne. Una ē qñ membra trahūt ab ipo ꝓpter inanitionē: ⁊ iſta ē hora famis. Alia ē qñ mēbra vicina. ſ. epar recipiūt ab eo chilū de ꝓpe ⁊ paꝝ ante ita ꝙ non attrahit: tūc dicēdū ꝙ prima diſpõ nõ ē cõueniēs ſtomaco ad ſumēdū farmacū ſolutiuū. Nam nimis āplecteret̃ ipm ⁊ nimis alteraret mēbra attrahētia aliquid đ ſubſtātia farmaci ⁊ virtus ſtomaci nimis debilitaret̃: ⁊ ſtomacꝰ nimis diſſolueret̃. In hora autē 2° loco dicta ſtomacus ē vacuus a cibo ſȝ fortis nõ reſolutꝰ nec debilitatꝰ ab attractiõe mēbroꝝ: ⁊ iõ medicina ſatis debite ab eo circundat̃ vt poſſit

Ratio dicti eſt: qꝛ cū ſtomacus ſit debilis: humores colerici currūt ad eū debilitantes ipm: vnde ſi medicina ſumat̃ magis debilitat ipſum. etiā ſtomacus colericus ieiunus multum mordicat̃ a medicina: iõ oȝ ꝙ ſumat aliquid. ⁊ ſilr̃ ē ſi fuerit debilis ꝯpoſitõis: qꝛ multū debilitatur ex multa reſolutõe. hec Gentilis.

ꝯuenienter alterari ⁊ actuari ⁊ ibi nõ ē cibꝰ inuoluens medicinā prohibēs eā ab alteratiõe quā hȝ facere in humorē nec mēbra ipam trahūt. Stomacꝰ etiā ē ſatis fortis vt ꝑcepto nocumēto expellat ipam: ⁊ deponit ipam facilr̃ deorſum. His aūt oībus caſibꝰ ē meliꝰ ſumere medicinā ſtomaco ieiuno qñ aliquid nõ ĩpediat. Sed cū ſtomacꝰ ē calide cõplonis cū ſit vacuus timet̃ ne a farmaco qđ ēt ē calidum nimiū calefiat. Silr̃ ſi ſit debilis qꝛ rare texture timēdum ē ne farmacū nimis ipm debilitet cū occurret ſibi nudo nõ cooperto a cibo: ⁊ ne nimis reſoluat ipm. Et ſilr̃ qñ ſtomacus ē debilis: ⁊ iõ in iſtis caſibꝰ oȝ aliquid eē in ſtomaco ꝑ qđ reſiſtat̃ malis diſpõnibꝰ farmaci. Leuis tñ dȝ eē digõis: vt nõ extrahat̃ a farmaco antequā digerat̃ ⁊ ñ cõuertat̃ in malos humores: etiaȝ ꝙ in qualitate opponat̃ qualitati ſtomaci: qꝛ ſi ſtomacus ſit calidus apponatur cibus frigidus: plurimuȝ tamē quia farmacuȝ eſt calidum: oȝ cibum eſſe frigidum.

Plurimi preterea quibꝰ datur medicina vētris ſolutiua in eſtate ex ea perueniūt ad febrē: oȝ ergo ne medicine potator comedat vel bibat donec medicina ſuā perfecerit operationē: neq̄ȝ etiā quādiu medicina operatur dormiat niſi volūtas affuerit vt reſtringat̃. Qđ ſi ipſiꝰ ſtomacus nõ tollerauerit ne comedat ꝓpterea ꝙ ſtomacus eius ē colericus ⁊ cito deſcēdit ad ipſuȝ colera: aut propterea ꝙ a comeſtione vehemēter abſtinuit ⁊ famē tollerauit: detur ei paruȝ panis infuſi pauco vino ſuper medicinā antequā vēter ſoluatur: quoniā hoc ē ex eo qđ medicinaȝ fortaſſe adiuuat.

¶ Hic ponit regulas ſumptas a tꝑe āni dicens ꝙ plurimū illi qbꝰ dant̃ medicie tꝑe eſtatis veniūt ad febres: ⁊ iõ ſupple cauēda ē: ⁊ hoc ē dictū ĩ precedētibꝰ.

Et hoc euenit ꝓpter ſuꝑcalefactionē ⁊ rarificationē cū đbilitate virtutis ab eſtiuo calore: etiaȝ ꝑꝑ ſuꝑcalefactionē corporis a farmacia que vt in pluribus ē calida ⁊ ſicca: etiaȝ ꝓpter ſuꝑcalefactionē ſanguinis ⁊ ſpiritꝰ ex motu agitato iſtoruȝ: quia calor aeris cū impetu trahit ad exteriora ⁊ virtꝰ medicie ad interiora: quare ⁊c̃.

Oȝ p̄terea ne anus aqua frīda lauet̃ ſȝ cuȝ calida.

Hec ē ſcđa pars ſcđe partis principalis huius capituli in qua docet quid faciēdū ſit poſtq̄ȝ medicīa ſuā ꝯpleuerit opationē. Et diuidit̃ ĩ duas partes. Primo eīȝ facit hoc. 2° redit ad iungēdū plures alios cañ. tā de faciēdis ante farmaci potū q̄ȝ de faciēdis poſt. 2ª ibi: quid etiā. In prīa ponūtur duo cañ. Primꝰ ē ꝙ potator medicine nõ dȝ bibere nec comedere donec medicinā ſuā ꝑfecerit opationē: nec etiā q̄ȝdiu medicina opat̃ dormiat niſi voluerit ꝙ reſtringat̃ opatio. Sȝ ſi ſtomacꝰ nõ tollerat ſtare ſine cibo ⁊ potu vſq̄ȝ ad cõplemētū opatiõis: aut qꝛ ſtomacus ē colericꝰ: aut qꝛ ad ipm cito ꝓperat colera: aut qꝛ multū abſtinuit a comeſtiõe ⁊ tollerauit famē: tūc det̃ ei paruȝ panis infuſi in pauco vino antequā vēter ſoluat̃ ſuper medicinā qm̄ hoc ē fortaſſe ex eo qđ adiuuat medicinā. Scđs cañ. ē ꝙ anus nõ debȝ lauari cū aqua frigida ſȝ cū aqua calida. ¶ Circa ꝑtē primā primi cañ. nota cām canonis eē qꝛ cibus aſſumptꝰ p° obtūdit medicine vigorē ꝑmixtū cū illa. Scđo qꝛ cibus cõueniēs inclinat ſtomacuȝ ⁊ inteſtina ad retētionē. Tertio ſi miſcet̃ cū medicina periculū ē ne medicina ĩpediat eiꝰ opatõȝ vel digõnē: imo ſit cā corruptõis eiꝰ. Quarto ne hūores attracti cibū alterarēt. Quito ſi đ cibo attrrahat̃ aliquid dubitādū ē ne cuȝ illo de medicīa aut de humoribꝰ malis attrhat̃ ad venas. Sexto qꝛ medicina erit cā eiectionis cibi ad ĩteſtina ante digõneȝ.

¶ Sȝ tu poſſes querere hic qūo cognoſcā ꝙ medicīa cõpleuit ſuā opationē? Rñdet̃: per ſigna ſupra poſita ĩ precedenti ca°. ſ. ſitiȝ ⁊ ſomnū ⁊ mutatiões egeſtionū: ⁊ ēt qꝛ ſumens nõ ſentit in eructuatõe ſaporem medicine vt prius.

¶ Sȝ circa tertiā ꝑtē cañ. nota ꝙ ſi ſtomacus ē colericꝰ aut ſi paratꝰ ē vt ad eū ĩ vacuitate currat colera timēdum eſt ne farmaco ꝯplete operante nimiū exiccaret̃ ſtomacus ⁊ traheret humores acutos qui poſtea facerent dolores ⁊ ſincopiȝ ⁊ alia mala accidētia: ⁊ ideo oȝ preuenire ꝯplemētuȝ operatõis farmaci in cibādo vt reſiſtat̃ curſui hūoruȝ colericoꝝ ad ſtomacū ⁊ malis affectibꝰ huiꝰ curſus. Silr̃ ſi ſūpta fuerit medicina ſuper fortē famē: timendū eſt ĩ expectatõe ꝯplemēti operatõis ne đbilitatio nimia accidat: etiā qꝛ nā eſt auara timendū ē ꝙ nõ ꝑmittet hūores eūari: etiā qꝛ ſtomacus ſic caliditate exacuta nõ actuet farmacū debite nec ĩclinet̃ ad ipm expellendū. Et iõ aſſūptio pauci cibi cõfortātis p° ꝓhibet accñtia q̄ eēnt in corporibꝰ iſtis maiora q̄ȝ nocumēta in eiſdē corporibꝰ ſequētia cibi exhibitionē. Cū hoc ēt adiuuat ad hoc vt melior fiat medicine opatio: qꝛ ſtomacus nõ ita retinebit medicinā nec ita alterabit qualitate intēſa nec ꝓhibebit humoꝝ exitū: ⁊ ſtomacus fortificatꝰ ante in tꝑe ſolutõis iuuabit ad expellēduȝ. Qđ vero dicit̃ ꝙ det̃ panis ĩfuſus in vino. cā eſt qꝛ ꝑ paneȝ diu ſtat ibi mā per quā ſtomacus nõ eſt auarꝰ ⁊ ꝓhibet̃ vini nimis cita penetratio. Per vinū aūt ſit ꝙ corpꝰ cito ꝯfortat̃ ⁊ ꝙ panis eliquat̃. ¶ Utrū aūt dāda ſit medicina cū vino ſolet hic queri? Et dicit Dy. ꝙ in his ĩ quibꝰ eſt ſtomacus debilis eſt ꝯueniēs: in aliȷs autē nõ ex cā hic poſita. Et ego puto ꝙ Dy. nõ dicat veritateȝ niſi vbi vinuȝ daret̃ cā nutrimēti ⁊ medicina gr̃a ſoluendi. Sȝ ſi vinum det̃ vt adiuuās virtutem alicuiꝰ medicine: nõ video

UVA. BHSC. IyR_006_1

quare repugnaret plus de vino q̄ȝ ꝺ aqua zuccari cū qua daṫ turbit. Silr ſi medicina ſumaṫ non ſoluȝ intētōe ſoluendi ſȝ etiā alterādi vt deferaṫ medicina ad locum: puto vinū adiūgi ꝯueniēter. vñ Raſis 4° almāſoꝛis vult ꝙ medicina de aloe mirra ⁊ croco ſumaṫ cū vino albo ⁊ odoꝛifero ⁊ calido. de reubarbaro nō ꝑmittaṫ quin deṫ cū eo paꝝ vini albi odoꝛiferi. ¶ Circa 2^m^ cañ. nota ꝙ in extremitate iteſtini multotiēs remanet poſt medicinā aliqs humoꝛ ībibitus aut aliqua ꝑs medicine q̄ multotiēs ſtimulat: ⁊ ſunt cā q̄nq̄ȝ tenaſmonis: ideo lauādus ē locus ꝯpleta opatōe: ſed cū aqua calida qꝛ meli⁹ abſtergit ⁊ qꝛ frigidū ē magis inimicū anō ⁊ cal'm amicū: vt dicit 5^a^ ꝑticula affo. Videṫ tñ Raſis 6° ꝯtinētis alio mō ītelligere ⁊ aliā dare cāȝ: vñ dixit auctoꝛitate Gal. 6° epidimiaꝝ: ꝙ ſumens laxatiuū debet lauare anum cum aqua calida eo ꝙ cōfert eductoriū laxādo. Sed ſi ꝓm laxationeȝ fuerit ſuperabūdans: lauandus eſt cuȝ aqua roſata. hec Raſis.

Scias ꝙ tpe Auic. ꝙ poſt aſſellatiōes ex ſūpta medicina mos plurimuȝ erat: ⁊ maxime nobilium anuȝ lauari cū aqua calida: pꝛio vt mundareṫ a reliquijs ſoꝛdidaꝝ materierū per ipſuȝ trāſeūtiuȝ. 2° vt dulcedine aque ꝓhiberet ab expꝛeſſionibus tenaſmonis ⁊ ex acumine taȝ farmaci q̄ȝ humoꝛū ꝑ anuȝ tranſeuntium. 3° vt actuali caloꝛe aque cōfoꝛtaretur anus: ac ſua humiditate facile obediat eius apertioni: ſed mos iſte nō ſeruatur.

Quidam etiā dixerūt ꝙ pillule que ſunt cuȝ apozimatibus dande: ſunt dāde cum apozimatibus que ſunt cuȝ eis homogenea. Pillule nāq̄ȝ que coleraȝ expellunt rubeā cuȝ apozimate dāde ſūt alicuius qꝺ ſit: verbigratia ſicut fumuſterre: ⁊ que melācoliā euacuāt cuȝ apozimate alicuius qꝺ ſit ſicut epithymū aut polipodiuȝ aut his ſimile: ⁊ que flegma expellunt cuȝ apozimate alicuius qꝺ ſit ſicut centaurea.

¶ In iſta parte ponit plures cañ. de faciēdis partim añ farmaci aſſūptionē ⁊ partiȝ poſt ⁊ ꝑtiȝ ſimul. ⁊ hic tñ non videbo oꝛdinē: ſed diuidiṫ ī tot ꝑtes quot ſūt cañ. ¶ Primus cañ. eſt ꝓm quoſdā: ꝙ pillule q̄ ſunt dāde cuȝ apozimatib⁹ ſint de homogeneis vel ſimilib⁹ in eūando: vt verbigrā ꝙ pillule q̄ eūant colerā nō denṫ cū apozimate fumiterre. ſed pillule q̄ eūant melācoliaȝ cū apozimate epithimi. ⁊ q̄ eūant flegma cū apozimate alicui⁹ qꝺ ſit ſicut centaurea. ¶ Circa cañ. nota ꝑ° ꝙ multis de cauſis dantur pillule cū apozimatib⁹ ſicut multis de cauſis medicīe miſcenṫ adinuicē. Nā q̄nq̄ȝ ꝯmiſcenṫ vt vna coꝛrigat nocumētuȝ alteri⁹: aut vt adiuuet virtutē ſuā: aut vt deducat ad determinatū locū: aut vt faciat ipſaȝ magis acceptabileȝ lȝ hoc ad pꝛimū poſſȝ referri. Qñ ergo hoc aut melius reperim⁹ ī apozimate aut apozima ē placidū: tunc nos damus pillulas cū apozimate. Ego aūt vtplurimū do pillulas cū apozimate ex alia cā. Naȝ qñ intēdo dare apozima qꝺ ꝓpter vnā reȝ īgredientē eſt abhoīale: reȝ abhoīabilē pono ī pillulis ⁊ reliqua do ī apozimate. verbigrā ſi dandus eſt agaricus cū decoctōe ficuū ⁊ reꝝ pectoꝛaliū: ⁊ cuȝ māna vel pulpa caſſie: ego dabo agaricū in foꝛma pillulata ⁊ reliq̄ū foꝛma potabili. Multotiēs ēt cū ītendim⁹ ꝙ attractio fiat a lōginquo: ⁊ tñ indigem⁹ aliquo potu: nō eīm a ꝓpinquo ꝑmiſcem⁹ apozima ⁊ pillulas. Mutotiēs etiā ītendim⁹ hūoꝛis quādā mollificationē cū apozimate vt facili⁹ trahaṫ. Propter ml'tas ergo cās danṫ pill'e cū apozimate: ſȝ q̄nq̄ȝ talia apozimata ſūt ſolutiua q̄nq̄ȝ nō: maxie aūt ſunt ſolutiua qñ ītendimus ꝙ ex ambobus ſit medicina vna ſolutiua ⁊ nō putam⁹ ſolas pillulas ſufficē. ¶ Secūdo nota ꝙ farmaca q̄nq̄ȝ danṫ ī pillulis q̄nq̄ȝ ī potu q̄nq̄ȝ in ꝯfectōe vel electuario q̄nq̄ȝ in puluere vel in trazea. Cā aūt eſt diſpō patientiū: qꝛ quidaȝ non tollerāt potare: q̄dā non ſciūt deglutire pillulas. Quedā aūt medicine ſūt ita abhomīabilis ſapoꝛis ꝙ ab aliquo vix tollerarenṫ. Itē ⁊ eſt magis conſiderāduȝ que danṫ in foꝛma ſolida: diuti⁹ moꝛanṫ antequā diſſoluanṫ: vnde multū poſſūt attrahere: vñ ad hoc cōfert figura rotūda. Et iō pillule dātur qñ ītendim⁹ a lōginquo eūare: apozima qñ de ꝓpe: cōfectiones ⁊ pillulas qñ mediocrē moꝛam querimus. Quia ergo pillule danṫ plurimū vt moꝛā trahāt: cōiter apozima dȝ ſequi pillulas notabili tēpoꝛe poſtquā ſūpte ſunt: vt nō ꝓhibeat opationeȝ eaꝝ a longinquo. Et iō Raſis nono almanſoꝛis. c. de melācolia dat pillulas ī quib⁹ poniṫ agaricus trib⁹ hoꝛis ante decoctioneȝ epithimi. Et ex iſto pȝ ſolutio ad queſtionē hic moueri ſolitā. ſ. qñ dȝ dari apozima cū pillulis: vtrū ſimul aut ante aut poſt. Nā vt plurimū ē dandū poſt: ſed q̄nq̄ȝ magis q̄nq̄ȝ minus ꝓȝ varias ītētiōes. Canonis aūt veritas ē: qꝛ ſi pillule ſint vni⁹ humoꝛis eūatiue ⁊ apozima alteri⁹: tunc apozima poſt datū nō ſufficiēter iuuabit ad attrahēdū humoꝛē cōmotū a pillulis: imo inchoabit nouū motū agitatū: ⁊ iō erit incōueniens talis compoſitio.

Apozima eſt decoctio diuerſaꝝ mediciaꝝ ſimḱ: ⁊ de apozimatib⁹ meminit Meſue ſeptima diſtictōe ſui ātidotarij. ⁊ Aui. quito hui⁹ tractatu nono.

Cū aūt eūare volueris coꝛpus ſiccū carnē hñs durā medicīa foꝛti ſicut helleboꝛo ⁊ his ſilib⁹ vehemēter ſtude in humectādo ipſuȝ nutriētibus vnctuoſis.

¶ Hic ponit cañ. de pꝛepatōe quoꝛūdā coꝛpoꝝ reſpectu quarūdā medicinaꝝ: dicēs ꝙ cū volueris eūare coꝛp⁹ ſiccū durā carnē hñs cū medicīa foꝛti ſicut ē helleboꝛ⁹ ⁊ ſibi ſimilis: tūc vehemēter ſtude in humectādo ipm cū nutriētibus vnctuoſis. Et iſte cañ. quaſi virtualiter eſt illeı affo. Ad helleboꝛos his. Et rō ē qꝛ hec coꝛpa ſi nō ꝑhumectenṫ nō hñtia de hūido multū qꝺ trahaṫ ad medicinā ꝙ ſit cā eūationis medicine: diu tenebūt medicinā int⁹: ⁊ ſic accidentia ſequētur foꝛtia. 2° iterū ꝑiculū ē ꝓpter foꝛtē exiccationē hellebori ne īcurrāt ſpaſmū ſiccū niſi ſint ꝑhumectata. Et tu hoc nō ītelligas ſolū nutrimētū vnctuoſum: ſed ꝙ ſit multū ⁊ qꝺ quieſcat: ⁊ bꝛeuiter alia faciat per que coꝛpoꝛū multiplicaṫ humiditas.

Et ad vltimū cū foꝛtes medicine multi ſint timoꝛis tales vȝ qualis ē helleboꝛus: q̄m in coꝛpoꝛe mūdo efficit ſpaſmū ⁊ repleti coꝛpoꝛis ꝯmouet hūiditatē motu turbido: ⁊ ad iteſtina trahit illud qꝺ ei difficile eſt expellere: ⁊ titimali venenoſi ſicut mezereō ⁊ alſcebꝛan ⁊ earū īpedimentuȝ cuȝ ſuperāt remouet rayb.

¶ Hic docet ſuccurrere medicinis foꝛtib⁹ qñ ſuperant ⁊ faciūt accidētia foꝛtia: dicēs ꝙ qñ medicine ſunt foꝛtes ad vltimū. ſ. vltimate malitie cuȝ ſint multi timoꝛis: ſicut verbigrā helleboꝛ⁹ ⁊ mezereon. i. laureola ⁊ alſcebꝛā. i. eſula ⁊ alij titimali venenoſi eoꝝ impedimētū cū ſupat remouet rayb. ¶ Ubi nota ꝙ titimali: vt dicit Serap. eſt nomen cōe ad oēs medicinas lacticiniū hñtes. Sȝ taliū q̄dā ſūt venneoſa' ſicut mezereon ⁊ helleboꝛ⁹ ⁊ alſcebꝛā. i. eſula ⁊ multa catepucialiū genera. quedā aūt nō ſicut volubilis minoꝛ. Aui. hic loquiṫ de venenis ⁊ alijs medicinis ſimilis malitie. ¶ Scꝺo nota ꝙ he medicīe ſunt magni timoꝛis ꝓpter ſuā venenoſitatē ⁊ ꝓpter violentiaȝ ſui opis: ⁊ ꝑꝑ vētoſitatē ꝑ quā agitatā ⁊ generatā ab eis vel ex eis faciunt aſcēdere malas mās ſuperi⁹: ⁊ ſic mouent eas motu īoꝛdinato ⁊ turbido. Et ꝑꝑ ſuā exiccationē ⁊ caliditatē ꝓpꝛiā nocet neruis ꝑꝑ qꝺ timeṫ in eaꝝ opatiōe de ſpaſmo: ⁊ ꝓpter motū māe multe viſcoſe cū vētoſitate agitate q̄ſi ſubito ad inteſtina faciēdo doloꝛē cōſtat ꝙ mouent ad inteſtina illud qꝺ ē difficile ex inteſtinis expellere. ⁊ hec oīa dedit Aui. intelligere in littera. ¶ Tertio nota ꝙ iſte medicine dicūtur ſuperare coꝛpus qñ ex doloꝛe vel agitatione vel venenoſitate vel caliditate aut exiccatione ſua ipm nimiū ꝑmutarēt: ita ꝙ intenderem⁹ ad illaꝝ virtutes extinguēdas: ⁊ qñ ita ē: tunc dicit Aui. ꝙ impedimētū illaꝝ tolliṫ per rayb. ⁊ bene littera exterioꝛ exponit ꝙ ē lac acetoſum. Et Symon ianuēſis ī ſinonimis dicit ꝙ ē lac acetoſum: ⁊ pꝛobat hoc ꝑ Raſiȝ 9° almāſoꝛis. c. de cura dyabetis. vbi dat rayb. ¶ Et pꝛactica greca coꝛreſpondēs Almanſoꝛi loco illius hȝ lac acetoſum. Dy. aūt nō acceptat hoc qꝛ lac acetoſuȝ ē cōſtrictiuū: ⁊ cōſtrictiua nō debent dari ad remouēdas medicinaꝝ violētaꝝ malitias. Ego tñ ꝑ° nō video ꝙ abſolute dicaṫ ꝙ reſtrigit fluxū. Sȝ Aui. dicit ꝙ reſtringit fluxū colericū ⁊ ſanguinē. ſed hoc erit magis extiguēdo q̄ȝ ſtipticitatē īducēdo. Et īpemet Auic. dicit ꝙ lac acetoſuȝ ī coꝛꝑibus calide cōpl'onis ſepe lauat vētrē dato tamē ꝙ cōſtringeret. Stat ꝙ ſuis alijs qualitatibus ita extinguat illarū medicinarū malitiā q̄ȝ cōueniet. Dicit etiā Dy. ꝙ illud qꝺ cōfert eſt aqua lactis cōfecta cum melle ⁊ pauci ſalis: vñ īpa lenit ⁊ abſtergit: ⁊ ē cā expulſiōis medicine: ſed neſcit vtrū ſit rayb vel aliud ⁊c̄.

Spaſm⁹ fit in coꝛpoꝛe mūdo qꝛ trahitur bonū ⁊ iuuatiuū qñ cum terroꝛe nature trahiṫ ⁊ violētia.

Amplius medicina multotiēs ſuū odoꝛē in ſtomaco dimittit: ē ergo ſicut ſi medicīa ibi remanet: cuius medicamē eſt aqua oꝛdei que ipſuȝ lauat: qua quideȝ melioꝛ exiſtit eoꝛum que in potu ſumūtur.

¶ Ponit cañ. aliū de faciēdis ꝓpter quoddā accidens: ⁊ dicit ꝙ multotiens medicina dimittit ſuum odoꝛem in ſtomaco: ⁊ eſt ac ſi medicina remanſiſſet in ſtomaco: ⁊ medicamen huius accidētis eſt aqua oꝛdei que dictum odoꝛem lauat: ⁊ aqua eſt melioꝛ eoꝛū que ſumūtur in potu ad hanc cauſaȝ. ¶ Ubi nota ꝙ eoꝛuȝ que ſumūtur in potu ꝓpter nocumēta medicine quedā danṫ ad frāgēdū acuitatē ⁊ malitiā medicine: quedā danṫ ad expellēdū medicinam cito a coꝛpoꝛe. Eoꝝ aūt que expellūt: quedaȝ ſunt lubꝛicatiua: quedā cōpꝛeſſiua: quedā lauatiua. Modo iſtoꝝ que expellūt melioꝛa ſūt lauatiua. nā cito educūt ⁊ cū hoc relinquūt poꝛos aptos. Sed lubꝛicatiua ⁊ cōpꝛeſſiua multos relinqnūt poꝛos obſtrictos. Aqua oꝛdei ergo ī iſto gradu bonitatis ē pꝛeponēda: ⁊ vltra hoc ſui frigiditate ⁊ humiditate extinguit malitiā medicine: ⁊ ideo īpa ē ꝺ melioribus que ſumūtur ad talē malitiā remouēdam. ¶ Scꝺo nota ꝙ odoꝛ medicine plerūq̄ȝ remanet qꝛ ꝑs aliqua adhefit villis ſtomaci: ⁊ iō ē ac ſi medicina remāſiſſet quātū ad abhoīationē ⁊ agitationē ſtomaci ſequentem: ⁊ foꝛte aliq̄d facit de fluxu ⁊ cōmotiōe humoꝛū. Dicit ergo Aui. ꝙ hoc eſt remouēdum per abſterſiua.

Scias ꝙ huiuſmodi aqua appꝛoximaṫ frida ſi hēat repꝛimēre virtutem farmaci. ſi vero habeat lauare ⁊ abſtergē datur calida.

Cūq̄ȝ tēpus ꝓlongabiṫ ⁊ medicina operari nō ceperit: ſi alleuiatio fieri poterit vt nihil moueatur fiat: ꝙ ſi quid affuerit timoꝛis meli⁹ erit vt idromel traijciat aut eius ſirupū aut aquā in qua nitruȝ reſolutuȝ fuerit: aut ſubijciatur ei colliriū aut fiat ei cliſtere. Ex cauſis vero ꝓpter quas medicina nō operaṫ eſt cānaliuȝ coanguſtatio de nā: aut ꝓpter ꝯpl'oneȝ aut ꝓpter egritudinis vicinitatē. i hñtib⁹ eiȝ paralyſiȝ aut apoplexiā medicinaꝝ

vie

UVA. BHSC. IyR_006_1

Collirium quãq ſumitur pro ſuppoſito rio vt hic: quãq pro medicina oculoꝝ.

vie ad ſuas mãs coanguſtãtur. Accidit ergo vt difficile ſit facere quatenus vẽter eis currat.

¶ Hic ẽ alius cañ. ĩ quo dicit ſi ꝓlongat tꝑs ⁊ medicina nõ incepit operari ſi potes nihil facias. ſ. ſi nõ cogeris nõ agas. Si aũt cogeris aut ꝑꝑ feſtinãtiã infirmi: aut q: aduenit tꝑs cibandi: aut poxiſmus: aut ꝑꝑ aliã cãʒ q: times ꝙ nõ inducat aliquã malã ꝯplõnẽ vel qualitatẽ ex diuturna mora melius erit vt bibat aquã mellis aut ſirupũ ei⁹. i. potũ factũ cũ ea: ⁊ aliquib⁹ ſecum decoctis pro varijs intẽtionibus: aut aqua in qua reſolutũ ẽ vitrũ: ⁊ iſta ẽ ad incitandũ expulſiuã ⁊ incidẽdũ materias viſcoſas: aut ſupponat ſuppoſitoriũ: aut fiat cliſtere ⁊c̃. Et fiãt cliſteria diuerſoꝝ modoꝝ: aut pure leniẽtia: aut abſtergẽtia: aut carminãtia: aut acuẽtia. ⁊ cã iſtoꝝ ẽ clara. Naʒ cãe ꝑꝑ quas medicine nõ opant ſũt anguſtia cãnaliũ: aut nãlis: aut accidẽtalis cõplõnis malitia: aut ꝑꝑ vicinitatẽ egritudinis. Nã in habẽtib⁹ paralyſim aut apoplexiaʒ vie medicinaꝝ ad ſuas mãs trahẽdas anguſtãt ꝑꝑ egritudinẽ. Et ꝓpter hoc accidit ꝙ ſi ſit difficile facere ꝙ vẽter currat. i. fluat: accidit ẽt iſtis ꝙ ſunt debilitati nerui ⁊ muſculi in vtraqʒ iſtaꝝ egritudinum: ⁊ iõ ſenſatio ſtimuli ẽ minor ⁊ ſilr virtus expulſiua obtuſior ⁊c̃. Et tu nota de his infirmitatib⁹ ꝙ oportet ĩ eis fortes adhibere medicinas.

Duas preterea medicias vẽtreʒ ſoluẽtes in vna die cõiungere eſt timoroſuʒ ⁊ eſt extra recritudineʒ.

Etrõ ẽ q: ſuperflue euacuam⁹ ⁊ virtus multũ debilitat: tñ dare duas medicinas ꝯbiles ꝯuenit vt cõpleatur ſolutio: q: data medicia alñ ſit cliſtere lauatiuũ: ⁊ ẽt damus aquã zuccaratã per os. hec Gẽtilis.

¶ In iſto cañ. dicit ꝙ cõiungere duas medicinas in vna die ẽ timoroſuʒ ⁊ extra rõeʒ de ſoluẽtib⁹ vẽtrẽ: ⁊ hoc ẽ habitũ ſupra ⁊ intelligat de medicinis ſolutiuis datis ĩ doſi integra. nã timor ẽ de ſuꝑfluitate fluxus.

Omis quoqʒ medicina q̃ alicui humori ẽ ꝓpria cuʒ ip̃m nõ ĩuenit perturbat ⁊ ventrẽ cuʒ difficultate facit: ⁊ ſimilr ſi ipſuʒ in ſuo ꝯtrario infuſuʒ ĩuenerit.

¶ Hic ponit aliã regulã dicẽs ꝙ oĩs medicina ꝓpria alicui humori qñ nõ ĩuenit ip̃m: aut inuenit ip̃m ĩfuſuʒ in ſuo cõtrario ꝑturbat vẽtrẽ: ⁊ facit ventrẽ. i. ſoluit vẽtrẽ cum difficultate. Cã aũt dicta eſt ſupra qñ nõ ĩnuenit: ſed qñ ĩuenit ip̃m infuſum in ſuo cõtrario: cã eſt q: contrari⁹ humor reſiſtit eductiõi hũoris ꝓprij illi medicine: q: nõ põt eũari ille humor quẽ reſpicit de ꝓprietate niſi cõmoueat ⁊ agitet illum in quo ẽ infuſus.

Omnis preterea medicina humoreʒ ĩ primis extrahit qui ẽ ei ꝓprius: deinde illũ qui ẽ poſt ipſuʒ in multitudine ⁊ ſubtilitate ⁊ reliquos ſm hũc ordinẽ p̃ter ſanguinẽ: qm̃ nã vſqʒ ad poſtremũ eũ retinet ⁊ recõdit: humoreʒ vero ex lõginquo attrahere eſt difficile.

Hic dat regulã de mõ eũandi humores ꝑ medicinas q̃ ſolũ vnũ reſpiciũt de ꝓprietate: ⁊ dicit ꝙ oĩs medicina in primis extrahit humorẽ qui ẽ ei ꝓprius: deinde illũ qui ẽ poſt ip̃m in multitudine ⁊ ſubtilitate: ⁊ in reliquis hoc ordine niſi in ſanguine. nã lʒ ſanguis poſt aliũ humorẽ ĩ ordine ſequeret in multitudine ⁊ ſubtilitate vt poſt coleraʒ: tñ nã nõ permittit ip̃m euacuari: q: recondit ip̃m vſqʒ ad vltimũ tãqʒ hũorẽ bẽigniorẽ. ¶ Ex iſtis pʒ ꝙ poſt eũatõʒ humoris principalr ĩtẽti a medicina duabus de cãis põt vnus hũor aliũ p̃cedere ĩ eũatione. vna eſt q: in ſe ſit facilis mobilis: q: ſubtilior aut amplior in quãtitate. 2ª q: minus a nã retinet: ⁊ ꝓpter hanc ſc̃daʒ cauſam accidit ſanguini ꝙ ſemꝑ ẽ vltimus vt eũetur: ꝓpter primã melãcolia dʒ eſſe vltima. ¶ Ex hoc pʒ 2° ꝙ nõ ſemꝑ idẽ humor ſequit ĩmediate humoreʒ ꝓprium vni medicine in eũatõe cũ ſuperfluit. Nã qñ iam a ſcamonea eũata ẽ colera cõtingit ꝙ nõ ſolũ flegma ſʒ melãcolia eũet vbi melãcolia fuerit hũor prauior ⁊ magis moleſtãs virtutẽ q̃ʒ flegma ñ obſtãte ꝙ flegma eẽt ſubtili⁹ ⁊ ãplioris q̃ʒtitatis. ¶ Vlteri⁹ nota ꝙ nõ ſolũ ſeruat ordo ĩ trib⁹ reb⁹ dictis. ſ. ĩ ſubtilitate multitudine ⁊ maiori conatu nature ad ip̃m expellendũ ſed ẽt in ꝓpinquitate ad vias ductuũ: vñ multotiẽs cõtingit ꝙ medicina ſolutiua colẽ prius eũat flegma ſi fuerit in inteſtinis ⁊ ſtomaco: q: cũ natura ibi ꝑcipiat nocumẽtũ: tũc ĩnſurgit ꝯtra id qđ in ſtomaco cõtinet ⁊ illđ expellit. ita ẽt in ſuꝑflua opatiõe põt ꝯtingere ꝙ flegma erit multũ in venis vicinis inteſtinis ⁊ nõ colera: vñ poſt melãcoliã medicina de ꝓprietate illius eũatiua flegma ⁊ nõ colerã eũabit: ⁊ hoc põt ſumi a Sera. 6° breuiarij. ¶ Ex qbus pʒ ꝙ plurimũ etiã humorib⁹ hñtib⁹ ad ĩuiceʒ ꝓportionẽ quã debẽt hẽre ĩ corꝑe ſano ĩ iſtis quattuor. ſ. ĩ ſubtilitate multitudine ĩ ꝯueniẽtia ad naturã ⁊ in exñtia ĩ debitis locis: medicina colere eũatiua đ ꝓprietate ⁊ nõ flegmatis ad modũ loquendi medicoꝝ: primo eũat colerã ⁊ ſi excedit in opere ſuperfluẽdo poſt. 2° loco euacuat flegma. 3° melãcoliã. 4° ſanguinẽ. Illa aũt que eſt flegmatis euacuatiua p̃° eũat flegma. 2° colerã. 3° melancoliam. Illa aũt que eſt eũatiua melãcolie p̃° melãcoliaʒ eũat. 2° coleram. 3° flegma. vltimo ſanguinẽ. Et hunc ordinem ĩnuit Aui. hic. ⁊ Gal. 3° de ſimplici diſtĩctiõe 4ª. c. vltimo. Cũ aũt nõ ſeruat talis ꝓportio: q: aut vnus ẽ plus ꝓportionaliter augmẽtat⁹ q̃ʒ ali⁹: aut q: vn⁹ ẽ factus horribilior

Et nõ ſoluʒ requirunt ad veritateʒ canonis ea que ponũt hic: ſed ẽt ꝙ non ſit medicia que euacuet duos hũores appropriatos. Prio enim euacuat vnũ: deinde alium.

alio: aut q: vnus eẽt ingroſſatus ⁊ ali⁹ ſubtiliat⁹ reſpectu eius ꝙ debet eẽ in ſano: aut q: vn⁹ eẽt minus ꝓpinquior vijs ductuũ: nõ eẽt incõueniẽs hos ordines nõ ſeruari vt ẽ dictũ: ĩmo ſtat quãqʒ ſanguineʒ primo educi: q: eẽt tante diſcõueniẽtie ꝙ nã tẽtaret eius expulſionẽ ⁊ nõ egeret niſi pauco adiutorio in apertõe venaꝝ aut ĩ mutatõe. Et tu ex dictis multas tales varietates ꝯprehẽdes poſſe accidẽ vt quotidie notat experientia. ¶ Vltio nota hoc verificari de medicia vicini humoris ⁊ nõ plurimũ de ꝓprietate eductiua. Nã agaricus q purgat colerã ⁊ flegma: q: principaliter reſpicit flegma nõ eſt dubiũ ꝙ primũ euacuat multotiens flegma: deinde colerã. Sed pro clariori declaratiõe cauſaruʒ horuʒ dictoꝝ dubitatur.

Vtrum quando medicina datur in

Conſimile dubiũ monet Auer. quinto colliget tractatu primo. c. xxiiij. dicẽs: Sed querẽdũ eſt ⁊c̃.

nimia quãtitate vel quouis alio mõ ſuꝑflue euacuat euacuato humore quẽ de ꝓprietate reſpicit debeat alios humores eũare? Ad ꝑteʒ negatiuã arguit p̃° ſic. Sicut ſe hʒ magnes ad ferꝝ: ſic ſe hʒ medicina ad hũores quos de ꝓprietate dʒ eũare. ſed qualitercũqʒ fortificata virtute magnes nõ attrahit niſi ferꝝ: ergo a ſimili q̃litercũqʒ fortificata virtute medicie nõ attrahet niſi illũ hũorẽ quẽ de ꝓprietate reſpicit: ⁊ ſic nõ hẽbit aliũ eũare. 2° ſic. Si medicina ſuꝑflue eũans attraheret humorẽ quẽ nõ reſpicit de ꝓprietate: vt verbigrã attractiua colere cuʒ ſuꝑfluit eũaret flegma: ſequeret ꝙ cũ eũaret flegma adhuc debẽt euacuare colerã. ꝯſequẽs eſt falſuʒ ⁊ ꝯ experiẽtiã. ⁊ ꝓbat ꝯſequẽtia: q: qñ talis medicia eũat flegma: ipſa eſt potens ad attrahẽduʒ ꝑ ſuã ꝓprietatẽ ⁊ magis hʒ attrahere coleraʒ q̃ʒ flegma. aliter eniʒ non prius illaʒ eũaſſet. ⁊ ibi eſt ẽt colera eque bñ approximata qñ iaʒ ſuꝑfluit eũatio ⁊ ꝑmutat ad flegma. qđ ꝓbat q: in nulla diſpõne poſſibile eſt corp⁹ ab aliquo quattuor humoꝝ ĩtegre eũatuʒ eſſe ſtante vita: vt pʒ 2° elemẽtoꝝ. G. q: ſunt corpis elemẽta. ¶ In oppoſitũ tñ ⁊ qđ eũent alij humores ordine ſupradicto: eſt Aui. hic ĩ textu ⁊. G. 3° de ſimplici loco allegato. ⁊ Auer. 5° colliget ⁊ oẽs medici: ⁊ pʒ ꝑ experiẽtiã. ¶ Pro dubio eſt notãduʒ ꝙ medicinã eũare ordine p̃dicto qñ ſuꝑfluit ẽ notũ ⁊ ꝯceſſuʒ ab oĩbus. ſʒ ĩ cã mõ quo faciat ẽ differẽtia inter G. loco allegato ⁊ Auer. 5° colliget. Nã Gal. vult ꝙ medicina poſtq̃ʒ eũauit humorẽ quẽ reſpicit de ꝓprietate nõ trahit aliũ ꝑ ꝓprietatẽ attrahẽdi: ſed eſt cã eũonis aliorũ humoꝝ q: remanet virt⁹ eius vt aliquid adherẽs orificijs venaꝝ ⁊ ſui mala q̃litate ſtimulat ꝯtinue virtuteʒ expulſiuam venaꝝ. 2° q: aperit orificia illa ita ꝙ remanent magis larga q̃ʒ debẽt eſſe: effluit humor content⁹ in eis ſicut fluit ab aliquo vaſe liquor facto in eo foramĩe. Et 3° q: ꝓpter multã expulſionẽ factã debilitata eſt ꝯtẽtiua venaꝝ. Et 4° q: farmacũ ⁊ hũor currẽs ꝑ orificiũ vene: ⁊ ꝑ venã alterat venã ad malã q̃litatẽ: ⁊ oĩs mala ꝯplexio debilitat illud cui⁹ eſt mala ꝯplexio: ⁊ iõ ſequit exitus alioꝝ humoꝝ ab illo quẽ medicina attraxit: quos tñ humores medicina nõ attrahit niſi ꝑ accidens q: eſt cã ꝙ vene nõ retinent ⁊ ꝙ expellũt humores. Et ꝙ hec ſit mens. G. pʒ 3° de ſimplici loco allegato cũ dixit: Et cã ĩ eũone eius qđ eũat oĩo ex hũorib⁹ q nõ ſunt ꝓprij medicine nec ꝯueniẽtes ei: ꝯſiderat in ea ꝯplexio: eſt in trib⁹ rebus: quaꝝ vna eſt debilitas venaꝝ: ⁊ alia eſt amplitudo orificioꝝ venaꝝ. 3ª ẽ mordicatio medicine ſolutiue. Et ſic pʒ ꝙ. G. nõ ponit medicinã ꝑ aliquã virtutẽ trahere taleʒ hũoreʒ ꝑ ſe: ſʒ ꝙ eſt accidẽtalis cã illius eũonis. aliqñ ẽt ſm ip̃m ſola mordicatio ſufficeret ad hãc eũationẽ: ⁊ ſi vene ſint fortes ⁊ orificia ñ magis aperta oportuno. Cã aũt ordinis in tali eũatiõe ſm Gal. maxime ꝯſiderãda ſunt ſubtilitas ⁊ groſſities ⁊ debita vel indebita humorũ habitudo ad corpus vel maioritas aut minoritas cõueniẽtie cũ virtute corporis. vñ in fine capituli ita dicit: Cã aũt ꝓpter quã qñ iſti hũores euacuant ẽ eorũ eũatio ſm ordinẽ quos dicim⁹ ſunt tenuitas humorũ ⁊ groſſitudo eoꝝ additio ⁊ diminutio in ꝓprietate cuiuſcũqʒ eorũ ĩ corpore ⁊ cõueniẽtia ip̃orũ ad ip̃ʒ. Et ego addidi multitudinẽ ⁊ paucitatẽ ſupra ad ſpecificãdum illũ modũ cõueniẽtie. Nã multotiẽs qñ excedit mẽſuram ꝑ hoc ẽ diſcõueniẽs ⁊ pauc⁹: licʒ nõ ſit ita cõueniẽs ſicut mediocris: tñ nã magis conat ad illũ retinẽdũ ꝓpter priuationẽ. Et Gal. hec cõprehẽdit ſub cõueniẽtia. Addidit ẽt ꝓpinquitatẽ ⁊ diſtantiã a loco a quo fieri dʒ eũatio ex auctoritate Serap. Et põt hec poſitio ꝓbari ꝑ rõnes ambas factas añ oppoſitũ per quas oñdit ꝙ hic motus ſit nõ trahẽte ꝓprie medicina. Et tũc ſtatim ſequit ꝙ pars que euacuat ẽ habilior ad motũ ꝓpter ſubtilitatẽ: aut q: minus a nã retinet. Auer. aũt 5° colligit. c. 14° dicit cãm eẽ virtutem attractiuã cõiter humorũ non a proprietate. Dicit 2° ꝙ proprietas grã exẽpli trahẽdi colerã nõ ẽ in ſcamonea ꝑ ſe queẽadmodũ ꝓprietas trahẽdi ferrum in magnete: ĩmo oportet ꝙ hanc acquirat a calore nr̃o. 3° dicit ꝙ hãc ꝓprietatẽ nõ acquirit ĩ quacũqʒ quãtitate exhibita: ſed ĩ doſi debita ſub qua ẽ expertũ ip̃am purgare colerã. Et iõ cũ querit que ſit cã eũatiõis aliorum humorũ ab illo de cuius ꝓprietate ẽ vt attrahat a medicina? Rñdet ꝙ hoc eſt ꝑ ꝓprietatẽ illã acquiſitã illi medicine date in hac mẽſura

UVA. BHSC. IyR_006_1

gr̄a exempli: que ē ꝓprietas reſpiciēs oēs humores. Cum enim humores ſint vniꝰ ꝓpinquitatis nō ē longinquū talem ꝓprietatē cōiter reſpiciētē oēs hūores inueniri ī medicina. Et qñ hoc nō daṫ ī mēſura mlto maiori q̄z ſit debita nō acquiriṫ illi medicine talis ꝓprietas limitate reſpiciēs colerā: vñ loco allegato dixit: Rñderi dz q̄ ille calor quē hz medicina purgatiua ꝑ quē attrahit nō hz eū ſoluz ꝑ ſe vel in ſe eū actu ſicut ē adamas qd̄ attrahit ferrū ꝑ ſolam formā ſpecificā: q̄r acquirit ipm calorez a corꝑe. calor eniz nō dat illū calorē niſi ī quātitate determinata ī illa: ⁊ ꝓpterea qñ recipiṫ alia quātitas īdetermiata nō ſtabit ī tali ꝓprietate. Et ſic pz ex Auer. q̄ talis medicina qñ datur in quātitate excedēte nō acquirit illā ꝓprietatē. Unde parum poſt ſubdit: ergo attractio medicine nō ē ꝓpria alicui humori niſi ꝑ viā cōparationis ⁊ ꝓportiōis determiate ī illa medicina ⁊ nō in oī accidēte: q̄r qñ egrediṫ ab illa quātitate: tūc trahit ſolū illud qd̄ attrahit ꝑ attractiōez. Contra tñ hūc modū arguiṫ ſic: q̄r ex hoc ſeqṫ q̄ medicīa attractiua melācolie ſi daṫ ī ſuꝑabūdanti doſi ita q̄ habeat ſuꝑflue eūare: dz p̄º eūare colerā poſt flegma poſt melancoliā. cōſequēs tñ ē falſuz ⁊ contra experiētiā ⁊ contra Gal. 3º de ſimplici medicina. c. allegato ⁊ 2º de elemētis. ⁊ cōtra Hypo. in libello de humana nā. ⁊ cōſequētia tamē ꝓbaṫ: q̄r medicina exhibita nimia nō acquirit illā ꝓprietatē atttrahēdi determinatū humorē: vt dicit Auer. ergo eūat ⁊ in prinº ſue eūationis ſemꝑ humorē aptiorē ad motum. talis aūt nō ē melācolia: ergo nō trahit ī primis melancoliā ſed colerā que ē mobilior. Et ꝓpter hanc ratiōez puto aut Auer. nō ita intelligere vt videnṫ ſonare verba: aut Gal. meliꝰ dixiſſe veritatē. Videṫ ēt Auer. ex ſuo motiuo velle oñdere q̄ nō ſemꝑ ordo dictus ſalueṫ in ſuꝑflua eūatione: imo q̄ medicina melancolie eūatiua eūat cōuenieter flegma. Et añ Auer. Halyabas 2º practice. ⁊ Haly ī cōmento hoc voluerūt q̄ ꝓprietas que acquiriṫ: qñq̄z reſpicit illū humorē principalē ⁊ aliū ſibi viciniorē. mō flegma ē vicinius melācolie q̄z colera: q̄r cōuenit in qualitate actiua ⁊ illa in paſſiua. Et ſequētes hāc viā de ordine fundanṫ ſuper dicto Hypo. in libello de hūana nā: cū dixit: flegma cū ſit fridū ⁊ viſcoſuz violētia farmaci eūata melācolia ꝓpria ſequiṫ flegma. Et ego hoc 2m nō puto verū cū videamꝰ ī tali medicina q̄ primo trahit melācoliā qd̄ non faceret niſi per ꝓprietatē ipaz reſpiceret. nā per eūationez cōem priꝰ alij fuiſſent eūati. Preterea ꝯ hoc ē Gal. ⁊ fere oēs medici. Et iō hāc auctoritatē intelligo nō q̄ vna medicina violēta eūata melancolia eūeṫ poſtea flegma: ſed q̄ requiraṫ violētia farmaci ꝓ melancolia eūanda. 2º requiriṫ violētia pro flegmate: q̄r ē ī ſcd̄o loco reſiſtentie humorū qui farmaco eūanṫ. Ex quibus cōprehendere potes q̄ ego ⁊ in cā eūationis humoꝝ ⁊ in ordine humoꝝ ī euacuando ſequor. G. ſed mihi videṫ hoc addēdū in eius explanatione q̄ in farmacis ſolutiuis nō ſolū inueniṫ virtꝰ ſolutiua humoris ꝓprij: ſz gnālr ꝓſpiciēs humorē oēz hora qua eſt actuata. Sz tamē due tales ſunt ī medicīa: Primo attrahit illum quē a ꝓprietate reſpicit: ⁊ poſtea cū effrenitat ꝑ gnālem virtutē oīum humoꝝ attractiuā trahit alios: ōcurrēte tñ aut venaꝝ expulſiua ꝓpter ſtimulum: aut in vltime debilitatis egrediētibꝰ humoribꝰ a venis ſicut in corpore mortuo. Cā autem quare pono hanc virtutem attractiuā: ē q̄r nō video quō data medicina ſolū colere a ꝓprietate eductiua: ⁊ data medicīa ſolū a ꝓprietate flegmatis eductiua: ⁊ medicina ſolū melācolie eductiua q̄ ſint quelibet pars 3a ꝑs doſis vniꝰ eūantur iſti humores. Et ſi dareṫ ꝑ ſe illa eductiua colere nō operareṫ niſi q̄r attrahēdo iuuāt ſe nō ſolum in ferēdo viz nāe ſtimulādo venas maxie cū vnū ab epate aliū a ſplene aliū a capite euacuat: tūc eīm ī oī tali mēbro deberet inferri vis a qualibet medicinarū ⁊ maxime cū mēbra ſint diſtantia ad que non oz ire aliquid de medicina niſi qualitatē. Et ad argumēta rñdeo. ¶ Ad primū q̄ nō eſt ſilē de magnete ⁊ medicīa: q̄r in magnete nō ē niſi virtus reſpiciēs rē vnā: ſed medicina ē virtus cōiter reſpiciēs plures hūores acquiſita tamē a noſtro calore actuāte eā lz nō ſit icōueniēs medicinā aliq̄z attractiuā eē in actu talē ſicut dicit Gal. tertio de ſimplici capl'o penultimo. Et quare puto medicinā fuiſſe ſanguinis attractiuā de qua loquiṫ Gal. in libello de farmacijs q̄ ruſticus ꝯſiderās porcellos ſuꝑ herbā geſcētes a quibꝰ riuuli ſanguinis ad herbā dirigebanṫ: ⁊ poſtea dando hominibꝰ interficiebat eos. de q̄ Cōciliator loquiṫ differētia 144a q̄ multū ꝑ paduanū territoriū īueniṫ. ¶ Ad 2m argumētū cōcediṫ q̄ medicine colere eūatiua cōtinue dū eūat alios hūores ſuꝑfluēdo eūaret colerā niſi ad tantam eius paucitatē veniret q̄ reſiduuz nā nimio conatu retineret. Et ex hoc pz q̄ ī certo caſu nā plus conaṫ ad colerā q̄z ad certū ſanguinē retinēdū. ⁊ pz q̄ nō oz totalr̄ oēs alios humores eē eūatos cū ſanguis eūaṫ. ⁊ hec de qōe ſufficiāt.

Amplius cum timor affuerit ne nauſea aut ſincopis alicui accidat poſtq̄z medicinā biberit: oportebit fieri vt anteq̄z medicinā bibat tribus diebꝰ aut duobꝰ cuz aqua rafani vomat ⁊ vt rafanuz comedat.

¶ Docet p̄parare quedā corpora ad accipiēduz medicinaz: ⁊ dicit q̄ cū timor fuerit ne accidat nauſea aut ſincopis poſtq̄z biberit medicinā: oz q̄ fiat vt ante aſſumptiōez medicine duabꝰ vel tribꝰ vicibus vomat cū aq̄ rafani ⁊ q̄ comedat rafanū. ¶ Ubi nota q̄ iſte cañ. nō ē ſeruādus in eo ī quo timeṫ vomitꝰ ꝑꝑ ſuꝑioris ꝑtis ſtomaci debilitatē ⁊ ī quo timeṫ curſus colere ad ſtomacū. ꝑ hūc eīz vſuz vomitꝰ plus timēdus ē ei q̄z de illis accñtibꝰ. Sz ſūt quidā hoīes robuſti ſtomaci ī quoꝝ ſtōaco adheret aliq̄ mala mā viſcoſa ⁊ ꝓprie ī ore: de q̄ timeṫ q̄ aſſūpto farmaco agiteṫ ⁊ īde ꝓuoceṫ ad vōitū ⁊ īde accidat ſincopis. In iſtis ergo verificaṫ cañ. Auic. ⁊ rō q̄r ex hoc vōitu remoueṫ cā illoꝝ accñtiū. Qd̄ ſi dicaṫ q̄ ex hoc vomitu p̄paṫ vt faciliꝰ vomat vt dictū ē ſupiꝰ: ergo ñ ē talis ꝑmittēdus cū ītēdimꝰ p̄parare ad fluxū vt hic: ſz cū intēdimꝰ preꝑare ad vomitū. Diciṫ q̄ vſus ad vomitū cū facili vomitiuo de ſe preparat corpus ad magis vomēdū: qñq̄z aūt cōtingit ꝑ accidens qd̄ magis preꝑat ad eius ꝓhibitionē: puta quādo ꝑ ipm euacuaṫ humor ī ore ſtomaci qui erit cā inclinatiōis ad vomituz: vnde vomitus vomitu curatur: ⁊ in colirica paſſione precipiṫ vomitus. Ad primū iſtorū intendit Aui. ſupra, cū dicit leues vomitꝰ p̄parare corpꝰ ad mouēdum. Sz ī iſto cañ. loquiṫ Auic. de ſcd̄o mō ī quo ē ꝑ vomitum iſtū leuē remotio p̄paratiōis ad vomēdū.

Et iō Auic. intendit de nauſea prouenīēte ex hūoribꝰ frigidis viſcoſis ī ſtōaco exñtibꝰ: vnde medicina ꝯmouet eos: ⁊ fit nauſea ⁊ aliquādo ſincopis ꝑ ꝯpaſſionez ad cor: mō decoctio rafani ꝯſumit ⁊ īcidit tales humores quare ⁊c̄.

Oportet preterea ne multū ſalis ſit in cibis eius qui medicinaz vult bibere.

¶ In iſto cañ. Aui. dicit q̄ ī cibis illoꝝ qui debēt ſumē medicinā nō dz poni multū ſalis. ¶ Sed tu dices ꝯtra. Sal p̄parat ad opus farmaci aliqñ humores incidēdo flegmata ad fluxuz faciēdo. Hic diciṫ q̄ multitudo ſalis multuz eſt exiccatiua ⁊ preſertiz ſtomaci ⁊ iteſtinoꝝ: ⁊ iō ī hoc ſtomacus fit paratꝰ ledi a farmaco. Accidit ēt q̄ ſal ē ſtipticuz ⁊ q̄ reſoluit ⁊ īdurat ſubſtātiā ſtomaci ⁊ inteſtinoꝝ q̄ oīa plus īpediunt q̄z iuuent eliquatio inciſio ⁊ incitatio ad expulſionē facte ab eo. Non multū ergo ſalis debent capere in cibo illi qui ſunt ſumpturi farmacuz.

Multotiēs quoq̄z ex hauſtu medicie ꝑueniṫ ad nauſeā ⁊ anguſtiā ⁊ ſincopiz ⁊ tremorē cordis ⁊ vētris mordicatōez: ⁊ ꝓprie cū nō ſolutōez fecerit aut ſudorē. multotiēs p̄terea ē nobis neceſſariū vt eū faciamꝰ vomere: ⁊ multotiēs excuſat nos ab hoc dare ei retētiua ⁊ facere vt aquā ordei bibat q̄tenꝰ venter ſoluaṫ ⁊ medicie malicia remoueaṫ: ⁊ qd̄ in iteſtinis retētuz fuerit lauetur.

¶ Hic docet Aui. ſuccurrere q̄buſdā accñtibꝰ q̄ ſuꝑueniūt ſuppoſitiōi farmaci: dicēs q̄ multotiēs ex hauſtu medicine infirmꝰ ꝑuenit ad nauſeā aut anguſtiā aut ſincopiz aut tremorē cordis aut mordicatōez vētris: ⁊ ſunt q̄nq̄z accidētia. Succurriṫ autē eis cū vomitu: qñq̄z aūt cū potu reꝝ retentiuaꝝ deſuꝑ medicinā: qñq̄z cū potu aque ordei vt ſoluaṫ malicia medicie ⁊ laueṫ illud qd̄ fuit retētuz in iteſtinis. vbi p̄º vides q̄ hec quinq̄z accñtia ſatis ſunt nota niſi de anguſtia q̄d ſit: nō multū clare dictū ē ſupra. Propter qd̄ nota ex Gal. p̄º ꝓnoſticoꝝ q̄ anguſtia ē accidēs ī quo īfirmꝰ nō īuenit ſituationē neq̄z figurationē in lecto ſuo. Et tūc manifeſtū eſt q̄ ſincopis ⁊ tremoris cordis cā eſt nocumētuz factū cordi aut ꝑ cōmunitatez aut ꝑ eſſentiā. Anguſtie aūt cā pōt eē iſta eadē ⁊ pōt eē ex mala qualitate humoꝝ ī venis ⁊ viſceribꝰ exiſtentiū: q̄r ſuꝑ quocūq̄z latere geſcat infirmꝰ cū ad illud ꝯcurrūt humores pre nocumēto illi cōmunicato nō pōt ampliꝰ ſuꝑ illud quieſcere. Sz cā nauſee ē agitatio ꝑtis ſuꝑioris ſtomaci ⁊ mordicatōis in vētre ⁊ īteſtinis: aut ſunt cā humores acuti illuc attracti: aut vētoſitas aut q̄litas farmaci. Cāe aūt vomitus ſunt oēs ſupradicte ꝓpter quas medicīa ventris ſolutiua fit vomitiua vt feces ſicce: anguſtia cānaliū: debilitas ſuperioris ꝑtis ſtomaci ⁊ alia ibi dicta. ¶ Nota 2º q̄ ī iſtis facere vt vomāt ē remediū manifeſtū. nā q̄r nocumētū ē ī ſuperioribꝰ ⁊ ē magnū: q̄zto celerius fieri pōt dz farmacū emitti: ⁊ hoc fit celeriꝰ vomitu: ⁊ hoc vult Meſue in de cōſolatiōe medicinaꝝ q̄ qñ alia nō ſufficiūt melius ē vt vomitu expellaṫ. ſed tñ niſi accidētia ſint valde terribilia priꝰ ſunt alia tētanda vt farmacū aliquid opeṫ: quibꝰ nō cōferētibus adminiſtreṫ vomitꝰ. Ad volēdū aūt artificialr̄ occurrere oz diſtinguere cās ⁊ accidētia que ſequūtur. Nā qñ cā vomitꝰ ē feꝫ ſicca in inteſtis p̄mitti dz cliſtē vnctuoſum illā fecē eūans: ⁊ qñ cā ē oppilatio denṫ aperitiua. Si patiṫ infirmꝰ accidētia mala tanto tēpore: ſi ē ex violentia farmaci deṫ aq̄ calida hora poſt horā aut aqua ordei. nam iſta faciūt illa que intēdimꝰ ī iſto cāu. ſ. remittere malitiaz farmaci ⁊ ipm lauādo expellere. Si aūt fuerit ex ventoſitate denṫ carminātia ventoſitatē. Si vero ſint ex debilitate ſuperioris partis ſtomaci denṫ ꝯſtrictiua ⁊ ſtiptica ſicut citonia ⁊ maſtix ⁊ ſimilia. Si ex cordis debilitate dentur odorifera ⁊ fiant fricatōes excitātes. Et hoc bene diſtinguit Meſue in loco allegato in diſtictōe tertia. c. ij.

Multi tñ ſunt timoroſi ⁊ ſpāles effectus medicinaꝝ nāꝫ terrētes quos ponit Meſue ī principio tertij capl'i ſcōe intētionis de rectificatōe medicinaruz ⁊ lege ibi.

Tria ſūt mala accidētia ī genere que ſolēt ꝯtingere ex vſu medicinaruz: vt vult idē Meſue in canone ſcd̄o primi capl'i tertie intētionis de rectificatōe mediciarū parapho illo: Omis aūt medicinaruz ſm plurimū malicia ⁊c̄.

Ille vero cuiꝰ ꝯplexio fuerit frida ⁊ ſuꝑ alios humores fuerit flegma ſuꝑabūdās dz ſumere poſt medicinā

⁊ ipſius

UVA. BHSC. IyR_006_1

⁊ ipſiꝰ operatõeꝫ naſturtiũ aqua calida ablutũ cũ oleo. Et qui calide fuerit ꝯplexionis pſiliũ bibat cũ aqua frigida ⁊ oleo violaceo ⁊ zuccaꝝ tabarzet aut iulep. Et ille quidẽ qui tẽperate eſt ꝯplexionis ſemẽ lini.

¶ In hac ꝑte ponit quedã faciẽdã ad tẽperãdũ ⁊ remouẽdũ reſiduuꝫ humoꝝ ⁊ farmaci differẽtiã ſꝫ diuerſitatẽ humoꝝ ⁊ cõplõnũ: ⁊ dicit tria. Primũ ꝙ cõpleta opatõe farmaci ſiquis ẽ frigide cõplõnis ⁊ ſupat in eo flegma ꝙ ipe poſt talẽ bibat ſemẽ naſturtij ablutũ tñ cũ oleo ⁊ diſtẽperatũ cũ aqua calida. Scðm ẽ ꝙ ſiquis fuerit calide cõplexiõis bibat pſiliũ cũ aqua frigida ⁊ cũ oleo violato aut zuccaꝝ tabarzet. i. albũ aut iulep. Si vero fuerit tẽperate ꝯplõnis bibat ſemẽ lini. ¶ Et tu nota ꝙ ĩ oĩbus iſtis ẽ abſterſio ⁊ lubricatio ꝑ quas remouet̃ medicine ⁊ humoris reſiduũ ⁊ in diſtẽperatis opatio cũ qualitate aut ĩ tẽpato ſimilitudo: vñ naſturtiũ calidũ dat̃ flegmatico: pſiliũ frigidum colerico: ſemẽ lini temperamẽto vicino.

Ei auteꝫ qui excoriationẽ timuerit inteſtinoruꝫ bolum armenuꝫ cum ſucco granati detur. Sumere etiam debet quicquid diximus poſt fluxum ventris: ⁊ ſi nõ: ipſum retinebit.

¶ Hic ponit quid faciẽdũ cũ quis ex ope ſuperfluo farmaci timet inteſtinoꝝ excoriationẽ: dicẽs ꝙ ei eſt dandus boluſarmenꝰ cũ ſucco granatoꝝ. Et debet ſumere quicquid diximus poſt fluxum vẽtris: ⁊ ſi non: ipm̃ retinebit. ¶ Ubi nota ꝙ boluſarmenꝰ ĩfrigidando ⁊ cõfortando ĩteſtina ẽ cauſa ꝓhibitõis excoriatõis: ſilr̃ vinũ granatoꝝ. Sed textus ſequẽs ẽ extraneus: ⁊ iõ intelligat̃ ꝓnunc ſic ꝙ qui timuerit excoriationẽ facere debet quicquid diximus poſt fluxũ vẽtris. Et hoc ĩtelligat̃ ſi boluſarmenꝰ cũ vino granatoꝝ ipꝫ fluxũ nõ retinebit. Aliqui tñ intelligũt ſic: Et ſi nõ ſumat quicquid diximus tũc ſumẽdo retinebit fluxũ vẽtris qꝛ nõ remouebit̃.

Scias etiã ꝙ bolus armenꝰ prohibet excoriationẽ: nõ ſoluꝫ ĩfrigidãdo ⁊c̃. ſꝫ ꝯſolidãdo inteſtina: vnde ſuccus granati remittit acuitatẽ medicie ⁊ ſtipticat ⁊ cõfortat inteſtina: vnde expellit hũores acutos: poſtea bolus armenus ꝯſolidat. hec Gentilis.

Omni preterea farmaciã bibẽti cui poſtea aduenit febris melior eſt aqua ordei. Sirupus vero acetoſus ẽ excoriatiuus: ⁊ ideo tardandus eſt vſqꝫ ad duos dies aut tres donec in inteſtinis virtus ſua redeat.

¶ Hic ponit aliũ cañ. de faciendis qñ accidit febris poſt farmacũ dicẽs ꝙ hõi bibẽti farmaciã ſi febris ſuperuenit melior res ẽ potus aque ordei. Sꝫ ſirupus acetoſus qꝛ in eo timet̃ excoriatio inteſtinoꝝ tardandus ẽ vſqꝫ ad duos dies vel tres donec redeat virtus ſua ĩ inteſtinis. ¶ Ubi nota ꝙ aqua ordei ĩquãtũ frigida ⁊ humida oppo. febri ⁊ qualitati inducte ĩ humoribus que ẽ caliditas ꝓpter farmacũ ⁊ ꝑꝑ motum ⁊ reprimit malitiaꝫ farmaci ⁊ abſtergit hũores attractos ad inteſtina ⁊ aperit ⁊ nutrit cuꝫ multis alijs cõditiõibus ĩ febre vt legit̃ pª quarti ⁊ pº regis acu. ⁊ iõ nullus potus eſt melior in iſto cãu. Sirupus vero acetoſus p̃cipue mellinꝰ ẽ plurime abſterſiõis ⁊ talis excoriat debilia ĩteſtina. ſilr̃ eſt plurime acuitatis ꝑꝑ acetũ: ⁊ iſtud mordet ⁊ excoriat: ideo nõ cõuenit duꝫ inteſtina ſunt debilitata a farmaco: ⁊ ideo oꝫ expectare donec inteſtina ad ſuum redeant vigorem.

Septẽ ſũt cãe ſpeciales ⁊ vna generalis aduẽtꝰ febris poſt aſſumptã medicinaꝫ quas ponit Meſue ĩ ſuo de rectificatiõe medicinaꝝ intẽtione quarta. c. j. parapho prio: Eius aũt euentus ẽ ⁊c̃. ⁊ plura alia de hoc q̃ ibi legas.

Ille quoqꝫ qui medicinã bibit ſcða die eſt balneũ intraturꝰ. Et ſi ex hũoribꝰ ipſius aliquid fuerit relictũ: balneũ ipſuꝫ mũdare poterit. Nã ſi videris ꝙ balneũ ſit ei ſapiduꝫ ⁊ in ipſo delectet̃: erit hoc ſignuꝫ ꝙ balneum ipſuꝫ ab eo qð relictuꝫ eſt mũdificat: ipſuꝫ quoqꝫ in eo dimitte. Qð ſi iueneris ꝙ in ipſo nõ delectetur: imo in eo eſtuationẽ patiatur expelle eum.

¶ In iſta parte ponit vſuꝫ balnei poſt medicinã: dicens ꝙ ille qui bibit medicinã die 2ª ẽ intraturus balneũ: ⁊ poterit balneũ ipm̃ mundare ab hũoribꝰ ſiquid de illis ẽ relictũ. Nam ſi videris ꝙ balneũ ſit ei ſapidũ ⁊ delectet̃ in ip̃o hoc erit ſignũ ꝙ balneũ mundificat ipꝫ ab eo qð derelictũ ẽ: ⁊ iõ ipꝫ in eo dimitte. Sꝫ ſi inueneris ꝙ in eo non delectet̃: imo in eo patit̃ eſtuationẽ expelle eũ. ſ. a balneo. Ee vt melius veritas iſtius canonis videatur dubitatur.

Modo etiã breuiori mouet hec Gẽtilis.

Utrũ ſumpto farmaco ſolutiuo balneum cõueniat die 2ª ⁊c̃. ¶ Negatiue arguit̃ auctoritate Aui. ĩ hoc. c. vbi ſupra dixit: poſt medicinã quoqꝫ quis nõ ingrediat̃ balneũ: qm̃ trahit mãꝫ ad exteriora: nec ẽ bonũ niſi ad vẽtrẽ ſtringẽdũ. ¶ Scðo arguit̃ auctoritate Meſue de cõſolatione medicinaꝝ intẽtione 3ª. c. 3º cañ. 3º. Et ſunt ibi ſue rões tres. Prima ẽ iſta. Balneũ trahit ad exteriora ⁊ in humoribꝰ reſiduis poſt medicinã remanſit ex medicina inclinatio motus ad interiora verſus vias expulſionis: ergo hic motus prohibet̃ ꝑ balneũ: ſed incõueniẽs ẽ talẽ motũ ꝓhibere. ꝙ aũt ſit incõueniẽs talẽ motũ ꝓhibere ꝓbat̃ eiſdẽ rõnibꝰ quibꝰ ꝓbat̃ ꝙ hora qua farmacũ actualr̃ euãat nõ cõuenit balneũ: qꝛ per hoc fiũt motus agitatiui ⁊ debilitatiui. Et cõfirmat̃ qꝛ mãm euãre debemus mõ faciliori. ſed dum mã repit ad inteſtina virtute p̃cedẽtis farmaci facile ẽ adiuuare motũ ſuũ quẽ hꝫ: ergo facile ꝑ inteſtia euãbitur: ſꝫ cũ balneo nõ niſi cũ difficultate trahet̃ ad interiora: ergo ⁊c̃. ¶ Scða rõ ẽ iſta. Illa euãtio ẽ ĩcõueniẽs ꝑ quã trahit̃ mã de mẽbro ignobili ad ignobile ꝑ mẽbra nobilia tranſeũdo: ſꝫ hoc ẽ huiuſmõi vt dictũ eſt ſepe ſupra: ergo ⁊c̃. Minor pꝫ qꝛ trahit̃ mã de inteſtis ad cutẽ a balneo ⁊ nõ niſi ꝑ venas ⁊ epar: que ſunt mẽbra nobilia. ¶ Tertia rõ eſt. Ip̃a nã euãt ex vijs ꝓpĩquioribꝰ: ergo ita dꝫ facere medicꝰ maxime cũ vie ſunt ꝯueniẽtes euacuationi. Sꝫ vie ꝓpinquiores ad euãndũ talẽ mãm a farmaco derelictã ſunt inteſtina ⁊ ſunt mẽbra cõueniẽtia eductioni: ergo nõ dꝫ cõuerti ad cutim ꝑ balneũ. Itẽ inducit duo nocumẽta que fiũt ꝑ vſum balnei poſt aſſumptioneꝫ farmaci. Primũ ẽ ꝙ facit oppilatiões eo ꝙ mãs trahit in venas ab inteſtis. Scðm ẽ ꝙ facit poſſidere egritudines cutis q̃re malã mãꝫ trahit ad cutim. ¶ Tertio arguit̃ ſic. Per farmacũ iſti q ipꝫ ſumpſerũt remanẽt inflãmati exiccati ⁊ inaniti: ſed poſt has diſpões ꝑſeuerãtes non cõuenit balneũ preſertim ad intẽtionẽ qua hic admĩſtrat̃: ergo ⁊c̃. ¶ In oppoſitũ ẽ Aui. in lr̃a: ⁊ ꝓbat̃ duabꝰ rõibus. Primo ſic. Illud qð purgat humores remanẽtes in locis cuti vicinis ⁊ tollit inflãmationẽ mẽbroꝝ ⁊ eoꝝ cõſumptionẽ ⁊ laxitudinẽ ẽ cõueniẽs 2ª die poſt farmacum: ſed balneuꝫ ẽ huiuſmodi: ergo ⁊c̃. Minor pꝫ 4º Almãſoris. c. de iuuamẽtis balnei ⁊ pro ꝑte 2ª primi. Et maior pꝫ: qꝛ farmacati ſaltẽ pro eradicatiõe vtplurimũ ſunt exiccati: ⁊ hñt paucos humores ſupfluos: ⁊ ip̃os habẽt circa cutim: ergo cõuenit eis illud ꝑ qð hec remouẽtur. Et pꝫ aſſumptũ: quia farmaco debite adminiſtrato ꝓ euãtiõe: vt plurimũ pars humoris dimittit̃ ſuperflui cum melius ſit infra ſubſiſtere q̃ꝫ exquiſitiſſime euacuare: ⁊ illud paruꝫ relinquit̃ circa cutiꝫ: qꝛ in locis a quibus farmacũ fuit longinquuꝫ ⁊ minime potes attrahere. ¶ Scðo ſic. Illud qð aperit poros ⁊ euaporare facit cõtemperando caliditateꝫ ⁊ ſiccitatẽ cõuenit ſequenti die poſt farmacuꝫ: quia timor eſt ne aliqui humores agitati ⁊ ſubtiliati: ⁊ aliqui vapores farmaci remanſerint in totius ãbitu: quos remouere oꝫ: ⁊ remouent̃ per aperitiuũ ⁊ vaporatiuũ. ¶ In dubio iſto prĩo dicã de balneo ⁊ eius effectibꝰ quãtuꝫ attinet ꝓpoſito. 2º rñdebo iuxta viã Aui. ¶ Quãtuꝫ ad pm̃ nota ꝙ balneũ cõiter ita deſcribit̃. Balneũ eſt corpꝰ liquidũ fluiduꝫ qð corpori noſtro circũferentialr̃ occurrẽs ipm̃ accidẽtalr̃ imutat. Et vident̃ qui ita deſcribũt velle ꝙ balneuꝫ qñqꝫ ẽ aqua qñqꝫ eſt aer qñqꝫ vapor: ſiue cum iſtis ſit aliqua ꝯmixtio virtutis mineralis vel herbaꝝ vel taliuꝫ: ſiue non ſit: ſiue circa tale corpꝰ ſit ſtrictura terrea artificialis ipm̃ claudens aut nãlis: ſiue nõ ſit. Et hoc mõ terme ⁊ ſtuphe ⁊ aq̃ in ſemicupio ⁊ aer a ſole calefactꝰ vel a vento ĩfrigidatꝰ vel humectatꝰ: ⁊ talia oĩa eſſent balnea. Et videt̃ mihi ꝙ doctores medicine auctẽtici nõ loquunt̃ iſto modo. Nã Aui. 3ª primi. c. de balneo noĩando balnea vult ꝙ qui ĩdiget balneo nõ ĩdiget eo niſi vt ab ipſo hẽat caliditatẽ ſubtilẽ ⁊ humiditatẽ tꝑataꝫ. Ex quo videt̃ ꝙ oẽ balneuꝫ ẽ ĩductiuũ humiditatis tꝑate ⁊ ſubtilis caliditatis: qð nõ facit aqua frigida nec aer frĩdus exteriꝰ occurrens: ⁊ iõ puto ꝙ limitãda ſit dicta deſcriptio dicendo ꝙ balneũ eſt corpꝰ ſubtile nãliter humidũ ⁊ ita accidentalr̃ calidũ: vt corpori circũferentialr̃ occurrẽs ſit ipm̃ actualr̃ calefactiuũ. Qð ſi dicat̃ ꝙ cã balnei eſt ĩfrigidatiua: puta pª vt dicit Auic. 2ª primi dicit̃ ꝙ illa cã nõ eſt balneũ: ſꝫ ſibi deſeruiẽs. Et dicit̃ de aqua actu frigida ꝙ nõ ꝓprie dicit̃ balneuꝫ. Nota 2º ꝙ cuꝫ multiplicia ſint balnea hic loquit̃ de balneo qð ẽ ĩ cõi vſu: ⁊ eſt balneũ aeris calidi cuꝫ pñtia aque calide dulcis. hoc eñ eſt illud qð abſolute dicit̃ balneũ ⁊ in quo dicunt̃ corpora balneari lꝫ ĩproprie ꝑ quãdaꝫ ſimilitudinẽ dicant̃ balneari in aqua frĩda. vnde Aui. poſt cam̃ de vſu balnei. ponit cam̃ de balneatõe in aq̃ frĩda. ¶ Tertio nota ꝙ balneuꝫ quoſdã hꝫ effectus ĩmediatos ⁊ ꝑ ſe: quoſdã aũt mediatos ſm̃ modũ loquẽdi medicoꝝ: quoſdã per accidẽs ſiue ſint mediati ſiue ĩmediati. ⁊ põt ſm̃ varios modos ſue applicatõis ⁊ ſm̃ varietatẽ diſpõnis corporis qð balneat̃ qñqꝫ calefacere vltiate: qñqꝫ ĩfrigidare: qñqꝫ humectare: qñqꝫ exiccare: qñqꝫ ĩpiguare: qñqꝫ macrefacere: qñqꝫ aperire: qñqꝫ oppilare. Et ideo diuerſis corporibꝰ ⁊ eidẽ corpori in diuerſis diſpõnibꝰ eſt aliter ⁊ aliter admĩſtrãduꝫ: ita ꝙ nulluꝫ videt̃ corpus cui nõ poſſit ĩ aliqua diſpõne ⁊ aliquo mõ diſcõueniẽter approximari. Et iõ cum querit̃ vtruꝫ tali corpori vel tali diſpõni ꝯueniret balneũ: nõ eſt ſenſus vtrũ qualitercũqꝫ applicatũ vel cuꝫ quacũqꝫ circũſtãtia alia ꝯueniat: tunc eñ nulli corpori ꝯueniret. Sufficit ergo ꝙ cũ aliqua diſpõne ſit ꝯueniens: verbigrã ſi dicat̃ vtruꝫ balneũ ꝯuenit homini ſcða die poſt aſſumptõeꝫ farmaci. Senſus eſt vtrũ ĩ aliqua diſpõne corpꝰ inueniat̃ ſcða die poſt aſſumptionẽ farmaci ĩ qua ſibi ꝯueniat. Et ſi quis magis realr̃ ĩtelligat põt addi ꝙ qñ farmacũ precedẽti die ſumpſit vel indicatõe ſũpta ab hoc ꝙ farmacũ ſumpſit. Nã nemo dubitat ꝙ corpore ſtatiꝫ cibato aut inteſtinis plenis malis humoribꝰ aut ſupfluitatibꝰ aut hora vehemẽtis famis nõ ꝯueniret: ⁊ ſi p̃cedẽti die farmacũ ſumpſiſſet. ⁊ hoc ꝓ nunc de balneo. ¶ Sed ꝓ rñſione ad queſituꝫ nota pº ꝙ corpoꝝ purgatoꝝ per farmacũ q̃dã euãnt̃

eũone eradicatiua merito dicta q꞉ totalꝛ eũante humoreꝫ eradicatiue ſupfluũt aut quaſi quedaꝫ tantũ minoratiue: q꞉ multũ adhuc de ſupfluo ⁊ peccante humore remanſit. ¶ Scḋo nota ꝙ corpa eradicatiue bñ ⁊ artificialꝛ purgata ꝑ operationẽ farmaci vtplurimũ non remanẽt oĩo bene mũda a malis humoribꝰ. Iſtḋ pꝫ q꞉ melius ẽ īfra ſubſiſtere q̃ꝫ exquiſitiſſime euacuare: ergo in rõnabili eũone cum vtplurimũ ex arte dꝫ fieri id qḋ ẽ melius: euacuať ꝓ eradicatõe nõ exquiſitiſſime: ⁊ per ꝯſequẽs aliqḋ de humore ſupflue remanet. Ex quo cuꝫ deſcriptiõe eradicatiue euacuatõis: pꝫ ꝙ id qḋ remanet ẽ paucũ. ¶ Nota 3° ꝙ tale paucũ qḋ remauet dꝫ vtplurimũ remanere ĩ locis a quibꝰ minime potuit farmacũ trahere: q꞉ vnde potuit magis trahere magis eũauit: ergo aliȷs paribꝰ magis remanet in locis dictis. Ex quo ſequiť ꝙ vtplurimũ tale paucũ remanet in ambitu totiꝰ ꝓpe cutiꝫ extra venas. ab his ciꝫ locis ꝓpter diſtãtiã ⁊ groſſitiẽ ⁊ friditatẽ ⁊ viaꝝ ſtricturã minime põt farmacũ attrahere. ¶ Quarto nota ꝙ quãuis nõ oẽs humores q agitanť a medicĩa trahanť ad ĩteſtina: ⁊ nec ſtatiꝫ poſt ꝯſuetã opationẽ farmaci ſiſtať motus humoꝝ verſus ĩteſtina: ⁊ cuꝫ hoc vtplurimũ aliqḋ de humoribꝰ qui remanẽt hoc mõ agitati in ſequẽti die inueniať ĩ ĩteſtinis: experiẽtia tñ pꝫ hos motꝰ aliqñ quietari. Et Aui. videť inuere ꝙ aliqñ ſunt quietati in 2ª die. Silꝛ ẽt humores qui ad ĩteſtina cucurrerũt 2ª die cuꝫ cliſteri debẽt euacuari: ⁊ ideo in ſequẽti die ꝑ magnã ꝑteꝫ ſui nec humores motu farmaci tẽdunt ad ĩteſtina nec in ĩteſtinis ſũt humores mali. ¶ Ex his rñdeť ad q̃ſitũ per ꝯclõnes quaꝝ pª eſt iſta. Stante humoꝝ motu a farmaco verſus inteſtina non ꝯuenit balneũ niſi medicĩa ſupflueret aut de ſupfluitate timereť. Hãc vult Meſue loco allegato. ⁊ ipſaꝫ vult Aui. ĩ iſto ca°. ⁊ pꝫ ꝑ rões quaſdã poſitas añ oppoſitũ. ¶ Scḋa ꝯclõ: humoribꝰ malis exiſtẽtibꝰ notabilis quãtitatis in ĩteſtinis nõ ꝯuenit introitꝰ balnei cuꝫ mora diu. Pꝫ q꞉ mãe mouenť de loco ignobili ad ignobilẽ per locuꝫ nobileꝫ qḋ ẽ ĩconueniẽs. Ex quo pꝫ ꝙ anteq̃ꝫ in balneũ ingrediať 2ª die: ille q ſumpſit farmacũ dꝫ ſũpſiſſe cliſtere ſi aliter hec ſuperflua nõ emittanť. ¶ Tertia ꝯcluſio: ſi farmacuꝫ ſuperflue operať merito huius nõ oportet ſequẽti die ingredi balneũ reſolutionẽ faciẽs. Pꝫ q꞉ augereť diſpõ illa pter nãm que ẽ inanitio. ¶ Quarta ꝯclõ: poſt eũatões minoratiuas nõ oꝫ ſequẽti die gr̃a reſolutõis ĩgredi balneũ. Pꝫ q꞉ remanet mã mlťa ⁊ maius eẽt nocumẽtũ agitationis ⁊ periculũ motus humoris q̃ꝫ iuuamẽtũ reſolutionis: vt pꝫ intelligẽti in hac mã. ¶ Quinta ꝯclõ: vt plurimum poſt farmaci eradicatiui exhibitionẽ: aliȷs deductis cauſis ſequẽti die opꝫ ingredi balneũ. ꝓbať q꞉ vtplurimũ in talibus ꝓpe cutiꝫ remãſit mã ſupflua que ẽ apta per balneũ reſolui ⁊ nocumẽta ſunt apta ſequi ſi rationabilꝛ ꝓcedať: q꞉ motus farmaci ẽ quietatꝰ ⁊ ĩ inteſtinis nõ erũt mãe male trahẽde ad cutim. Et hoc ẽ pro mẽte Aui. ⁊ q꞉ rõnes q̃s fecit Meſue nõ ſunt cõtra iſtũ intellectũ: iõ puto ꝙ nõ cõtradicũt Meſue nec Aui. quẽadmodũ dicit Cõciliator in differẽtia 145ª. Rõnes eĩm nõ ꝓbãt niſi de illo in quo humores inclinãť ex motu farmaci ad ĩteriora: aut ĩ quo ſunt humores qui ĩ ĩterioribꝰ peccãtes trahẽtur ad extra: quorũ nullũ contingit in his de quibꝰ Aui. loquiť. Et q꞉ qui ſumpſerũt farmacũ poſſunt eẽ ex alia cã q̃ꝫ ex opere farmaci in diſpõne ad ſtãdũ ĩ balneo: iõ dixi ĩ ꝯclõne alia cã deducta. Aui. aũt q꞉ vidit ꝙ qñq̃ꝫ medicꝰ põt errare ĩponendo ĩ balneo farmacatũ ad oñdẽdũ ꝙ hic error ẽ paruꝰ: cuꝫ de facili vitari poſſit: ḋdit modũ quo illud percipere poſſumus: ⁊ per hec diligẽs facilꝛ ſoluit.

Scias preterea ꝙ ei qui inteſtinoꝝ patitur debilitateꝫ plerũq̃ꝫ ex medicinis ventreꝫ ſoluẽtibus aduenit vẽtris ſolutio fortis ⁊ prolõgabitur ei res ⁊ multis indigebit medicinis donec retineatur.

Quincuplex inuenitur debilitas inteſtinoꝝ. Una ẽ ſicut obtuſio ſẽſus coꝝ: alia eſt ſue attractiue: alia expulſiue: alia digeſtiue: ⁊ iſte quattuor ḋbilitates vtplurimũ eueniũt in colicis ⁊ iliacis paſſionibus: neq̃ꝫ prohibẽt de exhibitõe medicĩaꝝ fortiũ. Alia ẽ debilitas retẽtiue virtutis ĩteſtinoꝝ pp quã leniter a quacũq̃ꝫ cã oriť fluxus vẽtris vt a peduꝫ frigore vel modico reumate vel diſſueto cibo ⁊ huiuſmodi: ⁊ de hac videť loq hic Aui. Cã aũt durabilitatis huiꝰ fluxus põt ꝓuẽire a forti ĩpreſſiõe quã facit medicĩa in debilibꝰ ĩteſtinis ac ab attractione forti humoꝝ ad ea cũ vehementi diſpõne ad taleꝫ fluxum.

¶ Hic ponit cañ. aliũ dicẽs ꝙ tu debes ſcire ꝙ ĩ illo qui patiť inteſtinoꝝ debilitatẽ timeť plerũq̃ꝫ ex medicis ſolutiuis ſupfluitas fluxus vẽtris q̃ ꝓlongať ei res: ⁊ indigebit multis medicinis. ſ. adiuuãtibus ad cõſtringẽduꝫ donec retineať. Iſtius cañ. cã patet: q꞉ debilitať cõtentiua ĩteſtinoꝝ magis in iſtis q̃ꝫ in aliȷs: ⁊ debilitas acquiriť magna ꝓpter paucitatẽ reſiſtentie: ⁊ iõ multo adiutorio ⁊ tẽpore longo indigẽt ad reductionẽ.

In ſenibus etiaꝫ ſimiliter timetur ex vẽtris ſolutione ipſius nocumentum.

¶ Hic poniť alius cañ. ĩ quo diciť ꝙ ſilꝛ in ſenibꝰ timẽtur nocumẽta ſolõnis ex ipa. Et cã ẽ q꞉ cum nocumentuꝫ ſit virtutis debilitatio ⁊ corpis exiccatio cãus in fluxũ alicuiꝰmodi ⁊ dolores ⁊ accidẽtia reliqua: ⁊ ſenes ꝓpter paucitatẽ innati caloris ⁊ accidentalẽ humiditatẽ habeãt virtutes omnes debilitatas: ⁊ cuꝫ hoc ex equali debilitatione ⁊ reſolutione ⁊ exiccatiõe magis noceãtur: ideo hec nocumenta in eis timentur.

Et ſcito ꝙ ex potu nabit poſt medicinas ventris ſolutiuas ad febres perueniť ⁊ ad eſtuationem.

¶ Hic ꝓhibet vnum potũ poſt medicinaꝫ: ⁊ dicit ꝙ ex potu nabit poſt medicinã ꝑueniť ad febrẽ ⁊ eſtuationẽ. Ex quo dať intelligi ꝙ nõ ſumať. Et ẽ nabit ſuccꝰ fructuũ. ſ. nõ depuratus qui paratꝰ ẽ ebullire: maxie cũ ab accidẽtali calore a farmaco derelicto alterať. Et q꞉ facit poſſidere oppilatiões: vñ retinẽtur vapores medicine ⁊ humoꝝ: ⁊ ḋ ſe ẽ alterabile ad caliditatem putredinalẽ: ideo facit in febrem cadere.

Poſt ſolutõeꝫ quoq̃ꝫ vẽtris ⁊ minutiõeꝫ multotiẽs ĩ epate aduenit dolor quẽ aq̃ calide potus remouet.

¶ Ponit cañ. de remouẽdo quoddã accidẽs: ⁊ dicit ꝙ multotiẽs poſt flobothomiã ⁊ potũ farmaci accidit dolor in epate: ⁊ illũ remouet potus aque calide. ⁊ putãdũ eſt q꞉ epar non ſentit niſi per pãniculũ: ⁊ ꝙ hic dolor in hoc caſu accidẽs ſit vtplurimũ a ventoſitate: qua reſoluta ꝑ potum aque calide remoueť dolor.

Et ſcito ꝙ tẽpus quo maior canis aſcẽdit ⁊ frigoris fortis nõ eſt tẽpus ſumẽdi medicinã. Medicina eniꝫ in vere aut autũno eſt bibẽda. Et ver quidẽ eſt cuꝫ niues de mõtibꝰ cadũt. Et poſt ver quidẽ venit eſtas ĩ q̃ nõ ẽ ſumẽda niſi res ſubtilis. Autũnꝰ vero ẽ veri ꝯrius.

¶ Repetit cañ. ſupra dictũ: dicẽs ꝙ tẽpus in quo aſcẽdit maior caliditas: ⁊ ſilꝛ in tꝑe magni frigoris nõ ẽ tẽpus ſumẽdi medicinã: ſꝫ dꝫ ſumi in vere ⁊ ĩ autũno: ⁊ ver ẽ tẽpus ĩ quo niues de montibꝰ cadũt: ⁊ poſt ver ſequiť eſtas in qua non ẽ dãdũ ſolutiuum aliqḋ niſi ſubtile. i. debile. ⁊ autũnus aũt eſt tꝑs declaratũ ſupra in fen 2ª. ⁊ cãe iſtius cañ. ſunt declarate ſuꝑ illo affo. Sub cane ⁊ ante canẽ ⁊c̃. Nã in eſtate virtus ẽ debilis ⁊ motus humoꝝ ẽ cõtrariꝰ motui medicine ⁊ corpora ſunt nimis calida: ⁊ eſtas precipue quo ad calidiorẽ partem ẽ illa in qua canis aſcẽdit. In hyeme aũt humores ſunt ꝯgelati ⁊ pori ac vie clauſi valde prohibẽtes reſolutõeꝫ ⁊ exitũ vaporis farmaci: ⁊ q꞉ in tꝑe illo ad reſiſtenduꝫ frigori indigemus forti virtute ẽ incõueniẽs. In vere aũt ⁊ autũno: q꞉ ſunt tẽpora temperamẽto vicina: lꝫ magis ver cõueniat medicine. Nã nõ eſt corpus paratũ calefactioni plurime: ⁊ humores ⁊ vie non ſunt plurimũ indiſpoſiti ꝓ eũatione. De vere autẽ dictuꝫ ẽ ſupra: ⁊ dicta hec intelliganť quo ad eũationẽ gratia generalis preſeruationis non gratia cure.

Scias ꝙ canis maior ẽ ſtella fixa inter ſignũ geminoꝝ ⁊ ſignũ cãcri: que canis diciť: vel q꞉ apparet ſub figura canis: vel q꞉ ſub dominio canis calor mordax viget ⁊ aduſtiuꝰ humoꝝ. ⁊ hec ſtella videť eẽ maior q̃cũq̃ꝫ alia ſtella fixa: imo videť appropiquare ad magnitudinẽ veneris poſite in auge ſui epicicli: ⁊ eſt de xv. maioribus ſtellis ab alfagrano numeratis. ⁊ ſub dominio iſtiꝰ ſtelle Hyp. quarta ꝑticula affo. affo. quinto. vetuit farmacias cum dixit: Sub cane ⁊ añ caneꝫ moleſte ſũt farmacie. Tu auteꝫ pro cauſis huius recurre ſupra ad illḋ paragraphũ circa fineꝫ primi capľi. Ex regulis preterea q̃s tu obſeruare debes ⁊c̃.

Ampliꝰ nãe nõ ẽ faciẽda ꝯſuetudo bibẽdi medicĩaꝫ cũ qua neceſſe ſit mollificare vẽtreꝫ q꞉ fiet ꝯſuetudinaria: ⁊ hoc hñs ad ĩpedimẽtuꝫ male finis perueniet.

¶ Hic ponit cañ. aliũ dicens ꝙ nature nõ ẽ facienda cõſuetudo bibẽdi medicinã cũ q̃ ſit neceſſe mollificare vẽtrẽ quare fiet ꝯſuetudinaria: ⁊ habẽs hoc. ſ. ꝙ medicina ſit cõſuetudinaria ꝑueniet ad impedimẽtuꝫ mali finis. Cã cañ. ẽ q꞉ nã nõ aſſuefiet expellere niſi cũ farmaco ſtimulãte magis q̃ꝫ faciat ſupfluitates per ſe. Et iõ ꝑua ſtimulatio non irritabit ad expellendũ: ⁊ erit oportunũ ꝓ oĩ ſuperfluitate expellẽda ſumere ſolutiuũ: ⁊ hoc deducit ad malũ finẽ corpora nimiũ exiccando p̃cipue pp epatis nocumẽtũ.

Unũquẽq̃ꝫ etiam qui fuerit ſicce cõplexionis deiȷcit fortis medicina.

¶ Hic eſt alius cañ. ⁊ eſt ꝙ fortis medicina deiȷcit illuꝫ qui ẽ ſicce cõplõnis: ⁊ cã ẽ clara.

Oportet preterea vt ſuper debileꝫ medicinã ex motu minuať ne eius virtus reſoluatur.

¶ Alius cañ. ẽ ⁊ ẽ: Super debili medicĩa nõ dꝫ fieri fortis motus ne virtꝰ reſoluať. Cã huiꝰ ẽ: q꞉ fortis motꝰ cuꝫ corpus multũ calefacit reſoluit medicinaꝫ: ⁊ cuꝫ hoc mouet humoreꝫ ad cõtrariũ motus medicine: ⁊ ſuperat virtutem medicine ſi ſit debilis. In forti autẽ medicina ſi fiat motus agitabuntur humores: ⁊ ideo a medicina que ſuperat attractione ſua motus humoruꝫ ad exteriora trahẽtur ⁊ magis operabitur.

Ex medicinis quoq̃ꝫ debilibus benedictis ſunt viole cum zuccaro.

¶ In iſta parte diciť ꝙ viole cũ zuccaro ſunt medicina debilis ⁊ benedicta. Diciť aũt benedicta quia nec accidẽtia difficilia facit: nec nocumẽtũ notabile infert operando ſicut mãna caſſiafiſtula ⁊ viole ⁊c̃.

Et iſte cui in hyeme neceſſariuꝫ fuerit medicinaꝫ bibere vẽtũ obſeruet meridionalẽ. ⁊ in eſtate dixerũt quidaꝫ eorum ecõuerſo. hoc quideꝫ diuiſionẽ habet.

¶ Ponit cañ. de obſeruãtia ⁊ equalitate dieꝝ ĩ quibus ſumiť medicina: dicẽs ꝙ in hyeme ille cui ẽ neceſſariũ ſumere medicinã obſeruet ventũ meridionalẽ. i. ſumat ĩ die flatus venti illius. Et quidã dixerũt ꝙ in eſtate ẽ ecõtrario: q꞉ dꝫ obſeruari vẽtꝰ ꝯtrarius: ſed hoc 2m hꝫ dubiũ. Et nõ obſtãte ꝙ quidã aliter exponãt: tamen ego puto ꝙ Aui. primã ꝑtẽ dicat abſolute ꝙ ſumẽs medicinã ĩ hyeme obſeruet vẽtum meridionalẽ ad eliquãdũ humores ⁊ mollificandũ viſcera ⁊ vias: nõ tñ ꝙ ſe exponat flatui venti ſꝫ ſtet in aere quẽ vẽtus alterauit. Sed ſcḋam partẽ. ſ. ꝙ ſit ecõtrario faciẽdum ĩ eſtate hoc nõ dicit Aui. abſolute: ſed auctoritate

Põt aſſignari triplex cã quare tẽpore hyemis ꝓ medicina ſumẽda ſit obſeruandus vẽtus meridionalis. pª q꞉ auſter calidus ẽ ⁊ hũidꝰ iuxta illḋ Gal. tertia affo. cõmento illius affo. Quotidiane vero cõſtitutões. dicẽs: quic

UVA. BHSC. IyR_006_1

quid enim facit ſola humectatõe ⁊ calore agit. 2ª ẽ q: auſter diſſoluit humores ⁊ hũectat corpa: vt dicit Hyp. i affo. xviij. nunc allegato. ⁊ Galien⁹ in ꝯmẽto. 3ª cã eſt q: vẽtus iſte de ſe laxat vẽtrẽ: vt dicunt Hyp. ⁊ Gal. affo. ⁊ ꝯmẽto eodez. Scito tñ ꝙ i quibuſdã medicinis prohibet auſter ſicut in aſſũptiõe turbit: vt vult Meſue in ſuo de ſimplicibus in fine caplĩ de turbit parapho primo. Js aũt qui ſumpſit turbit ⁊c̃.

auctoritate aliquorũ. Et cũ dicit ꝙ hoc diuiſionẽ hʒ: põt itelligi tribus modis. Prĩo ꝙ nõ oẽs medici in hoc concordãt. Scdo ꝙ hẽat dubitationẽ: ita ꝙ ꝑ diuiſionẽ itelligat dubitationẽ. Uel 3° ꝙ hẽat hoc diuiſionẽ: q: non ẽ verũ de oĩbus ſed de aliquib⁹. Qui eiʒ hñt fortẽ retẽtiuam ĩteſtinorꝫ nõ debẽt nec eſtate nec hyeme ſumere farmacũ ĩ flatu ſeptẽtrionis ne huiuſmodi cõſtringat vẽtrẽ: ſed qui multũ debilẽ ⁊ fluxibilẽ hñt debẽt expectare talẽ diem: ⁊ nõ debẽt morari in flatu vẽti.

Eger cum debili indiguerit ſolutione ⁊ non operabitur: non magis moueat ſed dimittatur.

¶ Ponit aliũ cañ. dicẽs ꝙ qñ eger indiguit debili ſolutione: ⁊ ſupple ſumpſit debilẽ medicinã ⁊ nõ opata fuerit ſic dimittat ⁊ nõ magis moueat: ⁊ hoc q: ille plus noceret ex debilitate que ſequeret datiõnẽ alteri⁹ medicine q̃ʒ iuuaret ex eius aſſumptiõe. Jõ dimittẽdus ẽ maxime: q: nõ multũ indiget ſolutiõe. Jn ſano aũt ꝑꝑ fortitudinẽ virtutis nõ ẽ ita neceſſariũ. Et in egro qñ forti indiget ſolutiuo qñ debile nõ operat nõ oʒ ꝙ dimittat. p° q: timet ne farmacũ forte aliquid faciat nocumẽtũ. 2° q: ſunt ibi humores mali multũ nocẽtes quos oʒ eũare.

Egritudo quoqꝫ multotiẽs ebullire facit vẽtris ſolutionez ⁊ accidit febris: ⁊ eſt cuʒ minutio ſufficit.

¶ Ponit vltimũ cañ. quẽ Dy. exponit hoc mõ ꝙ mltotiẽs egritudo facit ebullire. i. facit nocumẽtũ circa vẽtris ſolõnẽ: ⁊ accidit febris. i. talis egritudo ẽ ſicut febris. Et ẽ cũ minutio ſufficit. i. qñ flobothomia excuſat te ab illa ſolutõe vẽtris. Et ita intelligas ꝙ põt ſolutio vẽtris excuſare a flobothomia: vt dicit 10ª tertij. c. de cura dolorꝫ ⁊ partiũ pectoris ꝙ multotiens excuſat ſolutio oĩ die ſemel aut bis a flobothomia. Ego aũt ⁊ ſi nõ putẽ hanc ſñiaʒ falſaʒ: tñ puto ꝙ Auic. voluit ꝙ multotiẽs cõtingat ꝙ egritudo ẽ cã quare vẽtris ſolutio ebullit. i. multũ calefit: ac ſi eſſet egritudo a colera cũ agitatio faceret magnũ calorem: ⁊ ad talẽ ebullitõez ſequit febris que ẽ forte ſinocha ſine putredine: ⁊ nõ forte ĩ aliqua tali ſufficit ad febrẽ remouendã diminutio: ſed tu elige expoſitionẽ que tibi placet.

¶ Caplm ſextum de ſuꝑfluitate medicine ventrez ſoluẽtis ⁊ de hora conſtringendi eam.

e X ſignificatõib⁹ quib⁹ cognoſcit hora qua eſt catarticũ conſtringẽduʒ eſt ſitis. Cum ergo ventris ſolutio perſeuerauerit ⁊ ſitis non acciderit non erit timenduʒ ꝙ ſuperfluitas peruenerit.

¶ Jſtud caplm cũ precedẽti cõtinuat hoc mõ: cũ Auic. ſupra determiauerit de regulis ſolutiõis ventris: hic docet cognoſcere quaſcunqꝫ diſpõnes ⁊ eis ſuccurrere que vtplurimũ ſolẽt ſequi eũationẽ talem. Et q: iſte diſpõnes ſunt due. ſ. ſuꝑfluitas fluxus ⁊ defect⁹: ideo docet primo ſuccurrere ſuꝑfluitati fluxus. 2° defectui. 2ª ibi: cũ farmacia. Prima in duas. nã p° docet cognoſcere ſufficientẽ ⁊ ſuperfluã eũationez. 2° docet ſuccurrere ſuꝑflue. 2ª ibi: inanitio. Preſens caplm diuidit in tres ꝑtes. Nã p° ponit vnũ ſignũ ſuꝑflue eũatiõis. 2° aliud. 3° ponit cañ. nõ de ſuꝑfluitate: ſed de vno alio accidẽte. 2ª ibi: qñqꝫ eſt exitus. 3ª ibi: ⁊ ſi cui. Prima in duas. p° ponit ſignũ. 2° dterminationẽ ſigni. 2ª ibi: verũtamẽ. Dicit primo Aui. ꝙ de ſignis de quib⁹ cognoſcit hora qua reſtringẽda eſt opatio catartici ẽ ſitis: ⁊ qñ ſolõ ventris pſeuerat aduenit ſitis: ⁊ ſi nõ aduenit nõ eſt timẽdũ de ſuꝑfluitate flux⁹. Ex quo dat intelligi ꝙ ſitis ẽ cõuertibile ſignũ cũ ſuꝑfluitate fluxus cũ cõditionib⁹ ĩfra dicẽdis. Nã ẽ ſignũ ſuꝑfluitatis: ⁊ ſi nõ adeſt ſitis nõ ẽ timẽda ſuꝑfluitas opatõis medicine. Sʒ hec quomõ limitanda ſint videbit ĩfra ĩ dubio.

Uerũtamẽ ſitis quãdoqꝫ accidit ⁊ non propter multitudinez ſolutõis ventris neqꝫ propter eius ſuperfluitatez: imo ꝓpter cauſaʒ diſpoſitõis ſtomaci: quoniaʒ ſi fuerit calidus aut ſiccus aut vtrũqꝫ faciat cito ſitim: aut propter cauſaʒ diſpoſitiõis medicine cũ fuerit calida pũgitiua: aut ꝓpter cauſaʒ materie in ſeipſa: quoniã cum fuerit calida ſicut colera aut in talib⁹ quales ſunt cauſe huiuſmodi nõ erit longe quin feſtina veniat ſitis: ⁊ ſi cũ hoc haruʒ rerum accidit contrariũ non erit longe quin penitus ſitis cuʒ tarditate veniat.

¶ Hic determinat hoc ſignũ: ⁊ diuidit in duas partes. Nam primo oñdit quib⁹ cauſis cõtingit errare in iudicãdo ꝑ hoc ſignũ. 2° ĩfert rectũ modũ iudicãdi. 2ª ibi: cum ergo. ¶ Dicit primo ꝙ ſitis qñqꝫ accidit nõ ꝓpter ſuperfluitatẽ fluxus ventris: imo ꝓpter cãm diſpõnis ſtomaci: qm̃ ſi fuerit calidus aut ſiccus cito faciet ſitim cũ ſuꝑfluitate eũationis. Aut erit hoc ꝑꝑ cãm diſpõnis medicine vt cũ medicina purgatiua fuerit calida ⁊ ſicca. Aut 3° ꝓpter cãm in humore qui eũatur ⁊ agitat ⁊ ad ſtomacũ ducit: vt ſi ille humor ſit calidus ⁊ ſiccus ſicut in colera: aut in talibus quales ſunt iſte cãe: vt aer calidus: ⁊ abſtinere pri⁹ a potu ⁊ multa talia: vt humor ſalſus ⁊c̃. tũc nõ erit longe quin accidet ſitis feſtina. ſ. ante ſuꝑfluitatẽ: ĩmo ante ꝯplemẽtũ eũationis. ⁊ hec ſunt dicta Gal. ĩ cõmẽto illi⁹ affo. Quicũqꝫ ĩ farmacijs. ⁊ ſunt dicta ſupra. c. 4°. ⁊ ſilr nõ eſt longe qđ cũ ẽ cõtrariũ harꝫ rerũ tardet aduent⁹ ſitis poſt initiũ ſuperfluitatis eũationis.

Cũ ergo videris ꝙ ſitis iaʒ ſuꝑfluit ⁊ ꝙ vẽtris ſolõ nõ ſit pauca ꝯſtrige ⁊ ꝓcipue cũ cãe feſtinatõis ſitis ⁊ velocitatis ipſi⁹ nõ fuerit in vẽtre: qm̃ ĩ huiuſmodi nõ debes tardare conſtrictionẽ cum ſitis apparuerit.

¶ Cõcludit ⁊ infert hic rectũ moduʒ ſignificandi ex ſiti: dicẽs ꝙ ſi vides ꝙ ſitis ſuꝑfuit: ⁊ ꝙ vẽtris ſolutio non ẽ pauca cõſtringere ⁊ precipue cũ cã feſtinatiõis ⁊ velocitatis ſitis nõ fuerit in vẽtre: quoniã in hoc cãu nõ dʒ medicus tardare cõſtrictionẽ cũ apparuerit ſitis: ĩmo ſtatim cũ incipit dʒ cõſtringere vel nõ dʒ tardare vſqꝫ ad aduentuʒ ſitis: ergo nec poſt: ſʒ prior ẽ melior. ¶ Circa ꝑtẽ ſolet dubitari vtrum ſitis ſit ſignũ ſufficiẽtis eũationis medicine? Negatiue arguit q: ſitis põt accidere poſt ſuperfluitatẽ ⁊ põt accidere añ ſufficiẽtiã eũationis: ergo nõ ẽ ſignũ ſufficiẽs. Aſſumptũ pʒ ex Gal. 4ª ꝑticula affo. cõmẽto illi⁹ affo. Quicũqꝫ in farmacijs. ⁊ Meſue in de cõſolatõe medicinarũ ĩtentione 3ª. c. de ſuꝑfluitate ſitis. ĩ hoc dubio reſpondet Dy. ꝙ ſitis vt põt colligi ex Meſue loco allegato accidẽs poſt ꝯſumptionẽ farmaci ẽ triũ modorũ. Quedam enim ẽ ꝓoccupãs: ⁊ quedã ſubſequẽs ſuperfluitatẽ: ⁊ quedã ſequẽs ſufficiẽtiã eũationis. Preoccupans eſt aut ꝓpter qualitatẽ corporis: q: calidũ aut ſiccũ aut vtrũqꝫ: aut ꝓpter qualitatẽ medicine q: actuata a mã falſa: ⁊ quomodolibet calida ⁊ ſicca: aut ꝓpter qualitatẽ humoris qui eũatur q: calidus ⁊ ſiccus aut amar⁹ aut ſalſus. Et iſta ſitis preoccupãs ẽ ante eũationẽ humoris: ⁊ cũ anxietate ⁊ anguſtia. Subſequẽs aũt ſuꝑfluitatẽ eũatiõis ẽ cũ ariditate vel extenuatiõe ⁊ debilitate ⁊ triſticia: ⁊ poſt multam eũationẽ. Sitis aũt ſuccedẽs debitã eũationẽ ẽ illa que ẽ poſt notabilẽ eũationẽ cũ lenitate ⁊ q̃te ⁊ iocũditate. Ad ꝓpoſitũ Aui. nõ loquit niſi de hac tertia que ꝓculdubio ſignificat ſuper ſufficiẽtẽ eũationẽ. ¶ Quid ſi querat q̃re ſitis accidit poſt purgationẽ? Dicit primo ꝙ quidã dicunt mẽbra poſt purgationẽ multũ inanita eẽ: ⁊ iõ petere a ſtomaco ⁊ trahere ab eo humidũ roridũ qđ ĩ ſtomaco exiſtẽs ẽ ſitis priuatiuũ. Et hic modus nõ placet ei q: ſi membra hec traherẽt: hoc eẽt: q: humiditas mẽbrorꝫ iuuatiua eſſʒ eũata. Modo hoc ẽ falſum q: tũc eẽt ſuꝑflua eũatio. Mõ nos loqmur de ſiti ſequẽte ſufficiẽtez ⁊ nõ ſuꝑfluã. ¶ Dicit 2° ꝙ cã ẽ caliditas ⁊ acuitas farmaci: ⁊ q: farmacũ non erat multũ forte nõ potuit ĩ pauco tꝑe: nec dũ in ſtomaco eẽt humiditas facere ſitim: ſed hñ eo purgato potuit paucã humiditatẽ remanẽtẽ accendere. ¶ Querit etiaʒ quomodo ſitis ſignificat ſuper ſufficientem euacuationẽ? Uidetur enim ꝙ in pluribus non ſignificat illud. nam in frigidis ⁊ in euacuatione frigidoruʒ humorꝫ non accidit niſi poſt ſuꝑfluã eũationẽ. in calidis aũt ⁊ eũatione calidorum humorꝫ accidit ante vt dictũ eſt: ergo ſoluʒ ſignificabit ĩ tẽperatis que q: ſunt valde pauca vt ĩ paucioríb⁹ erit verꝫ ſignũ. Et rñdet ꝙ hec ſitis ſignificat ĩ his q̃ ſunt tꝑamẽto vicini: q: iſti ſunt multi ⁊ plures alijs: iõ in multis ſignificat ⁊ verificat. Et 2° dat aliã rñſionez ꝙ ſignũ maxie verificat in cõplõne frĩda ⁊ humida ⁊ talib⁹ humorib⁹: ⁊ nõ ſic in ꝯrijs. Et 3° q: in illis maxie verificat hoc ſignũ ĩ q̃bus nõ eſt apta fieri ſitis preoccupãs ſed ſuccedẽs: aut talia ſunt: aut frĩda tm̃: aut humida tm̃: aut frĩda ⁊ humida que maxie ſũt talia. Et hoc vult Meſue loco ſupra allegato ꝙ cũ ſtomacus fuerit poſit⁹ in dominio humorꝫ piguiũ viſcoſorꝫ: tunc ſitis maximã bonitatez purgatiõis ſignificat. Ego aũt quo ad hec oĩa puto ꝙ ſitis abſolute non ſit ſufficiẽs ſignũ ſufficiẽtis purgatõis nec ſuꝑflue nec diminute: ſed cũ quibuſdã ꝯditõibus. Nã in corꝑe qđ aliunde nõ ſitiret ſiue ſit vni⁹ cõplõnis ſiue alteri⁹ qñ facta eũone mediocriter ſcḋm iudiciuʒ eſtimatiuũ medici ſuꝑuenit ſitis que nõ ẽ nſi cũ quiete ⁊ lenitate ⁊ iocũditate ſignificat bonitatẽ ⁊ ſufficientiã purgatõis. Et rõ: q: ſi eẽt ꝓpter caliditatẽ farmaci aut humoris acuti ſtimulãtis nõ eẽt cũ iſta quiete: q: iſta duo hñt ſtomacũ ĩquietare: ⁊ q: vtplurimũ qñ eſt facta purgatio debite quãtitatis ſcḋm iudiciũ artificiale medici eũatus eſt humor coleric⁹ ⁊ cũ hoc farmacũ: ⁊ iõ ẽt in colerico ſitis hoc mõ eueniẽs ſignificat ſufficientem purgationẽ. Jn flegmaticis aũt ⁊ frĩdis qñ accidit ſitis ſignificat ſufficiẽtiam manifeſtei purgatõis ⁊ ſignificat ipſaʒ nõ fuiſſe ſuperfluã ſi ẽ cuʒ lenitate ⁊ iocũditate. Nã cũ medicina euacuat qđ eũanduʒ nõ eſt: euacuat cũ anguſtia ⁊ ĩquietudine vt dictũ eſt ſupra. Jn his aũt qui ꝓpinqui ſunt tꝑamẽto: res ẽ manifeſta. Aut aliter dicendũ ꝙ ſitis poſt eũonez cũ farmaco nõ paucã ſignificat ſufficiẽtiã aut ſuꝑfluitatẽ eũonis in diuerſis tñ corꝑib⁹ cuʒ diuerſis circũſtantijs. Nã in calido ⁊ ſicco oʒ eſſe ſitiʒ validam ad euacuatõez nõ paucã: ĩ flegmatico pricipiũ ſitis ſignificat

Gentilis in hoc dubio adducit alia argumẽta ⁊ in rñſione ponit vnam diſtinctionez de ſiti. ⁊ tu ibi lege ⁊c̃.

Scias ꝙ talis ſitis cã eſt q: farmacũ cũ ſit calidũ ⁊ ſiccũ ꝯſũpſit humiditates roridas oris ſtomaci vnde farmacuʒ pri⁹ trahũt humores a longe ⁊ poſtea a ꝓpiquo: q̃re ⁊c̃. hec Gentilis.

UVA. BHSC. IyR_006_1

ſufficientiã. Nã Auic. inuit ĩ littera ĩ medijs medio modo ſm eſtimationẽ iudicij medici: ⁊ ſilr in alijs cauſis tarditatis ⁊ velocitatis caſus ĩ ſitim. Et per hoc pȝ rñſio primi ⁊ ſcdi. ¶ In 2ª aũt difficultate videt̃ mihi ꝙ qñ farmacum euãuit humidũ roriduȝ ⁊ illud qđ locũ eius tenet: nec aliđ tranſmittit̃ a capite ⁊ vicinis locis: ſignificet ſufficientiã. Nec valet argumẽtũ: euacuat̃ humiditas iuuatiua: ergo euãtio ẽ ſuperflua vel mala. nã nõ eſt aliqđ hñs iuuamẽtũ in quo nõ ſit aliqđ nocumẽti xjº terapẽtice. Pȝ ẽt ex dictis ꝙ in vomitu facto a ſolutiuo ẽt ſitis hoc mõ accñs ſignificat ſufficientiã euãonis. Et pȝ cã quare fames nõ ponit̃ ita ſignũ: qꝛ inanitõeȝ ſtomaci nõ ſequit̃ fames niſi trahãt vene: ⁊ vene a farmaco debilitate qñqȝ nõ ita trahũt. Alij tñ dicũt cãm eẽ qꝛ fames ſequit̃ ꝯſumptionẽ ſubſtãtiſici humidi ꝙ nõ hȝ farmacũ euãre niſi cuȝ ſuperfluit. Et ꝑ hoc pȝ ſolõ ad argumẽta añ oppo. Pȝ ẽt quõ priuatio ſitis ſignificat ꝙ nõ ẽ ſupflua euãtio timẽda quoad multitudinẽ ꝯueniẽtis hũoris ⁊ boni curatiui ꝑ farmacũ: lȝ forte cũ priuatõe ſitis ſit qñqȝ euãtio ſupflua quoad virtutẽ.

Qñqȝ etiã exitus eius qđ egredit̃ eſt demõſtratiuus hore ꝯſtringẽdi. Qui eiȝ colerã expellit rubeã cũ viderit ꝙ iaȝ ꝑuenit̃ ad flegma ſciat ꝙ iã medicina ſupflue operat̃: ⁊ quãto magis ſi ad coleraȝ peruenit̃ nigrã. Sanguis vero maioris eſt timoris ⁊ deterioris periculi.

¶ Hic ponit 2m ſignũ ſupflue aut ſufficiẽtis euãonis ad cognoſcẽduȝ qñ catarticũ eſt ꝯſtrigendũ: dicens ꝙ qñqȝ hec hora cognoſcit̃ per mutationẽ egeſtionũ hoc mõ: qꝛ ille qui ſũpſit medicinã purgatiuã colere rubee: ſi poſt purget̃ flegma ſignificat ꝙ euãtio ſuperfluit: ⁊ mltomagis ſi ꝑueniat̃ ad euãoneȝ colere nigre. Sȝ ſanguis qñ egredit̃ ẽ res maioris timoris ⁊ deterioris periculi. ⁊ tu hoc totũ intellige iuxta dicta ſupra in caº de regulis cõibus ſolutiõi ventris ⁊ vomitui. Et vides ꝙ expõ Dy. ibi poſita ⁊ ĩprobata nõ fuit ad mentẽ Aui. de permutatõe egeſtionũ: ſed ĩtelligit de permutatõe de vno humore vnius ſpẽi ad humorẽ ſpẽi alteriꝰ. Nõ autẽ quare exitus colere nigre poſt purgationẽ colere ſit magis ſignificãs ſupfluitatẽ qȝ exitꝰ flegmatis: colligit̃ in ꝑcedẽti caº de ordine exitus humoꝝ qñ medicine ſupflue euãnt. Nã qꝛ melancolia eſt groſſior flegmate qñ farmacũ eã nõ reſpicit de ꝓprietate nõ egredit̃ niſi qñ plus ſupfluit qȝ illa q̃ euacuat flegma. ⁊ qꝛ ſanguis tenet̃ vltio tãqȝ theſaurꝰ: iõ eſt maioris timoris ⁊ periculi: qꝛ nõ exit niſi ꝑꝑ vltimã violẽtiã illatã virtuti.

De hoc ordie euacuatiõis meminit Meſue in ſuo de ꝯſolatõe medicinaꝝ intẽtõe prima. c. ij. parapho jº. Dicimꝰ autẽ ꝙ medicia omis. Et ẽt prio: Diſtinguẽduȝ ẽ aũt ĩ poſſe medicinaꝝ ⁊c̃. ⁊ tu vlterius videbis q̃ dicit Dynus in expoſitione huius quare ⁊c̃.

Et ſicui ꝑꝑ medicinã mordicatio ſupuenerit ꝯſideranduȝ erit illud qđ in caº de mordicatõe diximus.

¶ Hic ponit cañ. ĩcidẽtalẽ: dicẽs ꝙ ſicui ꝑꝑ operatiõeȝ medicine accidit mordicatio dȝ ꝯſiderare illud qđ dictũ ẽ ĩ caº de mordicatõe. ſ. 16ª tertij. c. de pũctõe. aut qđ dictũ ẽ ſupra de mordicatõe accidẽte in ſtomaco ⁊ ĩteſtinis.

Attendas ꝙ ex altera triũm cauſaꝝ mordicatio ſtomaci vel ĩteſtinoꝝ poſt ſumptã medicinã ſolet cõtingere. ꝑª ẽ qꝛ medicina ex ſe eſt mordax ⁊ acuta ſicut euforbiũ ⁊ ſemẽ vrtice. 2ª eſt acumen illoruȝ humorũ quos medicina trahit: vt ſi fuerint colerici vel aduſti. 3ª eſt acuties ſeu vehemẽtia ſenſus ſtomaci aut inteſtinorũ: quia eoꝝ nerui ſunt teneri molles ⁊ in ſuperficie poſiti ac libere expoſiti taȝ medicinis qȝ humoribus ꝑ eos trãſeuntibus: vnde a leui cauſa mordicationẽ ⁊ doloreȝ ſentiũt: quare ⁊c̃.

¶ Caplm ſeptimũ de modo ſuccurrẽdi diſpoſitiõi eius in quo ſuperfluit ventris purgatio.

i

Nanitio ſupfluit aut ꝑꝑ venaꝝ quiebilitatẽ: aut ꝑꝑ orificioꝝ ipſaꝝ ãplitudinẽ: aut ꝓpterea ꝙ farmacia eaꝝ pungit orificia: aut ꝓpterea ꝙ ex ea ꝯplõis malicia corpi acquiſita fuerit: aut ex ea q̃ ẽ ſicut ipſa.

¶ Poſitis ſignis ſupfluitatis fluxus vẽtris: aut exiſtentis: aut incipientis: ſi vlteriꝰ flueret docet in iſto. c. ſuccurrere. Et primo facit hoc. 2º admonet medicũ de ꝓuiſiõe. 2ª in fine capituli: ibi medici vero. Pria in duas. Nã primo narrant̃ cãe quibꝰ ſupfluit opatio medicine. 2º ponũtur remedia. 2ª ibi: cũ ergo vẽtris. Dicit primo ꝙ euãtio ꝑ farmacũ facta ſuperfluit ꝓpter aliquã quinqȝ cãꝝ. Prima ẽ debilitas venarũ. 2ª amplitudo orificioꝝ earũ. 3ª punctura aut mordicatio: quã facit cõiter farmacum. 4ª qꝛ farmacũ relinquit malitiã ꝯplõnis. 5ª ſi eẽt aliquid iſti ſile: vt verbigrã mala ꝯplõ: aut mala excoriatio: aut vlcꝰ: aut texture raritas: aut pũctura ĩteſtinoꝝ vel ſtomaci vel venarũ ⁊ ſimilia. ¶ Sed vt res ſit elarior nota ex Meſue de cõſolatiõe medicinaꝝ. c. de ſupfluitate fluxus ventris ꝙ fluxus ſuperfluit ſm tres cãs in genere. Aut eim cã eſt ex ꝑte corꝑis: aut ex parte medicie: aut ex parte accidẽtiũ vtriqȝ iſtaꝝ: aut vni eaꝝ ſuperueniẽtiũ. Si ẽ ex ꝑte corporis: aut ex ꝑte viaꝝ vt venaꝝ: aut mẽbroꝝ expulſiõis: aut ex ꝑte humoꝝ: aut oĩum ſimul. Si ex parte venaꝝ: aut qꝛ ſunt debiles: aut qꝛ lata hñt ⁊ debilia orificia. Ex ꝑte mẽbroꝝ expulſiõis. ſ. ĩteſtinoꝝ ⁊ ſtomaci: qꝛ hec hñt debilia: aut nimiũ mollificata: aut qꝛ ẽ de genere hoĩum ĩ quibus ꝓhibet̃ farmacia ꝑꝑ aptitudinẽ ad coliricã paſſiõȝ vel ſiccitatem inteſtinoꝝ. Ex ꝑte humoꝝ vt ſi corpus ſit poſitũ ĩ dñio humorũ paratoꝝ ad fluxũ. Ex parte aũt medicie vt ſi ẽ venenoſa: ſi apta ẽ ĩteſtinoꝝ villis adherere: aut ſit nimie quãtitatis: aut ſit nõ bene correcta vel multã habeat malitiã. Ex ꝑte aũt accidentiũ cõmuniũ ſunt multa: ⁊ oĩa que pñt facere fluxũ de nouo: ꝑcipue cũ exponeret ſe aeri frigido aut vẽto ſeptẽtrionali. Et Aui. duas cãs ex parte corporis poſuit: ⁊ duas ex parte medicie: reliquas dedit ĩtelligi per vltimum dictum.

Cũ ergo vẽtris purgatio ſupfluit liga extrema ſuperiꝰ ⁊ ĩferiꝰ ĩcipiẽs ab aſcellis ⁊ ĩguinibꝰ dẽſcẽdẽdo ab eis.

¶ Hic Aui. exequit̃ ponẽdo remediuȝ in fluxu ſupfluo. Et primo ponit medicinã que ẽ ſine timore. 2º illã in qua ẽ aliquis timor. 2ª ibi: ⁊ ſi hoc totũ. In ꝑª facit tot quot ſunt remedia. Primũ remediũ ẽ ꝙ ligent̃ extremitates ſ. manus ⁊ pedes incipiẽdo ab aſcellis ⁊ inguinibꝰ deſcendẽdo deorſum. ¶ Ubi nota ꝙ intẽtio in fluxu cõſtringendo ẽ in iſto cãu: aut remotio malitie medicine. ſ. ſubſtantie ſue: aut mali effectus relicti puta male ꝯplõnis vel partis mordicãtis. Aut ſcđo ꝯſtrictio vel ꝯfortatio mẽbrorũ ſiue ſint orificia venaꝝ dilatata ſiue vie ductuũ rarificate. Aut tertio humoꝝ cõſtrictio ⁊ ꝯdẽſatio vel alia alteratio. Aut quarto diuerſio ad aliũ locũ qȝ ad inteſtina. Aut quito ſedare agitationẽ laborioſam: aut ſexto cõfortare aĩam ⁊ viuificare virtutẽ. ⁊ Auic. ad has intẽtiões ponit remedia. Hic aũt nõ poſuit remedia per euãtionẽ humoris peccantis: qꝛ ſupponit̃ ſuperfluã euãtionẽ eẽ: lȝ aliquãdo ẽt hoc ſit neceſſariũ. ¶ Primũ ergo remediũ ẽ diuerſiuũ ⁊ debẽt eẽ iſte ligature doloroſe ⁊ tantũ ꝯiuncte aut cõſtricte. Et ꝯſtat ꝙ ita ab aſcellis vſqȝ ad digitos manuũ ligãdo: ⁊ ſic ꝓportionalr in pedibꝰ ſit maior diuerſio qȝ ſi ſolũ in vno loco vel duobꝰ fieret ligatio. Et tu nõ attẽdas ad illos qui volunt ligare crura ne mã trahat̃ a ſuperiori ad inferiora. nã nõ trahit̃ ad ĩteſtina: ſed ab aſcellis. ¶ Sed queritur quare oȝ ꝓcedere deſcẽdẽdo. Scđo quare oȝ incipe ab aſcellis ⁊ ĩguinibꝰ. Tertio vbi dȝ fieri fortior ⁊ ſtrictior ligatio. ¶ Pro prio nota ꝙ duobꝰ modis ſolent iſte ligature adminiſtrari. Unus ẽ ꝙ primo fiat ligatio iuxta ĩguina: poſt diſſoluat̃ ⁊ fiat alia ꝑ mediuȝ coxaꝝ: ⁊ diſſoluta ſcđa fiat tertia vſqȝ ad pedes. Scđus modus ẽ incipe ab inguine: ⁊ ibi ſtante prima ligatura ꝓcedere inferiꝰ cõtinue ligando: ⁊ oĩbus ſimul ſtãtibꝰ ligaturis: ⁊ vterqȝ modus põt ſeruari ⁊ ẽ vtilis: ⁊ tũc pȝ cã primi. Qꝛ enim corpus ẽ inanitũ ⁊ membra intrinſeca nõ facile trãſmittũt ad extrinſeca: ⁊ etiaȝ qꝛ motus humoꝝ ẽ ad inteſtina: oȝ fortem eẽ motũ ad trahẽdũ humorẽ illũ ad cõtrariũ: ⁊ iõ oȝ ꝙ incipiat a locis ſaltim vicinis venis magnis: vñ hũores fluũt ad ĩteſtina ⁊ ſic ab aſcellis ⁊ inguinibus ⁊ poſt deſcẽdat. Si aũt a nimis longe incipet forte de humore currẽte nõ traheret̃ aliquid. Ex quo pȝ ꝙ iuxta inguina ⁊ iuxta aſcellas oꝑȝ fieri ligaturas doloroſas: qꝛ habent fortius attrahere qȝ ſequentes ⁊ a loco ſibi longinquiori. Sequẽtes enim trahũt a vicino: vt vicinũ trahatur ab interioribus venis magnis.

Et in potu parum tyriace aut filonj tribue.

¶ Secunduȝ remediuȝ eſt ꝙ detur in potu parum tyriace aut filonij. Et hic nota ꝙ ſi dat̃ ad quietandũ motũ ⁊ inducẽdũ ſomnuȝ ⁊ ꝓhibẽdũ ſenſationẽ ⁊ ingroſſandũ humorẽ: oȝ ꝙ tyriaca ſit noua in qua ẽ virtꝰ opij. Si aũt dat̃ ad reſiſtendũ venenoſitati farmaci: tũc tyriaca dȝ eẽ antiqua ⁊ non noua. Filoniũ aũt nõ dat̃ ita ad venenoſitatẽ remouẽdã: ſȝ ad quietandũ ⁊ ſomnũ inducendum.

Modꝰ aũt per quẽm diſcernit̃ noua ab ãtiqua: ꝑquire ab Auic. quito canonis tractatu prio. c. j. parapho illo: Ex eis q̃bus diſtinguitur ⁊c̃. Prodeſt aũt tyriaca prio qꝛ reprimit venenoſitatẽ medicine ⁊ humoꝝ cõmotoꝝ per eã. 2º qꝛ ꝓuocat ſomnũ ratõe opij. 3º qꝛ fortificat calorem innatum iuxta illud Auer. c. iiij. ſui tractatus de tyriaca ⁊c̃.

Et ſi poteris fac ipſuȝ ſudare in balneo aut vapore aque calide ſub pãnis ſuis capite exterius tracto.

¶ Ponit 3m remediũ dicens ꝙ ſi potes fac eũ ſudare in balneo: aut ꝑ vapores aque calide in lecto ſuo: ⁊ ſub pãnis ſicut cũ veſicis plenis aqua calida ⁊ vaſis ſtrictis ⁊ ſimilibus poſitis iuxta patiẽteȝ: capite tamẽ extracto ne aer calidus tractꝰ ad ĩteriora nimiũ đbilitet calorẽ ĩ exterioribꝰ. cõuenit tñ in illo cãu: vt mã illa trahat̃. Et dicit notãter ſi potes qꝛ ex alijs cãis qñqȝ iſta ꝓhibẽt̃: vt ſi eẽt nimiũ inflãmatus aut debilitatus.

Cũqȝ multum ſudauerit conſtrictiua ad potandum da ei ⁊ fricetur

¶ Ponit 4m remediũ dicẽs ꝙ qñ multũ ſudauerit ĩ balneo aut in vapore aque calide: da ei ad potandũ cõſtrictiua ⁊ frica ipm. ¶ Et nota ꝙ fricatio ſit vt abſtergat̃ ſudor: ⁊ poſſit melius fluere. ⁊ cõſtrictiua dant̃ vt confortentur inteſtina ⁊ ſtomacus.

Et fiant ei epithimata ex rebus bene redolentibus ex aqua myrtoꝝ ⁊ ſandalis ⁊ cãfora ⁊ ſucco fructuũ.

¶ Ponit 5m remediũ: ⁊ ẽ vt faciãt ei epithimata ex rebꝰ redolẽtibꝰ ſicut ex aqua mirtilloꝝ ⁊ ſandalorũ ⁊ cãphore: ⁊ cũ ſucco fructuũ. ſ. ſtipticoꝝ. ¶ Et nota ꝙ iſta epithimata ſunt approximãda ſtomaco ⁊ ĩteſtinis: nõ auteȝ alijs ꝑtibꝰ ad cõfortandũ ea ne recipiãt mãȝ. ſȝ ꝯſtrictiua alijs ꝑtibꝰ approximata nocerẽt: qꝛ ab illis exprimerẽt mãȝ verſus ſtomacũ. ⁊ iõ iſti emperici qui in fluxibꝰ vẽtris faciunt lãuãdas ad pedes ⁊ manꝰ cũ decoctõe reꝝ ſtipticaꝝ errãt vehemẽter. vñ Meſue ĩ ſuo đ cõſolatiõe mediciaꝝ caplõ de ſupfluitate fluxꝰ ventris vituperat admiſtrationẽ balnei etiã cõſtrictiui ĩ hac intẽtiõe.

Mẽbra preterea ipſius excrinſeca fricare debes ⁊ calefacere

UVA. BHSC. IyR_006_1

calefacere ventoſis cum igne ſub ipocūdriis prius poſi/
tis ⁊ inter ſpatulas ipſius.

¶ Ponit 6m remediū dicēs ꝙ tu debes calefacere mē/
bra ſua.ſ.a ſtomaco diſtātia: ⁊ ēt fricare: priꝰ tñ appoſitis
ventoſis cum igne ſuper ipocūdrijs ⁊ inter ſpatulas. Et
vides tu ꝙ calefactio ⁊ fricatio ē ad trahēdū ad exteriora ⁊
vētoſe ponūtur ī ipocūdrijs ⁊ inter ſpatulas: vt ad epar ⁊
ſplenē trahāt̄ māe a ſtomaco: vel ſaltē vt figat̄ curſus hu/
morū ꝑ hec mēbra trāſeūtium.

Vētoſe i hoc caſu dbēt adminiſtrari ſine ſcarificatione ⁊ ſanguis aduſtiōe. ꝑ has eniꝫ non ꝯuenit euacuatio ſꝫ diuerſio ſiue retētio humorum īferius decurrētiuꝫ. ⁊ que ponūtur ſub ipocūdrijs retinent humores ab epate fluentes: ⁊ que īter ſpatulas retinēt fluentes a ſuperiorībꝰ ad inferiora ⁊c̄.

Qđ ſi tibi neceſſe fuerit ſtomaco ipſiꝰ ⁊ īteſtinis ſuꝑ/
ponere empl'a ex ordeo fracto ⁊ aquis ſtipticis: fac ſil'r
ex oleis: oleo de cytonijs ⁊ oleo de maſtice.

¶ Ponit aliū cañ. dicēs ꝙ ſi fuerit neceſſe ponere ēpla/
ſtrum ſuꝑ ſtomaco cuꝫ ordeo fracto ⁊ aquis ſtipticis ſicut
de decoctiōe gallaꝝ ⁊ aqua plātaginis aut aquaꝝ roſaꝝ:
tūc fac illud: ⁊ ſimiliter īunge ſi tibi placet cū oleo de cito/
nijs ⁊ oleo maſticino. Et nota ꝙ intelligēdū ē de ordeo qđ
torrefit: aut fricat̄ multū cū pāno aſpero: vt eius abſterſi/
ua remoueatur virtus.

Jpe p̄terea ab aere frido ē ſeꝑandus qm̄ p̄mit eū ⁊
ipſiꝰ reſoluit vētrē: ⁊ ab aere calido qm̄ ipſiꝰ laxat v̄tutē.

¶ Ponit aliū cañ. dicens ꝙ remouendus ē ab aere fri/
gido qꝛ p̄mit mēbra extrinſeca ⁊ auget fluxū: ⁊ a calido ex/
ceſſiuo qꝛ diſſoluit virtutē: ⁊ hoc ītelligatur niſi ſit aptus
ingredi balneum aut ſudare.

Confortari quoqꝫ debet ex rebus bene redolētibꝰ
⁊ ex ſtipticis ad traiiciēdum: ei danduꝫ ⁊ ex tortellis ī vi/
no ſuauiter redolēte. oportet tamē vt ſint calide ⁊ vt pa
nis cuꝫ ſucco granati iaꝫ preceſſerit: ⁊ ſimiliter aſaugui/
cha ⁊ cortices papaueris albi triti.

¶ Ponit aliū remediū per cōfortationē virtutis cōiun/
ctam ſtipticitati: dicēs ꝙ cōfortari dꝫ cū bñ redolentibus
⁊ dꝫ trahere de ſtipticis ſicut tortellas.i.panē bis coctū ī
vino odorifero: ⁊ vinū dꝫ eē calidū: ⁊ āte ipm̄ dꝫ ſumpſiſſe
panē infuſum ī ſucco granati aut aſſaiaret.i.ptiſana cum
ſucco granati ⁊ cortices papa.al.triti ſup. ſunt cōuenien/
tes ante illū panē. Et tu nota ꝙ panis infuſus ī ſucco gra
nati precedit ad cōſtringēdū: ⁊ ſil'r ptiſana cū ſucco grana
ti ⁊ cortices papa.al.ad cōſtringēdū oēs iſtas res. Sꝫ tor
telle in vino ad ꝯfortandū virtutē nutriēdo ⁊ ſua aroma/
ticitate: ⁊ dant̄ cū vino calido ob facultatē penetratiōis:
⁊ vt melius ⁊ citius digerat̄.

Ex eo quoqꝫ expertū eſt vt grana naſturtij pōderis
triū.ʒ.ſumāt̄ ⁊ torrefiāt: deide ī adoch coquāt̄ donec co/
agulent̄: ⁊ ad bibēdū tribuat̄: ē nāqꝫ vltimū ī bonitate.

¶ Dicit ponēdo aliud remediū qđ expertus ē in iſto cāu
ꝙ capere.ʒ.iij.granoꝝ naſturtij torrefactoꝝ ī agdole.i.ī
lacte acetoſo ī quo coquant̄ donec coagulent̄ ē cōferens:
īmo ē vltimū in bonitate in iſta diſpōne. ¶ Nota ergo ꝙ
naſturtij ſemē nō torrefactū ſoluit ventrē: vt dicit Aui.2o
cañ. Sꝫ per torrefactionē reſoluit̄ ab eo pars ſubtilis que
ē ſolutiua ⁊ remanet pars groſſa que nō ē ſolutiua īmo ſti/
ptica ⁊ glutinoſa. ¶ Nota 2o ꝙ melius ē vt nō terant̄ illa
grana īmo ſumant̄ ītegra: vt dicit Meſue de cōſolatione
medicinaꝝ: qꝛ cuꝫ terunt̄ tollit̄ virtus ſua īpīguatiua ſiue
viſcoſitas. Ex quo pꝫ ꝙ dꝫ eſſe torrefactū ⁊ nō aduſtum.
¶ Nota 3o ꝙ Meſue nō dat ipm̄ cū lacte acetoſo: ſꝫ cum
ſucco citoniorū aut mirtilloꝝ. Utroqꝫ ergo mō dari pōt.
Cā aūt quare ē vltimū qꝛ videt̄ habere ꝓportionē aptiſſi/
mam ad tales humores īpinguandos.

Opꝫ preterea vt eiꝰ nutriēs ſit ſtipticū īfrīdatū cum
niue quale ē qđ ſit ex ſucco vue acerbe ⁊ ſibi ſimilibꝰ.

¶ Ponit aliud remediū per qualitatē cibi: ⁊ dicit ꝙ dꝫ
eſſe cibus eorū ſtipticus: ⁊ hoc ad cōſtringēdū villos ner/
uoꝝ ſtomaci.ſ.⁊ īteſtinoꝝ: ⁊ ad claudēdū ora venaꝝ: ⁊ fri
gidus ad eandē intētionē. Et hoc ſi nō ſit multa debilitas
ꝓpter quā nō ſit optimū dare calidū: vt ſupra dictū ē de
vino. vel dicit ꝙ illud ē ꝓpriuꝫ vino ne trahat̄ ad venas:
frigidū ne faciat nocumētū: ⁊ tales cibi ſunt qui fiunt cum
agreſta ⁊ ſimilibus. Qđ ſi dicat̄ ex Hypo.2o regis acu. ꝙ
cauēdū eſt tangere mēbra debilia cuꝫ vehementi frigido:
Dicit̄ ꝙ hoc eſt veruꝫ: ⁊ nos hoc non facimus quādo tale
mēbrum eſt multuꝫ debile. Preterea qñqꝫ tale nocumen/
tum tolleramus ꝓpter iuuamētum maius.

Ex eo ēt qđ ī retinēdo ſol'onē iuuat: ē vt vōitꝰ ꝓuo
cet̄ cū aq̄ cal'a ⁊ eiꝰ ēt extrema ī ea mittāt̄ ⁊ ñ īfrides ea.

¶ Ponit remediū aliud ⁊ ē vomitꝰ cū aqua calida ꝯfert
diuertēdo hūores ad ꝯtrariū ſui motꝰ ⁊ eūando ſubſtātiā
medicine ⁊ eius malitiā tēperādo. ⁊ cōfert etiā extrema po
nere in ea trahēdo ad cōtrariū: ⁊ nō ſunt infrigidāda vt ñ
augeat̄ fluxus per eoꝝ cōpreſſionē.

Cum auteꝫ alicui eoruꝫ ſincopis ſuperuenerit: da ei
vinum ad potandum.

¶ Ponit aliū cañ. accidentis: dicēs ꝙ cum alicui ſuꝑ/
uenit ſincopis det̄ ei vinū: qꝛ citiſſime virtutē confortat: ⁊
plurimū in iſtis fit ſincopis ꝑ reſolutionē virtutis.

Hoc ēt precepit Gal. xij. de ingenio ſanitatis.c.v. cū dixit ꝙ in omni ſincopi dandū eſt vinuꝫ calide nature ⁊ penetrabilis quatinus cibꝰ cito penetret ⁊c̄. Curā auteꝫ huius fluxꝰ ſupfluētis ex farmaco ordinatiſſime cum ſex vijs cōplectitur Meſue ī ſuo de rectificatiōe medicinaꝝ ītētione tertia.c.iiij. parapho illo: Auxiliabimur ergo his ⁊c̄. lege ibi quare ⁊c̄.

Et ſi hoc totum nō cōtulerit tribue ei in fine rei nar/
cotica ⁊ medicamēta fortia nota que ſunt in capl'o de ꝓ
hibitione fluxus ventris.

¶ Hec ē 2a pars capituli de remedijs timoroſis. Et dicit
ꝙ ſi iſta nō ſufficiūt ⁊ ſupple virtꝰ cōſtet tribue narcotica
⁊ medicinas fortes ad cōſtringendū fluxū vētris ſcriptas
ī ſuo.c.cañ.tertio fen 16a. ¶ Ubi nota ꝙ narcotica dicū
tur medicine ſtupefactiue ⁊ ſomnū inducētes: que ſunt vt
plurimū valde infrigidantes quaſi ī vltimo. ⁊ qꝛ talia non
adminiſtrāt̄ ſine magno nocumēto: iō nō debēt admiſtra/
ri niſi qñ alia nō cōferūt: ⁊ iō ī vltio. ¶ Scđo nota ꝙ hoc
dictū ſolet exponi ꝙ narcotica non ſunt adminiſtrāda in
principio ſuperfluitatis fluxus: īmo primo ſunt alia ꝓban
da: ⁊ cū percipit̄ ꝙ alia nō cōferunt debēt adminiſtrari: ⁊
iſta videt̄ intētio Meſue de cōſolatōe medicinarū cañ.8o
c.allegato: vbi dixit: cōpingere aūt ⁊ ſtupefacere ē illđ vl/
timū ad qđ intēdere debes: ⁊ ꝓprie tunc cū iam oīa nō cō
tulerint ⁊ res poſita ē ſicut ad deſperationē. Adducit autē
Meſue ad hoc probandū duas rōnes. ¶ Prima eſt iſta: q
exhibēt iſta narcotica ī prīcipio ſuperfluitatis fluxus faci/
unt rē magni timoris: ergo nō debēt hoc facere. Et aſſū/
ptum pꝫ qꝛ narcotica in prīcipio ſuperfluitatis fluxus ſm̄
cōplexionē contrariātur compl'oni vite: quia ſunt frigida
exceſſiue ⁊ ſicca: vt pꝫ de opio. ¶ Scđa ratio: illa non ſunt
adminiſtrāda ad reſtringēduꝫ poſt que venit fluxus diſru
prior ⁊ fortior q̄ꝫ prior: ſed ita eſt de narcoticis: ergo ⁊c̄.
Maior ē clara qꝛ ſecūdus adductus cū ſit cū virtute debi
litata a narcotico ē cuꝫ maiori periculo q̄ꝫ primus. Etiam
minor probat̄ qꝛ narcotica nō ꝯſtringūt niſi pro quāto ſtu
pefaciunt ⁊ congelāt: ⁊ non qꝛ cām fluxus abſcindāt: ⁊ cū
hoc virtutē debilitant: ergo deficiēte eorū virtute mate/
rie currēt vt ante ⁊ inueniēt membra debilitata ꝓpter ve
ſtigia cōgelationis ⁊ mortis: ergo facient fluxum maioreꝫ
q̄ꝫ prius. Quidā autē alij de quorū numero ſum ego: non
intelligunt ꝙ ſint adminiſtrāda narcotica ī fine ⁊ poſt ad/
miniſtrationē aliorū quādo nō cōferūt: īmo ſi in prino me/
dicus videt rē tātā ⁊ taleꝫ cū ſuo arbitrario iudicio ꝙ alia
nō ſufficiēt: ſi nō ſit intentio alia ꝓhibens ea melius eſt ea
adminiſtrare in prino q̄ꝫ poſt experientiā aliarū reꝝ. Qđ
ꝓbat̄ qꝛ virtꝰ ī fine erit debilior: ſꝫ tūc maxime nocēt nar
cotica qñ virtꝰ ē debilis: ergo tunc erit maximus error in
vſu eorū: ergo tunc non ſunt adminiſtranda in fine. Aut ſi
medicus ſciret ad illa oportere deuenire dꝫ adminiſtrare
ea in principio. Qđ autem arguit primo Meſue non pro/
bat niſi ꝙ nō ſunt regulariter adminiſtrāda: qꝛ hoc fit cū
magno periculo. ⁊ hoc non negat̄. Ad 2m dicenduꝫ eſt ꝙ
ſi ꝓpter illud dimittēdus eſt vſus narcoticoꝝ in prīcipio:
multo magis dimittēdus erit in fine. Naꝫ ſi fluxus redit
minus poterit tollerari in fine qñ virtꝰ ē debilitata: ⁊ ideo
dico ꝙ nō ſemper redit ſed poſſibile eſt: ⁊ iſta poſſibilitas ē
maioris timoris in fine cuꝫ virtus eſt debilior q̄ꝫ in princi/
pio. Dico ergo ꝙ Aui. per finē rei ītellexit ītentōeꝫ diſpo/
tionis in qua veriſimil'r alia non ſufficerēt: tūc eīm ab ipſo
rei initio opꝫ ꝙ iſta tribuātur. ¶ Tertio nota ꝙ ī narcoti
coruꝫ adminiſtratōe prīo ꝯſiderāda eſt maneries eoruꝫ: qꝛ
quedā ſunt ex toto fugiēda ſicut iuſquiamus niger ⁊ ſola/
truꝫ fluuiale. 2o eſt cōſiderāda quātitas ne nimiū ſuper/
abūdet: ⁊ in hoc eſt melius paulatiꝫ dare q̄ꝫ multuꝫ dare
ſubito. 3o debemꝰ cōſiderare eoruꝫ mixtionē ⁊ correctio/
neꝫ: qꝛ nō debēt dari pura preſertiꝫ fortia: īmo cuꝫ corri/
gētibꝰ mixta: ⁊ ſunt correcta in filonio. Naꝫ quedā ponū
tur ad reſoluēduꝫ ſubſtantiā narcotici ne longā moraꝫ fa/
ciat: ⁊ huius reſpectu eſt caſtoreū ⁊ piper optimū correcti
uuꝫ opij. Alia permiſcent̄ ad maturāduꝫ humorē qui ꝯge
lat̄ vt crocus. Alia ad confortanda prina vite ⁊ mēbra na/
turalia vt ē zedoaria ⁊ alie medicine cordiales ſtomacales
⁊ epatice ⁊ alie ad ſiſtenduꝫ motui materieꝝ que ꝯgelātur
de parte in partē ſicut mirra ſandaraca ⁊ olibanuꝫ ⁊ ſimi/
les. Opꝫ preterea ꝯſiderare tēpus exhibitōis.ſ.ꝙ corpus
nō ſit in diſpoſitōe plenitudinis cibi aut multe đbilitatis:
⁊ ꝙ ſit tēpus aptuꝫ ad ſomnū ſicut ē ſero: aut eſt nox: licet
ꝓpter neceſſitatē fortiuꝫ doloruꝫ dent̄ in omni hora: nec
dātur ī corpore ī quo ſint adhuc mali humores: ſed ī cor/
pore mūdificato. His eniꝫ ꝯſideratis narcotica miniſtrari
poſſūt. Et tu per hoc vide cañ. Meſue cao allegato. ī quo
etiaꝫ cao ponunt̄ quedam narcotica ſalteꝫ vſualia ⁊ preci/
pue vltimi trociſci ſcripti ab eo ⁊c̄.

Medico vero ē vtiliꝰ vt p̄uiſor exiſtat in preparā/
do trociſcos ⁊ puluereſ pōticos anteq̄ꝫ ſit hora: ⁊ vt ēt
ſit preuiſor ⁊ in enematibus ⁊ ipſoꝝ inſtrumētis.

Jſta eſt vltima pars in qua docet ⁊ admonet medicū di
cens ꝙ debeat preuidere ⁊ habere pulueres cōſtrictiuos
⁊ trociſcos apud ſe p̄paratos: ⁊ etiaꝫ ꝓuideat de ſuis ene/
matibus ⁊ ſuis inſtrumētis.

¶ Cam 8m de eo q bibit medicinā ⁊ nō ſolutꝰ fuerit.

c

Um farmacia ſolutionẽ nõ fecerit ⁊ fecerit moꝛdicationẽ vẽtris ⁊ anguſtiã in ipſo: ⁊ qui ſũpſit ipſaꝫ eſtuauerit ⁊ ſcotomabiť ⁊ dolebit caput ⁊ patieť alices ⁊ oſcitatões: ſuccurrere debes cũ enemate ⁊ coliriis ſiccis. Et ipſe quidẽ bibat maſticis. ℥.iii.ĩ aqua tepida. Medicina quoqꝫ quãdoqꝫ operať ꝓpter ſtipticoꝝ bibitionẽ ⁊ comeſtionẽ taliuꝫ qualia ſunt cydonia ⁊ maciana ꝓpterea ꝙ os ſtomaci cõpꝛimũt ⁊ qđ ſub eo exiſtit: ⁊ ꝓpter qđ nauſeã ſedãt ⁊ medicinã a ſuo motu qui eſt ad ſuperioꝛa violẽter ad partẽ mouẽt inferioꝛẽ: ⁊ ꝓpterea ꝙ nature vim inferũt. Qđ ſi enema non inuenerit ⁊ mala ſuperuenerit accidentia extẽſionis coꝛpoꝛis ⁊ oculi exierit extra ⁊ fuerit motus ad ſuperioꝛa: neceſſaria erit minutio.

¶ Aui. in iſto. c. docet ſuccurrere defectui ſolutiõis medicine. ſ. qđ ſit faciẽdũ qñ medicina nõ operať. Et diuidiť caplm in duas ptes. Nã pꝛimo facit hoc reſpcũ medicie que foꝛtia ⁊ mala infert accidẽtia. 2° reſpectu illiꝰ que timoꝛoſa accidẽtia nõ inducit. 2ª ibi: ⁊ cũ medicina. In pꝛia pte ponit q̃ttuoꝛ remedia. ¶ Pꝛimũ ẽ ꝙ ſi medicina non ſoluit ⁊ mala facit accidẽtia: qꝛ facit moꝛdicationẽ ĩ vẽtre: ⁊ anguſtiã: ⁊ eſtuationẽ: ⁊ ſcotomiaꝫ: ⁊ doloꝛes capitis: ⁊ alices: ⁊ oſcitatiões: tunc ſuccure cũ cliſteribꝰ ⁊ coliriis ſiccis ⁊ ſuppoſitoꝛiis. ¶ Scđꝫ ẽ ꝙ ſi ſumat ĩ potu tres. ℥. maſticis in aqua tepida. i. remiſſi caloꝛis: nõ tñ deť tepida: qꝛ ſic eẽt vomitiua. ¶ Tertiũ ẽ ꝙ ſumat cõſtrictiua deſup vt cydonia ⁊ poma ⁊ ſimilia: ⁊ iſta ꝯferũt quattuoꝛ modis: qꝛ cõpꝛimũt ſtomacũ ad inferioꝛa ⁊ illud qđ ẽ ſub eo. ſ. inteſtina. 2m ẽ ꝙ ſedãt nauſeã. 3m ẽ ꝙ repꝛimũt motus materierũ: ⁊ medicina que erat ad ſupioꝛa etiã violẽter ad inferioꝛa moueť. 4m ẽ ꝙ inferũt vim nature ſm quoſdã: qꝛ dant vigoꝛẽ nãe ⁊ virtutẽ cõſtringẽdo ⁊ cõiungẽdo villos vel gnãndo ſpũꝫ vt panis ĩ vino infuſus: de quo dictuꝫ ẽ ſupꝛa: vel ĩferũt vim nãe. i. cogũt ad expellẽdũ inferiꝰ illud qđ in eis cõtineť. ¶ 4m aũt remediũ ẽ ꝙ ſi enema nõ ſufficeret: ⁊ ſint accidẽtia mala extẽſionis coꝛpis ⁊ exitus oculoꝛũ ad extra: ⁊ fuerint motꝰ materierũ ad ſupioꝛa: tũc oꝫ ꝙ fiat flobothomia. ¶ Ubi pꝛimo notãdũ ꝙ ſicut ĩ ꝓcedẽti. c. diciť ꝙ ſupflua ſolutio hꝫ tria cãꝝ genera ſm modũ loquẽdi medicoꝛũ: ita dicimꝰ hic đ ſolutiõis defectu. Nã aut ẽ pp coꝛpis ſumẽtis diſpõnẽ: aut pp medicine diſpoſitionẽ: aut pp accidẽtia ſuperueniẽtia iſtis. Ex pte coꝛpis ſunt plures cãe. Nã aut ẽ pp humoꝛuꝫ ineptitudinẽ: aut ꝓpter viaꝝ ſtricturã: aut pp oppilatiões ex fecibꝰ: aut humoꝛibus viſcoſis: aut ꝓpter plurimã ventoſitatẽ factã ex mã pꝛepata innẽta que cuꝫ agitať ſubleuat medicinã: aut mteriam vel humoꝛẽ includit ĩ anfractibus ⁊ foꝛaminibꝰ: aut ꝓpter debilitatẽ expulſiue: ſicut accidit ĩ paralyſi aut apoplexia: aut ꝓpter debilitatẽ virtutis ĩmutatiue: qꝛ virtus nõ agit debite ĩmutãdo medicinã: ⁊ iõ medicina non agit in coꝛpus actionẽ debitã. Ex parte aũt medicine põt eẽ: aut qꝛ ẽ de medicinis malignis que cũ difficultate coꝛrigũť a caloꝛe nãli: ⁊ pticipãt venenoſitate: aut qꝛ ẽ debilis: aut qꝛ mltũ turbido motu agitatiua: quare ſequiť clauſio materie in ãfractibꝰ: aut qꝛ ẽ debilis virtꝰ: aut qꝛ pauce quãtitatis: aut qꝛ non fuit cõiuncta ſuo vigoꝛatiuo. Ex pte aũt accidẽtiũ ſicut ĩdebita admĩſtratio occurrẽtiuꝫ vt cogitatiõis ire doloꝛis aeris cibi ⁊ ſimiliũ: ⁊ tũc opꝫ ꝙ ad debite ſuccurrẽdũ remoueamꝰ cãm taliũ diſpõnum: licet qñqꝫ ab ipis effectibꝰ ſit inchoandũ pp neceſſitatẽ feſtinatiõis: ſicut ſepe incepimꝰ ab accidente dimiſſo moꝛbo. ⁊ cã pꝫ. ¶ Nota 2° ꝙ lꝫ fiãt pp coꝛpis diſpõnem: nõ oꝫ codeꝫ mõ ſuccurrere in medicina cõpꝛeſſiua ⁊ lenitiua ⁊ lubꝛicatiua ⁊ ſolutiua: nec ĩ oĩbus ſolutiuis eodẽ mõ qꝛ aliter qñ ẽ venẽoſe nãe: ⁊ aliter qñ nõ. ⁊ hec oĩa diſtĩcte ponit Meſue in de ꝯſolatiõe mediciaꝝ ĩtẽtõe 3ª. c. pᵒ. Et qꝛ hic Aui. nõ oĩa remedia: nec oĩuꝫ caſuũ: ſꝫ capitalia ⁊ pꝛĩcipalia ponit vt p hec alia intelligamꝰ: dimiſſo lõgioꝛi ſermone exponã modũ quo remedia Aui. iuuãt. Et pꝛimo đ enemate. Nã enema ſi ſunt feces ĩ inteſtis eas educit: ĩteſtina mollificat: poꝛos aperit: mãꝫ adaptat: vẽtoſitatẽ diſſoluit: virtutẽ expulſiuã irritat ſi fuerit factũ vt dꝫ: iõ multis intẽtionibus ꝯfert: trahẽdo ẽt ad inferioꝛa nõ parũ ꝯfert iuuamẽtũ: cõfert ẽt in remotione nauſee ⁊ agitationũ in ſupioꝛibꝰ. Uñ Meſue loco allegato dixit: verũ ex his oĩbꝰ cõfide ⁊ expecta maiꝰ iuuamẽtũ ex cliſteribꝰ. Et in fine capituli: ⁊ ne cõdẽnes cliſteria: ſꝫ fiducialr ĩ eis ꝯfide. Coliria aũt ſiue ſuppoſitoꝛia ſiue dicanť a colon inteſtĩo ſiue a colãdo nõ ẽ cura: ꝯferũt ſtimulãdo expulſiuã: ⁊ irritãdo ad motũ verſus ĩferioꝛa: ſed in aliis deficiũt a bonitate cliſteriis. Scđo pꝫ ꝙ coliria ſicca. i. ſuppoſitoꝛia cõferũt incitãdo expuſiuaꝫ. Sꝫ remediũ ſcđm puta maſticis. ℥. iii. ĩ aqua tepida ꝯfert qꝛ maſtix aromaticitate cõfoꝛtat: ⁊ ſtipticitate ꝯpꝛimit partes ſuperioꝛes verſus inferioꝛes: ⁊ pp alia que dicẽtur ſtatim de ſtipticis. Sꝫ de tertio remedio nota ꝙ ſtiptica comeſta faciũt pᵒ cõpꝛeſſionẽ partiũ ſuperioꝝ ⁊ poſt ĩferioꝝ qꝛ cõpꝛimunt ptes quibꝰ occurrũt: ⁊ iõ ſunt cã vt exprimẽdo pellãtur medicina ⁊ humoꝛ ĩferiꝰ. 2° ꝓhibẽt nauſeam ꝑ modũ dictũ: qꝛ ſua grauitate ꝓpellũt medicinã ad inferius: ⁊ ꝓhibẽt motũ ſuũ agitatiuũ ad ſuperius. 3° qꝛ ĩferunt vim nãe. i. faciũt mẽbꝛa foꝛtia: vel qꝛ ꝯpꝛimũt ita mẽbꝛa vt cogãť exprimere illud qđ ĩ foꝛaminibꝰ cõtineť eſto ꝙ nã tentaret retinere. ¶ Sꝫ tu dicis quõ qñ medicia mouet ⁊ ñ eũat fiũt illa accidẽtia dicta. ſ. moꝛdicatio ⁊ eſtuatio ⁊ anguſtia ⁊ ſcotomia ⁊ doloꝛ capitis? Diciť ꝙ hoc declaratũ fuit ſupꝛa in. c. de regulis cõibus ſolõni vẽtris ⁊ vomitui: ⁊ fiũt aut pp humoꝛẽ: aut pp vẽtoſitatẽ: aut pp vapoꝛes: aut pp medicine ſubſtãtiã. Sed flobothomia eſt neceſſaria qñ multa ſunt mala accidẽtia ⁊ ꝓ̃ſertim cũ oculi eminẽt extra ⁊ facies tumet. Significať eĩm ꝙ tũc materie mouẽtur ad ſuperioꝛa ⁊ per venas: ⁊ ideo flobothomia eũando materias agitatas ⁊ diuertẽdo ꝯfert. Et vult Meſue ꝙ pꝛimo fiat euacuatio de baſilica ⁊ poſt illam de ſaphena: qꝛ euacuatio de ſaphena ẽ virtuoſa ad diuertẽdũ. Incipiẽdũ ẽ aũt a baſilica qꝛ illa euacuat mltitudinẽ: ⁊ ꝓpter ꝓpĩquitateꝫ citiꝰ diuertit ⁊ indigemꝰ hic pꝛĩcipalibꝰ remediis. Et cuꝫ ĩceperit ꝑ flobothomiã baſilice declinare mã ad ĩferioꝛa facilius traheť ad diſtantiã longã ꝑ flobothomiã ſaphene. Si aũt a ſaphena ĩcepiſſet quia multa erat repletio nõ attigiſſet eiꝰ diuerſio vſqꝫ ad caput.

Hoc idẽ ꝯſuluit Meſue in ſuo de ꝯſolatõe medicinaꝝ intẽtiõe ⁊ caplo hic a magiſtro ĩſerius allegatis parapho illo: At ſi eſt medicina eaꝝ que ꝓcedũtur ⁊c. ipſe tñ priꝰ iubet exhiberi ꝑ os cõpꝛeſſiua ſtiptica: poſtea cliſteria ſiue ſuppoſitoꝛia ⁊c. huiuſ modi. Et tu ſcias hic ꝙ hec remeᵃ vꝫ cliſteria ⁊c. tunc maxime cõueniũt qñ medicina nõ ſoluit ꝓpter groſſaꝫ ventoſitatẽ q̃ ſubleuat eã ad ſuperioꝛa deſcẽdere ꝓhibẽs: vel ꝓpter debilitatẽ virtutis expulſiue: vel ꝓpter oppilationẽ in viis expulſionis vt ĩ colica: vel ꝓpter ĩobedientiã materie ad expulſionẽ. Iuuamẽta autẽ cliſteriꝝ ⁊c. cape hic inferius a magiſtro. Tutiꝰ tñ ẽ in iſto caſu ĩcipere a ſuppoſitoꝛio acuto: cuiꝰ acuties ſit cũ medicĩa appꝛopꝛiata humoꝛi educẽdo. ⁊ iſto nõ iuuãte: vtere tũc cliſteri attractiuo ⁊ laxatiuo: quare ⁊c.

Et cuꝫ medicina ventrẽ nõ ſoluerit ⁊ mala eam nõ ſequuta fuerint accidẽtia: melius etiã erit vt ipſaꝫ cõſequať minutio ſaltẽ poſt duos dies aut tres. nã niſi hoc factuꝫ fuerit timẽdum eſt in ipſo ne humoꝛes ad vnum pꝛincipaliuꝫ mẽbꝛoꝛuꝫ moueãtur.

¶ Hic ponit qđ faciẽduꝫ qñ medicina nõ euacuat ⁊ nõ ſequunť mala accidẽtia: dicẽs ꝙ ẽt in iſto caſu faciẽda eſt flobothomia ſaltẽ poſt duos dies aut tres: qꝛ niſi hoc fiet timẽduꝫ eſt ne humoꝛes currãt ad aliqđ mẽbꝛũ pꝛĩcipale. ¶ Ubi nota pᵒ ꝙ qꝛ humoꝛ ẽ alteratꝰ a medicĩa: ideo mẽbꝛa reſpuũt ipꝫ: ⁊ periculũ eſt ne ꝯtinue magis maligneť: ⁊ tũc poſt multã maliciã timoꝛ ẽ ne pulſus a mẽbꝛis ĩ quibus genuit moueať ad aliqđ mẽbꝛuꝫ pꝛĩcipale. ¶ Sꝫ q̃res q̃re dicit ꝙ iſto caſu fiat flobothomia poſt duos dies aut tres? Uideť eĩꝫ ꝙ ſit ſtatiꝫ faciẽda. Nã ſi timeť curſus humoꝝ ad pꝛĩcipale qˡ ꝓhibeť per flobothomiã quãto citius tãto melius cũ virtꝰ ꝯſtet. Diciť hic cõiter ꝙ verũ eſt vbi nos eſſemꝰ ſecuri ꝙ medicina nõ operareť: mõ aliqñ ꝯtingit ꝙ medicina nõ ducit vſqꝫ ad tres dies vt diciť de hiera a doloꝛibꝰ ꝓpter hunc igiť timoꝛẽ expectamꝰ. Aut melius qꝛ medicina quãuis nõ euacuet ⁊ nõ faciat grauia accidẽtia: tñ agitat humoꝛes ⁊ virtutẽ quodãmõ deiicit. Et ideo ne due cãe extraneãtes ſilˡ ꝯiungaň: bonũ ẽ differre maxĩe cũ nõ ſunt accidẽtia indigẽtia. ñã ſi apparet decurſus humoꝝ aut aliud tale ẽ ſtatim faciẽda. ¶ Et ſi q̃rať quare farmacia nõ danda ẽ? Diciť ꝙ in iſto caſu humoꝛes ſunt ꝓpter agitationẽ plurimũ ſanguini mixti. Et qꝛ ſtomacꝰ debilitatꝰ ẽ: nõ ẽ foꝛte aptꝰ ita ad recipiẽdũ aliã medicinã. Et iõ volẽtes curare facimꝰ cũ vniuerſali curatõe: ⁊ qꝛ ſanguis agitatus nõ euacuať farmacia: ergo ⁊c.

Et hoc intelligas de medicina foꝛti laxãte attrahẽdo ⁊ nõ de bñdicta pata fieri cibus. Nã talis foꝛtis medicina cõmouet hũoꝛes ⁊ diſponit eos ad putredinem caloꝛe extraneo quẽ ĩducit ĩ eis: quare flobothomia quodãmodo euacuat ⁊ tẽperat: quare ⁊c.

¶ Cam 9m de diſpõnibꝰ mediciaꝝ vẽtreꝫ ſoluẽtium.

m

Edicinaꝝ ventrẽ ſoluentiũ quedaꝫ ſunt quaꝝ malignitas magna ẽ ſicut heleboꝛꝰ niger ⁊ turbit cũ nõ fuerit bonũ ĩmo fuerit ex genere ipſiꝰ qđ citrinũ ⁊ agaricũ qđ nõ fuerit albũ ⁊ purũ ĩmo nigredini attinuerit: ⁊ ſicut laureola. ⁊ qꝛ res iſte male ſunt: tũc ſi bibite fuerit ⁊ mala inde accidẽtia pꝛouenerit melius erit vt medicĩa a coꝛpoꝛe expellať quãto plus poſſibile fuerit vomitu aut purgatõe ⁊ mediceť cuꝫ tyriaca. Multaruꝫ pꝛeterea eaꝝ remoueť malicia ⁊ cõturbatio quã faciunt anime dãdo in potu aquã vehemẽter frigidã ⁊ ſedendo in ipã ſicut turbit citrini putridi. Oĩs quoqꝫ res que acuitatẽ frãgit glutinatiõe ⁊ lenificatiõe ⁊ vnctuoſitate in qua ſit dulcedo ad hoc cõfert.

¶ Sicut diciť ſupꝛa in diuiſiõe: in iſto caᵒ Auic. determinauit de diſpõne medicinaꝝ ventrẽ ſoluẽtiuꝫ docẽs ꝑ hoc rectificare operationẽ medicine in eũando. Nã cum optimũ ſit in hoc operatões rectificãdo cognoſcere qđ faciendũ ſit merito diſpõnis coꝛpoꝝ ſumẽtiũ ⁊ merito regiminis eoꝝ in quo ſunt accidẽtalr occurrẽtia variãtia coꝛpus ⁊ medicinã: erat etiã neceſſariũ ꝯſiderare 3m. ſ. diſpoſitões medicinaꝝ ⁊ varietates operationũ eaꝝ que debẽtur merito iſtius diuerſitatis que ĩueniť in medicĩs ſoluẽtibꝰ vẽtrẽ. Et qꝛ medicinaꝝ taliũ diuerſitas maxĩe ẽ quo ad gnãlia ĩ tribꝰ: quoꝝ pᵐ ẽ malignitas ⁊ ĩcolumitas. 2m ẽ foꝛtitudo ⁊ đbilitas. 3m ẽ ĩ mõ opandi vel ſoluẽdi aut lubꝛicãdi aut ꝯpꝛimẽdi: ⁊ ſic de aliis: ideo maxime Auic. ſm

bas tres

UVA. BHSC. IyR_006_1

has tres diuerſitates poſuit cañ. in iſto. c. lʒ aliquid dixerit de diuerſitate que ē reſpectu humorū cūandoꝝ: ⁊ reſpectu mēbroꝝ a quibus eūat. Uiſuʒ fuit ſibi ꝙ primū ſatis elicit cū dictū ſit ſupra ꝙ debes purgare humorē peccantē nō alium: ⁊ de 2° dictū ſit in libro 3°: ⁊ iō illas dereliquit: ⁊ ſic pñs caplm̄ diuidit in tres partes: q: p° docet rectificare operationes ī ſoluēdo p cōſiderationē diuerſitatis p:ie. 2° per cōſiderationē ſecūde. ⁊ 3° tertie. 2ª ibi: quedā etiaʒ medicinaꝝ. 3ª ibi: medicina preterea. In pte prima dicit Aui. ꝙ medicinaꝝ ſoluētiū ventrē quedā ſūt quaꝝ malignitas ē magna ſicut helleborus niger ⁊ turbit citrinū ⁊ agaricus qñ nō ē albus ſed declinat ad nigredinem reſtat nō purus: ⁊ ſicut laureola. Et iō ſi fuerint bibite ⁊ inde ſequant̄ mala accidētia melius qđ fieri pōt eſt vt expellant̄ a corpe quātociti⁹ pōt fieri: aut cū vomitu: aut cum ſolutiōe vētris: ⁊ det̄ tyriaca: ⁊ multaꝝ taliuʒ remouet̄ malitia dando in potu aquā frigidā: ⁊ ſedēdo in ea ſicut turbit citrini ⁊ putridi. Et iterū oīs res q̄ frāgit acuitatem glutinatiōe ſua: aut vētoſitate: aut lenitate ī qua ſit dulcedo cōfert ad hoc. ❡ Nota ergo p° in oī medicina ſolutiua eē quādā malignitatē: īmo p q̄ʒto abijciūt a ſubſtātia ꝓprietatē ī eis inuētā: vt dicit̄ 2° regimīs acutoꝝ cōmento illius partis: porro ſi paſſio ⁊c̄. ⁊ ꝙ iſte ſunt multe ⁊ plures alijs venenoſe: verūtamē quarūdaʒ venenoſitas ⁊ malignitas ē parua: aliarū vero ē magna: ⁊ de iſtis loquit̄ Aui. ❡ Nota 2° ꝙ medicine hñtes malignitatē: quedā habēt illā diſpōnē ⁊ nāʒ ſue ſpēi ſicut mezereon qđ ē lacticinium magnū ⁊ ſicut laureola ⁊ ſiles medicie que dicūt̄ laborioſe eūantes. Quedā aūt hēnt pp ſingularē diſpōnē: ⁊ iſte ſunt duorū modorū. Nā quedā habēt talē malignitatē a nā: quedā ab accidēte ſupueniēte eis. Exēplū primi ſicut colloquītida que naſcit̄ ſola in plāta vna: ⁊ agaricus niger. Exēplū ſecūdi ſicut turbit putridū. ⁊ Aui. loquitur hic de oī tali vehemēti malignitate. ❡ Nota 3° ꝙ cognitio iſtarū malignitatū ⁊ ſi rōe quorūdā accidētiū poſſit cōprehēdi vt tactu ⁊ guſtu ⁊ odoratu ſm modū queʒ docet Meſue in de cōſolatiōe medicinaruʒ. c. p° tñ vera ⁊ certa via ē expiētia: ⁊ medic⁹ dʒ eē doct⁹ ī pticularib⁹ ⁊ vniuerſalibus regulis cognoſcēdi īcolumes a malignis: ⁊ ptinet hec doctrina ad 2m cañ. ⁊ ad libros de ſimplici medicina: iō Auic. nō curauit docere hic: ſed vade ſi vis ad loca illa ⁊ tene memorie. ❡ Quarto nota ꝙ ille medicie que multū maligne ſūt difficulter pdūt ſuā malignitatē: ⁊ cū hoc velociter īprimūt malas diſpōnes. Et iō ſi vacabim⁹ ad faciendū ꝙ corrigant̄ ī corpe nocumēta ī tpe harū opationuʒ augmētabūtur multū. Sʒ cuʒ ipe ſint ī vijs ductuū eductio p vomitū aut p fluxū fit in pauco tpe. Et iō ſecuri⁹ remediū qñ nocumēta faciūt magna ē illaruʒ expulſio a corpore vomitu vel fluxu. ſ. cū cliſteri aut potu aq̄ tepide aut cū re lubricāte. ❡ Quinto nota ꝙ qñqʒ he medicie ſumūtur ī corpib⁹ bene pparatis ⁊ bñ cōſolatis: ⁊ faciūt opatōʒ cū difficultate: ſed nō cū accidētib⁹ malis timoroſis: īmo ſine timore: ⁊ tūc nō oʒ ꝙ expellant̄: aut aliquid cōtrariū ſue opationi fiat. Et iō Auic. non dixit abſolute expellant̄ a corpe qñ ſunt bibite: ſed qñ ſunt bibite ⁊ mala ſupueniūt accidētia. ❡ Sexto nota ꝙ tyriaca dat̄ ad venenoſitateʒ remouēdā. ❡ Septimo nota ꝙ aqua frigida multū cōfert admiſtrata cōtra medicias que ſui acuitate īprimūt multū ſicut turbit citrinuʒ: ⁊ iō in potu ⁊ in balneo ita vt frigus penetret: in potu taliū inflāmātiū medicinaꝝ ē vtilis. Sʒ pauca balneatio ī aqua frigida p quā ſola fieret caloris alteratio nō cōfert: ⁊ dʒ eē aqua fortiſſimi frigoris: vt hēat ī tales medicias īprimē. ❡ Octauo nota ꝙ glutinoſa ⁊ vnctuoſa ⁊ lenitiua multū deprimūt de acuitate medicie violēte: ⁊ iō videbis notabiles medicos dare cōiter tales medicinas acutas cū māna: aut cū pulpa caſſie: aut cū aliquo tali q: frāgit malitiā: ⁊ cuʒ hoc facit cito lubricare. Opponūtur eniʒ iſta ſui hūiditate ⁊ groſſitie ptib⁹ ſubtilib⁹ taliū medicinaꝝ ī q̄litatib⁹ ⁊ mō ſubſtātie. Et q: dulcedo fūdat̄ in ſubſtātia groſſa: ⁊ ē abſterſiua res dulcis: iō ī iſtis adiuuat dulcedo. Dulcis ergo ⁊ vnctuoſa ⁊ inſipida medicina data in tali cāu cōfert cito expellēdo medicinā a corpore ⁊ frāgendo malas qualitates medicine. Sʒ ſi querat̄ vtruʒ ſtiptica cōueniāt: dicit̄ ꝙ vbi nō intēderem⁹ ꝓuocare vomitū cōfert: vt patuit ī pcedēti. c. Nā res ſtiptica ē de cōueniētiorib⁹ reb⁹ que miſcēt̄ cū medicinis acutis: vt dicit Meſue intētiōe 2ª. c. 3° ſumme p:ie. Sʒ dubiū reſtat quare nō pſtat iuuamētū medicie ſalſe. Nā dicit Meſue eodē loco de re ſtiptica: ⁊ vniuerſalr̄ quidaʒ: medicinis oīb⁹ p̄ter q̄ʒ ſalſe iuuamētū pſtant: ⁊ tu cōſidera cauſaʒ.

Sciaſ tñ ꝙ vltra hec quattuor gnālia remedia cōtra malignitatē medicinaruʒ violentaꝝ: vnaqueqʒ ex eis hʒ remedia ſibi ꝓpria ⁊ ſpecialia de quibus pertractat Aui. ſexta quarti ſūma tertia tractat⁹ primi que ē de venenis ſūptis ex plantis calidis ⁊ curis coruʒ.

Et ſcias ꝙ tyriaca ī iſto caſu dʒ eſſe antiqua ſiue fermētata: talis eniʒ a forma ſpecifica habʒ reprimere venenoſitatē dictaꝝ medicinaꝝ. Tyriaca eiʒ ē ſublimior medicinaꝝ ꝯpoſitarum pp multitudinē ſui iuuamenti ⁊c̄. vt dicit Auic. quīto canonis caplo de tyriaca. ⁊ Auer. c. iij. ſui libelli de tyriaca dicit: Et p:ia cā ꝓpter quam fuit inuenta tyriaca fuit vt curentur p iſtā nocumenta venenoſoꝝ que ſunt in animalibus ⁊c̄.

Et ego conſidero cāʒ eē pp vtrāqʒ habere ſbaʒ ſiue ꝯplōneʒ terreſtrem: in tali enim cōmixtione rei ſtiptice cum ſalſa reſultaret terreſtrificatio maior: ⁊ ſic multū exiccaret corp⁹ ⁊ maxie macilentuʒ ⁊ paratum facit̄ ī ſitiʒ īcurrē: quare nō pſtat iuuamentū: ergo ⁊c̄.

Quedaʒ etiā medicinaꝝ quādoqʒ aliquib⁹ proportionales exiſtūt cōplexionib⁹ ⁊ aliis nō coueniunt. Scamonea nāqʒ in eos qui in frigidis morātur regionibus nō operatur niſi debiliter: niſi magna inde detur quātitas ſicut eſt mos eius in terra turcoꝝ: ⁊ quādoqʒ eſt neceſſariū quibuſdaʒ corporib⁹ ī aliquib⁹ regionib⁹ ne medicinarū corpora dētur ſed virtutes eaꝝ tantum.

❡ In hac pte ponūt̄ cañ. rectificātes modū eūandi penes cōſiderationē virtutis ſiue fortitudinis medicie: ⁊ diuidit̄ in duas ptes: quare prio ponit iſtos cañ. ſumptos ex cōſideratiōe ꝓportiōis medicinarū ad corpa rōne nature corporū. 2° ponit cañ. rōne modi applicādi tales medicinas. 2ª ibi: ⁊ neceſſe ē. In p:ia parte dicit duo. Primū ē ꝙ quedā ſunt medicie que quibuſdā corpibus ſunt ꝓportionales ſine ſuis cōplexiōib⁹: ⁊ non coueniunt alijs: ſicut verbigrā: ſcamonea que in corpib⁹ habitātib⁹ in frigidis regiōib⁹ nō opat̄ niſi debiliter niſi det̄ de ea magna quātitas ſicut ē mos in terra turcoꝝ: ⁊ iō ſupple in talib⁹ ſunt medicine dāde ī maiori doſi. Et ſupple quedā ſunt corpa in quib⁹ fortes medicie opant̄ nimiū exceſſiue. Et iō qñqʒ ī quibuſdā corpib⁹ ⁊ quibuſdā regionib⁹ nō oʒ ꝙ dētur corpa medicinaꝝ: ſed virtutes tantū ſicut ī regionib⁹ vehemēter calidis. ❡ Circa quā partē nota ꝙ medicinā eſſe ꝓportionalē corpi ē talē eē eius habitudinē ad corpus: vt ex cōi vſu medicine illius in debita doſi ⁊ mō adminiſtrationis ſufficiēter ⁊ nō ſuperflue opet̄: ⁊ iō illis dicit̄ īproportionalis in quib⁹ hoc non cōtingit. ❡ Nota 2° medicinā nō opari couenieter ī corpib⁹ pōt trib⁹ de cāis ī genere cōtingere. Uno mō q: nō currit coueniēs ꝓprietas īter corp⁹ ⁊ medicinā: ⁊ pōt hoc eē in vno īdiuiduo ⁊ nō in alio ſicut 3° cañ. c. de aſmate vult Auic. ⁊ ita in. c. de lacte ⁊ ſupra ī. c. p° huius ſen: īmo ī vno indiuiduo ī vna hora: ⁊ nō in alia. Et hoc nō ſolū hʒ verū ī alteratiuis: ſʒ euacuatiuis exoluēdo: de hac nō loquit̄ hic. ❡ Scđo mō dicit̄ corpus īproportionale medicie ſolutiue rōne diſpōnis humoris peccantis quē hʒ medicina eūare. Aut ſi ē nō eſt dignus nec bene prepat⁹: vt oʒ in corpe illo: ⁊ etiā de iſta nō loquit̄ hic. ❡ Tertio mō dicit̄ īproportionalis rōe reſiſtentie corpis. Nā q: medicia nō eūat humorē niſi aliquo mō inferēdo vim mēbris ⁊ relaxādo eoꝝ virtutē retētiuā: ⁊ q: quedā ſunt corpa talis virtutis fortis: quedā aūt debilis: quedā aūt mediocriter ſe habentia: iō medicine quibuſdā dicūt̄ ꝓportiōales: q: date ī mediocri doſi opātur couenieter. ⁊ de hac ꝓportiōalitate ⁊ īproportiōalitate loquit̄ Aui. hic. ⁊ q: pōt medicia incōuenieter opari merito iſtoꝝ modoꝝ duoꝝ: aut ſuperflue qñ virt⁹ ē debilis: aut diminute qñ virt⁹ ē fortis. Ideo Aui. de vtroqʒ mō fecit mētionē volēs ꝙ corpib⁹ fortiter opatiōi farmaci reſiſtētib⁹ dent̄ medicie ī ſubſtātia: ⁊ cū hoc ī maiori q̄ʒtitate q̄ʒ ī cōi doſi. Debilib⁹ aūt ñ det̄ medicia cū ſubſtātia ſua ſʒ ſolū virt⁹. ❡ Tertio nota ꝙ medicia tūc dʒ exhiberi in ſubſtātia qñ corpulētia tota medicie dat̄ ſʒ totū medicie. Dʒ ꝙ ſolū exhibet̄ virt⁹ quādo dat̄ aut infuſio aut decoctio. Modo conſtat ꝙ medicina ſi equalis quātitatis ſumatur in ſubſtātia ſicut ponit̄ ī decoctōe erit fortior: ⁊ ideo debilib⁹ dat̄ ſola īfuſio aut decoctio. ❡ Nota tñ hic ꝙ medicinaꝝ q̄daʒ ſunt q̄ in ſubſtātia ſua hñt correctiuū ſue ptis ſolutiue ſicut reubarbaꝝ agaricus mirabolani ⁊ ſiles que hñt partē ſtipticā ꝯiunctā cū ſolutiua: ⁊ iō in talib⁹ medicinis qñ dant̄ corporib⁹ debilib⁹ meli⁹ eſt dare ſubſtātiā: ſʒ in mīori doſi. Et cā ē q: in ſubſtātia medicie ē ps cōfortatiua: vñ ī diſinteria exhibet̄ reubarbaꝝ ī ſubſtantia ⁊ nō īfuſiōe niſi forte timerem⁹ de oppilatōib⁹: aut intēderem⁹ cū ſolutōe vias apire: tūc eiʒ ē ꝯueniētior īfuſio ⁊c̄.

Scito eē quedā corpora ſicut ſunt illa de regno francie ⁊ ſibi vicina que bene ſuſtinēt corpus ſcamonee: nō tñ ſuſtinēt multaʒ ipſius quantitatē: imo ℈. ſ. magna ē doſis vt in plurib⁹. Et Meſue in caplo de ſcamonea dicit ꝙ doſis eius eſt a. g̃. v. vſqʒ xij. ⁊ de ea dixit Democritus ꝙ ē ſolutiuū anthonomatice: ⁊ forti⁹ ſup oīa ſolutiua: quare ⁊c̄.

Et eſt neceſſe etiā vt medicinis ſoluētibus ventrem bene redolētes medicine miſceātur: ꝓpterea vt mēbrorum virtutes eis cōſeruētur. Medicie quoqʒ cordis ad hoc iuuamētum conferūt: propterea ꝙ ſpirituū animaleʒ in vno quoqʒ mēbro confortāt: plurime quoqʒ earū ſubtilitate ſua ⁊ facilitate iuuant.

❡ Hic ponit cañ. rectificatōis operis ītentōe habita de mō admiſtratōis medicinaꝝ. Et diuidit̄ ī duas. Prio facit hoc. 2° nos remittit ꝓ ꝯplemēto alibi. 2ª ibi: ampli⁹ cōſiderare. P:ia ī duas. p° ponit cañ. de medicina ſolutiua ēt ſi ſit ſoluʒ admiſtrāda vna ſolutiua. 2° qñ plures. 2ª ibi: due p̄terea. De pª dicit ꝙ medicis ſolutiuis oʒ ꝙ miſceant̄ medicine odorifere ⁊ medicine cordiales. p° q: medicine odorifere ꝯfortant mēbra que habēt debilitare medicine ſolutiue. Et 2° q: medicine cordiales ꝯſeruāt ⁊ ꝯfortant ſpūʒ nāleʒ. i. vitaleʒ. Sepe eiʒ Aui. vocat vitaleʒ naturalē vt pª primi. 3° q: ſui ſubtilitate ⁊ facilitate adiuuāt ad operāduʒ. ❡ Et ad hui⁹ cañ. ītellectū eſt notāduʒ q: vt plurimū medicine ſolutiue ſunt ꝯ̃rie nāe corporis: ideo ſūt factiue nocumētoꝝ: ⁊ iō medicus cū indiget eaꝝ adiutorio dʒ eas corrigere anteq̄ʒ eas exhibeat. Correctio autem eaꝝ vt dicit Meſue intētōe 2ª ē aut faciēdo illud qđ ſupplet defectui eaꝝ aut illđ qđ corrigit nocumētū eaꝝ. Hec aūt ſuppletio ⁊ correctio fiūt aut pmutādo ſubſtātiā medicine: ⁊ hoc erit lauādo: aut īfūdēdo: aut triturādo: aut coquendo. Et hoc duob⁹ modis: aut elixando aut aſſando. Quid aūt hʒ facē lauatura ⁊ q̄ ſint medicie q̄ ipſa īdigēt: ⁊ qs ſit modus in vna quaqʒ medicia: ꝓ parte habet̄ a Meſue de ꝯſolatōe medicinaꝝ: ⁊ ꝓ parte ab Azarario ī libro q ſeruitor vocat̄: ⁊ ꝓ parte in libris ſimpliciū medicinaꝝ: q̄re ſuperfluū eēt hic ponere. ⁊ ſilr̄ intelligas de īfuſione ⁊ trituratōe ⁊ correctōe al's torrefactōe. Sʒ rectificatio me-

UVA. BHSC. IyR_006_1

dicine q̃ fit p̱ ꝯmixtionẽ qñq; fit p̱ ea que reſpiciũt ſua pro/
prietate venenoſitatẽ: qñq; p̱ ea q̃ opponunt ꝯplõni: qñq;
per ea q̃ ſuos effect⁹ malos merito ſecũdaꝝ virtutũ ⁊ ter/
tiaꝝ corrigũt. ¶ Primũ aũt cõiter ẽ ad ſupplẽdum id qđ
deficit: q: ſi medicina ẽ tarde: aut debilr: aut de ꝑpe: aut
ſolũ humorẽ ſubtilẽ attractiua: aut non a ꝓprietate reſpi/
cit mẽbrũ a quo euãre volumus: permiſcem⁹ illud qđ ac/
celerat ⁊ vigorat opationẽ: aut qđ facit virtutẽ i extrema
corporis penetrare: aut q: dirigit ad mẽbruz a quo euãre
ĩtendim⁹: aut q: adiuuat ad humorẽ groſſuz attrahẽduz:
⁊ hoꝝ ſpãlia legẽda ſunt alibi. Exẽpluz tñ primi ẽ ſicut p̱/
mixtio ſpecieꝝ eleſanginaꝝ cũ aloe. Exẽpluz ſecũdi ſicut
ꝯmixtio dicta ⁊ ꝯiunctio ſemĩs rafani cũ hermodactilis ⁊
vini ⁊ ſpice cũ reubarbaro. Exẽplũ tertij ſicut ſquilla cuz
hermodactilis. Exẽplũ quarti ſicut nuxmuſcata cũ ĩtendi
mus a capite euãre p̱miſceť cũ ſolutiuo. Exẽpluz quĩti ſi/
cut zinziber cũ turbit. Si aũt volum⁹ ĩhibere maliciã ꝓ/
prietatis venenoſe: hoc fit cũ his q̃ ꝯfortãt mẽbra q̃ reſpi/
cit venenoſitas: ⁊ hec ſunt aromatica: ⁊ cordialia: ⁊ a pro/
prietate talia ſunt bezoar illaꝝ medicinaꝝ. Si vero ĩtendi
mus obuiare malicie ꝯplõnis apponim⁹ medicinã q̃ ꝯ̃riaz
hẽat ꝯplonez: vt Auic. p̃ª quarti docet p̱miſcere cãforam
cũ ſcamonea. Si aũt ĩtendim⁹ occurrere malis operatiõi/
bus ſecũdaꝝ ⁊ tertiaꝝ operationũ virtutuz: oz q; hoc fiat
cũ eo qđ defectui illi opponiť: verbigr̃a generatõi vento/
ſitatis carminatio opponiť: excoriatõi opponiť vnctuoſi/
tas: viſcoſitati glutinatio ⁊ ꝯſtipatio: nauſee ſtomaci ꝯfor
tatio: apertioni venaꝝ illud qđ ꝓhibet eas apiri. Et remi/
niſcaris dictoꝝ ſupra q; ad rectã ꝯmixtionẽ nõ ſufficit ſo
luz oppoſitio in q̃litate ⁊ opatione: ſ; requiriť q; ſigillent
ſibi inuicẽ ꝓprietatẽ: ⁊ 2° requiriť q; dent in mẽſura debi
te ꝓportionis. ⁊ oĩa iſta particulr̃ ſunt legẽda in locis di/
ctis: ⁊ reqrũt nõ ſolũ vni⁹ lectõis expoſitionẽ ſ; plurium:
⁊ iõ hic Aui. noluit hec omĩa dicere: ſ; quedã ſicut capita
tãgere: ⁊ nos ad alia loca remittere. ¶ His habitis deſcẽ
do ſpecialr̃ ad cañ. P; p° q: fere oĩbus ĩmo oĩb⁹ ſolutiuis
ꝯueniẽter admiſcent medicine odorifere ⁊ medicĩe cordis
ꝯfortatiue ꝓpter reſiſtere malicie diſpõnis occulte p̱ quaz
he medicine mẽbra debilitãt. Et p; qũo cordiales medicĩe
ꝯfortãt ſpũz aĩalez in oĩ mẽbro p̱ plura dicta ſupra in. c. j.
Sed id qđ diciť medicinas iuuare ſua ſubtilitate ꝓ tanto
diciť q: aperiũt p̱ partẽ ſubtilẽ: ⁊ humores ad fluxũ habi
litãt. ⁊ hoc ẽ illud qđ Auic. ĩtelligit cũ dixit facilitate. Et
ꝯſidera q; medicĩe aromatice quedã ſunt cordiales: q̃dam
epatice: q̃daz ſtomatice: q̃daz cerebrales: ⁊ oẽs ꝯferũt: ma/
xime tñ cordiales ⁊ ſtomatice: q: in his duob⁹ mẽbris ma/
xime p̱uenit nocumẽtuz medicinaꝝ. Cordialiũ aũt medi/
cinaꝝ q̃daz ſunt tyriacales: ⁊ ſunt q̃ remouẽt ⁊ reſiſtũt ve
nenoſitati: quedã tẽperãt ꝯplexionẽ calidã ſicut roſe ⁊ can
fora: aut frigidã ſicut maſtix: quedã exceſſuz accidẽtis ſi/
cut ſpodiuz ⁊ karabe: ⁊ quedã ꝯfortãt generãdo ſpũm ſi/
cut poma dulcia doronigi ⁊ ſimilia. Medicinis aũt ſoluti
uis p̱miſcenť iſte medicine cordiales ꝭm exigentiaz medi/
cine. Et ille que plurib⁹ modis de iſtis adiuuant dicũtur
maxime cordiales: que aũt vno dicunť debilis virtutis: q̃
autez duobus aut tribus ſunt medie.

Scias q; medicinaruz cordialiũ ꝯferentiuz i hoc caſu: quedã ꝯfortãt tantũ: alie ꝯfortãt ⁊ alterãt: alie ꝯfortãt ⁊ addunt in ſolutionẽ: alie ꝯfortãt ⁊ dimĩnuũt de ſolutõe. Sed hec lati⁹ vide a Meſue i ſuo de rectificatõe medicinaꝝ intẽtione ſcđa. c. j. canone ſcđo parapho illo: Medicinaꝝ aũt cordialiũ virtutes quattuor modis eligende ſunt ⁊c̃.

Due p̃terea medicĩe qñq; ꝯiũgũť: q̃rũ vna ſuũ hu/
morẽ cito expellit ⁊ altera tarde. Una ergo ſuã opatõz
efficiet poſtq̃z ipſa iã alterã i ſuo ẽt hũore ꝯp̃ſſit ⁊ ope/
rabiť i ipſaz ⁊ ei⁹ debilitabit virtutez. Cũq; ſecũda poſt
operari ceperit erit debilis virtutis mouẽs ⁊ non perfi/
ciẽs: quare erit aliqđ ei admiſcẽdũ qđ ipſaz facilez red/
dat ⁊ feſtinare faciat ſicut zĩziber turbit q̃m ip; ſtupefie/
ri nõ p̱mittit: ⁊ ſilr̃ fiet ſi eas bñ ſciueris p̱miſcere.

¶ Hic ponit 2m cañ. dicens q; qñq; p̱miſcenť due medi/
cine quaꝝ vna ẽ tarde opatiua ⁊ alia cito in ſuũ humorez.
Et iõ altera eaꝝ. ſ. illa que cito opať p̱ficit ſuã opationem
poſtq̃z cõpreſſit alterã i ſuo humore. i. poſtq̃z fuit cã q; hu
mor ſuus qui attractus ẽ circũdat medicinã tarde opan/
tem. Et iõ dicit q; ea in ſuo hũore cõpreſſit ⁊ perficiet ſuã
opationẽ poſtquã alterã. ſ. tardã debilitauerit in ſua vir/
tute: ⁊ cũ 2ª ĩcepit opari erit debilis ⁊ mouebit humorẽ ⁊
nõ perficiet opationẽ. Ut ergo fugiamus hoc nocumẽtũ
cũ tarde opatiua ẽ aliqđ admiſcendũ qđ dupliciter iuuet.
Uno mõ q: ſuã acceleret opatõez. Scđo q: nõ permittat
ĩpam ſtupefieri. i. debilitari ſicut ẽ zinziber reſpectu tur/
bit. ⁊ cũ fiet opatio vnius ſilr̃ fiet opatio alterius ſi bñ ſci/
ueris eas permiſcere adinuicẽ. Ubi ꝯſidera q; Aui. volẽs
dicere qũo cõmiſcẽda ſunt aliqua ad cõfortationẽ virtu/
tis medicine introduxit exẽplũ ꝯpoſitõis quã pri⁹ dixerat
ĩcõueniẽtiſſimã. c. de regulis cõib⁹ ſolõni vẽtris ⁊ vomi/
tui. ſ. medicine cito opatiue cuz medicina tarde opatiua: ⁊
hoc vt remoueret dubiũ: q: ſquis ex illo dicto credere poſ
ſet q; nũquã tales medicĩe p̱miſcẽde eẽnt: qđ ẽ falſũ. Nã
multotiẽs indigem⁹ euãre diuerſos humores ⁊ medicina
vnius euãtiua ẽ tarda i ope: alteri⁹ aũt euãtiua velox. Ue/
rũ ẽ tñ q; nõ debẽt abſolute p̱miſceri niſi cũ debito modo
q: abſolute ſine alia diſpõne iſtas cõmiſcẽdo ſequiť nocu/
mẽtum. ſ. q; 2ª que ẽ tarda mouet ⁊ nõ euãt: ⁊ p̃ot ẽt ſequi
euãtio cõturbatiua ⁊ laborioſa. Naz ex dictis ſupra vidi/
ſtis q; quãdo volum⁹ dare vnã medicinã cõpoſitã ſoluti/
uã in doſi ĩtegra tollim⁹ de vtraq; medicinaꝝ cõponẽtiũ
p̱tẽ ꝓportionalẽ: ita vt ex oĩbus cõſurgat vna doſis: ver/
bigratia ſi volum⁹ euãre colerã ⁊ flegma eq̃lr̃ recipiemus
medietatẽ doſis de turbit. ſ. ʒ. s. ⁊ medietatẽ doſis đ ſca/
monea. g̃. lij. ⁊ p̱miſcebim⁹. Mõ cõſtat q; ſcamonea egre/
diẽte corp⁹ remanebit turbit in tanta modica quãtitate q;
nõ poterit opari niſi agitando. qđ ſi cõtĩgit q; poſſit opari
ĩcipiet manifeſte qñ corpus ẽ iã agitatũ a prima pluries: ⁊
hoc erit laborioſuz virtuti. Et iõ Auer. 7° colliget vitupe/
rat illos qui p̱miſcẽt ſcamoneã cũ turbit: ⁊ ẽ veriſimile q;
hoc facit intelligẽdo q; p̱miſceanť nõ debite. Et cõſidera
q; Aui. dicit q; pria duplr̃ impedit ſecũdã in opatiõe ſua.
Primo q: ĩpam cõprimit i ſuo humore. ſ. i humore quem
trahit p̃ª: q: trahiť illa ad locũ vbi ẽ tarda: cũ ãbe medicĩe
ſunt in eodẽ loco: ⁊ iõ cõprimit ⁊ circũdať ab humore prĩe
medicine ſecũda ⁊ tegiť. Secũdo ĩpedit q: operať in ipſa
aliquid. ſ. de eo educendo ⁊ debilitat ĩpam. ¶ Nota 2° q;
ad ꝓhibẽdũ hoc nocumẽtũ Aui. docet q; permiſceať cũ
medicina tarde opatiua medicina que accelerat ĩpaz ĩ ope
ſuo ſicut zinziber facit accelerare opationẽ turbit: ⁊ etiam
medicina que nõ p̱mittit ſtupefieri virtutẽ tarde: ⁊ p̃ot in/
telligi q; per ſuã pñtiã ꝓhibeat debilitatẽ talis medicine:
⁊ p̃ot ĩtelligi q; ita iuuet vt nõ dimittat eã pigritari ĩ ope.
⁊ tu de hac cõpõne qũo ſit faciẽda ſciuiſti ſupra. ¶ Tertio
nota q; iſta particula ⁊ ſilr̃ fiet ſi eas ſciueris bñ p̱miſcere:
duob⁹ modis p̃ot exponi. Un⁹ ẽ Dy. q; nõ ſolũ per ꝯiun/
ctionẽ rei accelerantis opus farmaci: ſ; ex bona cõmixtio/
ne p̃ot vitari hoc nocumẽtũ: q: bñ permiſcẽdo eas iuuenť
ita q; nõ citius operabiť vna q̃; alia. ¶ Et ſi querať q̃s eſt
bonus ⁊ debitus modus p̱mixtiõis? Rñdeť q; medicine
cõiungunť inuicẽ: aut p̱ decoctionẽ: aut p̱ ĩfuſionẽ: aut p̱
malaſſationẽ vt i puluerib⁹ electuarijs ⁊ trociſcis: aut p̱ ſi/
militudinẽ: ſ; melius cõmiſcenť p̱ decoctionẽ: aut per ĩ/
fuſionẽ qñ ambe medicine i vno ⁊ in eodẽ corp̱e liquido ĩ/
fundunť aut coquũtur q; vtrarũq; recipit virtutẽ. Adiu/
uat ẽt tẽpus: nã quedã ſunt que fermentanť: ⁊ iſte ſũt mul
to melius vnite poſt fermẽtationẽ: q: ſunt ad vnã formam
redacte: quedã aũt cõmiſcenť cũ coquũtur aut infundunť
aut piſtanť: ⁊ iſtas p̱cipue in decoctiõe nõ oz ſemp̱ eq̃li
tp̱e coqui: q: quedã ſunt que virtutẽ amittũt in longa de/
coctione: vt viole etiã epithim⁹ ⁊ ſimiles. Ad ꝓpoſitum ſi
ſciueris bñ permiſcere: ita q; vnianť virtutes medicinarũ
operabũť: ſilr̃ ſicut ſi poſuiſſes cũ tarda aliquid accelerãs.
Alius intellect⁹ ẽ q; ſi ſciueris bene p̱miſcere medicĩas di
ctas ĩuicem cũ adiutorio aliorũ ſicut zinziber cũ turbit ſi/
et ſimilis ſupple opatio que đ ſe eſſet tarda ⁊ medicĩa que
de ſe ẽẽt velox: quia in eodez tẽp̱ore ⁊ non vnius operatio
ab alia impedietur ⁊c̃.

Dicit Meſue in caplõ de turbit q; ipſuz ꝯfortatũ cũ zinzibere educit hũores flegmaticos groſſos ⁊ a remotis ⁊ iuncturis ꝓpriẽ: ⁊ mundificat ſtomacũ ⁊ expulit ab eo ſup̱fluitates adherẽtes villis ei⁹. Mũdificat ẽt pect⁹ a flegmate groſſo ⁊ putrido: quare ⁊c̃.

Ampli⁹ ꝯſiderare đbes p̱ĩcipia q̃ i virtutib⁹ medi/
cinaꝝ vẽtris ſolutiuaꝝ declarauim⁹ cũ loquuti fuim⁹ de
principijs vniuerſalib⁹ medicinaꝝ ſimpliciuz.

¶ Remittit nos ad librũ de ſimplicib⁹. ſ. ad cañ. vniuer
ſales ſecũdi: dicẽs q; tu debes cõſiderare principia decla
rata de virtutib⁹ medicinaꝝ ſolutiuaꝝ vẽtris in loco vbi
dicũť gnãliter principalia medicinaꝝ ſimpliciuz.

Aduerte q; p̱ĩcipioꝝ ꝯſiderãdoꝝ in ꝯpoſitiõe medicinarũ quedã ꝯſiſtunt in electiõe bonoꝝ ſimpliciũ non adulteratoꝝ: quedaz alia i artiſiciali p̃paratõe decẽti p̱ decoctiõez vel lotionẽ vel infuſionẽ vel trituratiõez. Alia in feſtinatione tarde operãtiũ: alia in correctione malignarũ: alia in cõuenienti ſigillatõe bone ꝓprietatis qua feliciťť ei⁹ operatio ⁊c̃.

Medicina p̃terea ſolutionẽ faciẽs plũmũ opabiť il/
lud ſoluẽdo ꝓprietate ſui ſicut turbit. ⁊ plerũq; efficit il
lud exprimẽdo ſui ꝓprietate ſicut mirabol̃. ⁊ qñq; opať
illđ lenificãdo ꝓprietate ſui ſicut ſiracoſt. ⁊ qñq; operať
id lambificãdo ſicut mucilago pſilij ⁊ pruna.

¶ In iſta p̱te 3ª capituli vt dictũ ẽ ſupra ponit cañ. đ eua
cuatiõe indicatiõe ſumpta a varietate modi opandi medi/
cinaꝝ. Et diuidiť i tres p̱tes. Primo ponit diſtinctionẽ ĩ
varietate modi opandi. 2° ponit cañ. 2ª ibi: in pluribus.
Dicit primo q; medicina faciẽs ſolutiõez: qñq; facit illud
ſoluẽdo ꝓprietate ſui ſicut verbigr̃a ſcamonea: ⁊ qñq; fa/
cit illud lenificãdo ſicut ſiracoſt ⁊ ẽ ſp̃ẽs mãne: ⁊ qñq; ope
rať lãbificãdo ſicut mucilago pſilij ⁊ pruna. ¶ Nota ergo
primo q; hoc nomẽ medicina ſolutiua qñq; diciť large de
oĩ medicina quocũq; mõ euãtiua ſiue p̱ vrinã: ſiue p̱ ſudo/
rẽ: ſiue per vẽtrẽ: ſiue alio mõ. qñq; ſtricte ꝓ medicĩa edu
ctiua euãnte per vẽtrẽ: ſiue lãbificãdo: ſiue alio mõ ſtrictiſ
ſime pro medicina euãnte eligẽdo determinatũ humorẽ ⁊
ĩpm attrahẽte p̱ ꝓprietatẽ ſuã. Mõ Aui. hic cũ in princi/
pio dixit ſolutionẽ faciẽs ſumpſit ſolõnẽ mõ 2°. S; poſtea
qñ in vno mẽbro diuiſiõis dixit: aut ſoluendo a ꝓprietate
⁊c̃. intellexit ſoluere mõ 3°. ¶ Nota 2° q; medicina com/
preſſiua eſt illa que ſua ꝓpria virtute qñq; obuiat mẽbro ⁊
ꝯſtrigit ĩpm ita vt cõprimať ab eo humiditas exiſtẽs i ſu/
is foraminib⁹. Medicina aũt diciť euãre leniẽdo que p̱ ſui
modũ opatiõis occurrẽs mẽbro ẽ apta ponere ſe inter hu/
morẽ adherẽtẽ mẽbro ⁊ ſuperficiẽ mẽbri: ita vt p̱ hoc hu/
mor ſepareť ⁊ deſcẽdat. Medicina aũt lãbificatiua ẽ illa q̃
per ſuũ ꝓpriũ modũ remouẽdo a mẽbro diſpõnez p̱ quaz
ĩapta retinere facit humorẽ labilẽ ⁊ per cõſequẽs deſcen/
dere:

Quidaz addiderũt his quattuor modis modũ quintum laxatõis vz eliquãdo humores ꝯgelatos vel coagulatos: ⁊ hoc modo dicunt euforbiuz laxare ⁊c̃.

UVA. BHSC. IyR_006_1

Meſue tñ in ſuo de ꝯſolatōe medicinaꝝ. c. iiij. ſūme prime: intētionis ſcđe parapho illo: Adhuc aūt omnis res que ē ⁊c. accepit bezahar generalr̄ pro oī virtute rei medicinalis que farmaco admixta malignitatē eius corrigit. ponit ēt gradus iuuamēti ipſius: ⁊ ibi lege: quare ⁊c. Accipit̃ ēt bezahar ꝓ lapide quodaꝫ qui ē multū carus regibꝰ: dictꝰ vulgariter lapis ſerpētinꝰ. ⁊ aliqui putāt hunc lapideꝫ eē qui generat̃ in oculis ceruoꝝ in oriēte: qui cū ſerpētes comedunt: poſt vt deponāt venenuꝫ intrant flumen: ibiqꝫ morant̃ imerſi vſqꝫ ad caput tādiu quouſqꝫ ſentiūt veneni virtutē ſupataꝫ: intereaqꝫ lachrymaꝫ emittūt: que coagulata in oculis interduꝫ vſqꝫ ad magnitudinem nucis deſiccat̃ ⁊ cadit ⁊ iuenit̃: ⁊ hic dicit̃ omniuꝫ venenoꝝ tyriaca ⁊c.

dere: q remouēdo a mēbꝛo ſuarū partiū aſperitatē. Solutiua aūt medicina ē illa que virtute attractiua attrahit humorē determiatū qui poſtea ſtimulās mēbꝛū ad qđ trahit̃ expellitur a virtute mēbri expulſiua: ⁊ eſt in iſtis medicinis ſolutiuis virtꝰ debilitandi mēbꝛū ⁊ violētandi ipm ita ꝙ humores qñqꝫ retinēt: ⁊ qñqꝫ pꝛohibēt rectificare vel retinere. Videt̃ tñ Dy. inuere ꝙ medicine ſolutiue inferūt nocumētū mēbꝛis ī quibꝰ ſunt humores ⁊ mēbra ex tali nocumēto īclinant̃ expellere humorē ī eis cōtētū: ⁊ tūc medicina trahēte ille humoꝛ mouet̃ pulſu mēbꝛi ⁊ attractiōe medicine. ¶ Scđo pꝛincipalr̄ nota ꝙ euātio que fit ꝑ medicinas ſolutiuas nō fit ab eis īmediate per ꝯplōnē ſuā vel ꝑ ſuū modū ſubſtātie: q inueniūtur medicine calide ⁊ medicine frigide ⁊ humide ⁊ ſicce: quaꝝ quelibet ē colere attractiua: ⁊ ita de attractiuis flegmatis. ⁊ ſilr̄ inueniūtur dure: molles: ⁊ viſcoſe: ⁊ lubꝛice: ⁊ inciſiue que trahūt vnū ⁊ eūdem humorē ⁊ tales que nō trahūt. Et iō Meſue dixit ī ſuo de cōſolatiōe medicinaꝝ. ꝙ medicina ſolutiua q̄ determinatū humorē euāt: nō euāt q calida vel frigida vel humida vel ſicca: ſꝫ q talis habēs ꝓpꝛietatē hoc faciēdi: que ꝓpꝛietas vocat̃ a medicis forma ſpecifica vel q̄litas occulta. Et de hac quomō ſe habꝫ ad formā ſubſtātialē talis medicine ⁊ ad cōplōnē: vide 2ª pꝛimi. c. de eo qđ comedit̃ ⁊ bibit̃. Sed medicinaꝝ cōpꝛeſſiuaꝝ ⁊ lenificatiuaꝝ ⁊ lābificatiuaꝝ virtꝰ ꝑ quā opant̃ videt̃ eē cōplō cū modo ſubſtātie: ⁊ iō iſte opatiōes ponunt̃ ī numero opationū cōplexionis humide: aut cōplōnis ſicce. Et ideo medici dicunt ꝙ iſte nō opant̃ his modis ꝑ ꝓpꝛietatē occultaꝫ que ſit forma ſpecifica: vel ꝓpꝛietas occulta: ſed per ꝯplōnem vel modū ſubſtātie. Et hec ē cā qꝛ iſte medicīe ꝑ hos modos euationū nō euāt determinatū humorē ſed illū quē inueniūt: vñ quēadmodū manus cōpꝛimēs ſpongiā nō eligit humiditatē quā determiate ab illa expꝛimat: ſꝫ ſi fuerit infuſa vino ⁊ aqua vtrūqꝫ expꝛimet: ita facit medicina cōpꝛeſſiua ⁊ lenitiua ⁊ lābificatiua. ¶ Tertio nota ꝙ non ē icōueniēs ī medicinis que leniēdo ⁊ cōpꝛimēdo aut lābificando euāt inueniri virtutē ſolutiuā loquēdo pꝛopꝛie de virtute ſolutiua: q ſtat ī his eē ꝓpꝛietatē trahēdi determinatū humorē a longinquo: ſed nō per virtutē lenitiuam: aut cōpꝛeſſiuā: aut lābificatiuā. Unde caſſia ⁊ māna que ſūt lenitiue ſoluūt colerā: pꝛuna ⁊ mucilago pſilij que ſunt lambificatiue ſoluūt colerā: mirabolani citrini q ſunt cōpꝛeſſiui ſoluūt coleram ⁊ kebuli flegma. Et ex his pꝫ ꝙ Aui. qñ dicit ꝙ lenitiua euāt leniēdo ꝓpꝛietate ſui, nō intellexit hic per ꝓpꝛietatē formā ſpecificā: ſed ꝓpꝛios modos opatōis: vt cōtra alios hic dictos diſtinguātur: ⁊ eſt ſenſus ꝙ quedā medicine euāt leniēdo qui ē modus ꝓpꝛius eis ⁊ diſtinctꝰ ab alijs modis euandi per ventrē hic poſitis. Sequit̃ vlterius ꝙ medicīe īquātū leniūt: aut lābificant: aut ꝯpꝛimūt: nō euāt niſi a mēbꝛis quibꝰ nō obuiant: ⁊ non euāt determinatū humorē: lꝫ per virtutem aliam. ſ. pꝛopꝛietatē occultam poſſint a longinquo ⁊ determinatū humorem trahere.

Nihil etiā pꝛohibet candē medicinā euāre lenificando ⁊ lābificando ſimul. lenificatiua eīꝫ dr̄ ꝯparatōe ad ſuperficieꝫ inteſtinoꝝ quā lenificat: ⁊ lābificatiua cōparatōe ad mām expellēdā quā lubꝛicā reddit ⁊ facile labilē vt caſſiafiſtula: manna: pꝛuna: tamaridi: lenificantqꝫ ⁊ lambificant. Medicine aūt que ſoluūt lauādo ⁊ abſtergēdo ſicut ſeruꝫ ⁊ abſinthiuꝫ reducunt̃ ad lenitiuas q ſoluūt operatione quā faciūt in ſuperficie membꝛoꝝ.

In pluribꝰ quoꝝ violentaꝝ medicinaꝝ exiſtit aliqua venenoſitas ⁊ ſolutionē ventris efficiūt ſm moduꝫ quo nature violētia infert̃. Ipſe igit̃ ſunt aptāde medicinis in quibus exiſtunt bezariati.

¶ Hic ponit cañ. ⁊ diuidit̃ in duas. In pꝛima parte ponit cañ. ī quibus: docet cōueniētē adminiſtrationē talium medicinaꝝ. 2º docet fugere incōueniētē modū ꝑmixtionis earū. 2ª ibi: amplius. Pꝛima in duas ſm cañ. duos. 2ª ibi: plerūqꝫ. In pꝛima dicit ꝙ medicinaꝝ violentaꝝ aliqua exoluūt venenoſitate: ⁊ faciūt ſolōnē vētris: ꝓpterea ꝙ īferunt nature viꝫ. i. violentiā. Et iō quādo dant̃ debet ꝑmiſceri aliquid ꝙ hēat virtutē bezaraticā. ¶ Circa quā ꝑtē nota ꝙ medicine dicūtur violēte q mltū fortiter euacuant: ⁊ cū fortibus accidētibꝰ. Et q ille que ſunt note fere oēs habēt venenoſitatē: ⁊ de alijs neſcit̃. Ideo Aui. dixit ī pluribꝰ: nō ꝙ vellet per hoc cōceſſum eē ꝙ aliqua talis que ſit non venenoſa: ſed vt non plus affirmaret q̄ꝫ ſit eē certū dixit in pluribꝰ. Alij aūt exponūt hūc locū ꝙ oēs medicine ſolutiue dicūtur violēte reſpectu medicinarum lenitiuarū ⁊ cōpꝛeſſiuaꝝ ⁊ lābificatiuarū: q oēs medicine ſolutiue euāt inferēdo vim nāe ⁊ alie nō. Et q nō oēs ſolutiue ſunt venenoſe vt reubarbaꝝ roſe ⁊ multe tales: iō Aui. dicit in pluribꝰ. Ego aūt accepto pꝛimū modū q nō video quare dicat̃ ꝙ ſolutiue īferant vim nāe ⁊ nō ꝯpꝛeſſiue ex mō ſue opationis: ⁊ q nō ſcio an plures ſint medicine euatiue exoluēdo que hēant venenū q̄ꝫ ille que nō habeant. nam multe ſunt leues ⁊ bñdicte ſicut reubarbarū. ¶ Nota 2º ꝙ bezoratini idē ē ꝙ bezoar: ſꝫ bezoar ē nomē ꝑſicū: ⁊ ſignificat large ſumēdo oēm rem que ē remotiua aut ꝓhibitiua diſpōnis venenoſe ſiue illa res ſit facta per artē ſiue nālis vt tyriaca. Sumit̃ qñqꝫ ſtricte ꝓut contra tyriacā diſtinguit̃: ⁊ tūc dicit̃ de medicina nāli ⁊ nō artificiali oppoſita veneno. Quādoqꝫ aūt ſtrictius ſumit̃ pꝛo vno lapide qui dicit̃ bezoar: de quo Auic. loquitur in 2º ⁊ eſt contra omnia venena. Hic ſumitur large: ⁊ hoc modo intelligendo patet cauſa cañ. Nam permiſcetur ad pꝛohibendum malam complexionē venenoſitatis.

Bezoar ſiue bezard vel bezahar accipit̃ aliqñ ꝓ galbano ꝓpter excellenteꝫ virtutē eius ꝯtra venenū: vt pꝫ per Aui. quīto canonis in caplō de tyriaca in tertia deſcriptiōe ipſiꝰ.

Plerūqꝫ etiā adiuuāt amaritudo ⁊ acuitas ⁊ ponticitas ⁊ ſtipticitas ⁊ acetoſitas in operatōibꝰ medicine cū eiꝰ ꝓpꝛietas ei pñs affuerit. amaritudo nāqꝫ ⁊ acuitas ī reſoluēdo iuuāt: ⁊ pōticitas ⁊ ſtipticitas ī ꝯmēdo: ⁊ acetoſitas ī iciſionē faciēdo q̄ ad lābendū pꝛeparat.

¶ Hic ponit 2m cañ. dicēs ꝙ plerūqꝫ adiuuat medicinā amaritudo: aut acuitas: aut ponticitas: aut ſtipticitas: aut acetoſitas cū ꝓpꝛietas ei pñs fuerit: q amaritudo ⁊ acuitas iuuant reſoluēdo: ponticitas ⁊ ſtipticitas cōpꝛimēdo: acetoſitas īcidēdo pꝛeparat ad lābenduꝫ. ¶ Ubi nota ꝙ iſtos ſapores iuuare pōt eē duobꝰ modis. Uno mō ꝙ iuuent remouēdo operatiōeꝫ exceſſus mali. Alio mō ꝙ iuuent operatiōeꝫ vbi eēt defectus opatiōis farmaci. Mō Auic. loquit̃ cōiter de vtroqꝫ iuuamēto maxime tñ de 2º: vnde acuitas reſoluēdo ſubtiliat: ⁊ ita adiuuat ī euando: ⁊ ſilr̄ amaritudo ponticitas ⁊ ſtipticitas dicūt̃ hic adiuuare cōpꝛeſſiuas medicinas ⁊ acetoſitas lābificatiuas. Sꝫ ſi loquamur de pꝛio mō iuuamēti acuitas nō videt̃ iuuare: īmo in exceſſibꝰ opationū addere ꝑſertim ī euando exoluēdo niſi forte per accidēs eſſet cā cite diſſolutionis ſubſtantie farmaci pꝛopter qđ minus operaret̃ niſi diſſolueret̃: vt diximus ſupꝛa de cā: quia nō operat̃ niſi virtꝰ eiꝰ ī corpoꝛibus. ⁊ de hac materia vide Meſue in ſuo de conſolatione medicinaruꝫ intentione 2ª.

Amplīꝰ qđ lābere facit nō ē ꝯiūgēdū ei qđ ī ꝯmēdo iuuat talr̄ vt ſint eoꝝ eq̄les virtutes: īmo melīꝰ ē in huiuſmodi vt vnū poſt aliđ tardet̃: vt ſit verbigratia vna duaꝝ medicīaꝝ q̄ lenificat pꝛius ſuā ꝑficiēs opationē q̄ꝫ ea q̄ pꝛemit: deīde adueniat exꝑſſiua ⁊ expellat qđ lenificatū fuit ⁊ ī reliquis ſm hanc conſideratiouē.

¶ Hic ponit cañ. in pꝛohibendo īdebitū modū ꝑmixtionis: ⁊ dicit bꝛeuiter ꝙ illud qđ facit lābere. i. medicīa lābificatiua nō ē permiſcēda cū eo qđ iuuat cōpꝛimēdo: ita vt ſint eoꝛum virtutes equales: īmo in huiuſmōi. i. in cāu īdigentie amboꝝ dꝫ pꝛemitti lābificatiua: ⁊ poſt cōueniēter exhiberi ꝯpꝛeſſiua que cōpꝛimēdo expellat id qđ lenificatum fuit: ⁊ in reliquis medicinis cōtrariaꝝ operationuꝫ ⁊ hoc mō faciēdū. ſ. ꝙ qñ equalr̄ indigemus opatiōe earū vna ꝑmittatur alteri. ſ. illa ex qua coꝛpus remanet magis paratū ad alterius īpꝛeſſionē recipiēdam ſi alia ſint paria. ¶ Et nota hic ꝙ medicina lābificatiua operat̃ mēbꝛū faciendo languidū: ita ꝙ per illud ꝓhibeat̃ in ea excoꝛiatio ⁊ cōpꝛeſſiua coꝛrugādo opat̃. Et iō contrarias hñt facere operatōes. Et iō ſi ꝑmiſcent̃ ita ꝙ virtutes eēnt equales: conſtat ꝙ eſſet inutilis permixtio vna alterīꝰ opationeꝫ īpediēte. nec Aui. hic vult plus. Sed tñ pōt eē qñqꝫ medicina nimiū cōpꝛeſſiua: ita vt merito iſtius ſit apta dimittere poſt operationē ſuā nimiā cōſtipatōeꝫ. Et aliq̄ ē qñqꝫ nimiū lubꝛicatiua: ita vt ſit apta dimittē nimiā lubꝛicitatē: vt dicit̃ de pulpa caſſie ꝙ nocet habētibus debilia īteſtina: ⁊ in iſtis caſibus pōt cōueniēter cōmiſceri cōpꝛeſſiuū cū lenitiuo ⁊ lābificatiuo: ⁊ ecōtra qñqꝫ ſuperāte vno: qñqꝫ ſuperante alio. Et illud eſt qđ dicit Meſue in ſua de ſimplicibus. c. de mirabolanis. Nam ad remouendā nimiā eoꝛū adherētiā debēt permiſceri cū pulpa caſſie. Sed qñqꝫ intēdimꝰ multā lenificationē vt bona fiat euatio eiꝰ qđ ē in cōcauo ſtomaci: ⁊ multā cōpꝛeſſionē vt confoꝛtatū remaneat mēbꝛū: ⁊ ī hoc cāu nō debēt ſimul dari: quia ſe īpedirent: neqꝫ ſequeremur intentum: ſed ſucceſſiue ita ꝙ ꝯpleta opatione pꝛimi ſequat̃ 2ª. Et ī iſta ītentōe dicta dꝫ ꝑcedere lenitiuū q ꝑparat ad opus ꝯpꝛeſſiui: vt dr̄ ſupꝛa ī littera. Poſſent ēt alijs modis ꝯueniēter admiſceri: ſꝫ iſta ſunt ſatis ad expoſitionē ⁊ concoꝛdiā dictoꝛuꝫ.

¶ Cam iom de eo qđ ex hoc caplō ī alijs locis ingrēdū ē.

m Edicine vētris ſolutiue ⁊ lenificātes q̄ bibunt̃ ⁊ epithimant̃ ⁊ reliq̄ ab eis ī noſtro ātidotario ſūt reliquēde ⁊ ſꝫ etates vnīꝰ cuiuſqꝫ ēt medicīaꝝ ſimpliciū melioꝛatio ⁊ qualr̄ ſit ei ſuccurrēdū ⁊ q̄uo ſit ei ī potu tribuēda ī medicis requirat̃ ſimplicibꝰ. Pille ꝑterea ad bibēdū dāde nō ſūt poſtq̄ꝫ deſiccate ſūt ⁊ facte fuerit vt lapides: neqꝫ ēt cū ſūt molles ne penetrēt ⁊ retineāt̃: ſꝫ ſint ſicut qñ ſiccari cepint ⁊ a digitꝭ cedāt ſi ꝯpꝛimant̃.

¶ In iſto caº vt pꝛedicit̃ in diuiſione: Aui. remittit nos ꝓ quibuſdā determinationibꝰ ad alia loca. Et īcidēter ponit vnaꝫ regulā. ¶ Pꝛimo ergo dicit ꝙ ſiq̄s vult cognoſcere medicīas ſolutiuas ⁊ lenificatiuas tā illas q̄ bibūtur q̄ꝫ illas q̄ epithimant̃: ⁊ ſupple ſint artificiales: requirat̃ ī antidotario. ſ. in 5º cañ. ¶ Dicit 2º ꝙ modus melioꝛādi medicinas ſimplices ⁊ qualr̄ ſit ſuccurrēdū nocumēto eaꝝ ⁊ q̄uo ſint admīſtrāde: requirat̃ in libꝛis de ſimplicibꝰ medicinis quoad regulas in canonibus vniuerſalibꝰ. 2º quoad

UVA. BHSC. IyR_006_1

ſpēs medicinaꝝ ī capitulis ꝓpriјs. Addit vlteriꝰ ꝙ pillule non ſunt dāde qñ ſunt antiquate ⁊ facte dure ſicut lapis: nec nimis molles qꝛ penetrāt ⁊ adherent in oꝛe ⁊ meri: qđ penitꝰ non itēdit medicus: ſed debēt eſſe ſicut ille que mō incipiūt exiccari: ⁊ que poſſunt pꝛemi digitis ⁊c̄.

¶ Capitulū vndecimuʒ de vomitu.

b Omēs qui ſūt remotioꝛes ab hoc vt medicus eos vomere faciat leuiter: aut ꝓpter naturā ſūt hoīes qui pectꝰ hēnt ſtrictū ⁊ qui male anhelāt ⁊ qui ad ſanguinē ſpuēdū ſūt apti: ⁊ hoīes colla hētes gracilia: ⁊ apātibus que ī ipſoꝝ naſcūtur gulis apti: ⁊ ſtomacos habētes debiles ⁊ multū pingues: qm̄ iſtis ꝯuenientius eſt vt vēter ſoluatur. Et macris melioꝛ eſt vomitus colere ipſoꝝ aptus: aut ꝓpter vſuʒ homines quibꝰ difficile eſt vomere neqȝ vomēdi habēt conſuetudinē: quoniā ſi iſtis vomitus pꝛouocatꝰ fuerit foꝛtibꝰ vomitibꝰ nō remanebit quin ipſoꝝ vene in mēbꝛis anhelitus ſcindantur ⁊ perueniat ad ptiſim. Cuʒ autē alicuiꝰ res qualis ſit ignoꝛabit: vomitibus leuibꝰ pꝛius erit experiēdus: qui ſi ei fuerit faciles erimꝰ ei foꝛtes auſi dare ſicut illum qui ſit ex heleboꝛo ⁊ ſibi ſimiles.

¶ Poſitis canonibꝰ de ſolōne vētris ⁊ rebꝰ annexis ponunt hic cañ. de vomitu cū annexis. Et diuidit in duas. Pꝛīo ponit cañ. in vſu vomitꝰ. 2° in annexis. 2ª ibi: cuʒ ille q ⁊c̄. Pꝛima ī duas. p° ponit coꝛꝑa iepta ⁊ coꝛꝑa apta ad vomitū. 2° ponit cañ. in vſu eiꝰ. 2ª ibi: ſi opoꝛtuerit. In pꝛima parte dicit quattuoꝛ. Pꝛimū eſt ꝙ hoīes q ſunt remotioꝛes ad hoc vt medicus faciat eos leuiter vomere ꝑꝑ nāʒ. i. ꝑꝑ diſpōneʒ eis nāleʒ ſunt illi in quibꝰ aliq̄ aut pluꝛes de ſeptē ꝯditionibꝰ īueniunt. Pꝛīa ē ꝙ pectꝰ habeāt ſtrictū. 2ª eſt ꝙ male anhelāt. i. cuʒ difficultate. 3ª eſt ꝙ ſunt parati ad fluxū ſeu ad ſputuʒ ſanguis. 4ª ꝙ habeant colla gracilia. 5ª ꝙ ſint apti ad hoc vt naſcant eis faciliter apoſtemata ī gula. i. in capite. 6ª ꝙ hēant ſtomacos debiles. 7ª ꝙ ſint multū pingues. Nā oībus iſtis meliꝰ eſt facere fluxuʒ vētris q̄ȝ vomitū. Dicit 2° ꝙ macris melioꝛ ē vomitꝰ aptus colere coꝝ. Tertiuʒ dictū eſt ꝙ qñqȝ ſūt inepti ꝓpter vſuʒ ſicut ſūt illi quibꝰ difficile eſt vomere ⁊ nō ſunt ꝯſueti. Nā in oībꝰ iſtis ineptis ſi vomitꝰ ſit ꝓuocādus cū foꝛtibꝰ vomitiuis nō remanebit quin ipſoꝝ vene ī mēbꝛis anhelitꝰ ſcindant ⁊ fiāt ptiſici. Quarto dicit ꝙ ſi ē aliquis de quo dubitas vtrū ſit aptus ad vomēduʒ leuiter vel nō: pꝛimo debes experiri illū cū leuibꝰ vomitiuis: ⁊ ſi ei fuerit facile tu poteris addere ⁊ dare ei foꝛtē ſicut illuʒ q fit ex heleboꝛo ⁊ ſimilibꝰ. Et pꝛime ꝯditiōes excepta illa de ſtomaco omnes ponunt ⁊ declarātur a Gal. in cōmento illiꝰ affoꝛiſmi quarte ꝑticule: Ptiſicos vero ⁊c̄. Nā cū ex oībus iſtis diſpōnibꝰ ſignificat debilitas mēbꝛoꝝ pectoꝛis: aut nimia īpꝛeſſio: vel ꝯpꝛeſſio ſicut in pīguibꝰ: cōſtat ꝙ qñ ꝑ vomituʒ māe ad ſupioꝛa vomebunt ⁊ ſanguis multꝰ cū violētia īplebit venas pectoꝛis ⁊ pulmonis ⁊ foꝛtis fiet extēſio partiū illaꝝ: periculū eſt ne vene ille ſcindātur ⁊ maxime ſi vomitꝰ fuerit cū re multū violentāte ⁊ cogēte ad vomitū. Et nō ītendo hic laboꝛare ad declarāduʒ qūo colluʒ gracile ſignificat ſtricturā ⁊ debilitatē venarū pectoꝛis: ⁊ qūo multa pīguedo ſignificat ꝯpꝛeſſionē venarū in pectoꝛe a carne ⁊ pīguedine: ſatis eīʒ dicta ſunt ī cōmēto illiꝰ affoꝛiſmi allegati. Sʒ de his q hñt ſtomacū debilē videt dubiū. Nā ſupꝛa in caº de regulis cōibus ſolutioni vētris ⁊ vomitui: dictuʒ eſt ꝙ ꝑꝑ debilitatē ſtomaci medicīa ſeceſſiua fit vomitiua: ergo hñtes ſtomacos debiles facilr̄ vomūt: ergo nō ſunt īepti ad hoc vt medicꝰ faciat eos vomere. ¶ Hic rñdet cōiter tribꝰ modis. Unus eſt ꝙ hic ꝑ habētes ſtomacos debiles ītelligimꝰ iſtos quoꝝ ſtomaci ſunt debiles per totū tā quoad partē ſuperioꝛē q̄ȝ quoad partē īferioꝛē. Sʒ in caº allegato ītelligit de debilitate partis ſupioꝛis. Nā cū īferioꝛ pars ſtomaci eſt debilis nō pōt pellere mām ad ſuperioꝛa: qđ tamē ad vomituʒ eſt opoꝛtunū. Uel 2° dicit ꝙ duobꝰ modis poſſumꝰ intelligere ſtomacū debilē. Uno mō quo ad virtutē expulſiuā ⁊ imutatiuā: ⁊ iſta ē que reddit ſtomacū īeptū ad vomitū: ⁊ iſta eſt de qua loquit Aui. hic. 2° dicit debilis qꝛ facile recipiēs nocumētū a ſenſibili: ⁊ iſto mō dicit multe ſenſibilitatis: ⁊ iſta debilitas facilitat ad vomitū: ⁊ de hac dictū eſt ſupꝛa. Uel 3° dicit ꝙ vomere facilr̄ includit duo vt ſumit hic: vt ab Aui. vnū eſt ꝙ a leui cā vomat. 2ᵐ ē ꝙ non ledant a vomitu. Mō multa ſūt dictoꝝ coꝛꝑuʒ q̄ a leui cā vomerēt: ſed quodlibet ledit a vomitu: ⁊ iō illi qui habēt ſtomacū debilē nō pñt vomere leuiter: qꝛ nō pñt vomere ſine notabili leſiōe. Sʒ nō valet argumētū: in eo medicīa ſeceſſiua fit vomitiua: ergo vomit ſine leſiōe: aut leuiter: ⁊ ſic pʒ ſolutio. ¶ Ulterius nota ꝙ Aui. hic colligit diſpoſitiones faciētes ad ineptitudinē vomendi tā naturales q̄ȝ accidētales ex cōſuetudine: ⁊ iō in pꝛincipio poſuit: aut ꝓpter nām ſub diſtinctiōe: ⁊ in fine dedit aliā partē diſtinctionis cū dicit: aut ꝓpter vſum: ⁊ cā aſſignata lʒ poſſet ī pluribus iſtoꝝ: tñ maxime verificat de alijs ab illis qui ſunt parati ad apoſtemata gutturis: ⁊ qui hñt ſtomacos debiles. in his eīʒ ꝑꝑ alia nocumenta manifeſta ꝓhibetur vomitus: ⁊ reliqua ſunt ſatis manifeſta.

Sciās tñ ꝙ vomitui īepti qñqȝ vomitu indigēt vel qꝛ repleti ſunt malis humoꝛibꝰ quos non licet per inferioꝛa educere: vel qꝛ habēt aliquā egritudinē in ītestinis: vel qꝛ adeſt mā venenoſa ⁊ coꝛroſiua vt colera pꝛaſſina vel eruginoſa que ſi educeret ꝑ inferioꝛa vulneraret inteſtina: quare ⁊c̄.

Et ſi non opoꝛtuerit vt fiat q̄tenꝰ vomāt: aut fuerit vnꝰ cui neceſſariū erit dare vomitū pꝛeꝑa ipʒ añ ⁊ fac ei ꝯſuetudinē ⁊ mollifica ipiꝰ nutriētia: ⁊ fac ea vnctuoſa ⁊ ſoluta: ⁊ fac eū quieſcē ab exercitijs ⁊ poſtea da ipʒ ei.

¶ Hic Aui. ponit cañ. ⁊ p° cōes deinde ꝓpꝛios. 2ª ibi: ⁊ da in potu ei. Dicit p° ꝙ ſiquis vomit difficulter: ⁊ ſit neceſſariū ꝙ vomat pꝛepara ipm āte: ⁊ fac ei cōſuetudinē vomēdi dando ei nutrimenta multa humida vnctuoſa ⁊ ſolutiua: ⁊ fac eū quieſcere: ⁊ ꝓhibe ab exercitio: ⁊ poſtea da ei vomitiuū. ¶ Ubi nota ꝙ iſta lr̄a multotiēs īuenitur affirmatiua: ⁊ ſenſus ē quē hic dixi ⁊ verificat rōne ſicut dicit in quarta ꝑticula affoꝛiſmoꝝ illo affoꝛiſ. Ad heleboꝛos his qui ⁊c̄. Nā per cōſuetudinē vomēdi ⁊ per nutrimenta multa ⁊ humida ⁊ vnctuoſa ⁊ quietē fit ſtomacus mollis ⁊ obediētioꝛ motui illi ſibi violēto. ſ. vomitui. Quñqȝ aūt additur negatiua que dicit: ⁊ ſi nō opoꝛtuerit vt fiat quatenꝰ vomat: ⁊ tūc eēt ſenſus ꝙ ſiquis ē de illis ī qbus nō opoꝛteret ꝓuocare vomitū qꝛ eēt indiſpoſitꝰ: ſed tñ eſt neceſſariū ꝓpter aliquē cāum facere ꝙ vomat: tūc ē ꝑparandus vt dictū ē. ¶ Nota 2° ꝙ lʒ in talibꝰ coꝛꝑibus vt vomāt vtile ſit facere cōſuetudinē: nō tñ ſemꝑ dʒ fieri. Nā qñqȝ ē tanta neceſſitas accelerādi ꝙ nō dat ſpatium faciēdi ꝯſuetudinē: vt ſi bibiſſet venenū moꝛtiferū qđ ē in ſtomaco: cōſtat ꝙ quāto citius pōt expellēdum ē. ¶ Nota 3° ꝙ hec tota pꝛeꝑatio ē ī mēbꝛis expulſiōis: lʒ quodāmodo humoꝛē reſpiciat. Nā ꝑparat ſtomacꝰ pꝛincipalr̄. Quō aūt humoꝛes ſunt ꝑparandi: aut vie nō ē ꝓpꝛiū huic loco: ſed cōe euātionibꝰ. Et iō de illo dictū ē. c. 3° qđ ē gnāle de euātiōe. ¶ Nota 4° ꝙ cibaria ſoluta pñt ītelligi cibaria apta ad diſſoluēdū robur ſtomaci: vt tepida ⁊ dulcia ⁊ oīa que hoc faciūt. Aut 2° qꝛ nō ſunt delectabilia: qꝛ diſſoluūt appetitū. Aut 3° ſoluta qꝛ diuerſa ⁊ nō cōiūcta: ita ꝙ īmutēt tāquā cibꝰ vnus. Ex tali eīm ſtomacꝰ fieret potiꝰ auarus: ſed ex diuerſis nō: vt dicit ſupꝛa in. c. đ regulis cōibꝰ ſolutiōi vētris ⁊ vomitui. Aliqui intelligunt ſoluta. i. abſqȝ ſale qꝛ inſipida: ⁊ iſta verba ſunt inſipida.

Quies eīʒ cōſeruat ſupfluitates: ⁊ iō vt fiat caruʒ generatio que hēant īducere humoꝛes ad vomituʒ qeſcūt: ⁊ hoc ante vomituʒ ⁊ non poſt: quare ⁊c̄.

Et ex hoc notato ſoluit dubiū motū a Gētili ī hoc loco ſi bene ꝯſideras: ⁊ vide etiā ab eo diſtinctionē de ꝑparatōe ⁊ dubiū de ſale ⁊c̄.

Et da ī potu vnctuoſa ⁊ olera cuʒ vino: ⁊ ad comedēdū da ei añq̄ȝ vomat nutriētia bona: ⁊ ꝓpꝛie ſi vōitꝰ fuerit difficilis: qm̄ foꝛtaſſe nō vomet ipʒ: imo nā ipſuʒ retinebit: ⁊ melius eſt vt bonū retineat q̄ȝ malum.

¶ Hic ponit cañ. ſpeciales: ⁊ pꝛimo ī vomitu facili cōuenietes. 2° in vomitu laboꝛioſo. 2ª ibi: cū aliquis. Pꝛīa ī tot quot ſunt cañ. Pꝛimꝰ ē ꝙ illi quē volumus facere vt leui vomitu vomat debēt dari olera cū vino ad comedēdum: ⁊ dʒ dari añ vomitū cibꝰ boni nutrimēti: ⁊ ꝓpꝛie ſi difficulter vomat: qꝛ foꝛte nō vomet: imo foꝛte retinebit illud qđ dat ei: ⁊ melius ē vt teneat bonū q̄ȝ malū. Ubi nota ꝙ Aui. inſinuat duo. Pꝛimū ē ꝙ talis vomitꝰ fiat dū cibꝰ ē in ſtomaco. Scđm ꝙ tales cibi debent eē vnctuoſi faciētes nauſeā ⁊ cū hoc boni nutrimēti: vnde olera cū vino ꝑcipue dulci mollificant ſtomacū ⁊ ꝑparāt ad nauſeā: ſed cū iſtis debēt dari illa que boni nutrimēti ſunt: aut qꝛ iſta olera debēt eē boni nutrimēti ⁊ ñ mali: ſicut ſpinachia ⁊ lactuca: aut qꝛ illud qđ cū eis dat: puta carnes dʒ eſſe boni nutrimēti: ⁊ nō mali. Ego nō ītelligo iſtū cañ. ꝙ facile vomentibꝰ dent ſolū olera cū vino: ⁊ difficulter vomētibus detur cibus boni nutrimēti: ſed ꝙ in oībus ꝯuenit dare olera ad mollificandū: ⁊ vinū dulce: niſi ꝑꝑ aliud ꝓhibens: ⁊ ēt in oībus cōuenit nutrimētū eē bonū: maxime tñ cōuenit hoc ſcđm difficulter vomētibꝰ ꝓpter cām dictā ī littera. Sed cā ꝓpter quā vomitiuū leue debʒ dari poſt cibū ē qꝛ vomitus ē motꝰ laboꝛioſus: ⁊ iō leuia vomitiua que leuiter agitant: ⁊ qꝛ ad fundū ſtomaci facile deſcēdunt niſi cibus eēt in ſtomaco nō ſufficiēter agitarēt: ⁊ niſi cū eis eēt cibi agitatio nō ſufficerēt vomitū īducere: ſʒ cū adiutoꝛio motus cibi inducūt ad vomitū. Accidit 2° ꝙ cibus ꝑmiſcet cum ſubſtantia hūoꝛis: vñ cū cibo facile pellit humoꝛ qui in ſtomaco cōtinebat. Et 3° qꝛ cū iſtis cibis abſqȝ hoc ꝙ hēant multū extraneare ſtomacū multotiēs ē virtus īcidendi humoꝛem viſcoſuʒ: aut ſubtiliandi groſſum: aut ingroſſandi ſubtileʒ: vnde poſtea leuius expellitur. Et pꝛimam iſtarum expꝛeſſit Raſis 4° almanſoꝛis. c. de iuuamētis vomitus. Attēde tñ ꝙ nō ſemꝑ hoc ē neceſſarium: ſed vtplurimū. qñqȝ eīʒ humoꝛ ī ſtomaco exiſtens ſufficiēter repit ad os ſtomaci ⁊ ē abhoīabilis: ⁊ nō nimis groſſus nec ſubtilis: vt accidit illis quibꝰ colera ieiuno ſtomaco pellit ad ſtomacū eoꝝ: de quibꝰ facit mētionē Gal. 6° regis ſanitatis: ⁊ 2° regis acu. ī quibꝰ ꝯuenieter vomitꝰ adminiſtrat añ cibū cū humoꝛ ſit ꝑatus facilr̄ egredi. Sʒ vtplurimū melius ē vt cibꝰ pꝛecedat nō ad hoc vt digeratur ſʒ ad vomitū facilitandū.

Cūqȝ

UVA. BHSC. IyR_006_1

Cūqꝫ poſt cibū quē comedit cā vomendi vomuerit tardet comeſtionē donec fames ſit fortis: ⁊ ſeda ſitiꝫ eiꝰ cū aliquo qḋ ſit ſicut ſirupꝰ macianoꝝ ſine aq̄ ⁊ nō cum iulep neqꝫ ſirupo acetoſo qm̄ vomere faciunt.

¶ Ponit cā̄.2m de faciendis poſt vomitū: ⁊ dicit duo. Primū ē ꝙ poſt talē vomitū nō cibeť donec fames ſit fortis. Scōm ē ꝙ ſi ſitiūt dꝫ ſedari ſitis eoꝝ cuꝫ ſirupo pomorū macianoꝝ ſine aqua ⁊ nō cū iulep ſiue ſirupo acetoſo: qm̄qꝫ iſta vomere faciūt. Cā aūt primi ē q: fames fortis ſignificat ꝙ cōſumpti ſunt humores mali ſiqui poſt vomitū in ſtomaco remāſerūt: ⁊ ꝙ ſedatꝰ ē motus agitatiuꝰ ad expellēdū: ⁊ iō cibus qui ſumeť a ſtomaco cōſtringiť ⁊ bn̄ digeriť. Cā aūt ſecūdi eſt q: i ſirupo macianorū cuꝫ ē factus ex ſucco macianoꝝ odoriferoꝝ hn̄tium aliquaꝫ ſtipticitatē ē ꝯfortatio ſtōaci cū ſtipticitate ⁊ aromaticitate: ⁊ ſedat nauſeā ⁊ agitationē. Diciť aūt ſine aqua aut quia fiat ex macianis ī quibus non ē cruda humiditas que pōt vocari aqua: ſed fiat ex his que ſunt vetera: aut q: non miſceať aqua in tali potu ne mollificet. Cā aūt tertij ē q: iulep mollificat ſtomacū ⁊ ſirupus acetoſus cū ſit hn̄s ſaporē ex acetoſo ⁊ dulci mixtū ē nauſeatiuꝰ: vt diciť 1° cā̄. c. 3°. Et ideo tu mēti tene ꝙ in his qui vomūt ⁊ ītēdis vomitum reſtringere non des iſtos potus.

Cibus autēꝫ qui eſt ei vtilis eſt pullus ī carbeꝫ ⁊ .iij. phiale vini poſt ipſum.

¶ Hic ponit cā̄. de ſpāli cibo: ⁊ dicit ꝙ cibꝰ qui vomētibus ē vtilis ē pullus gardezi: aut ſm aliā litterā carbeꝫ: ⁊ tres fiale vini poſt ipm̄. Iſtū cā̄. quidā volūt debere ītelligi de cibo ſumēdo aū vomitū: ⁊ dicūt ꝙ carbeꝫ vt ſumiť apud auctores de ferculis ē cibꝰ factus ī paſtello cum oleo: ⁊ tūc cā erit clara q: per oleū mollificat: ⁊ ꝓpter pullum ē boni nutrimēti: ⁊ ſic habemꝰ intētiōes ſupradictas. Alij volūt ꝙ intelligať de cibo poſt vomitū: ⁊ hoc ego puto verū ꝑꝑ ꝯtinuitatē textꝰ: ⁊ dicūt ꝙ carbē eſt idē qḋ ſalſamētū factū ex rebus aromaticis ⁊ ſtipticis: ⁊ tūc ēt cā ē clara. Sed qūo ſumat tres fialas vini: diciť cōiter ꝙ non vult hanc abſolute mēſurā ſumēdaꝫ eē: ſꝫ dat intelligi ꝙ augeať parū per potus reſpectu cibi: quia indigent reſtauratione cita: ⁊ hoc ſit cū vino odorifero. Sꝫ non inueni ītegre quāta menſura ſit fiala: dicit tamē Dy. ꝙ idem eſt ꝙ briala ⁊ briala ē. ℥. 6. ⁊ ſemis.

Et ille quidē qui acetoſuꝫ vomuerit ⁊ nō ꝯſueuit ⁊ ī pulſu aliqḋ ſignū febris hūerit: comeſtionē vſqꝫ ad mediū diē tardet: ⁊ aū ipſaꝫ aquā calidā roſaceā bibat.

¶ Eſt alius cā̄. in quo Aui. vult ꝙ qui vomit acetoſuꝫ: q: inconſuetus vomitui ⁊ fatigatus in vomitu ⁊ in eiꝰ pulſu apparet ſignū aliqḋ fe. dꝫ tardare comeſtionē vſqꝫ ad mediū diē: ⁊ antequā comedat bibat aquā roſatā calidā. Cā aūt canonis ē q: qui vomit acetoſum vomit frigidum humorē: ⁊ iō nō ē veriſimile ꝙ ꝑꝑ humorē ſit calefactus: ſed ꝑꝑ agitationē: ⁊ iō veriſimile eſt ꝙ fe. illa ſit effimera ⁊ ꝙ ſtatus eius trāſibit ī ſex horis: ⁊ ita media die artificiali de diebꝰ equinoctialibꝰ q ſunt .xij. hore: ⁊ tūc cibari poterit. Aqua aūt roſaꝝ dať ad cōfortandū ſtomacū ſua ſtipticitate ⁊ aromaticitate. Sꝫ dať calida actu ne currat frigida actu ſtomaco debilitato ⁊ reſoluto ne extingueret eiꝰ caliditatem naturalē ⁊ ne multū debilitetur.

Cui aūt acciderit vt colerā vomat nigraꝫ ipſius ſtomaco ſpōgia aceto calido infuſa ſuperponať.

¶ Dicit ī iſto cā̄. ꝙ ſi accidat ꝙ vomat colerā nigrā dꝫ ſuperponere ſtomaco ſpongiā īfuſam ī aceto calido: ⁊ adminiſtrať fomētatio cū aceto calido ad incidēdū melancolicum humorē ſiqua ꝑs remanſit: aut imbibita: aut adherēs ſtomaco: ⁊ vt ſui ſtipticitate cōfortet ſtomacū: ⁊ adminiſtrať in ſpōgia leuitate ipſius: ⁊ q: ſpongia adiuuat reſolutionē quā facit actualis caliditas aceti.

Et melius quidē eſt vt ſit cibꝰ qui ad vomēdū ſumiť diuerſus: qm̄ cū ē vnꝰ qn̄qꝫ ipꝫ āplectiť ſtomacꝰ ⁊ ī dimittēdo ipꝫ ſit auarꝰ. Poſt vomitū aūt ipſiꝰ ſupfluū ꝯferūt aues pue ⁊ pulli cū ābulare incipiūt: oſſa tm̄ ſuaꝝ extremitatū non comedat q: ſūt grauia ⁊ ī ſtomaco tardanť.

¶ Ponit cā̄. de cibo: ⁊ dicit ꝙ cibus qui ſumiť vt vomat dꝫ eſſe diuerſus. Et cā ē q: qn̄ eſt vnus: ſtomacus ſit auarus ī retinēdo vt dictū ē ſupra. Sed cibꝰ qui dať poſt ſuperfluū vomitū ſint aues parue ⁊ pulli cū ambulare incipiunt: ſupple ſi ſunt de genere pullorū qui non ambulēt cū naſcūtur: ſicut mlte aues: ⁊ nō debēt comedi oſſa ſua: q: ſunt grauia ⁊ tardanť in ſtomaco. Nā cū iſti indigeant cibo faciliter digeſtibili nō mollificante: ⁊ multi ⁊ boni nutrimenti iſta cōueniūt. Oſſa aūt ſui duritie ſunt indigeſtibilia: ⁊ ideo non debent ſumi.

Et fac eum ingredi balneum.

¶ Ponit cā̄. ꝙ qui ſupflue vomat ingrediať balneum ⁊ verificať: vt ſupra de ſuperfluo fluxu ventris.

In hora autem vomendi currat ⁊ exercitetur ⁊ fiat vt laboret poſt vomat.

¶ Ponit cā̄. de faciēdis in tpe vomendi ⁊ vult ꝙ illa hora exerciteť ⁊ currat: ⁊ hoc ſi aliter vomat: aut niſi vomat ſupflue: ⁊ hic motus adiuuat ad agitandū cibū ⁊ humores qui ſunt in ſtomaco ⁊ ad nauſeā ꝓpter hoc: ⁊ iō cōfert niſi ī ſupfluo: ⁊ ē ſnīa affo. Cū volueris heleboꝝ ⁊c.

Sitqꝫ hoc in media die.

¶ Dat cā̄. ī hora vomēdi: ⁊ dicit ꝙ vomat ī medio die. Et cā ē q: illi humores ſunt tūc cōmoti ⁊ virtus excitata: ⁊ iō facilius pellūtur. Aliqui tm̄ volunt ꝙ fiat vomitus illa hora: q: illa hora tēperata ē forte cū nō ſit frigida: vt matutina: nec calida vt veſpertina.

In hora p̄terea vomēdi oꝫ vt oculi ligenť ſuppoſitis pilis duabꝰ: deide vēter leui faſcia tēperate faſcieť.

¶ Dicit hic ꝙ due pile ligenť ſup oculos ⁊ faſcieť oculi: ⁊ ſilr faſcieť vēter leui faſcia. Primū hoꝝ ſit ꝑꝑ ꝓhibere curſuꝫ humoꝝ ad oculos. Scōm ad fortificandū muſculos ventris ꝓpellendo: ⁊ nō dꝫ multum ſtricte ligari: quia multotiens impedirent.

Res quoqꝫ que vomitꝰ ſūt preparatorie ſūt eruca ⁊ raſanus ⁊ carica ⁊ calamētū montanuꝫ ⁊ recēs ⁊ cepe ⁊ porri ⁊ aqua ordei cū fece ſua ⁊ melle ⁊ pultes fabaꝝ cū dulcedīe ⁊ vinū dulce ⁊ nuces cū melle ⁊ q̄ ſūt eis ſilia: ⁊ micla q̄ facta ē ex pane azimo ⁊ oleo: ⁊ melones ⁊ cucumeres ⁊ eaꝝ ſeia: aut aliquid ex eoꝝ radicibꝰ tritis ⁊ ī aq̄ infuſis cuꝫ dulcedine ⁊ hermodactili ⁊ raſanus.

¶ Narrat hic res faciētes leuiter vomere. ¶ Ubi nota ꝙ reruꝫ faciētium leuiter vomere quedā faciūt irritando ad nauſeā ⁊ vomitū ſicut abhoīatio: quedā irritādo ⁊ diſponēdo materiā ſicut incidēdo aut ſubtiliando: quedam diſponēdo meri ⁊ os ſtomaci: quedā attrahēdo humorem ad ſtomacū. Et nō dicūť fortia vomitiua niſi q̄ ad ſtomacū trahūt. Et oīa iſta q̄ trahūt ad ſtomacū: nō dicunť vomitiua fortia: īmo quedam mediocria ſicut hermodactili. Sꝫ que nō trahūt māꝫ nō dicūť fortia vomitiua: ⁊ ideo in iſtis ſi bn̄ examinenť nō inuenies fortia vomitiua: aut debilia: aut mediocria: q: quāuis attrahāt mām̄ ad ſtomacū non operantur cum violentia accidentiū.

Qui aūt vinū biberit iebriās ad hoc vt euomat: n̄ icipiat vomere donec adhuc paꝝ bibat ſꝫ bibat multū.

¶ Hic ponit q̄ꝫtitatē vini qḋ ſumiť gratia vomēdi. Dicit ꝙ qui ſumit vinū inebriās. i. aptū inebriare gr̄a vomēdi non incipiat vomere dū adhuc paruꝫ bibit: īmo bibat multū. Et ꝯſidera ex hoc intellectu ꝙ Aui. nō vult ꝙ debeat inebriari ſꝫ loquiť de vino potēti qḋ ē aptū inebriare maxime aūt verificať ſi cū potētia ſua ſit dulce. Et cā ē q: cū parū bibit nō ē adhuc ſtomacus relaxatꝰ: nec multum bn̄ parata mā ad vomitū: ſed qn̄ vinuꝫ ē multe quātitatis: tunc mollificat ⁊ agitat ſupiora: ⁊ ſui quātitate gnāt ⁊ leuat malā māꝫ ſtomaco adherētē. ¶ Dubitať tm̄ hic: vtrū ſit meliꝰ ꝓuocare vomitū cum vino q̄ꝫ cū aqua? Ubi nota ꝙ cōſiderāda ē diſpō ſtomaci ⁊ humoꝝ qui expellendi ſunt. Nā ſtomaco multū frigido ⁊ hūore flegmatico peccante faciēdus ē vomitꝰ cū vino: q: nō obeſt ſtomaco ſua caliditate ⁊ īcidit flegma q̄dā acuitate ⁊ abſtergit. vbi aūt ſtomacꝰ ſit colericꝰ: aut humor peccās ſit colera: ſtat: īmo ē ita ꝙ melius ē euacuare cuꝫ aqua vt vult Gal. 2° de regimine ſanitatis.

Suchaba quoqꝫ cuꝫ bibita fuerit cuꝫ melle poſt balneum facietvomere ⁊ ſoluet ventreꝫ.

¶ Ponit rem in vſu alterius vomitꝰ. ſ. ſuchaba. Et dr̄ ꝙ ſuchaba ē potus factus ex ordeo ⁊ aqua. Et diciť ꝙ cū bibiť cū melle facit vomitū ⁊ ſoluit vētrē: p̄cipue ſi ſumať poſt balneū: q: balneū relaxat os ſtomaci. Cā ē q: ſua vnctuoſitate ⁊ virtute abſterſiua ⁊ abhominatione quadam mouet ſtomacum ad expulſioneꝫ ⁊ preparat.

Amplius qui vomere voluerit non fortiter maſticare debet prope ipſuꝫ.

¶ Dicit ꝙ qui vult vomere non dꝫ fortiter maſticare: ⁊ hoc ſit ne ſtomacus bn̄ ⁊ auide retineat ⁊ appliceť cibo ſumpto: ⁊ ītelligiť de cibo qui ſumiť gr̄a vomendi.

Cum autē aliquis fortē vult vomitiuū ſumere ſicut qui ſit ex helleboro ipſuꝫ bibere dꝫ niſi fuerit qḋ ꝓhibeat ⁊ poſt duas horas diei ⁊ poſtq̄ꝫ ſtercꝰ ab īteſtīs exierit. Et ſi cū pēna vomuerit: bene erit. ⁊ ſi nō: moueať parū per. ⁊ ſi nō: ī balneū mittať. Pēna quoqꝫ qua ſit vomitus iungēda ē ex aliquo qḋ ſit ſicut oleū ſiſaminuꝫ.

¶ Hic Aui. ponit cā̄. ī vſu fortis vomitus: ⁊ licet miniſtret regulas cognoſcendi vomitū iuuatiuū a nocitiuo: tm̄ hoc facit abſqꝫ ordine: ⁊ iō pars iſta diuidiť vt precedens in tot partes quot ſunt canones ī dicta littera. In prima ergo parte enumerat qūo ſumēdū ē vomitiuū forte, ⁊ qūo vomēdū ē, cū illo. Et ponit. 7. cōditiōes in his ſeruādas. Prima: ꝙ ſi ſumať vomitiuū forte ſicut helleborus dꝫ ſu/

Nota ꝙ maciana ſūt poma ſilueſtria q̄ nō habemꝰ: ex quibꝰ pn̄t fieri ſirupꝰ: ideo loco eiꝰ damꝰ miuā citonioꝝ ſine ſpeciebus ſi corpa ſint colerica. ſed ſi ſint flegmatica damꝰ cū ſpeciebꝰ: vnde talia non damꝰ cū aqua: q: oꝫ ꝯfortare ſtomacū q: debile ē: modo aqua remolliret ⁊ debilitaret cū magis: quare ⁊c. hec Gētilis.

Scias ꝙ res acetoſa que euomiť qn̄qꝫ ē cibꝰ aut potꝰ ex ſe acetoſus aut acetoſatus ī ſtomaco vt lac ⁊ vinū que ī ſtomaco frido ſrequēter acetoſanť. Et aliqn̄ ē acetoſuꝫ flegma vel ī ſe acetoſatū ex ebullitione ſicut ſucci fructuū poſt ebullitiōeꝫ acetoſanť vel ex permixtiōe melancolie acetoſe. Et aliqn̄ eſt melācolia vel nālis que quadā acetoſitate remiſſa participat: vel aduſta genita ex nāli: q̄ ſi ſubtilis ſit ē acris valde ſicut acetuꝫ: vt dicit Aui. p̄ria primi doctrina quarta. c. j. ⁊c.

Hoc idē predocuit nobis Raſis quarto almāſoris caplo de vōitu dicēs: eſt ēt obſeruāduꝫ vt cū aliquis voluerit vomere duos pāniculos prius in rotūditateꝫ circūuoluat ⁊c. ⁊ rō huiꝰ pōt eſſe q: in vomitu oculi laborant ita vt qn̄qꝫ exire videanť a ſuis foueis: ⁊ iō dixit Aui. circa finē huius capli ꝙ vomitus corpori ꝯfert: ſꝫ viſui nocumētū facit. preſeruanť autē per dictas pilas ⁊ ligaturas ab his nocumentis. quare ⁊c.

mi ſtomaco ieiuno vbi nō fuerit aliud ꝓhibēs. Scđa ꝙ ſumatꝰ poſt duas horas diei. Tertia ꝙ ſumatꝰ poſt euōneꝫ vētris a ſtercore. Quarta ꝙ vomat ꝑ īpoſitionē pēne ī gula cū qua ſi vomat bñ erit. Quīta ꝙ ſi non vomat hoc mō moueatꝰ paꝝ. Sexta ꝙ ſi motꝰ nō ſufficit mittatꝰ ī balneū. Septīa ꝙ pēna vngatꝰ cuꝫ aliquo qđ ſit ſicut oleū ſiſaminuꝫ. ¶ Ubi pᵒ ꝯſidera ꝙ dixit bibere dans intelligere ꝙ talia medicamīa qꝛ ſunt abhoīabilia trāſglutiuntꝰ ſine maſticatione: ⁊ illud large dicitꝰ bibere ſiue illđ ſit ī ſolida ſubſtātia ſiue molli: vñ ſupra dicit ꝙ bibuntꝰ pillule. Dy. tñ dicit ꝙ laborat ad docēdū ꝙ ī forma apozimatis ⁊ potabili ⁊ fluxibili meliꝰ admīſtrantꝰ vomitiua fortia: qꝛ vt dicit facilius deſcendāt remanēte virtute in ore ſtomaci. Sꝫ ego non puto veꝝ ꝙ in forma potabili ꝙ faciliꝰ deſcendāt cū ſupradictū ſit ꝙ illud farmacum vomitiuū ſit ſeceſſiuū ſi detꝰ in ſubſtātia ſolida: qꝛ faciliꝰ deſcēdit: ⁊ hic non ītendo aliter arguere niſi qꝛ faciliꝰ ad ſuperiora agitantꝰ in forma liquida ꝗꝫ ſolida. ¶ Sꝫ circa prīmā ꝯditionē cū dicitꝰ ꝙ dꝫ ſumere ieiunꝰ tale vomitiuuꝫ: attende ꝙ vera cā eſt qꝛ vomitiuū debile nō datꝰ niſi ad educendū humorē qui eſt ī ſtomaco: ⁊ talis faciliꝰ cū cibo exit vt ſupra dicitꝰ. Sꝫ forte vomitiuū datꝰ ad attrahēduꝫ a lōginquo ⁊ īpediretꝰ operatio ſua ꝑ ꝯmixtionē eius cū cibo. Scđa cā eſt qꝛ cum ſit plurimū res maligna nō dꝫ ſumi ita ꝙ aliquid ex ea penetret in venas: modo ſi cū cibo ſumeretꝰ trāſumpta ꝑte cibi attrahetꝰ aliqđ de vomitiuo. Tertia cā qꝛ facta agitatione cito a ſtomaco pelleretꝰ cū ſupernataret cibo: ⁊ ſic non retineretꝰ ſufficiēti tꝑe ad attrahēdū illud qđ attrahēdū eſt: ⁊ etiā qꝛ talis medicina nō operatꝰ niſi reducatꝰ ad actū a calore corporis humani vt ſupra dictuꝫ eſt: ⁊ cibus īpediret operationē ꝑ quā ad actuꝫ reducētꝰ. ¶ Cā aūt quā aſſignat Dy. ſuꝑ hoc: eſt qꝛ vomitiua fortia non euāant niſi cū forti motu: ⁊ fortior motꝰ reqritꝰ ad vomendū ſtomaco vacuo a cibo ꝗꝫ a ſtomaco pleno. Judicio meo nihil eſt: qñqꝫ fortia vomitiua faciūt forteꝫ motū per quē ēt ſtomacus plenꝰ facilius euacuatꝰ ꝗꝫ vacuus. ¶ Nota vlteriꝰ qꝛ Aui. hic dicit detꝰ ſtomaco ieiuno niſi fuerit qđ ꝓhibeat. Tale aūt ꝓhibēs qñqꝫ ē diſpoſitio medicine ꝗ ꝓpter quedā nocumēta ꝗ facit īdiget vt detꝰ cū re cibali: aut qñ aliqđ cibi eſt in ſtomaco vt ꝑcipue heleborus albꝰ. qñqꝫ eſt ex ꝑte nāe ſuſcipientis vt ſi eēt valde ſenſibilis ſtomaci aut debilis. qñqꝫ ex parte accidētium vt ſi ſumeretꝰ ī hora famis. Jn his eīꝫ caſibꝰ oꝫ ꝙ ſumatꝰ ſupra cibū vt maiora nocumēta vitentꝰ. ¶ Circa 2am ꝯditionē nota ꝙ due ſunt cāe ꝓpter ꝗs forte vomitiuū dꝫ ſumi poſt duas horas diei. Prima qꝛ dꝫ ſumi hora qua hūores nō ſunt a ſomno īmobilitati vt citius egrediantꝰ. Nā cū farmacū vomitiuū ſtet in ſtomaco ī ſuꝑiori parte agitat ⁊ īcitat ad ſui expulſionē: ideo nō tādiu tenetꝰ ſicut ſeceſſiuuꝫ: ⁊ oꝫ ꝙ citiꝰ a ſe trahatꝰ: ⁊ ideo dꝫ eē poſt excitationē ⁊ ſubtiliatōeꝫ humoꝝ a lumīe diei: ⁊ ne ſumatꝰ ī hora vehemētis caloris. Dicitꝰ poſt horas duas: qꝛ in eſtate qñqꝫ dꝫ fieri: ⁊ ſi ampliꝰ ſtaretꝰ eſſet hora nimiū calida. Scđa cā eſt qꝛ ſumendo illa hora accidit ꝙ ſit actus vomēdi circa meridiē vt pōt patere ex ſupradictis: qꝛ in tꝑe quattuor horaꝝ cōiter ꝯplet ſuā oꝑatōeꝫ. ¶ Tertia ꝯditio eſt ꝙ ſit poſt fecuꝫ emiſſionē ab īteſtinis. Et cā ē primo ne fecū agitatio ſit cā aut putredīs aut motꝰ eius ⁊ ſui vaporis ad loca nobiliora. 2ᵒ ne oppilatio meſeraicaꝝ ex fecibꝰ faciat attractionē difficileꝫ. ¶ Quarta ꝯditio eſt ꝙ vomat cū poſitōe pēne in gutture: hec eīꝫ eſt mīma agitatio poſſibilis ad vomitū excitāduꝫ ⁊ mīme corpꝰ cōmouēs poſt medicinā aſſumptā: ⁊ iō ab illa īcipienduꝫ eſt. Et hic per pēnam ītelligimꝰ ⁊ digitos ⁊ res alias mobiles in gulaꝫ īmittēdas cā vomendi. ¶ Quīta ꝯditio eſt ꝙ ſi pēne īmiſſio nō ſufficit dꝫ moueri paꝝ: ⁊ hoc vt fiat agitatio paulatīꝫ mouēs māꝫ verſus ſurſuꝫ. Sepe eīm cū ſubito ⁊ fortiter mouetꝰ mā verſus ſurſuꝫ vt aſcēdat ſtomaci partes ſuꝑiores claudūtꝰ ⁊ ꝓhibetꝰ īcitatio ad vomitū. Sꝫ cuꝫ paulatīꝫ hoc fit accidit ꝙ vſqꝫ ad meri ⁊ os ⁊ ſuꝑiores partes paulatīꝫ cōicatꝰ nocumētuꝫ: vñ mouetꝰ ad expellenduꝫ ꝑ os: ⁊ per viā nālis ſubordinatōis mouentur inferiora ad trāſmittendū ad os. Et tu vide modū quo motꝰ ⁊ nauigatio agitāt ad vomitū ī ꝯmēto aſſo. Cuꝫ volueris heleboꝝ ⁊c̄. ¶ Cōditio 6a ē ꝙ mittatꝰ ī balneū nō qdē tm̄ vt diuertatꝰ mā ab īteriorībꝰ ad exteriora: ſꝫ vt mollificetꝰ ſtomacꝰ ⁊ relaxetꝰ os eiꝰ ⁊ mā ſubtilietꝰ ⁊ ꝯmoueatꝰ. Hec eīꝫ ꝑparāt ⁊ incitāt ad vomitū pluſqꝫ leuis motꝰ. ¶ Septīa ꝯditio ē ꝙ pēna cū ꝗ fit vomitꝰ ē vngēda cū oleo ſiſamīo qꝛ ē oleū multū mollificatiuū: ⁊ cū non habetꝰ: loco eiꝰ vtimur oleo dulci cōi aut oleo anetino. Tu tñ ī iſtis vide ꝙ Auic. īnuit ꝙ vbi pēna īmiſſa gutturi nō ſufficit ad īcitādū ad vomēdū ſufficit leuis motꝰ corꝑis: ergo vꝫ īnuere ꝙ leuis motꝰ corꝑis plus facit ad vomitū ꝗꝫ pēna īmiſſa gutturi niſi qs velit ꝙ poſt talē motū requiratꝰ iteꝝ agitatio cū pēna: qꝛ tūc poſſꝫ ſuſtineri ꝙ agitatio cū pēna ē fortior leui motu.

Dicit Serapio ī agregatore ī capl̄o de oleo ſiſamino ꝙ tale oleū ē maluꝫ ſtomaco ⁊ ꝺſtruit eū. Et Aui. ī ſcđo cāonis capl̄o de ſiſamo dixit ēt ꝙ ē malū ſtōaco faciēs nauſeaꝫ ꝓſternēs deſideriuꝫ. Juuat aūt ī ꝓuocatōe vomitꝰ ex forti farmaco. pᵒ quidē abhoīatione ſaporis ⁊ odoris eius. 2ᵒ ſua vehemēti lenificatōe qꝛ lenit vt ita dicaꝫ gargaroneꝫ: ⁊ ꝓhibet ipm ab excoriatōe ex decurſu farmacie ⁊ humoris acuti ſuper eum ⁊c̄.

Qđ ſi incēſio acciderit ⁊ anguſtia ſtomaci: detꝰ ī potu aq̄ calida ei aut oleū qm̄ aut vomitū faciet aut vētrē ſoluet. Ex eo preterea qđ ad hoc iuuat ē ſtomaci ⁊ extremoꝝ calefactio qm̄ hoc nauſeaꝫ facit.

¶ Hic docet ſuccurrere quibuſdā accidētibꝰ malis ī his qui forte vomitiuū ſūpſerūt. Et dicit ꝙ ſi alicui tali acciderit īcēſio. i. inquietudo: aut anguſtia. i. mordicatio: ſuccurrēdū ē dando in potu aquā calidā. ſ. tepidi caloris: aut oleū ſuppl̄e tepidū: qꝛ hec aut faciēt vomere aut ſoluēt vētrē: ⁊ calefaciat extrema ⁊ ſtomacū: qꝛ hoc faciet nauſeaꝫ. ¶ Ubi nota primo ꝙ ꝑ incēſionē Auic. ītelligit mordicationē: ⁊ per anguſtiā intelligit īquietudinē: que ſequūtur huiuſmodi dolorē. Et iō ſequitꝰ poſt aſſumptionē vomitiui ꝓpter humorū attractorū ad ſtomacū malitiā: aut ꝑꝑ farmaci malā qualitatē: aut ꝓpter vētoſitates que multiplicantꝰ virtute nō potēte tā cito expellere per vomitum ⁊ per ſeceſſum vt oꝫ. ¶ Scđo nota ꝙ aqua calida ſui lubricitate mollificat: ⁊ caliditate anodina mitigat mordicationē ⁊ ſuis qualitatibꝰ tēperat ⁊ ꝓmit farmaci acuitatem ⁊ lubricando facit vt ſurſum aut deorſum citiꝰ emittatur. etiā dolorē mitigat ⁊ reddit ſtomacū aptiorē ad faciēdum conatū pro expellēdo materiā. Oleū aūt qđ nauſeatiuū ē: eſt aptū ad faciēdū vomitū ⁊ medicine acuitatē reprimit: qꝛ vnctuoſa reprimūt acuitatē acute medicīe. ¶ Sꝫ dubiū videtꝰ qūo ſtomaci ⁊ extremoruꝫ calefactio ſit nauſeatiua. Nā ſupra de regulis ſolutiōis vētris ſm̄ vnā expoſitiōeꝫ ī eo qui timet ne vomat medicinā debēt calefieri ſtomacꝰ ⁊ pedes frigidi. Ex hoc ergo videtꝰ ꝙ hec calefactio potiꝰ hꝫ ꝓhibere vomitū ꝗꝫ facere nauſeam. Hic rñdet Dinus duobus modis. Primꝰ ē ꝙ hoc referatꝰ tantū ad ſtomaci calefactionē: que ꝓpterea ꝙ agitat humorē ī ſtomaco nauſeam facit: ēt qꝛ rarificat ⁊ debilitat ſuperiora ſtomaci: ꝓuocato ergo vomitu remouētur incenſio ⁊ anguſtia ꝓpter ablationē cāe: ⁊ intelligitꝰ de calefactiōe debili. Superius aūt intelligebatꝰ de forti: ⁊ illa cōſtringit ⁊ nō relaxat ꝑtes ſtomaci. Calefactio aūt extremoꝝ nō facit vomitū: ſed cōuenit ī noſtro cāu faciēdo fluxū vētris ⁊ nō nauſeā. Scđa rñſio ē ꝙ qñqꝫ iſta accidētia hic dicta fiūt: qꝛ medicīa agitat māꝫ: ēt ſtomacus ē debilis ⁊ nō pōt expellere. calefactio aūt ſtomaci ⁊ extremorū confortat ſtomacum: ⁊ ideo ꝑ accidēs ē cā nauſee: qꝛ facit virtutē fortē ad mouēdū ſurſum māꝫ. Sꝫ ſupra qñ timebatꝰ de vomitu in medicīa ſeceſſiua nō erat ſtomacꝰ debilis īmo fortis: ſed mā inobediens motui deorſum ⁊ per calefactiōeꝫ eliquata fiebat obediēs. Ego puto ꝙ ſupra Aui. ī. c. allegato nō poſuit ꝙ dꝫ ſtomacꝰ frigidus calefieri ad ꝓhibēdū vomituꝫ: ſed poſuit qꝛ hoc ē cōueniēs in opere farmaci ſiue ſeceſſiui ſiue vomitiui ꝙ nō ꝑmittatꝰ ſtomacꝰ eē frigidus nec pedes: vnde non dicit ibi ꝙ ſemper in tali timore ſint calefaciēdi. ⁊ hoc intelligo ſiue timeatur ꝙ fiat vomitiua ſiue nō. hic autem vult ꝙ iſta calefactio potius habet facere nauſeam ⁊ precipue tepida relaxando ſtomacum.

Scias etiaꝫ ꝙ ex aſſumptōe aque calide magis fiet ꝓuocatio fluxꝰ ventris ex eo qđ lauat ſtomacū ⁊ facit medicinā deſcēdere: ſed ex ſumptōe olei magis prouocabitꝰ vomitus lꝫ poſſit fieri ēt fluxꝰ vētris: quare ⁊c̄.

Cūqꝫ medicinā vomere faciēs preparauerit ⁊ ſuaꝫ īceperit operationē: vomitor quieſcere dꝫ ⁊ odores bonos olfacere: ⁊ eius extrema cōprimēdo ſunt fricanda: ⁊ paruꝫ aceti eſt ei in potu tribuēduꝫ: ⁊ comedat maciana ⁊ cydonia cū pauco maſticis. ⁊ ſcito ꝙ motꝰ facit magis vomere ⁊ quies minus.

¶ Hic dat cañ. qñ medicina vomitiua accelerat ī operādo. Et dicit ꝙ medicina qñ citius īceperit facere vomituꝫ ſolito: oꝫ ꝙ vomitor faciat iſta quinqꝫ vel aliqua eoꝝ. Primū ꝙ qeſcat. 2m ꝙ olfaciat odores bonos. 3m ꝙ faciat fricare extrema ſua ꝯprimēdo. 4m eſt ꝙ ſumat ī potu paꝝ aceti. 5m ꝙ comedat ſtipticū boni ſaporis ⁊ odoris ſicut maciana aut cidonia aut aliquid de maſtice. Addit ī fine ad dāduꝫ cām vnius dicti ꝙ motꝰ facit maxīe vomere ⁊ quies minꝰ. ¶ Notāduꝫ ergo ꝙ cuꝫ farmacū vomitiuū accelerat ſuā operationē in faciēdo vomere ſimul cū alīȷs rebꝰ ⁊ humoribꝰ ipſuꝫ etiā euomitꝰ. Et qꝛ ſumitꝰ forte vomitiuū ad attrahēdos humores a lōginquo: ideo veriſimile eſt ꝙ tūc eductū ſit anteqꝫ fecerit oꝑationē ſuā: ⁊ ideo medicꝰ dꝫ cito conari ne nimis cito vomat: vt tādiu teneatꝰ ꝙ putetꝰ operatū eē attrahēdo illud qđ intendebamus ipm debere extra attrahere. Et per hanc cāꝫ nititur ad ꝓhibēdum vomitū per hec quinqꝫ. Quoniā auteꝫ hec quinqꝫ prohibent de quiete dedit cauſaꝫ Auic. ⁊ dicitꝰ 4a particula aſſo. Cuꝫ volueris heleboruꝫ magis ducere. Et cā eſt qꝛ humores nimis ſtimulāt: ⁊ ita quies oppoſito modo facit minꝰ vomere. Olfacere aūt bonos odores facit ſtomaco ſil'eꝫ motū localeꝫ in partibꝰ facere ac ſi ſapida deglutiantꝰ vt dixi pa aſſo. ⁊ ideo ſtomacus ꝯſtringitꝰ quoad partē ſuꝑiorē. Fricatio autē diuertit vt non percipiatꝰ ita in ſtomaco nocumētū: ⁊ iō non ita ſtimulatꝰ. Et acetū cōſtringit partes quibꝰ obuiat ꝑcipue paꝝ vt ſolū tangātur ſuperiora ⁊ nō ſtomaci fundū. Reliqua patēt qūo ꝓhibeant vomitū. Qđ ſi ꝯtingat vomitū accelerare ſuā oꝑatiōꝫ nō ſolū euāandi ſed attrahendi: qꝛ fuerit nimis forte: dꝫ potari aliquid qđ acceleret exitū eiꝰ ⁊ vigorē eius frangat. Sed hoc dedit intelligi ſupra in ſolutiuo.

De aceto dicit. A. ſcđo canonis capl̄o quod prohibet effuſiones materierū ad interiora ⁊ reprimit maliciaꝫ farmaci ⁊ ꝯſtringit ſtomacū calefactū vomitiuo cōfortat ⁊ vnit.

Et eſtas ē tꝑs ī quo magis ē dignꝰ vt ī ipſo fiat vomitꝰ. ꝙ ſi alicui neceſſariꝰ fuerit ⁊ nō fuerit figure ipſius ꝯueniēs: eſtas erit dignior hora vt in ea cōcedatur.

Incidēter

UVA. BHSC. IyR_006_1

Etrō ē q̄ꝛ i eſtate multiplicaꝫ colera q̄ petit partes ſuperiores: quo fit vt ꝯueniē tius per ſuperiꝰ euacuet: etiā q̄ꝛ eſtas cō mouet ⁊ ſubtiliat humores idē vomitus paratiores reddit: q̄re ⁊c̄.

¶ Incidēter hic docet que hora ē cōueniētior ad vomi/
tum de horis āni: dicēs ꝙ eſtas ē hora dignior ad vomi/
tū. Et iō ſi aliqui fuerint iepti ad vomitū eſtas erit digni/
or hora: vt in ea deducaꝫ ad vomēdū. Et primū hoꝝ colli/
gitur ab Hyp. 4ª particula afforiſ. illo affo. Purgare qdē
eſtate ſupiora ⁊c̄. Et 2ᵐ intelligiꝫ ꝙ ſi aliquis fuerit carno
ſus iſte erit figure incōueniētis ad vomitū: ⁊ ſilr hn̄tes ha
bitū ſimilē ptiſicis vt diciꝫ ſupra. In iſtis ergo non ē ad/
miniſtrādus vomitꝰ ita cōueniēter ſicut in tp̄e i quo tēpo
re vomitus ē facilis: ⁊ q̄ꝛ illud ē eſtas: ideo in illis qui ſunt
talis figure opꝫ ꝓ faciendo eos vomere expectare eſtatem
niſi magna concurrat neceſſitas.

Et finiū vomitus lōginquior ſꝫ moduꝫ purgatiōis
prime eſt ſtomaci ſolius ⁊ nō inteſtinoꝝ ⁊ ad modū qui/
deꝫ purgatōis ſecūde capitis ⁊ totiꝰ corporis. Ipſius ve
ro attractio ⁊ eradicatio eſt ab inferioribus.

¶ Hic docet Aui. vnde vomitꝰ eūat ⁊ attrahit. Et di/
cit ꝙ finis. i. longinquior locus vnde eūat vomitꝰ ſm lo/
cū purgatiōis p̄ie ē ſolus ſtomacus. i. nō hꝫ primo eūare
niſi a ſtomaco ⁊ inteſtinis: ⁊ purgat 2º caput ⁊ totū corpꝰ
⁊ ipſius attractio ⁊ eradicatio ē ab inferioribꝰ. ¶ Ubi no
ta ꝙ ꝑ motū prime purgatiōis intelligit Aui. illū qui fit ꝑ
vomitū ſolū ⁊ imediate. mō cōſtat ꝙ per vomitū dū vo/
miꝫ mā nō expelliꝫ niſi a ſtomaco. purgatio aūt 2ª non in/
telligiꝫ ꝙ fit poſt primam ſed ꝙ nō imediate: ⁊ q̄ꝛ per vo/
mitū expelliꝫ illud qđ fuit attractū a longinquo. ſ. a toto ⁊
a capite: iō dixit ꝙ ē corpus ⁊ caput per modū purgatio-
nis ſcđe. Et tu ex hoc intellige ꝙ id qđ ē in iteſtis niſi alio
motu ad ſtomacū traheret nullo mō ꝑ vomitū expellere/
tur. ſed hoc dictū eſt ſupra. c. 4º. ¶ Nota 2º ꝙ eradica/
tio qn̄qꝫ ſumiꝫ per eūationē de ꝓpinquo: ⁊ hoc mō dictū
ē ſupra ꝙ vomitꝰ trahit ab inferioribus ⁊ eradicat a ſupe/
rioribꝰ. Qn̄qꝫ aūt diciꝫ eradicatio remotio a loco vbi mā
fixa erat ſicut in radice: ⁊ hoc mō vomitus ⁊ alie eūatiōes
eradicant ab inde vn̄ trahūt: ⁊ vomitus eradicat ab infe/
rioribꝰ ⁊ qn̄qꝫ a ſuperioribus. Hic dantur aliȷ̄ modi reſpō
dendi de quibus non curo.

Et tu quidē cognoſces vomitū ꝯferētē ab eo qui nō
fecit iuuamētuꝫ: ex eo ꝙ ipſuꝫ ſequiꝫ alleuiatiōis ⁊ deſi/
derij boni ⁊ anhelitus ⁊ pulſus bonitas ⁊ ſimiliter ex di
ſpoſitōibꝰ aliaꝝ virtutū. Eius aūt iceptio ē nauſea. Et
deteriꝰ quidē maluꝫ qđ efficit eſt mordicatio fortis i ſto/
maco ⁊ aduſtio ſi medicia fuerit fortis ſicut heleborus ⁊
qđ ex eo fit qm̄ icipit a ſaliua que fluit: deide ſequiꝫ ipſaꝫ
vomitꝰ multi flegmatis multotiēs poſt quē ſequiꝫ vomi
tus rei liquide tenacis. Mordicatio quoqꝫ ⁊ dolor erūt
manſiui ita ꝙ alia accidētia non mutētur niſi i nauſeā
⁊ anguſtiā. Et qn̄qꝫ ſoluiꝫ ēt vēter: poſtea i hora quar/
ta incipit quieſcere ⁊ ad requiē declinat.

¶ Hic ponit ſigna per que cognoſciꝫ vomitꝰ eſſe ꝯueni/
ens ⁊ ꝯferens eſto ꝙ fiat cū q̄buſdā accidētibꝰ malis. Nā
hunc vomitū fortē fere eſt ipoſſibile ſumere ⁊ operationeꝫ
debitā ſequi abſqꝫ labore. Et p̄º docet ſigna ſignificatiua
bonitatē que ſigna apparēt poſt operatōeꝫ ⁊ ſunt ꝓportio
nabilia ſignis q̄ ſignificāt bonitatē operatiōis ſolutōis vē
tris. Et ſūt alleuiatio corpis: bonitas deſiderij. ſ. appetitꝰ
cibi: bonitas anhelitꝰ: bonitas pulſus: fortitudo reliquarū
virtutū. ſ. digeſtiue ⁊ expulſiue ⁊ aīalis. Et ſi bene ꝯſide/
res: cā in hoc eſt eadē q̄ dicta ē ſupra i medicina ſolutiua:
⁊ cognoſces ꝙ iſta nō oꝫ eē in actu vomēdi nec ſtatiꝫ poſt
vomitū: ſed poſt quietē ⁊ agitationē vomitꝰ. Scđo docet
q̄ malicia vtplurimū accidit i vomitu forti p̄cedēte vt dꝫ
⁊ nō excedente menſurā nocumēti cōiter expectati in eo.
Et dicit ꝙ icipit opatio a nauſea ⁊ poſtea deteriꝰ malū qđ
efficit ē mordicatio fortis i ſtōaco ⁊ aduſtio. i. dolor adu/
ſtiuus ſicut qn̄ medicina eſt fortis ſicut heleborus: ⁊ icipit
p̄º educi vomitu ſaliua: poſt ſequiꝫ vomitꝰ flegmatis mul
ti: poſt illud flegma ſequiꝫ vomitus rei tenacis liq̄de: tn̄ in
hoc dolor ⁊ mordicatio fiunt māſiui. i. ſtātes ita ꝙ nō mu
tabunꝫ ad alia accidētia niſi ad nauſeā ⁊ anguſtiā. Et per
anguſtiā itelligit Dy. ſubuerſionē aīe. Qn̄qꝫ ēt accidit in
exhibitōe taliū ꝙ ſequiꝫ fluxus vētris ⁊ poſt i hora quar/
ta ab illa i qua fuit aſſumptꝰ vomitꝰ icipit decliare ad re/
quiē ⁊ geſcit motꝰ ille farmaci. ⁊ hoc totū itelligaꝫ vt i plu
ribꝰ: ⁊ vomitu p̄cedēti eo mō q̄ expectaꝫ poſt aſſumptōem
fortis vomitui. ¶ Circa p̄ᵐ nihil videꝫ addēdū niſi ꝙ quē
admodū ex exhibitōe farmaci ꝯtigit aliq̄n ꝙ alleuiatio ſta
tiꝫ poſt eiꝰ operatiōeꝫ debitā nō ſentiꝫ: ita pōt ēt ſimilibꝰ
modis ⁊ cāis accidē i vomitu. ¶ Sꝫ circa 2ᵐ puto ꝙ q̄ agi
tatōe ſtomacꝰ expellit ad vomitū p̄cedit đ neceſſitate in/
clinatio ad vomitū q̄ diciꝫ nauſea: plurimū ēt p̄cedit mo/
tus ſtomaci abſqꝫ expulſiōe que diciꝫ ſubuerſio aīe. Sed
de ſubuerſiōe nō opꝫ. Nā poſſibile ē ꝙ primū motū ſto/
maci ad vomēdū ſequeꝫ expulſio corpulēti: ⁊ ſic fit vomi/
tus primꝰ. Sꝫ mordicatio fortis ⁊ aduſtio accidit a quali/
tate farmaci vtplurimū: ēt pōt eē a qualitate humoris acu
ti attracti ad ſtomacū. Rō aūt quare incipit eūari ſaliua
ē q̄ꝛ plurimū talis humiditas cōtineꝫ in ore ſtomaci ⁊ i ca/
pite eius ⁊ in radice gutturis nālr: que agitata per farma/
cū ⁊ aliq̄n per agitatiōeꝫ manꝰ facile pelliꝫ cū ſit in via: ⁊
cū hoc ex mō ſubſtātie ſit parata ad expulſionē. Plurimū
aūt talia vomitiua faciūt 2º loco vomere multum flegma.
Nā fortia vomitiua plurimū reſpiciūt flegma ⁊ cū hoc ēt
ſtomacus ē eius lacuna. Sed cōtingit aliquādo pelli mul/
tā colerā: ⁊ iō dicit Aui. plurimū: ⁊ nō dicit ſemper. Et q̄ꝛ
iſta vomitiua danꝫ ad eūandū humores difficilis euacua
tionis qui ſunt tenaces: iō vtplurimū per ea iſti humores
eūanꝫ: ⁊ eūantur liquidi: q̄ꝛ nō pn̄t antequā eliquenꝫ eua/
cuari: ſed eūanꝫ in vltimo q̄ꝛ ſunt magis reſiſtētes. Et poſ
ſet hic ordo ex quibuſdā accidētibꝰ variari varijs cauſis.
Sꝫ attēde p̄io ꝙ ipē dicit ꝙ mordicatio ⁊ dolor fiūt mā
ſiui: ⁊ nō mutanꝫ ad alia mala accidētia niſi ad anguſtiā.
Sꝫ tu poſſes dicere: Aui. ſtatiꝫ dicit ꝙ malū ē ꝙ magnifi
cetur anguſtia. Si ergo ad anguſtiā deducit erit vomitꝰ
malus ⁊ nō cōferēs. Ego puto ꝙ cogitatio huius difficul/
tatis fecit Dy. per anguſtiā itelligere ſubuerſionē anime:
⁊ hoc mō itelligēdo nō ē anguſtia de accidētibus malis:
q̄ꝛ ē minor motus q̄ꝫ vomitus. Ego aūt puto ꝙ cū mordi
catione ⁊ aduſtiōe ſtomaci plurimū ē anguſtia ꝓprie acce
pta: ⁊ iō Auic. dicit ꝙ nō permutanꝫ in vomitu cōferente
niſi ad anguſtiā. Cauſa aūt ꝙ anguſtia ē malum ⁊ de ac/
cidētibus mali vomitus: diciꝫ ꝙ qn̄ ē multū intenſa ⁊ aſſo
ciata cū alijs que ſtatim dicet ē de accidētibꝰ mali vomi/
tus nō ſemper: imo dolorē ⁊ aduſtionē plurimū cōicatur.
Nec puto ꝙ per anguſtiā itelligat Aui. abhoīationē. Qđ
etiā diciꝫ ꝙ qn̄qꝫ ſoluiꝫ venter: ē: q̄ꝛ cū ſtomacus cōpri/
mitur accidit aliquid emitti per inferius orificiū: aut quia
farmacū vomitiuū trahit ad inteſtina: ⁊ cū pro parte ma/
gna ē expulſum: nō eſt potens expulſiuā inteſtinorū vin/
cere: q̄ꝛ inclinat per viaꝫ illā expellere: ⁊ iō accidit in fine
operatiōis vomitiui. Circa vltimū aūt qđ dicitur ꝙ hora
4ª declinat ad quietem: intelligiꝫ vtplurimū ſm varieta/
tem vomitui ⁊ nature corporum.

Hyp. ſcđo ꝓnoſticoꝝ ſic loquiꝫ de malo vomitu: Uomitꝰ ſicut ſuccꝰ porri vel viridis vel plūbeus aut niger: malus ē. Si oībꝰ iſtis infectus fuerit mortis nunciꝰ eſt cōtinuꝰ. Dis odor malus ē in quocūqꝫ vomitu: malū eſt ⁊c̄.

Malū aūt ē vt vomitꝰ n̄ ꝑueniat ⁊ magnificeꝫ āgu
ſtia ⁊ accidat tēſio ⁊ egreſſio oculoꝝ ad exteriora ⁊ forti
rubedo i eis vtriſqꝫ ⁊ ſudor multꝰ ⁊ iterſectio vocis. Si
ergo alicui acciderit niſi ei ſubueniaꝫ ꝑueniet ad morteꝫ
idē. Illō aūt quo ei ſuccurriꝫ ē enema ⁊ doſis mellis cū
aq̄ calida: ⁊ i potu ei dare olea i quibꝰ tyriace virtꝰ exiſtit
ſicut oleū đ lilio. Et labora donec vomat: q̄ꝛ ſi vomuerit
nō ſuffocabiꝫ: ⁊ adhibe ēt enema qđ ſit apđ te p̄paratuꝫ.

¶ Docet hic Auic. cognoſcere vomitū qui eſt malus: ⁊
cū peioribꝰ accidētibus q̄ꝫ dꝫ. Et primo facit hoc dicens
ꝙ ē malū ꝙ ſumpto vomitiuo nō perueniat vomitus: ſed
magnificeꝫ anguſtia ⁊ tenſio accidat. ſ. faciei ⁊ gutturis ⁊
totius corpis: ⁊ egreſſio oculoꝝ ad exteriora ⁊ fortis rube-
do i eis vtriſqꝫ ⁊ ſudor multus ⁊ iterſectio vocis. Et raro
q̄ꝛ ſi hec acciderint ⁊ nō ſubueniaꝫ patiens morieꝫ. Scđo
dicit ꝙ quādo hic acciderit illud per qđ ſuccurriꝫ ē ene/
ma cū exhibitione mellis cū aqua calida in potu. Tertiū ē
dare in potu olea lenificatiua in quibꝰ exiſtit virtꝰ tyriace
ſicut oleū de lilio: ⁊ laborare ad faciēdū ꝙ vomat: q̄ꝛ ſi vo
mcrit nō ſuffocabiꝫ. Et tandē repetit ꝙ admiſtreꝫ enema
qđ dꝫ eē paratū apud te: ne qn̄ indiges ſit oportunū prepa
rare ⁊ tēpus interponere i eius preꝑatiōe. ¶ Nota p̄io
ꝙ farmacū vomitiuū ꝑmanet plurimū i ſupiori pte ⁊ tra/
hit ad ſupiora: ⁊ conatꝰ ē nāe ad expellēdū per ſuperiora: ⁊
ideo per ſuas qualitates cū ſtet in loco vicino cordi ⁊ ſpiri
tualibus ⁊ per modū motus qui ē ad ſuperiora ꝯprimēdo
dyafragma verſus ſpiritualia mēbra cōicāꝫ accidētia ſua
cordi ⁊ mēbris ſpūalibꝰ ⁊ fiunt mala ⁊ piculoſa preſertim
cū diu moraꝫ ⁊ nō eūaꝫ nec ipꝫ nec māe ad ſtomacū attra
cte. Ex quibꝰ rebꝰ pꝫ cā accidētium que hic ponūtur ⁊ eā
periculoſitatis. Et ſi cū iſtis adiungas ꝙ talia vomitiua
ſunt fortiū qualitatū: ⁊ ꝙ os ſtomaci in quo maxime ipri/
mūt cū ſint ibi ē plurime ſubtilitatis ⁊ cōitatis cū corde ⁊
cerebro res erit clarior. Tēſio eīm accidit aut conatu forti
oīuꝫ neruoꝝ ad expellēduꝫ nociuuꝫ ꝑ cōitatē ſtomaci: aut
muſculoꝝ pectoris ⁊ ventris motiuoꝝ ſtomaci ſubordina
toꝝ. Egreſſio oculoꝝ accidit multis humoribꝰ mortis ꝓ/
pter fortē motū partiū pectoris verſus ſupiora: ⁊ ſilr rube
do ⁊ ſilr iterſectio vocis propter nocumētuꝫ dyafragma/
tis: ſudor aūt multus ex fortiſſima agitatōe totius. Et pꝫ
ꝙ q̄ꝛ motus iſti ſunt iuxta cor: accidit inde mors niſi ſub/
ueniaꝫ. ¶ Scđo nota ꝙ iſtis accidētibꝰ vere ſubueniꝫ re/
mouendo cām: q̄ꝛ faciēdo farmacū ⁊ maluꝫ humorē educi
per iferiora cū cliſteri: aut per ſupiora cū ꝓuocatōe vomi/
tus. Aut 2º remoueꝫ ꝑmutando māꝫ ⁊ medicinā a loco no
bili ⁊ multi ſenſus ad ignobile ſicut ab ore ſtomaci ad fun/
duꝫ: ⁊ fit cū melle ⁊ aqua calida abſtergēdo ⁊ lubricare fa/
ciēdo. Aut 3º malā qualitatē remouēdo farmaci qđ fit cuꝫ
oleis i quibꝰ eſt virtꝰ tyriace. i. virtus reſiſtēdi male quali
tati farmaci quecūqꝫ ſit illa: vt oleū de lilio aromaticitate
ſua. Sꝫ qn̄qꝫ facimꝰ cū eo i quo plures iſtoꝝ modoꝝ ſub/

Circa primū: hoc eſt circa vomitū ꝯferentē: vn̄ dixit Hyp. ſcđo pronoſticoꝝ ꝙ vomitꝰ laudabilis ē ille cui flegma admixtum fuerit colibꝰ: neqꝫ nimis eſt viſcoſus: quāto vero a ſimplicitate remotior: tāto ſuſpectior ⁊c̄

UVA. BHSC. IyR_006_1

ueniendi ꝯiungunt̃: vt eſt oleuꝫ qꝺ lãbificãdo medicinã ⁊ nauſeã faciẽdo preparat expulſioni ⁊ aromaticitate reſiſtit male qualitati: ⁊ ita diſponẽdo mẽbra vt min⁹ ledant̃. Et in cliſteri ſunt intẽtio eũandi: diſponẽdi īferi⁹: reſoluendi vẽtoſitates: mollificãdi mẽbra. Et põt ẽt eſſe intẽtio tyria/calis: ⁊ iõ Meſue intentõe 3ª. c. ij. vex inquit in oĩbus his confide ⁊ expecta maius iuuamẽtuꝫ ex cliſterib⁹: tamẽ nõ eſt dimittẽda ꝓuocatio vomitus: vt patebit per ea que di centur in vltima parte huius capituli.

Et egritudines quidẽ que ſunt digniores eo vt ĩ eis fiat vomitus ſũt cronice ſicut idropiſis ⁊ epilepſia ⁊ me/lancolia ⁊ lepra ⁊ podagra ⁊ ſciatica.

¶ Hic enumerat egritudines ĩ quib⁹ dignũ ẽ vt fiat vo mitus. Et dicit ꝙ ſunt egritudies cronice ſicut idropiſis ⁊ melãcolia epilepſia lepra ⁊ podagra ⁊ ſciatica. Circa quã partẽ cadũt alique difficultates. Pria q: nõ videt̃ ꝙ vo/mitus magis ꝯferat in cronicis q̃ꝫ in acutis egritudinib⁹. qꝺ ꝓbat̃: q: in illis egritudinib⁹ magis cõfert vomit⁹ qua/rum mã coueniẽtius eũatur vomitu: ſed iſte ſunt penden/tes a colera ⁊ ille ſunt acute: ergo magis cõfert in acutis. Scꝺa difficultas q: nõ videt̃ ꝙ vomitus cõferat epilẽſie ⁊ melãcolie cũ Haliabas prio ſermone practice dicat non couenire vomitũ partib⁹ ſuperiorib⁹: itẽ q: mã manet ad tale mẽbrũ cõſtat ꝙ non couenit. Tertia difficultas quia dicit vomitũ couenire leproſis. ſed videt̃ ꝙ nõ: q: purga/tio cuꝫ farmaco nõ couenit vtẽtibus malo cibo. ſed lepro/ſorũ corpora ſunt huiuſmõi: vt pꝫ tractatu 3º. c. vltimo: er go ⁊c. ¶ Ad primã rñdet̃ notãdo ꝙ ĩ egritudinib⁹ acutis corp⁹ ẽ inflãmatũ ⁊ paratũ per motũ ledi: ⁊ iõ mot⁹ fortis nõ põt adminiſtrari ſine notabili nocumẽto. Et q: illaruꝫ mã nõ multũ reſiſtit farmaco: iõ põt eũari coueniẽter per fluxũ ventris. Et ob hanc cãm ptim q: nocumẽta vomit⁹ maiora ſunt in eis: partim q: nõ ita cogunt̃ vti farmacis nõ ita in eis cõpetit eũatio cũ vomitu. Sed in cronicis eſt ecõtrario q: cũ nõ ſint multe caliditatis: iõ nõ timet̃ iflã/matõis magnũ nocumẽtũ: ⁊ q: multaꝝ taliuꝫ mã nõ eũat̃ facile niſi farmaco multũ violento: iõ cogit neceſſitas mul totiẽs ⁊ cõſentit nã ⁊ egritudies ꝙ in eis fortis vomit⁹ ad/miniſtret̃. Et ex hoc pꝫ q: loquẽdo de vomitu forti: vt lo/quit̃ Aui. ꝙ magis in cronicis ꝯuenit morbis. Nec valet argumẽtũ: Coueniẽtius mã colerica eũat̃ vomitu q̃ꝫ fleg/matica vel melãcolica: ergo ꝯuenit qñ facit acutã egritudi nem q: inflãmat: ⁊ ꝓ tũc inflãmatio quã faceret vomitus ẽ ſuſpecta: ſed in diſpõne ſanitatis mã colerica coueniẽti⁹ ⁊ facilius eũatur vomitu q̃ꝫ alia mã alijs paribus. Aliter tñ poſſet dici ꝙ in aliqua egritudine magis couenire vo/mitũ põt intelligi duob⁹ modis. Uno mõ q: vomitus pro mã illa eũanda ſit facilius ⁊ cũ minori nocumento. 2º mõ q: minus ſecure põt vomitus dimitti. Primo mõ in mul tis egritudinibus de colera nõ acutis coueniẽti⁹ ſit vomi tus: q: mã eaꝝ facilius ⁊ cũ minori nocumẽto eũatur. Nõ eniꝫ ẽ impoſſibile mãꝫ acutã facere egritudinẽ nõ acutam q: nõ difficilẽ. Preterea nõ ẽ incoueniẽs eẽ egritudinem colericã nõ acutã ⁊ nõ cronicã ꝺ dulci flegmate qꝺ vomi tu educitur. Sed 2º mõ coueniẽtius adminiſtrat̃ vomit⁹ in cronicis: q: nõ dimittit̃ niſi cũ maiori nocumento. Nã ille egritudines nõ acute ĩ quib⁹ mã ẽ facilis eũatõis poſ/ſunt abſqꝫ vomitu cuꝫ fluxu vẽtris curari cũ mã obediat leui medicine. Sꝫ ille cronice de quib⁹ hic dicim⁹ nõ poſ/ſunt aliter curari: aut cũ maxia difficultate aliter curant̃: ⁊ ſic pꝫ argumẽti ad oppoſitũ ſolutio. ¶ Ad ſcꝺam diffi/cultatẽ dicit̃ ꝙ lꝫ nõ fiat epilenſia aut melãcolia niſi no/cumẽto cõicato capiti: tñ radix male materie a qua hoc no cumẽtũ fit qñqꝫ eſt ĩ partib⁹ ſtomaci ⁊ ſibi vicinis: vt ĩ epi lenſia que vocat̃ ſtomatica ⁊ in melãcolia mirachia. Mõ dicit̃ ꝙ vomit⁹ nõ ꝯfert iſtis niſi qñ ſũt per cõitatẽ cũ ꝑti/bus inferiorib⁹ in quib⁹ eſt radix materie. Halyabas aũt intellexit de illis que nõ ſunt per cõitatẽ. vnde etiã Auic. paꝝ infra dicit ꝙ vomit⁹ nocet epilẽſie capitis. ¶ Ad ter/tiaꝫ difficultatẽ dicit̃ ꝙ in lepra ꝯfirmata nõ ꝯfert vomi/tus nec alia fortis euacuatio: ſed in nõ ꝯfirmata confert vt habet ſumi tertia quarti. Sꝫ quãdo dꝫ purgari oꝫ ꝙ vta tur bono cibo. Et ſi ẽt exoluat̃ nõ tñ ſequit̃ ꝙ nõ dꝫ pur/gari ꝓpter iuuamẽtuꝫ maius.

Modo tñ clariori eẽt dicẽdum ꝙ cũ egritudies acute ſubtiliũ humoꝝ ſint vt in plurib⁹ febriles: ideo non ꝯpetit in eis ꝓuoca/tio vomit⁹ cũ forti vomi/tiuo ne violẽtia motionis vomit⁹ ⁊ ſupercalefactõe farmaci vomitiui febris ĩ cẽdatur maxime ĩ cauſo/nibus ⁊ tertianis ꝯtinuis: ſed in ĩterpolatis põt ſua uiter ꝓuocari vomit⁹ cuꝫ pẽna aut cuꝫ digito ori ĩ/poſito vel cũ aqua calida ⁊ oleo cõmuni: quare ⁊c̃.

Uomitus preterea cũ ſuis iuuamẽtis plerũqꝫ affert egritudines ſicut quãdoqꝫ generat ſurditateꝫ.

¶ Hic dicit ĩ generali. Et ſi vomit⁹ habeat facere iuua/menta tñ facit quaſdã egritudines ⁊ ꝑcipue ſurditatem: ⁊ hoc q: mouet materias verſus caput.

Ampli⁹ minutio nõ ẽ cũ eo ꝯtinuãda ſꝫ tardãda tri bus dieb⁹ ⁊ precipue ſi ĩ ore ſtomaci fuerit humor.

¶ Ponit cañ. in cõiunctione vomit⁹ ⁊ flobothomie: di/cẽs ꝙ minutio. i. flobothomia nõ ẽ cõiungẽda cũ vomitu ĩmo oꝫ ꝙ tardet̃ duob⁹ dieb⁹ aut tribus: ꝑcipue ſi humor fuerit in ore ſtomaci. Et cã ẽ q: duos fortes mot⁹ inflãmã tes ⁊ virtutẽ ꝓſternẽtes nõ debemus inuicẽ cõiungere. Cũ aũt humor ẽ in ore ſtomaci ne fiat attractio humoris il lius in venas ẽ cauẽda minutio: ⁊ etiã ne os ſtomaci debi/litet̃ nimiũ cum ex flobothomia ⁊ vomitu debilitant̃: ⁊ ẽt ne accidat cõmotio fortis illius male materie in ore ſtoma ci: quã cõmotionem ſepe ſequitur ſincopis: vt dicetur in caplꝺ de flobothomia.

Uomitus quoqꝫ multotiẽs ſit difficilis propter hu/moris ſubtilitatẽ. Ipe igitur ẽ ĩgroſſandus potu ſauich ⁊ granis granati.

¶ Docet cañ. quẽdã ſpãleꝫ: dicẽs ꝙ multotiẽs ẽ diffici/lis vomit⁹ ꝑꝑ ſubtilitatẽ materie: ⁊ tũc mã ẽ ingroſſanda cũ potu ſauich. i. ptiſane que ẽ facta cũ granis granatorũ: ⁊ hoc ẽ cõe cuꝫ mã peccat ſubtilitate: ita vt ſit inobediens eũationi ꝙ debet ingroſſari vt dicitur ſupra.

Sauich ⁊ ſaotch noia ſt̃ arabica ſino nima gñãlia ad or/deuꝫ fractũ ſiue triti/cuꝫ ⁊ ad oẽs fructus ꝯtritos cuꝫ multa aq̃ coctuꝫ: ⁊ iõ aliqñ in/ueniũtur in libris ſa/uich ordei: ſauich tri tici: ſauich pomoꝝ: ſauich prunoruꝫ: ſa/uich granatoruꝫ ⁊c̃ huiuſmodi. intellige ergo hic per ſauich ex granis granatorũ factũ. grana eim gra/natoꝝ cũ aqua cõtu/ſa ⁊ in potu data co leraꝫ ſubtilem nimis ĩſpiſſant. vel intellige per ſauich ordeũ fra ctuꝫ permixtum his granis aut ſucco co/ruꝫ ꝙ inſpiſſat ⁊ in/groſſat coleraꝫ: prio per ſubſtãtiaꝫ ordei: ſcꝺo ꝑ qualitatẽ ſuc/ci mali granati ⁊c̃.

Et ſcito ꝙ exit⁹ male rei ꝑ ĩferiora poſt vomitũ ẽ ſi/gnũ ꝙ illꝺ qꝺ faciebat faſtidiũ deſcẽdit ĩferi⁹. Et vomit⁹ poſt aſcellationẽ eſt ſignũ ꝙ ẽ ex accñtib⁹ aſcellãdi.

¶ Hanc partẽ ĩtroducit Dy. ꝙ Aui. cõparat vomitũ ad ſolutionẽ ventris ⁊ econtrario ponẽdo duas concluſiões: quaꝝ prima ẽ hec. ¶ Solutio vẽtris per quã educit̃ mala res ꝓpter quaꝫ apparebat vomitus neceſſarius excuſat a vomitu: verbigratia ſi ꝓpter faſtidium aut morſum cor/dis aut oculorũ tenebroſitatẽ ſine febre apparet vomitus neceſſarius multotiẽs per fluxũ vẽtris per queꝫ res mala egredit̃: purgat̃ corpus a cauſa eoruꝫ accidẽtiũ ⁊ excuſa/mur a vomitu: ⁊ iõ id qꝺ Aui. poſt vomitũ dicit dꝫ intelli gi poſtquã vomit⁹ apparuerit neceſſarius. ¶ Scꝺa ꝯclu ſio: multotiẽs vomitus poſt neceſſitatẽ ſolutõis vẽtris ex cuſat ab ea. pꝫ q: per talẽ vomitũ mltotiẽs euacuat̃ illud qꝺ debuiſſet eũari per ſolutionẽ vẽtris: verbigratia lũbo/rum dolor vel genuũ grauitas ĩ quib⁹ vniuerſalr̃ putatur iuxta dicta 4º afforiſmoꝝ neceſſaria ſolutio vẽtris ⁊ vomi tus aliquãdo excuſat ab ea. Ego aũt puto ꝙ iſte ꝯclões ſint vere: ſed Aui. non intẽdit eas: q: ſuus modus loquẽ/di hoc nõ ꝺnotat cũ dicit ẽ ſignũ ⁊ nõ dicit ẽ cã remotio/nis vt intẽdũt cõclões Dy. Ideo dico ꝙ multotiẽs acci dit faſtidiũ ⁊ vomitus ⁊ parato multo vomitu ſiue artifi/cialiter ſiue nãliter cõtingit ꝙ per ſeceſſum egredit̃ hũor malus aut mali odoris aut male ſpeciei ſicut colera vitelli/na vel praſſina: ⁊ ſignificãt tũc ꝙ mã que erat prio cã faſti dij circa ſtomacũ deſcendit ad inferiora. Et nõ puto ꝙ ſit neceſſariũ ſignũ: ĩmo vt plurimũ ẽ: ita ꝙ raro cõtigit ꝙ ſint multe materie: ita ꝙ oporteat poſt vomitũ cito eũari a nã aliã mãm deorſum. Sed ſicut in colirica paſſiõe mul totiens ⁊ inferi⁹ ⁊ ſuꝑius eũatur mã que eſt cã faſtidij: ita putandũ ẽ vtplurimũ eẽ cũ poſt vomitũ ſequat̃ ſolꝰ ven/tris. Et ꝓportiõali mõ ĩtellige ſecũdã conclõnẽ.

Hora preterea vomẽdi in eſtate melior cauſa dolo/ris in meridie eſt.

¶ Hic docet meliorẽ horã vomẽdi in eſtate: ⁊ attende ꝙ hic inuenit̃ duplex lr̃a. Una dicit ꝙ cã doloris: alia ꝙ cã caloris: ⁊ vtraqꝫ tollerari põt. Dicit ergo ꝙ melior hora vomẽdi in eſtate ẽ in meridie cã doloris ſm vnã litterã: aut cã caloris ſm aliã litterã. Sed vtroqꝫ mõ cã ẽ vna q: in meridie ꝓpter caliditatẽ hũores ſunt magis mobiles: ⁊ iſta hora qua humores ſunt mobiles dꝫ ꝓuocari vomit⁹: q: eſt eũatio difficilior q̃ꝫ ſolꝰ: ideo reſpectu caloris adiu/uantis dꝫ fieri ĩ meridie. Sed ſi fiat vomit⁹ ad ſedãdũ do lorẽ ⁊ ad diuertẽduꝫ: tũc etiã in meridie magis iuuabit: ⁊ vtroqꝫ modo verificatur.

Et vomitus corpori ꝯfert: ſꝫ viſui nocumẽtuꝫ facit.

¶ Hic cũ iuuamẽto vomitus exprimit nocumẽtũ ſpãle: ⁊ dicit ꝙ quãuis vomit⁹ cõfortet corpus totũ tamẽ facit nocumẽtũ ĩ viſu. Et cã ẽ q: circa oculũ partes ſunt laſſe: iõ multũ recipiunt de humore qui ad ſuperiora mouetur: vnde ſupra habitum ẽ ꝙ faſcient̃ oculi in hora vomitus: ⁊ iſtoꝝ humoꝝ curſus ad oculũ nocet. Nota tñ ꝙ mltotiẽs vomitus facit iuuamẽtũ maius nocumẽto: puta qñ viſus eẽt leſus ꝓpter malaꝫ materiam in ſtomaco ⁊ partibus ĩ/ferioribus contentam.

Ampli⁹ faciẽduꝫ nõ ẽ vt ꝑgnãs vomat: qm̃ ſuꝑflui/tates corporis ipſius ĩ ea nõ egredient̃. Et vomit⁹ ⁊ la/bor eã ad eſtuationẽ perducẽt: faciẽdũ ẽ igit̃ vt quieſcat. Alij vero quibus accidit vomitus ſunt iuuandi.

¶ Hic docet in vltĩo cañ. iſtius. c. ⁊ ẽ intentio Aui. ꝙ lꝫ ĩ nõ pregnãtibus cũ accidit eis vomitus ſunt incidãde ad vomitũ: q: per illud purgant̃ ⁊ eũatur cã vomitus ⁊ faſti/dij. Hoc tñ nõ ẽ faciẽdũ in pregnãtibus. Et cã ẽ q: per vo mitũ nõ purgant̃ ab humore qui ẽ cã faſtidij cũ ille nõ ſit ſaltem ſm multas partes niſi in venis ⁊ nõ eũat̃ niſi a far/maco vomitiuo eũante fortiter ⁊ nõ per ſolã incitationem ad vomitũ: iõ faciẽdũ ẽ ꝙ quieſcãt a vomitu: q: ⁊ ſi ꝑ illꝺ aliquod hẽatur iuuamẽtũ maius tñ habẽt nocumẽtũ: q: ꝑ vomitũ ⁊ laborẽ qui ẽ ĩ eo ducũtur ad eſtuationẽ. Et Dy. intelligit ꝙ ꝑgnãtes nõ debẽt vomere vomitu forti: quo/niã vomitus debilis eis cõcedit̃. Et vos per vomitũ fortẽ ĩtelligatis tã vomitũ qui fit cũ farmaco forti eũante exol/uẽdo: ⁊ hũc oꝫ ꝓhibere ex cañ. gnãli ꝙ ꝑgnãtes non ſunt purgande forti farmaco q̃ꝫ vomitu qui fit cũ magno cona tu vt

Scias tñ ꝙ ſi vo mitus ex aliqua cau/ſa ſit pregnãti neceſ/ſarius: puta q: ſum/pſit aliquod venenũ: vel q: ſurſuꝫ abũdat in furioſis humori/bus: tutius ſibi fit in medijs mẽſibus im/pregnatiõis. ſ. quarto quinto ⁊ ſexto q̃ꝫ in trib⁹ primis vel vlti/

UVA. BHSC. IyR_006_1

mis: cotilidones eiꝫ ſeu ligamēta quibus appendunt pāniculi fetus orificijs venaꝝ matricis ſunt fortiores in medijs menſibus: iuxta illud Hyp. quarta affo. affo. illo: Pregnātes purgare ſi cōuenit a q̄rto vſqꝫ ad ſeptimū ⁊c̄. Et p te videas q̄ dicit Gal. in ꝯmēto: quare ⁊c̄.

tu vt cū pēna vel cū alio mō laborioſo ſine farmaco ſolutiuo. Et ſm̄ hoc ego puto ꝙ Aui. itelligit ꝙ eſtuatio ⁊ labor ſupant in malitia iuuamētuꝫ euacuatiōis. Sed qñ leuiter pōt fieri vomitus rei cōtente ī cōcauo ſtomaci cōfert. Et tu ex hoc ītelligis cām quare Aui. 2ª tertij. c. de regimīe pgnātiū. ⁊ Raſis 4° Almāſoris ꝓportionali caplo nō docent quomodo eas prouocare ad vomitum: ſed confortare cum ſtipticis ⁊c̄.

¶ Caplm̄ 2^{m} de eo q̄d agere dꝫ ille qui vomit.

c

Um ille qui vomuerit a ſuo vomitu euaſerit os ſuuꝫ ⁊ faciē poſt vomitū abluere debet ex aceto aqua tꝑato: vt grauitas q̄ qñqꝫ capiti accidit remoueat̄: ⁊ paꝝ maſticis cū aqua m acianoꝝ bibat: ⁊ caueat ſibi a comeſtione ⁊ potu aq̄ ⁊ diu quieſcat: ⁊ ipſiꝰ iungantur ipocūdria ⁊ ingrediatur balneuꝫ ⁊ abluat ſe velociter ⁊ egrediat̄. Et ſi neceſſariū ei fuerit dare ad comedēdū ſit res boni ſaporis ⁊ bone ſubſtātie ⁊ velocis digōnis.

¶ In p̄cedēti caplo habuimus cañ. de vſu vomitꝰ. Hic habemꝰ cañ. ī vſu ānexorū vel regulā ſeruādam in ānexis vomitui. Et ſunt quinqꝫ. Primū ē quid dꝫ facere ille qui vomit ſine alio nocumēto. 2^{m} ē de iuuamētis vomitꝰ. 3^{m} ē de impedimētis ⁊ nocumētis vomitꝰ. 4^{m} de ſuccurrēdo diſpōnibus accidētiū vomētis dū vomit vel ē ī ꝓpinqua diſpōne vomēdi. 5^{m} de ſuccurrēdo ei quo ſuperfluit vomitus. 2ª ibi: Hypo. p̄cepit. 3ª ibi: ſupfluus vomitus. 4ª ibi: de ꝓhibitiōe. 5ª ibi: fiat vt. In p̄nti. c. Aui. p̄cepit ſex. ¶ Primū ꝙ qñ ē cōpletus vomitꝰ dꝫ ablui facies cuꝫ aceto ⁊ aqua roſata: vt remoueat̄ grauitas capitis: ⁊ remouet illā grauitatē iſta ablutio tēꝑando calorē ⁊ reꝑcutiendo. ¶ Scd̄ꝫ ē ꝙ ſtatiꝫ bibat parū maſticis cū aqua macianorū habētiū ſtipticitatē infra tamē citoniorū ſtipticitatē: Et aqua eoꝝ ē ſuccus eorū deputatus: iſta enim ſui ſtipticitate ⁊ aromaticitate cōfortant ſtomacū relaxatū ī vomēdo. ¶ Tertiū ē ꝙ caueat a potu aque ⁊ a comeſtiōe: q2 ſtomacus d̄bilitatus nō bñ digereret ⁊ grauaret̄ ⁊ relaxaret̄ per aquā. Et hoc intelligat̄ tēpore propinquo actui vomēdi: ⁊ totū ē dictū ī p̄cedēti caplo. ¶ Quartuꝫ tñ ē vt qeſcat ⁊ pauſet a labore ⁊ vngantur ipocūdria cuꝫ oleo tepido ⁊ muſculi vētris qui laborauerūt in vomitu laſſitudine dimittant̄. ¶ Quītū ē ꝙ īgrediat̄ balneū ⁊ lauet ſe velociter ⁊ cito egrediat̄: ⁊ hoc totū vt humiditates ⁊ vapores moti ad cutim reſoluant̄ abſqꝫ aliorū attractōe. ¶ Sextū ē ꝙ hora qua videt̄ cibus neceſſarius: det̄ ei cibus boni ſaporis vt ipm̄ bñ amplectat̄ ſtomacus: ⁊ bone ſubſtantie ne genitum ex eo ſit paratū putredini: ⁊ facilis digōnis vt digeratur a ſtomaco debilitato ī vomitu ⁊c̄.

¶ Caplm̄ 3^{m} de iuuamentis que affert vomitus.

b

Ypocrates precepit vomituꝫ fieri in vno quoqꝫ mēſe duobus diebus cōtinuis vt ī ſecūdo emēdetur id q̄d in primo die fuit difficile: ⁊ vt expellatur id q̄d aduenit ſtomaco. Hyp. nāqꝫ ſecuritatē facit ꝙ cuꝫ eo ꝯſeruat̄ ſanitas: hoc autē plus eſt maluꝫ.

¶ Hoc caplm̄ vt dictū fuit ſupra ē de iuuamentis vomitus. Et diuidit̄ in quattuor partes. Primo docet qualis ē vſus vomitus cōferētis ī regimine ſanitatis. 2° narrat ſua iuuamēta. 3° addit cōditiōes obſeruādas ī vſu talis vomitus. 4° quibꝰ corporibꝰ cōfert. 2ª ibi prope: ⁊ vomitus. 3ª ibi ꝓpe finē capituli: ipſe quoqꝫ dꝫ fieri. 4ª ibi: ⁊ ille quidē. Dicit primo auctoritate Hypo. ꝙ vomitꝰ dꝫ fieri ī omni mēſe duobꝰ diebꝰ cōtinuis: ⁊ fit duobus diebus ꝓpter duas cās. Una ē vt in 2° die expellat̄ illud q̄d fuit difficilis expulſionis in primo. Et cā ſcd̄a ē vt expellantur humores qui ad ſtomacū a vicinis mēbris cucurrerunt in actu vomitus. De tali eiꝫ vomitu teſtat̄ Hypo. ꝙ afferat ſecuritatē: ⁊ cū eo ſeruat̄ ſanitas. Sed illud q̄d eſt plus q2 pluribus diebus ē malū ī cōſeruatione ſanitatis: lꝫ forte ī preſeruatiōe vel cura qñqꝫ ſit āpliꝰ vtendū qñqꝫ minꝰ. Et ex hoc prio ſoluit̄ vnum dubiū hic moueri ſolitū: vtruꝫ ī alicuius corporis cōſeruatiōe ſit vtendū vomitu duobus diebꝰ vno poſt aliū? Rñdet̄ ꝙ ſumēdo cōſeruationē large ꝓ p̄ſeruatiōe ⁊ cōſeruatiōe in multis corporibꝰ ē plus vtēdum vomitu: vt expreſſe vult Gal. in 6° de regimīe ſanitatis ī hoīe q hꝫ latū porū trāſeūtē a felle ad ſtomacū verſus ītestina: ⁊ ſilr̄ in multoꝝ morboꝝ cura: ſed in pura cōſeruatiōe nō oportet plus. ¶ Nota tñ ꝙ non oīa corpora cōſeruanda indigēt preciſe equali mēſura vomitus: quia quedā plus quedā minus vomere debent: aut vomitu indigent. Oīa tñ que vomere debēt aut vomitu indigēt melius ē ⁊ ſecuriꝰ vt in oī mēſe duobus diebus vomāt vt p̄cipit̄: ſed quedā plus: ⁊ quedā minꝰ: ⁊ quedā cū maiori conatu: ⁊ q̄dā cū minori. ¶ Solet etiā moueri ſcd̄m dubiū: vtrū in cōſeruatiōe tēꝑati ꝯueniat vomitꝰ? ⁊ videtur ꝙ ſic: q2 Aui. loquit̄ vniuerſalr̄. Quod nō arguit̄: q2 tēꝑatus tantū appetit quātū digerere pōt: ergo nō īdiget euacuatione ſuperfluitatū ꝑ vomitū. Hic rñdet̄ ꝙ tēperatus aut regitur regimīe ſibi ꝓportionato aut nō. Si primo mō tñ appetit quātū bñ digerere pōt: ⁊ iō nō multiplicat̄ ſuperfluitas vomēda: iō ſufficit ei exercitiū ⁊ balneū. Si ſecūdo mō tūc indiget vomitu. nā hoīes tēꝑati qñqꝫ nō ſequūt̄ regulā ſue nāe: ſꝫ ꝓpter voluptatē nimis comedentes: aut ꝓpter occupatiōeꝫ nō comedētes horis debitis: aut comedētes res nō bonas cōgregāt ſuperfluitatē expellēdā vomitu. Et cōfert eis vomitus mō dicto. Uidet̄ tñ ꝙ ſi optima nā que vere ē in medio tēperamēti tantū appetit q̄ꝫtū digerere pōt: ꝙ tꝑatus verſus frigiduꝫ in extremo tēperamēti appetit pluſq̄ꝫ pōt digerere: ⁊ tēperatus ī extremo tēperamēti verſus calidū minus appetit q̄ꝫ poſſit digerere. ¶ Tertiū dubiū ē vtrū d̄beat ꝯſeruādus vomere duobus diebus īmediatis? Et videt̄ ꝙ nō: q2 melius ē īterponere aliquē vel aliquos dies īter primū ⁊ ſecūdū vomituꝫ vt virtus reſtauret̄ per quietē: ⁊ melius poſſit ſecūdū vomitū perficere. Hic rñdet̄ ꝙ regula Aui. ē melior: ⁊ rō q2 ſi plus ſtarēt humores magis quietarent̄ in ſtomaco ⁊ difficilius educerent̄ ⁊ aliqua facerēt nocumēta: ⁊ in peiores diſpōnes mutarent̄. Et ad rōneꝫ dicit̄ ꝙ ī ſanis cōſeruādis hic vomitus nō ducit ad tantū laborē quin ī craſtinū poſſit ꝯueniēter vomere: in alijs aūt aliquādo oꝫ ſpectare ſubleuationem virtutis.

Et ideo tale vomitiuū debet eē debile ⁊ nō forte ne virtus notabilr̄ debilitetur: quare ⁊c̄.

Et vomitꝰ quidē qui ē huiuſmodi euacuat flegma ⁊ colerā ⁊ mūdificat ſtomacū. Ipſe nāqꝫ nō habet ꝙ ipſuꝫ mūdet ſicut inteſtina habēt colerā rubeā que ad ea deſcēdit ⁊ mundat ea.

¶ Hic oſtēdit iuuamēta vomitꝰ: ⁊ p̄° magis ī generali. 2° magis in ſpāli. 2ª ibi: ⁊ remouet. In p̄ª pte dicit ꝙ vomitus factꝰ mō dicto euacuat colerā ⁊ flegma ⁊ mūdificat ſtomacū ab illis humoribꝰ: q ſtomacꝰ īdiget mūdificatōe artificiali: q2 nō hꝫ a nā id q̄d ipſuꝫ mūdificaret: ſꝫ bene īteſtina hñt mundificatoriū nāle colerā rubeā que trāſmittit̄ ad ea ꝑ porū a chiſtifellis: vt dictū eſt p̄ª fen huius cañ.

Educit̄ et qñqꝫ vomitu melancolia vi nature ⁊ vtiliter cuꝫ porus ſplenis ad orificiū ſtomaci tranſiens effundit illic ſupfluā melancoliā. De mundificatione autē ſtomaci lege Gal. in quarto de iuuamētis mēbrorum. c. iiij. ⁊. x. ⁊ ibi multa alia ad propoſitū iuenies: quare ⁊c̄.

¶ Nota ergo p̄° ꝙ per anothomiā videt̄ poruſſelleus vadens ad ꝯcauuꝫ īteſtinoꝝ per quē trāſmittit̄ colera ad ea ⁊ ſtimulat ad egeſtionē: ⁊ cū hoc lauat īteſtina a flegmatibus q̄ in eis ꝯgregant̄: ad ſtomacū vero vadit paruus porus q nō hꝫ apertā viā ad trāſeundū ad ꝯcauitatē ſtomaci: īmo tantū defert aliquā partē ad calefaciendū fundum ſtomaci. ¶ Querit aūt Gal. 4° de vtilitate ꝑticulaꝝ. q̄re ad ſtomacū nobiliorē ⁊ indigētē nā nō miſit talē purgationeꝫ? Et rñdet ꝙ deijceret appetitū ſi ī ꝯcauitatē trāſiret. Uñ experiētia notat ꝙ multa colera currēte ad ſtomacuꝫ ſicut fit multotiēs ī ictericia aut in alijs caſibꝰ ſtatiꝫ deijcit̄ appetitꝰ. Et ī illis in quibꝰ poruſſelleus ad ſtomacū veniens ē latus: de quibꝰ Gal. loquit̄ 2° tegni ⁊ multotiens alibi. Ad hoc ergo nocumētuꝫ vitāduꝫ nā nō miſit talem reꝫ pūgitiuā ī ſtomaco: ⁊ īdiget adiutorio artificiali: ⁊ hoc precipue in hoīe. Nec ꝓpterea dicit̄ nā deficiēs ī neceſſarijs: q2 dedit homini intellectū per quē pōt ſibi artificialr̄ ꝓuidere de mūdificādo ſtomacū cū vomitu. ¶ Nota 2° ꝙ cā quare īdiget vomitu ī regimīe ſanitatis: eſt q2 errat̄ vtplurimū in regimīe vite: ⁊ error ille vtplurimū ē ad groſſiorē dietā: vt dicit̄ p̄ª particula affo. ⁊ p̄ª particula ꝓblematū. Augmētuꝫ aūt cibi eſt cā īdigeſtionis ⁊ ꝑ īdigeſtioneꝫ ī ſtomaco multiplicat̄ flegma. Addit̄ ēt ꝙ qñqꝫ errat̄ ī paucitate: ⁊ tūc vtplurimū ſtomacus trahit cū violētia a vicinis mēbris: ⁊ tūc multiplicat̄ ī eo flegma: ⁊ iō oīs fere ſtomacꝰ īdiget vomitu mūdificāte ipꝫ a flegmate vel a colera vel ab ambobꝰ. Sed tunc cadit dubitatio q2 videt̄ ꝙ meliꝰ ſit mūdificare ſtomacū ꝑ ſeceſſuꝫ q̄ꝫ ꝑ vomitū: ⁊ per ꝯſequēs ꝙ vomitꝰ nō ſit oportunꝰ. Et aſſumptū ꝓbat̄ q2 eūatio ꝑ ſeceſſuꝫ ē magis nālis ⁊ magis facilis: ⁊ habet̄ p̄ª affo. illo affo. Que ducere oꝫ. Et ꝙ ſit facilior dicit̄ 2ª afforiſmoꝝ illo affo. In oībꝰ morbis ea q̄ circa vmblicū. Forte diceret̄ ꝙ lꝫ abſolute facilior ſit eūatio per ſeceſſuꝫ q̄ꝫ per vomitū: tñ eūatio materieꝝ ī ſtomaco exñtiuꝫ eſt facilior ꝑ vomitū q̄ꝫ ꝑ ſeceſſuꝫ. ¶ Cōtra: ſi mā repit ad ſtomacū decētius ē ipſaꝫ ad īteſtina expellere q̄ꝫ ad meri: q2 virtꝰ nālis deputauit portā ſtomaci īferiorē expulſiōi ⁊ portā ſuperioreꝫ attractioni. Et ꝓpter hoc magis mouet̄ per ſeceſſum mā attracta ad ſtomacū a medicina q̄ꝫ ad vomitū. Et ideo etiā materieꝝ que ſunt in ſtomaco facilior ē eūatio per ſeceſſum ⁊ nālior. ⁊ argumētū totū ē Meſue de cōſolatione medicinaꝝ. c. prio poſt ꝓhemiū cū dixit: Sexta cā eſt qm̄ ſi ad ſtomacū repit mā decētius ē ipām ad inteſtina expellere q̄ꝫ ad meri. Uirtus enim nālis inferiorē ſtomaci portā expulſioni: attractiōi vero meri deſeruit. ¶ In oppoſituꝫ ē Aui. hic ⁊ auctoritas Hypo. qui volūt ꝙ vomitus iſte ē neceſſarius ⁊ vtilis ī cōſeruatiōe ſanitatis. De ſeceſſu aūt artificiali hoc nō dicūt: ideo 3ª primi. c. de exercitio. ꝓhibet vſum farmacoꝝ: quia farmacia purgat ⁊ inueterat. Et Gal. 3° de regimine ſanitatis vult ꝙ ſanatiue artis nō eſt

UVA. BHSC. IyR_006_1

cognoſcere virtutẽ farmacoꝝ. Ad dubiũ reſpõdet Dy. ꝙ vniuerſalr̃ in regimĩe ſanitatis meliꝰ eſt vti vomitu ꝙ̃ꝫ farmaco ſolutiuo: niſi diſpõ corpis ſit multũ extranea: verbi grã ꝙ ſtomacꝰ eẽt valde debilis: aut hõ paratꝰ ad ptiſim: aut valde difficulter vomẽs ꝓpter alias diſpõnes ꝓhibẽtes a vomitu. Et hec ꝓpter tres cãs. Pria qꝛ farmaca ſolutiua oĩa ſunt alteratiua corpis: ⁊ in ꝯſeruatiõe ſanitatis nõ idigemꝰ alteratõe. 2ª qꝛ farmaca ſolutiua operanť inferẽdo violentiã nãe: ⁊ ideo debilitãt mẽbra: ⁊ cũ hoc faciũt pigritiã in mẽbris expulſiõis ꝙ nõ expellãt abſqꝫ ſtimulo: ⁊ hoc eſt magnũ nocumẽtũ in eũone nãli ⁊ neceſſaria ſicut eſt ſeceſſus. Fieri aũt taleꝫ pigriciã a vomitu nõ eſt iconueniens. Sꝫ tertia cã eſt qꝛ ſtomacꝰ nõ hꝫ qꝺ ipꝫ mũdet ſicut iteſtina. Et iõ rñdet ꝙ lꝫ eũatio in ſe per actũ eũonis ꝑ ſeceſſuꝫ ſit nãlioꝛ ⁊ facilioꝛ: tñ merito illoꝝ cũ quibꝰ fit: eſt difficilioꝛ: qꝛ fit cũ farmacis facientibꝰ nocumenta dicta: ſed vomitꝰ fit ſolũ cũ cibalibꝰ rebꝰ ſũptis ⁊ cũ ſtimulatiõe cũ pẽna vel digito vel re alia in oꝛe poſita. Mihi videť ꝙ hec rñſio non ſit gnãlis. nã eũatio per fluxũ vẽtris non fit ſolũ cuꝫ farmaco ſolutiuo: ſꝫ cũ lenitiuis ⁊ abſterſiuis ⁊ lãbificatiuis ⁊ lubꝛicatiuis: ⁊ cũ rebꝰ eque bñ cibalibꝰ ſicut ille cũ quibꝰ ꝑparanť ad vomitũ: de quo hic eſt ſermo. Et iõ videť mihi ꝙ tertia cã Dy. nõ eſt ad ꝓpoſitũ: qꝛ q̃ſtio ẽ de eũone eiꝰ qꝺ in ſtomaco ꝯtineť: qꝛ ſtomacus nõ hꝫ reꝫ ipm mũdãteꝫ ſicut iteſtina: vtruꝫ ſit meliꝰ per vomitũ ꝙ̃ꝫ per ſeceſſuꝫ eũare? Et iõ videť mihi ꝙ Dy. ⁊ ſi non ex toto reꝫ declarauit: tñ fuit vicinis veritati. Diciť eiꝫ ꝙ illꝺ qꝺ ẽ in ſtomaco a nã plurimũ expelliť ꝑ iferioꝛa: qꝛ illa via eſt nãlioꝛ ⁊ ille motꝰ facilioꝛ: ⁊ vtplurimũ meliꝰ eſt cõtẽtus in ſtomaco ꝙ dꝫ expelli ⁊ trãſmitti per iferioꝛa: qꝛ plurimũ ẽ kilus aut ſupfluitas pꝛime digõnis que kilo eſt admixta: vt ergo res bona ⁊ vtilis ſugať a venis meſeraicis que terminanť ad iteſtina: bonũ fuit ꝙ nã hoc modo iclineť facere. Sꝫ qñ nõ itendimꝰ ꝙ tale qꝺ trãſeat in nutrimẽtũ: melius eſt niſi fuerit cã ipediens ꝓuocare vomitũ: vñ Auic. ꝑª quarti. in febꝛibꝰ in quibus minime ꝯpetit vomitꝰ pꝛecipit qñ mã inclinat ad ſtomacũ. Et rõ huiꝰ eſt illa quã dicit Dy. qꝛ id qꝺ in ſtomaco ꝯtineť pꝛecipue in ꝯcauo cũ re modicũ participãte nã extranea: aut cibi aut cũ ſolis cibalibꝰ ꝑ icitationẽ põt expelli. Si ẽt res aliq̃ medicialis deť: tñ paucũ moꝛať ꝑ icitationẽ ad vomitũ ſimul cuꝫ humoꝛe ꝯtento i ſtomaco expelliť: vñ viſcoſos humoꝛes nõ facile puro lenitiuo poſſumus eũare: ⁊ illud oꝫ multo tꝑe moꝛari ⁊ per iteſtina tranſire ⁊ ea ledere: ⁊ cuꝫ hoc aliqꝺ trãſit de eo ad epar ꝑ venas meſeraicas qꝺ nõ oꝫ in ꝓuocatõe vomitus: ⁊ ideo meliꝰ eſt iſtas tales ſupfluitates in regimine ſanitatis per vomitũ expelli. Secus aũt eſt i ſupfluitatibꝰ que ꝯtinenť: aut in venis: aut in ambitu totiꝰ: aut in iteſtinis. ⁊ hec ſolutio plus ſatiffacit videre meo.

Et remouet grauitateꝫ que accidit capiti ⁊ clarificat viſuꝫ ⁊ aufert faſtidiuꝫ: ⁊ cõfert ei ad cuius ſtomacuꝫ deſcẽdit colera que ipſius coꝛrũpit cibuꝫ: quoniaꝫ cuꝫ pꝛeceſſerit vomitus: eius cibꝰ ſemper mundus veniet: ⁊ remouet abhominationẽ que fit ꝓpter vnctuoſitateꝫ ⁊ caſuꝫ deſiderij ipſius meri: ⁊ qꝺ facit deſiderare acutum ⁊ acetoſuꝫ ⁊ ponticũ: ⁊ cõfert laſſitati coꝛpoꝛis ⁊ vlceribus que ſũt in renibꝰ ⁊ veſica: ⁊ eſt lepꝛe foꝛte medicamẽtum ⁊ malicie coloꝛis ⁊ epilepſie ſtomatice ⁊ ictericie ⁊ aſmati ⁊ tremoꝛi ⁊ paraliſi: ⁊ eſt ex curatõibus que ꝯferunt habẽtibꝰ vlcera nigra magna.

¶ Hic narrat ſpecialia iuuamenta vomitus: ⁊ ſunt. xvj. Primũ ẽ qꝛ remouet grauitatẽ capitis. ſ. qñ ẽ per cõitatẽ ſtomaci ⁊ mẽbꝛoꝝ inferioꝛũ: ſed ſi eẽt per ꝓpꝛietatẽ i capite nõ cõfert. 2m ẽ ꝙ clarificat viſum ⁊ intelligas qñ ẽ turbatus per cõitatẽ ſtomaci. Sed ſi ſit per ꝓpꝛietatẽ i oculo nocumẽtũ potius nocet multũ vt pꝫ in ꝑcedẽti caplꝺ. Sꝫ cã tertij quarti quinti ⁊ ſexti ſimul diceť in ſequentibus. 7m in remouẽdo faſtidiũ ⁊ cõferendo illi ad cuius ſtomacũ deſcẽdit colera que coꝛrũpit ſuũ cibũ: ⁊ remouet abhominationẽ que fit ꝓpter vnctuoſitatẽ. Et remouet caſum veri ⁊ nãlis deſiderij. Et remouet illud qꝺ fecit deſiderare acetoſum ⁊ acutũ ⁊ ponticũ: ⁊ ſupple alia magis extranea: ſicut gipſum ⁊ carbones. Oĩa enim hec remouẽtur ꝑ eũationẽ humoꝛis in ſtomaco cõtenti ⁊ per ſtomaci mũdificationẽ: qꝛ talis humoꝛ erat cã illoꝝ. 8m aũt ẽ ꝙ confert laſſitati coꝛpoꝛis: qꝛ illa ꝓuenit ex multitudine flegmatis in toto que remoueť eũato flegmate a ſtomaco: qꝛ poſtea reſiduũ facile reſoluiť. 9m ẽ ꝙ confert vlceribus renũ ⁊ veſice: qꝛ eũat mãm fouẽtem vlcera: ⁊ diuertiť vt diciť 16ª tertij de hoc. 10m ẽ ꝙ eſt optimũ medicamẽ lepꝛe ⁊ intelligiť ꝙ remoueť mã que ẽ cã eius per hũc leuẽ vomitũ. Sed vomitus cũ heleboꝛo magis ẽt cõfert tempoꝛe ſuo in lepꝛa. Eradicat eniꝫ mãs quaꝝ difficilis ẽ eũatio a quibus lepꝛa pendet. 11m ẽ ꝙ cõfert habẽtibus malitiam coloꝛis eũando flegma qꝺ pꝛohibet bonã digõneꝫ que bonum coloꝛẽ facit. 12m ẽ ꝙ cõfert epilepſie ſtomatice: ⁊ nõ ꝓpter pꝛopꝛietatẽ capitis. 13m ẽ ꝙ cõfert ictericie oppilatiue. Nõ eniꝫ ẽ putandũ i ea ſolũ eẽ flegma qꝺ ẽ i poꝛofelleo: ſed ẽt eſſe flegma multũ in partibus circũſtantibꝰ quo eũato cũ vomitu facili reſiduũ pelliť. Aut foꝛte vult ꝙ cõfert eũando colerã currẽteꝫ ad ſtomacũ pꝛeternãliter pꝛopter regurgitationẽ a felle: qꝛ paruꝫ aut nihil vadit ad inteſtina. Et foꝛte iſta expoſitio ẽ melioꝛ: qꝛ vult ꝙ illud qꝺ vadit ad inteſtina nõ põt vomitu aut cũ difficultate educi vt ſupꝛa patuit. Aut tertio põt dici ꝙ cõfert ictericie in via pꝛeuiſionis aut ꝑſeruatiõis ab ea: qꝛ eũat flegma qꝺ ẽ in ſtomaco qꝺ futurũ ẽ cã oppilatõis. Dicit decimoquarto ꝙ ꝯfert aſmati. Sed cõtra: in aſmate mã duciť verſus mẽbꝛũ patiẽs per vomitũ: ergo nõ cõfert: imo nocet. Hic rñdet Dy. ⁊ cõcoꝛdat cũ Halyabate ꝙ quibuſdã mẽbꝛis confertꝰ vomitus magis vt ſunt inferioꝛa ⁊ multũ diſtãtia a ſtomaco qꝛ eũat ⁊ diuertit: ⁊ quibuſdã minus ſicut capiti collo ⁊ pulmoni. Et iõ dicit Dy. ꝙ vomitus nõ confert aſmati dũ mã ẽ in fluxu: ſed poſtquã iã fluxit. Et hoc ꝓpter tres cãs: quarũ vna ẽ eũando flegma qꝺ eſt in ſtomaco eũat illud qꝺ fouet mãm aſmatis: lꝫ nõ ſit cã cõiuncta. Scꝺo qꝛ vomitus cuꝫ foꝛti vomitiuo eũat mãs difficilis eũationis: que ſunt in pectoꝛe. Tertio qꝛ in vomitu foꝛtiter cõmoueneť mẽbꝛa hanelitus: ⁊ iõ calefiunt ⁊ iuuant ad ſubtiliandũ humoꝛẽ peccantẽ. Ego tñ video Raſim ꝑcipere vomitũ 9° almãſoꝛis i pꝛima ſeptimana. ⁊ Aui. ꝑcipe 10ª tertij vomitũ cõtinuũ: ⁊ ꝓpꝛie poſt cibuꝫ. Et videť ꝙ hoc ſit qꝛ per ipm fit maius iuuamẽtũ eũando mãm: que ẽ ſub foꝛma cãe antecedẽtis ꝙ̃ꝫ nocumẽtum ex motu verſus pulmonẽ: ⁊ qꝛ in tranſitu inciſiuoꝛũ ⁊ acutoꝝ ꝑ meri ſubtiles eoꝝ partes facilius cõicanť pulmoni: bñ ẽt materia que ẽ in eo ſit facilioꝛ ad exitũ. Qñqꝫ enim pꝛecipiť vomitus cũ heleboꝛo pꝛecipue nigro: ⁊ tunc eũantur materie difficilis eũationis ſicut flegma iã fixũ in pulmone. Dicit vlterius ꝙ cõfert tremoꝛi ⁊ paraliſi: qꝛ eũat materias eoꝝ que ſunt difficilis eũationis: ⁊ hoc ẽ maxime de vomitu q fit cũ foꝛti vomitiuo. Etiã vomitus poſt cibũ eũando materias cãe antecedẽtis ẽ vtilis. Et qꝛ Aui. videť hic loqui de vomitu qui ẽ cõſeruatiuus ſanitatis: ego puto ꝙ nõ itelligat in iſto caplꝺ niſi de iuuamẽto qꝺ fit eũando mãꝫ q̃ eſt in ſtomaco: ⁊ illud iuuamẽtũ ẽ eũando cãm antecedẽtẽ in oĩbus alijs moꝛbis exceptis moꝛbis ſtomaci. Ultimo dicit ꝙ cõfert hñtibus vlcera nigra mala. qꝺ ſi intelligať ꝺ foꝛti eũante melancolicũ humoꝛẽ res ẽ clara: ⁊ iſte eũant a longinquo. Si vero loquatur de vomitu facto ad conſeruationẽ: erit qꝛ iſta mundificatio ẽ cauſa melioꝛis digõis in epate: ⁊ ꝙ in ipſo minus de humoꝛe melancolico puto putreſieri ⁊ ad cutem moueri.

Sicut ẽ i cacechia in qua i pꝛimis ꝑmutatur coloꝛ coꝛpoꝛis ⁊ faciei ad albedinẽ ⁊ citrinitatẽ ⁊ eſt diſpoſitio antecedens idropiſiꝫ: vt vꝫ Aui. xiiij. tertij tractatu q̃rto. c. iij. cui competit vomitꝰ: qꝛ per vomituꝫ purgãtur humoꝛes: qui ſi ad cutem ſpargerẽť fedarẽt coloꝛeꝫ. iuuat ergo vomitus diuertẽdo huiuſmodi hũoꝛes peccantes a ſupficie coꝛpoꝛis ⁊ eos educendo: quare ⁊c.

Scias ꝙ Raſis quarto almãſoꝛis. c. de vomitu ſic dixit de iuuamentis eius: Uomitꝰ ſi vt oꝫ tẽpe rate fiat: ſtõacũ purgat ⁊ digeſtiuã melioꝛeꝫ efficit ⁊ coꝛpꝰ renouat ⁊ mũdat: capitqꝫ ⁊ ſenſum alleuiat ⁊ viſũ acuit ⁊c.

Ipe quoqꝫ fieri dꝫ i mẽſe ſemel aut bis pꝰ repletõeꝫ ita ꝙ ñ obſerueť reuolutio ſcita neqꝫ numerꝰ dieꝝ notꝰ.

¶ Hic vt pꝛedicitur addit quaſdaꝫ conditiones obſeruandas in vſu vomitus. Et dicit ꝙ iſte vomitꝰ debet fieri in menſe ſemel aut bis modo dicto vno poſt aliuꝫ ⁊ poſt repletioneꝫ ex cibo. ⁊ hoc pꝛopter cauſas dictas. Sed addit hic ꝙ in eo nõ dꝫ obſeruari reuolutio ſcita ⁊ numerꝰ dieꝝ: qꝛ nõ dꝫ ſemꝑ in capite triũ dierũ fieri: qꝛ qñ ita obſeruareť fieret neceſſitas cõtinuãdi. Et hoc mõ ꝓpter aſſuefactionẽ ⁊ dimiſſiõeꝫ oꝛdinis eſſet nocumentũ. vt ergo non faciamꝰ hãc cõſuetudinẽ: bonũ ẽ nõ obſeruare numerũ dieꝝ iter vnũ vomitiuũ ⁊ aliud.

Et ille quidẽ cui maius iuuamẽtuꝫ affert vomitꝰ: eſt cuius cõplexio pꝛima eſt colerica ⁊ eſt macer.

¶ Hic docet quibus coꝛpoꝛibus magis ꝯfert vomitus: ⁊ dicit ꝙ cõfert colericis ⁊ multotiẽs: ⁊ hoc dictum ẽ ſupꝛa ſatis: ⁊ eſt talis ſententia quarta affoꝛiſ. illo affo. Graciles ⁊ facile ⁊c.

Scito tñ ꝙ vomitus nõ ẽ macris vtilis gnãliter ex parte maciei: quia macris melãcolicis nõ multuꝫ ꝯuenit: ſꝫ inquãtuꝫ repletiõi colerice ꝯiungiť aut ei atteſtatur: quare ⁊c.

¶ Caplm 14m de malitijs q̃ ꝓueniũt ex ſupfluo vomitu.

Superfluus vomitꝰ ſtomaco nocet ⁊ ipſuꝫ debilitat ⁊ reſoluit ipm ⁊ facit eũ aptũ ita vt materie ad eũ perueniãt ⁊ obeſt pectoꝛi ⁊ viſui ⁊ dẽtibꝰ ⁊ antiquis capitis doloꝛibꝰ niſi eis qui ſunt ꝑꝑ ſacietatẽ ſtomaci ⁊ facit nocumẽtũ epilepſie capitis q̃ nõ ẽ cã iferioꝝ mẽbꝛoꝝ. Supfluitas quoqꝫ q̃ eſt in ipſo nocet epati ⁊ pulmoni ⁊ oculo ⁊ aliquã venarũ qñqꝫ ſcindit.

¶ Hic narrat impedimẽta vomitus ſupflui. Et diuidiť in duas partes. Nã pꝛio facit hoc. Scꝺo oñdit vnã ſpecialẽ coꝛpoꝛis diſpõnem i vomẽdo: ⁊ ponit illius regimẽ i gnãli. 2ª ibi: ex oĩbus. Primo ponit nocumẽta ⁊ ſunt decem: quoꝛũ pꝛimũ ẽ ꝙ nocet ſtomaco ipm debilitando in opatiõe ſua digõnis ⁊ appetitꝰ ⁊ reſoluẽdo ſubſtantiã ſuã ꝓpter magnã agitationẽ: ⁊ ꝓpter hoc reddit ipm aptum vt materie extranee declinẽt ad ipm: qm̃ mẽbꝛa foꝛtia trãſmittũt ad debilia: ⁊ hoc pꝛimũ ẽ verũ nõ in oĩ ſtomaco ſed in debili cui nocet. Nã Auic. ꝑcipit ꝙ illũ qui debilem hꝫ ſtomacũ in nulla egritudine vomere facias. Scꝺꝫ ẽ ꝙ nocet pectoꝛi. Tertiũ ꝙ nocet viſui. Quartũ ꝙ nocet dentibus.

UVA. BHSC. IyR_006_1

bus. Quintũ ē q̄ nocet ātiquis doloꝛib⁹ capitis niſi fuerit cā ſtomaci. Et hoc ē verū de moderato: q: mouet materi/as verſus caput. Tamen ſupfluus nocet in oīb⁹: q: mouet mām tā verſus iſta mēbra q̄z ſupraſcripta: ⁊ maxime ī his qui habēt hec mēbra debilia: vt pz de pectoꝛe in affo. q̄rte pticule: Ptiſicos vero ⁊c̄. Dixit aūt ātiqs: q: vtplurimū in illis cōfirmatū ē nocumētū: ſed tñ ēt ī recētib⁹ qui non ſunt cā inferioꝛū mēbꝛoꝝ nocet. Sextū nocumētū ē ī epilepſia que ē per ꝓpꝛietatē in capite: ⁊ hoc pp cām eandē. Sed ī illa que ē per cōitatē ſtomaci dictū ē q̄ cōfert. Iſta ſola vocat̄ hic epilepſia capitis nō obſtāte q̄ oīs epilepſia ſit in capite: ⁊ in iſta ēt vomitus ſupꝛaſcriptus nocet. Se/ptimo nocet epati: ⁊ octauo pulmoni: nono oculis: ⁊ iſta tria ſunt vera de ſupfluo ſolū: q: ꝓpter ſolā agitationem debilitant etiā epar ⁊ pulmonē: verūtamen videt̄ q̄ ocu/lis noceat tēperatus. Decimū ē nocumentuz q̄ aliqñ ē cā fracture vene: aut in pulmone: aut ī epate ex foꝛti agitatōe ⁊ tēſione que fiūt in ipis: ⁊ hoc ē veꝝ de ſuperfluo vtplu/rimū: licet in multis ꝑparatis qñq̄z moderatus hoc facit: ⁊ hic iō ē cauēdus ⁊ pꝛeparandus in pꝛeꝑatis.

Idē Raſis libro ⁊ caplo ātea allegatis ſic cōmemoꝛauit nocumēta vomit⁹ dicens: q̄ ſi mult⁹ fuerit vomitus: coꝛpus deſiccabit: atq̄z epati ⁊ coꝛpi necnō oculis ⁊ pulmoni nocebit: venas quoq̄z ſcindit qñq̄z ⁊ rumpit et paſſio accidit emoptoica ⁊c̄.

Ex hoīb⁹ ꝑterea ē qui vult cito ipleri: deīde nō tollerat īmo ꝑpat ad vomēdū. Et actio hui⁹ ex eis ē q̄ ꝑducūt eū ad malas egritudies māſiuas: ipſe ergo a repletōe ꝓhibēdus ē: ⁊ tu ipſius cibum ⁊ potū menſura.

Hic facit hoc qđ dictū ē: dicēs q̄ ſunt quidā hoīes q̄ volūt cito impleri. i. qui comedūt multū in vice vna: quia multū appetūt ꝓpter voluptatē: ſed poſt ſtomacus nō tollerat: ⁊ oz q̄ vomāt: ⁊ illud eſt ex rebus que ipos ducunt ad māſiuas egritudines: q: debilitādo ſtomacū ē cā coꝛruptionis digōis que ē mater fere oīuz egritudinū: vt dicit̄ 13ª tertij: ⁊ iō pꝛohibēdus eſt hic talis a repletiōe: ⁊ tu de/bes menſurare cibum ſuum ⁊ potum ⁊c̄.

Caplz iſm đ mō ſuccurrēdi diſpōib⁹ q̄ accidūt vomēti.

De pꝛohibitōe aūt vomēdi diximus iā qđ opoꝛtebat. Tēſioni vero ⁊ doloꝛi qui ſub ipocūdrijs fiunt conferunt pāni aqua ca/lida infuſi ⁊ ſuperpoſiti ⁊ oleis lenificāti/bus ⁊ ventoſe cuz igne.

In iſto caplo vt ſupꝛa dixi docet Aui. ſuccurrere qui/buſdā diſpōibus que veniūt ī actu vomēdi: aut cū homo ē in ꝓpinqua diſpōe ad vomitū. Et diuidit̄ in duas. Pꝛimo excuſat ſe: q: hic nō dicit in quib⁹ dz ꝓhiberi vomi/tus. 2° exequit̄ ꝓpoſitū ibi: tenſioni vero. Hic exequit̄ ꝓpoſitū: ⁊ diuidit̄ in tot partes quot ſunt accidētia. Pꝛimo ergo docet ſuccurrere doloꝛi ⁊ tenſioni que fiunt ſub ipocūdrijs: ⁊ dicit q̄ cōfert ſupponere pānos infuſos ī aq̄ calida actu calidos: q: cū doloꝛ ille ſit vētoſus ⁊ tēſio per mollificatiua mitiget̄: ideo panni in aqua calida reſoluen/do ſui caliditate vētoſitatē: ⁊ mollificādo locū mitigāt doloꝛē ⁊ tēſionē. Similiter cōferūt olea lenificantia ſicut ba/netinūs ⁊ camomillin⁹. Et ſilr pp eādē cām ⁊ vētoſe cum igne poſite abſq̄z ſcarificatiōe multū diſſoluūt vētoſitatē.

Foꝛtez autez moꝛdicationē in ſtomaco remanentem remouet bibere iura vnctuoſa que cito digerāt̄ ⁊ īunge/re locuz ex aliquo qđ ſit ſicut oleuz violaceū mixtuz cum oleo cheiri ⁊ pauca cera.

Hic docet ſuccurrere doloꝛi moꝛdicatiuo qui fit ī ſto/maco: ⁊ iſte aut fit pp acuitatē farmaci: aut pp acuitatem hūoꝛis attracti ad ſtomacū. Et dicit remanentē: ⁊ videt̄ ī/telligere đ moꝛdicatiōe que remanet fixa aut remanet poſt actū vomēdi: ⁊ hoc puto verius. Cōueniūt enim iura pin/guia facile digeſtibilia: q: ſtomacus ē debilis: ⁊ cōfert in/unctio cū oleo violato ad repꝛimēdā acuitatē: ⁊ cū oleo de ben in quo ē virtus mollificatiua caloꝛis ⁊ doloꝛis ſedati/ua: lz habeat aliquid caliditatis: ſed ſui aromaticitate vz̄ ꝯfoꝛtare ſtomacuz debilitatū. Eſt aūt ben viola ſarracena cui⁹ alia ē citrina: ⁊ naſcit̄ ī ātiquis muris ī tuſcia: ⁊ alia ē rubea: ⁊ alia ē alba ⁊ ſunt placidiſſimi odoꝛis: ⁊ habēt̄ bo/nonie ⁊ tuſcie in hoꝛtis pꝛeſertim puellarum.

Sigultū vero ſi cū eo acciderit ⁊ ꝑmāſerit: retinebit ſternutatio ⁊ dare ei ex aq̄ calida ad traijciēdū paulatiz

Docet ſuccurere ſingultui. Et nota q̄ aliquis ē ſingultus ꝑcedēs eūationē: aliquis accidēs duz fit eūatio: aliqs accidēs cōpleta eūatione. Ille qui ē ante eūationez aut in actu eius: ē vtplurimū aut ꝓpter moꝛdicationē medicīe: aut humoꝛis ad ſtomacum tracti: aut ꝓpter ventoſitatem groſſaz imbibitā in ſtomaco: aut ꝓpter coꝛrugationez fa/ctam a medicina vel humoꝛe. Et iſti mouent̄ cū ſternuta/tione vt dicit̄ 6ª particula affo. A ſingultu habito ſternu/tatio ſuperueniēs ſoluit egritudinē: ⁊ remouet̄ ēt cū pau/latino ⁊ frequēti potu aque calide: quoniā ſternutatio ex/cutit tunicas ſtōaci foꝛtiter ita vt ab eis ſeꝑari faciat illud qđ adherēdo faciebat ſingultū. Et aq̄ calida iuuat abſter/gēdo ⁊ acuitatez remouendo: que iō paulatim dat̄ vt plu/ries ſuper locū trāſeat. Qñq̄z aūt ſingultus ē poſt eūatōz ⁊ iſte lz poſſet eē ex eiſdem cāis remanētibus ⁊ curari hoc mō tamē plurimū ē ꝓpter ſiccitatez: vt dicit̄ in affoꝛiſmo quinte particule. Spaſmus ⁊ ſingultus poſt nimiā inani/tionē ē malū. ⁊ de iſto nō loquit̄ Aui. hic. q̄ ſi remedia hic poſita tibi non ſufficiunt vade ad decimātertiā tertij: vbi etiam videbis quid eſt ſingultus.

Hoc ēt remediūz cōmemoꝛauit Auic. xiij. tertij tractatu quito. c. xxj. de cura ſingultus circa pꝛīcipiūz capli paraphoil lo: Et ſternutationi q̄dez in ſuperādo materiā ⁊c̄. Quid autē ſit ſingult⁹: vide ab eo eodez tractatu. c. xix. Gal. tñ quita particula affo. ꝯmēto illi⁹ affo. In imoderata purgatiōe ſpaſmus aut ſingultus maluz. dixit ſingultuz eſſe ſpaſmū ſtomaci in initio pleni aut deſiccati aut moꝛdicatione aliqua incitati ⁊c̄. Sz dubito. nam idē Gal. ſexto de accidenti ⁊ moꝛbo ꝓbat ſingultū nō eē ſpaſmū: ex eo q̄ ſpaſm⁹ ē paſſio mēbꝛi lacertoſi: ſz ſtomacus nō eſt mēbꝛū lacertoſum: ergo ⁊c̄. hoc relinquo ꝓuectioꝛibus: quare ⁊c̄.

Et de ſanguine quidez iam diximus in caplo de im/pedimentis vomitus.

Pꝛo vomitu ſanguinis qui fuerit ex potu farmaci re/mittit nos ad decimātertiā tertij ſtatim allegatā. Sz ſci/tote q̄ vomitus ſanguīs qñq̄z ē pp vltimā eūatiōez ī qua farmaca ſupfluētia vltimo trahūt ſanguinē ⁊ huic ſuccur/rit vt dicit̄ ſequēti caplo: qñq̄z aūt ē pp ipetuoſum motū ⁊ fracturā alicuius vene: ⁊ de hoc loquitur hic.

Alcuzeç vero ⁊ egritudib⁹ fridis ⁊ īterſectōi vocis q̄ accidit poſt ipz ꝯfert ligare extrema ⁊ ſtrīgere ea ⁊ ſup/ponere ſtōaco pānū īfuſuz oleo in quo cocta fuerit ruta ⁊ ſicidis: ⁊ dare ei ad bibēdum mel cū aqua calida.

Quid in hac parte dicat pz. Ubi nota alcuzeç qñq̄z ſu/mitur ꝓpꝛie vt ē tetan⁹ a ventoſa mā: ⁊ illud nos vocam⁹ ranſum: ⁊ ē ex vētoſitate ita tendēte lacertum vt non poſ/ſit flecti. Et qñq̄z ſumit̄ vt ꝯuertit̄ cū ſpaſmo de tali mate/ria vel tetano: ⁊ qñq̄z cōtrahūtur muſculi pp ventoſitatē. Sed videtur hic Aui. ſumere abſolute ꝓ ſpaſmo vel teta/no. Nota 2° q̄ iſti ſpaſmi aut fiūt in actu eūationis aut ante aut poſt. Cū aūt fiunt poſt multā eūationē plurimuz ſunt de inanitiōe ⁊ ſunt multū mali: vt dicit̄ in cōmento il/lius affo. Spaſmus ex heleboꝛo. Et nota vlteri⁹ q̄ ſpaſ/mus ⁊ ſingultus poſt talē eūationē nimiā ſunt mali: ⁊ de iſtis nō loquit̄ hic Auic. Aut enim non ſunt curabiles aut vix: ⁊ pꝛo eoꝛū cura vide ſcđa tertij. Sed in ipo actu eua/euationis ſunt ſpaſmi qñq̄z. Et ſm Meſue cōtingit a quat/tuoꝛ cāis. Una ē mot⁹ multe materie ſimul que nō eūatur ſed ſpargit̄ ad lacertos ⁊ neruos: ⁊ facit eos ſm latuz cre/ſcere ⁊ bꝛeuiari ſm longuz: vnde accidit mēbꝛis incurua/tio ſicut arcui: cuius coꝛda bꝛeuiat̄. Secūda cā ē alleuia/tio multi vapoꝛis turbidi cū ventoſitate groſſa ad neruos: ⁊ fit ſicut dictū ē ſtatim. Tertia cā ē q: tēpoꝛe quo ſumit̄ medicina poꝛi aperiūtur: ⁊ multe ꝑtes medicine cōuertūt̄ in vapoꝛes ſubtiles. Cum ergo ille qui medicinaz ſumpſit ſe exponit frigoꝛi iſti vapoꝛes ingroſſant̄: ⁊ nerui pꝛopter frigus penetratū apertis poꝛis incuruātur ⁊ fit ſpaſmus ꝓpter cōtractionē ad eoꝛum pꝛincipia. Quarta cā eſt ma/la qualitas cōicata neruis ⁊ lacertis: vnde refugientes ab ea cōtrahūtur. Et videt̄ mihi vt dixi ſuper affoꝛiſ. pꝛimo quinte particule q̄ nō ſolū ex multitudine humoꝝ aut vē/toſitate: ſed ex acuitate pōt fieri ſpaſmus: qui dicit̄ nō ꝓ/poꝛtionat⁹ ad materiā. Sz nota q̄ cū fit ſpaſm⁹ ex iſtis cāis hoc mō cōicatis muſculis totius nō curatur vt dicit Auic. hic. ſ. per ligaturā extremitatū ⁊ poſitionē pāni ſuꝑ ſtomacū in quo coctū fuerit de rutha ⁊ ſicidis. i. cucume/re aſinino: aut per potū mellis cū aqua calida: īmo vt pz ꝑ Meſue qñ eſt ex pꝛima cā curat̄ cum eūantib⁹ cito mām: aut cliſterijs: aut farmacijs ebibitis: ⁊ poſt eūonez cū recti/ficatōe ꝯtractōis neruoꝝ ⁊ ꝯfoꝛtatiōe cerebꝛi ⁊ nuce. vnde nec vult febꝛē in tali ſpaſmo ꝯferre: q: inflāmat farmacuz ⁊ mouet māz verſus lacertos. quāto ergo magis nō con/fert ligatura extremoꝛū per quā de directo trahit̄ mā ad lacertos ⁊ poſitio olei ſupꝛaſcripti cū calefaciat farmacū. Sz qñ eſt a ſcđa cā opz facere qđ dictū eſt de pꝛima. ſ. fa/cere eūonē ⁊ poſtea ꝯuertere vapoꝛes ad diuerſuz foꝛtiter cuz fricatōib⁹: cuz hic foꝛte nō nocet ligatura. Cū autē eſt ꝓpter frigus ꝯfert vapoꝛatio ⁊ calefactio. Et cū eſt ꝓpter malā qualitatē farmaci: cura ē cū remouētib⁹ farmaci au/daciam. ſ. potu aque calide. ſ. tepide ⁊ ſimiliū ⁊ cū ꝯfoꝛtā/tib⁹ neruos. Et iō pz q̄ expoſitoꝛes volētes q̄ hic Auic. ponat curā illoꝝ modoꝝ ſpaſmi de quib⁹ dicit Meſue nō ſufficiēter dixerūt. Pꝛo ꝯcoꝛdia Aui. cū Meſue ⁊ pꝛo expoſitūe Auic. nota q̄ iſte quattuoꝛ cāe ſcripte a Meſue qñq̄z īueniunt̄ in neruis ſtomaci: ſz per ꝯpaſſionē reliq̄ coꝛ/poꝛis nerui ꝯhunt̄ ⁊ ſpaſmant̄. Et ꝓ mēte Aui. tene q̄ in operatōe farmaci plurimū ꝯtingit ſpaſm⁹ per ꝯpaſſionez ad ſtomacū: ⁊ ideo diuertēdo mām ⁊ ventoſitatē per liga/turaz doloꝛoſaz extremitatū ⁊ reſoluendo cuz oleo dicte decoctōis ⁊ abſtergēdo illud qđ adheret villis ſtomaci cū potu mellis ī aqua fit cura taliuz ſpaſmoꝝ. Sz Meſue po/nit curā qñ iaz ī alijs mēbꝛis ⁊ lacertis eēt nocumētuz per eūonez. Et tu hanc expoſitionē ⁊ diuerſitatē nota. naz ēt vocis abſciſio fit ex ſimili cā laboꝛātibus lacertis pectoꝛis ⁊ epigloti per viaz cōpaſſionis.

Et hēnti quidē alſubeth fiat hoc ⁊ ī aurē ei⁹ mittat̄.

Hic docet ſuccurrere ſubeth. i. ſomno ꝓfundo. Nā hoc accidit ꝓpter multos vapoꝛes fridos eleuatos ad ca/put. Et iō ligare extrema eſt valde bonū remediū diuertē/do ad ꝯꝛiuz capitis: ⁊ etiā ꝯfert potus mellis cū aqua cali/da vt deponat̄ mā a ſtomaco que euapoꝛādo facit ſubeth. Olea aūt illa meli⁹ ponūt̄ in aure vt meli⁹ diſſoluat̄ vapoꝛ

UVA. BHSC. IyR_006_1

ex poſitōe medicie ſolutiue in loco ꝓpīquiori cāe ſubeth: ⁊ tu ex iſto ponere potes alia remedia ſcripta pª tertij caº de ſubeth: vt cuꝫ cliſterijs ⁊ ſuppoſitorijs ⁊ vomitū ꝓuocātibus ⁊ diuerſionibꝰ ⁊ embrocis ⁊ euaporatōibus vt oꝫ.

¶ Caplm i6m de eo in quo ſuperfluit vomitus.

Fiat vt ipſe dormiat ⁊ igeniet quāto plus poſſibile fuerit qūo dormiat ⁊ ligent ipſiꝰ extrema taliter qualr ligant cū fluxuꝫ vētris retinere volumꝰ. Et ipſiꝰ medicet ſtomacꝰ cū ēplīs pōticis fortitudinē faciētibꝰ

Quia ſomnꝰ fortes eua euatiōes retinet ⁊ ſtiptica fortificāt ſtōacū: vn̄ nō recipūt humores: quare ⁊c̄. Gentilis.

¶ In iſto caplō Auic. docet ſuccurrere vomitui ſupfluenti ex farmaco. Et diuidit in tres ptes. Prīo docet ſuccurrere ſupfluo vomitui. 2º docet ꝓuidere ne ſuperfluat. 3º remittit nos ad aliū locū ꝓ quibuſdaꝫ cognoſcēdis. 2ª ibi: cuꝫ autē. 3ª ibi: ⁊ oꝫ quidē. Prīma in duas. Prīo docet qn̄ vomitꝰ eſt ſuperfluꝰ: ſed non adhuc vomat vt ſanguis fluat vomitu. 2º qn̄ ex ſupfluitate eūonis vomit ſanguis. ibi 2ª: qd̄ ſi vomitus. ¶ Prima ps pꝫ q: prouocatio ſomni ⁊ ligatura extremitatū ⁊ appoſitio emplaſtroꝝ cōſtringentiū ⁊ ꝯfortātiū ſtomacū ex eodē capite ſiūt ex quo facte ſunt ſuperius in ſuperfluo fluxu ventris.

Qd̄ ſi vomitꝰ ſuperfluerit ⁊ iceſſanter egrediant humores donec ſanguis exeat: da ei ad bibenduꝫ lactis in in vino mixti quattuor cotilas: quoniā medicine vomitiue maliciā reprimit ⁊ ſanguinē ꝓhibet ⁊ nām lenit. Qd̄ ſi partē pectoris ⁊ ſtomaci a ſanguine cū hoc mūdificare volueris ne ex eo aliquid coaguletur da ei ad bibēdū ſirupū acetoſuꝫ ſiue ſit ex melle ſiue ex zuccaro cū niue infrigidatū paulatiꝫ: cuꝫ hoc quoqꝫ quādoqꝫ confert bibere ſuccuꝫ portulace cum bolo armeno.

Dicit Gentilis ꝙ cum exit ſanguis ſtat triplex intentio. Prima ē remittere acuitatē farmaci. 2ª eſt ſtipticare orificia venarū ne aperiātur. 3ª eſt euacuare medicinā d̄ ſtomaco: modo lac facit hoc: ⁊ tu lege ibi quomodo: quare ⁊c̄.

¶ Facit qd̄ dictū eſt miſcēdo modū quo cauēda eſt coagulatio ſanguis i ſtomaco. Naꝫ iſta coagulatio ē periculoſa: q: ſanguis i ſtomaco coagulatꝰ eſt venenū ⁊ iterficit aliqn̄. Sꝫ ad ꝓhibēduꝫ ſanguis vomitū docet offerre lac vino mixtū: q: ſui aquoſitate lenit ventrē ⁊ deponit medicinā ⁊ ſanguinē q eſt i ſtomaco per iferiora: q: ſui caſeitate oppilat ⁊ claudit orificia venaꝝ per q̄ currit ſanguis ⁊ ſuis q̄litatibꝰ ⁊ mō ſubſtātie reprimit acuitatē farmaci. Sꝫ vinū iō miſcet vt ꝯfortet ſtomacū ſui aromaticitate ⁊ ꝓhibeat lactis coagulationē i ſtomaco. Aliud remediū ē ſuccus portulace cū bolo armeno. Nā ſuccus portulace ē repreſſiuꝰ acuitatis farmaci: ⁊ cuꝫ hoc ſtrīgit ⁊ claudit vias ꝑ quas mā currit ad ſtomacuꝫ: ⁊ multo magis qn̄ cū bolo armeno miſcet. Immiſcet aūt modū quo ꝓhibet coagulatio ſanguis i ſtomaco ꝑ potū ſirupi acetoſi q abſtergit ⁊ icidit ſiue fuerit de melle ſiue de zuccaro: ⁊ dꝫ offerri īfrigidatꝰ i niue vt ꝓhibeat aptionē venaꝝ. Coagulatio aūt ſanguinis iō fugiēda ē: q: facit accidētia veneni terribilia: vt 6ª quarti ⁊ 8º interioꝝ. ⁊ i3ª tertij. Qd̄ ſi hec remedia nō ſufficiunt: recurre ad loca ꝓpria ſtatiꝫ allegata.

Cum ergo terrefactus fueris pro aliquo in quo ſuperfluit medicina fac ipſuꝫ vomere.

¶ Docet ſuccurrere ei in quo timemꝰ de ſuperfluitate vomitus: dicēs ꝙ facias euꝫ vomere vt medicīa cito a corpore expellat. Facias autem hoc incitādo ad vomitū cum potu aque tepide aut olei.

Et opꝫ quideꝫ te querere medicinas vomitiuas ſm ſuos gradus: ⁊ qūo q̄qꝫ eaꝝ ad bibēdū ſint dāde ⁊ p̄cipue heleboꝝ in antidotario ⁊ medicis ſimplicibus.

¶ De hac parte patet quid dicat.

¶ Capituluꝫ i7m de enemate.

Enema eſt medicamē nobile in expellēdo ſuperfluitates que ſunt in iteſtinis ⁊ in ſedādo dolores renuꝫ ⁊ veſice ⁊ apoſtemata ipſoruꝫ ⁊ egritudines colice ⁊ in attrahēdo ſuperfluitates a mēbris p̄īcipalibꝰ ⁊ ſupiorībꝰ. Que vero ex eis ſūt acuta debilitāt epar ⁊ perducūt ad febreꝫ. Ex enematibꝰ p̄terea fit iuuamē in expellēdo reliquias quas inaniētia relinquunt.

¶ Superius Auic. docuit modos adminiſtrādi eūationes que fiunt per exhibita per os. Hic docet regulas obſeruandas in eūationibus que fiunt ꝑ īmiſſa inferius. ſ. ꝑ cliſteria. Et diuidit in duas partes. Primo ponit iuuamēta ⁊ nocumenta in gnāli enematis. Scd̄o ponit regulas de mō obſeruādo ī adminiſtratiōe eius. 2ª ibi: forma aūt. Dicit primo ꝙ enema ē nobile medicamē ī quinqꝫ rebus. pº in expellēdo ſuperfluitates que ſunt ī inteſtinis. 2º in ſedando dolores renū ⁊ veſice. 3º ī apatibus eorū. ſ. renū ⁊ veſice. 4º in egritudinibus colice. 5º in attrahendo mās a mēbris principalibus ſuperioribus. Secūdo dicit ꝙ enemata acuta perducūt ad febres ⁊ debilitāt epar. Ultimo dicit quo ad hāc partē: ꝙ ex ipīs habet iuuamentū in expellēdo reliquias quas reliquerūt inaniētia. ſ. farmaca ſolutiua bibita. ¶ Ubi primo nota ꝙ enema ꝓprie ē decoctio que iniicit aut iniecta ē per anū. Cliſtere aūt ē in quo fit talis iniectio. ¶ Scd̄o nota ꝙ eedē medicine pn̄t ꝑ inferiꝰ iniici ⁊ dari ad potādū: ſed in hoc qd̄ iniiciūtur ꝑ īferius ſunt melius opatiue pro quibuſdā finibꝰ. Et ideo Aui. nō dixit abſolute ꝙ enema ē nobile medicamē: ſed ē nobile in illis quinqꝫ que narrauit. Cōſtat auteꝫ nobilitas medicine ex duobus: quoꝝ vnū ē efficacia in cōſequendo finē. 2m ē ſecuritas ⁊ leuitas ſuper naturā. Et in his qnqꝫ dictis ab Aui. enema ē efficax: ⁊ cū hoc ē valde ſecuꝝ. Efficax: q: per ipm ponūtur medicine ī ipſomet loco patiēte: aut in valde ꝓpinquo. Securū aūt q: ponit ī mēbro ignobili deputato ad expulſionē: vn̄ ſi in illud mēbrū imprimit aliquā diſpōnem nō ē tantū nocumētū ſicut in medicinis īmiſſis ſtomaco qd̄ ē mēbrū nobile. Sed lꝫ Aui. dicat eius nobilitatē tantū in ſupradictis: eſt tn̄ etiam nobile ī ꝯſtringēdo qn̄ fluxus ē cā inteſtinoꝝ: ⁊ nobile in cōſolidādo vlcera inteſtinoꝝ. Sed iſta nō ita pertinēt ad eūationē ſicut quinqꝫ predicta. Cū ergo Aui. hic de eūatione intēderet: nō curauit ponere iſta iuuamēta. ¶ Tertio nota ꝙ lꝫ tm̄ ſit vnus modus īmiſſiōis enematis: tn̄ enemata variātur in virtute ⁊ ſm varietatē eorū ex quibꝰ fiunt. Silr etiam variant res ex quibꝰ fiunt ſm varietatē materierū quas ītendimꝰ eūare. Nā qn̄ intēdimus eūare rem que nō indiget niſi mollificatiōe ſicut feces dure: tūc fit ex vnctuoſis pinguibus ſubtilibus aptis ad ſe imbibēduꝫ: ſicut cū oleo puro: aut cū re pingui vt cū iure galli: aut cū ſimili re. Qn̄qꝫ aūt intēdimus ad ſubtiliationē ſicut ī flegmate: ⁊ tunc fit cū ſubtilitate. qn̄qꝫ intendimus abſterſionē: ⁊ tūc fit cū aqua mellis vel ordei ī qua mel vel aliquid abſterſiuū diſſolutū ſit. qn̄qꝫ aūt intēdimꝰ vt irritet virtus expulſiua: ⁊ tunc apponūtur mordicatiua ſicut ſal. qn̄qꝫ aūt intēdimꝰ ventoſitatis diſſolutionē: ⁊ tūc apponimꝰ carminātia. qn̄qꝫ aūt intēdimus attractionē a lōginquo: ⁊ tūc apponunt attrahētia que ſunt duoꝝ modoꝝ. Quedā enim trahunt cū virtute attractiōis ꝓpria. ſ. a ꝓprietate reſpiciēte determinatū humorē. nā que multū ſtimulant expulſiuā faciēdo mordicationē in inteſtinis ſunt cā attractiōis humorū faciēdo quēdā dolorē: ſed iſta attractio nō reſpicit determinatū humorē. Sed turbit ⁊ colloquintida cucumer aſininus ⁊ ſcamonea nō ſolū trahūt q: irritant ſed actuāt ſi permāſerint ſufficiēti tēpore: ⁊ eūant determinatū humorē. ¶ Quarto nota ꝙ cum cliſtere fit gratia eūationis eius ꝙ in iteſtinis cōtinet alijs paribꝰ dꝫ eē leuius q̄ꝫ ſi ītēdat ad eūationē a lōginquo: q: cliſtere vadit ſup loco a quo faciēda eſt eūatio. ¶ Quinto nota ꝙ cliſtere vt pꝫ ex textu nō fit ſolum ad intentionē eūandi: imo qn̄qꝫ alterandi: qn̄qꝫ abſtergēdi: qn̄qꝫ cōſolidandi: qn̄qꝫ ad dolorē mitigandū. Et ſm hec oīa fiūt ex diuerſis rebꝰ: vt pꝫ in libris ꝑticularibꝰ. ¶ Sexto nota ꝙ quāuis enema nō tranſeat ad veſicā nec in venas: tn̄ q: inteſtina circūdant hec membra: iō enema vadēs ad inteſtina pōt ſuis qualitatibꝰ hec mēbra alterare ⁊ ſedare dolorē: maxime q: cuꝫ mēbra iteriora ſint rara euaporat ab inteſtīs aliqd̄ ſubtile de ſubſtātia cliſteris qd̄ attingit vtrūqꝫ iſtoꝝ mēbroꝝ dictorū: ⁊ ꝑ hūc modū cōfert in eoꝝ apatibꝰ ſiue fuerit intētio repcutere ſiue reſoluere ſiue alterare. Uerū q: ſuperiora inteſtia ſunt renibꝰ viciniora ⁊ inferiora veſice: ideo opꝫ in dolore vel cura renum per cliſtere conari ꝙ cliſtere magis penetret q̄ꝫ i cura veſice. Et pariter ītelligatis d̄ cura matricū in mulieribꝰ ⁊ lacertoꝝ quibꝰ renes colligant: qm̄ iteſtia adiacent iſtis locis. Quod ſi querat qūo enema ſedat ſiue cliſtere: dicit ꝙ vera ſedatiōe: ſicut cliſtere cū mollificatiuis ⁊ lenitiuis anodinis: ⁊ ſedatione ꝑ remotionē cāe ſiue ſit humor qui eūat: ſiue mala ꝯplō q̄ remouet: ſiue ſolutio cōtinuitatis q̄ ſolidat. etiā ꝑ ſtupefactionē ſicut multotiens fit in diſinteria. ſed hoc vltimum faciēdum eſt raro ⁊ cum timore ⁊ cautela. ¶ 7º nota ꝙ enema ſedat egritudines colice. i. oppilationes vel alios morbos qui ſunt d̄ genere colice. Eſt autē colica egritudo inteſtinalis doloroſa cū qua fit difficilis exitus eius qd̄ debꝫ egredi ſꝫ naturā: ſiue ergo fiat oppilatio a fece vel humore vel a mala ꝯplexione cū mā vel ab apoſtemate vel ab alio ſedat enemate ſm tn̄ variū modū facto iuxta diuerſitatē cāꝝ: vt hꝫ videri i6ª tertij. ⁊ pōt etiā dolorē in ea exiſtēteꝫ tribꝰ modis ſupradictis remouere: ſꝫ tn̄ iteſtinoꝝ quedā ſunt quoꝝ egritudines magis iuuant cliſteri q̄ꝫ medicina ſumpta ꝑ os: quedā ecōtra: ⁊ q̄daꝫ medio mō: ſed hoc dictū ē ſupra. c. primo huius fen: q: ſuperiora ⁊ gracilia melius iuuantur bibitis: īferiora cliſteri: finis colon verſus ſuperiora ⁊ monoculum medio modo. Et ſm hoc etiā quātitas cliſteris ē variāda. nā maioris quātitatis fit cliſtere quādo intendimus ꝙ vadat ad ſuperiora inteſtina: ⁊ minoris qn̄ intendimus ad monoculū: ⁊ medio mō qn̄ ad media. ¶ 8º nota ꝙ cliſteria dicunt acuta ī quibꝰ ponūtur medicie multum calide ⁊ acute imprimentes ſicut colloquintida euforbium

Cliſteria autē ſiue enemata q̄ ſunt apta ventri conſtipato ſiue alio morbo: ſcias ex Gal. in ſuo de cliſteribus. c. v. ⁊c̄.

biū ⁊ ſimiles. Et q: medicine iſte ꝓcipue in multa quãtita-
te poſite reſoluũt ⁊ calefaciunt: talia cliſteria ſunt diſſolu-
tiua ſpũuꝫ ⁊ partiũ epatis ⁊ ipm debilitãt. Nã tales me-
dicine multũ accedũt ꝓpe epar ⁊ plurimũ eoꝝ vapores ꝑ
organa vadũt ad epar: ⁊ per eãdẽ fere cãꝫ perducũt ad fe-
brẽ calefaciẽdo ſanguinẽ: qui eſt in vena magna chilis de-
ſcẽdentis ad ipm epar: ex quo daṫ intelligi ꝙ ſunt magis
cauẽda in febribus. ¶ Ultimo nota ꝙ inanictia ſunt me-
dicine ſolutiue que in iteſtinis relinquũt aliquid ꝺ humo-
ribus quos attraxerũt: ⁊ iſta hoc mõ relicta euãṫ cliſteri
cõiter lauatiuo niſi multã viſcoſitatẽ habuerit ⁊ groſſitiẽ:
quo cãu addimus aliqꝺ inciſiuũ ⁊ ſubtiliatiuum.

¶ Uſqꝫ huc fuit expoſitio. d. m. Ugonis de ſenis:
nunc incipit expoſitio Marſilij.

Formã vero cliſteris ⁊ quomodo cliſterizeṫ iaꝫ retu-
limus in caplo de colica.

¶ Nunc Aui. ponit quaſdã cõditiões in cliſteribꝰ attẽ-
dendas: ⁊ duo facit. Prĩo facit qꝺ dictũ ẽ. 2° docet ſuc-
currere cuidã defectui: ibi 2ª: ꝙ ſiquis. Prima ps ꝯtinet
tres partes. In prima remittit nos ꝓ ſufficiẽtiori declara
tione forme cliſteris ad aliũ locũ. 2ª exequiṫ modũ cliſte-
rizandi explicãdo ſitũ. 3° tangit cõueniẽteꝫ horã appli-
cãdi cliſtere. ibi 2ª: videṫ quoqꝫ. ibi 3ª: ⁊ cliſterizãdi. De pri
ma dicit ꝙ ipſe iã retulit formã cliſteris: ⁊ quõ cliſterizeṫ
corpus. c. de colica q: 16ª tertij: forma tamen ſatis ẽ nota.
Nã primo debet habere cãnam oblõgaꝫ ad formã palmi
cõis: vt ingrediaṫ ſufficiẽter iteſtinũ rectũ in cuius extre-
mitate debent eẽ multa foramina ne ſubito exñte vno ma-
gno foramine liquor tranſeat ad iteſtina: ne etiã ad vnam
partẽ ſed ꝑ multa foramĩa diſperſus multas partes attin-
gat. Et dꝫ eẽ terſuꝫ ⁊ politũ: in ꝓmptu ẽ cã: imo dꝫ eẽ cã-
na vncta oleo que iponiṫ. Debꝫ ẽt cãna eẽ ligata corio aut
veſica in ſua parte latiori: in qua veſica aut corio liquor te-
neaṫ: ⁊ cõprimẽdo coriũ igrediaṫ cãnam qꝺ in corio cõti-
neṫ. Debet ẽt eſſe ſtrictũ prope cãnam: ⁊ incedere ſe ãpliã-
do verſus aliã partẽ: ⁊ hoc vt cõpreſſo corio ⁊ exñte ſtricto
verſus cãnam melius liquor valeat ingredi.

Uideṫ quoqꝫ ꝙ cliſterizati ſitus melior ſit vt ſupinꝰ
iaceat: deinde reuoluat ſe ad latus dolens.

¶ Nũc tangit ſitũ cliſterizãdi: dicens ꝙ videṫ meliꝰ vt
cliſterizatus ſtet ſupinꝰ: deinde voluat ſe de latere in latꝰ.
¶ Pro pte nota ꝙ alter ẽ ſitus cliſterizãdi: ⁊ alter ſitus
cliſterizati. Nam cliſterizãdus dꝫ ſtare cuꝫ poſterioribus
eleuatis ⁊ ãterioribus depreſſis: ⁊ dꝫ ſtare ſuꝑ genua ſua
⁊ ſuper manꝰ a pte anteriori: cuius cã ẽ vt liquor melius i-
grediatur a ſurſum in deorſuꝫ. ſi tñ infirmus eſſet debilis
ipſo iacente nos oporteret ponere enema. Situs vero cli-
ſterizati duplex ẽ: quidã imediate poſt acceptiõꝫ cliſteris:
⁊ tunc deberet ille ſtare ſupinus: q: liquor melius poterit
detineri cum ſit quietior ſitus ꝓ retẽtiõe liquoris: ⁊ ille ap
pellaṫ ſitus cõis: q: corpora ſic cliſterizãda ꝺbẽt ſic ſitua-
ri. Alter vero ẽ ſitꝰ magis mediatꝰ vt poſtqꝫ liquor iã qui-
etatus ẽ ⁊ iam ſufficiẽter retẽtus: tũc moueaṫ infirmꝰ de
latere i latus: vt liquor bñ vndiqꝫ attingat inteſtina. Alter
ẽ ſitus magis ꝓprius qui fit rõne ꝓprij cãus: q: rõne do-
loris aut morbi in determinata pte ſic aſſumptus: ⁊ poſtqꝫ
infirmus ſtetit ſupinus dꝫ ſe voluere ad latꝰ dolẽs: vt ene
ma plus attingat ad alterã partẽ. Ad propoſitũ Aui. non
poſuit ſitum ꝓpriũ hunc: dans eum intelligere tãquã no
tum. Poſuit autem cliſterizati ſitum cõem: deinde ꝓpriũ
duꝫ dixit: deinde voluat ſe.

Gal. i libro de cliſteribus ⁊ colica capl'o quarto docet ſitũ cliſterizãdi dicẽs: Et tibi quidẽ neceſſariũ eſt qñ volueris inijcere cliſtere ⁊c. Mos aũt hodiernꝰ ẽ ad placitũ: ⁊ parũ obediṫ ꝓceptis medicoꝝ: quare ⁊c.

Et cliſterizãdi hora melior eſt cum eſt aeris frigidi-
tas: quoniã ſequeṫ inde vt augmẽtetur grauitas ⁊ do-
lor ⁊ eſtuatio ⁊ nauſea. Balneuꝫ preterea ſolet facere vt
ebulliãt humores ⁊ ſpargantṫ. Cliſteris quoqꝫ ꝯditio eſt
vt aerẽ ⁊ humores retẽtos attrahat. Et ꝓpter hoc ſm
plurimũ nõ eſt bonũ vt balneũ enemati premittas.

¶ Nunc tangit horaꝫ cõueniẽtem ꝓ cliſteri exhibendo:
dicẽs ꝙ melior hora cliſterizandi eſt aere exñte frigido ne
grauitas dolor nauſea ⁊ ſupercalefactio conſequanṫ. 2°
ponit aliã cõditionẽ dicẽs ꝙ balneũ diſpergit ⁊ facit ebul
lire humores: iõ nõ ẽ bonũ vt ꝓponas balneuꝫ enemati: ⁊
hoc ſm plurimũ. Dicit vltimo ꝙ cõditio cliſteris ẽ vt at-
trahat vẽtoſitates ⁊ hũores. ¶ Ad itellectũ partis notan-
dum ꝙ hora cliſteris põt ſumi ex multis. Primo ex diſpo
ſitione corporũ aut mẽbroꝝ. 2° ex parte ſtomaci: q: ſtoma
co exñte repleto nõ ẽ regulariter enema faciẽdũ: ne agiteṫ
cibus in ſtomaco: ⁊ indigeſtus attrahaṫ ad inteſtia niſi in
caſu ꝑꝑ ꝺbilitatẽ virtutis nos oporteret aliquãdo exhibe-
re cibũ. Itẽ ex parte corpoꝝ: q: cliſtere nõ ẽ exhibendum
corꝑe exñte valde debili: imo loco eius ponẽdum ẽ ſuppo-
ſitoriũ. Itẽ ſumiṫ hora ex parte aeris: q: cliſtere ſaltẽ acu-
tũ ẽ exhibẽdum hora ſuꝑiori: ⁊ maxime tẽpore multũ cali-
do. Cã tangiṫ in lr̃a ſicut ſupiꝰ etiã tpe exñte multũ frigi-
do dum ẽ aeris frigiditas minꝰ exhibẽdũ ẽ: q: tunc humo
res ſunt idiſpõres ad exitũ. Sumiṫ etiã hora ex parte al-
terius: q: cliſtere nõ ẽ faciẽdũ poſt balneũ imediate: q: cuꝫ
balneuꝫ hũores facit ebullire: eos ẽt diſpergit ⁊ trahit ad
exteriora. Cliſtere ſequẽs amplius nocebit calefaciẽdo: ⁊ ñ
bene educet cũ humores ad interiora vel exteriora ſint di
ſperſi. In cãu tamẽ quo eẽt doloris vehemẽtia poſſet ime
diate ſequi enema. Multotiẽs bonũ eſt ꝓmitti balneũ per
tẽpus multũ: q: preꝑabit ad enema aliqñ ⁊ diſſoluẽdo hu
mores ⁊ mãs. ¶ Ultĩo nota ꝙ cliſtere attrahit vẽtoſitatẽ
i. ẽ cã attractionis ⁊ expulſiõis vẽtoſitatis ad exteriora i-
citando virtutẽ expulſiuã: aut etiã attrahit ventoſitatẽ. i.
remouet diſſoluẽdo ſicut cliſtere factũ ex rebus carminã-
tibus ⁊ diſſoluẽtibus ventoſitatem.

Qꝺ ſiquis in iteſtinis puſtulas habẽs ipſo idiguerit
cauſa febris aut alicuiꝰ egritudinis ⁊ timuerit ne enema
retineaṫ: ſuperponere debet ano ſuo ⁊ femori ⁊ locis q̃
ſunt in circuitu ſpeltaꝫ calefactã cum panno.

¶ Docet nũc ſuccurrere cuidã defectui: dicẽs ꝙ ſiqs pa
tiẽs puſtulas in inteſtis ꝓpter febrẽ idiguerit cliſteri: aut
ꝓpter aliũ morbũ: ⁊ timeaṫ ne retineaṫ enema: dꝫ ſuo ano
ſupponere ⁊ etiã femori ⁊ alijs locis q ſunt in circuitu ſpel
tam calefactã cũ pãno. ¶ Pro parte nota ꝙ exñte puſtu-
la vel emoroyde ſopiṫ ⁊ ebetaṫ virtus ad expellẽdũ: q: cuꝫ
expellẽdo extendaṫ pars hñs puſtulas: aut tranſeat liquor
aut ſuꝑfluitas circa illã partẽ: tũc dolet illa ps. Pigritaṫ
ergo virtus ad expellẽdũ ne doleat. Et iõ per remediũ qꝺ
in hac parte poniṫ cõtingit primo ꝙ ꝓpter caliditateꝫ tẽ-
peratã ꝯfortaṫ virtꝰ ſenſitiua. Itẽ ꝑꝑ ſpeltã hñtẽ aliquam
abſterſiuã virtutẽ ꝓparaṫ enema extẽſiõi ⁊ expulſiõi: ⁊ bre
uiter incitaṫ virtus ad expellẽdum aliqualiter igiṫ ⁊c.

Scias ꝙ ſpelta eſt genus frumẽti quã quidã dicunt alicaꝫ quidam vero cãdaruſuꝫ: ⁊ ipſa calefacta adhibita ano femori ⁊ locis qui ſũt in circuitu trahit inferius enema retẽtuꝫ tam ſuo calore qꝫ ſibi inſita virtute attractiua: cuius ſignuꝫ eſt: q: ea repoſita in loco humido cito tumeſcit ⁊ germẽ emittit trahẽs ſibi humorem ⁊c.

Capituluꝫ 18m de epithimatibus.

Epithimata ſunt ex medicinis bonis que ad
ipſam perueniũt egritudinẽ.

¶ In pñti ca° Aui. determiat de quibuſdã
medicis q̃ exterius applicãtur. Et duo facit.
Primo determinat de epithimatibꝰ. 2° de
embrocis. ibi 2ª: embroce ſunt. Prima ps ꝯtinet ptes du-
as. Primo explicat epithimata bonas eſſe medicinas. 2°
ponit quedaꝫ iuuamẽta ⁊ modos epithimatũ ibi: ⁊ medici
na. De pª parte dicit ꝙ epithimata ſũt medicine bone ꝑ-
ueniẽtes ad morbũ. ¶ Pro pte nota ꝙ reperiunṫ iſta no
mina fomẽtatio: vaporatoriũ ſeu calefactoriũ: ſuffumiga-
tio: ẽplaſtratio: epithimatio: vnctio ⁊ ẽbrocatio: vñ fomen
tuꝫ nõ eſt niſi qñ medicamẽ ſic applicaṫ vt ꝑ ipꝫ queramꝰ
vaporatõeꝫ ſeu reſolutõeꝫ i vaporẽ ſicut qñ applicaṫ mul-
tuꝫ cũ camomilla vt fiat reſolutio. Suffumigatio nõ ẽ ali
ud niſi qñ medicamẽ qꝺ trãſmutatũ in fumũ: ⁊ iſte fumus
a mẽbro capiṫ aut panno ⁊ corpori applicaṫ ſicut qñ thus
aut maſtix iponiṫ prunis. Epithimatio vero eſt applicatio
liquoris ad corpꝰ aut ad mẽbruꝫ vt qñ balneaṫ pãnus i li-
quore ⁊ applicaṫ corpori. Emplaſtrũ aũt idẽ eſt ꝙ dura cõ
fectio medicinarũ: vñ vt in pñti ca° diciṫ vel poniṫ: ex eiſ-
deꝫ põt ꝯfici emplaſtrũ ⁊ epithima: ſꝫ epithima ẽ liquidũ:
emplaſtrũ vero duꝝ. Embroca ꝓprie eſt liquor cũ motu a
ſurſuꝫ i deorſuꝫ applicatꝰ mẽbro ſicut ſpõgia madefacta i
aqua camomille ⁊ exꝓſſa a ſurſuꝫ in deorſuꝫ: hoc vocatur
embroca. Unguẽtuꝫ vero ꝓprie eſt medicamẽ ꝯpoſitũ ex
re vnctuoſa ⁊ cera ⁊ eſt aliqualr ꝯſtans. Diciṫ aũt vnguẽ-
tuꝫ ab vngẽdo. Et differũt iſta medicamina quãtũ ad itẽ
tões quas vult medicus exigi. Nã ſi vult medicamẽ mul
to tpe operari: tũc facit ipm in forma duriori ⁊ fortiori vel
ꝯſtãtiori vel i forma ẽplaſtri: deĩde i forma vnguẽti: deĩde
i forma epithimatis: vltĩo i forma embroce. Si vero q̃rat
citã ⁊ ꝓfundã medicamĩs penetrationẽ: applicabit in for-
ma embroce tãquã i forma medicamĩs magis penetrãtis.
¶ Scꝺo nota ꝙ epithima diciṫ bonuꝫ medicamẽ: q: ſe-
curũ cuꝫ exterioribus applicaṫ. bonũ etiam q: penetrando
ſuaꝫ perficit operationẽ cuꝫ peruenit ad morbuꝫ.

Et medicina fortaſſe duas habet virtutes. vnã ſub
tiliatiuaꝫ ⁊ alteram ingroſſatiuã: ⁊ erit maior neceſſitas
ſubtiliatiue q̃ꝫ inſpiſſatiue. Cũqꝫ eius iſpiſſatio fuerit
tẽperans ſubtiliationẽ cuꝫ ex ea fiet emplaſtrũ penetra-
bit ſubtilitas ⁊ remanebit ſpiſſitudo: ⁊ illa quidẽ que pe
netrat cõfert ſicut facit coriãdruꝫ cuꝫ ordeo fracto cũ ex
eis fit emplaſtrũ ſuꝑ ſcrofulas. Emplaſtra preterea ſũt
talia qualia epithimata: ſꝫ emplaſtra ſũt dura ⁊ epithi-
mata currẽtia. Eſt quoqꝫ cũ epithimata fiunt cũ pãnis:
cũqꝫ mẽbris pricipalibꝰ ſuperponunṫ ſicut epati ⁊ cordi
⁊ nõ fuerit ibi qꝺ prohibeat conferunt pãni ſuffumigati
ex xilo aloe crudo ⁊ virtutibus epithimatuꝫ bonum tri-
buunt odoreꝫ queꝫ principalia diligunt.

¶ Nũc Aui. exequiṫ ponẽdo iuuamẽta ⁊ oꝑationes epi-
thimatũ. ⁊ pº tangit vnã oꝑationẽ. 2° ponit cõꝑationem

īter epithima ⁊ ēplaſtra. 3° tāgit ſpecialē cōditionē quorūdam epithimatū. ibi 2ª: emplaſtra p̄terea. ibi 3ª: cūq̄ʒ mēbris. De p̄ria parte dicit q̄ fortis medicina duas hʒ virtutes: ſupple cōtrarias. ſ. ſubtiliādi ⁊ ingroſſandi: ⁊ maior ē neceſſitas ſubtiliādi q̄ʒ ingroſſandi. Inſpiſſatiōe ergo tēpate ſubtiliationis ī hac medicina facta ēplaſtro penetrabit ſubtilitas nō penetrāte ſpiſſitudine hac ſubtilitate penetrāte cōferēte: ſicut facit ēplaſtrū factū ex coriādro ⁊ ordeo fracto poſito ſupra ſcrophulas. Dicit 2° q̄ emplaſtra ſunt talia qualia epithimata: ſed epithimata ſunt fluida currētia: emplaſtra vero dura. Dicit vlterius q̄ cōtingit epithimata fieri cū pānis. Ultimo dicit q̄ cuʒ epithimata ſupponūtur mēbris principalibꝰ vt epati ⁊ cordi nō exn̄te impedimēto: cōferūt pāni ſuffumigati ex ligno aloes crudo: ⁊ virtute epithimatū tribuētiū bonū odorē quē diligūt mēbra principalia. ¶ Pro intellectu partis nota q̄ vna medicina pōt habere virtutes cōtrarias: vt pʒ experiētia: vt q̄ partes exteriores ſint frigide ⁊ īteriores calide: vt pʒ de pſilio cuiꝰ cortex multa frigiditate p̄ticipat: ⁊ medulla multo calore: ⁊ in tali cāu nō ē incōueniēs frigide partis p̄uenire opationē: vt circūdata parte calida frigida nō inchoet aut expleat ſuā opationē. Aliquādo aūt ē ecōtra: q̄ pars corticalis ē calida: cētralis vero ⁊ interior frigida vt ī endiuia caule ⁊ multis alijs. Pʒ ēt ī p̄nti p̄p oſito q̄ coriādrū q̄d ē granū apud Mūdinū frigidū habēs virtutē ſubtiliādi ⁊ reſoluēdi per partē calidā: ⁊ inſpiſſandi ⁊ ingroſſandi p̄ partē frigidā. Fit ergo vt pars vna cōtraria per accidēs iuuet ad opationē alteriꝰ vt p̄te ſubtili eius penetrāte ſubſequēte groſſa cōſtipāte ⁊ poſtponente ſubtilior magis p̄funda ⁊ fortius operaṫ. Preuenit autē ſubtilis pars tāquā actiuioris opatiōis: ⁊ etiā eiꝰ p̄s ſubtilis calida facilius actuaṫ q̄ʒ frigida: cuius ꝯſimileʒ operationē tetigit Gal. 2° de ſimplici medicina: vbi vult oleum roſ. plus humectare q̄ʒ oleū non roſatū vel cōe: cū tn̄ hoc reſpectu cōe ſit ſiccuʒ: nō p̄pter aliā cām: niſi q̄ perueniente opatiōe olei ⁊ ſubſequēte preſſiōe p̄pter ſtipticitateʒ roſaꝝ maior ⁊ p̄fundior ſequiṫ humectatio. ¶ Ulteriꝰ nota q̄ quāuis coriādrum cū ordeo fracto q̄d hʒ virtutē abſterſiuā ⁊ reſolutiuā valeat ad ſcrophulas reſoluendas ap p̄rimatū exteriꝰ. Aſſumptū tn̄ interius actualr̄ ⁊ partibꝰ ſubtilibꝰ reſolutis cōſequiṫ coriādrū infrigidatio ⁊ nō calefactio. Iō exhibitū poſt cibū per ſuā virtutē infrigidatiuā p̄hibet ad caput euaporationē: ī quo coriādro virtꝰ ingroſſatiua temp̄at reſolutiuā: q̄ facit ip̄m tēperate ſubtiliare. Ex quo pʒ liquorē appoſitū mēbro quo mēbrū ē madefactū dici poſſe epithima: ſicut ſi ſit pānus poſitus in liquore ⁊ ſuppoſitus mēbro ſiue nō. pʒ q̄ dicit epithimata q̄n̄q̄ʒ ſunt cū pānis q̄n̄q̄ʒ nō. ¶ Ulterius nota q̄ dicit ⁊ ſi fuerit ibi q̄d p̄hibeat q̄ ſuffumigiū ligni aloes non ponaṫ cordi: pōt eē cōplo valde calida. ¶ Nota vlteriꝰ q̄ lignū aloes hʒ odorē valde aromaticū. Etiā ē vt puto a ſua forma cordiale. Si ergo cordi vel epati applicemus epithima q̄d ſit reſolutiuū aut alteratiuū intētiōe eorū ꝯſeruare aut refocillare virtutē epithimatibꝰ odorifera ſunt admiſcenda: aut epithimata mēbris applicanda ſicut ſuffumigiū ligni aloes. Et notāter applicaṫ ī fumo vt ſi euaporās fortē faciat operationē euaporātibꝰ etiā partibꝰ odoriferis ⁊ cordialibꝰ. Et notanṫ dictū ē crudū ne forte p̄pter decoctionē ſubtiles partes abijcianṫ. ¶ Ultimo nota q̄ mēbra p̄ncipalia diligūt bonū odorē: vt ſic dicā dilectione naturali nō q̄ habeant potētiā odorantē: ſed q̄ cuʒ odor fundeṫ in ſubſtātia vaporoſa conſimili ſpiritui: aut ēt ſit 2ª qualitas p̄portionata ꝯploni ſpiritui: iō naturaliter mēbra appetūt hunc odorem bonum ⁊c̄.

Sciaſ q̄ ī coriādro ē ſubſtātia ſubtilis profundās ⁊ ſubſtātia frida que nō p̄fundatur iuxta illud Aui. 2° huiꝰ caplo de coriādro. In ordeo vero eſt virtus ſubtiliatiua abſterſiua ⁊ reliqua: que vide a Gal. ī primo de elemētis caplo. vj. cū dicit: Ordeū aūt ſubtilē ⁊ abſterſiuū ⁊ aliquid habētem generat chimū: ⁊ hoc ex partibꝰ eius ſubtilibꝰ ⁊c̄. ⁊ a Serapione ī aggregatore caplo de ordeo ⁊ reliqua.

¶ Capitulū 19ᵐ de embrocis.

e

Embroce ſūt medicamēta ꝯgrua ei q̄d ex capite ⁊ alijs mēbris opʒ reſolui ⁊ illi cui cōplexionē neceſſariū eſt permutare.

¶ In parte p̄nti Aui. p̄ſequiṫ de alio medicamine exteriꝰ applicādo q̄d diciṫ embroca. Et diuidiṫ in duas. Prio Aui. tāgit operatōes ⁊ iuuamēta embrocaꝝ. 2° tangit ordinē applicādi ꝯrias embrocas. ibi 2ª: in mēbris aūt. In p̄ª parte dicit q̄ embroce ſunt cōuenietes medicine ad reſoluendū q̄d oʒ reſolui ex capite ⁊ mēbris alijs: ac etiā ꝯueniūt illi cuiꝰ neceſſariū ē p̄mutare ꝯplexionē. ¶ Pro parte nota q̄ in p̄nti parte ꝯcipiṫ iuuamentū ⁊ operatio embrocaꝝ. nā h̄nt alterare ſm̄ diuerſitatē eoꝝ q̄ ī grediunṫ embrocas. pʒ ēt 2° q̄ ſūt magni vigoris cū h̄eant reſoluere mās capitis ⁊ alioꝝ mēbroꝝ ⁊ profundas eradicare mās. Propter q̄d dubitaṫ vtrū embroce ſint forte remediū? Et videṫ p̄° q̄ ſic ex Aui. loco p̄nti. Q̄d nō ex auctoritate Auic. 13ª tertij ca° gnāli de curatiōe mēbroꝝ ſtomaci ad p̄cipiuʒ vbi vult embrocas eē debile medicamē liquidū ab alto p̄iectū ſupra mēbruʒ. ¶ Scd̄o ex heri dictis nota q̄ medicamē quātū p̄tinet ad p̄poſitū pōt dici forte: q̄ fortis ⁊ cite operatiōis ⁊ impreſſionis. 2° forte q̄ ꝯſtās ⁊ p̄manēs ī opando. Penes hāc diſtīctōeʒ ſunt ponēde due ꝯclōnes. Pria: ēbroca ē forte medicamē mō prio. hec ſit pro mēte Aui. loco p̄nti. 2ª: embroca ē debile medicamē mō 2°: q̄ eius ſubſtātia fluida ⁊ liq̄da ē modice p̄manētie. hec ſit p̄ mēte Aui. 13ª tertij.

In mēbris aūt q̄ embrocare oʒ ex calido ⁊ frigido ſi nō in eis fuerit ſup̄fluitates q̄ deſcēdāt fiat prius embroca ex calefacto: deinde fiat ex aqua frigida vt ꝯſtringantur. q̄d ſi res diuerſa fuerit a frigida incipiaṫ.

¶ Nunc ponit ordinē applicatiōis embrocaꝝ ꝯtrariaꝝ: dicens q̄ in mēbris egētibꝰ embrocatiōe calida ⁊ frigida ſup̄fluitatibꝰ nō fluētibus ſed defluxis p̄° fiat embrocatio ex calida: deinde ex frigida ꝯſtringēte mēbra. Si tn̄ res ſit diuerſa ab hoc: q̄ humores deſcendant ⁊ ſint in fluxu: p̄° a frigida ēbrocatiōe īchoandū ē. ¶ Pro parte prio nota q̄ mā exn̄te fluxa mēbra egent calefactiōe vt apiantur pori ſubtilieṫ mā ⁊ reſoluaṫ. Embroca igiṫ calida dʒ precedere frigidā cū frida nō iuuet: īmo noceat huic opatōi. Ueruʒ q̄ mēbrū ē debilitatū p̄pter aptionē a calido factā vt mēbrū iuueṫ ⁊ fortificeṫ eget embroca cōſtipante iuuāte ⁊ īfrigidāte. Si vero mā ſit in fluxu cū ītētio ſit repercutere ⁊ p̄hibere fluxū primo frigida embroca ē mēbrū ēbrocandū ⁊ nō calida: q̄ fluxus materie eſſet maior. hanc ſcd̄am ſn̄iam ponit Auic. 22ª tertij. c. de curatiōe doloris iuncturarū ſatis ad principiū per colūnam: ⁊ hoc quidē vt plurimū q̄ materia exn̄te valde frigida ⁊ exn̄te in fluxu nō ē īconueniens calidam ⁊ ſtipticam applicare medicinam: vt colligitur 3ª fen quarti can. ⁊c̄.

Scito q̄n̄q̄ʒ in eadeʒ egritudine ſuper ideʒ mēbrū ꝯuenire diuerſas embrocas. Prio q̄dē frigidas: poſt tēperatas: deinde calidas ſicut ī freneſi iuxta illud Aui. p̄ria tertij tractatu tertio caplo d̄ cura eiꝰ.

¶ Capitulum 20ᵐ de flobothomia.

f

Flobothomia eſt euacuatio vniuerſalis que multitudineʒ euacuat.

¶ In p̄cedētibus Aui. determinauit de ſolutione vētris ⁊ vomitu curā ītēdēs male cōplexiōis cū mā exn̄tis que curaṫ vel eūando mām vomitu vel ſolutōe vētris: In p̄nti parte determiat de flobothomia ⁊ eūatiōe ſibi ānexa. Et prio cōtinet hec p̄s partes duas. Nā prio determinat de eūatiōe p̄ flobothomiā. 2° de eūatiōe p̄ ventoſas ⁊ ſanguiſugas tāquaʒ de ānexis eūationibꝰ flobothomie. ibi 2ª: ventoſe partem cutis. Capitulū primū cōtinet tres partes p̄cipales. In p̄ria tangit iuuamēta ⁊ opatōes flobothomie: ⁊ ponit can̄. attēdēdos rōne eius q̄d eūatur. 2° tangit can̄. attēdēdos rōne partiū que flobothomanṫ: aut a quibꝰ eūaṫ. 3° ponit can̄. attēdēdos rōe inſtrumēti cū quo ſit flobothomia. ibi 2ª: ⁊ debes ſcire. ibi 3ª: ſcias ēt q̄ flobothomꝰ. Pria ī duas. In primo facit q̄d dictū ē cū hoc ponēdo cāus ī q̄bus cōpetit flobothomia. 2° ponit can̄. attēdēdos rōne eiꝰ q̄d eūatur. ibi 2ª: flobothomia quoq̄ʒ ⁊ eūatio. Pria ī duas. Primo ponit iuuamēta magis gnālia. 2° in ſpāli magis. ibi 2ª: ⁊ nemo quidē. Pria ī duas. Naʒ primo ponit opationes flobothomie. 2° exponit quoddā vocabulū poſitū in diffinitiōe. ibi 2ª: multitudo vero ē augmentū. Dicit p̄° q̄ flobothomia ē vniuerſalis ⁊ gnālis eūatio euacuās multitudinē humoꝝ. ¶ Ad intellectū partis nota q̄ flobothomia dr̄ vniuerſalis eūatio: q̄ multū eūans a mēbris corporis ſiue toto: vt 5ª affo. ꝯmēto 2° ſatis ad principiū ⁊ 2° regiminis acutoꝝ cōmēto xj° ſatis ad ſinē. Et ē cā p̄tis q̄ oēs vene cōtinuitatē h̄nt ad inuicē: ſanguis ēt cōtentus ī venis hʒ quādaʒ ꝯtinuitatē cuʒ partiali ſanguie: iō aliqualr̄ partes fluentes ſanguinē trahūt ⁊ faciūt aliū fluere: ⁊ in illo partialr̄ ꝯuenit flobothomia cuʒ farmacia. nam farmacia etiaʒ pōt eūare a toto. Diciṫ ēt 2° vniuerſalis eūatio q̄ generalr̄ omēs educit humores ⁊ nō eligit aliquē: ex quo differt a farmacia que euacuat a forma ſpecifica determinatū humorē. flobothomia aūt eūans a venis multos educit humores. ¶ Hic tn̄ nota q̄ flobothomia lʒ poſſet dici a toto eūare: plus tn̄ ⁊ īmediate euacuat a p̄te p̄p̄iquiori eradicādo māʒ p̄tis p̄p̄iquioris. ⁊ iſtud colligiṫ p̄ parte 2° regiminis acutoꝝ cōmento xj° circa ſinē. ¶ Tertio nota q̄ lʒ flobothomia hūoꝝ eūet multitudinē cōuenit ēt peccato qualis p̄° p̄ quale ītelligēdo q̄le gnāle. nā flobothomia nō euacuat niſi nocentē humorē aut nocitiuū. Cōuenit ergo gnāli peccato qualis. Itē ꝯuenit peccato qualis ſpāli. Fit eim flobothomia ſanguie ebulliēte: vt ſanguis cuēteṫ ⁊ nō putreſiat: ſicut farmacia debeṫ peccato quāti ⁊ pc̄to q̄lis. Nā prio pc̄to quāti gnālis q̄ oē nocitiuū ⁊ peccās ī quali ſicut ſup̄fluū quātū ē a corpore eijciēdū: vn̄ medicia nō ē aliud q̄ʒ attractio vel eductio: vt. xj° terapē. Itē cōuenit pc̄to quāti ſpālis. nā farmacū cōpetit humore peccante p̄ quātitatē ſuā: q̄ tn̄ nullū videṫ farmacū ad oium humoꝝ multitudinē educēdā debitū ⁊ cōueniēs: ſʒ hoc debite facit flobothomia: iō dictū ē flobothomiā multitudinē humoꝝ eūare. ¶ Item nota q̄ per multitudinē humoꝝ nō ſoluʒ habemꝰ ītelligere multitudinē oīuʒ humorū ſimul: vt hic ītelligit Aui. ſʒ etiaʒ augmētum humoꝝ maius q̄ʒ in corpore ꝯuenit eſſe vt ſanguis: huiuſmodi eniʒ augmēto cōuenit flobothomia.

Multitudo

UVA. BHSC. IyR_006_1

Sciaſ tm̄ hic vl/tra dicta magiſtri ꝙ declaratio flobothomie poſita ab Auic. nō ē ꝓpria ipſiꝰ diffinitio: qꝛ cōuenit alijs a declarato vt fluxibꝰ ſanguis ꝑ nares per menſtrua ꝑ emoroydas ⁊c̄. ſed ē quedā ſuꝑficialis notificatio quaꝫ ſic potes ſi uis quodāmodo ad equare diffinito. Flobothomia eſt euātio vniuerſalis multitudinē humoꝝ euacuans ꝑ apertōeꝫ vene cuꝫ lāceola certa intentiōe aperiēdi eam que multitudinē humoꝝ euacuat ⁊c̄.

Multitudo auteꝫ eſt augmentuꝫ humoꝝ ſuꝑ equalitateꝫ ipſorum in venis.

Nunc notificat vnū vocabulū in deſcriptiōe poſitū: dicēs ꝙ multitudo ē humorū augmētū ſuꝑ equalitatē in venis. Pro parte nota ꝙ augmētū ſupra equalitatem pōt intelligi dupl͛r. Uno mō ſuꝑ equalitatē. i. ſuꝑ equam quātitatē humoꝝ cōſimili ꝓportione ſeruata: vt quātum augeť flegma tm̄ augeť ſanguis ꝓportional͛r: ⁊ ſic ꝺ alijs: ⁊ tale augumētū diciť vera plectoria cui vere cōuenit flobothomia cū farmacia nō poſſit has quattuor ſuꝑfluitates euāre vel humores. 2° per tale augmentuꝫ intelligere poſſumꝰ augmētū ſupra equalitateꝫ. ſ. debite ꝓportionis adinuicē humorū: ⁊ huic multitudini aliqn̄ cōpetit flobothomia: aliqn̄ farmacia. Sanguīe eiꝫ ſolo augmētato per ampliꝰ nō ē ſibi appropriata farmacia: ſed cōuenit flobothomia. Alijs aūt humoribꝰ exauctis nō peccāte ſanguīe ſolū cōuenit farmacia. Flobothomia enim nō cōuenit qꝛ ⁊ ſi peccantē educat humorē nimium euābit de ſanguine. Primo ergo intelligit Aui. multitudinē tāquā illā cui appropriať flobothomia. Scđo diceret quis cuꝫ hūores ſūt extra venas quare Auic. dixit multitudinē humorū ī venis? Eſt breuiter dicēdū ꝑ° ꝙ hic loquutus ē de multitudine cui cōuenit flobothomia. talis aūt ē ml͛titudo humorū in venis cū euet a venis: ideo tantuꝫ de humoribꝰ venarū loquutꝰ ē: qm̄ humores exn̄tes extra venas cū ſint ꝑter naturā facti ſunt potius educēdi farmacia. Qꝺ vero mutētur ꝑter naturā ſaltē ſanguinis: pꝫ 6ª affo. cōmēto illius affo. Si in vētrē ſanguis effundať ꝑter naturā neceſſe ē in ſaniē ɔuerti. Hic tm̄ nota ꝙ lꝫ flobothomia īmediate euacuet a venis vt dictuꝫ eſt ex cōſequēti tamē inanitis venis pōt euacuare materiā extra venas ipſa intrāte venas: vt colligiť tertia quarti de cura heriſipile ⁊ 4° ꝺ regimine ſanitatis ad finem.

Et nemo quidē ē flobothomādus niſi vnus duorū: Unꝰ eoꝝ ē egritudinibꝰ ꝑparatꝰ: qui cū ipſius ſanguis multiplicatꝰ fuerit cadet in eas: ⁊ alter ē cadēs in eas. Unuſquiſqꝫ aūt eorū aut flobothomať ꝓpter ſanguīs multitudinē: aut ꝓpter ipſiꝰ maliciā: aut ꝓpter vtrūqꝫ.

Nunc ponit ſpālia iuuamēta tangendo cāſ ī quibus cōuenit flobothomia. Et diuidiť ī duas. Prīo Aui. tāgit duos gnāles cāus ī quibus cōuenit flobothomia. 2° ſpecificat dicta ſua: ibi ⁊ his quidē. Prima in duas. Naꝫ primo facit qꝺ dictū eſt. 2° tangit cāſ quare illa corꝑa ſunt flobothomāda. ibi 2ª: vnuſqſqꝫ autē. De ꝑª dicit ꝙ nullus flobothomať niſi ꝗ eſt aptꝰ cadere ī morbos ſanguine eiꝰ multiplicato: aut qꝛ actual͛r hꝫ morbū ꝓ cuiꝰ cura egemus flobothomia: ⁊ cuilibꝫ illoꝝ ɔuenit flobothomia: aut ꝓpter ſanguinē multū aut ꝓpter maliciā eius ſuꝑple qualitatiuā aut ꝓpter vtrūqꝫ. Pro parte nota ꝙ cū flobothomia ſit quedā euātio ipſa reſpicit repletionē. Cuꝫ vero oīs repletio ſit aut quo ad vaſa aut quo ad virtuteꝫ: vt ſumiť 2ª primi ca° de his ꝗ ꝓueniūt ex repletōe. ⁊ 2ª affo. cōmēto 17°: iō flobothomia aut ſit ꝓpter ſanguinē multū: ⁊ ſit ꝓpter repletionē quo ad vaſa: aut ꝓpter maluꝫ ſanguineꝫ: ⁊ ſit ꝑꝑ repletionē quo ad virtutē: aut ꝑꝑ vtrūqꝫ vtraqꝫ ɔcurrente repletōe. Scđo nota ꝙ cū repletio ſit remouēda: aut qꝛ ledit leſiōe ſenſibili vel iſenſibili ꝑter nām: vel etiā qꝛ ſit leſura: iō flobothomia ſit vel ꝓpter corpora actual͛r egra vel parata cadere in morbos: ſiue ſint neutra decidētie: ſiue ſana nūc: ſiue multū lapſa. Uere antē ⁊ ꝑfecte ſanis vtētibꝰ ꝑfecto regimīe n̄ ɔuenit flobothomia: īmo exercitiū ⁊ fricatiōes: vt colligiť 3ª primi ca° de exercitio.

Dubitatur an quis ſit flobothomādus ꝗ nō ſit flobothomādus ꝑꝑ multū ſanguinē ⁊ maluꝫ?

Affirmatiue arguiť auctoritate Aui. 3ª q̄rti ca° de cura flegmonis. ⁊ auc͞te Gal. 13° de ingenio ſanitatis. c. ij. vbi vult ꝙ cū moderatōe exn̄te ɔuenit flobothomia. Scđo ſic: alicui non egēti flobothomia ɔpetit flobothomia: ergo ⁊c̄. Cōſeq̄ntia nota: qꝛ oīs ꝗ flobothomať nō flobothomať ꝑꝑ ſanguinē ml͛tū ⁊ maluꝫ: tm̄ eget flobothomia. Añs pꝫ ꝑ dicta īferiꝰ illo ca° vt ꝗ hꝫ apa. Ad oppoᵐ ē Aui. Rn̄dēduꝫ ꝙ oīs ꝗ flobothomať: flobothomať ꝑꝑ ſanguinē multuꝫ ⁊ malū ꝑ͛cipal͛r exn̄tē ī ꝑte aut futuꝝ eſſe. Ex quo ſolunť obiecta qꝛ ꝑcuſſiōe aut caſu corpore exn̄te tꝑato lꝫ nō ſit repletio ī toto: qꝛ tm̄ futura ē ī ꝑte ꝑꝑ māꝫ fluentē: iō cōuenit flobothomia. Sic ēt dicēdū ꝙ aliqs nō egēs flobothomia. ſ. ꝑꝑ ſanguis repletiōem: eget tm̄ flobothomia ꝑꝑ futurā repletōeꝫ aut apationē maiorē ī ꝑte. vel 2° dicēduꝫ ꝙ oīs flobothomia ꝑ quā ītendiť euātio ⁊ abſolute hūoꝝ remotio ſit ꝑꝑ alterā cāꝝ. Illa tm̄ ꝗ ſit cā diuerſiōis nō neceſſario ſit ꝓpter aliqꝺ iſtoꝝ exn̄s ꝑ͛cipal͛r: ergo dicēduꝫ Aui. hic loq de ꝑª. de 2ª vero ɔcludūt argumēta.

Et his quidē egritudinibꝰ preparatꝰ ē ſicut qui ē expoſitꝰ ſciatice ⁊ podagre fortibꝰ ⁊ artetice ſanguīeis: aut ille cui accidit ſputuꝫ ſanguineū ex fixura vene ꝗ in pulmone eiꝰ exiſtit tenuiter ɔſolidata: qm̄ cū ipſiꝰ multiplicabiť ſanguis findeť: ⁊ apti epilepſie ⁊ apoplexie ⁊ melācolie cū ſanguis multitudine: ⁊ ſquinātie ⁊ apatibꝰ interioꝝ ⁊ obtalmie calide: ⁊ ex eis quibus emoroidaꝝ ſanguis qui fluere ſolebat ē retētꝰ: ⁊ mulieribꝰ quibꝰ menſtruꝰ ſanguis ē reſtrictꝰ. hoꝝ tm̄ colores nō demōſtrant ꝙ flobothomari debeāt ꝓpter ipſoꝝ obſcuritatē aut albedinē aut viriditatē. ⁊ illi qui ī iterioribus mēbris cum ɔpl͛one calida debilitatē patiunť. nā iſtis meliꝰ ē vt ī vere minuanť lꝫ ī has nōdū inciderit egritudines.

Superiꝰ numerauit Auic. corꝑa quibꝰ flobothomia ē ɔueniēs in gnāli explicādo cāſ ꝓpter quas flobothomāť: nunc determīat magis ī ſpāli alioꝝ corporū tangēdo diſpōnes ꝓpter quoꝝ ꝑuiſionē oꝫ nos facere flobothomiā. Et cōtinet hec pars ꝑtes duas. Primo facit qꝺ dictū ē. 2° penes flobothomiā cōꝑat corꝑa ad inuicē actual͛r egrotantia ⁊ egrotatura. 2ª ibi: ⁊ debes ſcire. Prima ī duas. Prīo tāgit corpora quibus debeť flobothomia ꝑuiſiua ꝑ quā magis intēdimꝰ remouere repletionē. 2° quibꝰ magis cōuenit flobothomia diuerſiua. ibi 2ª: ⁊ illis. Prima in duo. ꝑ° facit qꝺ dictū ē. 2° tāgit cōueniētē horā flobothomie. 2ª ibi: nā iſtis meliꝰ ē. Prima in tot quot cāus ⁊ morbos explicat ꝑꝑ quos ꝑmittere debemus flobothomiā. Sine partiū aſſignatiōe dicit ꝺ toto ſic: ꝙ ꝑatus his morbis. ſ. ꝑꝑ quos oꝫ ꝑmittere flobothomiā ne accidat in morbos ē ille qui ē paratus ſciatice podagre ⁊ artetice. Et cāus ſcđs ē ille cui accidit ſputū ſanguinis ꝑꝑ rupturam vene debiliter cōſolidate ī pulmone. eius eniꝫ multiplicato ſanguine vena ſcindiť. Itē flobothomādi ſunt illi ꝗ ſūt apti apoplexie: epilepſie: melācolie cū ſanguīe multo. Itē apti ſquinantie apatibꝰ īterioribꝰ ⁊ obtalmie calide. Item cōuenit flobothomia his quibꝰ ſanguis emoroidalis ſolitus fluere reſtrictus ē. Itē mulieribꝰ quibus ſanguis mēſtruus ē reſtrictus conuenit flobothomia quāuis colores horū corpoꝝ ī quibus ſanguis ē reſtrictus nō on̄dant huiuſmodi corpora flobothomāda eē ꝓpter eorū obſcuritatē albedinē aut viriditatē. Itē habētes debilitatē in mēbris interioribꝰ cū calida cōpl͛one egēt flobothomia. Dicit vltimo ꝙ melius ē flobothomare illa corꝑa ī vere dato ꝙ n̄ ſint egra his morbis. Ad intellectū partis nota ꝙ flobothomia cōuenit aut ſolo peccāte ſanguine ex ꝑte quātitatis: aut alijs peccantibꝰ humoribꝰ: ſed ſanguīe principaliꝰ vel alijs peccātibꝰ humoribꝰ principal͛r ⁊ peccante ſanguine. Prīo ꝙ in his oībus ɔueniat flobothomia notatū eſt: vñ ſtāte peccato ſanguini ſꝫ vnāquāqꝫ febrē ɔuenit flobothomia vt ſumiť xj° terapētice. Ad ꝓpoſitū flobothomia ꝗ cōuenit ꝑuiſiōe morboꝝ in ꝑte dictoꝝ ē aut rōne primi: aut ſcđi: aut tertij ſꝫ ꝙ ſtatiꝫ diceť ī ꝑte. Propterea ⁊ ſcđo notādū ꝙ artetica ē nomē gnāle ad podagrā ⁊ ſciaticam. Nā artetica quaſi articuloꝝ paſſio. In ſcia aūt ⁊ in pede ſunt articuli. Paſſio tm̄ podagrica ⁊ ſciatica dici pn̄t artetice. Arteticas tm̄ ab alijs articulis pedū ⁊ ſcie dearticulauit Aui. paſſiōes. Tertio nota ꝙ duplici intētiōe cōuenit flobothomia. Nā primo, ex quo paſſiones venture ſunt aut debēt eē ſanguinee cōuenit flobothomia vt euacuetur ſanguis qui aptus erat facere hos morbos. Itē qꝛ hi morbi erāt futuri fortes cōuenit flobothomia ne ꝓpter fortitudinē morboꝝ trahať multa mā ſanguinea fortaſſe apatura illa mēbra. Et notāter dictum ē ſanguineis: qꝛ ſi ſint ex mā alia nō ſanguinea vel nō peccāte ſanguine nō cōuenit qꝺ poniť in ſcđo can̄. vt notatū ē. Sed ꝓpter 3ᵐ nota ꝙ flobothomia nō cōuenit qꝛ principal͛r peccet ſanguis vt colligiť ex parte: ſed qꝛ cū pc͞to ſanguinis ē ēt peccatuꝫ alioꝝ humorū. Hic tm̄ iungēdū ē ꝙ ſi alij peccēt humores cū ſanguine ⁊ nō recedūt multū a nā ſanguīs cū ſint educibiles ꝑ flobothomiā ɔuenit flobothomia. Si vero multū recederēt a nā ſanguinis ⁊ cū hoc eēt peccatū ſanguīs: nō cōpeteret flobothomia niſi ratione ſanguīs peccantis.

Ulteriꝰ notādū ꝙ in patiētibꝰ reſtrictionē emoroidaꝝ aut ēt mēſtruoꝝ color non indicat de flobothomia ſuꝑple neceſſario: īmo pallēt aliqn̄ ꝓpter ebetationē calidi nālis: aut ēt humoribꝰ exiſtētibus difformibꝰ in mulieribus vt aliqui ſint ad exteriora ⁊ aliqui ad interiora. Nā color corporis humoꝝ dn̄iuꝫ on̄dit ſi nō intus accubuerūt. ſ. diuerſi: vt pꝫ ꝑ° affo. cōmento 2° auctoritate Hypo. Ex quo īfertur dum volumus facere flobothomiā non eſſe tantuꝫ attendendum ad colorē corporis ⁊c̄.

Dubitatur an habentes debilitātē ī mēbris interioribꝰ cū cōplexiōe calida ſint flobothomādi?

Negatiue arguiť. Debilitas ꝓhibet a flobothomia: ergo ⁊c̄. Cōſequētia nota cū añte: ⁊ colligiť añs pria affo. cōmento 3°. Propterea queritur ꝙ faciat compl͛o calida: ad hoc vt fiat flobothomia aut nō. Nā ſi ſit ſine mā nō indicaret vt fiat flobothomia. Ad oppoſitū ē Aui. Et breuiter dicēdū ꝙ per debilitatē intelligit ꝺbilitatē per viā aggrauatiōis ⁊ nō reſolutiōis que ꝓueniēs a cōpl͛one calida ꝓbabiliter on̄dit mām eē ſanguineā: eo ꝙ talis debilitas cū calida cōpl͛one nō prouenit ꝓbabil͛r a colerica mā: cuꝫ ꝑꝑ

UVA. BHSC. IyR_006_1

ſui ſubtilitatē ſm plurimū nō faciat hanc aggrauationeꝫ. Aut etiā 2° dicēdū ꝙ per debilitatē in īteriorib⁹ intelligit aliquē morbū debilitantē interiora: aut debilitatē ſequētē illū morbū cōiunctā male cōplōni calide tāquā fouenti illaꝫ debilitatē: in illo caſu ꝯuenit flobothomia vt euacuet̃ ſanguis ⁊ ꝓhibeat̃ fomētū talis debilitatis. Prima ſolō q: clarior ⁊ tutior teneat̃: ex qua pꝫ ſolō ad obiecta. ¶ Ulterí⁹ nota ꝙ he flobothomie poti⁹ dbēt fieri ī vere: q: tūc eliq̃ri ⁊ extēdi īcipiūt hūores: q: ēt illud tp̄s ē tp̄atū in quo corp⁹ ſuſtinere pōt eūones: gr̄a tñ curatōis coacte ⁊ nō ſic electiue: in alijs pōt flobothomia celebrari tp̄ibus.

Et illis quib⁹ ꝑcuſſio accidit aut caſus: qm̄ qñqꝫ minuunt̃ timēdo ne eis accidat ap̄a. ⁊ qui hꝫ ap̄a minuendus eſt: qm̄ timet̃ ne aperiat̃ anteq̃ꝫ maturet̃ lꝫ nō indiguerit ⁊ nō fuerit ibi multitudo.

¶ Nunc Aui. tāgit caſus ⁊ corpora quib⁹ magis flobothomia ꝯuenit gr̄a diſtractōis aut diuerſionis. Et duo facit ſm ꝙ duas tāgit cās. ibi 2ª: ⁊ qui hñt ap̄a. De pª dicit ꝙ flobothomia ꝯuenit his quib⁹ ꝯtingit ꝑcuſſio aut caſus timēdo ne apoſtemet̃ corp⁹ ſm aliquā partē. Dicit 2° ꝙ habēs ap̄a qñqꝫ ē minuēdus ne aperiat̃ ap̄a anteq̃ꝫ maturet̃ lꝫ non egeat flobothomia ⁊ non ſit multitudo ſanguinis.

¶ Pro pte nota ꝙ quāuis ꝑcuſſus aut q cecidit actualr̄ ñ egrotet: tñ flobothomia ꝯuenit ī iſto caſu ꝓuidēdo corp⁹ a morbo quo egrotaret: iō pōt dici flōmiā fieri in corpore nō actualr̄ egrotāte ꝓpter morbū q ſit ſi nō flobothomabit̃. ¶ Scd̄o nota ꝙ illa flobothomia nō ſit gr̄a eūonis: q: ſupple ſit repletio ſanguīs ī toto aut in pte: īmo ī tp̄ato vt allegatū ē 10° terapētice 2° ca°. Fit aūt gr̄a diuerſionis q: diuertēdo mãꝫ ne currat ad locū ꝑcuſſionis. ¶ Ulterius nota ꝙ quāuis hñs ap̄a actualr̄ egrotet: nō tñ ſit flōmia gr̄a p̄ntis morbi: ſꝫ ꝓuidendo ne mã multa fluat ita ꝙ mã multa extēdente mēbrū: aut mã multū opprimēte virtutē vt ipſa nō valeat digerere mãm: īmo oportebit apire ap̄a. ¶ Ulteri⁹ nota ꝙ lꝫ corp⁹ nō egeat flobothomia ꝑꝑ replōnē actualr̄ exñtē ꝯuenit tñ flōmia non gr̄a eūonis ꝓprie ſꝫ gr̄a diuerſionis mãe ne ad locū ap̄atuꝫ fluat.

Et dbes ſcire ꝙ dū iſte egritudies timent̃ ⁊ nōdū in eas ceciderit plus ſecure eis ꝯcedit̃ miutio. ⁊ cū ī eis ceciderit ī eaꝝ prin°: penit⁹ flōmia dimittat̃ q: hūores ſubtiliat ⁊ eos ꝑ corp⁹ fluere facit ⁊ eos ſano ſanguini admiſcet. Et ē ēt cū nihil eūat̃ ex eo qd̄ oꝫ ⁊ facit ꝙ neceſſaria ſint medicamēta alleuiātia. Cūqꝫ maturatio apꝑuerit ⁊ egritudo p̄cipiū aut ſtatuꝫ p̄terierit: tūc ſi oportuerit vt miutio fiat: ſi nō fuerit qd̄ ꝓhibeat fiat flobothomia.

¶ Nūc ponit ꝯparationē īter corꝑa parata ad morbos ⁊ q̃ iciderūt in morbos ꝑenes flobothomationē: dicēs ꝙ tu debes ſcire ꝙ dū enumerati morbi timent̃ qui tñ nōdum aduenerūt ſecuri⁹ ꝯcedit̃ flobothomia. qñ vero venerūt ī prin° hoꝝ flobothomia dimittat̃ penitus q: ſubtiliat humores ⁊ facit eos fluere ꝑ corp⁹ ⁊ ꝯmiſcet eos ſano ſanguini: ⁊ ꝯtigit ēt ꝑ ipſaꝫ nō eūari illud qd̄ neceſſariū erat euacuare: ⁊ facit neceſſaria eē medicamēta alleuiātia. Si vero apparuerit digeſtio ⁊ morbi p̄terierit p̄cipiū ⁊ ſtatuꝫ: tūc ſi flobothomia ſit neceſſaria fiat ſi non eſt ꝓhibēs.

Sed dubitatur vtruꝫ flobothomia

ſit magis ſienda ante aduētū morbi q̃ꝫ qñ aduenerūt morbi? Arguit̃ ꝙ ſic. Neceſſitas eſt tūc flobothomie: ergo ⁊c̃. Conſequētia nota: q: maiore exñte neceſſitate remedij: remediū plus ē applicādū. pꝫ añs cuꝫ morb⁹ actualr̄ neceſſitet ad ipſaꝫ exequēdā. 2° ſic arguit̃: ante aduentuꝫ morbi ſit flobothomia ꝑꝑ morbū euitādū: ergo tp̄e morbi deberet fieri ad remouēdū: ⁊ ſic dꝫ magis fieri cū ipſe aduenit cū maior ſit neceſſitas remouere morbū q̃ꝫ ꝓuidere ne eueniat. Ad pteꝫ oppoſitā ē Aui. ¶ Pro dubio pº notādum ꝙ corpora anteq̃ꝫ īcurrāt dictos morbos hñt virtutē ꝯſtātiorē cū debilitent̃ poſtea ex morbis. ¶ Scd̄o nota ꝙ ēt añ īcurſus morboꝝ hec corpora hñt ſanguinē min⁹ malignatū dū ēt īcurrūt hos morbos eoꝝ ſanguis plus malignat̃ ⁊ corrūpit̃. ¶ Tertio nota ꝙ hec lr̄a plus ſecure pōt exponi duplr̄. Uno mō ꝯponēdo ly plus cū ly ſecure vt ſit ſenſus plus ſecure. i. ſecurius. Alio mō apponit̃ iſti dictōi ꝯcedit̃ flobothomia vt ſit ſenſus ꝯcedit̃ plus ſecure flobothomia. i. flobothomia āplior. Iſto poſito pª ꝯclō eſt hec. Securi⁹ ꝯcedit̃ flobothomia añq̃ꝫ hec corꝑa īcurrāt morbos q̃ꝫ poſt. Cōclō ꝓbat̃ ſic. nã tūc virt⁹ eſt ꝯſtātior ⁊ virt⁹ āplior: ergo tūc plus ſecure ꝯcedit̃ flobothomia. Añs cū ꝯña ꝯtinet euidētiā. Ex pª infert̃ 2ª ꝯclō. Qd̄ āplior flobothomia ꝯcedit̃ iſtis: pꝫ ꝑ pªᵐ ⁊ 2ªᵐ ꝓbatōes. ¶ Ad primū obiectū dicēdū ꝙ q̃ꝫuis tp̄e morbi ſit maior neceſſitas: q: tñ nō ſic ꝯſentit virt⁹ nō ita ſecure poſſum⁹ facē flobothomiā. vel poſſum⁹ dicere ꝙ dū ſanguis eſt malignat⁹ ⁊ corrupt⁹ nō eſt tāta neceſſitas flobothomie ſicut ante.

Dubitatur an in p̄cipio morbi cōueniat flobothomia?

Primo ꝙ ſic arguit̃ auctē Hypo. 2ª affo. affo. 29°. Incohantib⁹ morbis ⁊c̃. Scd̄o auctē Aui. ī preſenti. c. vbi vult ꝙ p̄parare ē meli⁹. Tertio auctē Aui. ī pª quarti. c. de cura putridaꝝ ī gnāli cū dicit: Et cū poſt ponitur flobothomia nō ē ei amplius intētio quaſi velit ꝙ a principio ē fiēda. 2° arguit̃ rōne ſic: in principio horum morboꝝ mã pōt eē multa ⁊ furioſa: ſed tunc faciēda ē flobothomia vt p̄ia quarti de cura putridaꝝ ī gnāli. 3° ſic: flobothomia cōuenit his corporib⁹ antequā incurrāt egritudines igit̃ ⁊ in principio. Añs in lr̄a ponit̃: ꝯña tenet q: ſicut mã nō ē digeſta ī p̄cipijs morboꝝ ita nec ante. In oppoſitū ē Aui. ¶ Pro dubio nota hic ſumi principium ꝓut ē vnū d̄ quattuor tp̄ibus morbi: in quo nō apparent ſigna manifeſte digōnis ſed occulte: quō ſumit Gal. p̄ia affo. cōmento 12° illius affo. Paroxiſmos ⁊ ꝯſiſtētias declarant ⁊c̃. 2° ē p̄mittēdū flobothomiā eē duplicē: q̃ꝫdaꝫ mãm peccantē eūantē que dicit̃ eradicatiua: quādā auteꝫ minorātē que dicit̃ minoratiua. Iſto poſito prima ꝯclō ē hec. In principijs horū morboꝝ nō cōuenit flobothomia faltē eradicās regulariter. Cōcluſio arguit̃ ſic: in p̄cipijs horū morboꝝ mã ſanguinea ē corrupta ⁊ malignata: ⁊ humores nō ſunt digeſti: ergo ꝯña colligit̃ p̄ia affo. cōmēto 2° ⁊ prima quarti. c. de cura putridaꝝ in gnāli. Añs ex dictis cōtinet verū. Scd̄a cōclō ſi mã ſit furioſa nō ē inconueniēs in principio eūare. Colligit̃ ꝯclō ex locis allegatis. pª igit̃ cōclō ſit pro textu. Ex p̄ia cōcluſiōe pꝫ differentia īter flobothomiā exhibēdā añquā īcurrāt morbos ⁊ poſtquā incurrūt: q: āte quā incurrūt morbos ꝓpter p̄dictas cās amplior cōpetit flobothomia. Iſta ſit 3ª cōclō. In principio hoꝝ morboꝝ pōt minoratiua ꝯpetere flobothomia. pꝫ cōclō per vnū obiectū: q: multā mãm cōtiugit eē ſanguineā. Iſtis ꝯcluſis pōt patere ſolō ad obiecta. Nã p̄io ad affo. rñdēdum ē ꝙ in principio nō ē minorandū: ⁊ hoc nō ē cōtra lr̄am. Ad ſcd̄m ⁊ tertiū dicit̃ ꝙ in morbis ſanguineis in quibus nō ē malignatio ſanguīs: ſꝫ ſolū ex pte quātitatis peccatū: a principio cōuenit copioſior flobothomia: in ꝓceſſu ꝓpter ſanguis maiorē malignationē ⁊ maiorē debilitatē virtutis cōuenit minor flobothomia: iō cū poſtponit̃ flobothomia nō āplius ē ad eā intentio q̃ ſupple erat a principio. Intēdebas eniꝫ ⁊ poteras eradicare: nūc malignato ſanguine virtute ēt debilitata nō pōt eradicari. Alia rō ꝓbat ꝯclōnē ſcd̄aꝫ. ¶ Ad vltimū dicēdū ꝙ antequā incurrāt morbos ſanguis ē digeſtus: ſed nō ē malignatus ⁊ corruptus ſicut in morboꝝ principijs. ¶ Tertio nota ꝙ hec pars penit⁹ duplr̄ pōt exponi aut cōponi. pº cū hac lr̄a dimittat̃ vt ſic dicat̃ penitus. i. ex toto dimittat̃ flobothomia eradicatiua. 2° pōt cōponi cū flobothomia ⁊ ē ſenſus dimittat̃ flobothomia totalis ⁊ eradicatiua. ¶ Quarto nota ꝙ cū flobothomia agitet ⁊ ꝯmoueat humores eos cōmouēdo ⁊ extēdēdo ſubtiliat ⁊ eos agitādo facit fluere per corp⁹: iō cōmiſcet eos ſano ſanguini cū etiā a principio ſint indigeſti ⁊ recedētes a nã ſanguis cōtingit euacuare bonos malis remanētibus.

Clarior ac tutior eēt cōcluſio iſta 2ª ſi diceret̃ ſic. ſ. ꝙ ī principio egritudinū ſanguineaꝝ vel quarum mãe ſanguini ſūt admixte nō dantiū iduciās medico donec natura ſeipſaꝫ recolligat materiaꝫ digerat ⁊ malum a bono ſepet: flōmia cōpetit nō ſoluꝫ minoratiua ſed ēt interdū eradicatiua. ⁊ huic ꝯſentiꝫ Hyp. ī quarta particula affo. affo. illo: Medicari in valde acutis ſi ꝯuenit eadē die: differre eiꝫ in talibus malū. Et etiaꝫ Gal. in ꝯmento hui⁹ ⁊ in p̄ia particula ī cōmento illius affo. Que egerūtur ⁊c̃.

Dubitatur an flobothomia ſit fiēda

poſt ſtatū? Negatiue arguit̃ ſic. nã eūat in ſtatu: ergo medicus dꝫ in ſtatu eūare. ꝯñtia tenet ꝑ Aui. ī p̄ia quarti. c. de cura putridaꝝ in gnāli. Et ſi nã nō mouet moue tu ī hora motus eius. pꝫ añs cū nã facit criſim ī ſtatu, vt colligit̃ ſcd̄a quarti. Scd̄o in declinatiōe nã ſuperat morbū: ergo ⁊c̃. añs notū ⁊ cōſequētia tꝫ: q: tūc nã impediret̃ in tali ſuperatione. Ad oppoſitū ē Aui. ¶ Pro dubio nota ꝙ per ſtatū poſſumus intelligere ſtatū quo ad accidētia ⁊ ſtatuꝫ quo ad digōnē mãe. Tūc dicēdū ꝙ poſt ſtatum quo ad accidentia cōuenit flobothomia, cū nō ſint intenſa: ⁊ materia pōt eē digeſta. Scd̄o dd̄m ꝙ ī augmēto quo ad digōnem mãe humorib⁹ nō multū recedētib⁹ a nã ſanguinis pōt cōpetere flobothomia: cū tunc ſit peccatū ſanguīs ⁊ ſint humores educibiles per flobothomiā. ¶ Nota vlteri⁹ ꝙ in declinatiōe ſi nã nō bñ eūauit pōt fieri flobothomia vt euacuetur reſiduū mãe. In ſtatu aūt melius ē nãm dimittere oꝑari ſi apꝑet ꝙ poſſet euacuare. ¶ Et nota ꝙ prohibēs a tali flobothomia pōt eſſe: debilitas virtutis aut etas decrepita aut etiam etas valde parua aut aliquod accidens proſternens virtutem ⁊c̃.

Flobothomia quoqꝫ neqꝫ eūatio vētris ē faciēda in die mot⁹ egritudis q: ē dies requieſcēdi ⁊ īquirēdi ſomnū ⁊ dies ebullitōis egritudis. Et cuꝫ egritudo ē habēs criſiꝫ ī cui⁹ tp̄e ē lōgitudo: nullo mō ſanguis mult⁹ ē minuēdus. ſꝫ ſi poſſibile fuerit quies ē faciēda. ꝙ ſi nō fuerit poſſibile vt quies fiat: ex eo paꝝ minuat̃: ⁊ ī corpore ſanguis theſaur⁹ recōdat̃ ad flobothomiā faciēdā ſi apparuerit ⁊ virt⁹ ꝯſeruet̃ ad reſiſtēduꝫ in criſib⁹.

¶ Nunc ponit cañ. attēdendos in flobothomia rōne ei⁹ qd̄ euacuat̃: ⁊ tot facit quot cañ. ponit. ¶ Dicit pº ꝙ flobothomia nec eūatio alia eſt faciēda ī die mot⁹ morbi q eſt dies qeſcēdi ⁊ q̃rēdi ſomnū ⁊ dies ebullitōis morbi. ¶ Secūdus cañ. eſt ꝙ cū egritudo ē hñs criſiꝫ ⁊ ē lōgi tp̄is nullo mō eſt ſanguis mult⁹ eūandus: īmo ſi ē poſſibile dimittatur

UVA. BHSC. IyR_006_1

taṫ flobothomia. ⁊ ſi nō: pax ſanguis euaṫ ⁊ recondaṫ ſan
guis vt theſaurꝰ ad faciēdū flobothomiā cū fuerit neceſſa
ria: ⁊ reſeruetṫ virtꝰ ad reſiſtēdū ipſis morbis ī criſibꝰ.

Circa primum dubitatur an in die

motus egritudinis ſit euacuādū? Affirmatiue arguitur
auctoritate Auic. pͣ quarti. c. de cura quartane: vbi con/
cedit fieri vomitū ī die ꝑoxiſmi. Etiā medici hoc volunt.
2° in die ꝑoxi. nā euat: ergo ⁊ medicꝰ debet euare. tenet
ꝯña q: ars imitaṫ nām. pꝫ añs quarta ꝑticula affo. illo af/
fo. 36°. ſ. ſudores febricitanti ⁊c̄. 3° ſic: in die ꝑoxi. mā eſt
habilior expulſioni igiṫ ⁊c̄. ꝯña nota de ſe. pꝫ añs cū ſit agi
tata mā ⁊ cōmota per inſtantiā morbi. 4° in die ꝑoxi. po
teſt euari mā cōiuncta morbi: ⁊ nō ita in die quietis: ergo
⁊c̄. Tenet ꝯña q: cū mā ſit res ꝑter naturā valde indicat ꝺ
ſui remotiōe. añs pꝫ q: tunc ē valde agitata ⁊ cōmota. Ul
timo ſic: in febre cōtinua cōcluſa vel nō cōcluſa in febre ēt
quottidiana ⁊ in pluriū febriū cōplicatiōibus oī die ſit pa
roxiſmatio ⁊ afflictio: ⁊ tū cōuenit euatio vt notū ē: igitur
⁊c̄. añs ē notū cū tota cōſequētia. Ad oppoſitū ē hic cañ. ⁊
Aui. prima quarti. c. de cura putridarū ī gnāli. ¶ Pro re/
ſponſiōe nota q per diē motus egritudinis duo poſſumꝰ
ītelligere. Primo diē criſis qui ē velox ⁊ vehemēs motꝰ
morbi cū īfirmus ad ſalutē aut mortē perduciṫ: vt colligiṫ
2ͣ affo. cōmēto 13°. Itē 2° poſſumus intelligere diē exacer
batiōis. In hoc enim die morbus ē intēſior. hec ergo di/
es pōt dici dies motus egritudinis. ¶ Itē nota q febriū
quedā dicūtur īterpolate ⁊ quedā cōtinue. Et cōtinuarū
quedā dicūtur ꝓportionales cōtinue: que quāuis cōtinue
īfligant: ī affligēdo tū ꝓportionē ſeruāt magis affligēdo ꝺ
die 3° in 3ᵐ. Quedā vero dicūtur cōcluſe ⁊ vniformiter af
fligentes corpora: ita vt nō notabilis excreſcentia appare/
at aut diuerſitas. ¶ Itē nota q flobothomie hora eſt du
plex: quedā electiua: ⁊ quedā coacta. Electiua ē qua quis
eligit flobothomiā eē fiēdā cū apparētibꝰ iuuamētis ⁊ no
tabili nocumēto ſecluſo. Illa diciṫ coacta qua cogimur fa
cere flobothomiā lꝫ grāde ſequaṫ nocumētū. hoc tū faci/
mus ꝑeligēdo iuuamētū ⁊ ꝓuidēdo grandiꝰ nocumētum.
¶ Iſtis notatis poniṫ pͣ ꝯcl'o. In die criſis medico ꝯpre
hēdente nām facturā criſim nō dꝫ medicus euacuare aut
flobothomare. Probaṫ ſic cōcl'o: q: hec eſt dies qeſcendi
⁊ querēdi ſomnū ⁊ ebullitōis morbi vitāde: ergo nō ē mo
uendū. Tenet ꝯña quātū ad añs primū ⁊ 2ᵐ. quātū ad 3ᵐ
tenet ꝯña q: fl'omia aut alia euatio ē cā maioris ebullitio/
nis. Añs pꝫ pͦ quo ad primā partē. Nā dies criſis ē dies
maioris quietis: qñ eniꝫ nā ītendit expellere māꝫ morbi oꝫ
īfirmū qeſcere ne īpediaṫ nā: oꝫ ēt querere ſomnū vt calor
nālis fortificeṫ quo vt inſtrumēto poſſit nā depellere mor/
buꝫ. Et criſis ē ēt dies ebullitōis. Añs pꝫ per diffinitionē
criſis. ¶ Scd'a ꝯcl'o: in die criſis nā nō naturalr̄ operante
nō etiā ꝑ ꝯuenientē regionē euante nō eſt īconueniēs flo/
bothomare aut aliter euare. Cōcl'o ꝓbaṫ ſic: ex tali opera/
tōe nocumētū grande euitaṫ: ergo ⁊c̄. Conſequētia nota ⁊
pꝫ añs. Naꝫ pͦ ſi expellaṫ ſanguis ſupfluus ꝑ os aut ſiat
fluxꝰ ſanguis nariū nimiꝰ nō eſt īcōueniēs flobothomare
venā īferiꝰ vt diuertaṫ ſanguis ⁊ non ſuperfluat euatio.
¶ Tertia ꝯcl'o: in die ꝑoxiſmatiōis aut exacerbatiōis re/
gulr̄ nō eſt flobotomandū aut euandū farmaco ſatis forti.
Probaṫ: q: ī tali die virtꝰ debilitaṫ a morbo ⁊ ebullit mā
morbi ⁊ agitaṫ: ergo ⁊ tales euones nō ſūt fiēde. Cōſequē/
tia nota q: adderetṫ debilitas debilitati: ⁊ tūc nimis ebul/
liret mā. ¶ Quarta ꝯcl'o: aliqñ coacte ī die ꝑoxiſmi eſt flo
bothomādū aut euandū. Pꝫ ꝯcl'o: q: ex hoc aliqñ euitaṫ
mors potēs ꝯtingere ex ſuffocatōe ⁊ ꝯſimili. ¶ Quīta cō/
cl'o: aliqñ tꝑe afflictionū coacte oꝫ nos euare aut flobotho
mare. Pꝫ ꝑ rōnes añ oppoſitū vt in ꝯtinua ꝯcluſa aut in
ꝯtinuis ꝓportōalibꝰ aut in febribꝰ ꝯplicatis ita vt nūquā
īfebriēs maneat corpꝰ. ¶ Nota tū q faciēdo flobothomiā
aut aliā euonē ī his febribꝰ debemus ſeruare horā. nā in
ꝯtinua ꝓportōali flobothomare debemꝰ ī die minoris affli
ctōis. Et qñ eſt febriū ꝯplicatio: tunc flobothomāduꝫ aut
euandū ē in horis remiſſioris afflictōis. Qñ ēt ē febris cō/
cluſa: tūc ī hora minoris caloris flobothomādū ē. Ad rō/
nes añ oppoſitū pꝫ ſol'o. Pꝫ pͦ de quotidiana ⁊ cōplica/
tōe pluriū febriū. De vomitu ī quartana dicēdū q hoc fit
coacte. nā q: tūc mā melācolica ē mobilior ⁊ aptior exitui:
iō tūc illo tꝑe eſt expellēda vomitu. ¶ Ad aliā rōeꝫ cuꝫ di
ciṫ mām eſſe mobiliorē dico q cū hoc ſtat ipſaꝫ nō eē aptā
motui ad exteriora. vel diciṫ: q quāuis ſit mobilis nocu/
mēta ſequerenṫ ſi euareṫ rōne debilitatis nāe. Silr̄ nocu/
mēta ſequerenṫ ſi euareṫ cā ꝯiuncta. ¶ Ad aliā duꝫ diciṫ
nā euat: ergo ⁊ medicus. Negaṫ ꝯña. nā nā meliꝰ regulat
euoneꝫ ne hoc corpꝰ ducaṫ ad malā ebullitōeꝫ vbi duce/
retṫ ꝑ flobothomiā aut farmaciā. Ad ꝓbatōeꝫ ꝯñtie medi/
cus dꝫ imitari nāꝫ. Dico q dꝫ ī hoc imitari: q: euare talē
mām ⁊ talr̄ q̄leꝫ ⁊ qualr̄ euaret nā operans naturalr̄: nō tū ī
quocūqꝫ ī quo euat natura dꝫ medicꝰ euare: igiṫ ⁊c̄.

Dubitaṫ an dies criſis ſit dies que

rendi ſomnū? Ad affirmationē ē hic Aui. ad negationē eſt
Gal. 2ͣ particula affo. cōmento prio. ¶ Pro dubio nota
q per ſomnū intelligit hic Aui. quietem quo ad accidētia
aīe: ⁊ ē ſenſus lr̄e q in die ꝑoxiſmi dꝫ corpus quieſcere: q:
nō mouendū motibꝰ corporeis dꝫ etiaꝫ dormire: q: ſtare
quietus ⁊ ſedari ab oībꝰ accidētibꝰ aīe ac ſi dormiat ne ꝑ
accidētia aīe debiliteṫ ⁊ inflāmeṫ. Aut dd'm q talis ē di/
es querendi ſomnū nō in quocūqꝫ tꝑe ſed tꝑe declinatōis
vt velit q illa nō ē dies agitatiōis in qua dꝫ fieri reſtau/
ratio per ſomnū ⁊ nō debilitas per euationē. Qd' vero in
dclinatiōe cōueniat ſomnꝰ: pꝫ ī ꝯmēto allegato. Ad Gal.
dd'm q nō cōuenit ſomnꝰ ī principio ꝑoxiſmi: imo nō cō/
uenit niſi in declinatiōe. ¶ Ulterius nota q morbus ha/
bet criſiꝫ lōgi tꝑis: nō q: ciꝰ criſis lōgo tꝑe duret: ſꝫ q: lō
gū tꝑs ē añ ciꝰ euentū. ¶ Ulterius nota q talis morbus
habēs criſim longi tꝑis ē morbus de mā groſſa frigida: iō
in ciꝰ principio nō ē minuēdus multꝰ ſanguis ne debiliteṫ
valde virtꝰ: imo cōſerueṫ ſanguis vt qñ mā fuerit digeſta
⁊ obediens expulſiōi poſſit fieri flobothomia copioſa. Etiā
reſerueṫ ſanguis vt virtus maneat ⁊ criſi lōgo tꝑe reſiſte/
re poſſit. In morbo vero acuto q: materia ē habilior eua/
cuationi ⁊ criſis ē breuis: nō curando tātū de virtute: flo
bothomiam facere poſſumus.

Qd' ſi multū preterierit tꝑis ex quo quis minutꝰ fue
rit ⁊ in hyeme fuerit ꝯqueſtus q ſe quaſi fractuꝫ ſentiat
minuatur ⁊ ſanguis ꝓ theſauro recōdatur.

¶ Nūc Auic. ponit cañ. oñdēdo neceſſitatē flobothomie
⁊ eius quātitatē: ⁊ dicit q multo tꝑe elapſo ex quo qs flo/
bothomatꝰ ē ſi cōqueſtus ē q quaſi hyeme ſe ſentiat fra/
ctū tūc fiat flobothomia ſanguine ꝓ theſauro recondito.
¶ Nota q ex parte ꝑiti cōcipiṫ neceſſitas flobothomie:
ex quo eniꝫ multū tēpus ē q nō ē facta flobothomia. Cor
pore etiā vſo regimine multiplicante ſanguinē: aut cōſue/
to vti bono regimine imaginamur eē multū ſanguinē eua
cuandū flobothomia. Scd'o cōcipiṫ quāta flobothomia ē
fiēda dū vult ſanguinē eē recōdēdū tanquā theſaurū. nā
in hyeme cū humores ſunt cōgelati nō multū de ſanguie
auferēdū ē. Tertio colligiṫ ſignū aliud ex parte ꝑ qd' com
prehēdere poſſumus ſanguinis abundātiā. nā confractio
apparēs poſt dimiſſionē flobothomie notat ſanguinē abū
dantem ⁊ corpus frangenteꝫ.

Sciēdū ē q ꝯfractōes ſpōtanee mēbror̄ nō ꝓue nientes ab exercitijs: morbos denūciant eē vēturos iuxta illud Hypo. ſecūda affo. affo. illo: Labores ſpōtanei narrāt morbos. qui labores ſi tenſiui fuerint ſignificāt multitudinē humor̄: vt vult Gal. quarto de regimie ſanitatis capl'o. xiiij. parapho illo: Tēſiuꝰ labor cuꝫ ſine exercitio cōſiſtat ⁊c̄. Sꝫ ſi iſti labores inflatiui ſint ſiue apoſtemoſi neceſſario īdigent flobothomia: vt etiā vult ibidē Gal. capl'o. xv. parapho illo: Inflatiuus ſpontaneus labor ⁊c̄.

Amplius q: flobothomia ꝓpterea q ad diuerſum
trahit naturā ſm plurimū retinet.

¶ Nūc ponit aliū cañ. dicens q q: flobothomia trahit
ad diuerſam ꝑtē: ſupple parti per quā fit ſol'o: iō ꝯſtrīgit
vētrē aut fluxū vētris ſꝫ plurimū. Sꝫ circa hoc ē dubiū.

Dubitatur an flobothomia cōſtrin

gat ventrē? Qd' nō arguiṫ aucte Gal. pria affo. ꝯmēto 23°
in fi. cōmenti: vbi vult q pluries poſt flobothomiā ſoluiṫ
venter ⁊ accidit ſudor. Ad ꝑtē oppoſitā ē Aui. hic. ¶ Pro
dubio ſunt tenēda duo. Primuꝫ flobothomia hꝫ de ꝑſe
cōſtringere vētrē. Pꝫ cōcl'o ex textu ꝓ quāto ſol'o ven/
tris cōtingit mā tracta verſus inteſtina ⁊ interius. Flobo
bothomia aūt euat trahēdo mās magis verſus circūferē/
tias. Quia ergo trahit ⁊ diuertit ad partē cōtrariā: iō de
per ſe habet ꝯſtrīgere vētrem. ¶ Scd'a ꝯcl'o: flobothomia
per accidēs hꝫ ſoluere vētrē. ꝓbaṫ q: pōt ad flobothomi/
cam ſequi aliqd' accidēs ad qd' ſequiṫ ſol'o ventris: igiṫ ⁊c̄.
ꝯña nota quantū ad modū loquēdi medicorū: ⁊ pꝫ ꝑ añs.
nā facta flobothomia ⁊ exonerata virtute aliquātulū pōt
virtus cōfortata ſuperare mām ⁊ expellere ipam ꝑ fluxuꝫ
ventris. Itē poſſibile ē q per flobothomiā debiliteṫ vir/
tus ⁊ cōtingat ꝓpter iſtā debilitatē fluere ventrē. Ex ꝑdi/
ctis prio inferṫ q cōſtrictio vētris ꝓhibet a flobothomia.
pꝫ ex quo flobothomia hꝫ cōſtringere ventrme. 2° inferṫ
q fluxus vētris qñqꝫ ꝓhibet a flobothomia: q: cū natura
euetur ꝑ fluxū vētris: flobothomia nō cōuenit ne īpediaṫ
ſol'o vētris. Et hoc ſm illatū tangit Aui. 10ͣ tertij tractatu
5°. c. de cura pleureſis ad finē dū dixit q aſſellatio oī die
bis vel ſemel excuſat a flobothomia. Iſto poſito pꝫ intelle
ctus Gal. ꝑ cōcl'onē ſecūdā qūo flobothomia retinet flu/
xū vētris nālē ſꝫ plurimū: pꝫ per textū.

Cūqꝫ ex multa minutione debilitabiṫ virtus multi
generabūtur humores.

¶ Nūc ponit aliū cañ. dicēs q virtute debilitata ex flo
bothomia multi gnābunṫ humores. ¶ Pro parte nota q
virtute debilitata ex multa minutiōe virtute digeſtiua nō
potente debite digerere nutrimentū generabuntur multi
humores ſuperfluentes.

Sincopis ꝑterea accidit ī prima minutōe cuꝫ ſubito
euenerit ei qui nō ꝯſueuit: ſꝫ vomitū ꝑmittere ē ex eo qd'
eā ꝓhibet: ⁊ ſilr̄ vomere hora q̄ accidit. Et ōbes ſcire q
minutio eſt perturbās donec quieſcat.

¶ Nūc ponit aliū cañ. dicēs q ſincopis ex ſubito facta
flobothomia accidit corpori nō cōſueto: ſed facere vomitū
ante flobothomiā ꝓſeruat ab hoc accidēte. Facere ēt vo/
mitū hora qua accidit ſincopis curat ipam ſincopim. Di/

UVA. BHSC. IyR_006_1

citˀ vlteriꝰ ꝙ tu. debes ſcire flobothomiā perturbare do/
nec quieſcat. ¶ Nota tñ pro parte ſincopiꝫ qñqꝫ cōtinge
re incipiente flobothomia ꝓpter debilitatē ſtomaci. Naꝫ
ꝓpter flobothomiā facta ampliori debilitate cātur ſinco/
pis. Itē defluēte colera ad os ſtomaci agitata per flobo/
thomiā cōtingit ſincopis. Itē ſi fuerit aliquis humor ī ore
ſtomaci: vt colericus aut cōſimilis: ille cōmotꝰ ⁊ agitatus
ꝑ flobothomiā erit cā ſincopis. Iteꝫ pōt fieri ſincopis ꝑꝑ
ſuperfluitatē flobothomie vt ē euidēs. Ad ꝓpoſitū ī corꝑe
nō cōſueto ꝓpter timorē ⁊ terrorē ⁊ cōmotionē circa ſto/
macū pōt cōpetere vomitus. Itē in ſincopi ꝓpter debili/
tatē ſtomaci meliꝰ ē exhibere bucellā panis infuſam ī vino
granatoꝝ aut agreſta. In ſincopi vero ꝓpter cōmotioneꝫ
humorū ꝯuenit vomitus. ¶ Nota vlterius ꝙ illa turba/
tio cōtingēs ex flobothomia durat donec quieſcat corpꝰ:
quieſcant etiā humores agitati per flobothomiā. ¶ Item
nota ꝙ q: in fluxu ſanguinis ex vulnere magno ē dolor ve
hemens: ſanguis ēt a parte fluit nec agitatio fit circa inte/
riora: iō non ita cōtingit ex fluxu ſanguinis ex vulnere ma
gno ſincopis ſicut ex flobothomia. Si querať quare ſtri/
cto foramine fit ſincopis ⁊ nō ante? Cā ē q: qñ ſanguis flue
bat: tunc humores ⁊ mā ēuabanť. Stricto auteꝫ foramine
non diuertiť amplius ⁊c̄.

Flobothomia quoqꝫ ⁊ colica raro ſimul eueniūt.

¶ Nunc Aui. ponit aliū cañ. dicēs ꝙ flobothomia ⁊ co
lica raro ſimul eueniūt. ¶ Pro parte nota ꝙ hic duplex
lr̄a repiť. Una dicit colica: alia dicit colerica. Si dicit co/
lica verificať ꝑs iſto mō. Nā paſſio colica ꝯtigit plurimū
ex flegmate aut vētoſitate groſſa: iō ſm plurimū flobotho
mia nō ē neceſſaria. Pōt tñ qñqꝫ ꝯtigere ex calido āpate:
iō flobothomia ꝓ diuerſione mãe a fluxu eſt ꝯueniēs ma/
xime ſanguinea exñte mā. Itē raro ēt ꝯuenit flobothomia
exñte fluxu vētris cū nā ēuat ſufficiēter ꝑ fluxū vētris ma
teriā: aliqñ tñ vbi vellemꝰ diuertere ipſaꝫ a fluxu ventris
ꝯuenit flobothomia. Littera q̄ dicit colica ē melior ⁊c̄.

Pregnās preterea ⁊ mēſtruata nō minuanť niſi pro
pter magnā neceſſitatē ſicut ē neceſſitas retinēdi forteꝫ
ſanguis ſputuꝫ cuꝫ virtus fuerit cōueniens.

¶ Nūc Aui. ponit aliū cañ. dicēs ꝙ p̄gnās ⁊ mēſtruata
non flobothomeť niſi ꝑꝑ neceſſitatē multaꝫ: ſicut ꝯſtante
virtute ꝯuenit flōmia ꝑꝑ retinere fluxuꝫ ſeu fortē ſputum
ſanguis. ¶ Nota ꝙ flobothomia nō ꝯpetit regulr̄ in pre/
gnāte timēdo aborſuꝫ: aut ꝑꝑ diminutōeꝫ ſanguinis: aut
agitatōeꝫ ⁊ ꝯmotōeꝫ quā facit flobothomia. Cā vero ſu/
miť 5ª affo. ꝯmēto 24°. Propter neceſſitatē tñ p̄gnās ali/
qñ minuēda ē vt euitemꝰ aborſuꝫ ⁊ mortē matris: vt ſi mu
lier fuerit multū repleta ſanguīe ⁊ valde carnoſa cuiꝰ vene
late ſūt in hoc caſu ſequiť aborſus ꝑ viā ſuffocatōis aut ꝑ
viā fractōis ligamenti ꝑꝑ repletōeꝫ mēbri. Iteꝫ ſi mulier
habuerit ſputū ſanguīs itēſuꝫ faceremꝰ flobothomiā eui/
tādo maiꝰ nocumētū: ꝓpter quā ēt neceſſitatē mulier mē
ſtruata ē flobothomāda. Regulr̄ tñ mulier ſufficiēter mē
ſtruata nō ē flobothomāda ne addať debilitati debilitas.
Et vt nō diuertať mā a loco expulſionis qñ mā nō debite
ēuatur volēdo ꝓuocare āplius mēſtrua debemꝰ flobotho
mare ex ſaphena vt ſanguis trahať verſus matriceꝫ ⁊ ſe/
quanť mēſtrua: aut ēt ꝓ ſuperfluitatibꝰ ꝯuenit flobotho/
mia gratia diuerſionis ex baſilica facta.

Et debes ſcire ꝙ nō quotiēs noīata ſigna replōnis
apparuerit oꝫ vt minuas: iō qñqꝫ ē repletio ex hūoribꝰ
crudis: ⁊ ē tūc flobothomia multū īpediēs: qm̄ ſi minue
ris nō maturabis eos ⁊ timebiť ne eger perdať.

¶ Nūc ponit aliū cañ. dicēs ꝙ ñ qñcūqꝫ ſigna appent re/
plōnis oꝫ flōmare. Exñtibꝰ eiꝫ hūoribꝰ crudis flōmia īpe/
diret multū: vñ ſi facis flōmiā non maturabunť hūores ⁊
erit timor de ꝑditōe egri. ¶ Pro ꝑte nota ꝙ q̄uis replō
abſolute dicat plectoricā diſpōnē aut abūdātiā ſanguis q
p̄ ceteris plus repleť: ſumiť tñ repletio taꝫ ꝓ repletōe hu/
moris alteriꝰ a ſanguīe q̄ꝫ ēt ſanguīs ſicut ſumiť hic. Uult
ergo Aui. ꝙ nō ſemꝑ qñ ē repletio dꝫ fieri flōmia: q: qñ eſt
ex hūore crudo non dꝫ fieri. Eodē mō ſi repletio fuerit ex
hūore colīco multū recedēte a nā ſanguīs. Pōt tñ ītelligi
ꝑs hoc mō ꝙ exñte replōne ⁊ ſtāte peccato ſanguīs nō ꝯue
nit flobothomia copioſa ꝓpter cauſaꝫ aſſignatā.

Nō aūt ē īconueniēs vt ille ī quo mīa ſuperabūdat
minuať poſtea medicia ſolutiua ēueť. Sꝫ ſollicitꝰ eē de/
bes ex diſpōne coloris ſꝫ ꝯditionē quā nūc dicemꝰ ⁊ ꝯſi/
derare tēſionē: qm̄ ꝓpter tēſionē ꝑ totū corpꝰ īcedēteꝫ
magis eris ꝯfidens ꝙ flobothomare debes. Cuꝫ vero
ſāguis alicuiꝰ fuerit bonꝰ paucꝰ ⁊ fuerit ī ipſiꝰ corꝑe mul
ti mali hūores flobothomia bonū rapiet ⁊ maluꝫ relin/
quet. Et cū alicuiꝰ malus ſanguis fuerit paucus ⁊ decli/
nauerit ad mēbruꝫ aliqđ qđ eius declinatio vehemēter
īpedit ⁊ fuerit neceſſariū vt ipſe minuatur ex eius ſan/
guine paruꝫ erit aſſumēdum ⁊ cibo bono erit alendus:

deinde erit minuēdus iteꝝ poſt dies ꝓpterea vt malus
ſanguis ab eo extrahatur ⁊ bonus reſtaureť. Qđ ſi ma/
li humores colerici in eo fuerint ingenietur quatenꝰ ſub/
tili farmacia euacuētur aut vomitu aut vt ſedenť: ⁊ ſtu/
de ī hoc vt eger quieſcat ⁊ digerať ⁊ ocietur. Et ſi groſſi
fuerit antiqui p̄ceꝑerūt vt balneetur ⁊ ī ſuis miniſterijs
moueatur. Et dabāt ei ad bibenduꝫ ante flobothomiā
⁊ poſt ipſaꝫ anteq̄ꝫ alia fieret minutio ſirupuꝫ acetoſuꝫ
ſubtiliatiuū coctum cuꝫ iſopo ⁊ haſce.

¶ Nunc ponit cañ. dicēs ꝙ nō ē īcōueniēs vt ille ī quo
abundat melācolia flobothomeť: deinde ēuetur ꝑ medici/
nā ſolutiuā: attēto tñ colore corporis: attēta ēt corꝑis tē/
ſione: q: ꝑꝑ ipām per totū corpꝰ poteris magis cōfidere in
faciēdo flobothomiā. Deinde ponit aliū cañ. dicēs ꝙ ſan
guine alicuiꝰ exñte pauco: multis vero exñtibus malis hu
moribus flobothomia rapiet bonū ⁊ dimittet malū. Dicit
vlterius: Si ſanguis alicuius paucus ⁊ malus declinet ad
aliqđ mēbrū vehemēter impediēs ⁊ neceſſaria fuerit flo/
bothomia: modicuꝫ extrahať de ſanguine ⁊ nutriať bono
cibo: deinde minuať aliquātulū poſt aliquos dies: vt ma/
lus ſanguis extrahať ⁊ genereť bonus. Si vero humores
mali fuerint colerici: debes ingeniari vt educanť leui far/
macia ꝑ inferiora aut vomitu aut vt ſedenť in ſua malitia.
Stude etiā vt eger quieſcat ⁊ ocieť vt talis humor dige/
rať. Dicit vltimo ꝙ ſi humores fuerint groſſi: antiqui p̄/
ceꝑerunt iſtū balneari ⁊ iſtū moueri ad faciēdū ſibi neceſſa
ria. dabāt eniꝫ añ flobothomiā ⁊ poſt ſirupū ſubtiliatiuū
factū de iſopo ⁊ haſce ꝓ ꝑte. ¶ Nota p̄° q: dicit ꝙ abū/
dante melancolia ⁊ ſtāte pcc̄o ſanguinis minuēdū ē ꝓpter
peccatū ſanguinis: flobothomia ſalteꝫ minoratiua: poſtea
vero vt cōplete ēuetur melācolia ſuꝑabūdās: faciēda ē ſo
lutio ventris. ¶ Nota 2° quibꝰ ſignis cōprehēdimꝰ me/
lācoliā cū ſanguine ſimul peccare. Hoc eīm cōprehēdimꝰ
colore corꝑis ⁊ ſanguinis: ⁊ corꝑis apparēte tēſione. p̄° ex
colore ſanguinis ſi rubeus fuerit ad nigredinē tendens: ex
quo p̄dictoꝝ humorū ꝯprehēdamꝰ abūdantiaꝫ. Ex colore
etiā corporis ſi talis extiterit. Itē ex quadā tenſiōe appꝫ̄te
ī cute corꝑis: ⁊ maxime humoris plurimū extēdētis: quia
ſanguis denotať. ¶ Tertio nota ꝙ ſanguine exñte bono
⁊ pauco: plurimis vero exñtibꝰ malis hūoribꝰ flobotho/
mia rapiet bonū ⁊ dimittet malū. Bonū quidē capiet tā/
quā habilē expulſioni: nō quidem q: ēuat cligēdo bonos.
Malos vero dimittet tāquā ineptos expulſiōi. Ex quo ī/
feť ꝙ ī tali nō dꝫ fieri flobothomia: īmo potius farmaciā
eē exhibēdā. Et notāter dictū ē paucus: q: ſi ſanguis eēt
ſuꝑabūdans: flobothomia eēt cōueniēs: aut ſi ſanguis eēt
quātitatis tēperate: nō tantū nocumentū ſequereť ex flo/
bothomia ex parte incrudatiōis humoꝝ crudoꝝ: aut ebul
litionis humoꝝ colericoꝝ: quātūcūqꝫ ſanguine pauco exi
ſtente ⁊ malo ad aliqđ mēbrū tñ fluēte neceſſaria ē flobo/
thomia ſaltē ꝓhibēdo fluxū. Et q: ſanguis paucus ē ⁊ ma
lus rōne paucitatis paꝝ extrahēdū ē: ⁊ ratiōe malicie ille
nutriēdus ē cibo gnāte bonuꝫ ſanguinē: deinde minutio
fiēda ē vt paulatine malus educať ſanguis: ⁊ cōtinue bo/
no cibo nutriēdus ē: vt in iſto bonus ſanguis reſtauretur.

¶ Ulterius nota ꝙ ſi humores peccātes fuerint colerici:
⁊ ſupple ſi nō fuerit peccatū ſanguinis ⁊ fuerint educendi
per flobothomiā: p̄° educanť per farmaciā leuē: quia ſunt
obedientes motui ⁊ ēuatiōi. pro quāto ēt ſunt calidi: timor
eēt de nimia ēuatione ⁊ inflāmatiōe. ⁊ vomitu ēt ſunt edu
cendi: maxime ſi circa os ſtomaci extiterint. aut ſedandi
ſunt in ſua colericitate ⁊ caliditate alterando ipſos. Itē ſtu
dendū ē vt quieſcat eger ⁊ ocietur: vt talis humor colericꝰ
digerať: ī ꝓmptu ē cā. Oīa eīm iſta ſunt cā rehumectatio/
nis colere. ¶ Itē nota ꝙ balneū groſſis humoribꝰ exiſtē/
tibus ē cōueniēs: ī quo nō cōtrahať multa mora ſed modi
ca: vt fiat aliqua humoꝝ groſſoꝝ ſubtiliatio. Idē de ſiru/
po acetoſo dicēdū. Balneū aque multuꝫ calide: ī qua ma/
gna cōtrahiť mora nimiū agitando materias incōueniens
eſt. Idem de motu forti dicendum eſt.

Cuꝫ auteꝫ flobothomia neceſſaria fuerit cuꝫ debili/
tate virtutis cauſa febris aut alioruꝫ humoꝝ partire flo
bothomiaꝫ ſicut diximus.

¶ Nunc in parte iſta Aui. ponit aliū cañ. dicēs ꝙ flobo
thomia exñte neceſſaria cū đbilitate virtutis ꝓpter febres
aut ꝓpter humores alios: tu debes ꝑtire flobothomiā vt
dictū ē. ¶ Pro parte nota p̄° flobothomiā vt apparet ī
prin. capituli eē neceſſariā ꝓpter maliciaꝫ ſanguīs: aut eiꝰ
nimiā quātitatē: aut ꝑꝑ vtrūqꝫ ad quoꝝ quodlibet ſequiť
debilitas virtutis. ¶ Hic tñ notandū ꝙ debilitas virtu/
tis pōt intelligi tripliciter: aut debilitas valde intenſa oīo
ꝓhibēs flobothomiā: aut debilitas cōꝑatiua reſpectu vi/
goris qui cōiter dꝫ eē ī ēuationibꝰ obſeruandis: aut pōt eē
debilitas cōꝑando ipām ad vigorē tēpore ſanitatis exiſtē/
te. Hanc diſtinctionē ad preſens deduco ad ꝓpoſitū: q: đ
2ª debilitate intelligit Aui. ¶ Scđo nota ꝙ hec lr̄a cā fe/
bris aut alioꝝ humoꝝ pōt duplr̄ intelligi. Uno mō ꝙ hec
debilitas

UVA. BHSC. IyR_006_1

debilitas virtutis ꝯtingeret cā fe. aut alioꝝ humoꝝ a ſanguic. 2º pōt exponi cuꝫ flobothomia fuerit neceſſaria cauſa febꝛis: q: fe. fuerit de ſanguine: aut cā alioꝝ humoꝛum ſupple cuꝫ ſanguine peccantiū. ¶ Tertio nota ꝙ merito flobothomia eſt partiēda vt non ꝓſternat̄ virtus ⁊ vt etiā partita humoꝛ peccans educatur.

Amplius flobothomia ſtricta magis eſt cōſeruatiua virtutis: ſed tamē ſubtilem ⁊ claruꝫ interduꝫ ſanguineꝫ fluere facit: ⁊ ſpiſſuꝫ ⁊ turbidum tenet. Ampla vero velociter eſt ad ſincopim ⁊ magis operatiua in mūdificando ⁊ tardioꝛ ad cōſolidanduꝫ: ſed tamen eſt dignioꝛ ei qui ſecūduꝫ pꝛeſeruationē flobothomatur ⁊ in groſſis. Et amplaꝫ quidē efficere in hyeme eſt dignius ne cōgeletur ſanguis: ⁊ anguſtaꝫ efficere in eſtate eſt dignius ſi neceſſariuꝫ fuerit.

¶ Nunc Auic. aliū cañ. explicat: ⁊ dicit ꝙ flobothomia ſtricta ē magis ꝯſeruatiua virtutis: interduꝫ tñ ſubtileꝫ ⁊ claꝝ ſanguinē fluere facit: ſpiſſuꝫ ⁊ turbidū retinēdo. Ampla vero flobothomia citius facit ſincopiꝫ magis ꝺatiua in mūdificādo coꝛpoꝛa ⁊ tardioꝛis ꝯſolidatōis: dignioꝛ tñ coꝛpoꝛi pꝛeſeruādo dignioꝛ ēt in humoꝛibꝰ groſſis. Dicit ēt meliꝰ eſt facere flobothomiā amplā ī hyeme ne ſanguis congelet̄ ꝓpter ſtricturā ⁊ ſtrictā in eſtate ⁊c̄.

Dubitatur vtrum ſtricta flobothomia ſit magis conſeruatiua ampla?

Negatiue arguit̄ ſic: Per ſtrictā eūantur hūoꝛes ſubtiles ⁊ ſpūs: igit̄ ⁊c̄. Conſequētia nota q: his cōſeruat̄ virtus. añs tāgit̄ in littera. ¶ Scd̄o ſic: eūatio hūoꝛū ſubtiliū plus debilitat virtutē: igit̄ ⁊c̄. Conſequētia nota ꝓ tanto quia per ipam ſubtiles educūtur humoꝛes. Añs aūt ſumit̄. c. de humoꝛibus: igit̄ ⁊c̄. Ad oppoſitū ē Aui. ¶ Pꝛo dubio ſit hec pꝛīa cōcl'o. Ceteris paribꝰ per flobothomiā āplā plus de ſubtili humoꝛe eūatur ꝗ̄ per ſtrictā. Cōcl'o ē euidēs. nā ſubtilis hūoꝛ aut alius qualiſcūqꝫ facilius educit̄ per locū ampluꝫ ꝗ̄ ꝑ ſtrictū. ¶ Scd̄a concl'o: ſtricta fl'omia appꝛopꝛiat̄ humoꝛi ſubtili ſic: q: eūat humoꝛē ſubtilē ⁊ nō groſſum ī quātitate notabili. Hec ꝯcluſio nota ē. ¶ Tertia cōcl'o: ampla flobothomia: q: eūat groſſum hūoꝛē ⁊ ſubtilē: ita ꝙ alia ñ eūat niſi ſubtilē ipa groſſo humoꝛi dicit̄ appꝛopꝛiari. Hec cōcl'o euidēs ē. ¶ Ex iſtis cōcl'onibꝰ infert̄ concl'o rñſalis. Flobothomia ſtricta ē magis cōſeruatiua virtutis. Cōcl'o ꝓbat̄ q: ꝑ ipam minꝰ de ſpiritu ⁊ alijs vigoꝛātibꝰ virtutē eūat̄: vt pꝫ ex p̄habitis. Iſtis poſitis pꝫ ad obiecta rñſio. Pꝛobant eniꝫ ſtrictā ſubtiles humoꝛes plus eūare cuius oppoſitū dictū ē. ¶ Secūdo nota ꝙ notanter dictū ē interdū. nā talis eūat ſanguinē ſubtilem dupliciter. pº cōmixto ſubtili ⁊ groſſo per foꝛamē ſtrictuꝫ educet̄ ſubtile ꝑ qd̄ nō educit̄ groſſum. Itē ſubtili exñte ꝓpinquioꝛi foꝛamini citius ſubtile educet̄. vbi aūt eēt oppoſitū ꝙ groſſus eēt ꝓpinquioꝛ foꝛamini ꝑtialiter pꝛimo groſſus educeret̄.

¶ Tertio nota ꝙ ampla flobothomia cito eūans de ſpū ⁊ ſanguine cito etiā perducit ad ſincopim. ¶ Ulteriꝰ nota ꝙ etiā ipa magis oꝑat̄ in mūdificando cū ipa eūat groſſum ⁊ ſubtile. Tardioꝛis tñ ē ꝯſolidatiōis vt notū ē. ¶ Ulterius nota ꝙ coꝛpi p̄ſeruando ipa melioꝛ ē: q: multi humoꝛis magis eductiua: ⁊ q: ſibi vt foꝛtioꝛ āplioꝛ cōuenit.

¶ Ulterius nota ꝙ hec littera ī groſſis tripliciter exponi pōt. Uno mō ī groſſis. ſ. humoꝛibꝰ vt ſit ſenſus ꝙ ad euacuādū groſſos humoꝛes melioꝛ ē ampla eoꝝ eductiua. 2º mō in groſſis q: denſis ⁊ groſſis coꝛꝑibꝰ in quibꝰ oꝫ magnificare foꝛamē ne mā carnoſitatis obturet̄. 3º modo in groſſis. ſ. venis aut artarijs: ne etiā ꝓpter groſſitudinem ſue ſubſtantie foꝛamē obturet̄. pª expō eſt melioꝛ. ¶ Ulteriꝰ notādū ꝙ ī hyeme melius ē facere flobothomiā amplā vt ſanguis groſſus ⁊ ſubtilis melius educat̄: ne ēt ſanguis groſſus ⁊ ſpiſſus exñs ꝓpe foꝛamē cōgelet̄ a frigoꝛe hyemis. In eſtate aūt meliꝰ ē ſtrictā facere ꝓpter debilitateꝫ virtutis: ⁊ q: humoꝛes ſunt apti eductioni.

Cōuenit ēt flobothomia lati foꝛamis ī hyeme ne ſanguis ſubtilis exiēs per foramē anguſtuꝫ ad ſimilitudinē linee gracilis frigoꝛe deuictꝰ coꝛā foꝛamine ſtatiꝫ ꝯgeletur ⁊ exire non poſſit. nō ſic aūt vincitur ſanguis qui defluit per latū foꝛamē etiā q: maſſa humoꝛalis in hyeme nō ē apta effluere per ſtrictuꝫ foꝛamen. ⁊ dico hoc iuxta ſententiaꝫ Aui. ſcd̄a pꝛimi doctrina ſcd̄a ſūma pꝛima. c. vj. paraph̄o illo: Et hyems ē magis ꝯſtringens materias ⁊c̄. Et ſi vlteriꝰ legeris colliges cāꝫ ſtricti foꝛamis ī eſtate: quare ⁊c̄.

Flobothomādus pꝛeterea ſupinꝰ iaceat qñ flobothomat̄: qm̄ hoc eſt ꝯueniētius ad hoc vt ipſius cōſeruetur virtus ⁊ ne ei ſuperueniat ſincopis.

¶ Ponit aliū cañ. dicens ꝙ flobothomādus dꝫ iacere ſupinꝰ. Nā iſte ſitꝰ ꝯueniētioꝛ ē vt ꝯſeruet̄ virtꝰ ⁊ nō ꝯtingat ſincopis. ¶ Pꝛo ꝑte nota ꝙ ille ſitꝰ ꝗ̄rēdus ē ī coꝛꝑe ſano egro vel neutro. In coꝛꝑe aūt robuſto nō eſt ꝗ̄rēdus hic ſitus. ¶ Scd̄o reddēda eſt cā ꝑtis duas dimittēdo ꝗ̄s tetigit expoſitoꝛ. Naꝫ ſi coꝛpꝰ ſtat ſupinū ſtat ſupꝛa ſpinā ⁊ coꝛpoꝛis fundamētū: vñ ex hoc coꝛpꝰ non fatigat̄ ſicut ſi ſederet. Si aūt ſtaret cum coꝛpoꝛe deoꝛſum: pº non poſſet afferre bꝛachiū: ſtātibus ēt īteſtinis p̄ēſis ⁊ doꝛſo ītestina pꝛemēte non tāta ſtaret virtutis conſtātia.

In febꝛibꝰ aūt a minutōe cauēdū ē. ſ. ī his q̄ vehemētis ſunt calefactōis ⁊ inflāmatōis ⁊ in oībus non acutis febꝛibꝰ in ſui pꝛīcipio in die periodica.

¶ Nunc ponit Aui. quoſdā cañ. in flobothomia obſeruādos exñte fe. Et duo facit. Pꝛīo ponit quoſdā cañ. nō dearticulādo ſe multū ad febꝛes ſpāles. 2º cañ. ponit ſpecialē ī febꝛe ſinocha. ibi 2ª: in febꝛe autē. Itē duo facit. pº facit hoc. 2º quoddā ſpāle flobothomie explicat iuuamētū. ibi 2ª: multotiēs p̄terea. Pꝛīa ī duas. Pꝛīo facit hoc. 2º ponit quoſdā cañ. erroꝛis coꝛrectiuos. ibi 2ª: ⁊ ſūmoꝑe. Pꝛīa adhuc in duas. Nā pº tangit quedā ſigna quibꝰ cōpꝛehēdimꝰ ⁊ ſcimꝰ regulare flobothomiā. 2º quedā ſigna ponit ex ꝑte ſanguis. ibi 2ª: ampliꝰ ſanguis. Itē ꝗ̄ttuoꝛ facit. Pꝛīo ponit ſigna ex q̄litate moꝛbi. 2º docet modificare flobothomiā ex quodā accidēte in febꝛe ꝯplicato. 3º ponit ſignificatōes oñdētes flobothomiā eē fiēdam aut non ſūptas ex ꝑte cāe moꝛbi. 4º docet regulare flobothomiā ex ꝑte accñtis. ibi 2ª: in febꝛibꝰ. ibi 3ª: ⁊ ſilr oꝫ. ibi 4ª: diſpoſitionē. ¶ De pꝛima dicit ꝙ in febꝛibꝰ vehemētis calefactōis ⁊ iflāmatōis ⁊ ī oībus febꝛibꝰ nō acutis cauēduꝫ eſt a minutōe a pꝛīcipio ⁊ in die periodica.

Dubitatur an hec pars cōtineat veritateꝫ?

Negatiue arguit̄ ſic: In ſinocha ⁊ cauſone ꝯuenit flobothomia: ergo ⁊c̄. Cōſequētia nota q: ſunt vehemētis calefactiōis. Añs patet pꝛima quarti de cura putridaruꝫ. ¶ Scd̄o: in talibꝰ conuenit īfrigidatio: ergo flobothomia. Cōſeq̄ntia tenet q: flobothomia īfrigidat. Añs pꝫ pª affoꝛiſmoꝛuꝫ affo. 23º ⁊ nono terapētice. ¶ Tertio auctoꝛitate Hypo. 4º regīs acutoꝝ: cū dicit acutas egritudīes flobothomabis. ¶ 4º in tertiana pura cōuenit flobothomia: ergo ī febꝛe acuta. Cōſequētia tꝫ q: ē moꝛbꝰ acutus. Ad oppoſitū ē Aui. ī littera. ¶ Pꝛo dubio nota ꝙ per febꝛes vehementis calefactiōis intelligere poſſumus febꝛes pēdentes a mā calida multa que plus mlta quātitate calefacit ꝗ̄ humoꝛe multū calido: ſicut ſunt febꝛes ſanguinee. Scd̄o ꝑ febꝛes magne calefactiōis ītelligere poſſumus febꝛes pēdētes a mā multū calida: ſicut pendentes a multa colera.

¶ Scd̄o nota ꝙ per febꝛes non acutas poſſumus intelligere moꝛbos longos cronicos qui ſunt de mā groſſa. poſſumus ēt intelligere moꝛbos qui nec ſunt acuti nec cronici: ſicut tertiana pura ⁊ effiª. ¶ Penes hoc ſit hec pꝛima cōcl'o: ī febꝛe multe inflāmatiōis mō pꝛimo cōuenit flobothomia. hec cōcl'o pꝫ ex nono terapentice. ¶ 2ª concluſio: in febꝛe multe inflāmatiōis mō 2º non conuenit flobothomia. hec ſit ꝓ mente Aui. ⁊ pꝫ q: hee febꝛes ſunt tāte iflāmationis vt cōſequat̄ vehemēs ſiccitas ⁊ ariditas coꝛpoꝛum: iō ſi fiat flobothomia copioſa nimia ſequit̄ inflāmatio ⁊ exiccatio. ¶ 3ª cōcl'o: in fe. multe inflāmatiōis ſtante peccato ſanguīs cōuenit flobothomia. hec cōcl'o pꝫ ī cauſone ex Aui. loco allegato. ¶ 4ª cōcl'o: in febꝛibus nō acutis: q: cronicis nō conuenit flobothomia ſaltē multa. Pꝫ cā ne ꝓſternat̄ virtus: ⁊ ꝑꝑ mām groſſam nō bene educibilē: ⁊ ꝓpter moꝛbi longitudinē. ¶ 5ª cōcl'o: ī moꝛbis nō acutis quāuis nō cronicis de per ſe ⁊ merito materieꝝ flobothomia nō cōuenit. Pꝫ cōcl'o cū materie taliū moꝛboꝛum ſunt alie a ſanguine. ¶ 6ª cōcl'o: in his moꝛbis ratiōe augumēti pōt flobothomia cōpetere. Pꝫ cōcl'o ſi peccēt alij humoꝛes cū ſanguine. ¶ 7ª cōcl'o: nec in cronicis nec in acutis cōuenit flobothomia ī die ꝑiodicatiōis eius paroxiſmali. Ex his pꝫ ſol'o ad obiecta per cōcl'onē pꝛimam. Ad pꝛimā partē obiecti pꝫ per tertiā ⁊ ſcd̄am cōcl'onē. Ad ſcd̄am rōem dico ꝙ flobothomia facta ſm̄ ſenſum pꝛime cōcluſionis refrigerat. facta vero ſm̄ ſenſum p̄ñtis cañ. īflāmationē cāt ⁊ ebullitionē. Ad aliā rōnē dicēdū ꝙ ī acutis moꝛbis cū peccato ſanguinis conuenit flobothomia vt vult 3ª cōcl'o. Ad alias rōnes pꝫ ꝑ penultīas cōcl'ones.

In febꝛibꝰ p̄terea cū quibꝰ aduenit ſpaſmꝰ ē a minutōe cauēduꝫ lꝫ fuerit neceſſaria: qm̄ cuꝫ ſpaſmus accidit vigilare facit ⁊ ſudare multū ⁊ deijcit virtutem quapꝛopter ſanguinis theſaurus eſt dimittēdus.

¶ Nunc ponit cañ. iſtū dicēs: Dato ꝙ flobothomia ſit neceſſaria vitāda ē tñ in febꝛibꝰ cū quibꝰ cōiūgit̄ ſpaſmꝰ. Nam facit vigilare ⁊ ſudare ⁊ debilitat virtutē: iō dimittēdus ē ſanguis vt theſaurus. ¶ Pꝛo parte nota vt colligit̄ 2ª tertij ſpaſmū eē triplicē. ſ. de inanitiōe ⁊ repletione ⁊ nō ꝓpoꝛtionatū ad māꝫ. In ſpaſmo de inanitiōe notū ē ꝙ nō cōuenit flobothomia āplius inaniēs ⁊ exiccās coꝛpus. ī alijs aūt ſpaſmis non cōuenit flobothomia: quāuis foꝛte eēt neceſſaria ꝓpter ſanguinis abūdantiaꝫ: eo qd̄ ꝑꝑ motū ꝯtinuū ſpaſmi ſequit̄ doloꝛ: ſudoꝛ: vigilatio: ad que oīa ſequit̄ magna virtutis debilittaio. Ne ergo addatur debilitas debilitati vitanda ē flobothomia regulr̄ quāuis coacte qñqꝫ oꝫ nos facere timēdo ſuffocationē. Iō reglr̄ teneat̄ ſanguis vt theſaurꝰ ⁊ foꝛtificās v̄tuteꝫ: igitur ⁊c̄.

Scias ꝙ ſpaſmꝰ facit vigilare: q: ꝯmouet vehemēter cerebꝛuꝫ vna cū febꝛe: pꝛouocat ſudoꝛem ex vehemētia doloꝛis ⁊ anguſtie in ꝯtractōe neruoꝝ cum febꝛili caloꝛe poꝛos aperiēte: deijcit etiā virtuteꝫ ex vigilijs ſudoꝛibus ⁊ doloꝛibus intēſiſſimis quos īfert. Scito vlterius ꝙ ſi ī ſpaſmo de repletōe ſine febꝛe ſigna dominij ſanguīs apparuerint cōuenit flobothomia: ſed minoꝛ ꝗ̄ ī egritudīnibꝰ alijs ſimilis repletiōis: vt vult Aui. ſcd̄a t̄tij tractatu pꝛimo. c. vij. paraph̄o illo: Et ſi tu videris ſigna ſanguinis dominātia maniſeſta valde: flobothoma ⁊c̄

Et ſilr̄ oꝫ vt ex minutōe febꝛicitātis cuiꝰ febꝛis nō eſt ex putrefactōe minoꝛatio fiat ꝓpterea vt ad reſoluēdū febꝛē theſaurus reliquat̄. Et ſi foꝛtis iflāmatōis nō fuerit ⁊ fuerit febꝛis putrida attēde decem regulas ⁊ poſtea ītuere ī vrinali. Et ſi vrina fuerit groſſa ⁊ rubedini attinēs: ⁊ pulſus ēt fuerit magnus ⁊ facies tumida ⁊ febꝛis

UVA. BHSC. IyR_006_1

in ſuo motu nõ ꝓperet: flobothoma ĩ hora qua ſtomacus a cibo ẽ vacuus. Et ſi vrina fuerit ſubtilis aut ignea aut facies a pricipio egritudinis fuerit tornatilis caue tibi a flobothomia. Qđ ſi iterpolatio in ea fuerit ⁊ quies febris in ipſa fiat minutio.

¶ In parte ꝑcedẽti Aui. docuit euitare flobothomiã ratione cuiuſdã accidẽtis cõplicati febri: nũc docet regulare flobothomiã rõne modi febris. Et duo facit. Primo facit qđ dictũ ẽ. 2° explicat q̃ſdaz ↄditões. ibi 2ª: ⁊ ſi fortis. De prima parte dicit ꝙ ſilr oꝫ minorare flobothomiã ĩ febricitante febre putrida vt theſaurus ſup. ſang. dimittat̃ ad reſoluẽdũ febrẽ: ĩ qua putrida febre ſi nõ fuerit fortis inflãmationis vt ſupple cõueniẽs fiat flobothomia decẽ regule ſunt attẽdende: que ſupra tacite ſunt capitulo 3°. ſ. qñ ⁊ qualr̃ euãare oꝫ. Quibꝰ attẽtis vide vrinã q̃ ſi fuerit groſſa attinens rubedini: ⁊ fuerit pulſus magnus: ⁊ facies tumida: ⁊ febris non ꝓperet in ſuo motu: hunc flobothoma hora qua ſtomacus ẽ vacuꝰ a cibo. Et ſi vrina fuerit ſubtilis aut ignea ⁊ facies a principio fuerit tornatilis tibi caue a flobothomia. Si aũt febris fuerit interpolata hñs quietem tũc flobothoma. ¶ Pro parte nota primo ꝙ hic duplex lr̃a reperit̃. Una affirmatiua dicẽs: ⁊ ex putrefactõe: ⁊ hec littera nota eſt q: ĩ pricipio fe. pu. maxime de mã alia a ſanguine paucior competit flobothomia q̃ȝ ſupple in fe. hu. ſine putrefactiõe: eo ꝓ° ꝙ cũ putrefactione virtꝰ ẽ debilior: ⁊ per ↄñs minorẽ ſuſtinẽs flobothomiã: ꝓpter putrefactionẽ ⁊ indiſpoſitionẽ materie eductioni ꝑ flobothomiã. Jõ attẽdẽdũ ẽ ne virtus debilitet̃: imo cõſeruet̃ ſanguis vt nã ſit potẽs ad reſoluẽdũ. i. remouẽdũ febrẽ digerẽdo ⁊ eius mãȝ remouẽdo. 2° reperit̃ littera negatiua dicẽs: ⁊ febris nõ ẽ ex putrefactione. Et ẽ ſenſus ꝙ febre exiſtente humorali ⁊ nõ ex putrefactiõe fiat paucior flobothomia q̃ȝ appareat fiẽda vt virtus nõ debilitet̃ fortiter: imo dimittat̃ ſanguis vt febris abijciat̃. Prima littera melior ẽ. de 2ª ẽ dubiũ. ¶ Scđo notãter dictũ eẽ ſi nõ fuerit vehemẽtis inflãmatiõis: q: ex cañ. dicto ſupra pꝫ nõ cõuenire flobothomiã in febre vehemẽtis inflãmationis ꝓpter cãm dictã. ¶ Tertio nota ꝙ vrina groſſa tẽdens ad rubedinem ſignificat ſupabundantiã ſanguĩs: ⁊ pulſus etiaȝ magnꝰ ſignificat ſupra fortẽ virtuteȝ: ⁊ facies etiã tumẽs ſignificat virtũtis fortitudinẽ. His igit̃ apparentibꝰ flobothomia faciẽda ẽ cũ denotet̃ ſanguĩs abũdatia. ¶ Quarto nota ꝙ hic adhuc duplex reperit̃ littera. vna dicit ⁊ nõ ꝓperet: alia aũt ẽ affirmatiua. Negatiua melior ẽ. Et intelligit̃ illo mõ ꝙ ſi febris nõ ꝓperet in ſuo motu. ſ. cretico q: nõ fit. ſ. actualr̃ criſis nec de ꝓpinquo futura ẽ fieri: tũc flobothomia nõ cõueniret ne impediat̃ virtus: aut ẽt non ꝓperet in ſuo motu paroxiſmali. Properãte enim fe. in paroxiſmo nõ ẽ minuẽdum. Ex dictis pꝫ cã. Si aũt littera ſit affirmatiua põt exponi iſto mõ q: ſit citi motus: q: acuta febris ⁊ cõtinua: tũc illis obſeruatis cõditionibꝰ cõuenit flobothomia. ¶ Ulterius nota ꝙ per faciẽ tornatilem itelligit. A. macrã faciẽ ⁊ excarnatã cuius color tẽdit ad cineritiuȝ ⁊ aſſimilat̃ faciei mortue: tunc denotat̃ debilitas virtutis: q: illic non ſit ſpiritꝰ neq̃ȝ ſanguis. Cũ ergo vrina apparente ſubtili aut ignea facie ẽt a pricipio morbi apparente tornatili colerica mã denotet̃ ⁊ debilitas virtutis a flõmia cauẽdũ ẽ. Quare aũt in die quietis iterpolate febris ſit fiẽda minutio ⁊ nõ ĩ die paroxiſmi: nota ẽ cã ex dictis.

Et iuxta hãc litterã negatiuã intellige eẽ duplex genus febriũ nõ putridaꝝ in quibꝰ ↄpetit flobothomia. Primũ eſt effimera ex oppilatiõe: ⁊ pro hoc vide Gal. octauo de ingenio ſanitatis. c. iiij. parapho illo: Neceſſe ẽ vt ad ſinuemus nãm ⁊c̃. Scđz ẽ ſinocha inflatiua ſine putredine quã de genere effimere reputat Galienꝰ nono eiuſdẽ. c. v. parapho illo: Reuertor igitur ad primã intentõez ſinoche ⁊c̃.

Diſpõneȝ quoq̃ȝ tremoris ↄſidera: qñ cum tremor fuerit fortis a minutõe tibi cauẽdũ erit. Amplꝰ ſanguinis qui egredit̃ colorẽ attẽde: ⁊ ſi fuerit ſubtilis albedini attinẽs ipſuȝ illico retine. Et ſũmope tibi caue ne egruȝ ad vnam duarũ perducas reruȝ. ſ. humorũ colericoruȝ ebullitioneȝ ⁊ frigidoꝝ cruditateȝ.

De hoc etiaȝ meminit Auic. pria quarti tractatu ſcđo. c. vij. parapho illo: Cũ ergo exerces euãoneȝ: tũc ↄſidera horã interpolatõis ⁊c̃. Et ſubdit: ⁊ nõ euacues per fluxũ vẽtris ĩ die ꝑiodi neq̃ȝ flobothomes. Et cã dicti põt eſſe quadruplex. Pria q: hora quietis virtꝰ fortior eſt ad tollerãtiam flobothomie. 2ª q: facta tali hora getis non ſic perducit ad eſtuationẽ ⁊ ebullitioneȝ ſicut ſi fieret hora paroxiſmi. 3ª q: periculoſuȝ ẽ ſimul ſuſtinere debilitatem que a paroxiſmo ẽ ⁊ que a flobothomia. 4ª q: in paroxiſmo iterpolate febris mã mouetur a venis vbi ẽ ad mineraȝ febris: ⁊ flobothomia ſi tũc fieret hãc retraheret ĩ venas: ⁊ de iterpolata forte ↄtinuaȝ efficeret febrẽ: quare ⁊c̃.

¶ Nũc ponit aliũ cañ. docẽtem vitare flobothomiã rõe alterius accidẽtis: dicẽs ꝙ cõſiderare debes tremoreȝ: q: tremore exñte forti cauẽdũ ẽ a flobothomia. Cõſideres ẽt colorẽ ſanguinis egredientis ꝑ flobothomiã. Nã ſi fuerit ſubtilis attinens albedini ſtatim retine ipm̃ ne fluat: vnde ſũmope caueas tibi ne egrũ ꝑducas ad alterã duarũ rerũ ſ. humorũ flegmaticoꝝ cruditatẽ aut colericoꝝ ebullitõꝫ. ¶ Pro parte nota ꝙ tremor põt dici fortis: aut q: valde intenſus: aut q: valde longus. Si ſit intenſus tunc cãtur a materia colerica acuta mordaci diſperſa ſupra ſenſibile mẽbrũ in quo nõ cõuenit flobothomia cũ mã ſit colerica a ſanguie ſeparata. Si aũt ſit tremor fortis q: valde lõgus: q: ꝓpter talẽ tremorẽ fortẽ debilitat̃ virtus ne debilitas iungat̃ debilitati oꝫ cauere a flobothomia. ¶ Ulteriꝰ nota ꝙ ſi ſanguis ſit ſubtilis attinẽs albedini: denotat̃ ipſuȝ atteſtari flegmati: ⁊ ſic ẽ a minutiõe cauẽdũ. Si ẽt ſit ſubtilis ⁊ citrinitati attinẽs: tũc ẽt nõ cõuenit flobothomia. ¶ Ulterius nota ꝙ ſicut colericꝰ humor non tẽpatꝰ cum ſanguine vel per ſanguinẽ tãquã ꝑ frenũ ducẽdo ſe ad calorẽ intẽſiorẽ ebullit: ſic etiã flegmaticꝰ hũor nõ tẽꝑatus a calido ꝑ partes fridas ⁊ terreas veniẽdo ad ãpliorẽ frigiditatẽ incrudat̃. ¶ Ulterius nota ꝙ ſtante peccato illoruȝ humorũ ⁊ nõ ſanguis a minutiõe ſiue flõmia cauẽdum ẽ.

Cũq̃ȝ in febre te oportebit flobothomare nõ attendas qđ quidã dicũt. ſ. ꝙ nõ eſt bonũ vt poſt quartuȝ dieȝ fiat: qm̃ bonũ eſt vt fiat etiã ſi ſit poſt quadragita dies: ⁊ hoc ſꝫm ſentẽtiã Gal. lꝫ premittere ⁊ preparare ſit melꝰ cũ ſignificatões certe fuerit. Qđ ſi ĩ hoc erratũ fuerit quacũq̃ȝ hora iueneris egruȝ ⁊ oportuerit flobothoma ipꝫ poſtq̃ȝ decẽ reꝝ ſollicitudinẽ habueris. Multotiẽs preterea flobothomia ĩ febribus licet neceſſaria nõ ſit efficit vt natura fortis fiat ſuper materiã ꝓpterea ꝙ eaȝ efficit paucã: ⁊ hoc quideȝ cum fuerit figura ⁊ etas ⁊ virtus ⁊ reliqua talia vt permittãt.

¶ Nunc ponit aliũ cañ. dicẽs ꝙ cũ in febre egeas flobothomia nõ attendas dictũ quorũdã dicẽtiuȝ flobothomiã nõ eſſe fiendã poſt diẽ quartã. Nã bonũ eſt eam ẽt facere poſt diẽ quartã ſꝫm ſñiaȝ Gal. lꝫ premittere flobothomiã aut ipſaȝ ꝓperare ad faciẽdum ſit melꝰ appentibꝰ certis ſignificatõibꝰ. Si tñ errat̃ ſic ꝙ nõ ſit facta flobothomia ⁊ debeat fieri: quacũq̃ȝ hora videris ipſam neceſſariã fac: tñ ſollicitudinẽ hẽas decẽ reꝝ de quibꝰ facta ẽ mẽtio tãq̃ȝ de ſignificãtibꝰ euãoneȝ ca°. iij. de qñ ⁊ qualiter euãare oꝫ. ¶ Dicit 2° ꝙ lꝫ flobothomia multotiẽs nõ ſit neceſſaria in febre: facit tñ nãm potentẽ eſſe ſupra mãm paucificãdo materiã habitudine totiꝰ etate virtute ⁊ alijs ↄſentiẽtibꝰ flobothomie. ¶ Pro ꝑte nota ꝙ ſtãte peccato ſanguĩs q̃ȝto citiꝰ ſit flobothomia tãto melꝰ eſt: q: ſanguis ĩ ꝓceſſu magis malignat̃ ⁊ ineptior reddit̃ expulſioni eo ẽt ꝙ virtꝰ reddit̃ debilior. ¶ Scđo nota ꝙ ſtãte peccato ſanguĩs ceteris paribꝰ nõ ſolũ poſt quartũ diẽ eſt flobothomãdũ: imo mltotiẽs poſt 40ᵐ cũ iuuamẽtũ ſequat̃. Inimo multotiẽs in prin° nõ ↄuenit flobothomia ſꝫ in ꝓceſſu ſic: q: aliqñ in prin° hũores nõ ſunt apti educi ꝑ flobothomiã. In ꝓceſſu aũt pñt eẽ habiliores: q: ſanguis aptus educi ꝑ flobothomiã. ¶ Ulteriꝰ nota ꝙ lꝫ flobothomia mltotiens nõ ſit neceſſaria rõne febris vel rõe materie febris nõ ↄueniret flobothomia: q: tñ ſanguis eſt multũ grauãs virtutẽ: vt virtus reddat̃ potẽtior ſupra mãm digerẽdã ↄuenit flobothomia. Exẽpli cã vt ſiqs patit̃ tertianã cũ dñio ſanguis: tũc lꝫ in tertiana rõne ꝓprie mãe non ↄueniret flobothomia: rõne tñ ſanguis peccãtis vt nã reddat̃ potẽtior ſupra coleram: flobothomia ↄpetit. Itẽ ſuppoſito adhuc ꝙ mã ſanguinea nõ ſit multa: timore tñ ↄuerſiõis ſanguĩs ad nãȝ colere vt ſanguis euãetur ↄuenit flobothomia.

In febre autẽ ſanguinea neceſſe ẽ vt euãatio fiat minutõe nõ ſuperflua in pricipio ⁊ ſuꝑflua cuȝ affuerit maturatio febris que multotiẽs remouet̃ in hora flobothomie. Tibi quoq̃ȝ cauere debes a minutiõe in ↄplexione vehemẽtis frigiditatis ⁊ in regionibꝰ fortis frigiditatis ⁊ in hora fortis doloris ⁊ poſt balneũ reſolutum ⁊ poſt coitũ ⁊ in etate que ẽ minor. xiiij. annis quãto plus poteris: ⁊ in etate ſenũ quãto magis poteris niſi in figura ↄfiſus fueris ⁊ in ſoliditate muſculoꝝ ⁊ venaruȝ amplitudine ⁊ earuȝ repletõe ⁊ colorũ rubedine. hos nãq̃ȝ ex adoleſcẽtibus ⁊ ſenibꝰ flobothomare audebis. Adoleſcentes tamẽ ſꝫm ordinẽ ad flobothomãduȝ paulatiȝ ꝓuehere debes cuȝ pauca minutiõe. In corporibꝰ quoq̃ȝ fortis maciei ⁊ fortis groſſitiei ⁊ raris ⁊ albis ⁊ laſſis ⁊ citrinis ſanguinẽ non habẽtibus a minutiõe tibi quantuȝ plus poteris cauere debes.

¶ In parte pñti Auic. ponit aliũ cañ. ſpãleȝ: dicẽs ꝙ in febre ſanguĩs neceſſaria eſt euãatio nõ ſuꝑflua in pricipio: ⁊ ſuꝑflua cũ apparet maturatio mãe febris q̃ multotiens remouet̃ ĩ hora flobothomie. Dicit vlteriꝰ ꝙ cauẽdũ ẽ a flobothomia in ↄplõne multũ frida ⁊ in regionibꝰ fridis ⁊ in hora fortis doloris ⁊ poſt balneũ reſolutiuũ ⁊ poſt coitũ ⁊ quãto plus potes ĩ etate minori. xiiij. annis ⁊ ĩ etate ſenili niſi ↄfiſus fueris de figura ⁊ ſoliditate muſculoꝝ ⁊ venaꝝ ãplitudine ⁊ multitudine ⁊ eaꝝ repletõe ⁊ coloris rubedine: tales eiȝ audebis flobothomare. Adoleſcẽtes autẽ debẽt paulatine ad minutõeȝ ꝓmoueri: ꝓ° minutionẽ faciẽdo paucã. Dicit ẽt ꝙ quãto plus potes debes vitare flobothomiã ĩ corporibꝰ macris ⁊ craſſis raris ⁊ albis ⁊ laſſis ⁊ in citrinis non habentibꝰ ſanguineȝ.

Dubitatur circa parteȝ an in princi

pio febris ſanguĩs fiẽda ſit maior euãatio q̃ȝ in ꝓceſſu: Affirmatiue arguit̃ ſic: In ſanguĩe nõ expectat̃ digõ: ergo ⁊c̃. Cõſequẽtia nota ⁊ añs pꝫ ꝓª quarti ca° de cura putridaꝝ in gnãli dũ dicit: Et ſcias ꝙ flobothomia qñ eſt itẽtio ſanguĩs nõ eſt de genere eiꝰ ĩ qua expectat̃ digõ. ¶ Scđo arguit̃ ſic: Anteq̃ȝ corpa cadãt ĩ morbos ãplior ↄuenit flobothomia q̃ȝ poſtq̃ȝ actualr̃ egra ſunt: ergo etiã ĩ fe. ſanguinea in prin° ãplior cõpetit flobothomia q̃ȝ poſt in ꝓceſſu.

Antecedẽs

UVA. BHSC. IyR_006_1

Antecedēs ſuperiꝰ ē tactū. tꝫ ꝯſequētia. Nā antequā coꝛ/
poꝛa ſint actualr̄ egra copioſioꝛ cōpetit flobotbomia: eo
ꝙ nōdū ſanguis malignatꝰ ē. Dum aūt actualr̄ egra ſunt
cū ſanguis malignatꝰ ē: tūc nō tanta cōuenit flobotbomia
ſicut ante. Siłr cū in pꝛin. fe. ſanguinis cōtingat ſangui/
nē malignari pluſquā in ꝓceſſu: ⁊ in ꝓceſſu magis inten/
ſa putrefactione putrefieri: iō in pꝛin. intenſioꝛ cōpetit flo/
botbomia. ¶ Tertio arguitur ſic: In febꝛe ſanguinea in
pꝛincipio cōuenit flobotbomia vſqꝫ ad ſincopim: ergo in
pꝛincipio ſuperflua flobotbomia fiēda ē. Cōſequētia nota
ē: ⁊ añs eſt Gal. nono terap. ¶ Quarto arguit̄ ſic: San/
guis ſub ꝓpꝛia foꝛma manēs ē patioꝛ expulſiōi colera qꝫ/
tūcūqꝫ digeſta: igit̄ in ꝓpoſito iſto nō ē expectanda dige/
ſtio. Añs ꝓ tāto tꝫ cū ſit bumoꝛ tēperatus reſpectu illius
colere. Tenet ꝯña: qꝛ ī colera ſic digeſta nō āplius expecta
tur digō. Ad partē oppoſitā ē Aui. ī textu. ¶ Pꝛo dubio
nota ꝙ ſanguis pōt peccare ī quāto: pōt etiā peccare ī q̄li.
Si aūt peccet ī quali aut eſt ꝑ admixtionē alicuiꝰ bumoꝝ
aut ꝑ extractionē in ſeipſo factā nullo ſibi alio ꝯmixto. Si
p̄ᵒ mō: aut bic bumoꝛ extraneat ipꝫ qualitatiue qꝛ calefa/
cit aut īfrigidat: aut ex ꝑte modi ſubſtātie qꝛ ſubtiliat vel
īgroſſat. Scđo vero mō extraneat̄ ſanguis vel ꝑꝑ intrin/
ſecā cām vel extrinſecā ſi per cās p̄dictas alterat̄ aut ī mō
ſubſtātie mutat̄ aut ī qualitatibꝰ manifeſtis. vel 3ᵒ qꝛ pu/
trefit ⁊ diſponit̄ ad ſue foꝛme coꝛruptōez. Qui modi extra
neationū colligunt̄ p̄ª pꝛimi caᵒ de bumoꝛibꝰ ad pꝛicipiū.
Aliud ē peccatū ſanguis ī quāto dato ꝙ nō peccet ī quali
ſaltē peccato notabili. Ex iſto vt ēt tāgit expoſitoꝛ pꝫ dif/
ferētia īter ſanguinē ⁊ alios bumoꝛes. nā cum ſanguis ſit
bumoꝛ tꝑatus ⁊ a nā dilectꝰ ipſo aucto ſm quātitatē non
ſit eiꝰ qualitatiua extraneatio neceſſario: ſꝫ aliȷ̄s bumoꝛibꝰ
auctis cū ſint diſtēꝑate ꝯplōnis etiā qualitatiue mutant̄.
Nō ergo ſit ipoꝝ peccatū ſm quātitatē quin fiat ſꝫ qua/
le niſi foꝛte ſanguine eoꝝ refrenāte: ſicut pꝫ ī pletoꝛica di
ſpoſitiōe ī qua ē peccatū quāti oīum bumoꝛū nō exiſtente
peccato qualis vt ſanguine moderāte dictos bumoꝛes ne
ad malā deueniant q̄litatē. 2ᵒ pꝛemitto febꝛē ſanguineaꝫ
duplicē eſſe. ſ. ſine putrefactiōe ⁊ cum putrefactiōe: vt pꝫ
pꝛima quarti. c. de febꝛe ſanguinea. In febꝛe aūt ſanguīea
ſine putrefactione que ſynocba īflatiua appellat̄ ē peccatū
quāti ⁊ nō qualis notabilr̄. In febꝛe vero cū putrefactiōe
q̄ ſynocbꝰ appellat̄ ē peccatū qualis dato ꝙ quāti ⁊ qua/
lis poſſit cōtingere peccatū. ¶ 3ᵒ nota digeſtionē eſſe du
plicē. ſ. in nocitiuo ⁊ iuuatiuo. Digeſtio iuuatiui non ē niſi
p̄paratio materie iuuantis vt tandē in nutriti nāꝫ ducat̄.
Digeſtio in nocitiuo nō eſt aliud qꝫ pꝛeꝑatio māe nocitiue
ſiue bec ſit pꝛeꝑatio qua nociua mā ducat̄ ad benignū ſi/
ue bec ſit pꝛeꝑatio materie ad expulſionē. ¶ Iſtis notatis
ſit bec pꝛia cōclō. In febꝛe ſanguinea ſanguine ſolo quāto
peccante nō ē expectanda diſtegio. Hec cōclō ſit ꝓ mēte
Auic. pꝛia quarti allegato. c. Pꝛopterea perſuadetur pꝛo/
poſitio ſic: Stante tali peccato eſt ſufficienter aptus edu/
ci: ergo ⁊c̄. Antecedens notum eſt ex quo eſt peccatum ſo
lum quātitatis. ꝯña nota ē. ¶ 2ª cōclō: ſtante ſolū peccato
ſanguis ī quali nō ē minuēdū ſed ē expectāda maturatio.
Pꝛobat̄ qꝛ tali ſtāte peccato ſanguinis: ſanguis ē ineptus
eductiōi: igit̄ ⁊c̄. Añs tenet ꝓ tanto qꝛ bic de peccato loq/
mur qualitatiuo quo ſanguis diſponit̄ euātioni. ¶ 3ª cō
cluſio: ſtante peccato ſanguinis quātitatiuo ⁊ qualitatiuo
minoꝛādū ē a pꝛincipio ⁊ in ꝓceſſu eradicandū. Pꝫ cōclō
quo ad partē pꝛimā: qꝛ cū ſanguis ſit multus vt virtꝰ ſit
potētioꝛ ſupꝛa mām: mā ē minoꝛanda. Nō ergo ē eradicā/
da niſi cū debite ſanguis ſit diſpoſitus eductioni. In pꝛo/
ceſſu vero maturatione facta cōuenit flobotbomia copio/
ſa totā eradicans mām tāquā eductiōi paratā. Et iſta ter/
tia cōclō ſit ꝓ intellectu partis pn̄tis. Loquit̄ ergo Auic.
d̄ febꝛe ſanguinea cū putrefactiōe ſanguis ⁊ peccato qꝫti.
Iſtis cconluſis omittendo multa pꝫ reſponſio ad obiecta
oīa. Ad pꝛimū enim rñſum ē per vnā ex cōclōnibꝰ. Ad ali
ud ēt ꝑ pꝛebabita pꝫ rñſio. pꝫ etiā que digeſtio ꝯuenit ſan
guini ⁊ que non. ¶ 2ᵒ notandū ꝙ aliqua euātio pōt dici
ſuperflua: p̄ᵒ qꝛ plus euāt de mā qꝫ ſit euāndū: ⁊ boc mō
ſumit̄ ſuperfluū in pn̄ti. 2ᵒ mō pōt dici ſuperflua qꝛ eua/
cuans totū bumoꝛē: ⁊ per cōſequēs ſuꝑflua reſpectu eua/
cuatōis minoꝛatiue ſaltē ſm plurimū: qꝛ cōtingit aliquā/
do euātionē eradicantē minoꝛē eē euātiōe minoꝛatiua. 3ᵒ
ꝑ euātionē ſuperfluā poſſumꝰ intelligere euātionē ad quā
ſequit̄ vltima debilitas virtutis: de qua ēt nō intelligit̄ in
pn̄ti. 4ᵒ ꝑ euātionē ſuperfluaꝫ poſſumus intelligere eua/
cuationeꝫ que ſit vltra aliquale poſſe virtutis: qꝛ ad ipſam
ſequit̄ aliqualis debilitas cū ſufficiēter euāt mām peccan/
tē: de qua intelligit̄ in pn̄ti. Per euātionē etiā ſuperfluā
poſſumus intelligere euātionē multā que ſuperfluit reſpe/
ctu pauce euātionis: ⁊ bec expoſitio teneat̄. ¶ 3ᵒ nota ꝙ
ex parte cōcipit̄ banc euātionē eē fiēdam ī ſtatu: ī quo mā
ē ſumme digeſta: vt colligit̄ pꝛima quarti. c. 3ᵒ. Et boc cō
tinet veritatē cū nā nō tentet ꝓtunc euāre per nares: aut
aliā regionē. ¶ Ulteriꝰ nota ꝙ bec dictio q̄: pōt ad duo
referri. p̄ᵒ ad febꝛē vt dicat̄: que. ſ. febꝛis multotiēs remo
uetur in boꝛa flobotbomie. ſ. in ꝓceſſu ⁊ copioſe ⁊ poſt di/
geſtionē materie. Et notāter dictū ē mł̄totiēs qꝛ quotiēs
ſanguis ꝓpꝛiā ſeruauerit naturā: ⁊ bn̄ digeſtus ē. Quan/
do vero ſm partē ſit mutatus ad nāꝫ alterius bumoꝛis cō
tingens ē febꝛē nō ceſſare flobotbomia: aut remanēte mā
ſolōne ventris educēda: aut alia regione per farmacū. 2ᵒ
pōt referri ad ly maturatio: ⁊ ē ſenſus ꝙ maturatio mul/
totiēs remouet̄ in boꝛa flobotbomie. Nā facta iſta flobo/
tbomia ſtante iſto peccato colere aut flegmatis contingit
fieri incrudationē aut colere ebullitionē. p̄ª relatio tāquaꝫ
verioꝛ teneat̄. ¶ Ulteriꝰ notādū ꝙ a minutiōe ſaltē copio
ſa ī cōplōne calida aut frigida cauēdū ē. In frigida tāquā
debilioꝛi ⁊ apta magis ledi cū flobotbomie ſit per ſe īfrigi
dare ſanguinē paucificando ſpūs. In cōplōne calida timē
tes ebullitionē: flobotbomiā ergo vitare debemꝰ: per ca/
lidā colericā intelligēdo ⁊ calidā in quāto ⁊ quali: qualis
ē ſanguinea. ¶ Nota vlteriꝰ ꝙ in regiōe multū frida cō/
muniter a flobotbomia ē cauēdum ne paucificato caloꝛe ⁊
ſpū vebemētis aeris frigiditas illa coꝛꝑa debilitet ⁊ moꝛ/
tificet. Et notāter dictū ē cōiter qꝛ quedā ſunt coꝛꝑa illa/
rū regionū que multiplicant ſanguinē multo exiſtente fri
goꝛe aeris que etiā copioſam poſſunt ſuſtinere flobotbo/
miā. In regionibus ergo frigidis coꝛpoꝝ ꝑitate poſita a
flobotbomia cauēdū ē ꝓpter cām aſſignatā. Cōſimiliter
etiā in regionibus valde calidis ꝓpter paucitatē ſanguīs
⁊ ſpūum ⁊ ꝓpter ebullitionis timoꝛē. Et de per ſe plus eſt
vitāda flobotbomia in regione frigida qꝫ calida. In qui/
buſdam tn̄ coꝛpibꝰ rōne effectꝰ per accidēs cōtingētis vt
tactū ē: pōt fieri flobotbomia ſanguine multuꝫ exaucto.
¶ Ulterius nota ꝙ in pn̄ti parte reperit̄ triplex lr̄a. Una
dicēs: ⁊ boꝛa foꝛtis coloꝛis cuius cā ē ſnīa babite partis.
Alia vero dicēs doloꝛis que pōt exponi tripliciter. Uno
mō doloꝛis. ſ. virtutis aīe valde ꝓſtratiua ne d̄bilitas iū/
gatur debilitati: ⁊ ſic a minutione ſaltē copioſa cauēdū ē.
2ª ꝑ doloꝛē intelligere poſſumus doloꝛē a mā flegmatica
⁊ viſcoſa pꝛocedēteꝫ qualis ē colica paſſio ꝓcedēs a fleg/
mate viſcoſo ⁊ vitreo in quo vt notū ē non cōuenit flobo/
tbomia. Sed dū Gal. pꝛia affo. cōmēto 23ᵒ vult ꝙ in foꝛ/
ti doloꝛe nulla ē melioꝛ medicina qꝫ flobotbomia: iſtud cō
tinet veꝝ materia exiſtēte ſanguinea ī fluxu ad dolētē ꝑtē
de qua nō loquit̄ pn̄s expoſitio. Per foꝛtem doloꝛē 3ᵒ in/
telligere poſſumus nō ſolū foꝛteꝫ ex ꝑte intēſionis triſtis
ſenſationis ſꝫ foꝛtem reſpectu ꝓſtratiōis virtutis qꝛ ꝓſter
nat virtutē: ⁊ de boc loquit̄ Aui. Cuiꝰ cā ē qꝛ vel in tali cō
peteret flobotbomia copioſa de qua bic loquit̄: ⁊ boc nō:
qꝛ virtutē ꝓſternēdo ꝑduceret ad moꝛtē. Nec etiā de nō
copioſa cōtinet verū eo ꝙ iſta nō ſufficeret ad diuertēdū
materiā a mēbꝛo dolēte: imo in illo cāu applicāda ſunt mi
tigantia doloꝛē ⁊ refouētia virtutē. ¶ Ulterius nota ꝙ ꝑ
balneū reſolutiū Aui. intelligit balneū aque notabilr̄ cali/
de in quo magna moꝛa cōtracta ē ꝙ qꝛ calefaciēdo ⁊ potē
ter agēdo reſoluēdo ſpūs ⁊ ſanguinē in vapoꝛē valde debi
litat virtutē: iō nō ſtatim ſequi dꝫ flobotbomia ne debili/
tas iungat̄ debilitati: ne etiā coꝛpus ad nimiā ebullitionē
perducat̄. Poſt vero balneū mollificatiuū ī quo paruam
moꝛā cōtraxit infirmus tāquā poſt rē liquētem ⁊ diſponē
tem bumoꝛes exitui cōuenit flobotbomia. ¶ Ulterius no
ta ꝙ poſt coitū ſaltē ſuperfluū nō ē faciēda minutio ꝓpter
debilitatē contingētem ex coitu ⁊ percuſſiōe ex eodē ꝓue/
niēte ne fiat ebullitio. etiā in die coitus nō dꝫ fieri flobo/
tbomia ſaltē ꝓpter ꝯmotionē ⁊ agitationē factā: ⁊ boc re/
gulariter oꝑando. ¶ Ulterius nota ꝙ in etate ſenili potiſ
ſime debemꝰ vitare flobotbomiā quātū poſſumꝰ pꝛopter
paucitatē ſanguinis ⁊ ſpūuꝫ. In etate vero puerili vitāda
ē flobotbomia eo ꝙ pꝛimū calidū illiꝰ etatis agit ꝯſumēdo
multū de bumido apto reſolutōi tanqꝫ aereo eo etiā ꝙ il/
la coꝛꝑa egēt multo ſanguīe vt nutriāt̄. In etate vero me/
dia ⁊ magis in etate iuuētutis ſanguīe exn̄te multū calido
⁊ coꝛꝑe nō parato reſolutiōi pōt fieri flobotbomia multa.
¶ Ulteriꝰ nota ꝙ ſi expedit fieri flobotbomiā in bis ꝓbi/
bitis etatibꝰ quedā ꝯſiderāda ſūt. Pꝛio figurā: itelligēdo
ꝑ figurā coꝛpoꝛis maciē aut carnoſitatē: per ſoliditatē mu
ſculoꝝ intelligēdo quādā duriciē ex multo ſpū ⁊ bumoꝛi/
bꝰ ꝯtingēteꝫ: per amplitudinē venaꝝ ītelligēdo āplitudi/
neꝫ denotāteꝫ caloꝛē ⁊ denotāteꝫ mām multā extēdentē:
per rubeū coloꝛē ītelligēdo rubeū coloꝛē in facie ⁊ ambitu
totiꝰ apparēteꝫ. Que oīa cū ſignificāt virtutis ꝯſtantiā ⁊
ſanguinē abūdare: ſignificāt ſanguinē ꝯſentire flobotbo/
mie. ¶ Ulteriꝰ notādū ꝙ adoleſcētes oꝛdinate ꝓmouēdi
ſunt ad flobotbomiā: vt p̄ᵒ fiat pauca: deinde maioꝛ ne ex
multa flobotbomia ꝓſternat̄ virtꝰ q̄ pōt amplioꝛ fieri ī ꝓ
ceſſu iā coꝛꝑe aſſueto flobotbomie ampliꝰ ꝯſolidato ⁊ foꝛ/
tificato. ¶ Ulteriꝰ nota ꝙ coꝛpoꝛa valde macra nō ſūt flo
botbomāda ꝓpter paucitatē ſanguis ⁊ ſpūum eo ēt qꝛ ea
vtplurimū ſūt colerica ī quibꝰ ex flobotbomia iuxta p̄ba/
bitū colere timemꝰ ebullitionē foꝛtē. Foꝛtiter ēt craſſa nō
ſūt flobotbomāda: qꝛ vtplurimū ſūt frida: ne etiaꝫ inani/
tis venis ꝑꝑ flobotbomiā ſuffocatio ⁊ caloꝛis oppſſio ꝯſe
quat̄. Alba ēt ⁊ laſſa ⁊ bn̄tes carnes laſſas non dēſas nec
ꝯpactas: vt paucificato caloꝛe ⁊ ſpū ñ ſūt flobotbomāda:
in pꝛōptu eſt cā. Citrina ēt coꝛpoꝛa ⁊ abūdātia colera ⁊ in

Huic videt̄ aduerſari
Gal. nono de īgenio ſani/
tatis. c. vij. vbi dicit ꝙ fri/
giditas ⁊ bumiditas ae/
ris ē ſignificatio ꝙ flobo
tbomia ꝯueniat. Etiā ſcri
bit Aui. ſcđa pꝛimi doctri
na ſcđa. c. xj. ꝙ ī locis ba
bitabilibꝰ frigidis moꝛā/
tes ſunt foꝛtioꝛes ⁊ auda/
cie maioꝛes ⁊ melius di/
gerētes: igit̄ merito in ſan
guīe abūdare debēt ⁊ flo
botbomiȷ̄s qn̄qꝫ indigere
⁊ eas bene ferre ⁊c̄. Sꝫ tu
dic ꝙ iſti intelligūt de ae/
re ſiue regione cuiꝰ frigus
nō ſit penetrās ſed circū/
ſtans coꝛpoꝛi foꝛtificās in
tus caloꝛē innatū: ⁊ ī boc
caſu ꝯuenit frequēter flo/
botbomia. In aere auteꝫ
ſiue regione cuius frigus
coꝛpoꝛa inbabitātiū foꝛti
ter penetrat remittens vim
īnati caloꝛis vias cōſtrin/
gēs ⁊ bumoꝛes ꝯpingēs
regulr̄ non cōpetit flobo/
tbomia: quare ⁊c̄.

Scias ꝙ in venis no/
tabiliter macroꝝ ſepe ſan
guis ſuperabūdat ⁊ ē co/
pioſioꝛ qꝫ ī venis piguiū
vt experiētia notat in poꝛ/
co macro ⁊ aliȷ̄s qn̄ occi/
ditur: ⁊ buius cā pōt eſſe
vel qꝛ foꝛtitudo caloꝛis ī/
nati ſufficit digerere ma/

UVA. BHSC. IyR_006_1

gnā cibi quantitatē: qui ſi
nutritiuus ⁊ hūidus fue/
rit a leui cā nō colerizabi
lis ſanguinē i venis mul/
tiplicabit: vel qꝛ vehemēs
mēbꝛoꝝ ſiccitas pꝛohibꝫ
ex ſanguie plimū vniri ⁊
inuiſcari mēbꝛis macris.
manet ergo i venis: ⁊ dū
occultaꝛ vel ſuperabūdat
vel vias oppilat diminuē
dus ē per flobothomiam
nō obſtante macie: maxie
duꝫ bene tenduntur ⁊ in/
groſſantur: quare ⁊c̄.

ſanguie paucificata quātū poſſibile ē debēt euitare flobo/
thomiā. Et hic per nō habentia ſanguinē itelligere poſſu/
mus macra: craſſa: rara: alba: laſſa ⁊ citrina.

Amplius i coꝛpoꝛib⁹ que ꝓlixas perpeſſa ſūt egri/
tudies caue tibi a flobothomia niſi ſanguis affuerit coꝛ/
ruptio q̄ te ad hoc perducat: qm̄ tūc flobothomabis ea.
Et cōſidera ſanguinē: ⁊ ſi ipſuꝫ videris nigrū ⁊ ſpiſſuꝫ
extrahe eū: ⁊ ſi ipſuꝫ videris albū ⁊ ſubtilē eū illico con/
ſtringe: qm̄ in ipſo exiſtit vehemēs timoꝛ.

¶ Nunc Aui. ponit aliū cañ. dicēs ꝙ i coꝛpoꝛib⁹ hn̄ti/
b⁹ valde lōgas egritudies caue a flobothomia niſi ad hāc
faciendā ꝑducat coꝛꝛuptio ſanguis. nā tunc facias flobo/
thomiā viſo ſanguine nigro ſpiſſo. viſo aūt albo ſubtili ſta
tiꝫ ꝯſtringe. nā in eūando talē timoꝛ eſt. ¶ Pꝛo parte no/
ta ꝙ coꝛpoꝛa paſſa valde longos moꝛbos: aut ēt ifeſtata a
longis moꝛbis qꝛ valde debilitata nō ſunt flobothomāda
ꝓpter debilitatē virtutis: aut ꝓpter mām groſſaꝫ flobo/
thomie ineptā niſi adſit coꝛꝛuptio ſanguis ꝓpter eūonem
ſolitā retētam: vt mēſtruoꝝ emoꝛoidaꝝ ⁊ ſimiliū. In his
eiꝫ caſib⁹ ꝯuenit flobothomia: vt hec coꝛꝛuptio remoueaꝛ
apparēte ſanguie nigro aut ſpiſſo. Nā cuꝫ ſanguis decli/
nat ad quādā rubedinē obſcurā: ſi appeat niger ⁊ ſpiſſus
denotaꝛ coꝛp⁹ ex ſpiſſitudine nō aptū reſolutiōi. Denotaꝛ
ēt humoꝛē nō multū recedere a nā ſanguis cū ſanguis ten
dat ad nigrū: ideo ſecure pōt flobothomia fieri. Sanguie
vero exn̄te albo ⁊ ſubtili cum denoteꝛ paucitas ſanguis ⁊
ſpūuꝫ ⁊ coꝛp⁹ aptuꝫ reſolutōi: timoꝛ eſt in eūando ipm ne
debilitas nimia coꝛpoꝛi cōiungaꝛ.

A minutōe pꝛeterea tibi cauere debes ſuper cibi re/
pletionē ne materiā non maturā ad venas trahas loco
eius qꝺ ab eis euacuaſti.

¶ Nūc Aui. ponit aliū cañ. dicēs ꝙ tu debes tibi cauē
ne fiat flobothomia ſtomaco exn̄te repleto cibo ne māꝫ idi
geſtā trahas ad venas. Ad itellectū partis dubitaꝛ.

Utrum ſtomaco repleto cibo flobo

thomia facta materia idigeſta trahaꝛ ad venas: Qꝺ nō vi
detur qꝛ nulla eſt cauſa talis attractōis: ergo ⁊c̄. Cōſequē
tia nota ⁊ antecedēs patet. ¶ Naꝫ pꝛimo inanitio venarū
nō eſt cauſa attractōis cuꝫ vene eſſent ante hoc magis ple
ne debito. Nō eiꝫ virt⁹ eſt talis attractōis cā cuꝫ virtus
non idigeat recōpenſa ſanguine exn̄te ampliori debito: nō
etiā ratione vacui cuꝫ adhuc ſtet repletio debita venaruꝫ.
¶ Scꝺo arguiꝛ ſic: Coꝛpoꝛe habente talē repletionē ſan/
guinis quāta ē cū fit flobothomia ſi repleaꝛ cibo nō trahi/
tur mā indigeſta: ergo ⁊c̄. Añs ē cōceſſum cōiter. Tꝫ ꝯña
cū ſtet vtrobiqꝫ repletio cōſimilis. ¶ Tertio ſic: i famelico
cibo repleto nō trahiꝛ mā indigeſta: ergo ⁊c̄. Añs videtur
notū ſatis: ⁊ tenet ꝯña qꝛ cū ſit inanitio maioꝛ: dꝫ etiā fie/
ri attractio. ¶ Ultimo arguiꝛ ſic: Si dictū Aui. eēt verū
ſequereꝛ ꝙ nullū coꝛpus poſſet vere reſumi. ꝯñs ē contra
dicta auctoꝝ. Et arguiꝛ ꝯña: qꝛ aſſumpto cibo virt⁹ mē/
bꝛoꝝ inanita partē indigeſtam attraheret. Ad oppoſitam
ꝑtē ē Aui. i cañ. p̄n̄ti. ¶ Pꝛo dubio pꝛio p̄mitto ꝙ notan
ter dictū ē ſuper repletionē cibi ⁊ nō aſſumpto cibo: qꝛ ſto
maco repleto cibo: ſtomaco quaſi poſt repletionē faſtidito:
mēbꝛa melius pn̄t indigeſtā attrahere mām. ſed exn̄te cibo
pauco in ſtomaco aut tēpoꝛe pauce quātitatis reddiꝛ ſto/
macus auarus i detinēdo cibū: iō mēbꝛa nō pn̄t ſic attra/
here mām indigeſtā. Itē cōceſſum ē fieri flobothomiā ci/
bo exn̄te in ſtomaco vt inferius diceꝛ. 2° pꝛemitto attra/
ctionē fieri a virtute a calido ⁊ a vacuo. 3° p̄mitto ꝙ quā/
tūcūqꝫ peccās educaꝛ mā etiā iuuās educiꝛ: ⁊ cōueniens
ſiue peccet ſm quātitatē ſiue ſm quale. Eſt etiā ſupponen
dum ꝙ ſi in aliquo cōcauo teneaꝛ aliquid liquidū quātū/
cūqꝫ ſit plenū euacuata aliqua parte extrema quaſi totus
liquoꝛ ponitur in motu vt notū ē. Quibus ſuppoſitis po/
natur cōclō rn̄ſalis. Quod ſtante repletiōe ſtomaci nō ē fiē
da flobothomia ne agiteꝛ mā exn̄s in ſtomaco ⁊ coꝛꝛūpaꝛ
ne etiā rōne vacui ꝓpter exitū ſanguinis attrahaꝛ mā ci/
balis indigeſta. Iſto cōcluſo pꝫ rn̄ſio ad pꝛimū obiectum.
¶ Ad 2m de famelico dicēdū ꝙ cibo aſſumpto tꝑe famis:
qꝛ ſtomacus ē valde auarus in detinēdo: mēbꝛa nō attra/
hunt cibū indigeſtū. Et ſi ponaꝛ ſtomaci repletio nō ē in/
cōueniēs ad mēbꝛa indigeſtā duci materiā. ¶ Ad vltimū
negaꝛ ꝯña. Ad punctum dico ꝙ coꝛꝑa conualeſcētia ſi ſu/
mant debite cibum ſtomaco exn̄te cupido i detinēdo ipm
mēbꝛū n̄ attraheret mām idigeſtā. ſi vero fiat repletio ſto/
maci: nō ē incōueniēs tūc trahi mām indigeſtaꝫ.

Et oꝫ ēt vt tibi caueas ab ea i repletiōe ſtōaci ⁊ iteſti
noꝝ facta ex fece iā ꝯſequuta ⁊ ꝓpinq̄: imo i eā eūando
ſtude: ⁊ illō quidē qꝺ ē in ſtomaco aut coꝛā eo vomitu: ⁊
qꝺ i iteſtis iferioꝛib⁹ quo poteris ⁊ ſi nō alio ſaltē cliſte/
ri. Caue p̄terea tibi ne faſtiditū ſtomes: ſꝫ ꝓlōga ipꝫ ab
hoc vt ei⁹ faſtidiū digeraꝛ. Et tibi ēt caue ne ſubtilitateꝫ
ſenſus oꝛis ſtōaci hn̄tē aut ipſi⁹ debilitatē flobothomes

⁊ infelicē ex gnātōe colere rubee i ipſo: huiuſmodi nāqꝫ
ſibi cauere dꝫ: a nimia quoqꝫ audacia i minuēdo ſibi ca
uere dꝫ ⁊ ꝓpꝛie cū eſt ieiunus. Senſus vero ſubtilitatē
oꝛis ſtomaci hēteꝫ dignoſces ꝓpterea ꝙ moꝛdicatiua
traijcere ei nocet. Et habētem oꝛis ſtomaci debilitatē co
gnoſces ex deſiderij ipſius debilitate ⁊ doloꝛib⁹ oꝛis ſto/
maci. Et hētē os ſtomaci aptū receptōi colere rubee in
quo ipſa multū generaꝛ dignoſces ex perſeuerātia nau/
ſee ipſi⁹ ⁊ ꝓpterea ꝙ colerā quaqꝫ hoꝛa vomit ⁊ ex oꝛis
ipſius amaritudine. Iſtis nāqꝫ cum flobothomati fue/
rint oꝛis ſtomaci conſeruatōe non pꝛemiſſa accidet inde
timoꝛ magnus ⁊ quādoqꝫ moꝛiūtur inde.

¶ Nūc Aui. ponit cañ. aliū repetēdo p̄tactū dicēs ꝙ ſtā
te repletiōe ſtomaci ex cibo etiā ſtāte fece ꝯſueta. i. ātiqua:
aut etiā ꝺ nouo facta ex cibo tibi caue a flobothomia: imo
remoue pꝛimo fecē ⁊ repletionē ſtomaci. Repletionē ſto/
maci vomitu: aut qꝺ ē coꝛā ipo. Cōtentū aūt in inteſtinis
iferioꝛibus ſi nō cū alio poteris eūare eūa ſaltē cū cliſteri.
Dicit 2° ꝙ cauere debes ne euacues faſtidium: ſed expecta
ad faciēdū flobothomiā vſqꝫ quo mā faciēs faſtidiū dige/
raꝛ. Caue etiā ne flobothomes hn̄tem os ſtomaci ſenſibile
aut debile. Et etiā nō flobothomes infelicē ⁊ ꝓpꝛie ieiunū
ꝓpter gnātionē colere: aut ꝓpter pn̄tiā colere rubee in ſto
maco: quā ſenſibilitatē oꝛis ſtomaci cognoſces: qꝛ ſi ille co
medit aut bibit moꝛdicatiua nocēt ſibi. Debilitatē vero ſto
maci compꝛehēdes ex doloꝛe oꝛis ſtomaci: ⁊ deiectiōe ap/
petitus ſupple frequēter cōtingētibus. Item aptos rece/
ptioni colere: aut multiplicationi cognoſces ex ꝑſeuerante
nauſea: ⁊ qꝛ qualibet hoꝛa vomit colerā: ⁊ qꝛ hꝫ os ama/
rū. In quib⁹ coꝛpoꝛib⁹ habētib⁹ tale os ſtomaci nō p̄miſ/
ſa p̄ſeruatione ſi fiat flobothomia accidit ex ipa timoꝛ ma/
gnus: ⁊ qn̄qꝫ moꝛiunꝛ inde. ¶ Pꝛo itellectu ꝑtiū nota ꝙ
fece exn̄te noua vel antiqua in inteſtinis eūandū ē ante flo
bothomiā ne mēbꝛa inanita trahant māꝫ fecalē verſus ſe.
¶ Scꝺo nota ꝙ hec lr̄a aut coꝛā eo: pōt duplr̄ exponi no/
tando ꝙ per repletionē intelligere poſſum⁹ repletionē aut
a cibo factā: aut ex humoꝛib⁹: quocūqꝫ fit p° ē eūandū ne
mā indigeſta trahaꝛ ad venas. Intelligit ergo per id qꝺ ē
i ſtomaco humoꝛes in poꝛis ſtomaci exiſtentes: ꝑ illud aūt
qꝺ ē coꝛā eo intelligit cibū qui nō ingreſſus ē ſubſtantiaꝫ
ſtomaci: ſed adheret ſtomaco: iō diciꝛ coꝛā eo: aut ꝑ illud
qꝺ ē in fundo ſtomaci: ⁊ per illud qꝺ ē coꝛā eo itelligit exi/
ſtens in oꝛe ſtomaci. ¶ Tertio nota ꝙ illud qꝺ ē in ſtoma
co ē vomitu eūandū tanquā citioꝛi ⁊ faciliori euacuatiōe.
Illud enim qꝺ ē in inteſtinis inferioꝛibus de fece antiqua
aut noua: ē ſaltem euacuandū cliſteri aut laxatiuo. Et vbi
materia exiſtente in ſuperioꝛibus non confert cliſtere: ē far
macum ſumendum per os.

Nunc egritudinē
ſeu hanc colere effu
ſionē in ſtōaco ꝯme/
moꝛauit nobis Auer
rois tertio colligꝫ ca
p̄lo. xxij. cum dixit:
Mala ꝯplexio cali
da mālis ſit ab hu/
moꝛib⁹ colericis ⁊c̄.
Colera aūt genita in
ſtomaco ab illa que
ſibi iſundiꝛ diſcerniꝛ
ex ipſi⁹ coloꝛe: vt vlt
Gal. ſcꝺo de cōple/
xionib⁹. c. xviij. para
pho illo: Cū i alicu/
ius ſtomaco generaꝛ
colera ⁊c̄. lege ibi.

Dubitatur an in habente faſtidium

ſit expectandū quouſqꝫ digeraꝛ faſtidiū: Ad partē negati/
uā arguiꝛ ſic: flobothomia remouet faſtidiū: ergo n̄ ē ex/
pectandū. ꝯña nota ⁊ añs colligitur iꝫa tertij. c. de cura vo
mitus. Colligiꝛ etiā 2a pꝛimi. c. de ſignis repletōis. ¶ Se/
cūdo arguiꝛ ſic: faſtidiū pōt eē ex mā ſanguinea replente
in qua nō expectaꝛ digeſtio: igiꝛ ⁊c̄. Conſequentia nota: ⁊
añs declaratū ē. ¶ Tertio ſic. Exiſtēte faſtidio neceſſaria
ē flobothomia: ergo ipm ꝓlongare ē malū. Añs ſumiꝛ ex
cañ. Cōſequētia tenet: qꝛ ſi dimittaꝛ flobothomia grande
ſequiꝛ nocumentū: vt putrefactio. Ad partē oppoſitam ē
Auic. in cañ. p̄n̄ti. ¶ Pꝛo dubio omittendo multa verba
expoſitoꝝ noto p° ꝙ per faſtidiū intelligit Auic. abhomi/
nationē ⁊ ꝓſtrationē appetitus contingentē ex humoꝛib⁹
crudis flegmaticis reducibilib⁹ ad benignū: aut intelligit
repletionē ex cibo cōtingētē qui ē aptus digeri ⁊ in bonū
cōuerti chilū. Nō aūt intelligit repletiōeꝫ venaꝝ ⁊ ſtoma
ci ex quocūqꝫ humoꝛe cōtingētem. ¶ Pꝛo hoc dubio ſit
pꝛima cōclō: Qꝺ nūquā flobothomeꝛ faſtiditū coꝛp⁹: imo
flobothomia dimittaꝛ donec faſtidiū digeraꝛ: qꝛ ſi fiat flo
bothomia mā cruda ⁊ idigeſta traheꝛ ad venas ⁊ ad inani
ta mēbꝛa: vn̄ grāde ſequiꝛ nocumētū. ¶ Scꝺa cōclō: Ali/
qn̄ coacte oꝫ nos faſtiditū eūare. Pꝫ conclō vt euiteꝛ ma
gnū nocumētū: vt i ꝑcuſſiōib⁹ aut cāu ⁊ ſimilib⁹. ¶ Iſtis
ꝯcluſis pꝫ rn̄ſio ad obiecta qꝛ faſtidiū illud ē ꝓueniens ex
repletione ſanguinea: de qua non intendit in p̄ſenti remo/
uere per flobothomiaꝫ. ¶ Scꝺo notanduꝫ ꝙ per ſubtili/
tatem oꝛis ſtomaci habemus intelligere acuitateꝫ ſenſus
ſtomaci contingentem eo ꝙ os ſtomaci eſt valde diſco/
opertum: vnde ex qualibet leui cā ſentit: aut cōtingentem
ex calida ꝯplōne ſpūuꝫ. Eſt eīm notuꝫ ſenſatōeꝫ a frīdo fie
ri magis ebetē: a calido vero fieri acutioꝛeꝫ: vn̄ os ſtomaci
appellaꝛ valde ſenſibile nō ꝙ optimū habeat iudiciū i ſen
tiendo: ſeu qꝛ optie mediāte ipſo iudiceꝛ de qualitate tāgi
bili: ſꝫ qꝛ a qualibet leui cā patiꝛ ⁊ triſtaꝛ. ¶ Ulterius no
tāduꝫ ꝙ ꝑ debilitatē ſtomaci itelligere debem⁹ debilita/
teꝫ appetitiue virtutis ꝯtigentem ex laſſitate aut raritate
texture. ¶ Ulteri⁹ nota ꝙ ille appellaꝛ ifelix ad cuius ſto/
macuꝫ

De hac ſubtilita/
te ſiue ſenſibilitate ni
mia oꝛis ſtōaci me/
minit Gal. quarto ꝺ
accidēti ⁊ moꝛbo ca
p̄lo. xij. parapho il/
lo: Ex mēbꝛis nulliū
tātuꝫ hꝫ ſenſum ⁊c̄.
De debilitate autem
Aui. iꝫa tertij tractatu
ſcꝺo. c. iiij. de debili
tate ſtomaci qꝺ inci/
pit: Debilitas ſtoma
ci eſt nota diſpoſi/
tionis ⁊c̄.

UVA. BHSC. IyR_006_1

mocū ꝯtinuo multa eſt apta colera fluere: q: talis eſt ī do/lore ꝯtinuo ⁊ cōtinua afflictiōe. ¶ Nota etiā ꝙ ſubtilitas ſenſus oris ſtomaci ꝯprehendit̄ ex aſſumptōe mordicātiuꝫ leuiū q alteri ſtomaco nō inferūt nocumentū. Itē ꝯprehē dit̄ debilitas ſtomaci ex doloribꝰ ⁊ debilitate appetitꝰ circa ipm. Hec eiꝫ oia denotāt debilitatē virtutis ⁊ īpoten/tiā. Iteꝫ aptus ad recipiendū colerā ꝯprehēdit̄: q: ꝓpter faſtidientē colerā nauſea ꝑſeuerat: ⁊ q: ēt appeat os ama/ruꝫ ⁊ q̄ſi oī hora pellit colerā. ¶ Ulteriꝰ notādū ꝙ ſi pre/mittat̄ hoꝝ corpoꝝ ꝑſeruatio magnꝰ timor eſt: q: tm̄ debi litāt̄ ꝙ īde aliq̄n mors ſequit̄ ⁊ magnū nocumentū.

Subtilitatē vero ſenſus hn̄ti ⁊ dbilitatē bucelle mū di panis ī rob acetoſo bonū hn̄te odorē īfuſe ſūt dāde. Et ſi fuerit dbilitas ꝯplonis fride ſint ītīcte ī aliquo qd̄ ſit ſicut aq̄ cū zuccaro cū alefeniati aut ī ſirupo mēte mu ſcato aut ī miua muſcata poſtea minuat̄. Aptitudinē ve ro gnātōis colere hn̄s ē mūdādus dādo ī potu ei multi tudinē aq̄ cal'e cuꝫ ſirupo acetoſo: poſtea dant̄ ei bucelle panis ad mādūcādū: deīn fiat vt parūp quieſcat poſtea minuat̄. Prepandū p̄terea ē vt qd̄ ex bono ſanguīe re/ſolutū fuerit reſtauret̄ ſi fuerit fortis cū aſſatura carnis q̄ fit ſup prunas: qm̄ ſi digerit̄ nutrit multū ⁊ bn̄: verū/tn̄ oꝫ vt ſit pauca: qm̄ ſtomacꝰ pp flomiā eſt debilis.

¶ Nūc Aui. docet ſuccurrere nocumētis iſtoꝝ. Et p̄o docet ſuccurrere ſubtilitati ſenſus oris ſtomaci. 2o docet ſuccurrere aptitudini gnātōis colere. 3o ponit cañ. obſer/uādū poſt flobothomiā. ibi 2a: aptitudinē vero. ibi 3a: pre/parandū p̄terea. ¶ De p̄a dicit ꝙ hn̄ti ſubtilitateꝫ ſenſus oris ſtomaci ⁊ eiꝰ debilitatē ꝯferūt bucelle panis mūdi in/fuſe ī rob hn̄te ſaporē acetoſuꝫ ⁊ bonū odoreꝫ. Et ſi debi/litas ſit ꝓpter ꝯplōneꝫ fridaꝫ: ſint ille bucelle ītincte in aq̄ cū zuccaro ⁊ alefeniati: aut in ſirupo de mēta muſcata aut in miua muſcata: poſtea vero minuat̄. ¶ Dicit 2o ꝙ hn̄s aptitudinē ad gnāndū ⁊ recipiendū colerā mūdādus ē po tando multā aquā calidā cū ſirupo acetoſo: deīde dent̄ ſi/bi bucelle panis ad comedēdū: poſtea quieſcat ⁊ minuat̄. ¶ Dicit 3o ꝙ p̄parandū eſt vt illud qd̄ p flobothomiā reſo lutū eſt bono ſanguine reſtauret̄ ſi flobothomatꝰ ſit fortis cū carne aſſata ſupra prunas. naꝫ ſi digerit̄ nutrit bene ⁊ multū. ſit tn̄ quātitas pauca q: ſtomacꝰ eſt factꝰ debilis ꝓ pter flobothomiā. ¶ Circa partē aliq̄ ſūt notāda p̄o ꝙ per bucellas ītelligit pua fruſta panis. Per panem vero mū/duꝫ ītelligit paneꝫ factū ex bona ⁊ mūda farina nō furfu/ratū. Et p̄o ī hoc cāu ꝯuenit bucella ⁊ nō magna quātitas panis ne ſtomacus īpleat̄ ⁊ cibꝰ trāſeat ad mēbra indige/ſtus. Opꝫ ēt ꝙ panis ſit mūdus: q: ſtomacus magis ī iſto delectat̄ ⁊ cibꝰ ī ſtomaco maiorē ꝯtrahet morā. naꝫ furfur abſtergēdo ⁊ mordendo aliq̄leꝫ hꝫ virtutē ſeceſſiuā. Per rob vero habemꝰ ītelligere ſuccū talr̄ inſpiſſatū vt valeat ꝯſeruari: qd̄ rob eſt acetoſuꝫ ex quo eſt factū ex re acetoſa: vt agreſta amarilis ⁊ ſimilibꝰ. Sit tn̄ acetoſuꝫ nō ꝯiūctū acuitati pūgitiue q̄le ē acetū vini: ſꝫ ſit acetoſuꝫ ꝯiūctū ſti pticitati aut pōticitati q̄le ē agreſta ⁊ neſpila ⁊ ſilia: ⁊ ꝯfert hoc rob corrugādo os ſtomaci ⁊ ꝯfortādo. Notāter ēt dꝫ eē factū ex re boni odoris: q: factū ex re d̄ ſeipſa odorifera ſicut ſūt poma ſilueſtria ⁊ ſilia: aut q: in tali rob ſit poſita res odorifera vt aq̄ roſata. ¶ Ulteriꝰ nota ꝙ ꝯplōne exn̄te frida notāter ꝯuenit aq̄ ī qua ſit poſitū zuccaꝝ aut ī q̄ po/nant̄ alefeniati. i. aliq̄ odorifera calida ꝯfortatiua digōnis q̄ dr̄ a Meſue alefangina: iō aliq̄ pill'e dicūt̄ a Meſue ale/fangine. Has autem ſpēs poſſumꝰ videre a Meſue in de/ſcriptiōe pillulaꝝ. Et ſirupꝰ de mēta muſcata cōuenit. nā primo p mētā hꝫ cōfortare ſtomacū: per muſcū etiā calidū aromaticū idem opatur. Miua vero nō ē aliud q̄ꝫ ſirupꝰ factus ex aqua ⁊ zuccaro ⁊ ſucco alicuius fructus: vnde miua citonioꝝ nō ē aliud q̄ꝫ ſirupus citonioꝝ. Miua autē citonioꝝ ē duplex. nā quedam ē ſimplex ī qua nō ſunt po/ſite alique ſpēs que dicit̄ miua ſine ſpēbus. Alia aūt ē ꝯpo ſita cū ſpēbus: ⁊ dicit̄ miua cū ſpēbus. Per miuā aūt mu ſcatā intelligimus ſirupū citonioꝝ cuꝫ ſpeciebꝰ que miua calefaciēdo ſtomacum per aromatica cōfortatiua iuuat.

¶ Ulterius pꝫ ꝙ multa aqua calida cū ſirupo acetoſo po tata cōfert in apto gnātioni colere. Nā primo lauat ⁊ du/cit īferius colerā a ſtomaco: ⁊ per ſirupum infrigidantē. ſ. acetoſum corrigit malitiā colere ⁊ inſpiſſat ⁊ ipſam exitui p̄pat. Itē vigorat aliqualr̄ ſtomacū. Mūdificato v̄o ſto/maco dent̄ bucelle panis ad comedendū: ſupple etiā infu/ſe ī aliquo acetoſo hn̄te bonū ordorē: vt magis vigoret ſto/macū: vt nō recipiat nouā colerā: deīde quieſcat vt cibus melius tangat̄ a ſtomaco. ¶ Ulteriꝰ nota ꝙ cū flobotho/mia nō eūet eligēdo cū etiā ī ſanguine cōtineat̄ multa ſpu moſa ſubſtantia: iō quelibet flobothomia bonū ſanguineꝫ ⁊ ſubſtantiā ſpumoſam eūans hꝫ debilitare virtutē quaꝫ debilitatē poſſumus remouere exhibēdo bonū cibū: ⁊ ſic reſtaurando deperditū. ¶ Ulterius notandū ꝙ per aſſa/turā carnis nō intelligit̄ aſſatura que dicit̄ carbonella: q: carnes illo mō aſſate nō debite ⁊ tēperate aſſant̄: quia cuꝫ

Raſis tn̄ quarto almāſoris caplo de virtutibꝰ carnium ex

prune attingant valde partes carnis: ille partes multū aſ/ſantur nō coctis itermedijs. Sꝫ intelligit aſſaturā que fit carnibꝰ poſitis ī veru: ⁊ moto veru circūquaq̄ꝫ. Talis eiꝫ ē cōueniēs modus aſſandi. nā applicato ıgıe debite: cōue/niēter coquūt̄ ptes īteriores ⁊ extreme. idem talis modus aſſandi dꝫ eē paulatinꝰ ⁊ nō citus. Et talis caro conuenit ratiōe multoꝝ. Primo q: ipa ē humida multa humidita/te nāli īcluſa humiditate ī medio ꝓpter caliditatē circūſtā tem: ⁊ per ꝯn̄s humiditatē intrinſecus claudēteꝫ. Itē gr̄a aſſationis ipa participat virtute ſtiptica corrugante ⁊ con/fortante ſtomacū. Itē ſi bn̄ digerat̄ mlt̄ū nutrit cuꝫ ſit ex/purgata a ſupfluitatibꝰ per aſſationē. Et cū multū hēat d̄ humido ſubſtātifico multū pōt nutrire. Itē bonū exhibet nutrimētū tāquā bene purgata a ſupfluitatibus: ⁊ notan/terē dictū ſi bene digerat̄ q: ipa per aſſationē fit vt ſit in/obediens digeſtioni. Et per ꝯn̄s vt in littera ponit̄ ſolum forti exhibēda ſunt corpori: que debent exhiberi in pauca q̄ꝫtitate: q: ſtomacꝰ debilitatus ē per flobothomiā.

artificio intelligit de aſſa/tura que fit imediate ſuper prunas ⁊ nō in veru. Nā dicit ipſe: caro ſuper pru/nas aſſata mlt̄ū nutrit: cor pus nāq̄ꝫ corroborat: ne/q̄ꝫ velociter nutrit. hec etiā eis qui multū ſanguis flu/xuꝫ perpeſſi ſunt cōfert: ⁊ tn̄ lege vlterius ⁊ ꝯcorda q: facile: quare ⁊c̄.

Ampliꝰ vene q̄n̄q̄ꝫ flomant̄ ꝓpterea vt fluxus ſan/guis ex naribꝰ ⁊ matrice ⁊ ano ⁊ pectore ꝓhibeat̄ aut ex alijs exituris: iō vt ſāguis ad id qd̄ a pte illa eſt diuerſuꝫ ꝯtrahat̄: ⁊ hoc quidē medicamē ē forte in iuuādo. Oꝫ vero vt flobothomꝰ ſit vehemēter ſtrictꝰ ⁊ ſint vices mul te q̄ nō ſint in vna die niſi magne neceſſitatis cā fuerit: ſꝫ in die poſt diē: ⁊ q̄cūq̄ꝫ vice minoratio fiat quātū poſſi bile fuerit: ⁊ ad ſūmuꝫ meliꝰ ē vt flobothomie vices ſint multe q̄ꝫ vt ipſius quātitas ſit multa. Et flobothomia quidē cū nō eſt neceſſaria colerā rubeaꝫ ebullire facit ⁊ poſtea aduenit lingue ſiccitas ⁊ que ſibi ſunt ſimilia: eſt igitur ei ſuccurrēduꝫ cū aqua ordei ⁊ zuccaro.

¶ Nunc ponit cañ. aliū dicēs ꝙ q̄n̄q̄ꝫ flobothomant̄ ve ne vt ꝓhibeat̄ ⁊ remoueat̄ fluxꝰ ex naribꝰ aut matrice aut ano vel etiam pectore aut pulmone: vel vt retineat̄ ex alijs exituris. i. ex alijs partibus per quas exit: ad hoc vt ſan/guis diuertat̄ a parte: ſupple per quā exit ad aliā partē di/uerſaꝫ. Subdit ꝙ talis flobothomia diuerſiua ē forte me/dicamen in iuuādo. Subdit vlterius ꝙ neceſſe ē flobotho mum eē valde ſtrictū: ⁊ ꝙ vices flobothomie ſint multe q̄ nō fiant in vno die: imo die poſt diē niſi ſit magna neceſſi/tas minorando qualibet vice flobothomiā ſm̄ qd̄ poſſibi/le ē. Et ī ſumma melius ē vices flobothomie eē multas q̄ꝫ ſupple eius quātitatē ſupple ī vna vice eē multā. ¶ Ultio ponit cañ. 2m dicēs ꝙ cū flobothomia fit q̄n ñ ē neceſſaria facit ebullire colerā: vnde ꝯſequit̄ ſiccitas lingue ⁊ alia cō ſimilia: cui ſuccurrēdū ē cū aqua ordei ⁊ zuccaro. ¶ Pro parte primo notandū ꝙ ex parte cōcipit̄ primo flobotho/miā nō fieri gr̄a eūationis ſed gr̄a diuerſionis: vt pꝫ in ca/ſibꝰ numeratis ī parte in quibꝰ oꝫ foramē eē ſtrictū: vt mo dicū eūetur de ſanguine quāuis oporteat aliq̄n vices eſſe multas: vt faciamus ſufficiētē diuerſionē ⁊ nō ſubito mul tam diuerſionē. Hoc aūt foramē ſit ſtrictū cū intendimus facere ſcd̄am apertionē ⁊ poterimus tenere foramē aptuꝫ ponēdo ſupra foramē aliquid ſalis aut aliquid olei. ¶ Ul/terius nota ꝙ melius ē vices eē multas q̄ꝫ quātitatem eē multā: q: tēpore intermedio virtus pōt cōfortari p cibum aut aliam rē. Que vices non ſunt fiende in vno die niſi ꝓ/pter magnā neceſſitatē: quia īminet magnū periculuꝫ de nimio fluxu: quare ⁊c̄.

Dubitatur vtrum flobothomia cuꝫ

nō ē neceſſaria faciat ⁊c̄. Negatiue arguit̄ ſic: flobotho/mia cū nō ē neceſſaria aliquādo cōfert: igit̄ ⁊c̄. Cōſequen/tia nota. Añs patuit ſuperiꝰ. ¶ Scd̄o flobothomia non neceſſaria pōt perducere ad eradicationē hūorū frigidoꝝ: ergo ⁊c̄. Conſequētia nota ⁊ añs patuit ſupra. Ad oppoſi/tū ē. A. in lr̄a. ¶ Pro dubio nota ꝙ hic per flobothomiā nō neceſſariā intelligi pōt nullatenus iuuantē imo dāno/ſam. ſuperius aūt intellexit per nō neceſſariā eam que nō fuit neceſſaria ex parte morbi principalr̄ in quo fit. ¶ Se/cundo p̄mittēdum ꝙ p corpus in quo fit flobothomia nō neceſſaria intelligit. A. corpus ꝑfecte ſanū. De corpe autē alio lapſo nō intelligit Aui. quāuis in aliquo pars ꝯtineat veritatē. ¶ Sit igit̄ prima ꝯcl'o hec: flobothomia nō neceſ/ſaria facta in corpore perfecte facto facit ebullire coleram. Hec cōcl'o ſit pro littera ⁊ pꝫ ꝓ tanto q: eūatur ſanguis ⁊ bonū humidū: vnde calidū per agitationē ⁊ motū ⁊ ꝓpter exiccationē fit potentiꝰ ſupra humidū: vn̄ colerā tāquam humorē calidiorē ebullire cōtingit. Calidū eīm vt intēſuꝫ ⁊ ignitū ducit ſanguinē ad naturā colere. ¶ Scd̄a cōcl'o: flobothomia non neceſſaria facta in corpore colerico facit ebullire ſanguinē. Pꝫ ex dictis in notatis: pꝫ ſol'o ad obie cta. ¶ Nota etiā ꝙ notanter aduenit ſiccitas lingue: quia lingua ē mēbrū molle ad qd̄ determināt̄ actiōes ⁊ impreſ/ſiōes ſpiritualiū: ſpūalia aūt ſunt calefacta ⁊ ſtomacꝰ qua/re exiccat̄ lingua. Itē notatur ſiccitas cū ſit organū guſtꝰ ſicut etiā notamus ⁊ attēdimꝰ multū ad ſtomacū tanquā ad lebetē totiꝰ ꝓpter cuiꝰ leſionē ꝯtingit totū valde ledi.

UVA. BHSC. IyR_006_1

Dubitatur vtrū poſt flobothomiaʒ

cōpetat caro aſſata aut elixata: Arguit̃ ꝙ elixata. nā caro lixata ē facilioꝛis digōis q̃ʒ caro aſſata: ergo ⁊c̃. Conſequētia nota ꝓ tāto qꝛ cū virtꝰ digeſtiua ſtomaci ſit debilitata ꝑ flobothomiā: id qđ ē facilioꝛis digōis ꝯuenire videtur. Añs videt̃ eē notū qꝛ humidioꝛa ⁊ mollioꝛa facilius nutriunt. ¶ Scđo arguit̃ ſic: caro elixata ē humidioꝛ ⁊ mollioꝛ aſſata: ergo ⁊c̃. Cōſequētia nota vt ſupꝛa: ⁊ antecedens. ſ. qđ ſit mollioꝛ ⁊ humidioꝛ: pʒ per experiētiā ⁊c̃. Ad oppoſitum ē Aui. ¶ Pꝛo rñſiōe ad dubiū p̄mittēdū ꝙ aſſata ſūt humidioꝛa elixatis humiditate nāli ⁊ ſubſtātifica calido aſſante coꝛꝛugante ⁊ cōſtringēte poꝛos exterioꝛes vt humidū nāle ad exterioꝛa nō trāſeat ſed reclaudat̃. Elixa autem ꝑ caliditatē elixantē quāuis eaꝝ humidū aqueū magis penetret: diſſoluta tñ in bꝛodio humido nāli aſſatis remanēt ſiccioꝛa ſiccitate vt ſic dicā nāli: aut melius per priuatiōʒ humidi nālis. Unde ſi elixū notabili tp̄e retineat̃ vt humidū aqueū ab eo recedat: apparebit ſatis notabilr̃ ſiccum. ¶ Iſto p̄miſſo omittēdo multa expoſitoꝝ verba ponā iſtaʒ cōclōnē. Elixata ſunt facilioꝛis digōis aſſatis ceteris paribus. Pʒ cōclō qꝛ per caliditatē aſſantē aſſata redduntur dura ad digerēdū: vbi elixata per caliditatē elixantē reddunt̃ mollioꝛa ⁊ digeſtibilioꝛa. ¶ Ex iſta infert̃ 2ª ꝙ vbi ſit notabilr̃ debilitata digeſtiua cōpetunt elixata ⁊ nō aſſata. Pʒ cōclō per ſuppoſitionē. ¶ 3ª cōclō ē aſſatū digeſtum cōueniēter ē amplioꝛis nutrimēti ⁊ melioꝛis elixo. Conclō hec pōt colligi ex textu. Et perſuadet̃ qꝛ plus de humido nutrimētali ⁊ ſubſtātifico hʒ aſſatū q̃ʒ elixū: ergo ⁊c̃. Iteʒ cū humidū ſit nālis ē melius in digerēdo. ¶ Ex dictis infero cōclōnem pꝛo Aui. ꝙ aſſatura carnis virtute exñte foꝛti ꝓ recuperando ſanguinē bonū cōueniēs ē. Pʒ ex dictis cū multū nutriat ⁊ ſic bñ digeſta. ¶ Iſtis cōcluſis dicēdū ad obiectū negando ꝯñam. Nā in cāu illo nō ſunt eligenda ea que ſunt citioꝛis digōnis ⁊ melioꝛis: ſed que ſunt cite ſatis digōnis ⁊ multū exhibēt nutrimētū ⁊ bonum.

Qui aūt ſecūdare voluerit ⁊ non acciderit ex pꝛima minutōe malitia paraliſis aut qđ ſit ſibi ſilr̃: venā manꝰ in lōgitudine flobothomare debes ꝓpterea vt iuncture motio ipſiꝰ ꝓhibeat ꝯſolidationē ⁊ vt amplificetur. Qđ ſi cum hoc timoꝛ affuerit ꝙ cito ꝯſolidetur: ſuperponat̃ ipſi pānus oleo cū pauco ſale infuſus ⁊ deſuper ligetur. Et ſi flobothomꝰ etiā oleo inūctus fuerit cū fiet flobothomia: ꝓhibebit conſolidatiōis velocitatē ⁊ minuetur doloꝛ. Et hoc quidē ē vt ſuper ipſuʒ oleū aut ſibi ſimile leuiter iungatur: aut ipſe in oleo mittat̃ poſtea cum pāno exiccet̃. Inter flobothomiā quoqʒ ⁊ ſecūdationeʒ doꝛmire flobothomie ꝯſolidationē feſtinare facit.

¶ In pꝛecedētibus Aui. tetigit nocumēta flobothomie incōuenienter facte: nuc ponit cañ. circa ſecūdationeʒ flobothomie dicens ꝙ volēs ſecūdare. i. duas facere flobothomias: ſi ex pꝛima facta nō ꝯtigit ꝑalyſis aut ſibi ſimile dʒ facere ſcīdendo venā manus ẜʒ longū ne motꝰ iūcture ꝓhibeat ꝯſolidationē poſt amplificet̃ vulnꝰ. Et ſi hoc facto timeat̃ cita ꝯſolidatio: ſupponat̃ foꝛamini pānus infuſus oleo cū pauco ſale ⁊ liget̃ ſuꝑ foꝛamen. Et ſi flobothomus iungat̃ oleo dū fit flobothomia ꝓhibet citā ꝯſolidatōeʒ ⁊ minoꝛ erit doloꝛ: poſtea flobothomꝰ exiccet̃ cū pāno. Dicit vlteriꝰ ꝙ doꝛmire īter pꝛimā ⁊ ſcđaʒ flobothomiā facit ꝯſolidatōeʒ eſſe citioꝛē. ¶ Pꝛo ꝑte pͦ nota ꝙ ꝑ paralyſiʒ ītelligere poſſumꝰ quācūqʒ coꝛpoꝛis laſſitateʒ ⁊ ad motiones īpotentiā ⁊ ſincopim: hoc modo paralyſiʒ eē credimꝰ: qꝛ tūc eſt coꝛpus ac ſi vere foꝛet mollificatuʒ. Si ergo qs vult facere ſcđam flobothomiā ⁊ non ꝯtigerit ex pꝛima talis laſſitas aut debilitas virtutis: tūc fiendū eſt vt in ꝑte ponit̃. Si vero ꝯtigiſſet debilitas virtutis: tūc debemꝰ conari vt foꝛamen cito ꝯſolidet̃ ne eiꝰ ſequat̃ debilitas maioꝛ. ¶ 2ͦ ꝑ ꝑalyſiʒ ītelligere poſſumꝰ mollificatōem totiꝰ: aut ꝑtis ꝯtingentē ex pūctura nerui ex pͣ flobothomia aut ſibi ſilr̃eʒ: qꝛ leſionē neruoꝝ ex tali pūctura ꝯtingēteʒ: q̃lis leſio ē ſpaſmꝰ vel ꝯſimile: q̄ ꝑs verificat̃ vt dictū eſt. ¶ Itē nota ꝙ notāter dictū ē de vena manꝰ q̃ſi ſcīdat̃ ẜʒ lōgū ꝑꝑ iūcturā maxīe ē apta aꝑiri: ītelligēdo ꝑ manū illđ qđ ē a cubitu vſqʒ ad extrema digitoꝝ. Nā ſi ſcindat̃ vena bꝛachij ẜʒ longū: notū ē ꝙ ī retractōe bꝛachij aperit̃ foꝛamen ⁊ ꝓhibet̃ cita ꝯſolidatio. ¶ Ulteriꝰ notanduʒ ꝙ oleū cadens īter extrema vene inciſe ꝓhibet ꝯſolidationeʒ cū pars nō poſſit debite vniri parti. vñ cū q̄rimus citā cōſolidationē: vidēdū ē ne aliquid cadat īter labia vulneris: vt pʒ 3ͦ tegni. Uiſcoſa tamē ſumpta interius ⁊ trāſmutata in ſanguinē viſcoſum iuuāt ad cōſolidatiōeʒ. Sed applicata exterius ponēdo ea inter labia cōſolidāda ꝓhibēt cōſolidationē citā. Sed etiaʒ pungendo exiccādo totales ꝑtes labioꝝ que debēt conſolidari ꝓhibet cōſolidationē. Et notāter dʒ eē pauce quātitatis: ne ſua quātitate multa nimis exiccaret ⁊ moꝛdicaret. ¶ Ulterius nota ꝙ flobothomus dʒ vngi duabꝰ de cauſis. Nā citius penetrabit qꝛ factus mollioꝛ ⁊ minoꝛē doloꝛē inducet. Itē dimittēs aliquid in foꝛamine de oleo ꝓhibet citam cōſolidationē. Itē poſtquā flobethomus ſtetit ī oleo dʒ abſtergi aliqualr̃ ne lubꝛicet ꝓpter ſuā magnā humiditatē ⁊ nō debite attingat venā. ¶ Nota ꝙ doꝛmire facit cōſolidationē citā qꝛ in ſomno foꝛtificant̃ virtutes nāles ⁊ per ꝯñs eius operatiōes qꝛ eius partes cōſolidande melius adinuicē applicant̃ in ſomno vbi in vigilia nō pñt illa cōiungi inuicem. Etiā in ſomno humoꝛes ⁊ ſpūs retrahunt̃ verſus interioꝛa: ⁊ nō ita verſus foꝛamē ip̄m extendendo.

Scias ꝙ interdū ī flobothomia accidit paraliſis ⁊ qñqʒ ſpaſmꝰ ex punctura coꝛde ſeu nerui per flobothomū: alij accidit apoſtema ſi ꝯtingat vt rūpatur cuſpis flobothomi ī ſciſſura vene vel artarie: etiā ex ꝯcurſu humoꝝ ad locū leſuʒ: ⁊ qñqʒ accidit empoꝛiſma qđ mater ſanguinis dicit̃ ex tali ꝑcuſſione ſeu punctura artarie cū flobothomo. Et quod cūqʒ iſtoꝝ ī pꝛima flobothomia ꝯtigerit ſecundationē pꝛohibebit: ne ſi fiat renouet erroꝛes: q̄re ⁊c̃.

Recoꝛdare p̄terea eiꝰ qđ diximꝰ de eūone in hyeme cū medicina ꝙ dies ē eligēda auſtrina q̄m ſilr̃ in flobothomia. Et ſcire debes ꝙ cū minuūtur melācolici ⁊ epileptici ⁊ illi quos minuere oʒ ī nocte in hoꝛa doꝛmiēdi: oʒ vt ſit anguſtus. ſ. flobothomꝰ iō ne ſāguis exitꝰ accidat: ⁊ ſilr̃ in oībꝰ qui ſecūdatōe nō idigēt. Scire quoqʒ đbes ꝙ ſecūdatio ẜm debilitatis mēſurā ē tardāda. Et ſi debilitas quidē nō affuerit: ſit vltīa eiꝰ tardatio vna hoꝛa. Qui voluerit eaʒ facere vt ſanguis ipſiꝰ trahat̃: ſit dies vnꝰ. Ampliꝰ flobothomia trāſuerſa melioꝛ ē ei qui ſecūdationē vult ī eadeʒ. Et illa que ē ẜm latitudinē: ei qui vult ſecundationē in eadē hoꝛa. Et illa q̄ eſt ẜm lōgitudineʒ: ei qui vult nō vna eſſe ꝯtentꝰ ſecundatōe: imo in coꝛde tenet ꝙ eā per multos faciet dies quaqʒ die. Cūqʒ flobothomie doloꝛ maioꝛ fuerit: tāto erit eius ꝯſolidatio tardioꝛ.

¶ Nūc ponit Auic. aliū cañ. dicēs ꝙ ſis p̄terea memoꝛ dicti de eūatione fiēda ī hyeme, ꝙ dies ē eligēda auſtrina.

¶ Scđo ponit aliū cañ. dicēs ꝙ cū flobothomant̃ melācolici epileptici ⁊ alij quos flobothomare vis in nocte tꝑe ſomni: oʒ flobothomū eē ſtrictū ne accidat ſanguis exitꝰ multꝰ. Et ſilr̃ ē fiēdum in oībus nō egentibꝰ ſecūdatiōe.

¶ Dicit 3ͦ ꝙ debes ſcire ꝙ ſecūdatio ē tardanda ẜm debilitatē virtutis. Et ſi debilitas nō affuerit vltimū tempꝰ tardatiōis ſit vna hoꝛa. Uolens tñ flobothomiā facere vt diuertat̃ ſanguis tardet ſecūdationē ad vnū diē. ¶ Dicit penultimo ꝙ trāſuerſa flobothomia melioꝛ eſt volēti facere ſecūdationeʒ in eadeʒ hoꝛa: ⁊ facta ẜm longū melioꝛ eſt illi qui nō ꝯtentat̃ in vna ſecundatōe: īmo dʒ menti facere multas ſecūdatōes multis diebꝰ. ¶ Ultimo dicit ꝙ quāto doloꝛ eſt maioꝛ dū fit flobothomia: tāto ꝯſolidatio erit tardioꝛ. ¶ Pꝛo parte nota ꝙ regulr̃ ⁊ electiue flobothomia fiēda eſt de die ⁊ mane: qꝛ digeſtio eſt melius celebꝛata q̃ʒ nocte vtentibꝰ coꝛpoꝛibꝰ cōi regimine. Itē nox eſt tēpus deputatū doꝛmitionibꝰ ⁊ non eūationibꝰ nec motionibꝰ. Itē de die humoꝛes ſūt magis eliquati ⁊ magis mobiles: ⁊ ſic per flobothomiā magis educibiles. Itē minutoꝛ meliꝰ pōt ꝯpꝛehēdere venā flobothomādā. Coacte tñ oʒ nos nocte flobothomare pꝛimo dū non habemꝰ inducias ad expectādū dieʒ vt ī ſinocha īflatiua timēdo ſanguīs putrefactōeʒ ſi non fiat cito ẜʒ ꝙ fecit Gal. 9ͦ terapētice: ſicut etiā ī ſquinātia timētes ſuffocationeʒ: ſicut ēt in percuſſione aut cāu timētes apātionē: aut etiā hoc facimꝰ ꝑꝑ quietē infirmoꝝ: aut ēt ꝓpter quietē humoꝝ tꝑe noctis ſicut ē in cāu pñti. Nā pͦ melācolici. i. hñtes paſſiōʒ melācolicā aut maniā aut ſimilia qꝛ ī nocte ſunt magis quieti: magis ēt in nocte ſunt flobothomandi: qꝛ etiā coꝛpoꝛa epileptica habent humoꝛes magis cōmotos ī die ⁊ paroxiſmus ē magis aptus eis aduenire: iō in nocte pñt meliꝰ flobothomari. ¶ Ulteriꝰ nota ꝙ flobothomꝰ dʒ eē ſtrictus in talibus caſibꝰ: qꝛ quāuis hēant groſſum ſanguineʒ ꝑꝑ quē oʒ foꝛamē eē amplū: tñ qꝛ timemus ne ex inoꝛdinatis motibus exeat multū de ſanguine facimꝰ foꝛamē ſtrictuʒ. ¶ Ulterius nota ꝙ coꝛꝑa nō egentia ſcđatione flobothomie de quibꝰ intelligit Aui. ſunt coꝛꝑa debilia ī quibꝰ flobothomꝰ dʒ eē ſtrictus ne debilitent̃ per exitū multi ſanguinis. ¶ Ulteriꝰ nota ꝙ flobothomia notāter ē tardāda ẜm debilitatē virtutis. Cū eiʒ in oī eūone pꝛicipalr̃ intēdamus virtuti: nō exñte tñ debilitate dʒ tardari vna hoꝛa. i. modico tꝑe. ¶ Ulteriꝰ nota ꝙ volens facere flobothomiā gr̄a diuerſionis dʒ tardare ꝑ vnū dieʒ. Et hoc ꝯtinet verū maxīe ſi ītendimꝰ diuertere ꝓpter ſedare aliū fluxū ſuperfluentē. nam bonum eſt tardare flobothomiā vno die. ¶ Etiā nota ꝙ flobothomia facta ẜm latū eſt facilioꝛis ꝯſolidatōis iuuante plicatiōe iūcture ad plicatiōeʒ ⁊ ꝯſolidationē. Facta vero ex trāſuerſo capiēs de lōgo ⁊ lato: difficilioꝛ eſt ad ꝯſolidationē. Ea vero q̄ ē ẜm longū difficilioris eſt ꝯſolidatōis. Quāto vero doloꝛ ē maioꝛ: tāto difficilioꝛ ꝯſolidat̃. Nā quāto doloꝛ eſt maioꝛ: tāto ad locuʒ dolentē currūt humoꝛes īpedientes ꝯſolidatōeʒ. Iteʒ quāto doloꝛ eſt maioꝛ: tāto plus debilitat̃ pars dolens: ⁊ ꝑ ꝯñs fit īpotentioꝛ ad ꝯſolidādum.

Hec ēt dixit ſupꝛa de farmacia iuxta finez quīti capl̄i parapho illo: Et ille cui in hyeme neceſſariū fuerit ⁊c̃. ⁊ legas ibi annotatiōeʒ ⁊ habebis cāʒ dicti. Cā aūt huiꝰ qđ hic dicit̃ poteſt eſſe: qꝛ in hyeme vene cōſtricte ſunt ⁊ ſāguis ꝯpactus a frigoꝛe hyemis: quare ſāguis difficulter effluit vel ſubtilis exit ⁊ groſſus remanet: ventus aūt auſtralis ſua caliditate ⁊ humiditate hūoꝛes diſſoluit ⁊ venas relaxat: quare ⁊c̃. Et ſcito vlteriꝰ dieʒ auſtrinaʒ ſolū ī hyeme eligēdam eſſe: ex eo ꝙ auſter nō ē illius malicie ī hyeme ſicut ē in alijs tēpoꝛibꝰ: etiā qꝛ hyems ſuo vehemēti frigoꝛe oīa conſtrigit coartat ⁊ opprimit ī que penetrat auſter ⁊ ad veris naturā declinare facit. Hoꝛā vero eligēdā in alijs tꝑibus infra dicet Aui. in iſto capitulo parapho illo: Hoꝛa vero eius electa eſt que ē in lumine diei ⁊c̃.

Multis p̄terea ī ſecūdatiōe eūatio ſincopiʒ affert niſi fuerit poſtq̄ʒ aſſature aquā ſūpſerit. Inter flobothomiā quoqʒ ⁊ ſecūdatōeʒ doꝛmire ꝓhibʒ ne ſuꝑfluitates

que

UVA. BHSC. IyR_006_1

que extrahunẗ cū ſanguīe īcedāt: ꝓpterea ꝙ ſuperflui/tates ī ſomno ad corꝑis ꝓfundum trahūtur. Ex iuua/mētis vero ſecūdatōis ē ꝙ flobothomati virtutē cū ꝑfe/ctōe ſue euacuationis que eſt neceſſaria cōſeruat. Et me/lior quidem ſecūdatōis terminus eſt vt duobus aut tri/bus tardeẗ diebus.

¶ Nunc ponit aliū cañ. dicēs ꝙ p̄terea eūatio in ſecū/datōe affert ſincopiꝫ multis niſi facta fuerit ſecūdatio poſt potū aq̄ aſſature carnis. ¶ Dicit 2° ꝙ dormire poſt flobo/thomiā ꝓhibet ne ſupfluitates eūenẗ: īmo trahunẗ ad fun/duꝫ corporis. ¶ Dicit 3° ꝙ ex iuuamētis ſecūdatiōis ē q̄d ꝯſeruat virtutē flobothomati ꝑficiēdo neceſſariā eūoneꝫ: cuiꝰ ſecūdatōis melior terminꝰ eſt tardare duobꝰ diebus. ¶ Pro ꝑte nota p̄° notāter dictū eſſe multis: q: hn̄tibꝰ os ſtomaci debile aut colericū ⁊ breuiter flobothomatis ꝑ flo/bothomiā multā. ¶ Scd̄o nota ꝙ ꝑ aquā carnis aſſate n̄ habemꝰ intelligere vnctuoſitatē que liq̄ẗ in aſſatiōe. Il/la enim inducit faſtiſtiū ⁊ ꝓuocat vomitū. Sed habemus ītelligere hūiditatē ſubſtātificā que emanat a carnibꝰ aſſa/tis cōpreſſis carnibꝰ. Talis enim aqua diciẗ facilis dige/ſtionis ⁊ citiſſime reſumptōis. De qua aqua hēmus textū Aui. ī de viribus cordis. ¶ Ulterius nota ꝙ dormire in/ter primā flobothomiā ⁊ ſcd̄ationē facit vt ſupfluitates ⁊ humores qui erāt moti ꝑ primā flobothomiā ad exteriora trahanẗ ad ꝓfundū corꝑis. Ex quo pꝫ ꝙ ille qui vult face/re ſcd̄ationē vt debite eūet hūores dꝫ cito facere anteq̄ꝫ il/le dormiat vt ꝑ duas horas aut quattuor. Si vero vult fa/cere ſecūdationeꝫ gratia diuerſiōis oꝫ ipꝫ ꝑlus tardare vt dictū eſt ſupra. ¶ Nota ꝙ ſecūdatio nālis ē vt ꝯplete eūeẗ mā virtute ꝯſeruata. ¶ Nota ꝙ ſecūdatio dꝫ tardari duo/bꝰ diebꝰ aut tribꝰ vbi habemꝰ ītentōeꝫ eūare totā mām ⁊ multū ꝯſeruare virtutē: vbi aūt vellemꝰ eūare totā mām ⁊ virtus ꝯſtaret: tūc in eadē poſſumus ſecūdare flobotho/miā: ⁊ ſic non eſt ꝯtradictio in dictis Aui. ⁊c̄.

Ex dormitōe vero flobothomie ꝓpiqua plerūqꝫ ac/cidit ī mēbris ꝯfractio. Balneatio quoqꝫ anteq̄ꝫ minu/tio fiat: plerūqꝫ aggrauat minutōeꝫ: propterea ꝙ cuteꝫ īgroſſat ⁊ eā lenificat ⁊ ad lābendū aptaꝫ efficit niſi flo/bothomādus multā ſauguis hūerit groſſitiē. Et oꝫ ne flobothomatꝰ ī ſe replēdo ſit audax: ſꝫ ſm̄ ordineꝫ nu/triatur ⁊ cibuꝫ primitꝰ ſubtiliet. Et ſil'r oꝫ ne poſt ipſam exerciteẗ: ſꝫ declinet ad hoc vt ſupinus iaceat: neqꝫ poſt eā balneo vtatur reſolutōeꝫ faciente.

¶ Nunc ponit aliū cañ. dicēs ꝙ ex ſomno ꝓpinquo flo/bothomie accidit ſm̄ plurimū mēbroꝝ ꝯfractio. ¶ Dicit 2° ꝙ balneū añ flobothomiā ſm̄ plurimū facit flobothomiaꝫ eē grauē aut difficilē: q: īgroſſat cutē ⁊ lenit ipām: ⁊ facit ipām aptā ad lābēdū aut lubricādū niſi flobothomandus habuerit ſanguinē groſſum. ¶ Dicit penultimo ꝙ flobo/thomatus nō ſit auſus in replēdo ſe: īmo ordinate nutriaẗ ⁊ nō ex toto ſubtiliet cibū. Et ſil'r oꝫ ne poſt flobothomiaꝫ exerciteẗ: īmo iaceat ⁊ ſtet ſupinꝰ. Itē n̄ vtaẗ pꝰ flobotho/miā balneo reſoluēti. ¶ Pro ꝑte nota ꝙ ſomnꝰ poſt flobo/thomiā facit cōfractionē: p̄° q: facta ē agitatio ⁊ ſanguis cōmotio. ſi ergo fiat ſomnꝰ cōtrahūtur humores cōmoti verſus interiora ⁊ ex tali cōmotiōe cōfractio ſequiẗ. Iteꝫ in ſomno ſpūs ⁊ hūores trahūtur ad iteriora: vn̄ exteriora remanent depauperata: vn̄ ex tali retractōe apparent mē/bra laxata ⁊ fracta. Sil'r videmꝰ ī fatigatis qui nō ꝑcipiūt ꝯfractionē ⁊ laſſitudinē ī die illa ſed ī die ſequēti poſt ſom/num. Et notāter dictū ē plurimū q: maxime hoc cōtigit ſi corꝑa nō ſint valde robuſta ⁊ fortia: aut non ſint cōſueta dormitiōi poſt flobothomiā. Quedā enim ſunt que nō le/dūtur. ¶ Ulteriꝰ nota ꝙ balneū trahēdo ſupfluitates ad cutē ⁊ replendo poros cutis facit ingroſſari cutē ⁊ facit flo/bothomiā eē grauē: vt pꝫ. Balneū eīm cōuenit ſi ſanguis ſit groſſus: ⁊ in illo cāu qn̄ fit flobothomia ē exiccāda cu/tis ne lubricet. ¶ Ulterius nota ꝙ talis poſt minutionem nō dꝫ ſe replere: p'o q: virtus debilitata ꝑ flobothomiaꝫ nō pōt digerere multū cibū. 2° q: cuꝫ mēbra ſint īanita ſi caperet multū cibū ſtomacꝰ nō eēt auarus in retinēdo ipꝫ īō trāſiret indigeſtus ad mēbra. ¶ Ulterius nota ꝙ īme/diate poſt flobothomiā nō dꝫ ille exercitari ne addaẗ debi/litas debilitati: ne ēt per exercitiū ponanẗ hūores ī āpliori ebullitiōe ⁊ motu. Et maxime dꝫ ſtare ſupinꝰ q: ſtans ſu/pra dorſum ſtat quaſi ſupra fundamētū totius corꝑis: ⁊ il/le ē melior ſitus ꝓ fortificando virtutē. ¶ Ulterius nota ꝙ ille n̄ dꝫ balneari balneo reſoluēte quale ē balneū aque calīe multū ī q̄ ꝯbat magnā morā. cā ē ne addaẗ debilitas debilitati. Sꝫ vtrū debeat balneari balneo n̄ reſoluēte: eſt dubiū. Regul'r tamē nō ē ꝯueniēs niſi ꝑꝑ alia iuuamēta.

Scias tñ ꝙ lꝫ ſtatī ꝑ poſt flobothomiā nō ſit dormiēdū: ſomnus tñ ꝯpetit tribus aut quattuor horis poſt ipſā. ſ. dū ſanguis flobothomati mo/mētis ꝑfecte reſedit: nō ſolū poſt tres vel quattuor horas: īmo poſt duas ſomnꝰ cō/cedit: ⁊ ꝓ hoc vide Gal. nono de īgenio ſanitatis. c. iij. vbi de quodā patiēte ſino/chaꝫ dicit: Cuꝫ ergo minui extrahēs ſan/guinē vſqꝫ ad defe/ctionē poſt duas aūt horas minutiōis ci/buꝫ aliquātulū ei de/diſſem vt quieſce/ret ⁊ dormiret ⁊c̄.

Cū aūt aliquis flobothomaẗ ⁊ poſtea ipſiꝰ brachiū apoſtemaẗ: ex altero brachio minuaẗ ſm̄ ꝙ tollerauerit: ⁊ ſuper ipſuꝫ emplaſtrū de ceruſa ponatur: ⁊ ex fortiter īfrigidātibꝰ in circuitu eius fiat cataplaſma.

¶ In p̄cedētibus Aui. poſuit cañ. obſeruādū poſt flobo/thomiā: nūc docet ſuccurrere cuidam accidēti. ſ. apati cō/tingēti ex flobothomia. Dicit ſic ꝙ cū brachiū alicuiꝰ flo/bothomati apaẗ ſupple ꝓpter flobothomiā: flobothomeẗ ex alio brachio ſm̄ tollerantiā virtutis. Iteꝫ ponaẗ deſuꝑ empl'm de ceruſa: ⁊ fiat in circuitu loci apati cataplaſma ex rebus infrigidātibꝰ fortiter. ¶ Pro parte nota ꝙ bra/chiū pōt apari multis de cauſis. Aut ꝑꝑ dolorē cōtingētē ex pūctura nerui ꝑꝑ quā currūt humores ⁊ apant neruū: ⁊ in illo cāu nō cōpetūt ēplaſtrū de ceruſa nec etiā infrigi/dātia fortia poſita in circuitu: q: illa hn̄t claudere nerui pū/cti foramē: īmo ī illo cāu cōueniūt apiētia. 2° pōt cāri apa facto ēporiſmate aut māe ſanguis. ſ. qn̄ foramē cutis n̄ fue/rit debite aꝑtū ſꝫ remāſerit ſanguis īter venā ⁊ cutē: ī illo cāu cōuenit ēplaſtrū dictū: īmo ītentio ē vlterius aꝑiendo ducere ſanguinē aut reſoluere ſanguinē fluxū. 3° pōt hoc apa cōtingere retēta vētoſitate ī foramīe vene: ⁊ etiam ibi retēto ſanguine: ⁊ ſil'r etiā in iſto cāu nō cōpetit dictū re/mediū: īmo potiꝰ reſoluētia. 4° ꝯtingere pōt hoc apa ꝑꝑ ſolutā cōtinuitatē vene ⁊ cutis: ⁊ ī iſto cāu loquiẗ Aui. ita ꝙ ꝓpter dolorē fluāt humores ad locū dolētē: ⁊ īde apa/tio ſeq̄ẗ. In iſto cāu ꝯuenit fl'omia in alio brachio facta ad diuertēdū māꝫ fluētē q̄zuis mā exn̄te fluxa de brachio eo/dē debemꝰ facere fl'omiā nō diuertēdo: ſm̄ quā intētionē loquitur Raſis 5° almanſoris. Itē in iſto cāu ꝯuenit ēpla/ſtrū de ceruſa q̄d ēpluꝫ hꝫ reꝑcutere ⁊ exiccare. Cataplaſ/ma aūt q: decoctio facta ex fortiter īfrīdātibꝰ poſitis ī cir/cuitu vt mā debite repellaẗ cōuenit. Notāter dictū ē ī cir/cuitu q: cataplaſma nō ē ponēdū ſupra foramīe: ne māꝫ flu/xam āplius cōſtringēdo incuniet.

Cūqꝫ aliquis eoꝝ flobothomaẗ ī quoꝝ corporibꝰ ſu/perabūdantes exiſtūt humores flobothomia fit cā ebul/litōis illoꝝ humoꝝ ⁊ eoꝝ curſus ⁊ ipſoꝝ permixtiōis: fit ergo frequens flobothomia eis neceſſaria.

¶ Nunc Auic. ponit aliū cañ. dicēs ꝙ cū aliquis flobo/thomaẗ de numero eorū ī quibꝰ humores ſuperabūdant flobothomia fit cā ebullitiōis illoꝝ humoꝝ ⁊ fit cā fluxus ipſorum ⁊ permixtionis ipſoꝝ: īō frequens flobothomia eſt ſumme neceſſaria.

Dubitatur an habenti ſuperabūdā

tiam humorum a ſanguine ꝯueniat frequēs flobothomia? Et arguiẗ ꝙ non: q: hn̄ti ſuꝑabūdantiā humoꝝ flegma/ticoꝝ frequēs flobothomia nō cōuenit: igiẗ ⁊c̄. Cōſequen/tia nota ītelligēti cōcl'onē Aui. vl'r. Pꝫ añs q: talis flobo/thomia ē cā talis incrudatiōis. ¶ Scd̄o ſic: habēti ſuꝑ/abūdantiā humoꝝ colericoꝝ nō cōuenit flobothomia: er/go ⁊c̄. ꝯn̄a tꝫ: ⁊ pꝫ añs q: īnde corpus incurrit ebullitiōeꝫ. ¶ Tertio ſic: frequēs flobothomia ducit multitudinē hu/moꝝ ad curſum ⁊ ebulitionē: igiẗ ⁊c̄. Añs poniẗ in parte. ꝯn̄a tꝫ q: corpꝰ nō ē ducēdū ad ebullitionē. Ad oppoſitū ē Aui. ¶ Pro dubio nota ꝙ corpoꝝ quedā ſunt cachochi/ma q̄dā plectorica. Plectorica ſunt duplicia quedā ſunt plectorica vera ī quibꝰ ē quattuor humoruꝫ ꝓportionalis excreſcentia: quedā ſunt plectorica nō vera in quibꝰ ē pec/catuꝫ ſanguis in quāto ſanguis. Corꝑa vero cachochima ſunt multiplicātia hūores ſm̄ peccatū qualis. Iteꝫ quedā ſunt in quibꝰ ē multitudo ſanguis: quedā aūt in quibꝰ eſt paucitas. Iſto poſito pono aliquas cōcl'ones ad queſituꝫ. ¶ Pria ē: Corꝑi vero plectorico cōuenit flobothomia. Cō/cluſio pꝫ q: ī tali corꝑe ē peccatū corrigibile per flobotho/miā copioſaꝫ: igiẗ ⁊c̄. ꝯn̄a nota ⁊ añs pꝫ cum ſit hic ꝓpor/tionalis humoꝝ excreſcētia aut ſaltē ſanguis. ¶ Scd̄a cō/cluſio: In hn̄te ſuꝑabūdātiā hūoꝝ colericoꝝ ⁊ ꝯmixtiōeꝫ hūoꝝ maloꝝ cū bonis agitāte fl'omia: nō cōuenit fl'omia copioſa. Hec ꝯcl'o ſit ad mētē Aui. ⁊ arguiẗ ex cā q: ſtāte illa ſuꝑabūdātia ⁊ ſtāte paucitate ſanguis ſi flobothomia ē copioſa: ⁊ ſi tunc eūabiẗ multū de colera etiā eūabiẗ de ſanguīe: vn̄ ſequeẗ ebullitio ⁊ curſus humoꝝ colericoꝝ ⁊ cōmixtio humoꝝ maloꝝ cuꝫ bonis agitāte flobothomia. ¶ Tertia cōcl'o: In tali cāu ꝯuenit frequēs flobothomia. Pꝫ cōcl'o ex eo q: facta aliquali flobothomia eūaẗ de hu/more colerico: ⁊ nō eūatur ēt multū de ſanguīe bono: nec etiā ſequeẗ ebullitio ⁊ accidētia mala n̄ eūato ſanguīe mul/to: deinde facta nā potētiori ſupra mām ſi fiat etiā ſcd̄a flo/bothomia cōfert nec nocumēta ſequētur. Frequēs igitur flobothomia ē vtilis ⁊ neceſſaria. Iſtis poſitis pꝫ Aui. in/telligere de humoribꝰ colericis. Ad ſcd̄am ⁊ tertiā rōnes dicētes ꝙ talis flobothomia multa ꝑduceret ad humoruꝫ colericorū ebullitionē: ſed pauca flobothomia ⁊ frequēter facta nō vbi colera eſt ducibilis per flobothomiaꝫ cū par/ua quantitate ſanguinis.

Sanguis quoqꝫ melācolicus facit vt frequens mi/nutio ſit neceſſaria que in preſenti quidē alleuiat: ſed in ſenio peruenitur inde ad malas egritudines ex quibus eſt apoplexia.

¶ Nunc Aui. ponit aliū cañ. dicēs ꝙ ſanguis melācoli/cus facit flobothomiā frequēter eē neceſſariā. Que ſi alle/

UVA. BHSC. IyR_006_1

Hoc etiā ꝯmemorauit nobis Raſis q̄rto almāſoris capl̄o de iuuamētis ⁊ nocumentis flobothomie cū dixit: Ex frequenti ſāguīs minutōe malignitas ꝯplexionū atq; idropiſis ⁊c̄. ⁊ lege tu vlteri⁹ ⁊c̄. Hui⁹ aūt cā pōt eē q꞉ i omi flobothomia cū eductione mali ſanguis multuz de benigno ſolet educi: tam ſub forma ſanguis q̄ ſub forma ſpūs: vn̄ cōſumptio radicalis humidi paſſiui accelerat ⁊ calor īnatus citi⁹ pit ⁊ digōnis vigor minuit ⁊ flegma ſurrepit tandez ipſum ſuffocans: quacr ⁊c̄.

uiat in pn̄ti: in ſenio tn̄ ducit ad malos morbos ſicut ē apoplexia. ¶ Pro pte nota q̄ p ſanguinē melācolicū intelligim⁹ talez de melācolia nāli aut aduſta. ¶ Nota primo ſi ſit melācolic⁹ melācolia educibili p flobothomiā copioſaz flobothomia nō cōpetit nō ſtāte pc̄o ſanguis. Cōpetit tn̄ flobothomia cū eūat hūor melāeolic⁹: ergo opz flobothomiā paucā eē ⁊ frequētē vt totus ſanguis melācolic⁹ educatur. Si vero per ſanguinē melācolicū ītelligim⁹ melācoliam aduſtā nō cōuenit flobothomia copioſa pp cām aſſignatā. Ut tn̄ ſanguis remoueat ⁊ aduſtio eūetur conuenit flobothomia vt inde eūetur ſanguis: tn̄ ipa nō dz eē copioſa pro vice: imo oz ipam eē frequentē. ¶ Et nota vlterius q̄ flobothomia ⁊ maxime in corpib⁹ frigidis aliqn̄ in pn̄ti iuuat vt. ſ. in tpe iuuentutis aut primi ſenij. In ſenio tamē quātū ad magnū ſui pceſſum facit puenire ad malos morbos ſicut ē apoplexia. Nā eūando ſanguinē ⁊ ſpūz debilitatur cerebrū multiplicādo multā māz flegmaticā que poſtea ē cā apoplexie aut epilepſie aut ſiliuz morboꝝ fridoꝝ. Pōt tn̄ intelligi de flobothomia facta frequēter ī tpe iuuentutis: que ⁊ ſi in illo tempe aut etate nō faciat notabile nocumētū: ē tn̄ cā futuri nocumēti ī etate futura frigida.

Amplius flobothomia multotiēs cōmouet febres ⁊ multotiens reſoluit putrefactionē.

¶ Nunc Aui. ponit aliū cañ. dicēs q̄ flobothomia multotiens cōmouet febrē ⁊ multotiēs remouet putrefactiōz. ¶ Pro parte nota q̄ flobothomia pōt eē cā fe. effimere putride ⁊ ethice. Nā prīo flobothomia ſatis ſupfluēs facit ebullire ſpūs: ⁊ ſic pōt eē cā effimere: vt colligit prīa quarti. c. de fe. effimera cauſata ex eūatiōe. Pōt etiā eē cā putride: cū eiz colerā ebullire facit aut hūorē aliū: tūc pōt eē cā putrefactiōis cū ad ebullitionē humoris ſequat putrefactio. Itē pōt eē cā ethice. nā inaniēdo multū corpa faciēdo etiā corpus ebullire pōt cāri caliditas fixa ī corde ⁊ per ꝯn̄s febris ethica. ¶ Sc̄do nota q̄ flobothomia remouet putrefactionē: remouēdo primo ſanguinē oppilātē ⁊ phibentē debitā trāſpirationē. nā phibita trāſpiratio eſt cā putrefactiōis vt prīo de accidēti. Itē cū per flobothomiā educant fumi capinoſi qui ſua caliditate erant cā putrefactionis flobothomia remouēdo illos remouet putrefactionē. Itē remouet putrefactionē eūando rē putridā. Itē remouet putrefactionē exonerādo virtutē. Naz ſicut cātur putrefactio mā nō regulata īmo ſupāte virtutez: ita remouetur putrefactio virtute exonerata ⁊ facta potētiori ſupra mām. ¶ Tertio nota q̄ nō ē incōueniēs idē agēs ſm diſtinctionē paſſoꝝ diſtinctos pducere effect⁹: vt ſi prīo flobothomia fiat ī colerico corpe ī quo abūdant colerici humores ipa perducit ipm ad eoꝝ ebullitionē ⁊ putrefactōz. Si vero fiat flobothomia debite ſanguine exn̄te putrefacto ⁊ corrupto: ipa remouet putrefactionē. ¶ Ultimo nota q̄ flobothomia reſoluit putrefactionē: q꞉ reſolutio quātū ē in pn̄ti nō ſumit ppꝛie pro cōuerſione humorū in vaporem: vt 5ª affo. ꝯmēto 49º. Sz ſumit hic reſoluit. i. phibz aut remouet putrefactionē.

Omis quoq; ſanus qui flobothomat: illud qđ ī capl̄o de potu diximus accipere debet.

¶ Nunc Aui. ponit aliū cañ. dicēs q̄ oīs ſan⁹ flobothomatus dz accipe qđ dictū ē in. c. de potu. ſ. tertia primi. ¶ Ad ītellectū partis prīo nota q̄ notāter dictū ē ſan⁹: q꞉ īfirmis ſm exigētiā morbi nos oz variare potū vt ſi febriat acute multus exhibēdus ē potus aque cocte aut vinum granatoꝝ ⁊ ſimilia. Quare aūt potus cōueniat poſt flobothomiā ſaltē tpe notabili ē. nā cū facta ſit inanitio ⁊ exiccatio pro recōpenſatiōe deperditi aliquis pot⁹ ē dandus. Sano aūt corpi ex loco allegato cōuenit potus vini vt reſtauret deperditū per flobothomiā. Qđ vinū opz eē aliud ⁊ aliud ſm diſtinctionē corpoꝝ. Oz ēt eē āplioris ⁊ paucioris quātitatis ſm hāc diſtinctionē. Nō tn̄ poſt flobothomiā imediate potādum ē. Nā cū ſit facta ebullitio humorū: timor eēt de ebullitiōe pot⁹ ⁊ eius corruptiōe. Itē etiā cōſiderandū ē in hoc ꝯſuetudo potus. Sunt eiz aliq plus ⁊ minus cōſueti vino ⁊ potui.

Et debes ſcire q̄ venaꝝ que flobothomant: alie ſūt que ſūt tātuz vene ⁊ alie ſūt q̄ ſunt tātuz artarie.

Nunc ponit Aui. cañ. obſeruāduz ī flobothomia ratiōe ei⁹ a quo fit eūatio. Et quattuor facit. Nā prīo cañ. ponit circa flobothomiā venaꝝ ⁊ artariarū man⁹. 2º ponit cañ. circa flobothomiā venaruz pedis. 3º ponit cañ. circa flobothomiā venarū capitis ⁊ colli. 4º ponit cañ. circa flobothomiā partiū magis mediaꝝ. ibi 2ª: etiā quidē accidit nobis. ibi 3ª: in venis aūt. ibi 4ª: ex venis. Prima in duas. Primo Aui. determinat de flobothomia venaꝝ manus. 2º de flobothomia artariaꝝ man⁹. ibi 2ª: artaria vero manus. Prima pars cōtinet partes duas. Prīo Aui. ponit quaſdā diſtictōes quādā noticiā gnālez ⁊ ꝯferentiā ponēdo de flobothomia venaꝝ ⁊ artariaꝝ. In pte 2ª exequet d̄ flobothomia venaꝝ. ibi 2ª: vene p̄terea man⁹. Prīa ī duas. Prīo Aui. ponit quādā diſtinctiōez gnālem. 2º ponit noticiā flobothomie artariaꝝ. ibi 2ª: artarie vero manus.

De pª parte dicit q̄ tu debes ſcire q̄ venarū q̄ flobothomant q̄dā ſunt tm̄ vene q̄dā ſunt tm̄ artarie. ¶ Pro pte nota q̄ vena eſt nomē cōe ad venā pulſantē q̄ appellat artaria: ⁊ nō pulſantem q̄ appellat abſolute vena: tn̄ q꞉ vena pulſans ſibi appropriat hoc nomē artaria: iō nomen cōius ipoſitū ē abſolute vene nō pulſanti. Dū aūt dicim⁹ venaz abſolute: ītelligim⁹ venā nō pulſantē. Ad ppoſitū dū dicit venaꝝ: hic ſumit vena p noīe cōi. ¶ Sc̄do nota q̄ venaꝝ q̄dā dicunt tm̄ vene: q꞉ non noīant artarie nec artariales. q̄dā vero ſunt nō tm̄ vene: ſed cū hoc dicunt artariales: q꞉ ī aliquo cū artarijs cōicantes. vn̄ cuz artaria ſit hn̄s duas tunicas: vena hn̄s duas tunicas pōt dici vena artarialis: q̄lis ē vena pulmonis per quā ſanguis ⁊ nutrimentuz ſubtile vadit ad pulmonē: ⁊ iō ne exeat ⁊ vaporet duas hz tunicas ſicut artaria. Artariaꝝ vero q̄dā ſūt tm̄ artarie q̄ dicūt tm̄ artariales. Quedā vero dicunt venales: q꞉ cōicant ī aliquo cū venis: q꞉ hn̄t vnā tunicaz ſicut artaria venalis per quā fum⁹ capinoſus extra fert. ¶ Ad propoſitū q꞉ vena artarialis aut artaria venalis nō flobothomant: ſz ille q̄ ſunt aut vene tantū aut artarie tantuz: ideo dixit venaruz ⁊ artariaꝝ.

Artarie vero min⁹ flobothomant ppter terrorē ei⁹ qđ ī eis exiſtit de timore curſus ſanguis

¶ Nūc ponit gnālez noticiā flobothomie artariaꝝ. Et tria facit. Nā pº Aui. p̄mittit raritatē flobothomie artariaꝝ ⁊ cāz hui⁹ flobothomie. 2º p̄mittit vnū nocumētuz qđ ſequit ad hāc flobothomiā. 3º tāgit caſus ī qb⁹ flobothomia artariaꝝ ꝯuenit. ibi 2ª: ⁊ ſuaꝝ q̄dā. ibi 3ª: cū autē. De pª dicit q̄ artarie min⁹ flobothomant ppter timorez decurſus ſanguis. ¶ Pro parte nota q̄ ī artarijs ꝯtinet mult⁹ ſpūs ⁊ etiā ſanguis valde ſubtilis calidus q̄re magnus timor eſt ī fluxu talis ſanguis. Nā ex hoc timet magis d̄bilitas virtutis ex quo iſte ſanguis ē multū ſpūoſus. Itez q꞉ eſt valde ſubtilis timet de nimio exitu. Itē q꞉ artaria pulſat: timor eſt ne ppter motum exeat multus ſanguis ⁊ difficile cōſolidetur.

Et ſuaꝝ quidē diſpōnuz mior ē q̄ ex ea puenit ēporiſma. ⁊ hoc quidē ē cuz fixura fuerit vehemēter āguſta.

¶ Nūc tāgit vnū nocumētū qđ ſequit ad flobothomiā hanc: dicēs q̄ minor diſpōnū malaꝝ ſequētiū ad hāc flobothomiā ē ēporiſma: ⁊ tale ēporiſma ſequit certe cū fixura ſit valde ſtricta. ¶ Pro pte nota q̄ nō ſemp mala accidētia ſequūt ad flobothomiā artarie ſi fiat ex artaria pua ⁊ ſm cōditiōes dicēdas inferi⁹. Inter tn̄ accidētia mala q̄ ſequuntur ad flobothomiā artarie magne ēporiſma videt eē minus mala diſpoſitio: ex eo qđ pōt ſeq ſincopis: īmo ⁊ mors cōſequit aliqn̄. ¶ Et nota q̄ ēporiſma ſeu mr̄ ſanguinis nō ē aliud q̄z repletio poroſitatū carnis ⁊ cutis ſanguine: ita q̄ p̄mente digito ille ſanguis ingredit venam ⁊ poſtea exit adhuc venā cū foramē artarie nō ſit clauſum. Nō exit tamē cutim cū foramē cutis ſit ſtrictū ſanguine: ergo nō potente exire per foramen remanet inter cutem ⁊ venam ſiue artariam.

Galien⁹ quīto de ingenio ſanitatis caplo. vj. recitat opiōnez quorūdaz veterū volentiū vulnera artarie nō poſſe ꝯſolidari: ⁊ multa alia q̄ p te vide: quare ⁊c̄.

Cuz autez fuerit ſecuritas q̄ ex ea ſanguis nō fluet maxime ē iuuatiua ī egritudinib⁹ ppꝛijs ppter quas flobothomant. Maius tn̄ iuuamētū qđ ex minutōe artarie puenit nō ē niſi cū in mēbro ſibi vicino male ſūt egritudines: quaꝝ cā ē ſanguis ſubtilis ⁊ calidus. Cūq; artaria flobothomabit q̄ ē ei vicina ī qua nō erit timor maximuz affert iuuamētum.

¶ Nunc Aui. tangit gnālē cōferētiā talis artarie: dicēs q̄ cū fuerit ſecuritas: ſupple q̄ nō fluat ſanguis nimius p talē flobothomiā ipa maxime cōfert in morbis ppꝛijs pp quos flobothomat. iuuamentū tn̄ nō ē niſi qn̄ ī mēbro ppinquo flobothomādo loco ſunt morbi ex ſanguine ſubtili calido. nā flobothomia artarie ſibi vicine maximū facit iuuamentū. ¶ Pro parte nota breuiter q̄ quādo ad mēbrū fluit ſanguis ſubtilis per poroſitates artarie: flobothomia artarie eūando cām antecedētē morbi: ⁊ eūando ſanguinē maximum affert iuuamentuz.

Uene p̄terea man⁹ q̄ flobothomātur nō pulſatiles quidē ſunt ſex: cephalica nigra ⁊ baſilica ⁊ funis brachij ⁊ ſceilez ⁊ illa q̄ ppꝛio noīe aſcellaris vocat: ⁊ ipſa quidē eſt ram⁹ baſilice: eis vero ſanior oībus eſt cephalica. Opz autez vt oēs tres ſupra iuncturā aperiātur ⁊ non ſub ea neq; in ea: ideo vt egrediatur ſanguis bene taliter vt ſaliat ⁊ vt ſit ſecuritas a nocumētis neruoꝝ ⁊ artariarū ⁊ ſilr̄ cephalica. Eaꝝ vero flobothomia q̄ fit ſm longitudinē ad conſolidāduz eſt tardior qm̄ ipſe ſūt cōiunctōales. In nō ꝯiunctionalib⁹ vero res eſt ad hoc diuerſa ⁊ in ſciatica quidē ⁊ ſceilez ⁊ in alijs venis meli⁹ eſt vt ſm longitudinē flobothomētur.

¶ Nūc Auic. exequit enumerādo venas que cōiter flobothomant. Et duo facit. Prīo facit qđ dictū ē tangēdo modos

UVA. BHSC. IyR_006_1

modos flobothomādi. In 2ª pte tāgit nocumēta que ꝯtingunt aut cōtingere pn̄t ex dictarū venarū flobothomijs. ibi 2ª: ⁊ cū hoc. Pria i duas. Prīo has venas enumerat. 2º tāgit modū flobothomādi. ibi 2ª: opʒ aūt. De pria pte dicit ꝙ vene manꝰ que nō pulſant ⁊ flobothomant̄ ſunt ſex. pª cephalica. 2ª baſilica. 3ª nigra. 4ª ē funis brachij. 5ª ē nomīata ſceylen. 6ª ē aſcellaris ramꝰ exn̄s baſilice. Ceteris vero ſanior ad flobothomādū ē cephalica. ¶ Dicit 2º ꝙ oʒ apire oēs tres. ſ. cephalicā nigraʒ ⁊ baſilicā ſupra iuncturā: nō āt ſub iunctura aut in iūctura vt ſanguis ſaliēdo egrediat̄: ⁊ fit ex hoc ſecuritas a nocumētis tactis ſupra. ſ. punctura neruoꝝ ⁊ artariaꝝ. Et ſilr hoc in cephalica obſeruandū ē. Iſtarū aūt venaꝝ flobothomia ſm longum facta ē tardioris cōſolidatiōis: qꝛ iſte vene ſunt ꝯiūctionales. In nō cōiunctionalibꝰ vero cōſolidatio aliter ſe hʒ: qꝛ flobothomia facta ſm longū in quibuſdā nō ē difficilioris ꝯſolidatōis. ¶ Dicit vltimo ꝙ i ſciatica ⁊ ſceylen ⁊ alijs venis melius ē flobothomare ſm longū. ¶ Prīo nota hic ſumi manū ꝓ tota diſtātia ab humero vſqʒ ad extrema digitoꝝ: vt etiā ſumit Gal. ī libro de malitia ꝯplōnis diuerſe. ¶ Scdo nota ꝙ iſtaꝝ ſex venaꝝ quedā ſunt prīcipales: quedā ſunt earū rami. Principales ſunt maxime tres. ſ. cephalica eūans a capite ſupra iuncturā cubiti ꝓtēſa vel aſayd. 2ª ē baſilica ſeu vena epatis. 3ª ē nigra dicta purpurea vel fuſca aut appellata cōis: qꝛ cōiter a ſupioribus eūans ⁊ inferioribus que cauſat̄ ex cōiūtione baſilice cū cephalica. Funis vero brachij ē ramꝰ cephalice ꝓcedēs īfra iūcturas cubiti verſus digitos ⁊ flexuoſe īcedēs verſus ꝑtē īferiorē domeſticaʒ brachij ꝑꝑ qd̄ flexuoſe īcedere funis appellat̄ q̄ſi flexuoſe īcedēdo liget brachia. 5ª vena eſt ſceylen: cuiꝰ ſitus eſt īter pollicē ⁊ indicē ramus exn̄s cephalice aut ſm expoſitorē vene cōis. 6ª ⁊ vltima eſt aſcellaris: cuiꝰ ſitus eſt īter annularē digitū ⁊ auricularē alio nomīe nomīata ſaluatella ⁊ eſt ramꝰ baſilice. ¶ Tertio nota ꝙ cephalica dictis oībus ē ſanior ad flobothomādū: qꝛ minꝰ ꝓpinqua artarijs ⁊ neruis minorē timorē īducit de pūctura venaꝝ ⁊ artariarū ſufficiēter diuertēs ⁊ eūans a ſuperioribꝰ ītelligēdo per eā oēs alias potiſſime principales vt nigrā ⁊ baſilicā. ¶ Quarto nota ꝙ ille vene ſūt aperiende ſupra iūcturā. Naʒ ibi radicales exn̄tes ⁊ maiores meliꝰ pn̄t flobothomari ⁊ ſaliēdo meliꝰ emittere ſanguinē. Itē cū ibi paucioribꝰ neruis ⁊ artarijs aut minoribꝰ ꝯmiſceant̄ nunq̄ʒ timor ē de nocumētis q̄ ſequi pn̄t. Itē facta ligatōe ſupra iuncturā: he vene pn̄t meliꝰ apparere quare ibi potiꝰ ſunt flobothomāde. ¶ Quīto nota Auic. ſpecificaſſe cephalicā ad denotandū ꝙ quāuis alijs ſit ſanior: tn̄ in eiꝰ flobothomia pōt accidere nocumētū: iō hanc regulā ſpecificauit. ¶ Sexto nota ꝙ ille vene pn̄t dici ꝯiunctiōales q̄ ita ꝯiungunt̄ iūcturis ꝙ ad ꝯiūctionē ⁊ applicatōeʒ eaꝝ ſequat̄ extenſio ſm latū: q̄les ſunt noīate vene vt experiētia notat. Que aūt ſunt nō ꝯiunctōales notū ē. Flobothomia ergo facta ſm lōgū tardior ē ad ꝯſolidādū ī ꝯiunctōalibꝰ ꝑꝑ cāʒ aſſignatā. In alijs aūt cū facta flobothomia ſm longū ptes meliꝰ applicant̄: ipſa eſt citior ad ꝯſolidādū. ¶ Ultio nota ꝙ ī venis nō ꝯiunctiōalibꝰ ꝓpter q̄s ſupple ītendimꝰ modicū eūare ⁊ non ſecūdare flobothomiā meliꝰ eſt ipſaʒ efficere ſm longū ꝓpter citiorē ꝯſolidationē. Et qꝛ ſciatica vena pedis quātū ad ptes exterioreʒ in hoc cū alijs venis manus ꝯuenire videt̄: iō de ipſa ītra venas manuuʒ fecit mentionē ⁊c̄.

Scias ꝙ cephalica dicit̄: qꝛ potiſſime a capite qd̄ grece cephas dicit̄ ſanguinē educit. Baſilica dicit̄ a baſis grece qd̄ latine dicit̄ fundamētū: qꝛ ſicut fūdamētū ſubeſt cephalice ⁊ nigre: vel qꝛ euacuat a partibꝰ īferioribꝰ corporis q̄ ſunt velut fundamētū. Nigra dicitur ēt purpurea ⁊ vena cōis ⁊ vena cordis ⁊ mediana ⁊ vena matricis. Dicitur aūt nigra ⁊ purpurea qꝛ plus alijs color eius vergit ad iſtos colores. Cōmunis vero qꝛ educit ſanguineʒ a ſuperioribꝰ ⁊ īferioribꝰ. Cordis aūt qꝛ a corde ⁊ pectoralibꝰ directe eūat. Mediana vero quia īter cephalicā ⁊ baſilicaʒ ſita eſt ⁊ ꝯflata de ramis ambaꝝ. Matricis autē qꝛ a matrice ſanguinē diuertit. Funis brachij dicit̄ qꝛ tortuoſe ⁊ ad inſtar funis īceditur. Pro duabꝰ reliquis lege Raſiʒ prio almāſoris caplō d̄ venis. ⁊ Aui. pria primi doctrina quīta ſūma quīta caplō quarto ⁊c̄.

Et cū hoc oʒ ī cephalica vt a capite muſculi moueat̄ ad locū leneʒ ⁊ dilatet̄ flobothomꝰ: ⁊ flobothomꝰ flobothomū nō ꝯſequatur qm̄ faciet apa. Plurimū autē erroris qui euenit in minuēdo cephalicā nō ꝓuenit ex percuſſiōe vna lʒ ſit magna: īmo nō accidit nocumētuʒ niſi ꝓpter iterationē percuſſionū. Et que ex ipſiꝰ flobothomia plus tardat̄: eſt illa que fit in lōgitudine: cuiꝰ quidē flobothomi dilatādi ſunt ſi volūtas affuerit vt ſecūdatio fiat. Cū autē eā nō īueneris quere aliquē ramorum eiꝰ qui ſunt in ſilueſtri aſeid. Et ī vena quidē nigra eſt timor ꝓpter neruū qui ē ſub ea: ⁊ qn̄qʒ ēt ē īter duos neruos: tibi igit̄ cauere debes vt ipſam in lōgitudine flobothomes ⁊ ad īferiora. ⁊ fortaſſe ſuper ea erit neruꝰ ſubtilis tēſus ſicut corda: ⁊ tunc quidem oportebit vt hoc cognoſcat̄: ⁊ caueat̄ ne percuſſio in eo cadat ⁊ proueniat inde ſtupor perſeuerās. In eo aūt cuiꝰ nerui ſunt groſſiores: ramus iſte eſt magis manifeſtus. Et error quidē in ipſo eſt deterioris nocumēti: quare cuʒ error accidit ⁊ neruꝰ ille percuſſus fuerit nō conſolides flobothomiā: īmo ſuper eā pone qd̄ ipſius prohibeat cōſolidationē. Et eius quidē medicamētū eſt ſicut medicamētum vulneris neruoꝝ. ⁊ nos iam loquuti ſumus de ipſo in libro quarto. Caue tibi p̄terea ne res īfrigidās ad ipſuʒ perueniat: qd̄ ſit verbigratia ſicut ſolatrū ⁊ ſandalū: ſʒ ipm̄ ⁊ totū corpꝰ oleo calefacto frica. Funis aūt brachij melius eſt vt trāſuerſe minuat̄ niſi vtrinqʒ fuerit flexuoſa: qm̄ tunc in lōgitudine flobothomat̄.

¶ Nunc ponit iuuamēta ⁊ nocumēta que cōtigere pn̄t. Et ꝯtinet hec ps ptes duas. Prīo ponit nocumēta docēdo p̄ſeruare ab illis: docēdo ēt ſuccurrere illis nocumentis. 2º tangit partes a quibus he vene eūant: ⁊ ꝑ ꝯn̄s iuuamēta iparum. ibi 2ª: p̄terea ſcire debes. pª in quattuor. pº facit qd̄ dictū ē de cephalica. 2º de vena nigra. 3º de fune brachij. 4º de baſilica. ibi 2ª: ⁊ in vena. ibi 3ª: funis vero. ibi 4ª: baſilica quoqʒ. ¶ De pria dicit ꝙ cū hoc qd̄ dictū ē: ſupple flobothomiā cephalice eē ſaniorē: etiā opʒ dū vis flobothomare cephalicā ipaʒ mouere a capite muſculi verſus locū leuē: ſupple carnoſuʒ ī quo nō ē ps muſculi. Et breuiter cā ē: qꝛ ſi pungeret̄ caput muſculi qꝛ corda: grāde inde ſequeret̄ nocumentū ex dolore. ¶ Dicit vlterius ꝙ foramē ſupple factū ꝑ flobothomiā dʒ eē āplum ſupple ſi intēdimus facere ſcdationē ne flobothomus ſeq̄t̄ flobothomū in vna vice qꝛ dno cōſequātur ⁊ ſit alid̄ a primo foramine: eo qd̄ ꝓpter plures punctōes dolores inducentes ad locū dolentē currētibꝰ humoribꝰ fit apatio. Iō dicit Aui. ꝙ plurimū erroris ī minuēdo cephalicā cōtigit ex multis ꝑcuſſiōibꝰ ⁊ nō ex vna magna: cuius flobothomia facta ſm longū ē tardior ad cōſolidādū ꝓpter cāʒ aſſignatā: cuius ēt foramē ſit dilatatū ſi intēdis ſcdare flobothomiā vt iam dictū ē. Quā. ſ. cephalicā ſi reꝑire nō potes flobothoma aliquē ramū exn̄tem ī aliqua ꝑte exteriori cubiti. Cōiter tn̄ flobothomamus funē brachij exn̄tē ī ꝑte domeſtica. ¶ Scdo dicit ꝙ ī flobothomia vene nigre aut cōis timor ē ꝓpter neruū qui ē ſub ea ſupple quē potes reperire ꝑ anothomiā aut elixādo brachiū: ⁊ qn̄qʒ ē talis vena inter duos neruos. ¶ Hic tn̄ dicit prio ꝙ corꝑa aliqua pn̄t plures habere neruos alijs. Aut qꝛ vt notū ē ad exꝑiētiam corꝑa non hn̄t venas vniformiter ſituatas: īmo vidit Magiſter: ⁊ ego vidi ēt artariā in ſūmo brachij. Iō dicit Aui. ꝙ cauere debes tibi ne tu ipm̄ flobothomes ſm longū trahēdo ad inferiora verſus ēt loca neruoſa: qꝛ ſi ſoluat̄ neruus ſm latū ſiue ſm trāſuerſuʒ peius eſt q̄ʒ ſi ſolutꝰ ſit ſm longū. ¶ Dicit vlteriꝰ ꝙ forte ꝑꝑ variā ſituationē neruorū ſuꝑ tali vena ē neruꝰ tēſus vt corda: quē d̄bes cognoſcere ⁊ cauere ne ꝑcutiat̄: ita ꝙ non accidat ꝑſeuerās ſtupor ſoluto ſupple neruo deferēte ſenſuʒ: quē vero neruuʒ cognoſcere poteris ex duritie ⁊ reſiſtētia tactꝰ: qꝛ ē neruꝰ manifeſtior. In hn̄tibꝰ neruos groſſiores hoc ē notū: ī quo ſi errat̄ talis error pūctionis ē peior cū ille ſit maioris ſenſationis: cū etiā peius ſit īcidere neruū groſſuʒ q̄ʒ ſubtilē.

¶ Dicit vlteriꝰ cū ē error ex ꝑcuſſione nerui nō cōſolides flobothomiā. i. foramē flobothomie ne obturet̄ ⁊ retineat̄ virꝰ ſupra neruum: vn̄ appone prohibētia cōſolidatiōeʒ ⁊ medicamē neruoꝝ: ſupple punctoꝝ de quibꝰ 4º can̄. dictū ē. ¶ Dicit etiā ꝙ cauere debes tibi ne in illo cāu appōas īfrigidantia vt ſolatarū qd̄ eſt herba valde frigida: ⁊ ſandalū qd̄ eſt lignū frigidū ſtipticum. In promptu eſt cauſa ne incuniet̄ materia ⁊ cōſequat̄ apa ⁊ ſpaſmus: īmo dicit Aui. frica totum corpus oleo calefacto: qꝛ per caliditatem ꝯſequit̄ mollificatio ⁊ prohibitio ꝯtractōis. ¶ Ultio dicit Aui. ꝙ meliꝰ ē flobothomare funē brachij per trāſuerſuʒ. In prōptu ē cā: qꝛ cū ipſa īcedat flexuoſe: tūc talis flobothomia capiet de lōgo ⁊ lato vene: vnde bn̄ ſic educet̄ ſanguis. Si vero ꝓcedat flexuoſe ex vtraqʒ parte brachij ad modū funis: tūc meliꝰ ē flobothomare ſʒ lōgū: qꝛ ꝯmotio iūcture iuuat ad bonū exitū ſanguis: ⁊ ēt ſic flobothomādo bn̄ educet̄ ſanguis ipſa ſic ꝓcedēte valde dilatata.

Idē ꝓmonuit nos Raſis ſcptio almāſoris capitulo de flobothomia dicēs: Opʒ ne ꝑcuſſio fiat ī initio muſculi: ſʒ locus inquirat̄ mollior ⁊ ibi percuſſio fiat: qꝛ vulnꝰ in capite muſculi valde doloroſuʒ eſt: ⁊ d̄ ſpaſmo valde ſuſpectuʒ ⁊c̄.

Baſilica quoqʒ magni eſt timoris ꝓpterea ꝙ artaria cadit ſub ea ⁊ ꝙ nerui ⁊ muſculi etiā ſub ea cadunt. In ipſaʒ ergo flobothomiā tibi caue: qm̄ ſi ꝑcuſſio fuerit in artaria ſanguis nō reſtrīgetur aut reſtringet̄ difficulter. Hominū quoqʒ ſūt quidā quoꝝ baſilice due aſſociātur artarie: quarū vna cuʒ ſignata fuerit exiſtimabit̄ ꝙ iaʒ ſit ſecuritas ⁊ fortaſſe percutiet̄ altera: hoc eiʒ ſcire debes. Cūqʒ ligaueris ſm plurimū rei accidet ibi inflatio qn̄qʒ ex artaria qn̄qʒ ex baſilica: ſed qualitercūqʒ fuerit ligaturā ſoluere debes ⁊ inflationē molliter inungere: deinde ad ligāduʒ redi: ⁊ ſi inflatio reuerſa fuerit reitera. ꝙ ſi nō iuuerit quid erit in hoc ſi baſilicaʒ dimiſeris ⁊ ad ramuʒ qui aſcellaris vocat̄ redibis: que quidem eſt que ſuper domeſticū aſeid exiſtit ad inferiora ⁊ inflatio nāqʒ erroreʒ multotiens efficit ⁊ ligatura ſepe artarie pulſuʒ quieſcere facit ⁊ ipſam eleuat ⁊ ponit ipſaʒ ſupremā ⁊ exiſtimat̄ ꝙ ſit vena ⁊ flobothomat̄. Cūqʒ quālibet ligaueris venā ⁊ ex ligatura ſuper eaʒ ꝓuenerit qd̄ ſit ſimile ſicut lenti aut ciceri fac in ipſaʒ qd̄ in baſilica diximꝰ. In baſilica quoqʒ flobothomāda quāto plus ad brachiū deſcēderit erit ſaniꝰ. Fobothomꝰ ꝓ-

UVA. BHSC. IyR_006_1

terea in venā ꝓcedere debet ad diuerſitatē partis arta rie. In baſilica quoqʒ nō ſoluʒ cōtingit erroꝛ ex ꝑte ar⸗ tarie: ſed etiā muſculus ſub ea eſt ⁊ neruus ꝓpter quos etiā ꝓuenit erroꝛ: hoc quidē iaʒ tibi dixímꝰ. Signuʒ ve ro erroꝛis ī baſilica ⁊ ꝙ artaria iaʒ ſit percuſſa eſt ꝙ ſan guis egredit̄ ſubtilis ruffus qui ſaliēdo manat ⁊ leniſica tur cuʒ eo tactus ⁊ ipſa fit inferioꝛ.

¶ Nunc tāgit nocumēta q̄ ſequunt̄ ad flobothomiā ba ſilice. Et ꝑº facit hoc. 2º docet ſuccurrere dictis nocumē tis. ibi 2ª: tunc ergo ſecure. Itē ꝑª in duas. Pꝛio facit qđ dictū eſt. 2º ponit ſignū ꝑ qđ ꝯpꝛehēdímꝰ erroꝛē. ibi 2ª: ſignū ergo erroꝛis. Pꝛia poſſet diuidi ſʒ nō curo. ¶ Dicit ergo Aui. ꝙ baſilica eſt magni timoꝛis eo ꝙ artaria ⁊ ner⸗ ui ⁊ muſculi cadūt ſub ea: iō caue tibi ne aliquid illoꝝ ꝑcu tias. Nā ꝑcuſſa artaria nō ꝯſtringet̄ ſanguis aut difficul ter ꝯſtringet̄. ¶ Dicit 2º Aui. ꝙ baſilice quoꝛūdam hoīuʒ aſſociant̄ due artarie ꝑꝑ diſtīctū inceſſuʒ artariaꝝ: ⁊ vna cognita ⁊ ſignata foꝛte alia percutiet̄: ⁊ iō cōſidera an ſint due an vna ſola qđ ꝯpꝛehēdere potes ex pulſu. ¶ Dicit 3º Aui. ꝙ cū tu ligaueris bꝛachiū qñqʒ tumebit artaria qñqʒ vena. Debes ergo remouē ligaturā ⁊ inūgere leuiter īfla⸗ tionē vt ſupple īflatio debite remoueat̄ vt ꝯpꝛehēdas ve⸗ naʒ ab artaria: ⁊ iterato liga vt iteꝝ appeat īflatio. ſ. arta⸗ rie aut vene ꝯueniēs: ⁊ tūc nō flobothomes baſilicā ſʒ ra⸗ mū eiꝰ q dr̄ aſcellaris q tēdit verſus ꝑtē domeſticā verſus īferioꝛa bꝛachij q̄ʒuis nō ita flexuoſe incedat vt funis bꝛa⸗ chij. Nā ex quo ramꝰ baſilice flomat̄ ſilē affert iuuamētū.

¶ Dicit vlterius ꝙ īflatio multotiēs facit te errare: qꝛ fa⸗ cit quieſcere artariā ⁊ eſtimari ipam eē venā. ¶ Dicit vl⸗ terius ꝙ quacūqʒ vena ligata ſi ex ligatura accidit aliqđ ſimile ciceri vel lenti: fac qđ dictū ē de baſilica: qꝛ diſſol⸗ ue ligaturā ⁊ vnge inflationē cū oleo: qꝛ diſperget̄ mā flu xa. ¶ Dicit vlteriꝰ ꝙ quāto ī flobothomādo baſilicā plus deſcēdes ī bꝛachiū ſupple mouēdo baſilicā a loco artaria⸗ rū ⁊ neruoꝝ hoc erit ſaniꝰ: iō flobothomꝰ dʒ ꝓcedere ad diuerſam partē artarie vt ſupple. ſ. ſi artaria ē verſus de⸗ xtrū ꝑgat̄ verſus ſiniſtrum ⁊ ecōtra. Poſtea Aui. repetit quoddā dictū ſupꝛꝰ ꝙ in flobothomādo baſilicā nō ſoluʒ errare cōtingit ex ꝑte artarie: īmo ex ꝑte muſculi ⁊ neruo⸗ rū vt dictū ē ſuperiꝰ. ¶ Ultīo Aui. ponit ſignū erroꝛis qꝛ artaria ſic ꝑcuſſa egredit̄ ſanguis ſubtilis. nā ſanguis ar⸗ tarialis ſubtilioꝛ ē venali. Eſt etiaʒ ruffus qꝛ rubeus clarꝰ tēdēs ad citrinū ꝓpter multos ſpūs clarificātes ⁊ irradiā tes ſanguinē. Eſt eīʒ ſpūs de nā lucis vt in de viribꝰ coꝛ⸗ dis. c. 2º. Eſt enim talis ſanguis coloꝛatioꝛ venali: iō plus tendens ad citrinū ⁊ clarū. Itē talis ſanguis fluit ſaliēdo ꝓpter caliditatē ipius mobilē: ⁊ ebullire faciētem ſangui⸗ nē. Itē apparet talis ſanguis valde leuis quo ad actū ꝓ⸗ pter vehementē raritatē ⁊ aerietatem. Itē percuſſa arta⸗ ria tali ipa fit inferioꝛ cuʒ pꝛimo tumeret ⁊ altioꝛ eēt ꝓpter ſanguinis euacuati pꝛeſentiam.

Tūc ergo ſuccurre ei ⁊ ī vulneris oꝛificio paꝝ đ pilis lepoꝛis pone cū pauco pulueris thuris ⁊ ſanguis draco nis ⁊ aloes ⁊ myrrhe ⁊ pauco alcolcotar ⁊ alʒegi: ⁊ ſup ipſaʒ ex aq̄ frida q̄ʒtū poteris roꝛa: ⁊ ſup locū ipʒ flobo thomatū ligaturā appone tenacē. Qđ ſi ſe tenuerit vſqʒ ad tres dies nō ſoluas: ⁊ poſt ēt tres dies q̄ʒto plus po⸗ teris tibi cauere debes ⁊ loco emplaſtrū ex ſtipticis ſup⸗ pone. Multi p̄terea hoīum artariā illā īcidūt penitꝰ vt ipſa ꝯtrahatur ⁊ caro deſup eā cooperiat̄ ⁊ teneat.

¶ In pꝛecedētibus docuit Aui. erroꝛē in flobothomādo baſilicā qꝛ qñqʒ percutit̄ artaria: nūc docet ſuccurrere il⸗ li ꝑcuſſiōi. Et tria facit. ꝑº eīm facit qđ dictuʒ ē. 2º ponit quēdā cañ. erroꝛis coꝛrectiuū. 3º ſatiſfacit cuidaʒ dubio. ibi 2ª: āplius plurimū. ibi 3ª: ⁊ ſcias ꝙ curſus. Pꝛima in tres ſm ꝙ ponit tria gnālia remedia. ibi 2ª: ⁊ ſup locū ipiꝰ. ibi 3ª: multi p̄terea hoīum. De pꝛima ꝑte dicit ꝙ ſup ꝑcuſ⸗ ſa artaria tu ſuccurrere debes cū impōne piloꝝ lepoꝛis in oꝛificio vulneris cū pauco pulueris thuris: ſanguis draco nis: myrrhe ⁊ aloes: etiā ponendo paucuʒ de alcolcotar ⁊ alʒegi: ⁊ roꝛa illaʒ partē ex aqua frida q̄ʒtū poteris: ⁊ loco pone ēplaſtrū ſtipticū. ¶ Dicit 2º ꝙ ēt ſuper flobothoma⸗ tū locū apponas ligaturā tenacē quā nō remouere debes ſi firma fuerit vſqʒ ad dies tres: ⁊ etiā poſt tres tibi caue⸗ re debes quātū poteris: ⁊ loco pone emplaſtrū ſtipticum.

Gal. quīto de ingenio caplo. iiij. dictat medica⸗ men ꝯtra fluxū ſanguinis de thure ⁊ aloe pulueriza tis ⁊ īcoꝛpoꝛatis cū albu⸗ mine oui q̄ſi vſqʒ ad mel lis ſpiſſitudinē: quibꝰ ad⸗ dit̄ piloꝛū lepoꝛis in ma⸗ gna quantitate ⁊ īponitur vulneri circūligādo qua⸗ ter vel qnquies ī loco vul neris. Et de hac medicīa ibidē ſic dicit: Et de hoc remedio iō pꝛolixe diſpu taui quoniā melius īueni⸗ re nullatenꝰ potui ⁊c̄.

¶ Dicit vltimo ꝙ multi incidūt totalr̄ illā artariā: ita vt ipa cōtrahat̄ ⁊ caro teneat eā ⁊ deſup coopiat. Iſta ē ſnīa Aui. ¶ Pꝛo ꝑte nota ꝙ in ꝓhibēdo fluxū ſanguis ab ar⸗ taria multiplicē poſſumꝰ hēre intentionē. Una ē inuiſcare labiū inciſuʒ cuʒ labio cū aliquo īuiſcāte ⁊ cōglutināte ex quo oppilabit̄ foꝛamē ⁊ ꝯglutinabit̄: ⁊ ſic obturabit̄ ne ſan guis exeat. 2ª intētio ē exiccare ⁊ cōſolidare. Eſt ēt inten tio infrīdare ⁊ ſtipticare: ex quibꝰ opatiōibꝰ refrenabitur ſanguis ī ſuo motu ne fluat. Etiā intētio ē repercutere ⁊ ī⸗ groſſare ſanguinē ⁊ ꝑ ꝯñs a ſuo fluxu ꝓhibere. 3ª ītētio ē tenere firmū medicamē vt firmiter adhereat loco ⁊ oppi⸗ let foꝛamē. Itē ītentio eſt aliqñ coopire foꝛamē aliquo te⸗ naci ⁊ foꝛti medicamine ſiue ſit ſm nām ſiue p̄ter nām. Ad quas oēs ītentōes reſpiciēs Aui. hec remedia multiplica⸗ uit in ꝑte. ¶ Pꝛo quo nota ꝙ pili lepoꝛis in hoc caſu ⁊ in alijs caſibꝰ fluxus ſanguis retinēdi ꝯueniūt: qꝛ ſicci ſūt le poꝛe melācolico exñte. Eo ēt ꝙ frigidi ſūt aliq̄li ſtipticitate ꝑticipātes. Eo ēt ꝙ ꝑ ipſos meliꝰ īuolui pñt medicamina īuiſcātia: ⁊ maxīe pili īterioꝛes ⁊ mollioꝛes ad modū lanu⸗ ginis exñtes vt meliꝰ vulneri ſint applicabiles. Si autem hos pilos nō poſſemꝰ hēre: ſumant̄ alij pili: aut ſumat̄ co⸗ tuʒ: aut ſumat̄ tela aranea maxīe reperta ī vaſe farine aut repta in ſupioꝛibꝰ molēdini. Hec eīʒ ꝑticipāt virtute exic catiua ⁊ in ꝯſtrigendo ſanguinē mirabilē hñt ꝓpꝛietatē ī⸗ uiſcādo ēt ꝯglutinādo per ꝑtes farine volatilis: Loquēdo maxīe de farina frumēti cuiꝰ ē īuiſcare ⁊ īgroſſare. Aut ſu mat̄ carta bōbacina papirꝰ ꝯbuſta q̄ ēt ꝓpter ꝑtes terre⸗ as obturare ⁊ exiccare hʒ foꝛamē. 3º ponit̄ in ꝑte thus qđ hʒ virtutē ꝯglutinatiuā ⁊ inuiſcatiuaʒ ⁊ aliqualr̄ exiccati⸗ uaʒ. Hic tñ notādū ꝙ ēt thus ē duplex. ſ. gūmoſuʒ groſ⸗ ſuʒ ⁊ minutū ſubtile ⁊ ſicciꝰ. Cū ergo q̄rimꝰ maioꝛē exic⸗ cationē ꝯglutinatōe thus minutū eſt applicādū. Dū vero ꝯglutinatōeʒ maioꝛē exiccatōe thus gūmoſuʒ eſt applicā⸗ dum. Cadit hic ēt electōis diuerſitas rōne ꝯplonis: qꝛ fa⸗ cta ſolōne in coꝛꝑe mollioꝛi ⁊ humidioꝛi cū ſibi minꝰ ſicca ꝯpetāt: vt colligit̄ 5º de īgenio ſanitatis: thus gūmoſum minꝰ ſiccū p̄eligēdū ē. In ſenioꝛibꝰ vero coꝛꝑibꝰ cuʒ cōpe tāt ſiccioꝛa: thus ſiccū magis minutū ē eligendū. ¶ Ulte⸗ riꝰ no. ꝙ ſanguis draconis ē ſuccus exñs rubeꝰ cuiuſdaʒ herbe ⁊ frīditate ꝑticipat ⁊ ſtipticitate: iō ꝑ ipʒ ꝯplet̄ intē⸗ tio repcuſſiōis ꝑ frīdū: ⁊ ꝑ idē ītentio īgroſſatōis ⁊ īmobi⸗ litatis. Per ſtipticitatē vero fit ꝯſtrictio ⁊ adunatio ꝑtiū ſolutaꝝ. ¶ Ulteriꝰ nota ꝙ aloe ꝯpetit ꝑꝑ ꝯſolidationeʒ ⁊ exiccationē fiēdas. tñ nota ꝙ ſolōne exñte ꝑua ſufficit pul⸗ uis ex thure ⁊ aloe vt colligit̄ 5º de ingenio ſanitatis: vbī mirifice hūc puluerē extollit Gal. cū cōpleat debite intē⸗ tionē cōſolidatōis ⁊ īuiſcatiōis. Ubi vero querimꝰ ex pul⸗ uere īfrīdatiōeʒ cū ſtipticatiōe ſanguis dꝛa. his ēt ē cōmi⸗ ſcēdus. Etiā nota ꝙ myrrha ponit̄ ꝓpter inuiſcatiōeʒ cō plendā: cū etiā aliquali participet exiccatiōe. ¶ Ulterius nota ꝙ alcolcotar nō ē aliud q̄ʒ vitriolū citrinuʒ: vt patet 2º cañ. c. đ attramēto ad pꝛīcipiū. ꝑ alʒegi vero ītelligit vi triolū alioꝝ coloꝝ de quibꝰ in p̄habito. c. tractauit Auic. quare vitriola ponunt̄ ad cauſticādū cū ſint vehementer cal'a ⁊ cauſticādo gnāt vnū coꝛticē ſeu cruſtā ſupꝛa locū vulneratū obturāteʒ foꝛamē ⁊ ꝓhibētē exitū ſanguis. Et notāter debēt eē pauca ne nimiū doloꝛē īducāt: ne nimiū etiā cauſticēt: quoꝝ eniʒ remedioꝝ talis pōt eſſe diſtictio ſeu đſcriptio. ℞. pulueris thuris myrrhe ſang. dra. añ. ʒ. j. aloes. ℈. ij. alcolcotar ⁊ alʒegi. añ. ℈. j. terenda teran⸗ tur ⁊ miſceantur albumine oui: deinde ſumant̄ pili lepo⸗ ris: ⁊ cū iſto medicamīe extēdāt̄ ſupꝛa foꝛamē. Et notāter ponit̄ albu. oui: qꝛ in ipo detinētur hi pulueres ⁊ īuiſcāt̄: qꝛ etiā hʒ virtutē īfrīdandi ⁊ īuiſcādi. Harū tñ medicina⸗ rū doſes multis intētōibꝰ ⁊ cāis poterūt variari. Et iō ꝓ⸗ pter caſuū occurrētias aliqñ attēdā magis cauſticatiōi: ⁊ aliqñ magis exiccatiōi: ⁊ aliqñ cōglutinatōi. Iō aloe aliqñ oʒ applicare ⁊ amplificare ſupꝛa thus: aliqñ equare: aliqñ ꝑuificare. Itē qñqʒ egemus oīum harum medicinaꝝ cō⸗ mixtiōe fluxu exñte ſatis magno ⁊ tedioſo: aliquādo ſuffi⸗ cit aloe thus ⁊ ſang. dꝛa. vt pʒ 8º almāſoꝛis. c. đ flobotho mia: aliqñ aloe ⁊ thus ſufficiūt in caſu quē dixi: vt tangit Gal. 5º de īgenio ſanitatis. ¶ Ulteriꝰ nota ꝙ irroꝛatio q̄ ē aſperſio ad modū roꝛis repcutiēdo mām ⁊ ingroſſando ⁊ remittēdo caloꝛē valde cōuenit. Et ſi eēt ex aqua roſarum eēt cōueniētioꝛ qꝛ ē aromatica cōfoꝛtatiua ꝑtis ⁊ cōſtipā⸗ do iuuās: ſic tñ ꝙ aqua nō ingrediat̄ foꝛamē: qꝛ frigidum inimicū ē vlceribꝰ. ¶ Ulteriꝰ nota ꝙ ligatura tenax. i. fir ma ⁊ firmiter tenēs mēbꝛū iō cōuenit: qꝛ cōſtringēdo ꝓhi bet fluxū ſanguis: ⁊ qꝛ facit medicamē adherere que nō ē remouēda vſqʒ ad dies tres: qꝛ. ſ. vſqʒ ad tꝑs quo ſciatur aut cōiecturet̄ coꝛticē eē firmū aut medicamē foꝛtiter ad⸗ herere. Foꝛtiter aūt coꝛtex vel ex ligatura foꝛti vel cauſti⸗ co foꝛti quale eſt alcolcotar ⁊ alʒegi. ¶ Ulterius nota ꝙ cū poſt tres dies opoꝛteat diſſoluere: qꝛ ſaltē medicamē ē foꝛtiter exiccatū cauēdū ē quāto plus poſſumꝰ ne remouea mus medicamē ſtipticū ſʒ iungamus emplʒ qđ actuali hu miditate hūectet pꝛimū ꝑ que duo debita ⁊ vehemens flu xus cōſtrictio ꝯſequat̄. qđ regimē etiā ē obſeruādū fluxu exñte multo. ¶ Ulteriꝰ nota ꝙ notāter dixit Aui. mlti ho minū nō ex toto illud aſſerēdo qꝛ talis opatio nō dʒ fieri ni ſi ī cāu quaſi deſꝑato: qꝛ ex tali opatiōe magna nocumēta ſequūtur. Nā cū artaria mēbꝛis ſanguinē p̄bēdo ⁊ ſpūm eoꝛū nālē caloꝛē cōſeruet ipa ex toto īciſa mēbꝛū valde de⸗ pauperat̄ ⁊ infrigidat̄ ⁊ ꝑducit̄ ad moꝛtificationē quare ca uēdū ē quāto plus poſſumꝰ ne vllatenꝰ ex toto incidamus venas ſicut cōiter faciūt inſcij medici mēbꝛa tādē ad moꝛ⸗ tificatione ꝑducētes. In cāu tñ vbi vehemētiſſimū ꝑiculū euitaremꝰ qꝛ ſubitā moꝛtē: hoc ē fiēdū. Cuius cām etiā tā git ī parte Aui. Nā cū per p̄ñtiā ſanguis ⁊ ſpūum artaria ſit extenſa ipa inciſa ꝑtes eiꝰ cōtrahētur ſub carne latētes

vnde

vnde per carnem fiet obturatio ne exeat ſanguis.

Amplius pleriqꝫ hominū ꝓpter ſanguinis exitum moriuntur. Et quidā eoꝝ ſunt qui moriūtur ꝓpter fortitudinem doloris ligature quā voluerūt propter fortitudineꝫ prohibitōis fluxus ſanguinis artarie donec mēbruꝫ factum eſt ſcḋm viaꝫ mortis.

¶ Nūc ponit quoddā correctiuū dictoꝝ: q: dictū eſt ꝙ dꝫ fieri ligatura tenax: hoc corrigēs dicit ꝙ plurimi hominū moriūtur ꝑꝑ exitū ſanguis potiſſimū qñ ē ꝑcuſſa artaria. Multi etiā moriunt̄ ꝓpter vehemēteꝫ dolorē ꝯtingētem ex ligatura vt mēbrū ſit factū quaſi mortuuꝫ. Ex quo īferēdū ē ꝙ vehemētiſſima ligatura nō ē fiēda. ṗº q: ipſa vehemētē inducēdo dolorē valde ꝓſternit virtutē: aut ēt ē cā vt humores fluāt ad locū ⁊ mēbrū apoſtemēt: aut etiā q: ꝓhibeat delationē ſanguis ⁊ ſpūuꝫ ad mēbra vñ ea remanēt quaſi mortificata: iō videmꝰ pullos ⁊ alia aīalia que ligata ſteterunt amittere pedes ſeu ſaltē ire nō poſſe.

Et ſcias ꝙ curſus ſanguis qñqꝫ ꝓuenit ēt ex venis.

¶ Nūc ſatiſfacit dubio. Et ſic ſuppleat̄ formatio dubij. Dictū ē multos mori ꝓpter exitū ſanguis ex artaria. Sꝫ vtrū aliq moriant̄ ꝓpter exitū ſanguis ex vena? Rñdet dicēs te cē ſciturū fluxū ſanguis ſupple magnū ⁊ nocētē qñqꝫ ēt ꝓuenire ex venis. ¶ Nota ꝙ fluxus ſanguis ex artaria plus nocet ꝙꝫ fluxus ſanguis ex vena multis ex cāis. Prio q: citiꝰ pōt exire ī magna quātitate: vt pꝫ ſatis ex dictis in illa ꝑte. ſignū ergo erroris euidēs ē. 2º q: cuꝫ talis ſanguis ſit ſpūoſior ⁊ plus cōſeruatiuꝰ caloris nālis mēbri ad eiꝰ euōnē maior ſequit̄ debilitas ⁊ nocumētū. ¶ Scḋo nota ꝙ vene q̄ ſunt ꝑiculoſe ad exitū ſanguis ſunt maxime magne a quibꝰ multꝰ pōt fluere ſanguis: ſituate ꝓpe artarias magnas ⁊ in membro calido. Harum eniꝫ ſanguis diſpoſitus eſt exitui ⁊ eductioni.

Hoc ē ēt ſcḋm ſententiā Gal. i libro de vtilitate pulſus. c. x. cū dicit: Poſtꝙꝫ venas iuenimꝰ nō pulſatiles euacuari per euōneꝫ pulſatiluū: cōſiſtit nobis ſententia illius qui videt ⁊c̄. lege ibi.

Preterea ſcire ōbes ꝙ ſāguis qui plīmū ꝺ cephalica euāt̄: ē qui ex collo ⁊ eo qꝺ ē paꝝ ſupra ipꝫ ⁊ paꝝ ſub ipſo egredit̄ ⁊ terminū ꝑtis epatis nō ꝑtrāſit ⁊ ipocūdriorū ⁊ īferiora nō talr̄ mūdificat vt ide ſit cura. Nigre vero iudiciū iter cephalicā ⁊ baſilicā ē mediuꝫ. Et baſilica quidē euāt qꝺ ē a parte ſumis ⁊ vētris īferiꝰ. Funis vero brachij ſilis ē cephalice. De ſceylē vero dicūt ꝙ que dextra ē doloribꝰ epatis ꝯfert: ⁊ q̄ ſiniſtra doloribꝰ ſplenis: ⁊ ꝙ ſanguis fluere dimittat̄ donec ꝑ ſe ſtrigat̄. Manꝰ quoqꝫ illiꝰ qui flobothomat̄: ī calidā aquā ē ponēda ne ſanguis cito reſtrigat̄ ⁊ vt facile egrediat̄ ſi eiꝰ egreſſio debilis fuerit ſicut ē ī plibꝰ eoꝝ qui ex ſceylē minuūt̄. Et ſceylē quidē flobothomia melior ē ea q̄ fit ī lōgitudine. Aſcellaris aūt iudiciū ē ſicut iudiciū baſilice.

¶ Nunc tāgit partes a quibus flobothomie dictaꝝ venarū principalr̄ euant. Et prio facit hic de cephalica. 2º ꝺ nigra. 3º de baſilica. 4º ꝺ fune brachij. 5º de ſceylen. 6º ⁊ vltimo de aſcellari. ibi 2ª: nigra vero. ibi 3ª: baſilica qdē. ibi 4ª: funis vero. ibi 5ª: ſceylen vero. ibi 6ª: aſcellaris vero. ¶ De oibꝰ ſimul ponendo dicit ꝙ debes ſcire ꝙ ſanguis vtplurimū euatꝰ ex flobothomia cephalice ē ſanguis ex collo ſumptꝰ aut ex ꝑte paꝝ ſupra collū exñte vel paruꝫ ſub collo: ita tñ ꝙ nō tranſit ad euandū a partibꝰ epatis ⁊ ipocūdrioꝝ: nec ēt talr̄ mūdificat iteriora vt ex tali mūdificatiōe aliqua cura hēat̄. ¶ 2º dicit ꝙ iudiciū ſupple flobothomie nigre vene vt cōis ē mediū iter cephalicā ⁊ baſilicā. ¶ 3º dicit ꝙ certe baſilica euat qꝺ ē a ꝑte ſuminis vētris īferiꝰ. ¶ 4º dicit ꝙ funis brachij ſupple ī euando ſimilat̄ cephalice. ¶ 5º dicit ꝙ quidā dixerūt ꝺ ſceylen ꝙ dextra ſceylen cōfert doloribꝰ epatis ⁊ ſiniſtra doloribꝰ ſplenis: Sic tñ ꝙ ſanguis ex flobothomia iſtarū venaꝝ dimittat̄ fluere donec ꝑ ſe ſtringat̄: ⁊ manus illiꝰ qui flobothomat̄ ponat̄ in aqua calida ne cito reſtringat̄ ſanguis: ſed egrediat̄ facile ſi egredit̄ debiliter ſicut debiliter ī multis flobothomatis ex ſceylen: cuius ſceylen ē melior flobothomia ſcḋm longum. ¶ Ultimo dicit ꝙ iudiciū flobothomie aſcellaris eſt ſicut iudicium baſilice ⁊c̄.

Scias ꝙ Aui. hic per ſumen intelligit vmbilicuꝫ: ⁊ ꝙ hoc veritatē ꝯtineat vide ab eo i 4ª tertij tractatu quarto. c. v. dicēs ꝙ infantes dū ſūt in vētre mingunt ex ſumine. De hac auteꝫ euōne que fit ex baſilica meminit Raſis ſeptio almāſoris capl̄o de flobothomia parapho illo: Sꝫ ex baſilice iciſione ⁊c̄. ⁊ ēt Gal. octauo de īgenio. c. vj. verbo illo: Sāguis qui ī epate ⁊c̄.

Artaria vero manꝰ q̄ flobothomat̄ ē artaria q̄ inter pollicē exiſtit ⁊ indicē ⁊ eiꝰ quideꝫ iuuamētū in antiquis doloribꝰ epatis ⁊ diafragmatis ē mirabile. Et Gal. quidē iā vidit hoc ī ſomnis: ꝑcipiebat eiꝫ homini hāc facere flobothomiā cā doloris quē in epate hēbat qui eaꝫ fecit ⁊ ſanꝰ effectꝰ ē. Plerūqꝫ ēt flobothomat̄ alia artaria que ad īteriorē partē palme decliuior hac exiſtit: cuius iuuamentuꝫ eſt ꝓpinquū iuuamēto iſtius.

¶ Nunc determīat de flobothomia artariaꝝ manꝰ. Et pōt diuidi in duas ꝑtes: q: ṗº facit qꝺ dictū ē. 2º iterato reuertit̄ ad determinādū de flobothomia venaꝝ manus. ibi 2ª: qui aūt vena manꝰ. Prima ī duas ſcḋm ꝙ tangit duplicis artarie flobothomiā. ibi 2ª: plurimi auteꝫ. Prima ī duas. ṗº facit qꝺ dictuꝫ ē. 2º dicta ſua auctē Gal. cōfirmat. ibi 2ª: ⁊ Gal. quidē. ¶ De prima dicit ꝙ artaria manus q̄ flobothomat̄ ē inter pollicē digitū ⁊ indicē mirabile afferēs iuuamētuꝫ antiquis doloribꝰ epatis ⁊ dyafragmatis. ¶ Scḋo dicit ꝙ Gal. vidit hoc ī ſomnis. ſ. ꝙ flobothomia talis artarie illa afferebat iuuamēta vñ ꝑcipiebat homini hāc facere flobothomiā ꝑꝑ dolorē ī epate habitū qua facta ſanꝰ ē factꝰ. ¶ Ultimo dicit ꝙ pluries flobothomatur alia artaria īferior decliuior exñs ad partem inferiorem palme cuius iuuamentuꝫ appropinquat flobothomie artarie habite.

Dubitatur circa partem prehabitā

an ꝑtes ꝯtineāt veritateꝫ? Qꝺ nō arguit̄ primo de cephalica q̄ euat a capite: ergo nō tantū a ꝑte modicū exñte ſupra collū. Conſequētia ex eo tenet ꝙ caput eſt multuꝫ ſupra collū. Pꝫ añs ꝑ cōem exꝑiētiā. ¶ Scḋo ſic: cephalica nō hꝫ originē a partibꝰ colli: nec etiā vene colli originātur ab ipa: ergo ipa nō euat a collo. Añs pꝫ ꝑ anothomiaꝫ ⁊ tꝫ ꝯña q: ñ euaret a dictis ꝑtibus niſi ꝓpter dictas cās. ¶ Tertio ſic: cephalica originat̄ ab epate: ergo ab epate ⁊ a ſuis ꝑtibus euat. Añs ē medicoꝝ ponētiū oium venaruꝫ epar eē principiū. Et ꝯña tenet q: vena maxime dꝫ euare a parte ſibi mittēte ſanguinē. ¶ Quarto ſic: oēs vene ad īuicē habēt cōtinuitatē vt ꝑ quālibet a toto ſanguis poſſit euari: ergo cephalica tā ſuperiora ꝙꝫ īferiora mūdare pōt. Añs notū eo ꝙ flobothomia ē euatio a toto euans 4ª affo. 2º ꝯmēto: ꝯña ē ſatis apparēs. In oppoſitū ē Aui. ī parte. ¶ Pro dubio nota ꝙ vena aliq̄ dicit̄ euare ab aliqua ꝑte qñ de ꝓpinquo ſatis ⁊ īmediate ab ea euat. ¶ 2º nota cephalicā venā ex vena ad furculā aſcēdente ortaꝫ colligari ramis venaꝝ vadētiū ſupra collū ⁊ aliqualr̄ īfra. ¶ Iſtis ꝓmiſſis ſit hec prīa cōcl'o: flobothomia cephalice pōt a toto euare. Pꝫ prio per multas rōnes añ oppoſitū. ¶ 2ª cōcluſio: flobothomia cephalice ñ īmediate euat a toto: hec ē ꝑ mēte Aui. ī textu. ¶ 3ª flobothomia cephalice īmediatius ⁊ citiꝰ a partibus brachij ſeu humeri pōt euare ꝙꝫ ab alijs partibꝰ. Pꝫ ꝓpter maiorē ꝓpīgtatē. ¶ 4ª cōcluſio: flobothomia cephalice euat a collo ⁊ a parte aliqualr̄ ſuperiori: ⁊ aliqualr̄ inferiori vt ī textu colligit̄. Etiā ex vno ꝓmiſſo ꝓpter affinitatē ⁊ colligātiā quā hꝫ cephalica cū ramis venaꝝ colli ⁊ partiū ſibi ꝓpīquaꝝ. Iſtis ꝯcluſis pro rñſali pꝫ ſolutio ad oppoſita. ¶ Ad primuꝫ cephalica euat a capite: pōt ꝯcedi dicēdo ꝙ caput nō eſt pars multuꝫ remota a collo. ¶ Ad aliā dicit̄ ꝙ cuꝫ cephalica non īmediate oriat̄ ab epate: ideo non īmediate euat ab epate ſꝫ a partibꝰ predictis. ¶ Ad aliā etiā breuiter pꝫ ſolutio ex dictis ⁊ per ꝯñs quid ſit reſpondēduꝫ.

Qui autē venā manus flobothomare voluerit ⁊ nō potuerit: nō erret in ligādo eaꝫ fortiter cū inuolutiōe ⁊ iteratiōeꝫ faciēdo: ſꝫ vna die aut duabꝰ dimittat. Uerū tñ ſi percuſſionem iterare neceſſariū fuerit a prima percuſſione ſe remoueat ⁊ nō ab ea deſcēdat.

¶ Nunc reuertit̄ ad determinādū ſecūdario de flobothomia venaꝝ manꝰ. Et quāuis poſſet diuidi: q: tñ ꝑtes nō hñt adinuicē ꝯtinuitatē ⁊ ordinē: iō poſſet diuidi in tot ꝑtes quot ponit cañ. Et ṗº ponit cañ. obſeruādos añ flobothomiā ⁊ ex ꝑte ligature. ¶ Primꝰ cañ. ē volēs flobothomare venā manꝰ ⁊ nō potens: ſupple q: nō īuenit venā nō erit fortiter ligādū ⁊ īoluēdum fortiter brachiū ⁊ faciēdo iteratā ligatōem: ſꝫ dimittat vna die aut duabꝰ. Et ſi neceſſariū fuerit iteꝝ facere ꝑcuſſionē: remoueat. ſ. a ṗª percuſſione nō deſcēdēdo. Iſte ē primꝰ cañ. ¶ Pro ꝑte nota ꝙ vena manꝰ aliqñ ꝓpter ſubmerſionē aut ꝑꝑ paruitateꝫ īueniri nō pōt ꝑ qua iueniēda ligat̄ brachiuꝫ. nā ꝓſſo ſanguine ꝑ ligaturā ī venā: vena appet magis tumēs ⁊ ſit altior. ¶ Ponit igit̄ cañ. ne nos curemꝰ in valde fortiter ligādo q: poſſet ſeq apa ſeu mortificatio mēbri. Si ergo facta ligatura ſatis forti nō īueniat̄ vena: remoueat̄ ligatura ⁊ dimittat̄ ſic duobꝰ diebꝰ aut tribꝰ. nā ꝓpter ligatōeꝫ ⁊ dolorē attrahet̄ ſanguis ad locū flobothomādū: vñ ipſa tumēte vena poterit fieri flobothomia. ¶ Ulteriꝰ dicit ꝙ ſi ē neceſſe facere nouā flobothomiā al's ꝑcuſſionē: nō dꝫ fieri ī eodē foraīe: ſꝫ remouēdū eſt paꝝ a ṗº ne forte nimiū āplificemꝰ foramē: aut cū doleat illa ꝑs nimiū dolorē iducamꝰ nō diſcedēdo tñ multū a primo foramie. Nā cū ſanguis ſit tractꝰ verſus illud foramē: ſi foramen fieret multuꝫ diſtās humores male euacuarent̄: igit̄ ⁊c̄.

Ligatura vero preterea fortis apa affert ⁊ infrigidatio pāni ⁊ ipſius humectatio ex aqua roſata aut aqua infrigidata eſt bona ⁊ cōueniens.

Hanc īfrigidationē pānoruꝫ cū diſſolutiōe ligature cōſuluit Raſis ſeptio almāſoris ī ſupcalefactōe loci flobothomie verbo illo: Locus quoqꝫ ſi calefactus fuerit ⁊c̄.

¶ Ponit aliū cañ. dicēs ꝙ ligatura fortis facit apa cui ꝯuenit humectatio ⁊ īfrīdatio cū pānis īfuſis in aq̄ roſaꝝ aut aq̄ frida. ¶ Pro ꝑte nota ꝙ fortis ligatura pōt facere apa ⁊ mēbri mortificatōeꝫ. Dū aūt fit apa ita ꝙ mā ē ī fluxu: ꝯueniūt repcutiētia: q̄le ē aq̄ roſata frida exñs ⁊ ſupple ſtiptica: aut aq̄ frida repcutiēs ꝓpter frigiditatē. Ubi vero timeremꝰ mortificationē mēbri: debemꝰ dare calida attractiua vt ſanguis ⁊ ſpiritus attrahant̄ ad mēbruꝫ.

UVA. BHSC. IyR_006_1

Oportet etiā ne ligatura cutē de ſuo loco ante flobothomiā aut poſt eaȝ remoueat.

¶ Ponit aliū cañ. dicēs ꝙ oȝ etiā ligaturā añ flobothomiā ⁊ poſt nō remouere cutē a ſuo loco. Cā ē iſta qꝛ remota cute a ſuo loco ⁊ ipa reuertēte ad ꝓpriū locū ⁊ poſt flothomiā coopiente foramē vene ſanguis exire nō poterit: q ſtans iter venā ⁊ cutē cauſabit ēpoꝛiſma: cuiꝰ gnātio mala ē qꝛ putrefiet ⁊ corrumpeṫ ſanguis.

Et corporibus quidē macris ligature fortitudo ē cā euādi venas ⁊ retinēdi ſāguinē ex eis. In craſſis aūt corpibꝰ pp laſſitudinē vene nō appent niſi ꝯſtrigant.

¶ Nūc ponit aliū cañ. dicēs ꝙ fortis ligatura ī macris corpibus ē cā euandi ex venis ſanguinē ⁊ retinēdi ipȝ ī venis. Sed in groſſis corpibꝰ ꝓpter groſſitiē ⁊ laſſitatē carnis non appent vene niſi reſtringanṫ. ¶ Pro pte nota ꝙ corpa macra hñt venas valde eminētes. Fortis ergo ligatio retinet ſanguinē ſupra locū flobothomandū: ita ꝙ vbi dȝ fieri flobothomia non ē ſanguis: ⁊ ſic nec exire poterit. Ex quo inferṫ in macris corpibus nō fortiter eē ligādum. In craſſis aūt pp humiditatē vene ſūt laſſe: ꝓpter ēt pinguedinē aut carnē vene ſūt valde ſubmerſe: vt ergo appareat eſt fortis ligatura neceſſaria que nō poterit nocumentuȝ īducere cuȝ vena ſit ſubmerſa.

Minutoꝝ preterea ſunt quidā qui ingeniātur qualiter dolor regatur ſtupefaciēdo manū ꝯſtrictione brachij ⁊ dimiſſione hore vnius. Et ſunt quidaȝ qui flobothomū oleo inungūt: ſed hoc totū ſicut iaȝ diximus doloreȝ lenit ⁊ conſolidationē retardat.

¶ Nūc ponit aliū cañ. dicēs ꝙ qdā minutoꝝ ſunt ingeniātes ī regēdo dolorē ſtupefaciēdo manū ꝓpter ſtricturā quā vna hora dimittūt. Quidā ēt eoꝝ ſunt ī vngētes flobothomū oleo. Hoc tñ vt dictū ē mitigat dolorē ⁊ tardat ꝯſolidationē. ¶ Pro pte nota ꝙ primus modus, opatōis nō ē ꝯueniēs. nā facto mēbro ſtupido per ligationē ñ tranſeuntibꝰ debite ſpiritibus ſenſitiuis lediṫ valde mēbrū: ⁊ nō debite etiā vitalibꝰ tranſeūtibus mēbrū aliqualr mortificaṫ. 2m aūt remediū vtile ē ſatis. Nā quāto flobothomꝰ lenior ē tanto minorē īducit dolorē. Fit aūt lenior p oleum. Itē oleū cutē facit leniorē ⁊ magis obediētē pcuſſiōi vt nō tātus īde dolor pcipiaṫ. Oleū aūt ſtans inter labia foraminis tardat cōſolidationē.

Et ſi vene quidē quas ī manu nominauimꝰ nō apparuerint ſed apparuerit ipſarū rami prematur manꝰ digito protrahēdo inferiꝰ. Et ſi ſanguis cito ad ſeipſuȝ reuerſus fuerit cū digitus remouetur ⁊ ītumuerit flobothometur: ⁊ ſi nō: non minuatur.

¶ Ponit aliū cañ. dicēs ꝙ ſi nō appareāt nomiate vene ſed appareāt rami ipaꝝ: tūc rami pmūtur digito trahēdo inferiꝰ. Et ſi ſanguis cito reuerteṫ ad ramū digito remoto ⁊ tumeat ramus flobothomaṫ tūc ramus: ⁊ ſi nō tumeat: nō flōmaṫ. ¶ Pro parte nota ꝙ lȝ ſm plurimū ramꝰ ſit minor radice: qꝛ tamē pōt radix ſubmerſior eē ⁊ ramꝰ eminētior: iō nō appente radice pōt ramus appere. Circa quā flōmiā reſpiciēdū ē vt no. Aui. Nā pmaṫ inferiꝰ cū digito: deiñ remoueaṫ digitꝰ. Et ſi videaṫ cito tumeſcē: ſignū ē ꝙ repletio ē ī ramo ⁊ ꝙ ſanguis ſue radicis optie tranſit ad ramū. Si vero oppoſitū ſignū appet: hoc ē iō qꝛ replō nō ē ī ramo nec ſanguis libere trāſit ī ramū q nō minuaṫ.

Cūqȝ lauādi affuerit volūtas cutis trahaṫ: ideo vt percuſſio cooperiaṫ ⁊ fiat ablutio: deīde ipſa ad ſuū ſitū reducaṫ. Pannus quoqȝ eminētia habens rectificeṫ qui eſt melior cuȝ pilaȝ habet ⁊ deſuper ligetur.

¶ Nunc ponit aliū cañ. dicēs ꝙ cū aliquis voluerit lauare. ſ. brachiū mundando ipm a ſanguie trahaṫ cutis vt pcuſſus locꝰ coopiaṫ: ⁊ tūc deinde reducaṫ cutis ad locuȝ ſuū ſeu ſitū priorē. Deinde rectificeṫ pānus hñs eminētiā melior exñs ſi habuerit pilā ⁊ ligeṫ deſup. ¶ Pro pte nota cutē eſſe lauādaȝ poſt flōmiā ne ſanguis remanēs īficiat brachiū vel ibi putrefiat. Fit aūt lotio cōiter cum vino exiccāte ⁊ ꝯfortāte brachiū. ¶ 2o nota ꝙ notāter cutis nō dȝ remoueri a foramie ne vinū aut alius liquor ītret foramē: deīde ꝓpter cāȝ aſſignatā reducaṫ cutis ad locū propriū. ¶ 3o nota ꝙ notāter pila. i. res rotūda ad modū pile ſeu ad modū plumaccoli poni dȝ ſupra foramē vt eū claudat ⁊ debite pmat ⁊ p pſſionē hūores q erāt tracti ad foramē diſpgant ⁊ nō faciāt tumores. Et notāter dȝ pānꝰ rectificari qꝛ dȝ fieri planꝰ ⁊ eqlis: ne pp ieqlitatē ſtrigat ita vt brachiū doleat: ⁊ iō bīdellū dȝ eē de panno antiquo: ⁊ nō dȝ eē factū cōiter cū qbuſdā pūcturis de ſerico ⁊c.

Cū aūt ī orificio percuſſiōis adeps egrediṫ molliter īterius reducēda erit ⁊ nō erit incidēda. Et in hoꝝ quideȝ ſecūdatōe nō ē fiducia hēnda ſine percuſſiōe: ⁊ hoc quidē in fine capituli vehemēter perſcrutabimur. nā ſermo iſte accidētaliter hic ingreſſus eſt.

¶ Nūc ponit aliū cañ. dicēs ꝙ ſi egrediaṫ ab orificio pcuſſiōis adeps leniter reducaṫ interiꝰ ⁊ nō icidaṫ. Subdit ꝙ in faciēdo ſcdam flobothomiā nō ē ꝯfidēdū niſi fiat noua pcuſſio de qua diceṫ in fine capituli: vñ hoc ē hic icidētaliter poſitū. ¶ Pro pte nota ꝙ adeps pōt exire aut pp aſpitatē flobothomi vt in egreſſiōe ſecuȝ trahat adipē: aut ꝓpter āplitudinē pcuſſiōis: tñ cuȝ adeps ē pauce quātitatis ⁊ modico tpe ſteterit extra reducaṫ interiꝰ. Et cā ē qꝛ ſi icidereṫ remanēte vna vacuitate iter foramē vene ⁊ cuteȝ poſſet cāri ēporiſma. ¶ Nota vlteriꝰ ꝙ cū adeps nō pōt totalr reduci ad ſuū locū iō oppillādo foramē vene ꝓhibȝ ne ſanguis exeat per primum foramē: ideo opȝ nouū facere foramē ⁊c.

Ampliꝰ ſcire debes ꝙ ſanguis retētio ⁊ pcuſſiōis ligatio terminatā hñt horā lȝ ſit diuerſa. nā quidā ſūt qui tollerare pñt ēt ſi febricitātes eēnt: vt quinqȝ aut ſex ſanguis libre auferātur. ſunt ⁊ alij qui nō pñt tollerare ipſis etiā ſanis vt vna ſanguis libra auferatur.

¶ Nūc ponit aliū cañ. ī quo docet flōmiā dbitā mēſurare. Et duo facit. po facit qd dictū ē. 2o oñdit tria eē obſeruāda ī debite mēſurādo flobothomiā. ibi 2a: verūtamē. ¶ De pria dicit ꝙ retētio ſanguis ⁊ ligatio pcuſſiōis habēt horā determinatā: lȝ iſta hora ī diuerſis ſit diuerſa. Nā quidā ſunt qui febricitātes tollerāt euātionē. v. librarū aut. vj. ſanguis. Quidā aūt ſunt qui ⁊ ſi ſani ſint ñ tollerant euātiōeȝ vnius libre. ¶ Pro pte lrāliter aduertēdū ꝙ cū ſanitas ⁊ vita debitā requirāt quātitatē humoꝝ: iō notāter debita hora ē eligenda qua ſanguis reſtringaṫ ne nimia debilitas īferaṫ virtuti. ¶ Scdo nota ꝙ quedā ſūt corpora valde plena ſanguie valde robuſta ⁊ ſpūoſa ī quibus ſeu a quibꝰ multꝰ ſanguis pōt auferri lȝ ſint febricitātia. Ex quo cōcipiṫ in febricitatibꝰ minꝰ ſanguis eē euandū: prio qꝛ virtꝰ eoꝝ ē debilior facta: ēt qꝛ ſanguis eoꝝ aliqualr ē malignatꝰ. In qbuſdā ēt ſanis modicū ſanguis ēt auferēdū ē ꝓpter paucitatē ſanguinis ⁊ ſpirituum.

Uerūtñ tres in hoc ꝯſiderāde ſūt diſpōnes: quarū vna ē lenitas corpis ⁊ ipſiꝰ laſſitas: ⁊ alia eſt color ſanguis. nā in hoc etiā multotiēs accidit error: qm̄ in pricipio ſui egrediṫ ſubtilis ⁊ albus: quare cuȝ repletiōis ibi affuerit ſignatio ⁊ oportuerit te flobothomiaȝ facere nō decipiaris propter hoc. naȝ color ſanguis in eis qui repletōis ſigna habēt permiſceṫ qñqȝ: ſȝ tñ inde nō eſt curanduȝ. in eis quoqȝ qui apata hñt color ſanguis erroreȝ facit: qm̄ apoſtema ſanguinē ad ſeipȝ trahit. Et tertia eſt pulſus a quo recedere non debes.

Nunc enumerat quedā attēdēda ꝓ mēſurāda flobothomia. Et prio facit qd dictū ē. 2o docet modū mēſurandi ex illis. ibi 2a: cū ergo ptrāſierit. Primo dicit ꝙ in illo caſu tres diſpōes ſunt ꝯſiderāde. Una ē ſubtilitas ⁊ fluxibilitas ſanguis. 2a ē color. Nā etiā multotiēs erraṫ in hoc: qꝛ ſanguis ī principio egrediṫ ſubtilis ⁊ albꝰ apparentibus tñ ſignis repletiōis: ſi apparuerit neceſſariā fore flobothomiā nō differas ne decipiaris ꝓpter taleȝ ſanguinē. Naȝ color ſanguis aliqñ mutaṫ apparētibꝰ ſignis repletionis: ſȝ nō ē inde curādū. In hñtibus etiā apa color ſanguinis facit errare cū apa trahat ad ſe ſanguinem. 3a ē diſpō pulſus a quo pulſuȝ non debes recedere. ¶ Pro parte nota ꝙ ſanguie exñte ſubtili denotaṫ ſanguinē eē retinendū: qꝛ ex hoc denotaṫ aquoſitas ſanguis ⁊ abundātia flegmatis aut abūdātia colere: iō ſanguis ē retinēdus. In hoc auteȝ cāu errare cōtingit: qꝛ poſſibile eēt repletionē eē multam: ⁊ ꝙ ſanguis ſm aliquā ptē ſit albꝰ ſubtilis ⁊ aquoſus: ⁊ tñ ſm aliquā ptē nō ſit talis coloris. Nō decipiaris ergo: qꝛ ſi adſint ſigna repletiōis potes vlteriꝰ euare. Itē erraṫ in colore ex pte alterius qꝛ apa exēpli grā ē ī iterioribꝰ trahēs ad ſe mām vt vētoſa ſicut colligiṫ 7a affo. cōmēto prio: iō ſanguis apparet poſtea ſubtilis ⁊ boni coloris: cū tñ ſit magna repletio ſanguinis. ¶ Ultimo nota ꝙ notāter eſt ad pulſum cōſiderādū per quē ꝯprehēdimus tenorē virtutis vitalis. In oi eniȝ euatiōe valde attēdēdum virtuti vt colligiṫ prima affo. cōmēto 3o.

Cūqȝ ergo pertrāſierit pulchritudo coloris aut mutabiṫ color ſanguis aut mutabitur pulſus ⁊ ꝓprie ad debilitatē retine. Et ſimilr ſi aduenerit oſcitatiōis accidēs aut alicum aut ſingultus aut nauſee: aut ſi cito mutabitur color aut pulchritudo initere pulſui. Qui vero magis preparati ſunt ad hoc vt ſincopis eis velociter accidat ſūt illi qui calidarū exiſtunt cōplexionuȝ macri laxa habētes corpora: ⁊ qui ſūt preparati ad hoc vt iſtud eis eueniat tarde ſūt corpa hñtes tpata ⁊ carnes duras.

¶ Nunc ponit modos ſignificādi dicēs ꝙ cum ſit mutata pulchritudo coloris: aut color ſanguis ēt ſupple mutetur ī aliū colorē: aut muteṫ ſanguis: aut pulſus: ⁊ ꝓprie pulſus fiat debilis: tūc retine. Subdit ꝙ ſi adueniāt accidētales

UVA. BHSC. IyR_006_1

De alicibꝰ memi nit Auer. tertio colli get. c. xlj. parapho il lo: Alices ſiũt ꝓpter motũ virtutis expul ſiue ⁊c̃. Et Gal. etiã ſeptia affo. ↄmẽto il lius affo. Brachio rũ extẽſiões ⁊c̃. para pho illo: Alices di cimus eẽ ⁊c̃. De ſin gultu dicit Hyp. gn ta affo. Sãguie mul to fluente ſpaſmꝰ aut ſingultus inatus ma luz. Propter qȯ aũt accidat ſingultꝰ per quire ab Auer. tertio colligz. c. xxv. verbo illo: Singultus qui dẽ accidit ꝓpter rez que ledit ⁊c̃.

dẽtales alices: oſcitatiões: ſingultꝰ aut nauſea: aut ſi cito mutet̃ coloꝛ aut pulchꝛitudo. ſ. coꝛꝑis: attẽde ad pulſuz: ⁊ ſi tibi appeat debilis retine ſtatim. Subdit etiã ꝙ magis pati ad velocẽ icurſuz ſincopis ſũt calidas hñtes ↄplões vt macri ⁊ laſſa hñtes coꝛpa. tardi vero ad ſincopim ſunt hñtes cõplones tꝑatas ⁊ carnes duras. ¶ Pꝛo parte no ta ꝙ coloꝛ ſanguis põt dupl'r mutari. Pꝛio vt coloꝛ ſan guiuis pulchꝛi mutet̃ i coloꝛẽ turpis ſanguis. Exẽpli gr̃a apatc i parte interioꝛi ad ſe trahẽte ſanguinẽ pulchꝛũ cuz ſanguie malo ſi fiat flobothomia appebit ſanguis pulcher cũ ſanguis malus exñs circa partẽ apatã nõ eũet̃. Eũato aũt multũ de ſanguie pulchꝛo cõtingit tandẽ eũari turpẽ. Talis ergo mutatio pulchꝛi i turpẽ ſignificat eũationẽ eẽ retinẽdã. Nã cũ in tali cãu fiat flobothomia vt diuertat̃ aut eũetur mã fluxura ad apa: ⁊ ꝓpter materiã fluxurã ta lis mutatio ſanguis ſignificat eũationez abundãtem eſſe. 2° põt mutari coloꝛ i coloꝛem: vt qꝛ pꝛimo apparebat ſan guis rubeus groſſus quẽ intẽdebas eũare: nũc aũt appet albus ſubtilis: iõ ſignũ ẽ eũationẽ eẽ abundãtez: qꝛ tamen ſigna ſumpta ex coloꝛe fallere pñt: vt patuit ex dictis Aui. Iõ dicit etiã pulſui eẽ attẽdẽduz. Nã ſi appareat ex pulſu virtutẽ cõſtare nõ ꝓpter hoc debemus deſiſtere a flõmia: ſil'r etiaz ſi accidat oſcitatio ⁊ ſil'r ſi ẽt alices accidant attẽ dẽdum ẽ pulſui. Nã hec accidẽtia pñt cõtingere vt alices ⁊ oſcitationes eleuatis vapoꝛibꝰ ſeu ventoſitatibꝰ ad ꝑtes oꝛis ſeu etiã bꝛachioꝝ: pñt ẽt cõtingere ꝓpter quãdã debi litatẽ ⁊ coꝛpis laſſitudinẽ. Pñt etiã ſingultꝰ: nauſea ⁊ co loꝛ mutatus cõtingere: aut ꝓpter humoꝛẽ ſtomacũ moꝛdi cantẽ: aut ꝓpter debilitatẽ virtutis: ꝓ quibꝰ ẽt cognoſcẽ dis aſpice pulſuz. ¶ Ulterius nota ꝙ coꝛꝑa calidarũ cõ plexionũ vt coꝛꝑa macra qꝛ colerica ſũt apta icurrere ſin copim multis ex cãis. Pꝛimo qꝛ in eis aptus ẽ humoꝛ ad os ſtomaci currere: ⁊ ſua moꝛdicatiõe inducere ſincopim. Itẽ qꝛ talia coꝛꝑa ſunt cite reſolõnis ꝓpter paucitatẽ ſan guinis ⁊ ſpũuz ⁊ eoꝝ ſubtilitatẽ. ¶ Tertio nota ꝙ per coꝛ poꝛa laſſa intelligere poſſumus p̃° coꝛꝑa colerica qꝛ habẽt carnes laſſas ⁊ raras diſpoſitas reſolõni. 2° poſſumꝰ itel ligere flegmatica que ẽt ꝓpter multã humiditatẽ hñt car nes laſſas: que vulgariter appellant̃ carnes cõfuſe. Iſta ẽt coꝛꝑa ſunt parata ad ſincopim ꝑꝑ paucitatẽ ſanguĩs ⁊ ſpi rituũ: iõ ꝓna ad debilitatẽ virtutis. 3° ꝑ coꝛꝑa laſſa poſ ſumus intelligere oĩa coꝛꝑa hñtia carnes raras ⁊ per ↄñs hñtia ſpũs aptos reſolõni. ¶ Nota 4° ꝙ coꝛꝑa tꝑata ha bẽtia humoꝛes debite quãtitatis ⁊ ſpũs: ⁊ bꝛeuiter valde reſiſtẽtia egris cãis tarde pñt incurrere ſincopim. Itẽ coꝛ poꝛa hñtia duras carnes nõ dico duras ꝑ pñtiã multi nu trimenti groſſi ⁊ melãcolici aut terreſtris: ſz dico duras ꝑ pñtiã multi humidi ſubſtãtifici extẽdẽtis cutim: ⁊ ſic in durant: qualia ſunt coꝛꝑa ſanguinea robuſta ⁊ lataruz ve narũ: in his eim coꝛꝑibus ꝑꝑ abudantiã ſanguis ⁊ ſpũuz tarde cãtur ſincopis. Exẽplũ aũt diſtincte duritiei eſt in ꝓmptu. Nã coꝛꝑa iuuenũ ſunt dura mõ ſcdo: vnde etiaz ꝗ̃uis ſit turpe dictũ videmꝰ mãmillas iuuenũ eẽ duras ⁊ carnes ſil'r. Senũ aũt carnes ⁊ mãmillas nõ eẽ duras imo laſſas: cũ tñ multã hẽant terreſtreitatẽ reſiſtẽtẽ coctiõi vt notat expiẽtia: vñ carnes iuuenũ aĩaliũ durioꝛes iſto mo do exñtes citius coquũtur carnibꝰ ſenũ ⁊ hñtes multũ de humido ex coctione nõ multũ minuũtur: ſed carnes ſenuz hñtes multũ de humido añquã debite molleſcãt ⁊ coquã tur per coctionem minuũtur.

Oz p̃terea vt miutoꝛ flobothomos habeat multos quoꝝ quidã ſint pilum habentes ⁊ quidã pilo carẽtes. Et piluz quidem habentes ſunt ↄueniẽtioꝛes venis la bentibꝰ ſicut guideç.

¶ Nũc ponit cañ. obſeruãdũ ex ꝑte minutoꝛis: ⁊ p̃° fa cit hoc. 2° qꝛ fecerat mẽtiõez ex flõmia accidẽ ſincopiz: iõ oñdit quo tꝑe magis accidat ſincopis. ibi 2ª: ſincopis vo. ¶ De tota pª ꝑte dicit ſic ñ vlteriꝰ diuidẽdo illã ꝙ oz minu toꝛẽ hẽre mltos flõmos quoꝝ qdã hẽant pilũ ⁊ qdẽ nõ: qꝛ hñtes piluz ſunt ↄueniẽtioꝛes venis labẽtibus vt guideç. ¶ Pꝛo ꝑte nota ꝙ ꝑ hẽre piluz poſſumꝰ duo intelligere. p̃° ꝑ pilũ poſſumꝰ itelligẽ pũctã vt ſit ſenſus ꝙ qdã flõmi ſũt hñtes pilũ vltra pũctã ſeu cuſpidẽ ↄſuetã. 2° intelligẽ poſſumꝰ pũctã trãſeuntẽ ex trãſuerſo flõmi. ¶ Et nota exẽ plũ qꝛ ſit talis trãſuerſatio circa pũctã ne flõmus poſſz ſe multũ fundare: ſicut de ſagittis que hñt barbulã: qm̃ hñt i circuitu quaſdã eminẽtias pũctuales que ꝓhibẽt ne ſa gitta multũ penetret niſi ꝑꝑ magnũ ipetũ. ¶ 2° nota ꝙ ꝑ venas labẽtes poſſumus itelligere illas que ſi tãgãt̃ nõ bñ ſtãt firme ſicut vene colli: q̃ ꝑꝑ eaꝝ ſituatiõez ⁊ qꝛ nõ ſunt bñ inexe carni ſi tãgãt̃ labiles ſiũt. ſi ergo dbẽt flõmari flo bothomꝰ dz hẽre pũctas ꝫm pꝛimã expõnẽ: vt ſi nõ tãgat venã cũ vna pũcta: tãgat tñ cũ alia. vel flõmꝰ dz hẽre bar bulã vt ſi minutoꝛ pũgit ⁊ ñ pupugerit venaz nõ ꝓfundet ſe in pungendo neruum vel carnem aut partem aliam ⁊c̃.

Et vt habeat glomoꝛez ex cuculo aut ſerico: ⁊ inſtru mẽtũ vomitiuũ ex ligno aut pẽna: ⁊ vt ſecũ teneat pilos lepoꝛis ⁊ medicamẽtũ ex aloe ⁊ thure ⁊ foliculum muſci ⁊ diamuſcatũ ⁊ trociſcos de muſco. Ideo vt ſi ſincopis acciderit q̃ ẽ vna ex rebꝰ que ex minutõe timet̃ ⁊ foꝛtaſ ſe habẽs hoc nõ vomuerit ſuccurrat ⁊ glomoꝛẽ i os eiꝰ mittat ⁊ ipſuz cũ iſtrumẽto vomere faciat ⁊ foliculum ei ad olfaciendũ tribuat: ⁊ faciat ipſuz traijcere aliquid ex electuario diamuſcato ⁊ ex trociſcis eius ꝓpterea vt eiꝰ virtus viuificet̃. Et ſi accidat vt ex artaria ſanguis egre diatur: ſuccurrat ⁊ repleat vulnus pilis lepoꝛis: ⁊ cũ me dicamine ex aloe ipſos retineat.

¶ Tangit alium cañ. dicẽs ꝙ neceſſe ẽ minutoꝛẽ habere glomoꝛẽ ex cotulo aut ſerico. Glomoꝛ aũt non ẽ aliud ꝗ̃z quoddã rotũdũ factũ ex cotulo aut ſerico. Itẽ hẽat etiam ſecũ iſtrumẽtũ vomitiuũ factũ ex ligno aut factũ ex pẽna. Fit aũt ex pẽna ſumendo pẽnã quãtũ ad ſuos pilos ⁊ po nẽdo pẽnã interiꝰ ꝑ os: aut ſumẽdo lignũ oblõgũ ſibi in uoluẽdo ſericũ aut cotũ ⁊ iponẽdo oꝛi. Itẽ oz ipm hẽre pi los lepoꝛis. Itẽ medicamẽ factũ ex aloe ⁊ thure. Itẽ foli culũ muſci. Itẽ diamuſcatũ ⁊ trociſcos d muſco: ad hoc vt ſi accidat ſincopis que ẽ vna reruz que timet̃ ex flõmia ſuccurrat̃. Si ẽt iſte nõ vomerit ponat in oꝛe eius glomo rez ⁊ faciat ipm vomere cũ iſtrõ. Itẽ faciat ipz olfacere fo liculũ muſci: ⁊ det ſibi modicuz electuarij diamuſcati aut trociſcoꝝ de muſco vt virtus cõfoꝛtet̃. Et ſi cõtingat ſan guinẽ fluere ex artaria ſuccurrat replẽdo vulnꝰ pilis lepo ris ⁊ retineat ſanguinẽ cũ medicina ex aloe. Ex parte colli gitur ꝙ minutoꝛ dz ſecũ deferre ea qbꝰ quibuſdã ſuccur rat nocumẽtis poſſibilibꝰ. Nã p̃° expedit aliqñ vomitum ꝓuocare vt repleto ſtomaco vel ex cibo vel hũoꝛibꝰ alijs: iõ oz minutoꝛẽ ſecũ hẽre glomoꝛẽ ⁊c̃. 2° aliqñ oz minuto rẽ ꝓhibere vomitũ: iõ hẽat ſecũ rẽ odoꝛiferã vt muſcum: garioſ. ⁊ ſilia. Itẽ oz ipz aliqñ ſuccurẽ debilitati virtutis: iõ diamuſcũ ſecum hẽre dz ⁊ electuariũ diamuſcatũ ⁊ ex trociſcis eiꝰ. Itẽ ſi accidẽt egreſſus ſanguĩs ab artaria: re pleat̃ vulnꝰ d pilis lepoꝛis ⁊ cũ aloe ⁊ thure ipſi retineãt̃.

Scias ꝙ fere omĩ ſin copi ↄuenit vomitꝰ pꝛeter ꝗ̃z illi que ſit ex ſudoꝛe vel motu ſpirituũ ad exterio ra: vt vult Aui. vndecima tertij tractatu ſcdo. c. viij. parapho illo: Et fricatio extremitatuz ⁊ conſtrictio carum ⁊c̃.

Sincopis vero raro accidit ſanguine egrediẽte: imo ꝫm plurimũ non accidit niſi poſt retentionẽ niſi ſuper fluus fuerit ſanguinis exitus licet i febꝛibus ſinochis nõ curemus ſi vſqz ad ſincopiz perueniat ⁊ in pꝛĩcipio apo plexie ⁊ i ſquinãcijs ⁊ i magnis apoſtemalibꝰ pernitio ſis ⁊ foꝛtibus doloꝛibꝰ: hoc tamen facere non debemus niſi cuz virtus fuerit foꝛtis.

¶ Nũc oñdit quo tꝑe maxie accidit ſincopis ex flõmia: ⁊ dicit ꝙ ipſa raro accidit ſanguine egrediẽte: imo ꝫz plu rimũ retẽto ſanguĩe niſi ſupfluat eũatio ſanguis: quãuis nõ curemꝰ in febꝛe ſinocha infirmuz aũt ꝑducere vſqz ad ſincopiz ⁊ in pꝛĩcipio apoplexie ⁊ i ſquinãtijs ⁊ in magnis apatibꝰ ⁊ in doloꝛibꝰ foꝛtibꝰ: qȯ tñ nõ dz fieri niſi virtute exñte foꝛti. ¶ Pꝛo ꝑte nota ꝙ ſanguĩe egrediẽte raro ac cidit ſincopis: qꝛ ſanguĩe egrediẽte ſpũs ⁊ ſanguis trahũt̃ verſus exterioꝛa: vñ exterioꝛa nõ remanẽt depauꝑata ca loꝛe: ⁊ ꝑ ↄñs nõ cãtur ſincopis ꝓpter caloꝛis reuocatõem factã niſi ↄtigat hãc eſſe ſupfluentẽ: vñ regitiua virtꝰ calo ris ⁊ ſpũs cauſet reuocatõez: ſanguĩe vero retẽto vtpluri mũ cauſat̃ ſincopis cũ facta eũone ⁊ retentõe facta humo ribꝰ agitatis ⁊ ↄmotis ex doloꝛe i ſtomaco genito ſincopis ſubſequat̃. ¶ Ulteriꝰ nota ꝙ flõmiã vſqz ad ſincopiz. i. li pothomiã facimꝰ i ſinochis: qꝛ in ſinocha iflatiua ſine pu tredine tutiꝰ ꝗ̃z in ſinocha cũ putredĩe timentes moꝛtez ⁊ ſuffocatõez ꝓpter multã mãm. Sil'r in pꝛĩcipio apoplexie ⁊ i ſqnãtie ⁊ i magnis apatibꝰ multa exñte replõne ⁊ itẽdẽ tes vltĩate diuertẽ facimꝰ flõmiã vſqz ad ſincopiz virtute tñ ↄſtãte: q̃ ſnĩa de doloꝛibꝰ habita ẽ pª affo. ↄmẽto 23°.

Et iam quidẽ accidit nobis vt in venis manus ſer monez amplificaremꝰ ſecũduz alioꝝ ſentẽtias ⁊ obliui ſcẽmur venis pedis ⁊ alijs venis: nos ergo i eis ſermo nez noſtrũ cõtiuuare opoꝛtet.

¶ Nũc determiat de flõmia venaꝝ pedis. Pꝛio ponit itẽtõez. 2° exeqt̃. ibi dicemꝰ ergo. ¶ De pª ꝑte dicit ꝙ iã accidit nobis ſi ãpliꝰ determĩet̃ de venis manꝰ. ſ. vt facia mꝰ ãplioꝛẽ ſermonẽ ꝫm ſnĩaz alioꝝ ãpilus dicẽtiũ de hac flõmia: ⁊ ne obliuiſcamur flõmiã venaꝝ pedis ⁊ aliaꝝ: nos vero reſecãtes ſupflua opz noſtrũ cõtinuare ſermonẽ de terminãdo ſupple de flobothomia venaꝝ pedis.

Dicemꝰ ergo ꝙ ex venis pedis ẽ ſciatica q̃ flobotho mat̃ a parte ſiluestri alcabi aut ſub eo aut ſupꝛa ipſuz: ⁊ ligat̃ illud qȯ ẽ ſupꝛa ipſuz a ſũmitate coxe vſqz ad cabi ⁊ iuoluit̃ faſcia foꝛtiter aut inſtita: ⁊ melius quidẽ eſt vt ante balneet̃ i aqua calida ⁊ vt ipſa in lõgitudie flobo thomet̃. Qȯ ſi ipſa fuerit occulta: aliquis ſuoꝝ ramoꝛuz flobothomet̃ qui iter minimũ ⁊ ſecũdũ digitũ ab eo exi ſtit. Et iuuamentũ quidẽ i flõmia ſciatice eſt magnũ in doloꝛe ſcie ⁊ ſil'r in podagra ⁊ in varice ⁊ i elephãtia: ſz

UVA. BHSC. IyR_006_1

ſciatice ſecūdario eſt difficilis. Et ex eis eſt ſaphena que eſt ſuper parcē domeſticā alcabi ⁊ ē manifeſtioꝛ ſciatica: ⁊ ipſa quideꝫ flobothomat̄ ꝓpterea vt euacuet̄ ſanguis ex mēbꝛis que ſunt ſub epate ⁊ vt ſanguis a partibꝰ ſuperioꝛibꝰ ad inferioꝛes declinet̄: quare mēſtrua vehemēter pꝛouocat ⁊ emoꝛoidarū oꝛificia aperit. Et ratio quidem facit opoꝛtere vt ſciatica ⁊ ſaphena ſimilis exiſtant iuuamēti ſed experimentū facit vt operatio ſciatice plurimū cōueniat doloꝛi ſcie ſicut ſi hoc eſſet debituꝫ. Et ſaphene quideꝫ flobothomia melioꝛ eſt que ſit trāſuerſe latitudini attinēs. Et ex eis ē vena curuature que flobothomat̄ ſub genu poplitis que tantū efficit quantū ⁊ ſaphena: ſed eſt foꝛtioꝛ ſaphena in pꝛouocatiōe menſtruoꝛuꝫ ⁊ in doloꝛibꝰ ani ⁊ emoꝛoidibꝰ. Et ex eis ē vena que eſt poſt alaurchob que eſt quaſi ramꝰ ſaphene ⁊ operat̄ quantū ipſa. Et ad ſūmuꝫ quideꝫ venaꝝ pedis flobothomia cōfert egritudinibꝰ que fiunt ex materijs ad caput declinātibus ⁊ egritudinibꝰ melancolie: ⁊ ipſa quideꝫ magis debilitat virtuteꝫ q̄ꝫ flobothomia venarum manus.

¶ Nūc determinat de venis pedū. Et diuidit̄ in duas. Nā pꝛimo facit qd̄ dictū ē. 2° ponit ī ſūma iuuamēta flobothomie venaꝝ pedis. ibi 2ª: ⁊ ad ſūmū. pª ī quattuoꝛ ꝑꝫ ꝙ determiat de flōmia quattuoꝛ venarū pedis. p° de flobothomia ſciatice. 2° ſaphene. 3° de vena que ē ſub genu. 4° d̄ vena que eſt circa calcalcaneū. 2ª ibi: ⁊ ex eis. 3ª ibi: ⁊ ex eis eſt vena. 4ª ibi: ⁊ ex ea ē vena que poſt. ¶ Pꝛimo dicit ſe dicturum ſciaticaꝫ eē venā pedis que flōmat̄ ex p̄te exterioꝛi alcabi. i. cauicule aut ſupꝛa aut infra ligādo illud qd̄ ē ſupꝛa a ſūmitate coxe vſq3 ad calcaneū: ⁊ iuoluendo foꝛti faſcia: vñ meliꝰ ē vt ide balneet̄ pes aut tibia: ⁊ fiat flobothomia ꝑm longū. Et ſi ſit ſciatica occulta flōmet̄ aliqs ramoꝝ ſuoꝝ exñs iter ꝑuū ⁊ minimū digitū pedis ⁊ 2m ab illo. ¶ Ulteriꝰ dicit ꝙ iuuamētū flōmie ſciatice magnuꝫ ē in podagra ⁊ doloꝛe ſciatice ī varice ⁊ elefantia cuiꝰ ſciatice ſcd̄atio ſupple ī flōmia ē difficilis. ¶ Dicit etiaꝫ ⁊ eſt ſnīa ſcd̄e partis ꝙ ex venis pedis ē ſaphena exñs ī p̄te domeſtica ſeu in p̄te īterioꝛi cauicule: maioꝛ etiā exñs ſciatica que ſaphena flōmat̄ vt eūet̄ ſanguis ex mēbꝛis ſub epate exñtibꝰ vt diuertat̄ aut deriuet̄ ſanguis a partibꝰ ſupioꝛibus ad partes īferioꝛes: ⁊ iō flōmia ſaphene vehementer ꝓuocat mēſtrua ⁊ aperit oꝛificia emoꝛoidarū. Et certe rō facit eē neceſſariū vt flōmia ſciatice ⁊ ſabpene vene ſimilis exiſtāt iuuamēti. Experiētia tñ oñdente flōmiā ſciatice doloꝛi ſcie eē cōueniēteꝫ magis. Saphene vero flobothomia melioꝛ ē que tēdit ad trāſuerſuꝫ. ¶ Tertio dicit ꝙ ex venis pedis ē vena que ē in curuatura genu que tātū operat̄ quātū ſaphena: foꝛtioꝛ tñ ipa in ꝓuocādo mēſtrua ⁊ in doloꝛibus ani ex emoꝛoidibꝰ ſeu in doloꝛe emoꝛoidali. ¶ Ulterius dicit ꝙ ex venis pedis ē vena que ē poſt ſupple calcaneū quaſi ramus ſaphene oꝑans tantū quātū ſaphena. ¶ Ultio oſtendit ꝙ certe ſupple ſūmādo iuuamēta flōmia venaꝝ pedis ꝯpetit moꝛbis factis ex materiebꝰ declinātibꝰ ad caput ⁊ moꝛbis de mlīa: ⁊ ipſa certe debilitat virtutē magis q̄ꝫ flōmia venaꝝ manꝰ. ¶ Pꝛo parte itelligi dꝫ p° ꝙ notāter ſit ligatio q̄ in lr̄a ponit̄ atq3 ēt balneatio vt magis tumeat vena trahat̄ ēt magis ad eam cū ipſa nō ſit multū manifeſta. ¶ 2° nota ꝙ notāter ipſa dꝫ flōmari ꝑm lōgū vt exeat ēt liberiꝰ ſanguis ⁊ ſtet apertū foꝛamē longioꝛi t̄pe. Jō eiꝰ ſecūdatio ē difficilis ⁊ occulta: q̄ ſi nō pōt iueniri querat̄ quidā ramꝰ exñs iter mīmū digitū ⁊ ſcd̄m q̄zuis ab eo non eūet ſicut dicta vena: tñ plus facit ad diuertēdū cū ad lōgioꝛa faciat diuerſionē. ¶ Ulteriꝰ nota ꝙ flōmia ſciatice ꝯfert ī doloꝛe ſcie ꝓueniēte a mā ſanguinea aut ſibi ꝯmixta diuertēdo ⁊ ēt eūando. Jn podagra auteꝫ maxie ꝯuenit eūando dū podagra ꝓcedat a cā ſili. Jtē cōfert ēt ī varice q̄ nō aliud ē q̄ꝫ venaꝝ eminētia ſiue tumoꝛ ī tibijs: vt ꝑꝫ in tibijs poꝛtatoꝝ ⁊ ſe foꝛtiter fatigātiū pedibꝰ. Hec eniꝫ flōmia eūat māꝫ varicū aut fluxurā ad varices. Jtē ꝯfert elefantie q̄ nō ē aliud q̄ꝫ p̄ter nām magnificatio tibiaꝝ. Cōfert eiꝫ paucificādo māꝫ q̄ ē cā augmēti tibiaꝝ. ¶ Ulteriꝰ nota ꝙ flōmia ſaphene manifeſtioꝛ ē ſciatica ⁊ nō eget tali faſciatiōe q̄zuis egeat balneatiōe pedis: que flōmia. ſ. ſaphene ꝯfert mēbꝛis exñtibꝰ ſub epate euacuādo ⁊ diuertēdo: vñ ēt ꝯfert vt māe deriuent̄ a ſupioꝛibus ad īferioꝛa. Et ideo vt ipſe tāgit cōfert in pꝛouocādo menſtrua ⁊ aperiēdo emoꝛoydas trahēdo. ſ. ſanguinē verſus matricē ⁊ verſus venas emoꝛoidales. ¶ Ulteriꝰ nota ꝙ ratio ſūpta. ſ. ex parte oꝛiginis venaꝝ facit apparere flobothomias vene ſciatice ⁊ ſaphene ſilis iuuamēti: cum vt docet anothomia oꝛiant̄ ab eodē trūco circa genu: ſaphena ꝓcedēte ad partē domeſticā pedis: ſciatica vero ad ſilueſtrē. Experiētia vero facit appere flobothomiā ſciatice eē maioꝛis iuuamēti ī doloꝛibꝰ ſcie. rō tñ cōpleta ⁊ cōpleta cognitio iuuamētoꝝ haꝝ flōmiaꝝ faciūt iuuamēta apparere diſtincta. Nā q2 ſciatica ē plus diſtincta ⁊ ꝓtenſa verſus ſciā ſeu verſus p̄tē ſcie: ⁊ ſaphena nō ſic iō plus cōtingit mās ſcie fluxas aut fluxuras ad ſciā eūari ꝑ flōmiaꝫ ſciatice q̄ꝫ ſaphene. ¶ Ulterius nota ꝙ flōmia ſaphene ē melioꝛ tranſuerſe facta ⁊ latitudini attinēs cū ipa nō ſit cōiunctionalis. ¶ Ulteriꝰ nota ꝙ flōmia cōiuncture ſeu curuature poplitis foꝛtioꝛ ē in ꝓuocando mēſtrua q̄ꝫ ſaphena eo ꝙ ſit ſupꝛa ſaphenā cuꝫ ſit etiā ꝓpinquioꝛ matrici vt ē notū citius ⁊ foꝛtius poterit a ſupioꝛibꝰ ad matricē trahere ſanguinē. Silr̄ dicēdū ē de doloꝛibꝰ ani ⁊ emoꝛoidibꝰ.

¶ Ulterius nota ꝙ vena que ē retro ſupꝛa calcaneū ē q̄ſi ramus ſaphene ꝓpter ꝓpinquitatē ⁊ affinitatē quā hꝫ ad ipam. Jō oꝑat̄ tantū q2 tot cōfert diſpōibꝰ quot ſaphena: quāuis foꝛte nō tantū eūet quātū ſaphena: cū nō ſit tanta vena quāta ſaphena. ¶ Ulteriꝰ nota ꝙ flōmia ſaphene diuertit mās a ſupioꝛibꝰ declinādo ad inferioꝛa: iō eiꝰ flōmia cōfert dū māe ſupple ſanguinee aut mixte ſanguini a ſuperioꝛibꝰ declināt ad īferioꝛa. Jtē cōfert moꝛbis de ſanguīe melācolico trahēdo. ſ. ſanguinē melācolicū q2 grauē a ſuperioꝛibꝰ ad inferioꝛa. ¶ Ulteriꝰ nota ꝙ quāuis ex venis bꝛachioꝛū ⁊ manꝰ cōiter plus eūetur de ſanguīe q̄ꝫ ex venis pedū: tñ q2 ſunt cōiter latioꝛes ⁊ pluris ſanguīs ꝯtētiue: tū etiā q2 ebullitioꝛ ſanguis ē circa ſupioꝛa q̄ꝫ circa īferioꝛa: ⁊ ꝑ ꝯñs ꝓnioꝛ flōmie: tū ēt q2 ſupioꝛa ſaltē pectoꝛalia: ⁊ que ſunt circa cpar plus hñt de ſanguīe q̄ꝫ inferioꝛa. Tñ ſuppoſita ꝑitate ſanguīs eūati plus debilitat̄ virtꝰ ex flōmia venaꝝ pedū q̄ꝫ manus: vt dictū ē. p° q2 cū īferioꝛa minꝰ hēant de ſanguīe q̄ꝫ ſupioꝛa vt ē dictū: tāto eūato ſanguīe ꝑ inferioꝛa q̄ꝫto ꝑ ſupioꝛa: multū debilitat̄ virtus in īferioꝛibꝰ vt virtꝰ totius dicat̄ debilioꝛ q̄ꝫ tāto eūato ꝑ ſupioꝛa. 2ª cā eē pōt quā tangit expoſitoꝛ. Nā cū coꝛ ⁊ cetera mēbꝛa ſanguine vigeāt ⁊ ſp̄ū: cū ēt virtutis cōſtantia ⁊ debilitas maxie coꝛdis tremoꝛē cōſequant̄: iō cū ꝑ flobothomiā venaꝝ pedū plus diuertat̄ ſanguis a coꝛde q̄ꝫ per flōmiā venaꝝ manꝰ cōtingit plus debilitari coꝛ. Et ſic ex ſecūdo pꝛemiſſo plus debilitari totum.

Jn venis aūt q̄ flobothomant̄ ⁊ ſūt in parte capitis excepta guideç: meliꝰ eſt vt trāſuerſe flobothoment̄.

¶ Nunc determiat de flōmia venarū capitis. Et diuiditur ī duas. Pꝛimo p̄mittit vnū cōe flōmie venaꝝ capitis. 2° exequit̄. ibi 2ª: ⁊ eaꝝ quidē. ¶ Pꝛimo dicit ꝙ melius ē vt vene ꝑtiū capitis flōmētur trāſuerſe excepta guideç vena. ¶ Pꝛo p̄te nota ꝙ ꝑ caput ītelligit caput verū cuꝫ collo. Nā guideç vocant̄ vene ꝑtiū capitis cuꝫ tñ ſint vene colli. ¶ Scd̄o nota ꝙ iſte vene debēt flōmari trāſuerſe: q2 liberiꝰ exibit ſanguis: ⁊ q2 nō ſunt ꝯiunctionales: ꝯiunctiōalibus tñ ſimilant̄. Nā cū ſint ī collo ad motū colli flōmate ꝑm longū apient̄: iō ⁊ liberiꝰ exibit ſanguis. Et poſſumus etiā ſi expediret ſecūdationē facere: ideo bonuꝫ eſt flobothomare eas ꝑm longum.

Et eaꝝ quidē q̄dā ſūt q̄ ſunt vene ⁊ q̄dā q̄ ſunt artarie. Uene ergo ſūt ſicut vena frōtis q̄ inter duo exiſtit ſupcilia: ⁊ ipſiꝰ quidem flōmia cōfert grauitati capitis ⁊ ꝓpꝛie illi q̄ ē ī poſterioꝛe p̄te capitis ⁊ grauitati oculoꝝ ⁊ ſtupoꝛi ⁊ doloꝛi capitis ꝑſeuerāti ātiquo. Et vena q̄ ſup caput flōmat̄ ꝑꝑ emigraneā ⁊ vlcera capitꝭ. Et due vene tēpoꝝ q̄ flexuoſe icedūt ⁊ due vene q̄ ſūt ī āgulis oculoꝝ lachꝛymalibꝰ ⁊ ꝑm plurimū nō apparēt niſi per cōſtrictōeꝫ ſuffocātē. Et ī ipſis quidē flobothomꝰ nō ē ꝓfundādus: q2 foꝛtaſſe fiēt fiſtule ex percuſſiōe oſſis: ⁊ ex eis nō egrediat̄ ſanguis niſi paucꝰ. Juuamētū vero flobothomie ipſaꝝ duaꝝ exiſtit ī doloꝛe capitis ⁊ in doloꝛe emigraneo ⁊ obtalmia ātiqua ⁊ lachꝛymis ⁊ pāno ⁊ ſcabiei palpebꝛaruꝫ ⁊ earuꝫ bothoꝛ ⁊ nictilopis.

¶ Nūc exequit̄ de flōmijs eaꝝ venaꝝ: ⁊ pꝛīo de flōmia illaꝝ venarū ꝯiūctarū. 2° artariaꝝ. ibi 2ª: ex artarijs. Pꝛima ī tot quot venaꝝ capitis ponit flōmiā. ¶ De pꝛīa p̄te dicit ꝙ iſtaꝝ venaꝝ alique ſūt vene abſolute: ⁊ alique artarie. Pꝛima ē vena frōtis que ē inter duo ſupcilia ſeu īter duo cilia cuiꝰ vene flōmia ꝯfert grauitati capitis: ⁊ maxime in p̄te ſupioꝛi: ſupple diuertēdo māꝫ a poſterioꝛi p̄te verſus añrioꝛē: ⁊ ſilr̄ eūant̄. De qua flōmia hēmꝰ 5ª affo. poſterioꝛa capitis dolentia ⁊c̄. Etiā ꝯfert grauitati oculoꝛū etiā doloꝛi ꝑſeueranti ⁊ antiquo. 2ª vena ē exñs ſup caput q2 exiſtens in ſūmitate capitis aut ī ſūmitate frontis: que vt dicit Aui. flōmet̄ ꝓpter emigraneā que eſt doloꝛ medie partis cranei ab emi ꝙ ē mediū: ⁊ craneū quaſi doloꝛ medie partis capitis. Jtē cōfert vlceribꝰ capitis ꝓuenietibꝰ a mā ſanguinea aut ſibi ꝯmixta. Jtē flōmātur due vene tēpoꝝ flexuoſe aut toꝛtuoſe incedentes: quaꝝ flōmie cōferūt in p̄dictis caſibꝰ eūando ⁊ diuertēdo. Jteꝫ flōmat̄ due vene que ſunt in āgulis lachꝛymalibꝰ oculoꝝ nō apparētes ſupple niſi apud cōſtrictionē ſupple gutturis ſuffocātē. i. ñ apparētes niſi ſtringat̄ guttur q̄ſi coꝛpꝰ ſuffocet̄. Quare aūt ꝯſtrictōe gutturis appareāt notū ē cū tūc magis facies tumeat ⁊ oculi guttur ⁊ alie p̄tes faciei: ⁊ ī ipſis

non eſt

Scias ꝙ lꝫ Aui. in ſanguinea podagra ꝯmēdet flobothomiā de oppoſita parte: hꝫ tñ hanc ſuſpectam in pꝛīcipio egritudinis vt ipſe ſcribit xxijª tertij tractatu ſcd̄o capl̄o de cura eiꝰ parapho illo: Et ſi fuerit ſanguinea aut cuꝫ dominio ſanguis opoꝛtebit vt adminiſtres flobothomiā ex parte cōtraria. ⁊ paulo poſt ſubdit licet tñ melius ſit vt blande tractetur in pꝛīcipio ⁊ nō fiat flobothomia: flobothomia enim accreſcere facit humoꝛes ⁊ facit eos vrere in coꝛpus ⁊ non extrahit illud qd̄ neceſſe eſt vt extrahatur ⁊c̄.

Nota ꝙ huiuſmodi vene debēt flobothomari trāſuerſe q2 parue ſunt: vnde niſi fiat ſic flobothomia cōſolidaretur nimis cito: quare ⁊c̄

UVA. BHSC. IyR_006_1

nõ eſt ꝓfundãdus flõmus: nã forte fieret fiſtula. Cũ eiʒ ibi
ſit caro mollis ⁊ ſpõgioſa facta flõmia ſeu ꝑforatiõe ⁊ de/
currẽtibꝰ ſuꝑfluitatibꝰ cito poterit fiſtula cãri. a qbus ve/
nis nõ egredit̃ niſi ſanguis paucus q꞉ ꝑue ſũt. Addit vlte/
rius ꝙ iuuamẽtũ talis flõmie ꝯuenit ĩ dolore totiꝰ capitis
⁊ ĩ dolore medie ꝑtis ⁊ ĩ obtalmia antiq̃ ⁊ ĩ lachrymis ⁊ in
pãno ⁊ bothor ⁊ ſcabiei palpebraꝝ ſi iſta cauſant̃ a mã ſan
guinea aut eius ſuꝑfluitate. Cõfert ẽt puſtulis ꝑuulis pal/
pebraꝝ. ſ. euãndo mãs ab iſtis cuʒ iſte vene ſint ꝓpinque
palpebris. Cõuenit ẽt noctilopis: ⁊ ſũt vt ꝑʒ 3ª tertij nocti/
lopi qui de nocte meliꝰ vidẽt. de die aũt ꝓpter groſſitudi
neʒ ſpũuʒ ⁊ humoꝝ nõ valẽt vidẽ: ideo cũ hec paſſio poſ/
ſet ꝯtingere ꝓpter groſſuʒ ſanguinẽ flõmia haꝝ venarũ
hunc ſanguinẽ euacuãdo eſt conueniens.

Et tres vene parue quaꝝ locus ẽ poſt illũ vbi extre
mitas auris tãgit cũ ꝑuenit ad capillos. Et vna quideʒ
haꝝ triũ ẽ magis manifeſta q̃ flõmat̃ in p̃ricipio aque ⁊
cũ caput ſtomaci recipit fumũ: ⁊ ꝓpter hoc ꝯferũt vlce/
ribꝰ auriũ ⁊ colli ⁊ poſterioꝝ capitis. Et Gal. quidẽ ne/
gat qḋ quidã dicũt ꝙ due vene que ſũt poſt aures flobo
thomant̃: vt qui filios gignunt ipſos nõ gignãt.

¶ Nũc determĩat de flõmia aliaꝝ venaꝝ dicẽs ꝙ tres
vene parue que aliqualr̃ ſunt poſt locũ vbi auris tãgit ca/
pillos: quaꝝ triũ vna ẽ manifeſtior: flõmant̃ ĩ principio aq̃
⁊ in principio cataracte: nã añquã fiant cataracte apparẽt
primo imagines ⁊ muſce volare ante oculos: deinde fit aq̃
ſiue cataracta ponẽte ſe tali aqua ĩter albuginẽ ⁊ corneã: q̃
aquoſitas aliqualr̃ põt eleuari a mã ſanguiea. Si ergo flo/
bothomant̃ iſte vene minuẽt ſanguinem ⁊ ꝓhibebũt ipm
euaporare ſurſuʒ: iõ etiã cõferunt dũ caput recipit fumuʒ
ſtomaci maxime ꝑꝑ caput eẽ calidũ ⁊ fumoꝝ attractiuuʒ.
Ex hac eiʒ flõmia minuit̃ feruor ſanguis capitis: iõ ẽ con/
ueniens. Itẽ cõfert vlceribꝰ auriũ ⁊ colli ⁊ poſteriorũ ca/
pitis diuertẽdo ⁊ euãndo materiã ⁊ minuẽdo ebullitionẽ.
¶ Ulterius dicit Gal. negare dictũ antiquoꝝ dicentiũ
duas venas poſt aures flõmari vt homĩes fiant ſteriles: ⁊
hoc dicebat Hy. aut videbat̃ dicere ĩ libro de aqua ⁊ aere
⁊ regiõibꝰ: qḋ dictũ de ꝑ ſe ẽ falſum. naʒ ſperma nõ venit
ꝑ has venas nec etiã aliqs ſpũs. hoc tñ põt cõtingere cõ/
patiente ⁊ debilitato cerebro: q꞉ nõ debite ſpũʒ aĩalẽ trãſ/
mittit ꝓ gnãtiõe fiẽda. ¶ Ulterius dicit ꝙ ex venis capi/
tis ſunt guideç. i. vene colli: quaꝝ vna ẽ ab vna parte colli
⁊ altera ab alia: ⁊ flõmant̃ in principio lepre diuertẽdo ſan
guinẽ a ſpiritualibꝰ ⁊ nobilioribus mẽbris ad exteriora di
uertẽdo ipm ẽt a facie que pluries ⁊ priꝰ ſolebat a lepra mo
leſtari. in lepra vero cõfirmata nõ cõuenit talis euãtio cuʒ
iaʒ ſit fixa infectiõi. In forti etiã ſquinãtia: ĩ cõſtrictõe an/
helitus: in acuto aſmate q꞉ forti: ⁊ in raucedine vocis ſup/
ple ꝓpter mãm ſanguineã: ⁊ in habẽte apa ĩ pulmone. i. in
diſnia ⁊ difficultate anhelitus ex multo ſanguine ꝓcedẽte
cõuenit flobothomia haꝝ venaꝝ euãndo cãm añcedẽtem
⁊ diuertẽdo eã a fluxu: iõ maxime in principijs hoꝝ mor/
boꝝ ꝯpetit mã exñte in fluxu. nã mã exñte fluxa nõ faceret
notabile iuuamentũ. Itẽ cõuenit in morbis ſplenis ⁊ late/
rum: vbi ſupple mãe ſanguinee fluũt a ſuꝑioribus ad infe/
riora. Nã ſi fiat flõmia harũ guideç ipa euãbit mãs ſupe/
riorũ ⁊ diuertet eas a fluxu ad ꝑtes iſeriores. ¶ Ulterius
dicit Aui. ꝙ ſicut ãte dictũ ẽ neceſſe ẽ flõmare has venas
flõmo hñte pilũ. pº q꞉ ſunt vene labẽtes. 2º ne flõmꝰ pe/
netret in gutture. ¶ Ultimo Aui. tãgit modũ ligãdi iſtas
venas dicẽs ꝙ oportet trahere caput ad cõtrariũ ꝑtis flo/
bothomie vt vena extẽſa fiat vt corda. cã ẽ in ꝓmptu. Nã
facta tali extẽſione vena ipa fit eminẽtior: nã tunc gibbo/
ſat̃ iſto modo. Et dicit Auic. ꝙ debemꝰ cõſiderare partes
magis declinãtes q꞉ magis depreſſas: vt exẽplũ q꞉ plica/
cato ſic collo notũ ẽ ꝙ pars verſus caput ⁊ verſus extre/
mitates colli ẽ magis declinãs. ꝑs vero cõtraria iſtis ꝑti/
bꝰ ẽ pars magis gibboſa ĩ qua vt manifeſtior fiat flõmia.
¶ Dicit vlterius ꝙ neceſſe ẽ vt fiat flõmia ẜm latũ ⁊ non
ẜm longũ. qḋ ẽ veruʒ vbi nõ querimus ſedationẽ ⁊ multi
ſanguinis eductionẽ. Nã ſi hoc querẽmꝰ fiẽda eẽt ẜʒ lon/
guʒ: ad quã intẽtõʒ ſe retulit Aui. ĩ illa parte: in venis ãt.
Item ad hanc intentionẽ ſe refert in fine partis: duʒ dicit
ꝙ cũ hoc toto oʒ vt fiat flõmia ẜm longum.

Et ex venis iſtis ſũt guideç q̃ ſunt due ⁊ minuunt̃ in
p̃ricipio lepre ⁊ fortis ſquinãtie ⁊ coanguſtatõe anhelitꝰ
⁊ aſmate acuto ⁊ raucedine vocis. Et in hñte apa ĩ pul
mone ⁊ diſnia q̃ ẽ ex multo ſanguie calido ⁊ egritudini/
bꝰ ſplenis ⁊ lateꝝ: ⁊ oʒ vt diximꝰ ante vt flobothomo pi
luʒ hñte minuant̃. Modus vero ligãdi eas ẽ ꝙ oʒ tra/
here caput ad ꝯtrariũ partis flõmie vt vena extẽdẽdo
fiat ſicut corda: ⁊ ꝯſideret̃ que pars ſit magis declinãs ⁊
fiat flõmia ex ꝯtrario partis illiꝰ. Opʒ p̃terea vt eiꝰ flo/
bothomia fiat in latitudie ⁊ nõ in lõgitudine: ⁊ ſicut fit
in ſaphena ⁊ ſciatica: ⁊ cũ hoc toto opʒ vt ipſius flõmia

Scias duplex eẽ
aque p̃ricipiũ remo/
tũ. ſ. ſeu p̃ricipiãs qñ
aqua ĩcipit fluere ad
oculũ ⁊ tũc apparẽt
imaginatões. Aliud
eſt ꝓpinquũ qñ. ſ. aq̃
iaʒ ẽ in oculo: ſʒ non
eſt ꝯgelata nec igroſ
ſata vt quaſi non ap/
parcat notabilis al/
bedo in pupilla. Aq̃
igit̃ qñ ẽ in p̃rĩo p̃rin
cipio põt cũ medici
nis curari ⁊ maxime
cuʒ flobothomia ta/
lis vene: ⁊ ḋ hoc p̃ri
cipio loqt̃ hic Aui.
cũ vero aqua ẽ igroſ
ſata ⁊ fluxit qḋ debʒ
fluere: tũc dicit̃ ꝯfir/
mata ⁊ cura eiꝰ nõ ẽ
niſi cũ inſtrumẽto: vt
vult Aui. tertia tertij
tractatu quarto. c. xx.
de cura aque para/
pho illo circa p̃rici/
piũ: Illi autẽ que cõ
firmata eſt ⁊c̃. cuius
ratio põt eẽ: q꞉ aqua
cõfirmata ẽ difficilis
diſſolutiõis de ſe ꝓ/
pter eius groſſitiẽ ⁊
mẽbri frigiditateʒ in
quo ẽ. ſ. oculus non
potẽs reſoluere illaʒ
etiã q꞉ ẽ coopertꝰ tu
nicis duris ⁊ multũ
ſpiſſis: quare ꝯuenit
iſtrumẽtũ ſicut acus
⁊c̃.

cadat ĩ lõgitudine. Et ex eis eſt vena q̃ ẽ in lepore cuius
flõmie locus ẽ ipſiꝰ extremitas que digito p̃ſſa ĩ duo par
tit̃: vbi quidẽ fit flõmia: ſʒ ſanguis qui ĩde egredit̃ ẽ pau
cus: ⁊ ipſiꝰ quideʒ flõmia ꝯfert calips ⁊ turbatõi oculoꝝ
⁊ emoroidibꝰ ⁊ bothor que in naribꝰ naſcunt̃ ⁊ prurituı
qui fit ĩ eis: verũtñ plerũqʒ accidit ex eo coloris rubedo
perſeuerãs que ſimilat̃ ſafaf ⁊ corrũpit faciẽ: ⁊ eſt ipſius
ĩpedimeutũ maius ſuo iuuamẽto. Et vene quidẽ q̃ ſũt
ſub aſeſe a parte nocre quarum flõmia ꝯfert egritudini
oculoꝝ antique que ẽ ex ſanguie ſubtili ⁊ antiquis capi/
tis doloribꝰ. Et ex eis ſunt vene que ſũt in labijs ⁊ ſunt
quattuor: ⁊ ſuper vnũquodqʒ eoꝝ exiſtit par que confe
rũt vlceribꝰ oris ⁊ alcola ⁊ doloribꝰ gingiuaꝝ ⁊ eaꝝ apo
ſtematibꝰ ⁊ ipſaꝝ laxitati ⁊ vlcerlbꝰ ⁊ fiſtulis ⁊ fixuris q̃
ſunt ĩ eis. Et ex eis ẽ vena q̃ eſt ſub lingua ſuper occultũ
mẽti que minuit̃ in ſquinãtijs ⁊ apatibꝰ duaꝝ amigda/
laꝝ. Et ex eis ſũt vene que ſũt ſub lingua ⁊ exiſtẽtes ſu/
per ipſaʒ linguã ⁊ minuunt̃ ꝓpter lingue grauitatẽ que
eſt ex ſanguine: que quidẽ in lõgitudine ſunt minuẽde
q꞉ ſanguinẽ ꝯſtrigere qui fluxit ex flõmia ĩ latitudine fa
cta eſt difficile. Et ex eis eſt vena alanfuta que iter men
tum ⁊ labiũ eſt inferius que flobothomat̃ ꝓpter oris
fetorem. Et ex eis eſt vena furcule que flobothomat̃ in
medicatõibus oris ſtomaci.

Nunc notificat flõmiã aliaꝝ venaꝝ dicens ꝙ ex venis
capitis ẽ vena exñs in lepore naſi: ⁊ eſt naſi extremitas que
cõpreſſa digito diuidit̃ ĩ duo: ĩ quo loco fit flõmia ſangui/
ne inde egrediẽte pauco: que flõmia cõfert turbationi ⁊ ca
lefactiõi oculoruʒ ⁊ emoroidibus ⁊ puſtulis naſi ⁊ pruritui
nariũ: tñ pluries ex tali flõmia accidit rubedo ſupple ĩ facie
ꝑſeuerans q̃ ſimilat̃ corruptiõi coloris ⁊ corrũpit colorẽ. i.
faciem: vel corrũpit faciẽ. i. colorẽ faciei: qḋ nocumẽtũ eſt
maius iuuamẽto. ¶ Dicit vlterius ꝙ vene que nõ ſunt a
poſteriori parte nuche: quaꝝ flõmia ꝯfert antiquo morbo
oculoꝝ ex ſanguine ſubtili ꝓcedente: cõferũt etiã ſi flobo/
thoment̃ doloribus ãtiquis capitis ſupple ꝓcedẽtibus a
mã ſanguinea. ¶ Ulterius dicit ꝙ etiã ſunt vene quattu
or labioꝝ: ita ꝙ in vnoquoqʒ labio ſunt due vene: quaruʒ
flõmia cõfert vlceribꝰ oris ⁊ gingiuaꝝ doloribꝰ ⁊ apatibꝰ
⁊ laſſitudini ipaꝝ ac vlceribꝰ fiſtulis ⁊ fixuris ipaꝝ. ¶ Ul
terius dicit ꝙ ex iſtis venis ẽ vna que eſt ſub lingua ſupra
occultũ mẽti que flõmat̃ ĩ ſquinãtijs ⁊ in apatibus duaꝝ
amigdalaꝝ. ¶ Ulterius dicit ꝙ ſunt quedã vene exñtes
ſuper linguã flõmande ꝓpter grauitatẽ lingue ex ſanguĩe
ꝓcedẽte. flõmande etiã ꝑ longũ q꞉ difficile ẽ cõſtringere
ſanguinẽ his flobothomijs ẜm latũ: hic tñ alia differẽtia
reperit̃ vt dicã ĩ notãdis. ¶ Dicit penultimo ꝙ ex iſtis ve
nis ẽ vena exñs ĩter labiũ inferiꝰ ⁊ mentũ que flõmantur
ꝓpter fetorẽ oris remouẽdũ. ¶ Ultimo dicit ꝙ ex iſtis ve
nis ẽ vena furcule que flõmat̃ ꝑꝑ mederi ſtomaco. ¶ No
ta ꝓ partibꝰ ꝑlectis ꝙ q꞉ vena exñs in lepore naſi ẽ parua:
iõ ab ipa etiã paucus exit ſanguis cuius flõmia cõfert cale
factioni. i. ĩfectiõi naſi euãndo cãm cõiunctã: turbatiõi ẽt
oculoꝝ ꝓueniẽti ex ſanguĩe aut ſuis vaporibꝰ diuertẽdo
ab oculis ⁊ euãndo. Cõfert ẽt paſſiõibꝰ nariũ ex ſanguine
ꝓueniẽtibꝰ euãndo cãm cõiunctã: aut dictarũ paſſionum
ãtecedentẽ cãm. Ex ipa tñ aliqñ ꝓuenit rubedo ꝑſeuerans
ſimilata ſafaf ſeu ſafati. i. rubori puſtuloſo faciei: ⁊ hoc eſt
ꝙ corpus plenum ẽ ⁊ nõ p̃ceſſerũt alique fortes diuerſiue
euãtiões: hoc aũt infert nocumẽtũ plus attrahẽdo de ſan
guine ad faciẽ q̃ʒ diuertat aut euẽt cũ ſit vena valde ꝑua:
⁊ nocumẽtũ in iſto cãu ẽ maius iuuamẽto. ¶ Nota vlteriꝰ
ꝙ ꝑ venas que ſunt ſub alſaſe: que ſunt vene a ꝑte poſte/
riori nuche intelligit venas que ſunt aliqualr̃ ĩfra locũ vbi
collũ cõiungit̃ capiti: quaꝝ flõmia cõfert morbo antiquo
oculoꝝ ex ſanguine ſubtili ꝓcedẽte diuertẽdo ſanguineʒ
ſubtilẽ ne trãſeat ad oculos: qui ſanguis ſubtilis ꝓpter cõ
tinuã renouationẽ ⁊ fluxum antiquũ põt cãre morbũ: ſilr̃
dicẽdũ de ãtiquis doloribꝰ capitis. ¶ Ulteriꝰ nota ꝙ flo
bothomia venaꝝ labioꝝ dictis diſpõnibꝰ ꝯuenit euãndo
⁊ diuertẽdo a partibꝰ ꝓpinquis: ⁊ ſilr̃ exiſtẽs ſub lĩgua ſu
pra occultũ menti ĩtelligẽdo per occultũ menti ſi volumꝰ
parteʒ ĩtrinſecã aut partẽ q̃ eſt ĩtra guttur ⁊ partẽ exterio
reʒ mẽti: q̃ vena apparet ſubleuata plicata lĩgua. Ualet ẽt
flõmia eiꝰ in ſquinãtia diuertẽdo ⁊ euãndo ſanguinẽ pec/
cantẽ p̃cedẽte ſemꝑ flõmia vniuerſali de vena cephalica.
Apãtibꝰ ẽt duaꝝ amigdalaꝝ magis eſt ꝯpetens tanq̃ʒ po
tẽs magis ⁊ citius euãre a parte ꝓpiquiori. ¶ Ulteriꝰ no
ta ꝙ vene ſupra linguã exiſtẽtes faciũt iuuamẽta q̃ ponũ/
tur in littera ꝯiunctã lingue educẽdo mãʒ: quaꝝ flõmia ẜʒ
longũ ⁊ non ẜm latũ eſt fiẽda: q꞉ ꝓpter plicationẽ lĩgue fa
ctã ẜm latũ multũ apit̃ vena vt inde multꝰ exeat ſanguis:
vt vidit magiſter Marſi. in experiẽtia. ¶ Nota ꝙ flõmia
illiꝰ vene q̃ eſt ĩter labiũ ⁊ mentũ ꝯuenit fetori oris ꝯtigẽti

UVA. BHSC. IyR_006_1

ꝓpter ſanguinē corruptū gingiuaꝝ eūando.ſ.ſanguinē illuꝫ ⁊ diuertēdo a partib⁹ illis: fetori vero prouenienti a ſtomaco non cōfert. ¶ Ulteri⁹ nota ꝙ flobothomia vene furcule ꝯfert pro medicādo os ſtomaci ſupple leſuꝫ ꝓpter defluxuꝫ ſanguīs ad ipſuꝫ. Nā flobothomia talis ꝓpter ꝓpinquitateꝫ euacuat ⁊ diuertit quāuis non ſit in vſu.

Ex artarijs vero q̄ ſunt ī capite ē artaria tēporis q̄ qn̄qꝫ flobothomat̃ ⁊ qn̄qꝫ incidit̃ ⁊ qn̄qꝫ extrahit̃ ⁊ qn̄qꝫ adurit̃: ⁊ hoc fit ꝓpterea vt acuti rheumatiſmi ⁊ ſubtiles ꝯſtringant̃ qui ad oculos deſcēdunt ⁊ ꝓpter āplificatōis principiū. Et due artarie que ſūt poſt aures que flobothomant̃ ꝓpter ſpecies obtalmie ⁊ pricipiū aque ⁊ pannū ⁊ nictilopas ⁊ antiquū dolorē capitis: in eaꝝ tn̄ flōmia ſemꝑ exiſtit timor ⁊ cū hoc tardetur cōſolidatio. Gal. quoqꝫ dixit ꝙ cuiuſdā in gula vulnerati artariam ꝑcuſſio parūper tetigit: ex aqua magna ſanguis ꝑs manauit: ſed Galien⁹ ei ſubuenit cū medicamēto thuris ⁊ aloes ⁊ ſanguinis draconis ⁊ myrrhe: ⁊ reſtrict⁹ fuit ſanguis: ⁊ dolor antiquus quē in exteriore parte coxe poſterius ꝯſueuerat habere receſſit.

¶ Nunc Aui. exequit̃ de flōmia artariaꝝ capitis: ⁊ dicit ꝙ ex artarijs capitis eſt artaria tēpoꝝ que qn̄qꝫ flobothomat̃: qn̄qꝫ incidit̃: qn̄qꝫ extrahit̃ ⁊ qn̄qꝫ adurit̃: ⁊ hoc fit iō vt ꝯſtringant̃ rheumatiſmi acuti ⁊ ſubtiles defluentes ad oculū ⁊ ēt ꝑꝑ p̄cipiū amplificatōis pupille. ¶ Nota ꝓ parte ꝙ ſm̄ medici diſtictas ītentōes hec oꝑatio quadrupl̄r fit. Nā p° vbi querim⁹ eūare ⁊ diuertere ſatis ſufficit flōmia. Ubi aūt plus querim⁹ ꝓhibere defluxū: incidimus ex trāſuerſo artariaꝫ cū flobothomo aut ipſaꝫ cuꝫ vncino ſubleuādo. Qn̄qꝫ ēt querētes vt tēpora ⁊ partes ꝓpinque oculis minori participēt ſanguīe ⁊ calefactōe extrahim⁹ partē artarie excarnādo ipſaꝫ ligādo ī duob⁹ locis ⁊ auferēdo partē īermediā. Aut 4° adurimus apponēdo aliqd cauſticum ſupra artariā vt ēt ꝓhibeat̃ defluxus humoꝝ ad locū: tutior tn̄ modus eſt per ſolā flōmiā. ¶ Ulterius nota ꝙ cū rōne īciſiōis artariaꝝ maxīe ſūt apti fluere humores ſubtiles ⁊ acuti: ideo vocat̃ talis oꝑatio in artaria grande īferens nocumētū. Jtē ꝯfert in p̄cipio amplificatōis aut dilatatiōis pupille diuertēdo mās dilatātes. ¶ Scd̄o dicit Aui. ꝙ due ēt artarie q̄ ſunt poſt aures flobothomant̃ ꝓpter ſpēs obtalmie ꝑꝑ p̄cipiū aque pāni ⁊ noctilope ⁊ ꝑꝑ ātiquū dolorē capitis qd̄ ſupple efficit hec flōmia diuertēdo ⁊ eūando mās: in quaꝝ flōmia ſemꝑ extat timor cū tardet̃ ꝯſolidatio ⁊ timeat̃ de nimio fluxu ſanguīs. Dixit tn̄ Gal. ꝙ cuiuſdā vulnerati in gula vulneratio modicū tetigit artariā ex qua fluxit magna ꝑs ſanguinis: cui ſubuenit medicamē factū ex aloe ⁊ ſanguīe draconis: ⁊ dolor antiqu⁹ quē ꝯſueuerat hēre in parte exteriori coxe ſanat⁹ ē: hoc aūt ſumit̃ a Gal. de flōmia noue trāſlatōis. Cā vero ſanatōis doloris coxe fuit q2 ꝯtīgens erat a ꝑtib⁹ ſuꝑiorib⁹ trāſire ſanguinē ad coxā: vn̄ diuerſo ſanguīe ꝑ ꝑcuſſionē artarie gule ꝯſequuta ē remotio doloris.

Et ex venis que in corpore flobothomant̃ ſunt due vene ſuper ventrē: quaꝝ vna ſuper epar cōſiſtit ⁊ altera ſuper ſplenē eſt poſita: ⁊ flobothomat̃ dextra ī idropiſi ⁊ ſiniſtra in egritudinib⁹ ſplenis.

¶ Nunc determīat de flōmia venarū vētris dicēs ꝙ ex venis que ī vētre ſeu corꝑe flōmant̃ ſūt due vene. Una poſita ſupra epar: alia poſita ſupra ſplenē. Et ſunt iſte vene ēt ſupra muſcl̄os vētris. Una ī directo epatis: alia ī directo ſplenis. Et flōmat̃ dextra ī idropiſi ſupple cōtigēte ꝓpter multā retētionē ſanguīs ſupra epar: hec eīm ꝓpinqua epati eūabit ab ipō. Alia vero flōmant̃ in morbis ſpenis: q2 ī oppilatiōib⁹ ēt cātis ꝓpter retentum ſanguinem.

Scito p̄terea ꝙ flōmia duas hꝫ horas: horā electaꝫ ⁊ horā neceſſariā. Hora vero electa eſt ei⁹ q̄ eſt in lumīe diei ⁊ poſt digeſtionis ꝯplementū ⁊ ſuꝑfluitatuꝫ expulſionē: ⁊ hora neceſſaria eſt hora q̄ fieri oꝫ ⁊ que tardari nō pōt ⁊ in qua res ꝓhibitoria nō attendit̃.

¶ Nunc Aui. tāgit horas flōmie: dicēs flōmiā duas habere horas: electiuā.ſ. ⁊ neceſſariā. Electiua ē vt fiat flobothomia ī lumīe diei ⁊ poſt cōpletā digōneꝫ ⁊ expulſis oīb⁹ ſuꝑfluitatib⁹. Hora vero neceſſaria ē hora qua flōmia nō pōt tardari: nec attēdim⁹ ad rē ꝓhibentē flōmiā. ¶ Nota ꝓ parte ꝙ illa hora vocat̃ electiua que ē apta eligi cū iuuamētis ⁊ nō exn̄te nocumēto notabili: ī qua ēt nō ſunt ꝓhibentia ſaltē notabilr̄ vt ꝙ fiat flōmia in die: alijs etiam cōditiōbus obſeruatis limitata de quib⁹ ſupra ē habituꝫ. Jlla aūt flōmia vocat̃ neceſſaria ⁊ coacta que fit ī alia hora neceſſario: q2 flōmia nō pōt tardari ꝓpter eminēs periculū q̄uis multa ſint ꝓhibētia ⁊ notabile inde ſequat̃ nocumentū. Exēpli cā īmediate poſt cibū ⁊ ēt an̄ expulſiōem ſuꝑfluitatū ſi fiat flōmia nocet corꝑi. facta tn̄ ꝑcuſſiōe aut cāu volētes euitare aduētū aꝑatuꝫ facimus flōmiam.

Scias ēt ꝙ flobothom⁹ obtuſus ē magno īpedimēto qm̄ errat ⁊ non ꝯſequit̃.ſ. qd̄ dꝫ ⁊ apoſtemare facit ⁊ dolere. Cū ergo flobothomo oꝑabis: nō manu p̄mēdo īpellas: ſꝫ ſuauiter blādiendo: ⁊ ēt furtiꝫ agas vt flobomi extremitas ad īteriora vene ꝑueniat: qm̄ ſi illud duriter feceris ſepe caput flobothomi intus ī vena occulta rūpet̃ fractura ⁊ facit vt vena refugiat ⁊ nō vulnerabit venā. Et ſi ꝑfidioſe īſtiteris vt cū eo flobothomes augmētabis maliciā: quapropter expiri d̄bes qual̄r flōmus īgrediat̃ cutē anteq̄ꝫ cū eo flobothomes ⁊ cū percuſſioneꝫ ſecūdare volueris ſi tibi neceſſariuꝫ fuerit.

¶ Nunc exequit̃ cañ. attēdēdos circa īſtrumētū quo fit flōmia. Et p2io facit hoc. 2° ex accidēti ponit duos. ibi 2ª: ⁊ ſcito. P2ia ꝑs breuiter cōtinet tot ꝑtes quot cañ. ponit circa hāc oꝑatōeꝫ manualē. P2io ponit cañ. ex ꝑte flōmi dicēs ꝙ flōmus obtuſus. i. male acut⁹ ē magni impedimēti ſiue pūgat venā ſiue nō. nā dolorem facit ⁊ facit aꝑare. ¶ Un̄ nota ſi flōmus ē obtuſus: nō ita pōt penetrare venam ſicut acut⁹: ⁊ iō nō ita ꝯtīgit errare cū acuto ſicut cū obtuſo: ⁊ ſi hō nō erret adhuc cū illo q2 difficulter pungit faciēdo magnū foramē facit dolere ⁊ aꝑare currētib⁹ humorib⁹. ¶ Ulteri⁹ dicit ꝙ cū flōmas nō debes īpellere flobothmū īp2imēdo ſꝫ ſuauiter blādiēdo: ⁊ ſcriatiꝫ agas ſic ꝙ extremitas flōmi ad interiora ꝑueniat vene vt ſupple libere exeat ſanguis. Nā ſi duriter īp2imas ſepe caput flobothomi occulta fractura frāget̃ eo qd̄ caput flōmi ē multum ſubtile ⁊ multū frāgibile cito. Jtē ex tali īp2eſſiōe fugit vena: vn̄ nō percuties ipam. i. malitioſe: quia volēs te oñdere hēre bonū īſtrumētū inſtiteris flōmie: ⁊ cuꝫ flōmo obtuſo augebis malitiā.ſ. aꝑatis dolorē ⁊c̄. Jō antequaꝫ flōmes debes exꝑiri qūo flōmus īgrediat̃ cutē. Et eodem mō debes facere ſi vis facē ſcd̄aꝫ flōmiā ſi ſit neceſſaria. Nā ex p2ia flōmia pōt caput flōmi eſſe plicatū aut factum obtuſuꝫ: iō facta p2ia flōmia videas qūo ſtat caput flōmi.

Tibi p̄terea cauere debes ne venā īpleas ⁊ ſanguineꝫ infles: qm̄ tūc lapſus ⁊ remotio min⁹ erunt.

¶ Nunc Aui. ponit aliū cañ. dicēs ꝙ tibi cauere debes ne impleas venā ſanguīe ⁊ īflet: nā tunc lapſus ⁊ remotio erit minus. Hec ꝑs pōt duob⁹ modis exponi. Nā p2io eſt aliqn̄ ꝙ vena multū reſiſtit ne flōmus īpaꝫ pungat. Dicit ergo ꝙ tu debes tibi cauere ne infles valde venā. nā quāuis aliquis tumor vene iuuet: mult⁹ tn̄ tumor ⁊ multa inflatio facit venā eē labilē: iō lapſus ⁊ remotio. i. p̄ſſio vene eēt minor: q2 qn̄ ꝑcutit̃ vena cū flōmo: vena labit̃ aliquantulū a ſuꝑiori ad īferius ⁊ aliquātulū remouet̃: tūc iſte lapſus ⁊ iſta preſſio ſi vena moderate tumeret eſſet minor q̄ꝫ debēt. ¶ 2° ſic exponit̃: ſi nō īflet̃ vena tn̄ lapſus: q2 remotio vene ſupple a ſuo ſitu erit minor. p̄ª expō melior ē.

Cūqꝫ vena tibi rebellauerit vel occultauerit ⁊ ipſi⁹ repletio ſub ligatura nō apparuerit ſolue ipſaꝫ ⁊ multotiens liga ⁊ inunge eam ⁊ cōp2imēdo deſcende ⁊ aſcēde donec eaꝫ manifeſtare ⁊ apparere facias. Et hoc quidem experieris cuꝫ duobus digitis vnūquēqꝫ locorum tangens in quibus ſcis venaꝫ extēdi: ⁊ quādoqꝫ tāgens vtriſqꝫ ⁊ quādoqꝫ vno ipſoꝝ: ⁊ cuꝫ altero facies ſanguineꝫ incedere donec altero cadēte ipſius ſentias ſanguinis acceſſionē cum ad ipſuꝫ perducit̃ ſanguis ⁊ eius receſſioneꝫ cum dimittitur.

¶ Ponit aliū cañ. dicēs ꝙ cū vena tibi rebellauerit.ſ. ī ꝑcutiēdo: q2 retropellat flōmū vel ſe occultauerit dū ꝑcutis q2 labit̃: aut nō apparuerit repletio ſub ligatura mltotiēs liga ⁊ iunge eaꝫ p̄mēdo ⁊ aſcēdēdo ⁊ deſcēdendo donec facias eā appere: q2 fricādo. Ex tali eīm fricatōe ⁊ vnctiōe ꝯſequit̃ impulſio ſanguīs ī venā: ⁊ quedā rarificatio ⁊ tumor vene. Et hoc pōt exꝑiri cū duob⁹ digitis tāgēdo ſic. i. quādoqꝫ cū vno faciēdo deſcēdere ſanguinē cū altero: vt ēt vno digito ꝑcipias acceſſuꝫ ⁊ receſſuꝫ ſanguinis.

Et ſcito ꝙ caput flobothomi habet ſpacium in quo penetrat: qd̄ tamē nō eſt longū ne ad artariam aut neruum penetret: ⁊ ipſum quidē plurimū impellere debes cum vena fuerit magis ſubtilis. Oportet autē vt flobothomi app2ehēſio fiat pollice ⁊ impudico ⁊ dimittat̃ index ad palpādū ⁊ vt in medio ferri fiat app2ehēſio pollice ⁊ nō app2ehendat̃ ſuperius quoniā nō bene tenebitur īmo erit vacillans.

¶ Ponit aliū cañ. dicens te ſciturū caput flōmi habere ſpatiū quo penetret: qd̄ tamē nō dꝫ eē lōgū ne ꝑcutiat artariā.ſ. exn̄tē ſub vena: aut ne penetret neruū. vena tamē exn̄te ſubtili ⁊ magna dꝫ fieri magna penetratio. Opꝫ aūt vt flōmus app2ehēdat̃ digitis pollice ⁊ īpudico: ⁊ dimittat̃ index ad palpādū ⁊ app2ehēdat̃ flōmus in medio ferri ⁊ nō app2ehēdat̃ ſuꝑius: q2 nō teneret̃ bn̄ firmiter ⁊ vacillaret

UVA. BHSC. IyR_006_1

laret in ꝑcuſſiōe. Et pᷓo oꝫ apphēdi iſtis duobꝰ digitis vt primo iſte idex remaneat ad palpādū venā: ſi bn̄ tumet bene ſtat: ⁊ tenebit etiam firmiter cum iſtis duobus digitis quos tibi dixi.

Cūqꝫ vena remouēdo ſe ad partē vnā mutabit: oppones ei ligaturā ⁊ ſtricturā ecōtrario partis illius: ⁊ cuꝫ remouēdo ſe ad duas partes equaliter mutabit nō debebis eaꝫ in lōgitudine flobothomare.

¶ Nunc ponit alios can̄. dicēs ꝙ cū vena mouerit ſe ad vnā partē debes ponere ligaturā ⁊ ſtricturā ad aliā ꝑtem ꝯtrariā: ⁊ ſi ſit mobilis ſm vtrāqꝫ ꝑtē flōma ſm latuꝫ. Cā eſt quia tunc non ſequitur tanta leſio ex mobilitate.

Et ſcito ꝙ oꝫ vt ſtrictio ⁊ ꝯpreſſio ſint ſm quātitatē diſpoſitōis cutis in duritie ſui ⁊ groſſitie ⁊ in multitudīe carnis ⁊ abūdantia: ⁊ opꝫ vt etiā ligatura ſit propīqua. Cūqꝫ ligatura venā occultauerit fac ſignū ſuper eam ⁊ caue tibi ne a ſigni rectitudīe remoueat cū ligaturā facies: ⁊ cū hoc toto īpelle flobothomū. Cū aūt vene declinatio ⁊ ipſiꝰ eleuatio tibi rebelles extiterit: finde locū qui eſt ſuper eā in corporibꝰ macris ꝓprie ⁊ cū vncino operare. Caſus preterea ligatōis ⁊ conſtrictiōis in iunctura prohibet venaꝝ impletionē. Cūqꝫ volueris lauare digito tuo tende cuteꝫ vt a rectitudine remoueat foraminis: deinde laua ⁊ exicca ⁊ pone pānuꝫ eminentiā hn̄teꝫ ⁊ dimitte cutē vt ad locū ſuū redeat. Et ſcito ꝙ qui multuꝫ ſudat cauſa repletōis: eſt flobothomia īdigēs: ⁊ multotiēs etiā habēti febreꝫ ⁊ habenti dolorē capitis qui ex ꝯſilio flobothomia eēt medicādus ſuperuenit fluxus vētris naturalr̄ qui flobothomiā excuſat.

¶ Ponit modū ligature dicēs ꝙ cōſtrictio ⁊ etiā ꝯpreſſio. ſ. dū ligas ſint ſm quātitatē cutis ī duritie: groſſitie: multitudīe ⁊ abūdantia carnis: neceſſe ē etiam vt ligatura ſit ꝓpinqua loco flōmando: qꝛ ex ligatura fit tumor in ꝑte ꝓpiqua ⁊ ſic manifeſtatio vene. Et ſi ligatura occultet venā qꝛ eā nimis ſubmergat fac ſignū ſupra venā vt d̾ iclauſtro vel alio aut alio colore. Facta ligatura noli recedere in flōmādo a ſigno facto: īmo ī illo ſigno īpelle flōmū. Si vero depſſio ⁊ eleuatio vene fuerit tibi rebelles qꝛ ꝓpter depreſſionē nimis occultet: ⁊ ꝓpter eleuationē fiat vena mobilis ſcinde cutē ſupra venā exn̄teꝫ: ⁊ ꝓprie in corꝑibꝰ macris in quibꝰ non ē timor de nimia ſciſſura carnis: ⁊ cape tūc venā cū vncino deinde flōma. ¶ Deinde dicit ꝙ caſus ligatiōis ⁊ cōſtrictionis in iunctura ꝓhibet venaꝝ impletionē: qꝛ cū cōſtringat ī loco deprehēſo ꝓhibet ne ſanguis trāſeat ad venā. ¶ Penultimo dicit ꝙ cū volueris lauare. ſ. poſt flōmiā extēde cū digito cutē vt cutis remoueat a foramīe vene vt ſupple liquor n̄ trāſeat ad foramē: deinde laua ⁊ exicca ⁊ poſtpone pānū hn̄tē eminētiā: ⁊ fac cutē reuerti ad ſuū locuꝫ vt ſupple ēt occurrat cutis foramini vene ne fiat emporiſma. ¶ Ultimo dicit ꝙ qui multū ſudat cā ſubtilis repletiōis ē egēs flōmia ſuppoſito ꝙ n̄ ſudet a cā exteriori: qꝛ vel curſu aut pānis ⁊c. vel ꝙ nō ſudet ꝓpter nimiā repletionē cibi aut potus: vel tertio ꝙ nō ſudet ꝓpter debilitatē cōtentiue virtutis ſicut hn̄tes ſudorē diaforeticū. i. reſolutiuū ſed ſudet ꝓpter pn̄tiā multoꝝ humoꝝ ⁊ maxime ſanguis ī venis. Etiā dicit Aui. ꝙ multotiēs hn̄ti febrē ⁊ dolorē capitis qui ex conſilio ſupple recto eēt flōmandus ſi ei ſuꝑuenit nāliter fluxus vētris excuſat a flōmia. Cōſimile ponit vt allegatū ē ioᵃ tertij tractatu 5°. c. 2° de cura ꝑleureſis. Hoc eē pōt qꝛ mās humorales debitas eūari cū ſanguīe ꝑ flōmiā nā eūat ꝑ fluxū ventris. Et eūatis ſuꝑfluitatibus nām aggrauātibꝰ nā fit potens ſupra reſiduū ⁊ nō indigemus flōmia.

Pōt quoqꝫ ſolutio vētris excuſare a flobothomia ex eo ꝙ ſanguis pōt ꝯuerti ſeu corrumpi ī humores melācolicos ⁊ flegmaticos q eūacuant per fluxū ventris: quare ⁊c.

¶ Caplm̄ de flōmia ſꝫ expoſioneꝫ Ugonis nuper ſiuētā.

Flobothomia eſt eūatio vniuerſalis q̄ multitudinē eūat. Multitudo aūt eſt augmētuꝫ humoꝝ ſuper equalitatē ipſoꝝ ī venis.

¶ Cū prius Aui. poſuerat regulas circa curā male ꝯplōnis cū mā ꝑ eūationē cū farmaco q̄d rōne ꝓprietatis ⁊ qualitatis eūat ⁊ de annexis: hic ponit ꝯn̄ter regulas circa modos eūationū: que nō fiūt ratiōe qualitatis eūantis: aut inſtrumēti ī quo fit eūatio nec eūat eligēdo. Et diuidit ī duas ꝑtes. Et qꝛ tales eūatiōes qn̄qꝫ fiūt per aꝑitionē venaꝝ: qn̄qꝫ autē alio mō ſolutiuo ſolōne cōtinuitatis: que ē aut ꝓpter ſcarificationē cū ventoſis: aut ꝑꝑ aīalia mordētia ſicut ſanguiſugas. Jō Aui. pᵒ ponit can̄. obſeruādos ī eūatōe cū flōmia. 2° cū vētoſis ⁊ ſanguiſugis. 2ᵃ ibi: ventoſe. Tn̄ ſi dicat ꝙ cū flōmia fit eūatio vl̄is magis q̄ꝫ cū farmaco: q̄re nō determinat priꝰ de flōmia q̄ꝫ de vſu farmacoꝝ? Dicit a magiſtris ꝙ nō īcōuenieter ꝙ hic de modis eūationū determinat ꝑ q̄ꝫto per illos curat mala cōplō. Et qꝛ facilius accidit mala cōplexio a peccato in quali ſpāli cui plurimū d̄bet eūatio cū farmaco: iō ab illo mō eūandi priꝰ incepit. Diuidit autem pn̄s caplꝫ in quattuor ꝑtes. In pᷓa ꝑte poſita deſcriptōe flobothomie ponit can̄. ī vſu eius rōne diſpōnis corporis ⁊ humoꝝ qui ſūt eūandi. 2° ponit can̄. ī vſu eius ratiōe loci a quo faciēda ē eūatio ⁊ per quē locū. 3° ponit regulas ī vſu flōmie rōe tꝑis. 4° rōne īſtrumēti cū quo fit flōmia. 2ᵃ ibi: ⁊ d̄bes ſcire. 3ᵃ ibi: ⁊ ſcito preterea. 4ᵃ ibi: ſcias etiā. Prima diuidit in tres ꝑtes. Pᷓo ponit deſcriptiōeꝫ flobothomie. 2° corpora prepata ⁊ quibꝰ flōmia ꝯueniat enumerat. 3° dat can̄. in vſu eius. 2ᵃ ibi: ⁊ nemo. 3ᵃ ibi: ⁊ debes ſcire. Prima in duo. Pᷓo deſcribit flōmiā. 2° exponit vnū mēbrū deſcriptiōis ſupraſcripte. 2ᵃ ibi: multitudo vero. ¶ Dicit ergo pᷓo ꝙ flōmia ē eūatio vniuerſalis que eūat multitudinē: ⁊ ī 2ᵃ ꝑte dicit multitudo ē augmētum hūoꝝ in venis ſuꝑ equalitatē. ¶ Ubi nota pᷓo ꝙ q̄dā dicūt hāc eē deſcriptionē flōmie ſm ꝙ ipa locat ſub organo mediciāli. Sꝫ cū d̄ſcribit eū locat ī manuali oꝑatōe dicit ꝙ eſt recte vene īciſio: vt dicit ꝯmētator ī libro ſecretoꝝ. Ego aūt puto ꝙ hec n̄ ſit vera diffinitio: qꝛ n̄ cōuertit cū diffinito. Eūatio eiꝫ q̄ fit ꝑ exercitiū ⁊ balneū ⁊ abſtinētiaꝫ ſūt eūones vl̄es eūantes multitudinē: ⁊ nō ſūt tn̄ flobothomia: ⁊ ſimilr̄ ſcarificatōes ⁊ fricatōes: vt ſumitur ex Gal. 2ᵃ ꝑticula affo. ꝯmēto illiꝰ affo. Ubicūqꝫ cibus p̄ter nām intrat: ⁊ iō puto ꝙ Aui. hic nō poſuit ꝓ vera diffinitōe ſeu deſcriptione: ſꝫ pro quadā accidētali notificatione ꝑ quoſdā ſuos effectꝰ quos optīe facit reſpectu aliaꝝ euacuationū. Nā ⁊ ſi farmacū poſſet vl̄r eūare multitudineꝫ: non tn̄ ita ꝯmode ſicut flōmia: qꝛ non eūat multitudinē ſm modū loquēdi medicorū: niſi tn̄ ſuꝑfluit ciꝰ operatio vſqꝫ ad ſanguinē eūanduꝫ. Et iō Gal. pᵐ adiutoriū eūans multitudinē poſuit flōmiam: 2ᵐ ſcarificationē īter ſpatulas: ⁊ poſt alia q̄ vide loco illo. Cā aūt quare vl̄r ⁊ multitudineꝫ eūat eſt cū multitudo ī venis ꝯtineat: ideo ꝑ venaꝝ aperitionē optime eūatur cū ibi nulliꝰ humoris ſit electio ſed effluit ſui liquiditate. Et iō ſm ſpēs eūant: q̄d eſt eūare multitudinē ſm medicos. ⁊ qꝛ oēs ſunt īuiceꝫ colligate: ideo ꝑ vnius flōmiā pōt ab oībus fieri eūatio. ⁊ illa pōt dici vniuerſalis: qꝛ a vaſis toti corpori ſeruiētibꝰ ⁊ a totiꝰ ambitu eūat. Dicūt tn̄ aliqui ꝙ ⁊ ab oībus mēbris ⁊ a locis extra venas eūat: vt colligit ab Aui. 3ᵃ quarti. c. de heriſipila: ⁊ pᵃ quarti. c. de cura variolaꝝ. ſꝫ ego puto ꝙ hoc non obſtāte: mea expoſititio ſit nulla. ¶ Nota 2° ꝙ qꝛ in flōmia non ē aliqd eligēs prius vnū humorē q̄ꝫ reliquū: ideo oēs humores q ī venis ꝯtinent mouent ad exitū: ⁊ nō ſolū vnꝰ ſed duo aut tres: ⁊ ideo ꝓprie dicit ꝙ eūat multitudinē. ⁊ ꝙ non fiat aliqn̄ ꝓpter peccatū multitudīs non eſt īconueniēs qn multotiēs fiat ꝓpter peccatū in quali vt ſtatiꝫ habebitis: ſed qꝛ farmacuꝫ eligit ideo non dat ꝓprie ad euacuāduꝫ multitudinē. ¶ Tertio nota ꝙ lꝫ ſit poſſibile ī aliquo loco q̄ꝫ in venis augeri humores ſupra mēſuraꝫ nāleꝫ abſqꝫ peccato ī quali ſpāli vt ī cōcauo cordis vbi ſanguis n̄ mouet ad putredineꝫ: tn̄ medici nō vocant multitudinem niſi augmētū ꝓportionale oīum humoꝝ in venis: qꝛ tale pctum nō accidit alibi niſi in venis: vn̄ pᷓa affo. ꝯmēto 3° nō magnificatis vltra modū humoribꝰ ad corpus nutriēdū: īpoſſibile ē corpus vltra modū augeri: ⁊ ꝯſtat ꝙ Gal. loquitur de his qui ſunt in venis.

Et nemo quidē eſt flobothomādus niſi vnus duorum. Unus eoruꝫ eſt egritudinibꝰ preparatus: qui cum ipſius ſanguis multiplicatꝰ fuerit cadet in eas: ⁊ alter eſt cadens in eas.

¶ Enumerat hic in gn̄e ꝓ parte ēt in ſpē corꝑa quibꝰ flobothomia ꝯuenit. Et pᵒ magis ī gnāli. 2° magis in ſpāli. 2ᵃ ibi: ex his. Primo ponit duo gnā corꝑoꝝ p̄paratoꝝ quibus flōmia cōuenit. 2° dat intētōes ꝓpter quas flōment. ibi 2ᵃ: vnuſquiſqꝫ. ¶ De prima dicit ꝙ nemo ē flōmandus niſi cōtineat ſub aliquo duoꝝ generū. Unuꝫ quoꝝ ē corpus p̄paratū cadere in egritudines: ita ꝙ cuꝫ ipiꝰ ſanguis multiplicatus fuerit cadet in eas. Aliud genus ē corpꝰ cadens in egritudines. ¶ Ubi nota ꝙ cōiter ſolet exponi ꝙ duo ſunt modi corpoꝝ flōmandoꝝ. ſ. actu egrū ⁊ neutruꝫ decidētie. ⁊ rō vt dicūt ē ꝙ cū flōmia ſit eūatio nō ꝯuenit niſi reſpectu alicuiꝰ preter nām exn̄tis: mō illa que ſunt inculpate ſana ſunt ſm nām: ſana enim omnia ſunt ſm nām inquātū ſunt ſana. Mihi tn̄ videt vt ſupra dixi ꝙ tēꝑata corꝑa ⁊ debite recta ſunt qn̄qꝫ flōmanda. nā ⁊ ſi oīa q̄ ſunt in eis ſunt ſm nām: tn̄ poſſibile ē ꝙ ex aeris diſpōne fiant p̄ter nām q̄d ī debito eoꝝ regimīe ē ꝓuidēdum vt fiat: ⁊ iō ego ꝑ corꝑa preꝑata cadere ī egritudines nō intelligo ſolū neutra īmo ſana ⁊ aliqua tꝑata ī quibꝰ ex mutatōe aeris d̄ hyeme ad eſtatē ⁊ p̄cipue futurā vehemēter calidā poſſibile ē vt ſanguinē hēant: qui cū multiplicat ꝑ rarefactioneꝫ faciet cadere in morbū. nec ꝓpter hoc dicēdū diſtēꝑatam aut neutrū aliq̄d eoꝝ: ſed de hoc dictuꝫ ē in caplō 4°. In oībus ergo corꝑibꝰ ī quibꝰ fit flōmia: illa fit ad remouendū morbū aut fit ad remouēdū diſpōnē per cuiꝰ augmētū aut ꝑmanētiā timet morbꝰ. ¶ Nota tn̄ vlterius ꝙ nō ſolū flōmat ex timore de euentu egritudinū ꝓpter ſanguis

UVA. BHSC. IyR_006_1

multitudinē in toto: ſʒ qñ ēt timet̃ multiplicatio ĩ pte vna vt in ꝑcuſſiōe ⁊ caſu dicet̃ ĩfra. nec ſolū ĩtelligas de multitudine ĩ quāto: ſed etiā de multitudine ĩ quali: intelligēdo per ſanguinē tam 4ᵐ humorem q̃ʒ maſſam.

Unuſquiſqʒ aūt eoꝝ aut flobothomat̃ propter ſanguinis multituidnē: aut propter ipſius maliciā: aut propter vtrūqʒ.

¶ Hic exequit̃ ponēdo ĩtentiōes ꝓpter quas flōmētur: dicēs ꝙ vnuſquiſqʒ eoꝝ quibꝰ conuenit flōmia ſi flōmat̃ aut flōmat̃ ꝓpter augmētū quātitatis ſanguīs: aut ꝓpter eius malitiā: aut ꝓpter vtrūqʒ. ¶ Ubi primo vides Aui. velle ꝙ flōmia cōuenit peccato ſanguīs in q̄li: abſqʒ peccato ſpāli inquāto. nā ꝑ malitiaʒ vt diſtiguit̃ cōtra multitudinē nō ĩtelligit̃ niſi peccatū ĩ quali ſpāli. Uidet̃ tñ ꝙ hoc non ſit veꝝ. ſ. ꝙ qlibet qui flōmat̃ ꝓpter alteriꝰ dictoꝝ: flobothomat̃. Nā Gal. in 13ᵒ de ĩgenio ſanitatis dixit ꝙ eūamus corpꝰ totū nō ſolū in diſpōne plectoria: verūetiā cū moderatōe eoꝝ exñte in toto. Et idē inuit Aui. infra de his q paſſi ſūt ꝑcuſſionē aut caſum. ¶ Ad hoc dicet̃ pᵒ ꝙ ſanguinē eē multū pōt ĩtelligi duobꝰ modis. Aut enim eſt multus reſpectu diſpōnis debite in ſanitate: aut eſt multꝰ reſpectu diſpōnis ĩ corpore actu ĩuente: verbigrā pono ꝙ ſortes ĩ dipſōne ſanitatis regrat lib. x. ſanguīs ⁊ hēat. ix. ⁊ cadat ita ꝙ caput offendat̃ fortiter: tunc lib. ix. ſanguīs non ſūt multꝰ ſanguis reſpectu eius qđ dʒ eē in ſorte tꝑe ſanitatis ſʒ paucus: eſt tñ multꝰ reſpectu diſpōnis nūc inuente ĩ eo: q2 ꝓpter dolorē tāto exñte ſanguine plus de eo curret ad locū q̃ʒ oʒ: ⁊ forte faceret apā. Uult ergo Aui. ꝙ vnuſqſqʒ cū flobothomat̃ facit hoc: aut ꝓpter maliciam: aut ꝓpter multitudinē reſpectu eiꝰ qđ ĩ tali diſpōne ĩdiget corpꝰ. ¶ Aut 2ᵒ dicit̃ ꝙ flōmia qñqʒ ſit grā eūonis aut grā diuerſiōis. Et dicit̃ ꝙ gratia eūandi non ſit niſi aliq̄ triū cāruʒ dictaꝝ ab Auic. ſʒ gratia diuertēdi bñ pōt fieri ſine iſtis. Et hos duos modos ponit Dy. Ego tñ puto ꝙ qñqʒ minuit̃ ſanguis non ꝙ ſanguis ſit ſuperfluꝰ reſpectu alicuiꝰ diſpōnis preexñtis ſʒ ꝓpter futurā que timet̃ vt ĩ iter agere debētibꝰ. Uñ Raſis 6ᵒ almāſoris caplo de hac mā dicit qui vult iter longū ꝑagere dʒ ante ipſiꝰ ĩceptionē minui ⁊ medicinā ventris ſolutiuā ſumere dʒ. Sʒ conſtat ꝙ hoc non ſit ꝓpter aliquā diſpōneʒ p̄ternālem que nūc ſit ſed que timet̃: ⁊ ē gratia eūonis ⁊ non diuerſiōis. Et iō dico ꝙ qlibet qui flōmat̃ ꝓpter multitudinē aut ꝓpter maliciā: flōmat̃. ſ. q̄ eſt aut timet̃: ⁊ ꝑ ꝯñs dico ĩculpate ſanū ⁊ tꝑatuʒ qñqʒ debere flōmari vt ſupra dixi: ⁊ ēt ĩnuit Gal.

Et his quidē egritudinibꝰ preparatꝰ ē ſicut qui ē expoſitꝰ ſciatice ⁊ podagre fortibꝰ ⁊ artetice ſanguĩeis: aut ille cui accidit ſputū ſanguineū ex fixura vene que ĩ pulmone eiꝰ exiſtit tenuiter ꝯſolidata: qm̄ cū ipſius multiplicabit̃ ſāguis findet̃: ⁊ apti epilepſie ⁊ apoplexie ⁊ melācolie cū ſanguis multitudie ⁊ ſquināntie ⁊ apatibꝰ ĩterioꝝ ⁊ obtalmie calide: ⁊ ex eis quibus emoroidarū ſanguis qui fluere ſolebat eſt retētus: ⁊ mulieribꝰ quibꝰ mēſtruus ſanguis ē reſtrictꝰ: hoꝝ tñ colores nō demōſtrāt ꝙ flobothomari debeāt ꝓpter ipſoꝝ obſcuritatē aut albedinē aut viriditatē: ⁊ illi qui in ĩteriorib9 mēbris cum ꝯplexione calida debilitateʒ patiunt̃.

¶ In iſta parte ſpāli narrat corpora ⁊ diſpōnes eoꝝ ratione quoꝝ ꝯuenit flōmia: q2 cuʒ dixerat de egris ⁊ illa dicunt̃ in caplis de cura ſuaꝝ egritudinū: ideo Aui. hic non narrauit ſpecialr̃ egritudines ĩ quibꝰ ꝯuenit flōmia: ſʒ narrauit ſpāliter plura parata cadere ĩ egritudies. Et ſolet diuidi pars iſta ĩ duo. Nā pᵒ narrant̃ corpora parata cadere in egritudinē in quibꝰ ſit flōmia p̄cipalr̃ cā eūonis. 2ᵒ illa in quibꝰ ſit flōmia cā diuerſionis. 2ª ibi: ⁊ illis quibꝰ percuſſio. Pria ĩ duo. Prio facit qđ dictū eſt. 2ᵒ oſtēdit tp̄s optimū ad flōmiā in iſtis. 2ª ibi: nā iſtis. In pª narrat deceʒ maneries p̄paratoꝝ. Prio ſunt parati ad arteticam ⁊ podagrā vel ſciaticā forteʒ vel ſanguineā. 2ᵒ parati ſputo ſanguis maxie cū poſt illud paſſi ſunt fracturā vene ĩ pulmone vel ĩ pectore ⁊ fuit tenuiter ꝯſolidata: q2 multiplicato ſanguĩe ſcindat̃ iteꝝ. 3ᵒ ſūt parati epilepſie cū ſanguīs multitudie. 4ᵒ ꝑati melācolie cū ſimili multitudie. 5ᵒ ſūt ꝑati ſq̄nātie. i. apatibꝰ capitis gutturis vel muſculoꝝ epiglotis ⁊ meri aut amigdal̃. 6ᵒ ſunt ꝑati apatibꝰ neruoꝝ. 7ᵒ ſūt ꝑati obtalmie calide. 8ᵒ ſūt illi quoꝝ ſanguis emoroidaꝝ q fluere ſolebat eſt reſtrictꝰ. 9ᵒ ſūt mulieres q̄bus reſtrictꝰ ē fluxus mēſtrualis ſupple p̄ter nām. Et ĩ iſtis docet ꝯſiderare ꝙ eoꝝ colores non oſtendūt ꝙ debeāt flōmari ꝓpter eoꝝ obſcuritatē aut albedinē aut viriditatē. 10ᵒ ſunt q cū ꝯplōne calida in ĩteriorib9 patiunt̃ debilitatē. Et tu pᵒ ꝯſidera ꝙ haꝝ egritudinū ĩ quibꝰ iſta corꝑa ſunt parata cadere: q̄dā ſunt a ſanguĩe: q̄dam ⁊ ſi non ſint a ſanguĩe tñ accidūt cū ſanguīs multitudine vt epilepſia ⁊ melācolia: ⁊ ꝯuenit flōmia ad exonerādū nāʒ vt ſit potentior ſupra māʒ ꝓpriā illaꝝ egritudinū: ⁊ q2 cuʒ flōmia aliquid de mā eaꝝ eūatur: nō tñ negat̃ has egritudines a ſanguĩe poſſe pēdere: ſed eſt raro: ⁊ ideo magis de directo ꝯuenit flōmia qñ ſunt egritudies a ſanguĩe pēdentes q̃ʒ in alijs: ſʒ ſpālr̃ deſcēdēdo. ¶ De pª manerie nota ꝙ artetica ē nomē gnāle paſſiōis iūcturaꝝ: ſed podagra ē nomē ſpāle doloꝝ iuncturaꝝ pedū: ⁊ ſciatica eſt dolor iuncturaꝝ anche dicte a ſcia que ē ꝯcauitas oſſis ſuꝑioris cui ꝯtinuat̃ vertebrū coxe. Et cū huiuſmōi dolores ſūt fortes q2 ĩtollerabiles: tūc eſto ꝙ ñ ſint a ſanguĩe: timet̃ tñ de ſanguīs nimio curſu: ⁊ iō ꝯuenit flōmia. Cū aūt ſūt cū ſanguĩe non cadit dubiū ꝙ flōmia ꝯueniat. De ꝑatis ſputo ſanguīs ꝯſtat ꝙ cū ſanguis multiplicat̃ magis extēdit̃ vena ⁊ facilius ſcinditur. De ſquinātia ⁊ apoſtematibus mēbroꝝ interioruʒ: iterū ⁊ de obtalmia nō cadit difficultas. Sed notāter dixit de obtalmia calida q2 qñ ſit a flegmate magis oʒ facere purgationē q̃ʒ flōmiā: ſʒ de illis quibꝰ cōſtrictꝰ ē ſanguis emoroydaꝝ qui fluere ſolebat: aut ſanguis mēſtruus: ſūt due difficultates. Pria q2 ſi reſtrictus ē ſanguis emoroydaꝝ ē ex ſanguīs paucitate: aut q2 non ſit āplius groſſus ꝓpter mutationē regimīs: ⁊ in iſtis nō eē ĩdigētiaʒ flōmie q2 nec timet̃ peccatū ĩ quāto nec̄ ĩ quali. ⁊ ſilr̃ cōtigit ĩ mulieribꝰ: vñ ⁊ ꝓpter febres paucificato ſanguĩe ĩ eis deficit fluxus: ⁊ ꝓpter partū plurimū retinet̃ pluribꝰ menſibus ⁊ ꝓpter lactationē: ⁊ tñ nō cōuenit ĩ caſibus iſtis flōmia. 2ª difficultas ſi hoīuʒ colores nō oſtendūt ꝙ flōmari debeāt q2 ſunt albi aut virides vel obſcuri: tūc ſequit̃ ꝙ ĩ iſtis nō ē ſanguis abūdans: q2 vt dicit̃ cōmento ſcđe ꝑticule affo. Coloꝝ corꝑis humoꝝ abūdātiā ⁊c̃. ⁊ iō flōmia nō ꝯuenit. 2ᵒ q2 tales colores nō accidūt niſi ex abūdātia aut flegmatis aut melancolie vt obſcurus: aut amboꝝ vt viridis: q2 ex ābobꝰ ē permixtꝰ: ſed mixtis hūoribus dñantibꝰ cauēda eſt flōmia vt dicet̃: ergo nō ſunt flōmandi. Ad primum horū dicit̃ ꝙ verū ē qñ reſtrigit̃ circa fluxū emoroydarū aut mēſtruoꝝ qui fluere ſolebat: ⁊ ꝑ tūc nō ꝯueniūt flobothomie. Quis eīm dubitat ꝙ qñ poſt nimiū curſum emoroydaꝝ ⁊ plurimā virtutis debilitatē ex eo reſtringat̃ aut nāliter aut accidētalr̃: ꝙ nō ſtatiʒ poſt ē faciēda flōmia cū tunc ſit ſanguīs defectus. ſed Aui. mētio ē qđ vtplurimū ita ē ꝙ qñ poſt tp̄s multū aliquis ē reſtrictꝰ: aliquis iſtorū curſuū ē flōmandus: ⁊ hoc ē vtplurimū in his quibꝰ accidit emoroydaꝝ curſus ⁊ ſit cōſuetudinariꝰ ſicut in quibus multiplicat̃ ſanguis groſſus: ⁊ ĩ mulieribꝰ vſqʒ ad debitā etatē merito diſpōis ſexus ē aptus multiplicari ſanguis: quo non ĩdigēt dū nō ſunt p̄gnātes: ⁊ iō ĩ iſtis cū retinet̃ fluxus notabili tꝑe ſignificat̃ ꝙ ſanguis malus ē multiplicatus vtplurimū: ⁊ iō indigēt flōmia vt p̄ſeruent̃ a morbis qui ex tali malo ſanguĩe ſunt apti gnārī. ¶ Sed pro 2ᵒ dubio nota ꝙ tam ſanguis mēſtruus q̃ʒ ſanguis qui ſolet fluere ꝑ emoroydas vtplurimū ē ſanguis aut aquoſitate multa ꝑticipans aut groſſitie: ⁊ iō qñ diu retinet̃ accidunt tria ꝓpoſito ꝑtinētia. Primo q2 talis ſanguis mittit̃ per ꝑtē ad exteriora: q2 mēbra intrinſeca ſunt multum fortiora mēbris exterioribꝰ: ⁊ p̄ſertiʒ emittit̃: q2 ille qui iaʒ ē malignatus ⁊ magis factꝰ diſtans a nā boni ſanguīs. 2ᵐ eſt ꝙ hic ſanguis recipit alterationē ab exterioribus: ⁊ ſit declinans ad humoris dicti nām. Et hūores etiā dicti qui cuʒ ipo multiplicant̃ remanēt in maiori ꝓportiōe ſolito ĩ exterioribꝰ: ⁊ iō ſit color aliquis đ tribꝰ dictis vtplurimū. 3ᵐ aūt ē ꝙ ſanguis de nouo multiplicatꝰ nōdū malignatus ē adhuc in venis maioribꝰ. nā nō tā cito eas egredit̃ ⁊ ĩ cute diffundit̃ niſi poſt malignationē: ⁊ iō remanet neceſſitas eūationis eiꝰ ne malignet̃: dʒ tñ medicꝰ ꝯſiderare vtrū prius ſit farmacādū aut nō per regulas poſitas ſupra. c. 4ᵒ: ⁊ tūc ad argumētū pʒ ſolō. Ad primū q2 color corꝑis oñdit abundātiā ſanguīs ſi nō aliqñ fuerit ĩ interioribꝰ: ⁊ aliqñ ĩ exterioribꝰ: ſed ad 2ᵐ pʒ ſolō ꝑ vltima dicta. ¶ Sed vlteriꝰ nota ꝙ Aui. dicit ꝙ indigēt flōmia illi qui in interioribus mēbris cū cōplōne calida patiūtur debilitatē: ergo cū ꝓhibeat a flōmia ſequit̃ ꝙ nō ſunt merito illiꝰ flōmandi: p̄terea mala cōplō calida pōt ita bñ eē a dñio colere ſicut ſanguīs: ergo ñ iuuat flōmia cū colere dñio: vt ita dicet̃: ſequtur ꝙ nō indicat flōmiā q2 plurimū ē cū ſiccitate vt ĩ ethica. Hic ergo vī ꝙ Aui. ĩcōueniēter hec corꝑa numerauit. Ad hoc dubiū cōiter rñdit vnus duobus modis. Primo ꝙ ꝑ debilitatē ĩtelligamus hic nō illā que ē ꝓpter reſolōnē: ſed illā que ē cū virtutis agitatiōe: talis eiʒ ē a ſanguĩe q2 nullus alius humor ē aptus gnāre ⁊ calefacere. nā colera ſui leuitate ⁊ paucitate nō grauat: ⁊ alij non ſunt fridi: ⁊ iō hec debilitas ē a ſanguĩe ſuꝑfluo ⁊ in ea ſit flōmia: debilitas aūt arguēs nō debere fieri flōmiā ē de reſolōne de qua nō loquit̃ hic Aui. 2ª rñſio ē qđ etiā verū ē ꝙ patiētes malā cōplōnē calidā ꝓpter quā ſiūt debiles ĩ interioribus ſunt flōmandi: nō ꝙ mala cōplō a ſanguĩe pēdeat: ſʒ q2 ab illa ſaltē ē apta foueri ſicut 7ᵒ terapētice Gal. patiētis malā cōplōnē frigidā ſtomaco factā cā ē cuʒ p̄ñtia flegmatis eūat flegma tāquā fouēs illā malā cōplōnē. Ego aūt puto ꝙ addere poſſet ꝙ mala cōplō calida ē cā attractōis ad locū ⁊ debilitas ē cā ꝙ alia mēbra ad debile tranſmittāt̃: vt pʒ prima primi. c. đ humoribus: vt ne ergo ad hec mēbra debilitata currat ſanguis faciēda ē flōmia. Qđ ſi dicat ꝙ ſunt debiles: ⁊ iō nō cōuenit: dicit̃ ꝙ nō oʒ in iſtis debilitatam

UVA. BHSC. IyR_006_1

tataꝫ eē virtutē agitiuā totiꝰ: ſꝫ ex vno mēbꝛo ꝑticulari: ⁊ talis nō arguit ꝙ dimittat̃ flōmia. Aut dicat̃ de q̄ loquit̃ eſt ꝑ aggrauationē ⁊ non ꝑ reſolōneꝫ: ⁊ ĩ hoc non confert flōmia. Et ſi hec ꝯiūgas cū dictis Dy. erit r̄nſio ꝯpletioꝛ.

Nam iſtis melius ē vt ĩ vere minuant̃ lꝫ in has nōdum inciderit egritudies.

¶ Hic oſtēdit tp̄s aptius ad iſtoꝝ flōmiā: ⁊ dicit ꝙ iſtis eſt meliꝰ ꝙ flobothoment̃ in vere lꝫ non ĩciderint ad has egritudines: ⁊ ĩtelligit̃ de flōmia ꝓuiſiua ꝙ tempus magis aptū vl̄r ad hanc flōmiā eſt ver lꝫ quibuſdā ex ꝑticularibꝰ diſpōnibꝰ ꝯtigeret aptiꝰ eē aliđ tp̄s: ⁊ ꝓpter hoc vide illud qđ dictū eſt ſuꝑ. c. iiij. de aliaꝝ eūonuꝫ ꝯueniētia in vere: eedeꝫ ſunt cauſe in illis ⁊ in flōmia.

Et illis quibus percuſſio accidit aut caſus: q̄m q̄nqꝫ minuunt̃ timēdo ne eis accidat apoſtema: ⁊ qui hꝫ ap̄a minuēdus eſt: q̄m timet̃ ne aperiat̃ anteq̄ꝫ maturet̃ licet nō indiguerit ⁊ nō fuerit ibi multitudo.

¶ Hic oſtēdit q̄ ſunt coꝛꝑa q̄ ꝓculdubio ĩdigent flōmia ſm̄ primā ĩtroductionē ⁊ ponit tres maneries. Pria ſunt coꝛꝑa quibꝰ accidit ꝑcuſſio. 2ª ſunt coꝛꝑa quibꝰ accidit caſus ab alto. 3ª eſt maneries illoꝝ q patiunt̃ ap̄ata calida. nā prime due minuūt̃ timēdo ne ꝓpter doloꝛē aut mēbꝛi debilitatē accidat ap̄a ſi ſanguis dimittat̃. 3ª coꝛpoꝛa minuūt̃ timēdo ne ap̄a rūpat̃ an̄ maturatōeꝫ: ⁊ ſūt iſti minuēdi lꝫ non ĩdigeāt ⁊ n̄ ſit ĩ eis multitudo.
Et hoc ē qđ ĩuenit̃ ex ſcriptōe Ugonis. ſ. c. đ flōmia ⁊c̄.

¶ Capitulū vigeſimūprimū de ventoſis.

VEntoſe cutis partē magis mundificāt q̄ꝫ flōmia: ⁊ plus extrahūt ſanguinē ſubtilē q̄ꝫ groſſuꝫ. Et ipſaꝝ quidē iuuamētuꝫ in coꝛpoꝛibꝰ ꝯpoſitis groſſis ⁊ craſſis groſſuꝫ habētibus ſanguinē eſt paruū: q̄m ex iſtis nō extrahūt ſanguinē neqꝫ extrahūt ſicut opoꝛtet: ĩmo qui ex eo vehemēter eſt ſubtilis ⁊ cuꝫ difficultate ⁊ in mēbꝛo ventoſato debilitatē efficiunt.

¶ Capl'm p̄ſens ſic cōtinuat̃ ad p̄cedēs: qꝛ in p̄nti determinauit de eūatiōe ꝑ flōmiā: nūc determinat de quibuſdā eūatōibus ānexis vt ſiēdis per vētoſas ⁊ ſanguiſugas que notabil'r ānectunt̃ flōmie. p̄º qꝛ ſanguinē eūantes. 2º qꝛ n̄ eūantes eligēdo ſicut nec flōmia. Et diuidit̃ ĩ duas. Nā primo determinat de eūatiōe ſiēda per ventoſas. 2º de eūatōe ꝑ ſanguiſugas. 2ª ibi. c. ſequēti: Indi dixerūt. Et merito prius de vētoſis ē determinatū vt de affinioribus flōmie vētoſatōe facta cū ferro ſcarificādo ſic ĩ flōmia: plus ēt ⁊ a pluribꝰ ꝑtibꝰ eūare vētoſaꝫ q̄ꝫ ſanguiſugā. Et diuidit̃ hoc. c. ĩ duas. Nā p̄º determiat đ vētoſis magis ĩ gnāli. 2º magis ĩ ſp̄āli. ibi 2ª: plurimi aūt hoīuꝫ. Pria in duas. Nā p̄ıº facit qđ dictū ē. 2º ponit quēdā cañ. obſeruādū in applicatōe vētoſaꝝ. ibi 2ª: ⁊ oꝫ quidē. Prima ĩ tres. Primo tāgit iuuamēta ⁊ nocumēta vētoſaꝝ. 2º opinionē quoꝛūdā tāgit circa tp̄s applicādi vētoſas. 3º etiā p̄mittit̃ qua hoꝛa illius tp̄is ſit applicāda ventoſa. ibi 2ª: quidā aūt. ibi 3ª: ex ſuis vero hoꝛis. ¶ De prima dicit ꝙ vētoſe plus mūdificāt cutē ⁊ eius ꝑtes q̄ꝫ flōmia: plus etiā educūt ſanguinē ſubtilē q̄ꝫ groſſuꝫ: quaꝝ iuuamentū ĩ coꝛꝑibus duris groſſuꝫ hn̄tibꝰ ſanguinē ē ꝑuū: q̄m non trahūt ſanguinē groſſuꝫ ſꝫ ſolū ſubtilē ⁊ eūando difficulter efficiētes debilitatē mēbꝛo vētoſato. ¶ Nota ꝓ parte Aui. loqui de vētoſis factis cū ſcarificatiōe que eūant ſanguinē exn̄tē circa cutē eo ꝙ ſcarificādo vtplurimū ſoluūtur rami ꝑui venarū diſꝑſi circa cutē. Cōiter vero ꝑ flobothomiā ſoluit̃ vena ꝓfundioꝛ nō ita ānexa cuti. Itē plus eūat ſanguinē ſubtilē q̄ꝫ groſſum eo ꝙ ſanguis diſꝑſus ꝑ illas venas ſubtiles cōiter ē ſubtilis. Itē modicū cōferunt coꝛpoꝛibꝰ de quibꝰ in littera dicit̃ cū ex eis ſubtilis ⁊ non groſſus ſanguis educat̃. Itē cū difficultate eūat̃ iſte ſanguis cū opꝫ ſcarificari ⁊ ventoſa attrahere. Itē efficiūt vētoſe debilitatem in membꝛo ventoſato reſoluente ſpiritus illiꝰ mēbꝛi: ⁊ ſic calidū nāle đbilitādo: reſoluēdo ēt đ humido ſubſtātifico ⁊ ēt eūando ſp̄āl'r ſauguineꝫ illiꝰ mēbꝛi ⁊c̄.

Quidā aūt p̄cipiūt vt vētoſe ĩ p̄ıcipio mēſis nō apponant̃ q̄m hūoꝛes nōdū āmoti fuerūt neqꝫ ebullierūt: neqꝫ ĩ fine mēſis: q̄m hūoꝛes tūc ſūt minuti: ſꝫ in medio mēſis cū hūoꝛes ſūt ebulliētes ⁊ in ſui augmēto lumis ĩ coꝛꝑe lune augmētū ſequētes ⁊ augmētat̃ cerebꝛū ĩ craneis ⁊ aqua ĩ flumibꝰ acceſſionē ⁊ receſſioneꝫ habētibꝰ.

Scias per mēſeꝫ ĩtelligē mēſeꝫ lunarē vñ in principio talis mēſis lumē ē paucū in luna: ſic quoqꝫ humiditates ⁊ hūoꝛes pauci ſunt ĩ tali p̄ıcipio. In medio auteꝫ cū luna hēat multuꝫ lumē ⁊ ſit augmētata: humoꝛes ēt augmentati ſunt: ⁊ ſic de fine: quare ⁊c̄.

¶ Nūc ſm̄ opinionē aliquoꝝ tangit tp̄s cōueniēs ad vētoſandū: dicēs aliquos p̄cipere nō apponi vētoſas ĩ principio mēſis nōdū motis ⁊ nō ebulliētibꝰ humoꝛibꝰ: nec ĩ fine mēſis ĩ quo ſunt minuti: ſed in medio mēſis ĩ quo ebulliūt ⁊ ſunt aucti lumĩs lune ſequētes augmētū: quo etiā tēpoꝛe ĩ craneis cerebꝛū auget̃: ⁊ aqua auget̃ etiā in flumibꝰ hn̄tibꝰ acceſſuꝫ ⁊ receſſuꝫ. Et notāter dicit̃ quidā. Nā ⁊ ſi hoc ſit aliqual'r exꝑientia verificatū: huius tn̄ nō p̄ōt afferri demōſtratio. Sed ex ꝑte ſupponit̃ humoꝛes coꝛꝑis regulari ⁊ depēdere a lumīe lune que cū ſit in medio potētioꝛ ſupꝛa nos: iō augēt̃ hūoꝛes: auget̃ etiā ⁊ craneū: ⁊ hoc cōtinet veritatē de tempoꝛe electiuo. De coacto aūt nō ſic cū aliq̄n coacte nos opoꝛteat facere ēt in fine menſis.

Ex ſuis vero hoꝛis ĩ die melioꝛ ē hoꝛa ſcđa ⁊ tertia.

¶ Nūc Aui. tāgit hoꝛaꝫ magis cōueniētē pro tp̄e vētoſatiōis dicēs ꝙ ſit hoꝛa 2ª vel 3ª diei. ¶ Pro tp̄e nota ꝙ primo melius ē ventoſare de die q̄ꝫ de nocte cū humoꝛes ſint magis habilioꝛes motui: cū etiā locꝰ applicādi meliꝰ poſſit eligi. Itē melioꝛ hoꝛa ē 2ª vel 3ª: cū tunc nec ſit frigꝰ ĩmobilitans hūoꝛes: nec ēt ſit caliditas nimia nimiū reſoluens ⁊ debilitās humoꝛē ⁊ virtuteꝫ. Et hoc ē verū maxie tp̄e calido aut tēpoꝛe tēꝑato ĩ quo ē electiue eūandū vel flobothomādū. ĩ tp̄e vero valde frigido nō ē ĩcōueuiēs vt eligatur hoꝛa tardioꝛ ⁊ calidioꝛ.

Et oꝫ quidē vt a vētoſis ſibi quilibꝫ caueat poſt balneū niſi cuiꝰ ſanguis fuerit groſſus: q̄m ipſe ſe priꝰ balneari dꝫ ⁊ vna hoꝛa moꝛari ⁊ poſtea ventoſas apponē.

¶ Aui. ponit aliū cañ. dicēs ꝙ opꝫ quēlibet ſibi cauere a vētoſatōe poſt balneationē niſi vētoſandus hēret ſanguinē groſſuꝫ: qꝛ tūc primo dꝫ ſe balneare poſtea moꝛari vna hoꝛa: deinde ventoſari. ¶ Pro ꝑte nota ꝙ notabil'r poſt balneū nō ſiat vētoſatio. p̄º ne debilitas debilitati ꝯiūgatur: ne etiā ebullitio facta per balneū ꝯiungat̃ ebullitiōi vētoſarū. In cāu tn̄ maius eligēdo iuuamētū nocumento vētoſatiōi p̄mittēda ē balneatio vt ſiat per balneuꝫ ſanguĩs ebullitio ⁊ ſubtiliatio diſponēs ſanguinē ad eūandū ꝑ ventoſas: vna tamen hoꝛa poſt: ⁊ bꝛeuiter tāto tp̄e poſt quāto humoꝛuꝫ ſint ſedate ebullitiones.

Plurimi autem hominū abhoꝛrent ventoſas in anterioꝛibus capitis apponere: ⁊ reperiūt in hoc ſenſum ⁊ intellectū impediri.

¶ Nunc Auic. in ſp̄āli determinat de vētoſis. Et diuiditur ĩ duas. Primō ponit aliquos cañ. ⁊ aliqua iuuamēta vētoſaꝝ nō multū ĩp̄as diſtinguēdo ſm̄ ꝙ ſunt cū ſcarificatiōe vel ſine. 2º exeq̄t̃ ponēdo plura iuuamenta. ibi 2ª: ventoſe aūt. Prima ĩ tot quot cañ. ponit vētoſaꝝ: partes patebūt legendo. ¶ Primo ergo ponit talē cañ. ꝙ multi hoīum abhoꝛrēt ꝑtibus anterioꝛibꝰ capitis apponere ventoſas quibꝰ reꝑiunt ſenſum ⁊ ĩtellectū debilitari. ¶ Pro ꝑte nota ꝙ anterioꝛa quibꝰ applicant̃ ventoſe vt ſic debilitent poſſent eē frons ⁊ tempoꝛa. ¶ Scđo nota ꝙ propter has vētoſas ſenſum ⁊ ĩtellectū cōtingit debilitari: qꝛ cum reſoluūt ſp̄ūs ab oꝛganis ſenſuū ⁊ motuū ĩterioꝝ: v̄tutes ĩterioꝛes ĩ ſuis debilitant̃ oꝑatiōibus: Ex cōſequēti ēt cū ĩtellectus ex ſenſuuꝫ vigoꝛe depēdeat in ſua oꝑatione neceſſe ē vnūquēq̄ꝫ ĩtelligētē fantaſmata ſpeculari: iō leditur ĩtellectus: intelligendo aūt per intellectū virtuteꝫ cogitatatiuā de qua 3º de aīa dictū ē. Hic aūt ĩtellectꝰ coꝛruptibilis ē: ⁊ ſine hoc nihil ĩtelligit ſupple verus. ſ. intellectꝰ. Per ſenſuꝫ aūt aliū interioꝛē ĩtelligēdo ſp̄ūm ſiue ſenſum in ꝑte anterioꝛi cerebꝛi vigentem quas omnes virtutes dicta de cauſa debilitari contingit.

Et vētoſe quideꝫ ſuꝑ nocrā que ē in collo poſite nigre vicarie exiſtūt ⁊ ꝯferūt ſuperciliorꝝ grauitati ⁊ alleuiāt palpebꝛas ⁊ ꝯferūt ſcabiei oculoꝝ ⁊ fetoꝛi oꝛis. Et ſuper alcheel vicē tenēt baſilice ⁊ ꝯferūt doloꝛibꝰ humeroꝝ ⁊ gule. Et ſuper alchadā poſteriꝰ ſūt vicarie cephalice ⁊ ꝯferunt tremoꝛi capitis ⁊ mēbꝛis que ſūt in capite ſicut facies ⁊ dentes ⁊ mole ⁊ aures ⁊ oculi ⁊ gula ⁊ naſus. Uētoſe aūt que nocre ſuperponunt̃ obliuionē hereditare faciūt veraciter ſicut quidā dixerūt: q̄m poſterioꝛ pars capitis ē locus ꝯſeruatōis quē ventoſe debilitant. Alcheelie vero debilitāt os ſtomaci. Et ꝓpter alchadā quidē q̄nqꝫ accidit capitis tremoꝛ parūper ita ꝙ mutemꝰ nos a nocra ⁊ ab alcheel parūper aſcēdamus niſi cū fuerint neceſſarie ꝓpter fluxuꝫ ſanguĩs ex tuſſi: q̄m tunc cū eĩs eſt deſcēdendū ⁊ nō aſcēdendum. Et he quidē ventoſe que alcheel ſuꝑponunt̃ ⁊ ĩter duas ſpatulas ꝯferūt egritudibꝰ ſanguineis ⁊ ſpaſmo ſanguĩeo ⁊ aſmati ſanguĩeo: ſꝫ ſtomacū đbilitāt ⁊ coꝛdis tremoꝛē generāt. Et vētoſe quidē que cruribꝰ ſuperponunt̃ ſūt minutōi ꝓpĩque ⁊ mūdificāt ſanguinē ⁊ pꝛouocāt menſtrua. Et ei quidem q̄ue ex mulieribꝰ alba exiſtit ⁊ laxa ſanguinē habens ſubtileꝫ vētoſe in cruribus poſite ſunt melioꝛes q̄ꝫ flobothomia que fit in ſaphena.

¶ Nunc ponit. alios cañ. dicēs ꝙ vētoſe nodo colli ſuppoſite vicē tenēt vene nigre ſeu cōis ꝯferētes grauitati ſuperciliorū alleuiantes palpebꝛe grauitatē. Cōferūt ēt ſcabiei oculoꝝ ⁊ fetoꝛi oꝛis. Poſite vero ſuper alcheel viceꝫ
i

UVA. BHSC. IyR_006_1

tenēt baſilice: ⁊ cōferūt doloꝛibꝰ humeroꝝ ⁊ gule. Suppoſite vero ſup alchadā poſteriꝰ vicē tenent cephalice cōferentes tremoꝛi capitis ⁊ mēbꝛis que ſunt in capite: vt faciei: dentibꝰ: maxille: oculis: auribꝰ: gule ⁊ naſo. ¶ Alter caū. quē ponit ē ꝙ vētoſe ſuppoſite nocre faciūt hereditare obliuionē: ſicut ēt dixerūt quidā: qꝛ per has debilitatur pars poſterioꝛ capitis: locus ꝯſeruatiōis memoꝛie exiſtēs: Sꝫ vētoſe alcheyle debilitāt os ſtomaci. Et ēt per ventoſas alchadan qñqꝫ accidit tremoꝛ capitis. Et iō nos paruꝫ recedamus a nucha ⁊ parū aſcēdamus alcheyl niſi ventoſe ſint neceſſarie ꝓpter reſtringēdū ſanguinē ex tuſſi. naꝫ tūc debemus deſcendere ⁊ nō aſcēdere. Et certe he ventoſe que ponūtur circa alcheil inter duas ſpatulas ꝯferūt moꝛbis ſpatularū ⁊ pectoꝛis ſanguineis ⁊ ſpaſmo ſanguineo ⁊ aſmati: ſed debilitāt ſtomacuꝫ ⁊ faciūt tremoꝛē coꝛdis. ¶ Ultimo dicit ꝙ vētoſe ſuppoſite cruribus ſunt ꝓpinique flōmie ⁊ mūdificant ſanguinē ⁊ ꝓuocant mēſtrua. Albe tñ mulieri ⁊ laxe ſanguinē hñti ſubtilē ventoſe ī cruribus poſite melioꝛes exiſtūt flōmia ſaphene. ¶ Pꝛo ꝑtiū ītellectu nota ꝙ per nocrā intelligit mediā partē colli ſeu nuchā in medio exñtem. ¶ Scdo nota ꝙ euātio alicuius vene pōt dici vicaria euationi alteriꝰ vene triplr. pº qꝛ ēt euāt a ſili ꝑte tāqꝫ talis vene ramꝰ: ſicut dicimꝰ venā īter auricularē digitū exñtē vicariā eſſe baſilice. Scdo modo dicit aliqua euatio vicaria: qꝛ a ſimili ꝑte euans alteriꝰ vicem obtinet dato ꝙ nō ſit ramificata ab altera: ⁊ iſto mō ventoſa poſita nocre obtinet vicē cephalice qꝛ euāt a ſuperioꝛibus capitis vt cephalica. Tertio mō dicit aliqua euacuatio alterius eē vicaria qꝛ conſimilr euans vt alia: aut a ſimilibꝰ partibꝰ ipam ad aliā ꝯparādo: ⁊ iſto mō vētoſa poſita ſupꝛa nuchā nigre obtinet vicē. Sicut eniꝫ nigra ſcu cōis a ſuperioꝛibꝰ euat ⁊ iferioꝛibꝰ: ſic ēt hec ventoſa reſpectu ventoſaꝝ que in collo ponūtur a ſuperioꝛibꝰ euat ⁊ iferioꝛibꝰ media exñs inter ventoſaꝫ que colli ſuperioꝛibus ꝑtibus applicat ⁊ que īferioꝛibꝰ. ¶ Tertio nota ꝙ hec vētoſa ꝯfert grauitati ſuperciliōꝝ ⁊ ēt palpebꝛaꝝ a ſanguine eueniēti aut groſſis ſupfluitatibꝰ ꝗ attrahunt ⁊ diuertūt ad locū ventoſatū: ſimilr ꝯferūt ſcabiei oculoꝝ: confert ēt fetoꝛi oꝛis coꝛruptū ſanguinē aut ſanguineā māꝫ ab oꝛe diuertēdo. ¶ Quarto nota ꝙ vētoſe alcheyl. i. īferioꝛis ꝑtis colli vbi doꝛſū furcule iūgit obtinet vicē baſilice: hanc. ſ. ad alias colli ꝯparādo vētoſas. ſicut eīm baſilica ab epate ⁊ a partibꝰ īferioꝛibꝰ plus euat: ſic ēt hec ventoſa reſpectu aliaꝝ ī collo poſitaꝝ plus a partibꝰ vt īferioꝛ euat īferioꝛibꝰ ꝑꝑ qꝺ doloꝛibꝰ humeroꝝ ēt gule ſanguineis aut vētoſis reſoluēdo aut diuertēdo ⁊ attrahēdo magnū affert iuuamētū. ¶ Quīto nota ꝙ vētoſe ſup alchadā. i. partē poſterioꝛē colli ſupioꝛeꝫ vt vbi caput ꝯiūgit collo aut ecōtra vicē obtinēt cephalice: ipſas ēt alijs colli ꝯpando vētoſis. ſicut eiꝫ cephalica plus a capite ⁊ ſuperioꝛibꝰ euat: ſic hec reſpectu aliaꝝ ī collo poſitaꝝ vt ſupioꝛes plus euant a capite ⁊ ſuperioꝛibꝰ. ¶ Sexto nota has ꝯferre tremoꝛi ⁊ mēbꝛis narratis ī ꝑte cū ab ipſis vt ꝑtibꝰ ꝓpinqs euet ⁊ diuertat. ¶ Septio nota ꝙ vētoſe appoſite nocre narrata ī textu īferūt nocumēta ſi ſupple frequēter ⁊ idebite applicētur. Idē dicendū de poſitis ī ꝑte anterioꝛi cū tñ aliqñ īferāt iuuamēta: ⁊ de poſitis ī anterioꝛi loquit Gal. ī ioº terapē. ¶ Octauo nota ēt ꝙ vētoſe poſite ſupꝛa alcheyl ſupple freqnter ⁊ īdebite debilitādo meri: tuꝫ qꝛ verſus meri ſupfluētes attrahūt mās: tuꝫ ēt qꝛ eiꝰ attrahūt ⁊ reſoluūt ſubſtantiā ſpumoſaꝫ hñt os ſtomaci per colligātiā ac meri debilitare. ¶ Ulteriꝰ nota ꝙ qñ vētoſe alchadā dū. ſ. ſūt freqnter applicate ad caput ēt pauco ſanguie euato reſoluendo ſpūs ⁊ debilitādo virtuteꝫ tremoꝛeꝫ faciūt accidē. ¶ Nono nota ꝙ notāter vētoſe debēt poni ī loco tacto in littera: qꝛ tunc ſatis dicta euitant nocumēta tanqꝫ loco ſatis medio ⁊ ꝑpato ventoſis applicatis. ¶ Ulterius nota ꝙ ſanguine fluenti ex ꝑtiſi ꝑꝑ venā fractā ītendēdo īmediatius diuertere ꝯuenientius eſt ventoſas alcheyl vt locis ꝓpinquioꝛibꝰ aut etiā aliqualiter locis inferioꝛibꝰ applicare.

¶ Ulterius nota ꝙ vētoſe applicate alcheyl ⁊ īter duas ſpatulas poſite cōferūt dictis moꝛbis a mā ſanguinea ꝓcedentibꝰ ꝓpter cām ꝑaſſignatā. ¶ Nota ēt ꝙ hñt ſtomacum debilitare ꝓpter cām ꝑaſſignatā: hñt etiā tremoꝛē facere coꝛdis reſoluēdo ⁊ attrahēdo multā ſubſtātiā ſpumoſam a coꝛde cū ſint mēbꝛo appoſite ſatis ꝓpinquo. ¶ Ulterius nota ꝙ ventoſe ſuppoſite crurībꝰ appꝛopinquāt flobothomie. ſ. reſpectu aliaꝝ ventoſaꝝ eo ꝙ in cruribꝰ cum ſit ſanguis multus: cū etiā ibi ſit caro mollis ⁊ tenera pōt multū de ſanguie euari. vel etiā ꝓpinquat flōmie. ſ. facte ꝓuocādo verſus matricē mēſtrua ꝓuocant: ⁊ ex hoc mūdificant ſanguinē ⁊ etiā coꝛruptū expellēdo ſanguinē ſunt cā mundificatiōis eius. ¶ Ulteriꝰ nota ꝙ mulieri ī littera poſite cōueniētioꝛes ſunt ventoſe flōmia qꝛ ſufficienter ꝓuocāt mēſtrua: ⁊ qꝛ nō tātū ſanguis euant ſicut flōmia: iō hanc mulierē ī ſanguine paucificatā nō debilitāt ita ⁊c̄.

Sciās ꝙ vētoſe poſite ī illis locis vt hic dicit nō ſūt per ſe ꝓuocātia menſtruoꝝ ⁊ maxime vbi retētio mēſtruoꝝ fiat pꝛopter groſſitiē ſanguinis a flegmate vel coagulatōe frigidi aut ab oppilatiōe pꝛopter humoꝛes groſſos frigidos: ſꝫ ipſe ꝓuocāt ꝗſi per accidens attrahendo mām. poſſent ēt ꝓuocare ſubtiliādo ⁊ aperiēdo qꝺ euenire poſſet ꝓpter illuꝫ motū attractōis. per ſe aūt hoc mō pꝛouocātia ſunt aromata ſua mediāte calefactōe: vt inuit Gal. quīta particula affo. ꝯmento illiꝰ affo. Muliebꝛia mēſtrua educit ex aromatibꝰ calefactio ⁊c̄. quare ⁊c̄.

Quidā pꝛeterea dixerūt ꝙ vētoſe ſuper occiput poſite ⁊ ſūmitatē capitis cōferunt amentie ⁊ ſcotomie ⁊ tardant canos quēadmodū dixerunt. In hoc ꝯſideratio ē habēda. nā iſtud in his operant coꝛpoꝛibꝰ ⁊ nō ī alijs: quoniā plurimis coꝛpoꝝ feſtinare faciūt canos ⁊ īpediunt ītellectū ⁊ ꝯferunt egritudinibꝰ oculi. ⁊ hec quidē eſt maioꝛ eaꝝ vtilitas quoniā ꝯferunt eoꝝ ſcabiei ⁊ bothoꝛ ⁊ almuſeragi ⁊ egreſſioni vuee: ſꝫ ītellectū īpediunt ⁊ faciunt hereditare ſtupiditatē ⁊ obliuionē ⁊ maliciā cogitationuꝫ ⁊ egritudines permanētes ⁊ nocent aquā ī oculo habētibus: ſed foꝛtaſſe ſi hoꝛa ſe pꝛeſentauerit qua illud fieri debet nō impediunt.

¶ Nunc Aui. tāgit iuuamēta aliquaꝝ vētoſaꝝ auctoꝛitate aliquoꝝ eoꝝ tamē coꝛrigēdo dicta: dicēs ꝙ quidā dixerunt vētoſas occipiti. i. cuppe capitis ſiue ſūmitati appoſitas cōferre amentie ⁊ ſcotomie que ſupple veniunt ex mā ſanguinea aut vapoꝛe ſanguineo ⁊ ꝙ tardāt canos vt dictū ē per os. Hoc tñ dictū quātū cōtineat veritatis eſt cōſiderandū. Nā he vētoſe in his coꝛꝑibꝰ hec iuuamenta oꝑant ⁊ nō in alijs. naꝫ in pluribꝰ coꝛꝑibꝰ faciūt feſtinare canos ⁊ īpediūt ītellectū. Maioꝛ tñ vtilitas earū ē qꝛ cōferunt ſcabiei ⁊ puſtulis oculoꝝ ⁊ almuſeragi. i. exitui vuee: īpediūt tñ intellectū faciēdo hereditare obliuionē ⁊ malas cogitatiōes ⁊ moꝛbos ꝑmanētes. Nocet etiā aquā hñtibꝰ in oculo ⁊ cataractā que tñ debite applicate coꝛpoꝛibꝰ non īferunt nocumēta. ¶ Nota ꝑ parte ꝙ vbi he leſiones ꝓueniant a ſanguīs repletiōe ⁊ cōſtante virtute ſunt cōuenientes vñ canitiē tardāt euando mām ſanguineā que ſuffocabat caliditatē nālcꝫ: applicate tamē frequēter ⁊ ſtante paucitate ſpūuꝫ ⁊ ſanguinis ſiue coloꝛis ſic debilitādo ſtomacum ⁊ cerebꝛum dicta inferunt nocumenta.

Hoc ēt inuit Aui. pꝛia tertij tractatu quīto. c. iiij. de cura vertiginis parapho illo: Vētoſe quoqꝫ poſite ⁊c̄. ⁊ ſi plura cupis de hac mā recurre ad Raſim in pꝛio ꝯtinētis. c. ij. ⁊ Gal. tertio de īterioꝛibꝰ. c. viij. ⁊c̄. debent autēꝫ huiuſmōi vētoſe applicari factis pꝛiꝰ euacuatōibus ſufficientibus ⁊ ꝓpꝛie vniuerſalibus: quare ⁊c̄.

Vētoſe aūt ſub mento poſite ꝓſunt dentibꝰ repletis ⁊ faciei ⁊ gutturi ⁊ mundāt caput ⁊ mādibulas. Et ventoſe renibꝰ ſuppoſite ꝯferunt aꝑatibus coxaꝝ ⁊ eaꝝ ſcabiei ⁊ bothoꝛ ⁊ podagre ⁊ emoꝛoidibꝰ ⁊ elefantie ⁊ ventoſitatibꝰ veſice ⁊ matricis ⁊ pꝛuritui doꝛſi. Cūqꝫ ventoſe iſte fuerīt cū igne ſiue ſint cū ſcalpellatōe ſiue abſqꝫ ea iuuabūt etiā in hoc: ſed ille quidē que ſunt cū ſcalpellatōe ſunt foꝛtioꝛes pꝛeterqꝫ in vētoſitate. Naꝫ que ſine ſcalpellatiōe ſunt in remouēdo ventoſitates frigidas ⁊ vt radicitꝰ euellant hic ⁊ vbiqꝫ ſunt foꝛtioꝛes. Ventoſe pꝛeterea in anterioꝛi parte coxaꝝ teſticuloꝝ apoſtemati bus cōferunt ⁊ vulneribꝰ coxaꝝ ⁊ crurum. Et ventoſe poſterioꝛi parte coxaꝝ ſuperpoſite ꝓſunt apoſtematibꝰ ⁊ exituris que ī natibꝰ fiūt. Et vētoſe poſite ſub poplite ꝯferunt pulſatōi poplitis que ex calidis generat humoꝛibꝰ ⁊ exituris malis ⁊ vlceribꝰ putridis in crure ⁊ pede. Et ventoſe ſuper duas alcabi ꝯferunt pꝛohibitōi menſtruoꝛuꝫ ⁊ ſciatice ⁊ podagre.

¶ Nunc determīat ꝺ ventoſis aliaꝝ partiū dicēs ꝙ vētoſe poſite ſub mēto ꝓſunt dentibꝰ faciei ⁊ gutturi mūdificādo caput ⁊ mādibulas dū ſupple hoꝝ mēbꝛoꝝ leſiōes ꝓueniūt a mā ſanguinea euando. ſ. aut diuertēdo. ¶ Ulterius dicit ꝙ vētoſe ſuppoſite renibꝰ cōferūt aꝑatibꝰ cōferūt ſcabiei ⁊ puſtulis paruis coxarū. Nā cū ſint poſite ī ꝑtibꝰ ꝓpinquis coxis diuertūt mās ab illis. Cōferūt etiā podagre ⁊ emoꝛoydibꝰ ꝑ idē. Itē cōferūt elefantie que eſt vehemēs cutis maioꝛatio aut tibie euando mām fluētē ad tibiam. Cōferūt ēt vētoſitatibꝰ veſice ⁊ matricis: ⁊ maxie ſine ſcarificatiōe attrahēdo ⁊ reſoluēdo vētoſitatē a locis ꝓpinquis. ¶ Tertio Aui. ponit vnā cōparationē īter vētoſas cū ſcarificatiōe ⁊ ſine: dicēs ꝙ ſiue ventoſe cū igne applicate fiant cū ſcarificatōe aut ſine iuuabūt ī hoc qꝺ dictū ē. Facte tñ cū ſcarificatiōe foꝛtioꝛes ſunt ī oībus ꝗꝫ in reſoluēdo ventoſitates. ¶ Notādū ē eiꝫ ꝙ per ſcarificationē fit maioꝛ attractio ⁊ euatio ſanguis. Sed facte ſine ſcarificatiōe foꝛtioꝛes ſunt in remouēdo vētoſitates frigidas: calido plus cōſeruato a quo fit frigide vētoſitatis reſolutio. Ubi vero vētoſitas foꝛet calida egēs īfrigidatione ⁊ igroſſatiōe cū per vētoſas cū ſcarificatiōe nō fiat tāta calefacto ſanguie exeunte ⁊ debilitāte calidum vētoſo etiaꝫ ſanguie euato ⁊ mēbꝛo aliquali īfrīdato: tūc cuꝫ ſcarificatiōe eēnt potētioꝛes: ſꝫ ſine ſcarificatōe potētes ſunt vt radicitus frīdas euent ſuperfluitates ī quocūqꝫ extiterīt loco. ¶ Quarto dicit ꝙ vētoſe ꝑti añterioꝛi coxaꝝ applicate cōferūt aꝑatibꝰ teſticuloꝝ diuertēdo mās fluētes ad teſticulos: ſic ēt cōferūt ꝓuocādo mēſtrua. Sꝫ appoſite ꝑti poſterioꝛi coxaꝝ iuuāt vlneribꝰ coxaꝝ ⁊ crurīū ⁊ aꝑatibꝰ ⁊ exituris natū. totū ē notū. Poſite vero ſub poplite. i. genu ꝯferūt pulſatōi qꝛ aꝑati ad qꝺ ſequit pulſatio genito ex humoꝛibꝰ calidis. Itē cōferūt malis exituris qꝛ ꝓuenientibus ex ſanguie malo aduſto. Itē vlceribꝰ putridis ꝓueniētibꝰ a mā ꝯſimili ī crure ⁊ pede ꝓpter ꝑaſſignatas cās. Sꝫ poſitas ſupꝛa duas alchaab. i. duas cauiculas ꝯferūt ſupple ī ꝓuocādo mēſtrua ⁊ remouēdo ꝓhibitionē menſtruoꝝ ad īferioꝛa. ſ. trahēdo ſanguinē. Cōferūt etiā ſciatice ⁊

UVA. BHSC. IyR_006_1

tice ⁊ podagre ſanguineis ſeu vētoſis ꝑꝑ cās aſſignatas.

Ventoſe aūt ſine ſcarificatōe qñqȝ ponunt̃ ꝓpterea vt mā a parte ſui mot⁹ trahat̃ ſicut cū mām̄illis ſupponunt̃ ideo vt curſus ſanguinis mēſtrui retineat̃. Et qñqȝ querunt̃ vt apoſtema ꝓfundū ad exteriora trahat̃ ideo vt medicamētuȝ ad ip̄ȝ ꝑueniat. Et qñqȝ requirunt̃ ꝓpterea vt āpa ad aliud mutet̃ mēbrū qđ ignobili⁹ ī viciniitate exiſtit. Et qñqȝ requirunt̃ ꝓpterea vt mēbrū caleſiat ⁊ ſanguis ad ip̄ȝ trahat̃ ⁊ ipſi⁹ reſoluant̃ vētoſitates. Et qñqȝ requirunt̃ ꝓpterea vt mēbrū ad ſuū nāleȝ locū reducat̃ a quo remotū fuit ſicut fit in ruptura iguinis. Et qñqȝ requirunt̃ iđ vt dolor ſedet̃ ſicut cū ſupponunt̃ vmbilico ī dolore colice vehemēter cogēte ⁊ in vētoſitatib⁹ vētris ⁊ ī dolorib⁹ matricis qui accidūt apđ motū menſtruoꝝ ⁊ ꝓprie ī adoleſcētib⁹: ⁊ ſuper laſſitateȝ partis exterioris coxe ſicut fit in ſciatica: ⁊ cuȝ timetur oſſis exit⁹ a iūctura ⁊ inter duas anchas proſunt duab⁹ anchis ⁊ duab⁹ partib⁹ iterioribus coxaꝝ ⁊ emoroidib⁹ ⁊ habēti rupturā inguinis ⁊ podagricis. Ventoſe quoqȝ ſuper nates poſite a toto corpore trahūt vt a capite ⁊ ꝯferunt inteſtinis ⁊ menſtruoꝝ ſanant corruptioneȝ ⁊ alleuiatur per eas corpus.

❡ Nunc determinat de diuerſitate ventoſaꝝ ſm̄ ꝙ ſūt cū ſcarificatōe aut ſine. Et p° facit hoc. 2° docet ſuccurrere qbuſdā nocumētis. ibi 2ª: locus ꝓterea. Pria ī duas. Nā p° tāgit operatōes ſine ſcarificatōe ventoſaꝝ. 2° cuȝ ſcarificatōe. 2ª ibi: ⁊ dicem⁹ quidē. Pria in tot quot operatōes ponit ventoſaꝝ ſine ſcarificatiōe. Pria eſt vt mā diuertat̃ a ꝑte ad quā mouet̃ ſicut cū mām̄illis apponimus vt fluxus ſanguīs mēſtrualis retineat̃. Qñqȝ ēt ponūt̃ vt mā apoſtemās in ꝓfundo attrahat̃ per ventoſam ad exteriora vt ſibi meli⁹ poſſit applicari medicamē. Qñqȝ aūt vt mā apta āpare trahat̃ ad mēbruȝ ignobili⁹ ſibi vicinuȝ vt cū ſupponim⁹ emūctorio vētoſaȝ vt mā diuertat̃ a mēbro pncipali. Qñqȝ aūt apponit̃ ventoſa ſupra mēbruȝ vt ip̄m calefaciat ⁊ trahat̃ ad ip̄m ſanguis ⁊ reſoluant̃ ventoſitates. Qñqȝ aūt ponunt̃ ventoſe vt mēbruȝ reducat̃ ad locū nāleȝ ſicut fit in ruptura īguinis deſcēdente īteſtino. nam apponit̃ vētoſa circa nates vt īteſtinū per attractioneȝ ſuperiora petat ⁊ ſequat̃ quedā ꝯtractio ⁊ mot⁹ ad ſuperiora. Qñqȝ aūt ponunt̃ vt ſedet̃ dolor vt ī colica ſupple vētoſa apponit̃ vmbilico ⁊ ꝯſimilr̄ in dolorib⁹ vētris ꝓueniētib⁹ a vētoſitate: ⁊ hec ventoſa illas attrahēte ⁊ carmināte vētoſitates: ⁊ ꝯſilr̄ in dolorib⁹ ꝓueniētib⁹ a vētoſitate apud cōmotionē mēſtruoꝝ ī iuuenculis. Dū eiȝ mēſtruū auget̃ agitatis materijs fit vētoſatio ⁊ dolor vijs ēt non ita latis exn̄tibus: apponūtur circa ꝑtē laxā. i. tenerā ⁊ mollē in exterior ib⁹ coxe ſicut in ſciatica dū timet̃ exitus a iunctura. Nā ventoſa trahēdo ⁊ exiccādo ē cā illius exiccatōis ſiue ꝯſumptiōis illius humiditatis. Ulteri⁹ dicit ꝙ vētoſe poſite īter duas anchas ꝓſunt duab⁹ anchis ⁊ partib⁹ duabus īteriorib⁹ coxaꝝ diuertēdo. ſ. ꝓſunt ēt emoroydibus ꝑ diuertēdo mās fluētes. Itē ꝯferūt hn̄ti rupturā iguīs. Cā ē aſſignata vt. ſ. inteſtina ſuꝑiora petāt. Cōferūt ēt podagre maxime diuertēdo. Ulterius dicit ꝙ vētoſe poſite ſupra nates trahūt a toto corꝑe qr̄ a differētijs toti⁹ corporis qr̄ ſuꝑioribus ⁊ inferiorib⁹: ī loco tñ plus inferiori exiſtētes plus a ſuꝑiorib⁹ dicūtur attrahere ⁊ diuertere. Itē conferunt inteſtinis diuertendo ventoſitatates ab eis: ſanāt etiam corruptionē menſtruorū ſupple prouocādo menſtrua vt ſanguis corruptus educatur. Alleuiatur etiā corpus per eas propter cauſas aſſignatas ⁊c̄.

Et dicem⁹ quidē ꝙ ī vētoſis cū ſcarificatōe tria exiſtūt iuuamēta. Primū eoꝝ eſt eūonis ex ipſo membro: ⁊ ſcđm eſt repoſitiōis ſubſtātie ſpiritus ne eūoneȝ humoris qui educit̃ ſequēdo euacuet̃: ⁊ tertiū eſt qm̄ nō curat̃ vt ex principalib⁹ membris fiat eūatio. Scarificatio vero eſt ꝓfunda vt ex profundo trahat̃.

❡ Supra poſuit iuuamēta vētoſarū ſine ſcarificatione: hic facit hoc idē cū ſcarificatōe: dicēs ꝙ ex ventoſis cum ſcarificatōe tria ſūt iuuamēta. ❡ Primū qr̄ ex ip̄o mēbro vētoſato eūatur mā: qđ primo pōt abſolute ītelligi cū ip̄a ventoſa mēbro applicet̃: cū etiā ſcarificet̃ vene mēbro appropriate. Scđo pōt intelligi cōꝑando ventoſas flōmie ꝑ quas vt in cōi vena flōmata nō ſic ꝓpria eūatur membri mā. ❡ Scđm iuuamētū ē qr̄ reponit̃ ſubſtātia ſpumoſa: vt ip̄a nō eūetur humorē ſequēdo eūatū: ⁊ hoc cōꝑādo ipſam flōmie. Nā nō ē dubiū quin per vētoſaȝ cū ſcarificatione ēt educant̃ ⁊ reſoluant̃ ſpūs. Uerūtñ qr̄ nō ſcarificātur vene ita magne vt ſunt ſolute ꝑ flōmiā quib⁹ etiā non magna quātitas ſpūum cōtinet̃: iđ ſic cōꝑando ꝑ ip̄ȝ ſubſtantia reponit ſpumoſa. ❡ Tertiū iuuamētū ē qr̄ nō curamus ī applicādo vētoſas timor ē ne fiat eūatio a principalib⁹ mēbris ſupple eas cōꝑando flōmie cum nō eūent a venis ita magnis: nec ſic ſint potētes in educēdo ſanguinē aut ſubſtātiā ſpumoſam. ❡ Ultimo dicit Aui. ꝙ ſcarificatio ꝓfunda fit vt a ꝓfundo trahat̃: nota ē cā: vel ſupple ēt vt mult⁹ ſanguis ⁊ cito educat̃: vel 3° mēbro exn̄te duro ⁊ mltū carnoſo cui⁹ venas ꝓfūdādo reꝑire poſſum⁹.

Locus ꝓterea vbi ventoſa adheret qñqȝ apoſtemat̃ ⁊ fit difficile ad ipſaȝ remouendā. Pānus ergo aut ſpōgia in aqua tepida īfuſa qua caliditati attineat ſumatur ⁊ cuȝ ea in circuitu fiat embroca. Et hoc quidē frequenter ꝯtingit cū ſuper mām̄illaꝝ partes ventoſas ponim⁹ vt ſanguis menſtruoꝝ fluxus ⁊ ex narib⁹ arceatur: quāobreȝ ſuper ipſas mām̄illas eas ponere non debemus. Cūqȝ locus ventoſe inunget̃ ꝓpe ipſaȝ ſuſpende ⁊ nō tardes ſed ad ſcarificāduȝ feſtina. Sitqȝ pria poſitio leuis ⁊ cito remoueat̃ ipſa: deinde ſecūduȝ ordinē tardetur ipſius remotio ⁊ tollerātia. Et oportet quidē vt vētoſatus poſt vnaȝ horā cibetur.

❡ Nūc docet ſuccurrere aliqb⁹ nocumētis. Et duo facit. Nā prio facit hoc qđ dictū ē. 2° quoſdaȝ ānectit cañ. ibi 2ª: īfans ꝓterea. Prima ī tres. Nā prio facit qđ dictuȝ ē. 2° modū applicādi vētoſas explicat. 3° tāgit horā cibādi poſt ventoſaȝ. ibi 2ª: cūqȝ loc⁹. ibi 3ª: ⁊ oȝ quidē. ❡ Primo dicit ꝙ qñqȝ locus vbi adheret ventoſa āpatur īquaȝ vera āpatiōe humore decurrēte ⁊ attracto malā cauſante ꝯplōnē ꝯpoſitionē ⁊ ſolutā cōtinuitatē. Aut ēt āpat̃ qr̄ tumeſcit ad moduȝ āpatis: quōcūqȝ āpetur difficile ē remouere ventoſaȝ carne tumēte replente ventoſaȝ vt fiat maior quātitas cōtēte carnis qȝ foraminis per qđ dȝ exire caro: iđ pānus infuſus ī aqua tepida ē applicādus aut ſpongia. Et nota bñ ꝙ fiat in circuitu embroca qđ medicamen laxādo carnē extrinſecā cuti erit cā cite remotiōis. Cōtingit aūt frequēter ſupple tale īpedimētū cū mām̄illis apponit̃ vētoſa vt cōſtringat̃ flux⁹ mēſtrualis: aut flux⁹ ex naribus. nā ſupple cū mām̄illares carnes ſint laxe ⁊ molles: iđ ventoſa illis maxime ē apta repleri propter qđ ſupra ip̄as mām̄illas non debem⁹ applicare ventoſas ſed ſub mām̄illis: vt vult Gal. 5ª affo. cōmento 5° illi⁹ affo. Mulieri mēſtrua ſi retinētur. Scđo dicit ꝙ cū locus cui applicāda eſt ventoſa vnget̃ ſuſpēde vētoſaȝ ꝓpe ⁊ nō tardes ſed feſtīa ad ſcarificandū. Fit aūt iſta iunctio ad ſubtiliandū ⁊ lenificandū cutē: ⁊ etiā mām humoralē leniēdū: ⁊ iđ in hn̄tibus cutē laxā ⁊ rarā iſta iunctio non cōuenit. Dȝ etiā feſtinare ad ſcarificandū ex quo ē facta diſpō partis: ⁊ primo leuiter applicet̃ ventoſa ⁊ cito remoueat̃: vt nō fiat ſubita ſȝ paulatina attractio: deinde tardet̃ ordinate remotio vētoſarū ⁊ ſuſtentatio eaꝝ vt ſupple cōpleat̃ toti⁹ humoris attrahēdi eūatio. ❡ Ultimo dic ꝙ certe oȝ vētoſatū cibare ꝑ vnā horā poſt ventoſitatē. i. tꝑe tāto vt mot⁹ quieſcat ⁊ ebullitio poſt ventoſam ⁊ corpus ſit debite quietatū.

Infans preterea ī tertio āno ventoſet̃ ⁊ poſt trāſactis duob⁹ annis quoniā prorſus nō debet ventoſari cū eſt vnius anni. In vētoſis quoqȝ fit ſecuritas ne materie ad inferiora deſcendāt. Et colericus quideȝ ventoſatus: poſt ventoſas comedere debet grana mali granati ⁊ ipſoruȝ ſuccuȝ ⁊ ſuccuȝ ſcariolarū cum ȝuccaro aut lacucas cum aceto.

❡ Nunc ponit aliquos cañ. Et diuidit̃ in tres ſm̄ numerū triū cañ. ibi 2ª: vētoſis quoqȝ. ibi 3ª: ⁊ colericis. Prio dicit ꝙ infans pōt vētoſari ī 3° āno: maxīe ſupple ſine ſcarificatiōe aut valde leuiter ſcarificādo. Iđ iā amplius fortificata virtute non nimiam ſpūum timendo reſolutionē ⁊ trāſactis ēt duob⁹ ānis poſt: qr̄ verſus tertiū pōt vētoſari ꝓpter cām ſupraſcriptā. Cū aūt ē vnius āni ꝓrſus. i. oīo nō dȝ ventoſari ꝓpter dolorē timēdo nimiā virtutis ꝓſtrationē: nimia etiā humoꝝ ſpūuȝ ſubtilitate timēdo reſolutionē. ❡ Cañ. ſcđus ē ꝙ per vētoſas ſuccurrat̃ ne materie deſcēdant ad īferiora. i. īteriora. Nā mēbra exteriora iuxta cōe vulgare ſuperiora dicūtur reſpectu īteriorū. Cū igitur vētoſe ab īteriorib⁹ trahat̃ ad exteriora: iđ ꝑ eas ſuccurrat̃ ne mā deſcēdat ad ip̄a. ❡ Terti⁹ cañ. ventoſat⁹ coleric⁹ poſt ventoſatiōeȝ comedere dȝ grana pomi granati ⁊ ſuccū ip̄oꝝ granatoꝝ granati īquā accetoſi aut muſci vt per frigiditatē eoꝝ ceſſet ebullitio ⁊ calefactio ex vētoſatiōe genite: aut ſuccū ſcariolarū q̄ ſcariola ē ſpēs endiuie. Eſt eiȝ endiuia que folia hȝ inciſa que frigida eſt: ⁊ refractiua ei⁹ qđ dictū ē. Debet aūt comedi cū ȝuccaro ad dulcorādū ip̄as ȝuccaro aliqualr̄ refouēte virtutē: aut ſumat lactucā cū aceto ꝑꝑ illud: cum hoc etiā colericā hēat refrenare māȝ. Cuȝ aūt vbi querim⁹ maiorē infrigidatōȝ cruda comedant̃ ⁊ nō cocta. Digerere tñ nō potēte virtute potius cocta comedant̃ aut faciliora digōni: ꝑ hoc alia ītelligēdo cōſimilia vt ſirupū acetoſuȝ orizaccarā ⁊ ſimilia. Uētoſato vero exn̄te fride cōplōnis ꝗzuis agitato per vētoſationeȝ ⁊ infrigidato tñ ꝓpter paucificationē caloris

Scias ꝙ vētoſarū quedā ſunt parue nō potētes multū attrahere: quedaȝ magne in quib⁹ ſit multa attractio ex eo ꝙ recipit maiorē quātitatē ſtuppe incēdēde que cuȝ accenſa fuerit ⁊ poſt extīcta fiet maior neceſſitas vacui ⁊ per ꝯñs multo fortius attrahēt: ⁊ de iſtis magnis credo ꝙ intēdat hic Auic. Similē ſniaȝ poſuit ēt Aui. xxjª tertij tractatu. iij. c. iiij. de cura fluxus mēſtruorū parapho illo: Deinde ponātur ventoſe ⁊c̄. Hoc ēt ꝯmemorauit Hyp. qnta particula affo. affo. illo: Mulieri mēſtrua ſi retineant̃ ⁊c̄. Et ſi vis alia ad ꝓpoſitū vide Galienum in cōmento: quare ⁊c̄.

Scias ꝙ vētoſe applicant̃ corpori cū ſcarificatōe ⁊ ſine ſcarificatōe. cuȝ ſcarificatiōe applicant̃ vt apoſtema vel mā apoſtematis ad ꝓfundū exn̄s trahat̃ ad exteriora aut a nobili ad ignobile mēbruȝ. applicant̃ etiā vt alicuius meatus ꝑmaneat apertio ſicut in ſqnātia. applicant̃ collo vt ſcribit Auic. nona tertij. c. xj. de cura eius parapho illo: Et cum deglutio ſit difficilis ⁊c̄. ⁊ ēt ad alias intētōes. Sine ſcarificatōe aūt applicant̃ pŕio vt mēbrū cui ſupponit calefiat ꝑ attractionē

ſanguis ⁊ ſpūs ad ipſum
⁊ vētoſitates reſoluant̄ in
eo: qn̄qꝫ vero applicātur
vt ſedet̄ dolor vt pꝫ in co
lica: vt idē Aui. dicit xvjª
tertij tractatu. iiij. c. ij. pa/
rapho illo: Et qn̄qꝫ ſuffi/
cit ponere vētoſas ⁊c̄. qn̄/
qꝫ aūt vt mēbꝛuꝫ ꝑmane/
at in ſuo vigoꝛe ſicut i iū/
ctura anche frequēter po/
nūtur: qn̄qꝫ vt reducat̄ vt i
ruptura inguinis: qn̄qꝫ vt
venenuꝫ ad exterioꝛa tra/
hat̄ ſicut in moꝛſu alicuꝰ
aīalis venenoſi: qn̄qꝫ poſt
remotionē ſanguiſugarū:
vltio vt mā diuertat̄ ⁊ ad
locū trahat̄ oppoſitū ⁊c̄.

calida ⁊ refouentia competunt vt poteſt compꝛehēdi ⁊c̄.

¶ Capitulū 22ᵐ de ſanguiſugis.

Indi dixerūt ꝙ in quarūdaꝫ ſanguiſuga/
ruꝫ nā exiſtit vētoſitas: ab eis igit̄ cauēdū
eſt que ſunt ex genere magna habētiū ca/
pita ⁊ quaꝝ coloꝛes ſunt antimoniales ⁊
nigre: aut quaꝝ coloꝛ eſt viridis: aut que
ſunt lanuginē hn̄tes ⁊ ſil'es mezameiç: ⁊ ſuꝑ quas exn̄t
fila coloꝛis azuli ⁊ quaꝝ coloꝛ ſimilat̄ madion. In oībꝰ
eiꝫ iſtis exiſtit vētoſitas ⁊ ꝓueniūt ex eis apāta ⁊ ſinco/
pis ⁊ ſanguis fluxꝰ ⁊ febꝛis ⁊ laſſitas ⁊ vlcera mala. Eas
quoqꝫ nō accipias ex aquis malis ī quibꝰ limus aluei eſt
niger ⁊ cenoſus ⁊ motꝰ ſtatiꝫ turbat aquā ⁊ fetet: ſꝫ illas
elige q̄ ī aquis colligūt̄ ocalibus tobabiatu ⁊ ī quibꝰ mo
rant̄ rane. Neqꝫ attēdas illō qō quidā dicūt ꝙ ſi ſint in
aquis vbi moꝛant̄ rane ſunt male. Sitqꝫ eaꝝ coloꝛ ſil'is
rei ſuꝑ quā exiſtit viriditas ⁊ tēdant̄ ſuꝑ eas fila duo co
loꝛē arſenici hn̄tia ⁊ ruffe rotūde que ſūt coloꝛis epatis.
Et ille q̄ ſimilant̄ parue locuſte ⁊ q̄ caude muris ſimiles
exn̄t ⁊ minute parua hn̄tes capita oēs iſte eligēde ſunt.
Et nullas magis eligas q̈ꝫ hn̄tes ventres rubeos ⁊ doꝛ
ſuꝫ viride ⁊ p̄cipue ſi ex aquis fuerint currentibꝰ.

¶ In p̄cedēti capl'o Aui. determinauit de eūatiōe fiēda
ꝑ vētoſas: nūc in iſto capl'o determīat de eūatione fiēda ꝑ
ſanguiſugas. Et pꝛimo docet eligere bonas ſanguiſugas
euitādo malas. 2° exequitur de euacuatōe earum deter/
minādo. ibi 2ª: extractio pꝛeterea. Pꝛima in duas. Nam
pꝛimo nominat malas ſanguiſugas. 2° bonas. ibi 2ª: ſꝫ il/
las. De pꝛīa parte dicit ꝙ indi dixerūt quaſdā ſanguiſu/
gas eē nāe venenoſe a quibꝰ ē cauēdū hn̄tes. ſ. capita ma/
gna coloꝛis antimonialis ⁊ nigri aut viridis coloꝛis: ⁊ ha/
bētes lanuginē ſil'em mezameiç: qꝛ cuiuſdā herbe hn̄tis co
loꝛē nigrū viridi cōmixtū ſupꝛa quas īcedūt fila nigri co/
loꝛis ſeu azurli: quarū ēt coloꝛ aſſimilat̄ madion. i. auibus
diuerſoꝝ coloꝝ: aut bꝛeuiter aui viridi tēdenti ad blauiū
que vocat̄ plūbiola: nā in oībus his ē venenoſitas: ⁊ faci/
unt apāta: ſincopiꝫ: fluxū ſanguīs: febꝛē: ⁊ coꝛpoꝝ laſſita/
tem: ⁊ mala vlcera. Sanguiſugas etiā n̄ accipias ex aquis
malis quarū limus aluei ē niger ⁊ cenoſus que ſtatim tur/
bant̄ ⁊ fetēt per motū: ſed elige illas que reꝑiunt̄ in aquis
ocalibus ſupple ⁊ hn̄tibus tobabiatū. i. vt puto hn̄tibꝰ ta/
biū ⁊ in quibꝰ ſtant rane. Unde nō attēdas dictū aliquoꝝ
dicentiū illas ſanguiſugas eē malas que degūt in aquis
ranaruꝫ quaꝝ ſanguiſugaꝝ coloꝛ aſſimilat̄: ac ſi ſupꝛa eas
tendant̄ duo fila hn̄tia coloꝛē arſenici que ſūt ruffe rotū/
de coloꝛate coloꝛe epatis ſimiles ꝑue locuſte: ſil'es ēt cau/
de muriuꝫ ⁊ minute ꝑua capita hn̄tes. Nulle tn̄ magis eli
gant̄ q̈ꝫ rubee ſm̄ vētrē ⁊ virides ſm̄ doꝛſuꝫ: ⁊ pꝛincipalr̄
ſi inueniant̄ in aquis currētibus: ⁊ hoc ſufficit ꝓ pꝛeſenti.

¶ Pꝛo partibꝰ nota pꝛīo ꝙ ſanguiſugarū in lr̄a poſitaꝝ
bonitas ⁊ malitia plus per exꝑientiā q̈ꝫ per rōnem cogno/
ſcunt̄. Aliqualis tn̄ rō pōt aſſignari. Nā hn̄tes capita ma/
gna eo ꝙ foꝛtiter ſoluēdo cōtinuū ſe etiaꝫ ſuggēdo ꝓfun/
dāt: iō male ſunt. nigrū aūt aut viridē aut blauū hn̄tes co
loꝛē ꝓ quāto cōpꝛehendunt̄ eē genite ex mala aduſta mā:
iō tanquā male euitāde ſunt. ¶ Scdo nota eas eē vene/
noſas cū ex putridis ⁊ venenoſis ſunt genite nutrimentis
faciētes apāta. Pꝛimo ꝑ earū graues moꝛſuras ⁊ attra/
ctiones. īferētes etiā ſincopim earum venenoſitate cōica/
ta coꝛdi: faciētes ēt ſanguīs fluxū. ſ. ſuꝑfluētē debilitādo
cōtentiuā virtuteꝫ ꝑtis moꝛſe. p̄° per moꝛſuꝫ. 2° ꝑ malaꝫ
ꝯpl'onē manifeſtā: aut occultā illi parti cōicatā. faciūt etiā
febꝛē: aut pꝛīo agitādo ⁊ inflāmando ſpūs: febꝛē effimeraꝫ
cāndo aut putridos inde cōicando vapoꝛes vt putrida fe/
bꝛis inde generet̄ huius aut illiꝰ humoꝛis ſm̄ eiꝰ putredi/
nis diſpōeꝫ. Laſſitatē ēt coꝛpoꝛis ⁊ debilitatē faciūt quia
laſſuꝫ ⁊ fatigatū faciūt aggrauādo malā ꝯpl'onē cauſan/
do: faciūt ēt fluxū ſanguīs ſuā etiā venenoſitatē coꝛdi cō/
municādo: cānt ēt mala vlcera ābulatiua cū ꝓpter ſangui
ſuge malitiā ī ꝑte moꝛſa ſit ſanguis malignatꝰ. ¶ Tertio
nota ꝙ ex aquis malis de quibꝰ ī lr̄a ponit̄ nō ſunt eligen
de ſanguiſuge cū cōſtet eas ex putridioꝛibꝰ ⁊ malignioꝛi/
bus eē genitas nutrimētis. ¶ Quarto nota ꝑ aquas oca/
les Aui. ītelligit aquas aptas velocitati. Et dicūtur oca/
les ab ocus oca ocū qō idē ē qō citus cita citū: inde ociꝰ. i.
citius. ¶ Ulteriꝰ nota ꝙ ī aquis reꝑit̄ herba que dicitur
lētigo aque q̄ ſuꝑnatat aque qua nutriūt̄ anates ſeu paue/
ri iuuenes ī qua ēt multū delectant̄ rane. Reperit̄ ēt vna
alia que vocat̄ tabiū magis ſtās circa ꝓfundū: ex qua etiā
multū delectant̄ anſeres. Ad ꝓpoſitū qꝛ in iſtis aquis re/
periunt̄ herbe ⁊ nutrimēta cōia aīalibꝰ ꝑfectis: iō he aque
nō ſunt ex toto male. ¶ Ulteriꝰ nota ꝙ per ranas Aui. in/
telligit ranas virides ⁊ nō ranas diuerſoꝝ coloꝝ buffoni/
bus ſimiles: nec ēt ranas magnas ⁊ groſſas que buffonibꝰ
ſimilant̄: quaꝝ viridiū vt bonaꝝ crura a tuſcis cōiter co/
medunt̄. Et nota ꝙ he melioꝛes faciūt ſanguiſugas eo ꝙ
rane nutriētes ſe ſuꝑfluitatibꝰ aquaꝝ illas aliqualr̄ mūdi/
ficant. Scdo ēt ⁊ meliꝰ ex quo ibi moꝛant̄ ille rane que nō
ſunt venenoſe nec male: ſignū ē aquas illas nō eſſe malas
nec venenoſas ex toto. Et notanter dicit̄ ex toto qꝛ ꝓ fir/
mo hētur ꝙ aqua ī qua cōiter inueniūtur rane ſanguiſu/
ga ēt ē mala: īmo ⁊ illa ī qua reꝑitur āguilla cū illa. Oīa ge
nerant̄ ex ſatis notabili putrefactiōe. Bonitas aūt illaruꝫ
de quibꝰ in lr̄a ponit̄ cōpꝛehēdit̄ experiētia. Quare tn̄ ex
aquis currētibꝰ ſunt melioꝛes: cā eſt qꝛ iſte aque ſunt me/
lioꝛes ⁊ mūdioꝛes: vt pꝫ 2ª pꝛimi. c. de aqua.

Extractio pꝛeterea ſanguinis a ſanguiſugis facta ꝓ
fundioꝛ eſt extractōe que fit cuꝫ ventoſis.

¶ Nunc Aui. determīat in ſpāli de extractiōe ſanguīs
cū ſanguiſugis: ⁊ pꝛīo ponit quādā cōꝑatione īter eūatiōꝫ
ſanguiſugaꝝ ⁊ vētoſaꝝ. 2° ponit aliqua attendenda circa
quaſdā ſanguiſugas. ibi 2ª: ⁊ ip̄e quidē. Pꝛīo dicit ꝙ ſan
guiſuge ꝓfundiꝰ extrahūt ſanguinē vētoſis. ¶ Nota ꝓ
ꝑte ꝙ quāuis vētoſe abſolute trahāt a ꝑte ꝓfundioꝛi ſan/
guiſugis: vt notat exꝑiētia. Et cā ē nota. p̄° qꝛ ventoſe ne
det̄ vacuū attrahētes foꝛtioꝛes ſūt ī attrahēdo ſanguiſu/
gis a ſua attrahētibꝰ virtute: etiā qꝛ ſcarificationē ꝓfun/
dam ꝯtingit eē īmediate: tn̄ ſanguiſuga ſe magis ꝓfundat
ī attrahēdo q̈ꝫ vētoſa: ſanguiſuga annectit ſe poꝛoſitatibꝰ
īterioꝛibꝰ mēbꝛi ſoluēdo venā aut oꝛificiū eius: vētoſa aūt
īmediate ſe applicat parti exterioꝛi.

Et ipſe quidē antequā ponant̄ quaſi per vnā diem
colligende ſunt ⁊ conſtrictiōe faciendū eſt vt euomāt do/
nec qō in earū exiſtit ventribꝰ egrediat̄ ſi hoc fieri pote/
rit. Et ipſis parū ſanguinis agni aut alteriꝰ rei ꝓijcia/
tur vt inde nutriant̄ antequā ponant̄: deinde ſumātur
⁊ earuꝫ viſcoſitas ⁊ ſoꝛdities cū aliquo qō ſit vt ſpongia
mundent̄. Locus pꝛeterea vbi ſunt apponēde cuꝫ bau/
rac lauet̄ ⁊ fricatione rubificet̄: poſteaquā volūtas appo
nendi ſanguiſugas affuerit in aquā pꝛoijciant̄ dulceꝫ ⁊
emūdentur: deinde apponātur.

¶ Ponit aliqua obſeruāda circa ſanguiſugas: ⁊ pꝛimo
facit hoc. 2° cuidā docet ſuccurrere nocumēto. ibi 2ª: ꝙ ſi
ſanguis nō cōſtringat̄. Pꝛīa in duas. Nā pꝛīo oñdit qd
ſit faciēdū añ applicationē earuꝫ. 2° quid poſt. ibi 2ª: cūqꝫ
hoc fuerit plene. Pꝛīa ī duas. Pꝛīo Aui. docet boniface/
re ſanguiſugas: docet ēt diſponere locū cui ſūt applican/
de. 2° ponit quoddā remediū quo ſanguiſuge loco appli/
cent̄. ibi 2ª: ex eo aūt. Pꝛīa ī tres. Pꝛīo docet remouere
nocumēta ab eis remouēdo aut abijciēdo malas. 2° eas bo
nificat ex ꝑte nutrimēti. 3° docet p̄parare locū vbi ſūt ap
plicāde. ibi 2ª: ex eis parū. 3ª ibi: locus p̄terea. Pꝛimo di/
cit ꝙ ſanguiſuge ātequā apponātur ſunt colligēde ꝑ vnū
diē ante: ⁊ eas cōſtringēdo vomere faciamꝰ vt egrediat̄ in
earū ventribꝰ cōtentū: notū ē totū: deinde det̄ eis de ſan
guine agni aut arietis: aut de alia re bona vt nutriāt̄ ex il
la añquā ponāt̄: deide ſumant̄ ⁊ eaꝝ viſcoſitas remoueat̄
cū aliquo qō ē vt ſpōgia. Cā huiꝰ vltimi ē. nam p̄° dꝫ vi/
ſcoſitas remoueri ne nimis adhereāt ⁊ ſint valde diffici/
lis remotiōis. Soꝛdities ēt ē abijciēda ne ſoꝛdidet ⁊ īficiat
ꝑtē cui apponit̄. Etiā locus cui apponit̄ dꝫ lauari cū bau/
rach. i. cū quodā ſale. nā baurach eſt ſpēs ſalis: ⁊ fricādo
fiat illa pars rubea: deinde cū volueris apponere ſanguiſu
gas pꝛoijce eas in aquā dulcē ſupple clarā ⁊ mūdā: deīde
pone eas ſupple mūdas ⁊ bene purgatas. Per dulcē illā
intelligēdo aquā in qua nō ē notabilis ſapoꝛ: hic eniꝫ ē cō
munis modus vocādi aquā dulcem. Cā autē talis lotiōis
⁊ rubificationis eſt qꝛ attrahat̄ ſanguis ad cutē vnde po/
terit melius ſanguiſuga attrahere.

Scias ꝓ iſto ca/
pl'o ꝙ medici in ſuo
opere apponunt ſan
guiſugas potiſſimuꝫ
ꝑꝑ tria. Pꝛīo appo/
nunt vbi flōmia fieri
non pōt nec ventoſe
poſſūt apponi. 2° qꝛ
 īnueniūnt̄ aliqui qui
abhoꝛrēt extractiōeꝫ
ſanguīs per flōmiaꝫ
⁊ vētoſas. 3° qꝛ ali
qn̄ volumus eūare a
loco medio non ni/
mis ꝓfundo: qre ⁊c̄.

Ex eo autēꝫ qō eas efficit volūtarias ad ſe ſuſpēdē
dum eſt vt locus luto liniat̄ aut ſanguine.

¶ Ponit aliū cañ. dicēs vt adhereāt ſanguiſuge qꝛ de/
bes linire locū cui debēt ſuſpendi ſanguiſuge luto aut ſan
guine qꝛ hoc facit eas eē volūtarias ad ſuſpēſionē. ¶ No
ta ꝙ aliqn̄ ſanguiſuge reſpuūt ſe ſuſpendere parti ꝓpter fe
toꝛeꝫ aut maliciā partis: aut qꝛ non ꝑcipit obiectuꝫ ꝯueni/
ens reſiſtēte cute. Linire ergo cutem aliquo obiecto ꝯue/
niēti vt luto ⁊ ſanguine vt adhereat ſanguiſuga vt obie/
ctum ꝯueniens exequat̄.

Cūqꝫ he fuerint plene ⁊ eas pꝛoijcere volueris pul
ueriza ſuper eas paruꝫ ſalis aut cineris aut baurac aut
ſete cōbuſte aut lini aut ſpongie cōbuſte aut lane cōbuſte
⁊ cadent. Et melius quidē eſt vt poſtquā cadūt locꝰ vē/
toſa ſugat̄ ⁊ ex ſanguine loci parūper accipiat̄ vt moꝛ/
ſure ipſaruꝫ malitia remoueatur.

¶ Oſtēdit quid faciendū ſit poſt appoſitōeꝫ eaꝝ: dicens
ꝙ cū iſte fuerit plene ſupple qꝛ ꝯtraxerūt multū de ſangui
ne ⁊ ſufficiēter ⁊ volueris remouere eas: tūc ꝓijce ſuꝑ eas
paruꝫ

paꝝ ſalis aut cineris aut determinati ſalis: q: baurac aut ſete ꝯbuſte aut lini aut ſpongie ꝯbuſte aut lane ꝯbuſte: naꝫ tūc cadent. ¶ Sc̄do dicit ꝙ meliꝰ eſt vt poſt ſanguiſugas ſugat̄ locus cui apposite fuerūt cū vētoſa vt accipiat̄ paꝝ de ſanguine loci morſi vt remoueat̄ malitia morſure ſanguiſuge. ſ. ꝑ remotōeꝫ huiꝰ eūati ſanguis. ¶ Nota ꝓ ꝑte ꝙ ſanguiſuga aliqñ multū adheret: q: eſt valde auida ī attrahendo: ⁊ inde nocumentū ſequit̄ q: euacuat etiā de ſanguine meliori. Scias ergo ꝙ omīa pūgitiua ⁊ diſſoluētia ſanguinē remouēt eā a loco cui adheret. ¶ Nota ēt ꝙ locus merito eſt vētoſa ſugēdus. nam ſanguiſuga malignat quātūcūqꝫ ſit bona: vt ergo remoueat̄ hec malitia parum ſanguinis ſugēduꝫ eſt cū ventoſa.

Qd̄ ſi ſanguis non ꝯſtringet̄ galle cōbuſte aut calx aut cinis aut tegula ꝯbuſta ⁊ ſubtilr̄ puluerizata ſuperponat̄ aut reliqua ab iſtis ex eis que ſanguinē ꝯſtrigūt. Et hec quidē opꝫ vt ſint apud eum preparata qui ſanguiſugas apponit cū ipſe ſe ſuſpēdant. Appoſitio preterea ſanguiſugaꝝ cōfert egritudinibꝰ ſubcutaneis ſicut ſahaf ⁊ alcuabe ⁊ eis ſimilia.

¶ Nunc Aui. docet vni ſuccurrere nocumēto: dicēs ꝙ ſi ſanguis poſt remotōeꝫ ſanguiſuge nō ꝯſtringat̄: tūc galle ꝯbuſte ſubtilr̄ trite aut calx aut cinis vel tegula cōbuſta ſuꝑponant̄: aut ſimilia ex ꝯſtringētibꝰ ſanguinē q̄ parata ſunt apud ponētes ſanguiſugas cū ipſe ſe ſuſpēdūt. Ultimo īfert vtilitatē ſanguiſugaꝝ: quaꝝ appoſitio morbis cōfert ſubcutaneis ſicut ſahaf alcuabe ⁊ ſimilibꝰ. ¶ Pro ꝑte nota ꝙ poſt remotionē ſanguiſugaꝝ aliquotiēs fluit multꝰ ſanguis: vt ī vno ſocio vidi cui ſe balneāti ī aqua adheſit ſanguiſuga circa teſticulos a quo tātus ſanguis exiuit vt putaret amiſiſſe teſticl'os. Cuiꝰ cā eē potuit apertio orificij vene ſatis magne vel malitia morſure aut venēoſitas: aut q: vehemēter ſanguis ꝯtētiua fuit debilitata vt multus inde flueret ſanguis. Ex quo pꝫ cā quare facta ſcarificatōe nō tantꝰ fluit ſanguis quātꝰ fluit multotiēs poſt appoſitōeꝫ ſanguiſugaꝝ: q: cā eſt malitia ꝯpl'onis aut venenoſitas debilitās partē. ¶ Sc̄do nota ꝙ remedia q̄ in ꝑte ponunt̄ ꝯferūt aut ſtipticādo ⁊ ſic claudēdo viā ꝑ quā dꝫ venire ſanguis: vt galle ꝯbuſte ⁊ tegula ꝯbuſta ⁊c̄. aut cauſticādo ⁊ corticē generādo vt calx ⁊c̄. ¶ Ulteriꝰ nota ꝙ he ſanguiſuge ꝯferūt ſahaf ⁊ morbis ſubcutaneis cū īmediate educāt hanc mām ſubcutaneā. Sahaf enim ſunt rubores puſtuloſi. Alcuabe ſūt loca nigra melācolica ad ſanandum difficilia: vt littera notat exterior.

¶ Cam 23m de retentōe eoꝝ que euacuant̄.

e

Ea q̄ eūant̄ retinēt̄: aut ꝑꝑ mãe iclinatōeꝫ abſqꝫ alia eūone: aut ꝑꝑ iclīatōeꝫ cū alia eūone: aut ꝓpterea ꝙ ipſamet eūatio iuuat̄: aut medicis īfrigidātibꝰ: aut ſtipticis: aut viſcoſis: aut adurentibꝰ: aut ſtrictura.

¶ Nunc Aui. exequit̄ ponēdo cañ. circa retētioneꝫ eoꝝ q̄ ſuperflue eūant̄ ⁊ maxie circa retētōeꝫ ſanguis: ſicut eiꝫ ſuperiꝰ determiauit de eūone per farmacū: deinde ēt poſuit cañ. circa retentōeꝫ eūonis ſuperfluētis: ſic ⁊ hic determiato de eūone ſanguis habuit determīare de retētōe eūonis ſuꝑfluētis. Et diuidit̄ pñs capl'm ī tres ꝑtes pricipales. Prīo Aui. ꝑmittit modos retētōis eūonis. 2o illos declarat. 3o oſtēdit ītentōes q̄ hñt in retentiōe eūonis. ibi 2a: ⁊ retētio qdeꝫ. ibi 3a: ⁊ dicemꝰ. ¶ Dicit p̄o ꝙ ea q̄ eūant̄ retinent̄: aut īclinādo: aut deriuādo māꝫ ſupple a parte a qua declinat ad partē aliā: ⁊ hoc aut eūando aut nō eūando: aut retinet̄ eūatio augendo ⁊ iuuādo eūoneꝫ: aut retinet̄ per medicinas infrigidātes aut ſtipticas aut viſcoſas aut adurētes: aut vltīo per ſtricturaꝫ ꝑtis. ¶ Nota ꝓ ꝑte ꝙ cañ. hic poſiti differunt ab aliqbꝰ ſuperiꝰ poſitis: q: iſti ſunt cōes ad quācūqꝫ eūoneꝫ retinendā quāuis maxie intelligat̄ ꝓ ſanguis retentōe: ibi aūt maxie attendunt̄ ꝓ intentōe eūonis ꝑ farmacū. ¶ Sc̄do nota ꝙ ⁊ ſi per apitiua retinet̄ fluxus reducit̄ tñ hec retētio ad aliquē modū retētionis dictoꝝ. Nā ſi fiat fluxus vētris ꝑꝑ oppilatōeꝫ apetitiua aperiēdo ⁊ d̄riuādo mās ad vias vrine retinet fluxū aut augēdo eūonē ꝑ ꝑtē eādē. Uel dicēdum ꝙ apitiua nō de ꝑ ſe remouēt fluxū ſꝫ de ꝑ accñs: nō eiꝫ opponūt ſe fluxui q: mãe opponāt ſe: ſꝫ remouēt aliqd̄ vt oppilatōeꝫ: ꝑꝑ cuiꝰ pñtiā ſeq̄bat̄ fluxꝰ. ¶ Nota vlteriꝰ ꝙ hoꝝ retinētiuꝫ eūones talis pōt dari ſufficiētia. Naꝫ exñte fluxu aut mā eſt ī fluxu ad ꝑteꝫ per quā eſt fluxꝰ: aut mā eſt ī parte ī qua vel ꝑ quā ē fluxꝰ. ſi mā eſt ī fluxu ⁊c̄. aut fit retentio diuertendo māꝫ ne fluat per illā ꝑteꝫ eūando. ſ. illā māꝫ ꝑ ꝑteꝫ aliā: aut nō eūando: ſꝫ ipaꝫ ꝑ alias diſꝑgēdo ꝑtes: ⁊ ſic habemus duos modos retētōis q ponūt ī principio. ſ. ꝑ iclinationē materie ad partē aliā a ꝑte ī qua ſeu ꝑ quā fit fluxus. Et hoc aut abſqꝫ alia eūatiōe: ⁊ ſic habemꝰ primū modū. vel cū eūatiōe alia: ⁊ ſic hēmus ſc̄dm modū: quoꝝ modorū exēpla ī ſequētibꝰ ponā. Si vero mā ſit fluxa ⁊ ñ mobilis ad partē: tūc aut retinet̄ iſta eūatio eūando illā mām que ē cā fluxꝰ: ⁊ ſic retinet̄ iuuādo aut augēdo fluxū: ⁊ ſic hēmus tertiū modū q: retētio fit dū ipamet eūatio iuuat̄. Fluxus eiꝫ fluxu retinet̄ ⁊ vomitꝰ vomitu 16a tertij. c. de cura fluxus oīum modoꝝ. Aut fit retētio īmobilitādo materiā ipam ⁊ ingroſſando ſiue ſit mobilis ad ꝑtē ſiue ſit in ꝑte cōtenta: ⁊ ſic hēmus quartū modū retētiōis ꝑ infrigidātia. Aut fit retētio ꝯſtrigēdo vias per quas fluētes debēt trāſire mãe: qd̄ fit prīo ꝑ cōſtipātia cōſtringētia vniēdo vias: aut hoc fit cōiungēdo ꝑtē ſolutā ꝑti nō ſolute faciēdo etiāꝫ mā adherere: que ītentiōes cōplent̄ ꝑ viſcoſa. Aut fit iſta retētio ex parte ſupra orificiū apponēdo ⁊ generando aliqd̄: que intētio cōplet̄ per adurētia ⁊ cauſticātia corticē ſeu cruſtaꝫ generātia in ſuperficie membri. Aut vltimo prohibetur fluxus artificialiter materie tranſituꝫ ꝓhibendo vt conſtringendo.

Scias ꝙ in retentiōe ⁊ maxie fluxus modoꝝ oīuꝫ ꝯueniunt iſte ītētōes. Pria eſt diuerſio ſine euacuatōe que fit per vētoſas ⁊ fricatōes ⁊c̄. huiuſmōi: ⁊ cū euacuatōe q̄ fit ꝑ ꝓuocatōem vrine vel ſudoris vel vomitꝰ ⁊ ēt ꝑ flōmiā vel ventoſas cū ſcarificatōe ⁊c̄. 2a ē eūatio que cōtingit fieri ꝑ farmaciaꝫ. 3a ē igroſſatio ⁊ imobilitatio mãe que ꝯpleri poteſt per frigida ⁊ narcotica. 4a ē ſtipticatio que fit ꝑ medicinas ſtipticas. 5a eſt iuiſcatio ſiue glutinatio que ꝯplet̄ per ſimiles medicias: ⁊ hoc ꝓprie ꝯuenit qñ eſt ſolutio ꝯtinui vel fractura. 6a ē cauſticatio ⁊ aduſtio que ꝯplet̄ ēt cū cauſticis ⁊ adurētibus. 7a pōt eſſe clauſura que ꝯpleri pōt aliqñ cū ligatura ⁊ cū adherētibus ad foramē vie ſiue cū pili leporis apponunt̄ in foramine artarie ad reſtringendū fluxuꝫ ſanguis: ⁊ ī fluxibus vētris exhibemꝰ genera gūmi aut dragagātuꝫ gūmiarabicuꝫ: maſticeꝫ thus ⁊ alia huiuſmodi que hēant adherē orificijs venaꝝ ītеſtīnoꝝ ⁊c̄.

Et retētio quidē eūonis ꝑꝑ attractōꝫ ſine alia eūone ē ſicut appoſitio vētoſaꝝ ſuꝑ mamillas facta ad hoc vt ſanguis fluxus ex matrice ꝓhibeat̄: ſed melior attractio ē cū qua exiſtit ſedatio doloris illiꝰ a quo trahit̄.

¶ Nūc Aui. exequit̄ de iſtis modis retētionū. Et diuidit̄ in tot quot modos ponit retētionū. ibi 2a: eūatiōis quipē. ibi 3a: ⁊ medicine. ibi 4a: ⁊ ſtiptice. ibi 5a: ⁊ adurētes. ibi 6a: ſed eiꝰ quidē. Prima ī duas. Prīo determīat de retētione ꝑ inclinatiōeꝫ ſine alia eūatiōe. 2o de retentiōe que fit cū alia eūatiōe. ibi 2a: in ea quidē. ¶ Prīo dicit ꝙ retētio eūatiōis ꝓpter attractionē ſupple aut inclinationeꝫ ad ꝑtē aliā non aliter eūando ē ſicut appoſitio vētoſaruꝫ ſub mamillis ad hoc vt retineat̄ fluxus matricalis. Melior tñ īclinatio ⁊ diuerſio ē que fit ſedato dolore ꝑtis a qua trahitur. ¶ Pro ꝑte nota ꝙ appoſitio vētoſaꝝ in hoc cāu ītelligi pōt. ſ. ꝙ ponātur vētoſe ſupra mamillas: q: in loco pectoris exñte ſupra radicē mamillaꝝ ⁊ ñ ſupra mamillas ꝓpter cām dictā ī capl'o de vētoſis. 2a fit appoſitio ⁊ melior ē apponēdo vētoſas ſub mamillis: vt vult Gal. cōmento allegato 5a affo. ꝯmēto 51o: ⁊ tūc exponit̄ ſupra mamillas. i. circa mamillas. ¶ Sc̄do nota ꝙ cū vene ſanguinē deferētes ad mamillas colligate ſint venis ad matricē ſanguinē deferētibꝰ vt notat anothomia: iō vētoſe mamillis appoſite aut ſub mamillis ꝑ illas attrahēdo venas inclinant mām ad ꝑtē oppoſitā. ¶ Tertio nota ꝙ īclinatio ad ꝑtem oppoſitā ſine alia eūatiōe in quibuſdā caſibꝰ fieri pōt. Primus cāus ē nō exñte repletiōe totiꝰ: īmo potiꝰ quaſi inanitiōe vt mā que īclinat̄ ſeu diuertit̄ locū hēat ad quē. ſ. poſſit inclinari vt etiā mēbrū ad qd̄ īclinat̄ mā repellēda nō ex toto reſpuat hāc mām declinādā. Sc̄ds cāus eſt materia declinādа exñte pauca que declinata ⁊ diſꝑſa per mēbra poſſit a mēbris ſuperari. Tertiꝰ cāus ē qñ hec mā nō fuerit vehemēter aut īpetuoſe fluens: q: mām īpetuoſe fluētē nō poteris aliter q̄ꝫ eūando ſufficiēter declinare. Quartus cāus ē: mā nō exñte furioſa ita vt eiꝰ retentōe ñ timeat̄ nocumentū ī toto. Quintꝰ cāus ē: virtute exñte debili nō tollerāte aliā eūationē. Ultimo ex ꝑhabitis memoranduꝫ ꝙ cū dolor attrahat melius ē ipm priꝰ ſedare tāquā rē ꝓhibentē vt fiat debita inclinatio.

Et ea quidē q̄ fit ꝓpter attractionē que ē cū eūone eſt ſicut flōmia baſilice facta ꝓpter hoc: aut retentio vomitus fluxui vētris: aut fluxus ventris vomitui: aut vtrorūqꝫ retentio ꝓuocatione ſudoris.

¶ Nunc determīat de retētiōe ꝑ inclinationē que fit cū alia eūatiōe: dicēs ꝙ retētio facta per īclinationē cuꝫ alia eūatōe ē ſicut flōmia baſilice ꝓpter hoc facta: aut ſicut retentio vomitꝰ per fluxū vētris aut ecōtra: aut ſicut vtrorūqꝫ retētio ꝓuocādo ſudorē. ¶ Pro ꝑte nota ex dictis ꝙ exñte repletiōe ī toto. 2o multa ⁊ furibūda fluēte mā. 3o mā exñte furioſa. 4o etiam ꝯſtāte virtute diuertēdū ē euacuādo mām. Dictoꝝ cā pꝫ ex dictis ī parte ꝑhabita. ¶ 2o nota ꝙ flōmia baſilice vt colligitur 10a tertij: ⁊ a Meſue in ſuo d̄ appropriatis ī. c. de cura fluxꝰ ſanguis cōfert ī ſputo ſanguis eūando a pectore ⁊ diuertēdo ſanguineꝫ a fluxu. Aliud quod ponitur in exemplis notū eſt.

Et eūonis quidē iuuamētū ē ſicut ſtōaci ⁊ ītеſtinorū mūdificatio ab hūoribꝰ viſcoſis malis labere faciētibꝰ cū pigra ⁊ ſicut ſtudiū qd̄ adhibet̄ ad os ſtōaci mūdificādū vomitu ꝓpter iciſioneꝫ materie vomitꝰ māſiue.

¶ Determinat de retentiōe que fit augēdo ſiue vigorādo eūoneꝫ quā volumꝰ retinere: dicēs ꝙ iuuamentū euacuatōis. ſ. aucte ⁊ vigorate ī retinēdo. ſ. eūoneꝫ ē ſicut mūdificatio cū pigra aut ierapigra ab humoribꝰ viſcoſis faciētibꝰ fluxū ſicut ēt ſtudiū adhibitū ad mūdificādū os ſtomaci ꝑ vomitū quo eūat̄ iciſa mā māſiua. ¶ Pro ꝑte p̄o nota ꝙ eūatio vigorat̄ vel auget̄ ꝓ retinendo fluxuꝫ in quibuſdaꝫ caſibꝰ vbi ſit mā in mēbro ꝯtenta ⁊ nō fluens q: in corꝑe manēs que ſit cā fluxus. Exēpli cā: qs hꝫ humores ī ſtomaco qui ſui viſcoſitate faciūt cibū lubricare: aut etiā hꝫ in īteſtinis colerā cōmixtā flegmati tenaci ⁊ viſcoſo q̄ ſtimulādo virtutē ⁊ excoriādo ē cā fluxꝰ ſanguis: tūc cum

Pro cauſis autē eūonis aucte lege Aui. ī ſc̄da huius doctrīa ſc̄da ſūma prima. c. xvij. paragrapho illo: Eūatio auteꝫ. Et ꝓ iuuamentis lege Meſue in ſuo de ꝯſolatiōe intētione tertia. c. iij. paragrapho illo: Auxiliabimur ergo ⁊c̄.

UVA. BHSC. IyR_006_1

remota cā remoueaꝛ effect⁹ augēdus ē flux⁹ aut vigorandus dictā educēdo mām. ¶ Hic tñ notādū ē euatione augeri aut vigorari reſpectu eiuſdē materie cū intēdis etiaz fluxū retinē aut reſpectu alteri⁹. exēpli cā: aliquotiēs euacuando coleram aut flegma viſcoſum retinemus fluxū lientericum aut ſanguineum.

Dubitatur ſine argumētis et eſt bonū in practicā:

Utrū talis euatio debeat augeri aut vigorari per medicinas attrahētes a ſpecifica forma: an per medicias euantes ꝯprimēdo? Et rñdendū ē: ⁊ ſit pria ꝓpō ꝙ ſi fluxus ventris ſit oppilatiu⁹: exēpli cā ſit flux⁹ vētris chyloſus fact⁹ ꝓpter oppilationē venaꝝ meſeraicaꝝ: tunc ſtiptica ⁊ euantia cōprimēdo nō cōueniūt. Cā ē hec q: huiuſmodi āpli⁹ oppilādo ⁊ ſtipticādo augerēt fluxū. ¶ Secūda ꝓpō: mā oppillāte exñte multa ⁊ groſſa euantia attrahēdo ꝯueniūt: ꝓpō pȝ ſic. Talis mā educēda ē per ſeceſſuȝ ergo ⁊c̄. Añs colligiꝛ 7° terapē. ad finē ī illa pte: renes aūt ⁊ veſica. Cōſequētia tȝ q: nō vꝛ iſta mā alio farmaco educenda. ¶ Tertia ꝓpō: mā exñte pauca ⁊ ī ꝯcauitate epatis aut meſeraicaꝝ cōiter farmaco a tota ſpecie attractiuo talis mā ē educēda. ꝓpō ꝓbaꝛ cū hec educēda ſit ꝑ ſeceſſuȝ vt colligiꝛ dicto loco ⁊ fen pñti prio. c. ¶ Quata ꝓpō: mā exñte modica ⁊ circa epatis gibbū nō ē vigorāda euatio per ſeceſſum. ꝓpō arguiꝛ ſic: Alijs paribus hec mā educēda ē per vias vrine: ergo ⁊c̄. nota ē ꝯñtia: pȝ etiā aſſūptum ex locis iā dictis. ¶ Quinta ꝓpō: mā exñte viſcoſa aut ſubtili valde ībibita talia cōprimētia nō cōueniūt ī ꝓpoſito q: ꝑāplius īuiſcant ⁊ īpingūt māȝ. ¶ Sexta ꝓpō: ī alijs materieb⁹ humoralib⁹ ab iſtis: ſtipticātia ⁊ ēt euantia cōprimēdo cōueniūt. pȝ ꝓpoſitio: prio per auctoritates ⁊ ex cā: q: poſtquā iſta euauerūt mās cōſtipant ⁊ ꝯfortant ⁊ vniūt ductus ⁊ cānales: vnde in fluxu colerico ſeu diſinteria colerica cōuenit reubarbaꝝ aſſatū qđ per aſſationem fit magis ſtipticū. Cōpetunt etiam mirabolani aſſati: ⁊ exhibetur etiam medicina dicta michelecta.

Dubitatur vtrum in quolibet fluxu

mālí ſeu ꝓueniēte ꝓpter malā ꝯplōnē cū mā ſit neceſſariū euacuare? Qđ ſic arguiꝛ: mala cōplō cū mā per euationem euatur: ergo ⁊c̄. Cōſequētia videꝛ ſatis nota: ⁊ aſſumptū ē Aui. in hac fen. c. 2°. ¶ Oppoſituȝ arguiꝛ: mala cōplō cū mā qñqȝ curaꝛ ſola alteratiōe: ergo nō ſemꝑ requiriꝛ euacuatio. Añs fuit tactū ſupra: vt pȝ in mā reducibili ad benignū. ¶ Pro dubio ſit hec pria ꝯclō: In fluxu ꝓueniēte ꝓpter malā ꝯplōnē ſine mā ſola ſufficit alteratio: hec ꝓpō īdeterminate arguiꝛ ſic: in tali fluxu remotio cāe ſufficit: ergo ⁊c̄. Añs ē notū ⁊ tenet ꝯñtia vbi mala complō ſine mā ſit cā hui⁹ fluxus. ¶ Scđa cōclō: in fluxu ꝓueniēte a mala cōplōne ſine mā multotiens ꝯuenit euare ſine formatōe rōnis. pȝ ꝯclō exēplo ſic. Sit eīȝ ꝙ ſtomac⁹ hēat malā cōplexionē humidā aut frigidā: ſit vltra ꝙ flegma multiplicet ī ſtomaco ⁊ foueat malā cōplōnē frigidā aut humidā ī ſtomaco: ita tñ ꝙ ad malā cōplōnē frigidā factā ſequatur fluxus liētric⁹: ī iſto cāu ē euandū flegma vt illud ſine cuius euatiōe nō curaꝛ fluxus. ¶ Tertia cōclō: flux⁹ mālis vtplurimū curaꝛ per euationē māe a qua depēdet. Pȝ cōcluſio cū plurimū mā cauſans fluxū ſit ꝑter nāȝ. ¶ Quarta cōclō: ī fluxu ꝓueniēte ꝓpter malā cōplōnē cū mā aliquādo ſola ſufficit alteratio. Pȝ per rōeȝ poſt oppoſituȝ. Iſtis hītis pȝ ſolō ad obiectū primū. Ad qđ diciꝛ ꝙ mala ꝯplō cū mā ñ reducibili ad benignū curaꝛ ꝑ euonem: mala aūt ꝯplō cū mā reducibili ad bēignū pōt curari ꝑ ſola alteratiua. ¶ Ulteri⁹ nota ꝙ in lr̄a poniꝛ pigra qđ idem ē ꝙ amara: hyera aūt idē ē ꝙ bñdicta: ide hyrapigra quaſi benedicta amara medicina. Que aūt ſint opatiōes hyerepigre videatis 5° cañ. c. de hyerapigra. ¶ Ulterius nota ꝙ mā exñte in ſtomaco que vomitu curaꝛ aliqñ eſt viſcoſa adherēs que ob iſtā cām vocaꝛ māſiua quaſi apta manere q̄ materia purgaꝛ per vomituȝ propter factaȝ inciſionē preparātem ad taleȝ euacuationē. nam inciſio viſcoſi eſt eius preparatio ad expulſionē.

Et medicine quidē īfrigidātes liquide cōgelāt ⁊ orificia conſtringūt ⁊ coanguſtant.

¶ Nūc notificat aliā rē retinētē euationem: dicēs ꝙ certe medicine infrigidātes cōgelant rē liquidā ⁊ cōſtringūt ⁊ coanguſtāt orificia ꝑ que debēt trāſire māe. ¶ Pro pte notādū hanc partē ītelligi taȝ de medicinis frigidis actu q̄ȝ potētia q̄ȝuis principalr̄ ītelligaꝛ de frigidis ī potētia. ¶ Scđo nota ꝙ cū de nā frigidi ſit infrigidare cōgelare ⁊ īmobilitare: iō vbi fluens mā ſit ſubtilis ⁊ liquida ⁊ ſupple calida: acuta frigida ꝯueniūt ingroſſando refrigerādo ⁊ cōgelando mām. In fluxu tñ māe viſcoſe fride frida per amplius inuiſcātia nō cōueniēt. Cōferūt etiā frigida conſtringēdo meatus ⁊ vias per quas he medicine trāſire debent. ¶ Ulterius nota ꝙ nō ſolū ſtiptica cōueniūt in fluxu: īmo multotiens ſtupefaciētia p° vbi mā ſit ſubtilis acuta mordax. Hec eīm ſtupefaciētia ꝓuocādo ſomnū cōueniūt īmobilitando materiā ⁊ ingroſſando: ſomnū etiā ꝓuocādo fluxū ꝓhibēt ⁊ cōſtringūt: que tamē non ſunt miniſtrāda niſi vbi alia remedia non cōtulerūt ⁊ magis exterius q̄ȝ interius ſunt approximanda cum nocendo notabiliter ſuum afferant iuuamentum.

Et ſtiptice quidem medicine materiā coartant ⁊ cānales conſtringunt.

¶ Nunc Aui. tāgit aliud ꝯſtringēs fluxū: dicens ꝙ ſtiptice medicine ꝯſtringūt mām: cōſtringūt etiam cānales. ¶ Pro parte nota ꝙ cum ſtipticitas fundeꝛ in ſubſtātia terrea ⁊ ſicca cui⁹ eē eſt ꝯdēſuȝ ⁊ vnitū: iō ſtiptice medicīe hñt ꝯdēſare ⁊ vnire ⁊ īgroſſare māȝ: hñt ēt cānales ꝯſtringere ⁊ adunare: tuti⁹ ē ergo applicāda corporib⁹ frīda medicia: vitāda tñ ī fluxu oppilatiuo: vt eſt tactū ꝓueniente a mā ſubtili indebita: aut etiā a mā viſcoſa.

Et viſcoſe quidē medicīe oppilatōes in cānaliū orificijs efficiūt: q̄ ſi fuerit acute exiccatiue plus opabunꝛ illđ.

¶ Tāgit aliud dicēs ꝙ medicīe viſcoſe iō ꝯſtringūt: q: in orificijs cānaliū efficiūt oppilatōes que hoc forti⁹ operanꝛ exiccatiue exñtes ⁊ acute. ¶ Nota ꝓ parte ꝙ de rōe viſcoſi eſt viſcare ⁊ adherere: ⁊ iō ſi ponaꝛ ī orificijs aut in vijs adheret parietib⁹ vie ⁊ parietē trahit verſus parietē: ⁊ talr̄ oppilādo fluentē tenet māȝ: ac ēt poſitū ſupra orificiū ꝯtinuū exñs ⁊ tenax māe prohibet exitū. ¶ Scđo nota vt euiteꝛ dubiū ꝙ viſcoſuȝ pōt intelligi acutū: q: penetratiuū ꝑ aliquas partes acutas q̄ penetrādo magis ꝓfundātur ⁊ īuiſcanꝛ. Exiccatiuū etiā exñs viſcoſitate ēt oppilatōeȝ cauſat tenaciorē: vt pȝ ī expientia de viſcoſa aliqualr̄ exiccāte vt đ bitumīe ⁊ ſimilib⁹. ī. de colla. 2° per rē viſcoſaȝ exiccatiuā ītelligere poſſum⁹ rē viſcoſaȝ ſui acuitate ⁊ exiccatōe cauſticā ꝑ q̄s medicias cauſaꝛ eſcara ſeu ēt cortex dur⁹ ⁊ tenax: q̄uocūqȝ ꝑs exponaꝛ ꝯtinet veritatē.

Et adurētes quidē cortices efficiūt vt ſuper cānalis orificiū maneāt ⁊ ipſuȝ claudāt ⁊ ꝯfirmēt: ſȝ tñ eaꝝ īpedimētuȝ timeꝛ: ⁊ hoc eſt qm̄ poſſibile eſt vt cortex rūpaꝛ ⁊ eradiceꝛ ⁊ amplificatio foraminis augmētetur. Et ex adurentibus quideȝ ſunt quedā in quib⁹ exiſtit ſtipticitas ſicut attramentū: ⁊ quedā in quib⁹ nō: ſicut calx non extincta. Et adurentes quidē ſtiptice ſūt neceſſarie vbi volūtas eſt vt cortex ſit fixus. Et alie ſūt neceſſarie vbi volūtas eſt vt cortex cito cadat. Et ei⁹ quidē que fit ſtrictura: alia eſt cū clauſura foramīs ⁊ coartatōe ad hoc vt ipſi⁹ partes in vnuȝ ꝯducanꝛ: ſicut ꝯſtringiꝛ illud qđ eſt ſupra cubitū cū flobothomator in baſilica errās percutit artariā: ⁊ alia eſt q̄ fit oppilatōe orificij vulneris ⁊ clauſure vie euati ſicut pilos leporis in vulnus ponim⁹. Dicemus ergo ꝙ ſi ſanguinis curſus ex apertiōe orificiorū venaꝝ fuerit: ſtipticis medicabiꝛ vt orificia venaꝝ ꝯſtringantur. Et ſi ex ruptura fuerit ſtipticis glutinoſis ſicut terra ſigillata. Et ſi ex corroſione fuerit, eo ꝙ carneȝ naſci facit cū eo qđ corroſionē abſtergit.

¶ Tāgit aliud reſtrictiuū flux⁹ ꝑ adurētia: dicēs ꝙ medicine adurētes faciūt cortices manētes ſupra orificia cānaliū: quaꝝ tñ medicinarū adurentiuȝ timeꝛ impetus: q: poſſibile ē rūpi corticē ⁊ radicari vñ augmentaꝛ foramen. Ex adurētibus tñ medicinis quedā ſunt ſtipticitate participantes ſicut ē attramētū: ꝑ attramētū ītelligēdo vitriolum aut ſpēs eius. quedā ſunt ñ ſtiptice ſicut calx nō extincta. adurentes aūt ſtiptice ſūt neceſſarie vbi volumus corticeȝ ⁊ fixaȝ remanere: alia vero vbi volumus corticeȝ cito cadere. ¶ Dicit penultīo ꝙ retentio ſupple fluxus que fit per ſtricturā alia fit claudēdo ⁊ cōſtringendo foramē vt partes foramīs reducātur in vnū ſicut ſtringiꝛ ſupra cubitū cū fune aut corrigia cū flōmator errās flōmādo baſilicā ꝑcuſſit artariā. Alia ē oppilāda orificiū vulneris ⁊ etiā claudēdo viā ſicut cū vulneri pilos leporis īponim⁹. ¶ Ulteri⁹ Aui. tāgit ītentōes hñdas in fluxu ſanguis dicēs: Si fluxus fiat ex aptōe orificioꝝ venaꝝ debes medicari ſtipticis medicis vt fiat applicatio ſtipticoꝝ orificijs: ⁊ ſi fluxus fiat ex ruptura ꝯpetūt glutinoſa ſicut terra ſigillata: ⁊ ſi fiat ꝓpter excoriationē cureꝛ ꝑ generātia carnē aut per cōſtringētia reȝ corrodēteȝ. ¶ Pro pte nota p° ꝙ īter medicinas adurnetes cauſticas ſiue corroſiuas ⁊ putrefactiuas eſt dr̄ia. Adurētes eīȝ ſeu cauſtice dicunꝛ q̄ pteȝ mēbri ꝯuertēdo in fumoſitatē terreū ſiccū cinereū relinquūt ſiue ſint tales actualr̄ ſiue potētialr̄. Medicine aūt putrefactiue dicunꝛ q̄ humorē aut pteȝ mēbri ꝯuertūt ī putredinē. Ille vero dicunꝛ corroſiue que corrodūt ſeu ſeparāt partē a pte dato ꝙ nō putrefaciāt. ¶ Ad ꝓpoſitū q̄rimus aliqñ retinere ſanguinē pteȝ cinereā terreſtrē relinquēdo vt tāq̄ȝ eſcara ſeu cruſta claudat ⁊ oppilet orificiū cānalis: iō tūc medicine adurētes ⁊ cauſtice ꝯueniunt. ¶ Scđo nota ꝙ medicīe adurentes ſeu cauſtice ſūt cauēde in mēbris pricipalib⁹ ⁊ ī mēbris neruoſis ⁊ vehemētis ſenſus cū nō faciāt nocumēta pteȝ corrūpēdo mēbri. ¶ Tertio nota ꝙ in approximatōe

Scias ꝙ medicina viſcoſa ē duplex. Quedaȝ ē actu talis ſicut viſcus: quedā ī porētia talis ſicut fūgi portulaca ⁊ omē ex quo fit humor viſcoſus. Hec diſtinctio colligiꝛ ex dicꝭ Aui. ſcđo cāonis tractatu prio. c. iiij. parapho illo: Per viſcoſaȝ vero ſignam⁹ ⁊c̄. ⁊ ibi tu lege Gētileȝ ⁊ ſcies eius vtilitatem ⁊c̄.

UVA. BHSC. IyR_006_1

in approximatõe hoꝝ cauſticoꝝ multiplex eſt timor. Primꝰ q tangit in lr̃a ne rũpatᷣ cortex ⁊ remaneat foramẽ amplius preexñte. 2ꝰ timor eſt de nimia itẽſione doloris: ⁊ iõ iſta cauſtica nõ ꝯueniũt niſi vbi alia remedia non iuuerit. ¶ Ulteriꝰ nota ꝙ approximãdo cauſticũ aliqñ ĩtendimus corticẽ gñare fixũ vbi nimiũ timemꝰ fluxũ ex amotõe corticis. Aliqñ vero nõ timemꝰ hoc: ⁊ tũc cauſticũ magis applicatᷣ gr̃a remotõis putrefactõis aut alteriꝰ q̃zuis ẽt ĩtendamꝰ ꝑ ipʒ ſedare fluxũ. Ex dictis ẽt pʒ ꝙ cauſtica ſecuriꝰ applicãtᷣ exterioribꝰ q̃ʒ ĩterioribꝰ: imo ĩterioribꝰ nõ pñt niſi cũ magno applicari ꝑiculo ⁊ pluriũ ꝑtiuʒ cauſticatõe.

Dubitat quis an calx extincta ſit ſtiptica?

Q͛d ſic arguitᷣ ꝑ modũ loquẽdi Aui. qui dixit calx ñ extincta quaſi denotet talẽ calcẽ extĩctã eẽ ſtipticã. ¶ Oppoſitũ arguitᷣ q꞉ calx nõ extincta nõ ẽ ſtiptica: ergo minus extincta. Añs in lr̃a ponitᷣ. cõſequentia tenet q꞉ per extinctionẽ retinetᷣ ſiccitas calcis. ¶ Pro ꝑte dubij ꝓbabilr̃ teneri põt calcẽ extinctã nõ extincta eſſe ſtipticiorẽ. Probatᷣ q꞉ appoſita aqua calci actuatis ꝑtibꝰ igneis fit ſubtiliũ partiũ calcis reſolutio ⁊ euaporatio: iõ partibus terreſtribꝰ remanẽtibꝰ calx põt eẽ ſiccior ⁊ etiã magis ſtiptica. ¶ Sc͛do tenẽdũ calcẽ nõ extinctã fortiꝰ exiccare: pʒ ꝓpõ ꝓpter partes igneas ⁊ acutas ĩ ipõ plus abũdare: tũc pʒ ſolõ ad obiectũ. ¶ Et nota p͛o ꝙ ſi volumꝰ tenere viam oppoſitã habemꝰ rñdere ad Aui. ꝙ notãter dixit calx nõ extincta: nõ q꞉ calx extincta nõ ſit ſtiptica: ſʒ q꞉ extĩcta nõ ẽ cauſticũ forte ꝑ q͛d intẽdimus generare corticẽ. ¶ Pro 2ª ꝑte nota ꝙ ex parte ꝯcipitᷣ duplex modus ſtricture. Unꝰ qui fit ſtringẽdo partẽ ſuꝑiorẽ vulneris: ne per ipſam mã fluat ad vulnus ſicut cõſtringitᷣ ſupra cubitũ cũ flobothomata ẽ artaria intẽdẽdo flõmare baſilicã. Sc͛s autẽ modus ẽ ligãdũ aliq͛d ſupra orificiũ: ⁊ differũt iſti duo modi: q꞉ primꝰ nõ ẽ ſine ĩpedimẽto. nã cũ per primã ligaturã ꝓhibeatᷣ trãſitꝰ ſpũuʒ ⁊ humoꝝ per ipam valde debilitatur mẽbrũ: ꝑ ſc͛aʒ nõ fit tãta mẽbri debilitas. ¶ Ulterius nota ꝓ parte 3ª ꝙ ĩtentio Aui. ẽ p͛cipalr̃ determiare de retẽtione fluxꝰ ſanguis explicãdo q̃ directe ponuntᷣ fluxui: iõ dictas ĩtentões ſolũ explicauit ĩ parte. Nã ſanguis fluit ex vena aut q꞉ orificiũ debilitatũ ẽ ⁊ aptũ: ⁊ quãtũ ad hoc ꝯueniũt ſtiptica q̃ hñt ꝯſtrĩgere ⁊ adunare orificiũ. Aut fit iſte fluxꝰ ꝓpter rupturã vene: ⁊ in iſto caſu ꝯueniũt ſtiptica ꝯglutinoſa ſicut terra ſigillata q̃ ꝯſtipãdo ꝯſtringit foramẽ ⁊ viã glutinãdo ẽt ꝑtes ſolutas applicãt parti. Aut 3º cauſatᷣ iſte fluxꝰ ſanguĩs facta excoriatõe ⁊ remotõe partis: ⁊ tũc generatiua carnis ⁊ recõpenſantia deꝑditũ ꝯueniũt. Si tñ fit corroſio ꝓueniẽs ex mã putrida corrũpente ſeu corrodẽte ꝯueniũt abſtergẽtia ꝑtẽ corroſaʒ ⁊ mãʒ corrodenteʒ: in applicãdo tñ talia medicamina eſt talis ordo. Nam vbi corroſio eſt vehemẽs primo eſt abſterſio fiẽda: deĩde carnis generatio: vbi vero corroſio eẽt pauca ſimul poterit abſterſio fieri ⁊ carnis generatio.

¶ Caᵐ 24ᵐ de ſanatõibus oppilationũ.

Opilatões auteʒ ſũt ex humoribus groſſis aut viſcoſis aut multis.

¶ In hoc caplõ ꝓſequitᷣ determinãdo de quodã morbo ꝯpõnali. ſ. de oppilatõe. Quare aũt nõ de alijs in fine. c. dicetᷣ. Diuiditᷣ autẽ caᵐ ĩ tres ꝑtes p͛cipales. Prĩo oñdit a quibꝰ cauſantᷣ cõiter oppilatões quibꝰ ẽt curentᷣ. 2º ĩter oppilatões rõne mẽbroꝝ oppilatoꝝ quãdã ponit dr̃iaʒ. 3º Aui. quẽdã annectit cañ. ibi 2ª: ⁊ ex oppilatõibꝰ. ibi 3ª: ergo cuʒ. Pr̃ia in duas. Nã p͛º tangit cãs oppilãtes. 2º ponit ĩtentões curatiuas. ibi 2ª: ⁊ multoꝝ qdeʒ humoꝝ. Primo dicit ꝙ oppilatiões cauſantᷣ ab hũoribꝰ viſcoſis groſſis aut multis. ¶ Pro ꝑte nota p͛º oppilatõeʒ eſſe triplicẽ. ſ. attenuatoriã coartatoriã ⁊ carnoſaʒ. Pr̃ia eſt q̃ cauſatᷣ ꝑ ꝯſtrictõeʒ mẽbri ⁊ applicationẽ ꝑtis ad ꝑteʒ: ſicut vena vehemẽter exiccata aut artaria eoꝝ ꝯſtrĩgitᷣ ꝯcauitas ſicut fit ẽt cõſtricta vena cũ fune: q꞉ eiꝰ ꝯcauitatis fit conſtrictio ſeu paucificatio. Quedã vocatᷣ oppilatio carnoſa qñ res carnea oppilat ꝯcauitatẽ vt ĩ polipo nariũ fit: q꞉ auctis carnibꝰ nares cõſtrĩguntᷣ. 3ª vocatᷣ coartatoria qñ res oppilãs ⁊ coartans meatũ nõ eſt caro ſʒ humor aut aliͣd ꝑ̃ter nãʒ. ¶ Applicãdo ad ꝓpoſitũ Aui. hic ponit curã oppilationũ ꝓcedentiũ ex humoribꝰ. Ex dicta diſtictione q̃zuis non ſit nimiũ ad ꝓpoſitũ poterit ĩueſtigari an oppilatio ſit morbꝰ fiens aut factꝰ. Nã ꝓbabilr̃ p͛º teneri põt oĩs oppilatio eſt morbꝰ fiens. Nã ꝓbatᷣ ad modũ medicoꝝ q꞉ oĩs talis pẽdet a cã: ergo ⁊c̃. Cõſeq̃ntia nota ⁊ aſſumptũ pʒ. Nã p͛º coartatoria ⁊ carnoſa pẽdent a carne aut alia re oppilãte ⁊ coartante. Itẽ attenuatoria pendet a ſiccitate aut are ꝯſtrĩgente. 2º eſt ẽt tenendũ nõ q̃libet oppilatõeʒ eſſe mãleʒ: q꞉ nõ q̃libet pendet a mã hũorali: ergo ⁊c̃. Cõſeq̃ntia nota: ⁊ añs pʒ cũ aliq̃ pendeat a lapide. ¶ Tertio nota ꝙ via oppilatᷣ aut q꞉ aliqd adheret vie ⁊ ſic humorẽ habemꝰ viſcoſuʒ ſui adherentia ⁊ corpulẽtia oppilãtem. 2º via oppilatᷣ q꞉ in ipſa aliq͛d ĩcuniatᷣ ſicut eſt humor groſſus q ſua groſſitie adheret. Aut 3º oppilatᷣ via q꞉ aliq͛d conculcatᷣ ĩ ipſa vt humor multus dato ꝙ ſubtilis ⁊ non viſcoſus. Tres ergo cauſas in littera ſufficiẽter tetigit Aui. ⁊c̃.

Et multoꝝ quideʒ humoꝝ qñ cuʒ eis alia nõ fuerit cã malitia remouebitᷣ extractõe ipſoꝝ flõmia aut ventris fluxu facta. Et ſi groſſi fuerint ĩdigebunt eis q̃ reſoluãt. Et ſi fuerint viſcoſi ⁊ maxĩe ſi fuerint ſubtiles erunt eis neceſſaria ea q̃ ĩcidãt. Et tu quidẽ iã ſciuiſti differẽtiã inter groſſuʒ ⁊ viſcoſum ⁊ ꝙ eſt ſicut differẽtia ĩter gluten liquidũ ⁊ lutũ: ⁊ groſſo quidem reſolutiuũ ẽ neceſſariũ ideo vt ipſuʒ attenuet ⁊ eiꝰ expulſio fiat facilis: ⁊ viſcoſo ĩciſiuuʒ eſt neceſſariũ ideo vt iter ipſum ⁊ id cui adheſit penetret ⁊ inter ea ſeparationẽ faciat ⁊ vt ipſuʒ in parua ſecet fruſta: qm̃ viſcoſum oppilat ꝓpterea q꞉ adheret ⁊ ꝓpter ſuaruʒ partiuʒ ꝯtinuatõeʒ.

¶ Exequitᷣ Aui. tãgẽdo cãs haꝝ oppilationũ. Et primo facit hoc. 2º tãgit cañ. erroris correctiuũ. ibi 2ª: oʒ auteʒ. Dicit primo ſine vlteriori diuiſiõe ꝙ malitia multoꝝ humorũ remouetᷣ per euãtiõʒ flõmie aut vẽtris. Si vero humores ſint groſſi egẽt reſoluẽtibus. Si vero ſunt viſcoſi ⁊ maxime ſubtiles ĩdigẽt ĩciſione. Et certe tu iã ſciuiſti differẽtiã inter groſſuʒ ⁊ viſcoſuʒ 2ª primi dũ loquebatᷣ d͛ vrinis. Nã ẽ talis differẽtia qualis ẽ ĩter gluten ⁊ lutũ. nam gluten ſubtile ẽ ⁊ viſcoſũ: lutũ vero groſſuʒ ⁊ nõ viſcoſũ. Groſſo neceſſariũ ẽ reſolutiuũ ſubtiliãs ipm ⁊ faciẽs eius facilẽ expulſionẽ: viſcoſo aũt neceſſariũ ẽ inciſiuũ vt penetrãdo inter viſcoſuʒ ⁊ mẽbri ſuꝑficiẽ vnũ ſeparetᷣ ab alio: ⁊ viſcoſuʒ diuidatᷣ in ꝑtes paruas eo ꝙ viſcoſum oppilat ⁊ adheret ⁊ cõtinnũ ẽ in ſuis ꝑtibꝰ. ¶ Pro ĩtellectu ꝑtis vt vitetᷣ dubiuʒ: primo nota ꝙ multitudo humoꝝ quedã dicitᷣ abſolute multitudo que nõ ẽ aliud q̃ʒ oĩum humorũ ꝓportionalis excreſcẽtia vel humoris abſolute multi ſicut ſanguis cui vt ẽ notũ debetᷣ flõmia. Nã flõmia ẽ euacuatio vniuerſalis que multitudinẽ humoruʒ euãt: vt dictũ ẽ ſupra. c. de flõmia ad principiũ. Quedã vero vocatᷣ multitudo ꝭʒ quid dicta excreſcẽtia talis vel talis hũoris. Ad ꝓpoſitũ cũ dicit hic multitudinẽ hũorũ intelligit multitudinẽ cõem ad primũ aut ſc͛m. ¶ Sc͛o nota ꝙ ꝑ fluxũ vẽtris ĩtelligit quãcũq; aliã euãtionẽ a flõmia vt ſit ſenſus ꝙ humor multꝰ oppilãs aut euãtur per flõmiã aut aliam euãtiõeʒ: q꞉ tñ cõtingit humores multos euãri vt plurimũ fluxu. ſ. vẽtris: iõ ſolũ de fluxu ventris ĩ textu facit mentionẽ. ¶ Tertio nota ꝙ cũ multitudo ſit quid p͛ter nãm cõuenit ſibi euãtio vt ſibi oppoſita. Nã res ꝑ̃ter nãʒ indicat ꝑ cõtrariã ablationẽ ſui: vt colligitᷣ 8º terapẽ. que euãtio aliqñ fit ab arte. ſ. nõ potẽte nã q꞉ aliqñ hec multitudo ab ipa natura ſuꝑatᷣ. ¶ Ulteriꝰ nota ꝙ reſolutio põt ſumi dupliciter quãtũ ẽ in ꝓpoſito. p͛º ꝓprie pro cõuerſione humoꝝ ĩ vaporẽ mediãte caliditate multa: ⁊ iſto mõ ſumit Aui. medicinã reſolutiuaʒ cañ. 2º. c. 4º. ⁊ ẽt Gal. 7ª affo. ꝯmẽto. 59º. 2º capitᷣ reſolõ ꝓ diſſolutõe ſeu ſubtiliatõe: q̃ ſubtiliatio fit ꝑ caliditatẽ tꝑatã. ſ. reſpectu caliditatꝭ reſoluẽtis vt colligitᷣ 2º cañ. allegato. c. ad ꝓpoſituʒ applicãdo cũ intentio ĩ groſſo ẽ ſubtiliare: iõ. A. per reſolutionẽ ĩtelligit diſſolutionẽ ſeu ſubtiliationẽ. ¶ Ulteriꝰ nota vt tãgitur in parte ꝙ viſcoſuʒ oppilat: aut q꞉ adheret: aut etiã q꞉ valde cõtinuũ ⁊ tenax exñs ſui cõtinuitate ꝓhibeat trãſitũ ꝑ viã: iõ merito duplex intẽtio habetᷣ ĩ viſcoſo. Una ẽ ad ſeꝑandũ ĩter partẽ cui adheret ⁊ viſcoſuʒ q͛d facit medicina inciſiua ꝑ ſuas ꝑtes ſubtiles penetrãtes ĩ medio viſcoſi ⁊ mẽbri ſe ponẽdo. Sc͛aʒ etiã oꝑationẽ facit ĩciſiuũ cã cõſimili viſcoſuʒ ĩ paruas diuidẽdo ꝑtes. Harũ tñ operationũ vna ẽ principalior alia. nã cũ viſcoſuʒ oppilet maxime q꞉ adheret: iõ principalis oꝑatio ĩciſiui in remouendo oppilationẽ ẽ ſe ĩterponere ĩter ꝑtẽ cui adheret ⁊ viſcoſum. Et iõ dato ꝙ inciſiuũ nõ oꝑaretᷣ ꝭʒ oꝑationẽ adhuc remoueret oppilationẽ: ſʒ ſi oꝑaretᷣ oꝑationẽ ſc͛aʒ adhuc adhereret ⁊ remaneret oppilatio: q꞉ dato ꝙ viſcoſuʒ ſeparetᷣ in ꝑtes adhuc ille ꝑtes adhererẽt mẽbro. ¶ Ulteriꝰ nota ꝙ notãter ẽ dictũ maxĩe ſi fuerint ſubtiles: q꞉ ſi humores fuerint groſſi viſcoſi: tũc nõ ſolũ ſufficeret ĩciſiuũ: ĩmo etiã requireretᷣ ſubtiliatiuũ q͛d opponeret ſe groſſo. Aut etiã ẽ hoc dictũ q꞉ viſcoſuʒ ſubtile maxĩe aptũ ẽ ĩprimere ⁊ adherere: iõ maxĩe ſibi conuenit inciſiuũ: q꞉ maxĩe adheret ⁊c̃. ¶ Ulteriꝰ nota dr̃iaʒ eſſe ĩter ĩciſiuuʒ ⁊ ſubtiliatiuũ: q꞉ ĩciſiuũ hʒ variare ꝯtinuitatẽ hũoris ĩciſi. hʒ eiʒ diuidere hũoreʒ ĩ ꝑtes: ſʒ ſubtiliatiuuʒ hʒ ſubtiliare dato ꝙ remaneat ꝯtinuitas hũoris: Iteʒ ĩciſiuũ nõ variat eſſentiã hũoris ſʒ ſolũ ĩcidit ipʒ ĩ ꝑtes: ſʒ ſubtiliatiuũ ſubtiliando variat hũoris eſſentiaʒ ſaltem hũoris ꝑmutãdo modũ ſubſtãtie: ⁊ ſic alia eſt oꝑatio ſubtiliãdo ⁊ alia ĩciſio.

Dubitatur vtrũ ea que ponũtur in parte habeãt remouere oppilatõeʒ?

Q͛d non arguitᷣ: q꞉ tm̃ aꝑitiuã hñt remouere oppilatiõeʒ: ergo ⁊c̃. Añs videtᷣ eſſe notũ cũ nihil vr̃ opponi oppilatõi niſi aꝑtio. Tʒ ꝯña: q꞉ q̃

Scias hic ꝭm Gẽtilẽ ꝙ ſi malitia humoꝝ ſit in quãto ⁊ ĩ quali: prius tũc vtimur ſubtiliatõe ⁊ apertione deinde euõne: nõ vt ſoluʒ oppilatio remoueatur per euõneʒ ſʒ vt exoneretur virtꝰ ⁊ fiat potentior ſupra reſiduũ: vel q꞉ poſſit dari medicina eradicatiua ex qua poſtea oĩo oppilatio remoueatᷣ. Si vero ſit malitia in quãto ſoluʒ fieri poterit euãtio ſine illis. hec ille ⁊c̃.

Triplex eſt opilaº

UVA. BHSC. IyR_006_1

eūant nō apiunt. ¶Oppoſitū arguit̄ ex Aui. in lr̄a. Pro dubio nota ex. A. 2° cañ. c. 4° ꝙ medicīa dicit̄ apitiua dupliciter. Prio ꝓprie: ⁊ eiꝰ ē mouere mām oppilātē ad exteriora ſeu mām exn̄tē ītra cōcauitatē remouere faciēdo cōcauitatē remanere aptā. Scđo aūt ⁊ minꝰ ꝓprie oīs medicina remotiua hūoris oppilātis: aut remotiua diſpōnis humoris qui oppilat dici pōt aperitiua: iō medicina abſterſiua vocat̄ aperitiua. Medicina etiā inciſiua ⁊ etiā materie euacuatiua ⁊ humoris pōt dici aperitiua. Ex hoc pꝫ ſolutio ad ratione ante oppoſitū. Nā tantū aperitiua primo mō aut ſcđo mō cōueniūt in cura oppilationū.

Dubitatur vtruz inciſiua medicina ſit dāda ꝓ remotiōe oppilatōis ab humore viſcoſo? Q̄ð ñ arguit̄: q: abſterſiua medicīa ī hoc cāu ꝯpetit: ergo ⁊c̄. Cōſequētia nota: ⁊ aſſūptū colligit̄ ex noticia medicīe abſterſiue. Nā ipa hꝫ remouere hūores viſcoſos ⁊ congelatos a ſupficie mēbri. In oppoſitū ē. A. ⁊ ē tenēdū ꝙ in tali cāu cōueniūt inciſiua vt pꝫ ex dictis. Et ad obiectū dōm ꝙ ī remotiōe oppilatiōis cōuenit abſterſio ⁊ inciſio ⁊ remotio ptis a parte cui adherēt ⁊ diuiſio viſcoſi ſeu ptis. Et quia hec duo pñt cōpleri per īciſionē tm̄: iō ipe de ipa fecit mētionē ⁊ nō de abſterſiua. ¶Uel dōm ꝙ de rōe medicine abſterſiue ē remouere humores viſcoſos nō a cōcauitate ſed ab orificijs poroꝝ exn̄tiū in ſupficie mēbri: q: ergo humor viſcoſus oppilās ē in cōcauitate membri ſibi potius debetur īciſio q̄ʒ abſterſio.

Scias tñ ꝙ medicina que ꝓuenit a mā ſtiptica ꝯprimēdo ſiue exprimendo vel ꝯgregādo vel etiā penetrādo abſtergit ⁊ maxime hūiditates ſubtiles: groſſa aūt ñ: occurrēte eiꝫ ſtiptico ipſe magis apte ſūt cōgelari ⁊ imobilitari q̄ʒ fluere: ideo ſubtiles materie abſtergunt̄ a ſtiptico ⁊ nō ſoluz exn̄tes in ſuperficie ſꝫ ī ꝯcauitate ex eo ꝙ faciliꝰ repūt per poros nō ſic groſſe: ⁊ hoc ꝓ parte ē de mēte Gal. vndecimo de ſimplici medicina: ⁊ Auer. ī quīto colliget ⁊c̄.

Dubitatur cū medicina lauatiua habeat aperire vt colligit̄ 2° cañ. allegato. c. quare etiā ꝓ cura oppilatiōis nō fecit de ipa mētionē? Dicēdū ꝙ iſtā dedit intelligere per euacuationē. nam iſta aperit lauando. ⁊ remouendo humorem.

Oꝫ aūt vt ī reſolōne groſſi a duabꝰ ꝯrijs caueat̄ rebꝰ: quaꝝ vna ē reſolutio debilis que ī raritate materiei augmētū efficit ⁊ ipſiꝰ locū augmētat ita ꝙ ad reſolōnē nō ꝑueniet q̄re oppilatōem augmētat: ⁊ altera ē reſolo fortiſſima q̄ eiꝰ ſubtile fit vapor ⁊ ſpiſſuz ipſiꝰ fit lapis. Cū ergo reſolo fortis ē neceſſaria iuuet̄ lenificāte ſubtili cū mā ī qua nō ſit groſſities ſꝫ ſit ī ea calor tꝑatus qui iuuet in reſoluēdo totū illud qđ eſt oppilatū.

¶Supra tetigit oꝑatiōes curatiuas oppilationū: nunc vnū cañ. explicat erroris correctiue: dicēs ꝙ neceſſe ē ſupple medicuz operantem ī reſolutionē groſſi cauere a duabus rebus cōtrarijs. Una ē reſolutiua res debilis extendens ⁊ ampliās māz ⁊ ſupple extendēdo augēs ꝑāpliꝰ oppilationē. Alia ē res reſolutiua fortis ſubtile humorū cōuertens ī vaporē: groſſuz aūt in lapidē. Et iō cū fortis extiterit reſolutio neceſſaria iuuāda ē talis medicīa cū medicina lenificāte calore ſubtili tēperato eius iuuāte in reſoluēdo rē oppilātē. ¶Pro pte prīo nota ꝙ res reſolutiua debilis primū tunc maxime efficit nocumentū qñ mā eſt multa ī toto etiā repleto ſui multitudine īobediēs ſue reſolutioni. i. ꝑ reſolutiuū fortiter agitabilis rarefacta etiā per tale aut maior facta. Itē etiā tūc maxime ſequit̄ ſcđz nocumētū ſeu īpedimētū qñ mā ē valde dura ⁊ groſſa: tunc quidē applicato valde reſolutiuo cū iſta mā ſit valde apta īdurari ⁊ īgroſſari cito ſequit̄ in lapidem tranſmutatio.

Dubitat̄ vtruz materie minus groſſe ꝯueniat fortior reſolo q̄ʒ groſſiori? Q̄ð nō arguit̄ ſic: Cura fit per cōtraria equata: ergo groſſiori magis reſolutiua cōuenit medicīa. Añs colligit̄ 3° tegni: ⁊ ꝯñtia tenet: q: ex quo mā ē groſſior: ergo ſibi ꝯtrariū reſolutiuū erit fortiꝰ. ¶Scđo ſic: māe minꝰ groſſe tāta ꝯpetit reſolo q̄ʒta māe groſſiori ⁊ āpliori: ergo ⁊c̄. ꝯñtia ē nota: ⁊ ꝓbat̄ aſſumptū. Nā gr̄a exēpli ponat̄ ꝙ a mā ſit in duplo groſſior. b. notū ē primo ꝙ mā. a. ātequā ſit reſoluta prīo erit eque groſſa ſicut. b. tūc arguit̄ ſic. a. exn̄te eque groſſa ſicut. b. ꝯuenit equalr̄ reſolo: ⁊ āte hoc cōueniebat reſolo iā vſquequo. a. ē. b. equatū: ergo tāta reſolo cōuenit. a. quāta. b. ⁊ adhuc amplior. ¶In oppoᵐ videt̄ mens Aui. ⁊ arguit̄ ſic: Maior timor eſt de ꝯuerſione ī lapidē ī mā groſſiori q̄ʒ ī mā minus groſſa: ergo remiſſiora reſolutiua ꝯpetūt māe groſſiori q̄ʒ māe minꝰ groſſe. Añs notū ē ⁊ ꝯñtia nota. ¶Pro dubio ſit hec pᵃ ꝯclo: Q̄uātū ad primas approximatōes fortiora reſolutiua ꝯueniūt ī mā minꝰ groſſa q̄ʒ in mā magis groſſa. Cōclo pꝫ ꝑ rōnez poſt oppoᵐ ⁊ arguit̄ ſic ex Auic. Nā reſolōni materiei groſſioris eſt lenificās ad miſcēdū: ergo ⁊c̄. ¶Scđa ꝯclo: quātū ad totā approximatōez effectiue fortiora reſolutiua ꝯueniūt māe groſſiori q̄ʒ ī mā minus groſſa. Probat̄ ꝯclo ſic: Mā magis groſſa plus reſiſtit reſolōni mā minꝰ groſſa: ergo ſi dꝫ venire ad debitaz reſolutionē eget reſolutiuo effectiue groſſiori ſeu fortiori. ¶3ᵃ ꝯclo: reſolutiuū vocat̄ effectiue fortiꝰ: nō q: ī eqs applicatōibꝰ fortiorē faciat reſolōnez: ſꝫ q: tādem faciet fortiorez: aut q: ī pluribꝰ applicat̄ vicibꝰ vt tādez faciat operatōez. ¶Quarta ꝯclo: nō eſt neceſſe groſſiꝰ tm̄ reſolutiuū q̄ʒtū minꝰ groſſuz ad tantā ꝑuenire ſubtilitatē q̄ʒta eſt ſubtilitas minꝰ groſſi. Cōclo arguit̄ ſic: Poſſibile ē groſſuz ꝑ ꝯtinuā reſolōnez fieri groſſiꝰ: ergo ꝯclo vera. Cōſequētia nota eſt: aſſumptū pꝫ. Applicato fortiter reſoluēte huic vehemēter groſſo: ꝑterea magis groſſuz pōt ꝯuerti ī vaporē groſſiorē: igit̄ ꝯclo vera. Aſſumptū eſt notuz: ⁊ tꝫ ꝯñtia: q: ſicut vapor groſſior extitit: ita mā groſſior alijs paribꝰ. Iſto poſito pꝫ ſolutio ad obiecta hincide currentia. Primū eiꝫ ꝓbat ſcđaz ꝯclōnez. 2ᵐ ſoluit̄ ꝑ quartā. Facta aūt poſt oppoᵐ ꝓbāt primā. ¶Scđo nota aliud eē medicinaz iuuari ī ſua oꝑatōe ⁊ aliud ītendi. Nā aliqd preparās māz ī qua dꝫ agere medicīa iuuat medicinā oꝑari: illud aūt ꝓprie ītendit oꝑatōez medicie qđ auget gradū virtutis medicie operātis in māz. ¶Ad ꝓpoſitū ꝑ medicinā lenificātez poſſumꝰ ītelligere medicinā leniter facientē reſolutionē ſua caliditate tꝑata cū qua ēt exiſtit aliqua ſiccitas. hec eiꝫ leniter reſoluendo ⁊ nō īdurādo māz ipſaz habilitat ad fortez reſolōnez: ipſa ergo eſt forti ꝑmittenda reſolutio. Scđo ꝑ medicinā lenificātez pōt intelligi medicina lenificās ſeu mollificās tꝑati caloris cuiꝰ eſt habilitare mām durā: que reſolutio etiā pōt ꝯmiſceri eiꝰ refrāgendo acuitatez ex mollificatōe habilitāte mām.

Et ex oppilatōibus quideꝫ peiores ſunt oppilationes venaruz: ⁊ deteriores eis ſunt ille que ſunt in artarijs: ⁊ adhuc peiores ſunt ille que in mēbris exiſtūt principalibꝰ: ergo cuz in aperitiuis ſtipticitas ⁊ ſubtilitas cōiungētur erit melius: quoniā ſtipticitas remouebit a mēbro ſubtiliatiui grauamen.

¶Nunc ponit vnā cōꝑationē īter oppilatiōes rōe mēbroꝝ oppilatorū: dicēs ꝙ peiores oppilatiōes ſunt ille venarū: ⁊ adhuc peiores ſunt artariaꝝ: ⁊ adhuc peiores ſunt ille mēbroꝝ pr̄icipaliū. ¶In vltīa parte ponit cañ. qđ ē melius vt ſubtilitas ⁊ ſtipticitas iūgat̄ medicinis aperitiuis: quia ſtipticitas remouet a mēbro grauatiōꝫ que fit ꝑ ſubtiliationem ſeu apertionem.

Iuuamēta autē ⁊ vtilitates rei ſtiptice iūcte alijs ſolutiuis pertractat Meſue ī ſuo de rectificatione mediciaꝝ ītētōe ſcđa caplo. iij. parapho illo: Res vero ſtiptica medicinarū oīum virtutes ⁊ operatōes felicitat ⁊c̄.

Dubitatur circa partez que oppilationes ſint peiores? Primo ꝙ ille neruorū arguit̄: q: he ſunt difficilioris cure ⁊ citiorē faciūt mortē ſaltē oppilationibus venarū ⁊ artariaꝝ: ergo ⁊c̄. Añs pꝫ quātū ad primā partē ꝓpter ſtricturā meatuū neruoꝝ. Q̄uātū ad aliā ptē pꝫ aſſumptū q: oppilatis neruis: aīalē ſpūuz ad ſpiritualia deferētibus mors ſtatim ſine dubio cōſequit̄. ¶2° arguit̄ ſic: oppilatiōes teſticulorū ſunt peiores vel maiores oppilatiōibꝰ artariarū aut venarum: ergo ⁊c̄. ¶3° arguit̄ ſic: oppilatiōes epatis ſunt peiores oppilatiōibꝰ venaruz aut artariarū in corde exn̄tiū: ergo ⁊c̄. In oppoſitū eſt. A. ī parte. ¶Pro pte notādū ꝙ oppilationū peioritas quāuis poſſit attēdi penes difficultatē remotiōis earuz ſicut morbū dicimꝰ malū q: difficilem ad curanduz. potiſſime tñ eius peioritas attēdit̄ penes nocumētū illatū aut aptuz īferri corpi. ¶Scđo nota ꝙ cū đ venis artarijs ⁊ neruis fit mētio: intelligit̄ de his que cōiter ꝑ corpis ſubſtantiaz ſpargūtur. ¶Tertio nota ꝙ hoc maxīe intelligit̄ de mēbris principalibꝰ ad indiuidui eē faciētibꝰ. ¶Pro dubio ergo ſit iſta pᵃ cōclo: ⁊ ſi neruoꝝ oppilatio alijs paribꝰ difficilioris ſit cure oppilatiōibꝰ venarū ⁊ artariaꝝ: cōiter tñ minꝰ male exiſtūt mō ſcđo. Pꝫ cōclo ſic: ex īdebita delatiōe vitalis ſpūs ⁊ nālis ac etiā ſanguis ad mēbra grādiꝰ ſequit̄ nocumētuz q̄ʒ cōiter ſequat̄ ex indebita delatione aīalis ſpūs: igit̄ ⁊c̄. Cōſeqn̄tia nota cū añcedēte q̄ʒuis aliq̄ oppilatio neruoꝝ vt illa ad quā ꝯſequit̄ ablatio anhelitus aliqua venaꝝ ⁊ artariarū oppilatiōe ſit peior vt argutum ē per vnā partē aſſumpti añ oppoſitū. ¶Scđa ꝯclo: ceteris paribus oppilatiōes venaꝝ ⁊ artariarū minꝰ male ſūt oppilationibꝰ principaliū mēbrorū ad eē indiuidui facientiū. Cōclo nota ē: ⁊ eo ꝙ illis mēbris leſis plus ledat̄ totū q̄ʒ leſis venis ⁊ artarijs. ¶Ultima cōclo: oppilatio membri principalis faciētis ad cōſeruationē ſpeciei ceteris paribꝰ ē minus mala mltis venarū ⁊ artariarū oppilatōibꝰ. Cōclo pꝫ cū vene ⁊ artarie multo plus ſint toti neceſſarie q̄ʒ teſticuli. Iſtis cōcluſis pꝫ ſolo ad obiecta. ¶Ulterius nota ꝙ ſtiptica ſunt ꝯmiſcēda apitiuis duplici de cā. Nā aperitiua diuidūt ⁊ diſpergūt ſubſtātiā mēbri: ⁊ ſic laxando debilitāt mēbrū. Stiptica ergo vniēdo mēbrū ⁊ refrāgēdo virtutē aperitiui cōferūt ⁊ cōfortant. Scđa cā q: ſtiptica ſic vniēdo imo ⁊ ſpūs vigorando ſubſtātiā ꝓhibent ſpūuz euaporatiōꝫ ⁊ citā reſolōnē. Ex iſtis pꝫ ꝙ ī mēbris hn̄tibus ſubſtātiā mollē quātū ē ex hoc ſtiptica maxīe ſūt apitiuis cōmiſcenda. ⁊ in mēbris quoꝝ magnā hēmus cuſtodiā ſicut ſūt mēbra nobilia ⁊ pr̄icipalia. In mēbris autē vilibus de quibꝰ nō ē cura ſtiptica minime aut modicū ſūt aperitiuis cōmiſcēda. ¶Ulteriꝰ nota ꝙ mēſura ſtipticorū pōt ex multis cōprehēdi: pᵒ ex re preter nāz vt morbo. Nā ſi oppilatio ē fortis pauca ſtiptica ſūt cōmiſcenda aperitiuis. Itē menſurat̄ ab accidēte qđ ē debilitas virtutis. nā virtute exn̄te debili ⁊ laxata ſtiptica cōueniūt fortiora. Sed ſi iungant̄ cōtraria vt fortis oppilatio ⁊ đbilitas virtutis:

UVA. BHSC. IyR_006_1

tutis:tũc ad p̃potens in iudicãdo eſt attẽdendũ nõ negle/
cto alio iuxta Gal. ſniaʒ 8º terapẽ. ad finẽ. Sumit̃ ẽt a di
ſpõne nãli q̃ eſt latitudo cãnaliuʒ aut coanguſtatio eoꝛuʒ:
q: magis lato exñte cãnali ſtipticioꝛa ꝯueniũt:iteʒ a nobi/
litate membꝛi. nã mẽbꝛo nobilioꝛi ſtiptica magis ꝯpetũt ⁊
magis aromatica. ¶ Circa p̃habitũ cañ. omittendo multa
verba ꝯmẽtatoꝛis notãduʒ q̃ alioꝝ moꝛboꝝ ꝯpoſitõaliuʒ
nõ expſſit hic. A. curã ipſaʒ plus ſeruans ad loca ꝑticula/
ria:q: tãq̃ʒ ex alioꝝ moꝛboꝝ ꝑticularib⁹ curis pẽdẽtẽ: ma
gis poſuit vero hic curã oppilatõuʒ vt plus ꝯtigẽtiuʒ ⁊c̃.

¶ Caᵐ 25ᵐ de medicatõibus apoſtematũ.

a Poſtematũ quedã ſunt calida:quedã ſũt
frigida fluxa ⁊ quedã ſunt frigida dura ⁊
ea iaʒ dixim⁹. Et ipſoꝛũ quidẽ cãe aut ſũt
pꝛimitiue aut antecedẽtes: ⁊ antecedẽtes
quidẽ ſunt ſicut repletio: ⁊ pꝛimitiue ſunt
ſicut caſus aut ꝑcuſſio aut moꝛſus. Quedã vero q̃ ſũt ex
cauſis pꝛimitiuis q̃nq̃ʒ cũ coꝛꝑis repletione ſe repñtãt ⁊
q̃nq̃ʒ eueniũt cũ equalitate humoꝝ. Et ea quidẽ que ſũt
ꝓpter cãs antecedẽtes aut pꝛimitiuas cuʒ repletiõe coꝛ/
poꝛis repñtata:aut ſunt in mẽbꝛis que pꝛĩcipalibus ſũt
vicina ſicut euacuãtia aut non ſunt.

¶ In caplõ p̃cedenti determĩauit de moꝛbo ꝯpõnali vt
de oppilatõib⁹:nunc moꝛbi ꝯpoſiti curã ponit vt apatuʒ.
Et diuidit̃ ĩ duas. Nã pº facit qđ dictũ eſt. 2º quoſdam
cañ. ponit ⁊ explicat circa ſpãleʒ curã apatuʒ. ibi 2ª: q pla/
gaʒ ſecare. Primũ caᵐ diuidit̃ ĩ duas ꝑtes quãtuʒ eſt ꝓ
pñti ꝓpoſito: q: pº ponit aliq̃s diuiſiones cãruʒ apatũ. 2º
cañ. exequit̃ ponẽdo curatões. ibi 2ª: ⁊ ſi non ſũt. Pꝛĩa in
duas. Nã pº p̃mittit vnã diuiſionẽ apatũ. 2º ponit q̃ſdã
diuiſiões. ibi: ⁊ ipſoꝝ quidẽ. De pª dicit q̃ apatuʒ quedã
ſunt calida: q̃daʒ ſunt frĩda. Et frigidoꝝ q̃dã frĩda fluxa:
q̃daʒ vero frĩda dura. Et iaʒ ea. ſ. apata diximus 2ª pꝛimi
doctrina pª caº de moꝛbis cõpoſitis. De 2ª dicit q̃ cauſe
apatũ aut ſunt pꝛimitiue aut añcedẽtes. añcedẽtes aũt ſũt
ſicut repletio coꝛꝑis: pꝛimitiue vero vt caſus ꝑcuſſio moꝛ/
ſus ⁊ ſimilia. ¶ Scđa diſtictio cãꝝ pꝛimitiuaꝝ aliq̃ q̃nq̃ʒ
repñtãt ſe coꝛꝑe repleto: q̃nq̃ʒ aũt ſtante eq̃litate humoꝝ.
¶ Tertia diſtictio ẽ hec: q̃ apata exñtia ꝑꝑ cãs añcedẽtes
aut pꝛimitiuas cũ repletõe coꝛꝑis: aut ſunt ĩ mẽbꝛis pꝛĩci/
palib⁹ aut ĩ eoꝝ emũctoꝛijs: aut ſupple non ſũt ĩ talib⁹ mẽ/
bꝛis. ſ. emũctoꝛijs. iſta eſt ſnĩa totius lectionis.

Nota q̃ apata ca
lida ſunt duplicia. ſ.
ꝑ eſſentiã vt que ſunt
de mã calida: ⁊ que/
daʒ ſũt calida per ac
cidẽs: vt qñ materia
ẽ frigida ⁊ putreſcit:
⁊ de vtriſq̃ʒ intelligi
tur hic: quare ⁊c̃.

Dubitatur vtruʒ pꝛius Aui. habu
it determĩare de mala cõplõne ⁊ de mala compõne q̃ʒ de
apatibus? ¶ Pꝛimo q̃ pꝛius fuerit de ſoluta cõtinuitate
determinãdũ arguit̃: q: ſoluta cõtinuitas ẽ notioꝛ nobis:
vt pʒ: ergo ⁊c̃. ꝯñtia nota q: a nobis notis pº ẽ inchoandũ
pº phiſicoꝝ. ¶ Scđo arguit̃ ex mõ Aui. 2ª pꝛimi qui ſolu
te ꝯtinuitatis noticiã apatũ notitie p̃poſuit. ¶ Tertio ad
aliã partẽ arguit̃ ſic: Apata ſunt cõioꝛa reſpectu malaruʒ
ꝯplõnũ: ergo ab eis vt notioꝛib⁹ inchoandũ. ꝯñtia tenet q:
tota cõpoſita ſuis partib⁹ nobis ſũt notioꝛa pº phiſicoꝛũ:
⁊ añs ꝓbat̃ q: in apate ẽ mala cõplõ mala ꝯpõ ⁊ ſoluta cõ
tinuitas: vt pʒ 2ª pꝛimi. c. allegato: ⁊ pꝛĩo de accidẽti ⁊ moꝛ
bo. ¶ In oppoſitũ ẽ oꝛdo in pñti fen ſeruatus. Pꝛo du/
bio ex dictis memoꝛãdũ apud medicos iſta nõĩa inueniri:
moꝛb⁹ ſimplex: moꝛb⁹ cõpoſit⁹ ⁊ moꝛb⁹ cõplicat⁹. ille di/
cit̃ ſimplex qui ẽ lapſus vna ſimplici nã moꝛbi cui ẽt đbet̃
vna ſimplex ĩtẽtio curatiua q̃ũo malã cõplõnẽ calidã aut
frigidã ⁊c̃. ſimplicẽ moꝛbũ dicim⁹ q: vnã cõplõnalẽ ledat
nãm cui vna debet̃ intẽtio curatiua: hec aũt iõ dicta ſunt
vn⁹ lapſus vni⁹ nãe cui debet̃ vna intentio curatiua. nam
⁊ ſi mala cõplõ calida ⁊ frigida vnã ledat cõplõnalẽ nãm:
nõ tñ vno lapſu vt notũ ẽ: nec etiã vna ei debet̃ ĩtentio cu/
ratiua ſeu curatio. ꝑ moꝛbũ aũt cõpoſitũ quẽ medici vnũ
appellãt ĩtelligo moꝛbũ ĩ quo triplex nã ledit̃: ſic tñ q̃ vn⁹
actus curatiuus ad oẽm talẽ ſufficit leſionẽ reſoluẽdã ſeu
remouẽdã. In hac ẽt notificatõe notãter ponit̃ trium na/
turarũ leſio. Nã nõ credo eẽ neceſſariũ quãuis ſit ſm plu
rimũ in apate cõiungi moꝛbũ ꝯplõnis vnitatis ⁊ ꝯpõnis:
ĩmo credo eẽ ꝓbabile vt al's tenui foꝛe apa: ⁊ tam in apate
nullũ eẽ ꝑtialẽ moꝛbũ. Hoc ſemꝑ ſuppoſito qđ hʒ tenere
quilibet ſane mentis q̃ ſi neutralitas vni⁹ nãe neutralitati
alterius nãe ꝯiungat̃: maioꝛ ſequit̃ leſio oꝑatiõis q̃ʒ ſi vna
ſit ſola neutralitas. Iſto ſuppoſito iuxta cõem modum ta
lem ſuppono cãuʒ q̃ neutralitas in cõplõne terminat̃ ex/
cluſiue ad ſenſibilẽ leſionẽ oꝑatiõis cui ꝯiungat̃ neutrali/
tas vnitatis: ⁊ neutralitas cõpõnis pendentis ab alia mã a
qua pẽdet illa mala cõplõ. Iſto habito pʒ ꝑ preſuppoſituʒ
oꝑatiõeʒ ſenſibil'r ledi ⁊ eẽ moꝛbũ cõpoſitũ vt ẽ notũ nul/
lo ꝑtiali exñte moꝛbo. Dicẽdũ ergo q̃ apata ꝯponũt̃ ex tri/
plici genere moꝛbi. i. ex lapſibus ĩpoꝛtatis ꝑ triplex genus
moꝛbi. ſ. ꝑ iſta tria vʒ mala complõ cõpoſitio ⁊ ſolutio con
tinuitatis. ¶ Nota etiã q̃ vnitas moꝛbi cõpoſiti ĩquãtuʒ
ſufficit ꝓpoſito ſumit̃ ab vnitate cãe a qua pẽdet ac ẽt vni/
tate actus curatiui. Etiã ex ꝑte accidẽtis vnius p̃ter nãm
qđ ſequit̃ qđ ẽ tumoꝛ, vtplurimũ vñ dicim⁹ apa eẽ vnum
moꝛbũ hoc mõ vnitatis huius vnitatis notitiã ſumentes
ab vnitate cãe ⁊ mãe lapſu ĩ cõplõne cõpõne ⁊ vnitate fa/
ciẽtes ad cui⁹ mãe replẽtis poꝛoſitates remotionẽ oĩuʒ tri/
um lapſuũ remotio cõſequet̃: ⁊ ſi apate remoto male cõple
xionis veſtigiũ remãſerit nõ ẽ illud ꝑs apatis dicẽdũ. Ex
dicta notificatõe ſaluat̃ q̃ ſi ab aliq̃ mã fiat mala ꝯplõ cali
da ⁊ ſicca hũc moꝛbũ ꝓbabil'r vnuʒ ⁊ ꝯpoſitũ poſſum⁹ ap
pellare: q: tñ clari⁹ eſt apa eſſe moꝛbũ ꝯpoſitũ vnũ: iõ ab/
ſolute auctoꝛes ipſa dixerũt eẽ vnũ. ¶ Ulteri⁹ notãdũ q̃
ꝑ moꝛbũ ꝯplicatũ moꝛbũ alteri moꝛbo ꝯiunctũ habem⁹ in
telligere: cui⁹ nõ vna ĩmo diuerſa ⁊ multiplex ẽ ĩtentio cu
ratiua. ¶ Iſto notato pono conclõneʒ rñſaleʒ: Qđ poſt de
terminatõeʒ oppilatõuʒ apatis rõnabil'r debuit ſeq̃ deter
minatio. Pʒ ꝯcluſio eo q̃ ad oppilatiões apata ꝯſequunt̃
ſeu q: ĩ apatib⁹ reperiunt̃ oppilatões repletis mẽbꝛoꝝ me
dijs regionib⁹. Et ex iſto ĩfert̃ q̃ cũ ſoluta ꝯtinuitas cũ op
pilationib⁹ ñ tãtaʒ hẽat ꝯtinuitatẽ ſeu affinitatẽ q̃ʒtã hñt
apata: qđ notãter Aui. poſt oppilatões de apatib⁹ đtermi
nauit ⁊ non de ſoluta ꝯtinuitate. Iſto poſito pʒ ſolutio ad
obiecta añ oppoᵐ. Nã pº dicẽdũ ñ nobis nocioꝛẽ eẽ ſolu/
tã ꝯtinuitatẽ apate: vel dđm q̃ q: apatũ cura oppilatõuʒ
cure ẽ affinis: iõ notãter vt tactũ eſt poſt determinationẽ
de oppilatiõib⁹ determinauit de apatib⁹. Ad aliũ dicẽdũ
q̃ cũ in apate ſoluta ꝯtinuitas includat̃: iõ ꝑfecta apatum
cognitio ſolute cõtinuitatis p̃ſupponit notitiã. In debite
ergo notificãdo apa debuit ſolute cõtinuitatis ponere no
titiã: habita vero notitia apatuʒ ⁊ ſolutiõis continuitatis
debuit pꝛĩo apatũ p̃mittere curã ꝓpter cãm aſſignatam.
¶ Ulteri⁹ aduertẽdũ pº ad ꝑtis euidẽtiã q̃ illa apata vo/
cant̃ calida ab Auic. que ſunt calida per eẽntiã eo q̃ đ mã
que ſui nã calida ẽ exiſtãt: vt ſanguinea: aut colerica: nõ ãt
ĩtelligit que ſunt calida accidẽtal'r: q: per putrefactionem
eiſdẽ accidẽtẽ que ſnĩa ẽt colligit̃ 2ª pꝛimi. c. de apatibus.
¶ Scđo nota q̃ ꝑ apata frĩda fluxa ĩtelligit apata ex mã
flegmatica fluxibili quale ẽ apa dictuʒ vndimea: aut fleg/
maticũ: aut ẽt aquoſũ: vt idrops aquoſa aut hernia aquo/
ſa. Per frĩda vero ⁊ dura ĩtelligit apata ꝓueniẽtia ex mã
melãcolica aut flegmatica cõgelata vt ſui cõgelatiõe ĩ du
ritiẽ trãſcat. Per ipa ẽt ĩtelligẽdo vẽtoſa que dura ſunt
ꝓpter intẽſionẽ vẽtoſitatis extẽdentis. ¶ Tertio nota q̃
ꝑ cãs apatũ intelligit cãs pꝛimitiuas effectiuas. cãe enim
pꝛimitiue efficiũt apata: vt cãus ⁊ ꝑcuſſio. Añtes vero vt
repletio dicũt̃ apata facẽ quãuis nõ ĩmediate ſʒ mediate.
¶ Quarto nota q̃ cã añs nõ ſolũ ſumit̃ hic pꝛo cã p̃cedẽ/
te ſed ꝓ cã coꝛpoꝛali nõ ĩmediate ſʒ mediate cauſante moꝛ
bũ vt humoꝛ putridus mediãte putrida fuligine inficiens
coꝛ. Añs vocat̃ cã nõ q: ĩmediate efficiẽs moꝛbũ ſʒ media/
te. Ex dictis ĩferẽdũ humoꝛẽ nõ actual'r humidũ putridũ
ſed aptũ putrefieri nõ vere debere dici cãm añcedẽtẽ pu/
tride febꝛis. ꝓpoſitio ꝓbat̃ q: hic humoꝛ nõ ĩmediate nec
ĩmediate cauſat febꝛem: ergo ⁊c̃. Nota ꝯñtia ⁊ pʒ añs. naʒ
pº nõ ĩmediate cãt febꝛẽ vt notũ ẽ: nec ẽt mediãte alio: q:
maxĩe hoc eſſet mediãte putredĩe. Sʒ ꝯ hoc arguit̃ q: hic
humoꝛ nec cãt nec cãuit putredinẽ q̃ faciebat febꝛeʒ: ergo
⁊c̃. Añs eſt notũ cuʒ ꝯña. Aliquo mõ tñ põt dici cã añs q:
cã coꝛꝑalis p̃cedens ad quã non ĩmediate: q: non ſtatiʒ ſe/
quit̃ moꝛb⁹ ſʒ mediate: q: mediãte tꝑe cauſabit febꝛeʒ: ⁊ iõ
exponendo verã cãʒ añcedẽteʒ dđm ſic: Cã añs eſt cã coꝛ
poꝛalis q̃ non ĩmediate fit moꝛb⁹ aut pẽdet: ſʒ mediãte alio
qđ cauſat moꝛbuʒ aut ꝯſeruat. ¶ Ulteri⁹ nota q̃ ꝑ reple/
tioneʒ ĩtelligere poſſum⁹ reʒ replẽteʒ: aut mẽbꝛũ: aut coꝛ/
pus repletũ. Si pº ĩtelligit̃ res replẽs q: humoꝛ: pʒ reple/
tõeʒ eſſe cãʒ coꝛpoꝛeã q: hũoꝛ ẽ res coꝛꝑalis. Hic tñ nota
q̃ talis hũoꝛ replẽs talẽ ꝑteʒ apatã: tũc dicit̃ cã ꝯiũcta ⁊
nõ añs. nã eſt cã coꝛꝑalis a q̃ ĩmediate pendet apa. Si ve/
ro repleat aliã ꝑtẽ aptã: replere ꝑteʒ apatã dici põt cã añs
non ĩmediate apans ſʒ mediãte ꝑte fluente: ſeu dici poteſt
añs q: cã coꝛꝑea non ĩmediate: q: non ſtatiʒ ſʒ mediate: q:
tꝑe ĩtermedio apta replere cãre dicit̃ apa. Si vero reple/
tio ĩpoꝛtet mẽbꝛuʒ repletũ aut ergo ĩpoꝛtat mẽbꝛũ apatuʒ
aut aliud. Si non ĩpoꝛtat membꝛuʒ apatuʒ: tũc non eſt cã
apatis niſi ſicut groſſe loquẽdo pars dicit̃ mã ⁊ cã totius.
Si vero dicat aliud mẽbꝛũ repletũ ſic aliquo mõ põt dici
cã añs q: ẽ cã coꝛpoꝛea a q̃ pẽdet apa mediate ⁊ nõ ĩmedia
te. ¶ Ulteri⁹ nota q̃ iſte cãe dicũt̃ pꝛimitiue que ſũt ĩ coꝛ
poꝛe ſed ñ dignoſcit̃ coꝛpoꝛis eẽntia ĩmediate vel media/
te cãntes moꝛbũ: que iõ dicũt̃ pꝛimitiue q: pꝛĩo in cãndo
moꝛbũ: mouent eĩm coꝛꝑeas ad ſuos moꝛbos cauſandos.
Cãe eiʒ pꝛimitiue ꝑlerũq̃ʒ mouẽt añtes pꝛima quarti. c. đ
effimera. Hic tñ aduertẽdũ q̃ nulla cã pꝛimitiua põt ali/
qđ apa ĩmediate cãre. pꝛopõ arguit̃ ſic: Oẽ apa dependet
ĩmediate a mã replẽte: ergo cõclõ vera. Añs notũ de vero
apate. Nota ꝯñtia q: moꝛſus ꝑcuſſio aut cãus rõne dolo/
ris attrahũt mãm ⁊ replẽt: apa ergo ĩmediate pẽdet a re/
pletiõe materiei. ¶ Ulteri⁹ nota q̃ ꝑ equalitatẽ humoꝛuʒ
ñ ĩtelligit Aui. abſolutã humoꝝ equalitatẽ: ſʒ ꝑ equalita/
tem ĩtelligit equã ⁊ tẽꝑatã quãtitatẽ vt pꝛo oꝑatiõib⁹ cõ/

UVA. BHSC. IyR_006_1

uenit. ¶Ulteriꝰ nota ꝙ iſta diuiſio pōt ſic ſuppleri: Cauſarū primitiuaꝝ quedā ſe repn̄tant corpori cū humoꝝ q̄ꝫtitate: quedā ſe repn̄tant corpori vltra debitū eūato. nam adhuc corpe fortiter eūato ꝑcuſſo aut morſo apatio conſequet̄ vt notū ē experiētia. ¶Ulteriꝰ notādū ꝙ ex hac ꝑte hanc poſſumꝰ ſumere diſtinctionē ꝙ apatū aliqua ſūt vicina aut in locis vicinis mēbris principalibꝰ: quedā ſūt ēt ī locis diſtantibꝰ. Similr̄ quedā ſunt ī locis que ſūt emūctoria ſeu eūatoria pricipaliū: q̄dā vero nō. Nā lꝫ oē emūctoriū ſit ſuo pricipali vicinū: nō tn̄ oē pricipale vicinū ē ipſius emūctoriū. ¶Ulteriꝰ nota ꝙ mēbrū illud vocat̄ emūctoriū pricipalis ad qḋ pricipale ſuas nāles expellit ſuperfluitates. Ideꝫ etiā vocat̄ emūctoriū: qꝛ ſuperfluitates extrahit ab his mēbris vt emulgēdo ad hec mēbra trāſeāt.

¶Unde nota ꝙ multiplices ex iſta ꝑte colligūtur apatū diſtinctiōes. naꝫ diſtiguunt̄ apata: aut rōne materierū vt dū dicimꝰ aliqua eē calida ⁊ aliqua frida: ⁊ hāc diſtictiōꝫ tetigit Aui. ī principio partis. Aut diſtiguunt̄ apata rōne modi apantis qꝛ vel apa generet̄ ꝑ viā fluxus māe vel per viā paulatine digōnis: qꝛ tn̄ apata gnānt̄ ꝓm plurimū per fluxū: iō hūc ſolū modū tetigit Aui. Itē 3° diſtiguūt̄ apata ex parte bonitatis ⁊ malitie māe apantis. Nā apatuꝫ ⁊ maxime ſanguineoꝝ quedā fiūt ex ſanguie laudabili q̄dā ex ſanguine malo vt pꝫ tertia quarti ſatis ad principiū. Qꝛ tn̄ mās defluētes vtplurimū cōtingit eē malas aut paulatine cōgeſtas: iō etiā iſtā diſtinctionē omiſit. Sumit̄ etiā diſtinctio rōe cāꝝ vt ꝓm ꝙ cāe ſunt corpee aut incorpee: quā diſtictionē poſuit 2ª huiꝰ: ibi ipoꝝ quidē. Diſtiguunt̄ etiā apata rōne diſpōnis corporis cui cōiungūt̄ ꝓm ꝙ cōiungūtur repletiōi totius aut nō: quā etiā ex illa parte colligere poſſumꝰ: ibi quedā vero ſunt que. Diſtinguūt̄ vlterius ratiōe locoꝝ ſeu mēbroꝝ: qꝛ aut ſunt in principalibꝰ aut non. Item aut ſunt in vicinis aut emunctorijs principalium aut non: que diſtinctiōes ratione locoꝝ comprehendūtur ex ea ꝑte: ⁊ hoc quidem ⁊c̄.

Et ſi nō ſūt nullo mō aliquid ex reſoluētibꝰ ē eis applicādū ī prin°: imo mēbrū expellēs eſt meliorādū ſi ibi fuerit mēbrū expellēs aut totū corpꝰ melioret̄ ſi nō fuerit ibi mēbrū ſingulare q̄tenꝰ ad ea ꝓueniat quicquid refrenat ⁊ ad diuerſū trahit ⁊ ſtipticū efficit. Et tn̄ cū diuerſitate illiꝰ mēbri fit attractio ad illḋ qḋ ī alio latē diuerſo ē poſitū ꝓpter exercitiū ipſiꝰ aut ꝑꝑ reꝫ pōderoſaꝫ ſuper ipm delatā. nā multotiens a manu apoſa trahit̄ mā qn̄ cū alia res defert̄ pōderoſa ⁊ hora vna tenet̄. Opꝫ auteꝫ vt ſtiptica cōſtrictiua repercuſſiua frigide ꝯplexionis pure exiſtant ſi apata fuerint acuta. Qḋ ſi apata fuerit frigida oꝫ ꝙ alicui ſint admixta in quo virtus ſit calida cū retentōe ſicut ſquinātū ⁊ blacte bizantie.

¶Nunc Aui. ponit cañ. curatiuos apatū. Et diuidit̄ in duas. In prima ponit curā apatū extrinſecoꝝ. 2° occultorū. ibi 2ª: occultoꝝ aūt. Pria ī duas. Prīo Aui. ponit curā apatis ſiue cañ. curatiuos apatū ꝑdictis diuiſiōibꝰ diuiſoꝝ. 2° diuiſoꝝ: alia diuiſiōe. ibi 2ª: ex apatibus ꝑterea. Pria in duas. Prīo ponit curā apatis ſeu apatū molliuꝫ ſiue laxorū. 2° duroꝝ. 2ª ibi: ī apate aūt duro. Pria ī duas. Primo ponit curā apatis ꝑ reſolutionē terminādi. 2° terminādi ⁊ curādi ꝑ collectionē puris ⁊ opationē. ibi 2ª: cūqꝫ ad collectionē. Pria in duas. Prīo ponit curā apatis dū nō fit in emūctorijs mēbroꝝ principaliū. 2° qn̄ fit ī dictis emūctorijs. ibi 2ª: ſi vero mēbrum. Prima ī duas. Prīo ponit curā apatū dū ꝓueniūt a cāis añcedētibꝰ. 2° dū ꝓueniūt a cāis primitiuis. ibi 2ª: ea autē. Pria ī tres. Prīo ponit curā apatū ī prin° exn̄tiū. 2° exn̄tiū ī ſtatu aut augmēto. 3° exn̄tiū in declinatōe. ibi 2ª: cū aūt volueris. ibi 3ª: cuꝫ aūt declinatio. Pria ī tres. Prīo facit qḋ dictū eſt. 2° qꝛ dixerat ī prin° apatis eſſe diuertēdū ponit quēdā modū diuerſionis. 3° qꝛ in prin° apatuꝫ ſtiptica dixit eſſe approximāda: iō ponit diuerſitateꝫ ſtipticoꝝ approximādoꝝ in diſtictis apatibꝰ. ibi 2ª: eſt tn̄. ibi 3ª: oportet vt. ¶Maꝝ triū ꝑtiū ſilr̄ ponēdo ſn̄iaꝫ: de pª dicit ꝙ ſi apata ſupple nō ſūt ī mēbris pricipalibꝰ aut emūctorijs aut ſibi vicinis nullo mō aliqḋ reſolutiuū a prin° eſt applicādū: ſꝫ mēbrū mittēs eſt meliorādū ſiue mittat totū corpꝰ ſiue aliqḋ ſpāle mēbrū intātū ꝙ refrenātia diuertētia ⁊ ſtipticuꝫ faciētia ad ea ꝓueniāt mēbra. ¶Scḋo dicit ꝙ eſt ꝯtigens fieri attractōeꝫ ⁊ diuerſionē ꝓꝫ diuerſitatē membri ad qḋ attrahit̄: qꝛ tale mēbrū eſt poſitū ī latere diuerſo ſicut apa manꝰ ꝓpter exercitiū alteriꝰ manꝰ aut delationē rei pōderoſe pluries a manu apoſa attrahit̄ ⁊ diuertitur mā. ¶De 3° dicit ꝙ ſtiptica approximāda ī prin° apatis acuti ⁊ calidi ḋbēt eē repcuſſiua puta ꝯplōnis fride. Ea aūt q̄ approximant̄ ī prin° apatū fridoꝝ debēt eſſe calida ſtiptica vt ſquinantū blacte bizantie. ⁊ hoc totuꝫ ſit de lectōe iſta.

Dicit Gētilis ꝙ ſtiptica repcuſſiua in pricipio ſūt approximāda vbi repercuſſio non ſit ipoſſibilis vt in mā venenoſa: in apatibus etiā emūctoriorum nō ſūt approximāda niſi ad remittēduꝫ acutateꝫ materie ⁊ nō ad repercutiendū: etiā qn̄ mā ē fluxa amplius nō repercutimus: etiaꝫ qn̄ mā ē groſſa viſcoſa qꝛ talis mā nō bene pōt repercuti: ſꝫ ī alijs caſibus poſſibilibus bene repercutimus ⁊c̄.

Dubitatur pro parte vtrum reſolutiua ſint in hoꝝ apatuꝫ pricipio approximāda:

Qḋ ſic arguit̄: qꝛ ī prin° hoꝝ apatuꝫ ꝯueniūt attractiua: ergo reſolutiua. ꝯn̄tia tꝫ per ſimile. pꝫ añs qꝛ poſſibile eſt hāc mām eſſe corroſiuā ⁊ venenoſaꝫ. ¶Scḋo ſic arguit̄: Mā dꝫ trahi a ꝑte nobili ad ꝑteꝫ ignobileꝫ: ergo ī prin° ꝯueniunt attractiua. Añs ſatis notū cū nā nāliter opans expellat māꝫ a ꝑte nobili ad ꝑteꝫ ignobilē: vt colligitur 2° de accn̄ti: ergo ⁊ medicus imitator nāe dꝫ hoc facere. ¶Tertio ſic arguit̄: In prin° apatuꝫ ꝯpetit cura debita apati: ergo ī principio apatis ꝯuenit reſolō. Añs vr̄ ſatis notū. Tenet ꝯn̄a: qꝛ cū apa pendeat a repletōe ⁊ reſolutio opponat̄ repletōi: videt̄ ꝙ reſolutio ī prin° ꝯueniat. In oppoſitū eſt Auic. in ꝑte. ¶Pro dubio nota Aui. ītelligere de apate dictaruꝫ ꝑtiuꝫ cuiꝰ nō eſt venenoſa mā. ¶Scḋo nota eū ēt ītelligē de apate qḋ nō eſt cū nimia ſeu vera repletōe ꝑtis. ¶Tertio nota ꝙ reſolutiua ſeu ꝯuerſiua humoꝝ ī vaporē ſūt ſatis calida vt colligit̄ 2° cañ. c. 4°. ¶Quarto nota calā nāliter attrahē mās ad locū ⁊ eas mobilitare ⁊ eis apire vias. ¶Ulteriꝰ nota vt colligit̄ pª affo. ꝯmēto 12° ꝙ pricipiū pōt ſumi ꝓ pūctuali initio morbi ꝓ ſpacio triuꝫ dieꝝ ⁊ ꝓ vno ex tꝑibꝰ morbi. ¶Ulteriꝰ nota ꝙ tēpora pn̄t duplr̄ diſtingui ī apatibus. p° penes aliqua accn̄tia que ꝯſequunt̄ ad apa vt dicat̄ eſſe principiuꝫ inchoāte doloris intēſione ⁊ tumore: dicamus augmentū iſtis auctis: ſtatuꝫ vero iſtis vltimatis: declinationē aūt qn̄ minuūtur. 2° diſtiguūtur penes digeſtionē māe: vt dicamꝰ principiū eē cruda exn̄te mā: augmētū vero apparēte manifeſta digōne aut ſibi cōtrario ſed nō in vltimo: ſtatū aūt ſūme digeſta aut deprauata mā. declinatiōeꝫ aūt qn̄ reſoluit̄ vel minuit̄ apa. quibꝰ duobꝰ mōis q̄ꝫuis oppoᵐ dicat expoſitor ītelligit Aui. principiū. nā hiꝰmodi ſic ītellecti oībꝰ pn̄t aptari apatibꝰ. ¶Ulteriꝰ ex dictis memorādū vt euitet̄ dubiū ꝙ n̄ hic cōſiderat̄ principiū ꝓ tēpore ī quo inchoat̄ morbꝰ īquātū tēpus: huiuſmōi eiꝫ ꝯſideratio tꝑis philoſopho ꝑtinet naturali: ſed cōſiderat̄ tꝑs ī morbo ⁊ principium pro diſpōne morbi talr̄ mēſurata. ¶Iſtis notatis ſit hec pria cōclō ad queſitū: Reſolutiua ī principio taliū apatū mā nō exn̄te venenoſa nō ꝯueniūt. Arguit̄ cōclō: Augentia apata nō cōueniunt: ergo aſſumptū tenet: ⁊ ꝯn̄tia ꝓbat̄ qꝛ reſoluentia attrahētia mām augēt apa. ¶Scḋa cōclō: mā apatis exiſtente venenoſa ⁊ mala attrahētia ⁊ reſoluētia cōueniunt. Pꝫ cōclō qꝛ in hoc cāu nō curamꝰ augere apa maius volentes euitare nocumētū. ſ. raptū māe ad īteriora: tunc pꝫ ſolō ad rōnē primā: pꝫ etiā ſolō ad aliū punctū: qꝛ nō ſemper mā ē extrahēda ad quodcūqꝫ mēbrū ignobile vt dicetur. Ad aliā dḋm ꝙ apati inquātū apa in pricipio reſolutio nō ē cura: ⁊ de hoc dicet̄ infra. ¶Ulteriꝰ nota ꝙ corpus mittēs ac mēbrū meliorari nō ē niſi ipm per eūationeꝫ facere meliꝰ ne mām mittat: aut ēt ē eiꝰ cōfortare virtuteꝫ ne multiplicādo ſuꝑfluitates eaſdē mittat mēbro apando: exēpli cā ſi ſit reſolō totius aut ꝑtis mittētis: vel ſi mēbrū ꝓpter ſuā malā cōplōnē multiplicet humorē quē aliqn̄ ſibi tranſmittat: tūc ē corrigēda mala mēbri cōplō que ē cā huius multiplicatiōis. ¶Ulterius nota ꝙ nō ſolū mittēs mēbrū ē meliorādū: imo ēt recipiēs: qḋ ꝓpter ſui malā cōplexionē aut ꝓpter aliqḋ accidēs trahit ad ſe mām dato ꝙ mēbrū de ſe nō trāſmitteret: vtputa calefacto membro aut etiā dolente: qꝛ vtplurimū: tn̄ mēbra mittentia ſunt cā delatiōis māe: iō de eoꝝ melioratōe expreſſit potiꝰ. ¶Ulterius nota ꝙ nō ſolū mēbra ſunt eūanda ꝓpter repletionē ſupple pn̄teꝫ: ſꝫ ſupple pluries ſunt eūanda grā ꝑuiſionis ne repletio ſequat̄ in ꝑte: vt dato ꝙ corpus nō multis abūdet humoribꝰ: cōtingit tn̄ mām ad determinatā partē eē fluxurā: ne igit̄ mā fluat ⁊ parti repletio cōſequat̄: ꝑmittitur melioratio cū eūatiōe. ¶Ulteriꝰ nota ꝙ apate exn̄te ī principio nō ſolū intētio eſt abſolute ad mām que fluxit ⁊ apat: ſed ēt ad ꝓhibēdū fluxū ne augeat̄ apa: ꝓhibet̄ aūt ꝓpter recurſum. i. retrocurſuꝫ qꝛ mām faciēdo currere ad ꝑtē diuerſaꝫ: qꝛ recurſus vt pꝫ 3° tegni: vel fit per pulſuꝫ: aut ꝑ tractū: aut per trāſmiſſum. Fit aūt pulſus ꝑ medicinā fridam ſui frigiditate cōdēſantē ⁊ humiditatē exprimētem ⁊ expellētem: ſicut ēt exꝑſſa ſpōgia, fit humiditatū expreſſio: quēadmodū tetigit Gal. 3ª affo. cōmēto 13° illiꝰ affo. Si vero auſtrina hyemis. Fit aūt trāſmiſſio a mēbro ad mēbrū ad qḋ currebat mā ꝑ ſtipticā cōfortādo medicinaꝫ teſte Gal. dicēte 3° tegni. Et trāſmittūt a ſe vaſa cōfortata ſtipticis farmacijs. Cōfortāt aūt ſtipticū vniēdo mēbrū cū ipm vnitū fortiꝰ ſit laxato: ſed ēt ſtipticū iuuat ꝯprimendo vel expellēdo: nō tn̄ qꝛ verū faciat pulſum cū pricipalr̄ operet̄ ꝯfortādo mēbri virtuteꝫ. Fit aūt tractꝰ a mēbro diuerſo trahente vel ꝓpter doloreꝫ vel ꝑꝑ vacuū aut aliā rē ad diuerſaꝫ ꝑteꝫ trahendo diſtrahēteꝫ. ¶Ulteriꝰ nota ꝙ ī mō faciēdi recurſuꝫ ꝑ iſta dꝫ eſſe ordo. nā tractus dꝫ ꝑcedere pulſuꝫ aut trāſmiſſuꝫ: vt colligit̄ 5° tegni. Nā non facta diuerſione non repugnabit ꝙ ad mēbruꝫ cui mittet̄ non trāſeat mā. Si etiā ſit repletio totiꝰ aut mēbri nō erit locus ī quo replēda mā capi poſſit. Facta vero attractione erit locus cōueniēs. Inter vero pulſuꝫ ⁊ trāſmiſſū nō neceſſario cadit ordo: qꝛ tn̄ tutiꝰ ē pluries applicare ſtipticuꝫ cōfortādo virtuteꝫ q̄ꝫ frigidū repcutiēs: iō ſtiptico faciente trāſmiſſuꝫ ꝑinchoandū ē. Itē inter faciētia recurſum ⁊ eūantia ꝑ ꝑtē cādē dꝫ eſſe ordo: qꝛ pluries ⁊ regulr̄ recurrendum

UVA. BHSC. IyR_006_1

rēdū ꝗꝫ ꝑ eādē partē euāndū. Nā ſi euetur per eandē ꝑtē nō facto recurſu āpliꝰ attraheret: ꝗꝫ per illā euaret ꝑtez.

¶ Notabilr aūt dictū ē pluries ⁊ regulr q: multa mā fluxa ſuffocāte mēbri calorē ſcarificandū ē añquā faciamꝰ recurſuz: īmo nō eſt recurrendū ne recurſu āplius incuniata mā ſui quātitate multa ex toto mēbri virtute opprimat calidū ſuffocādo: quā ſnīam poſſumꝰ colligere ex 3ª quarti. c. de cura flegmonis. ¶ Ulterius nota ꝙ hec lr̄a ea ad duo pōt referri. primo ad ea. ſ. āpata mēbra: ⁊ ē ſenſus: p° faciēda ē melioratio quatenꝰ. i. vt refrenātia attrahētia ad diuerſū ⁊ ſtipticātia ꝑueniāt ad ea. ſ. mēbra āpata vel apoſtemanda. ſ. ipām iuuādo. Uel quatenus ꝑueniāt ad ea q: ſic fiāt vt ipa poſſint mēbris applicari que nō debite poterant applicari ante totius aut ꝑtis meliorationē.

Dubitatur vlterius an in principio huiꝰ āpatis ꝯueniat repcuſſio? Qḋ ñ arguit ꝑ vnū mediū als tactuz. nā mā nō eſt pellēda de ꝑte ignobili ad nobilē: ergo ⁊c. Tenet ꝯña: q: repcuſſa mā ipſa ab exterioribꝰ ignobilibꝰ ad īteriora nobilia pellit. ¶ Scḋo arguit auctoritate Hyp. 6ª affo. affo. 25°. Heriſipilā extra factā ītus ꝯuerti nō bonū ⁊c. ergo ēt repcuſſio qua mā ad īteriora trahit nō eſt fiēda. In oppoſituz eſt Aui. ī ꝑte. ¶ Pro dubio nota mēbruz aut cretice āpari aut non. ¶ Scḋo nota ꝙ mēbrū cretice āpatuz aut āpandū: aut eſt mēbrū valde nobile aut ignobile. ¶ Et penes hāc diſtictiōez ſit hoc pᵐ rñſale: In prin° nō cretici āpatis de quo hic ītelligit Aui. repercuſſio cōuenit. Probat quia repcuſſio nō nocet ⁊ ꝓhibet āpatis augmētū: ergo fiēda. ꝯñtia nota. nā primo repcuſſio nō nocet valde incuniādo māz niſi ꝑhabitus eēt cāus: q: mā ē mala. repellēdo vero ꝓhibet fluxū māe ⁊ augmentū āpatis. ¶ Scḋa cōclō: In principio cretici āpatis nā naturalr opante facti nō ꝯpetit repercuſſio. Probat quia euatio ſeu ꝑmutatio nāe nāliter opantis nō ē impediēda: ergo ⁊c. Añs ē notū q: medicꝰ ē imitator nāe nō impediēs cā. tenet ꝯñtia. ¶ Tertia cōclō: In principio cretici āpatis a nā nō nāliter opante facti vt ī indebita ꝑmutatiōe cōueniūt repcuſſiua. Probat talē explicādo cāum ꝙ ꝑmutet mā verſus cor vel epar vel aliud pricipale mēbrū: quia tūc nulli dubiū hanc mām eſſe repellendaz. Preterea arguit: mala nāe opatio cohibēda ē: ergo ⁊c. Añs notū cum tota ꝯñtia. ¶ Iſto cōcluſo ad primū dicēdū ꝙ aliqḋ mēbrū pōt dici ignobile reſpectu alteriꝰ q: alterius famulatiui deputatū nāliter ēt inclinatū ad illius mēbri recipiēdas ſupfluitates. Et quātū ad hoc ſint due cōclōnes. Prima ꝙ in pricipio āpatis ꝑtis ignobilis facti ex ſupfluitatibus mēbri nobilioris vel alteriꝰ mēbri pter nāz exñtis nō ē fiēda repercuſſio: ꝓpō nota ē ne pricipali leſo cōſequat ēt nocumētuz. ¶ Scḋo teneat iſta ꝯclō ꝗꝫuis videat extranea: In prin° alicuiꝰ emūctorij āpatis cōpetit repcuſſio. Probat ꝯclō ſupponēdo caſuz ꝙ mēbrū pricipale ſit tpate ꝗꝫtitatis ⁊ ꝗlitatis humoꝝ ⁊ ſpūuz. 2° ſuppono emūctoriuz pati malā ꝯplōnez calidā ſine mā a pricipali bonā trahentez māz vt ex tali attractōe principale ledat aut ſupponat emūctoriū fore dolens: iſto ſtāte vt poſſibile ꝯuenit repercuſſio: q: ex hoc ꝓhibet pricipale nocumētū: ꝓhibet ēt attractio emūctorij. Scḋo aliqḋ mēbrū pōt dici ignobile abſolute reſpectu alteriꝰ: q: minꝰ ꝑfectā efficiat opationez: ⁊ ꝗꝫtuz ad hoc ſit iſta tenēda ꝯclō ꝙ bonū eſt repellere māz a mēbro ignobili ⁊ ipſaz diſpgere verſus nobile. Naz p° ꝯſequit iuuamētū vtputa ꝓhibitio augmēti āpatis ne nobili ſequat nocumētuz. nā cū mā ſit diſpſa leuiter a pluribꝰ ꝑtibꝰ ſuperat. Ad aliaz rōnez de heriſipila p° pōt dici ꝙ loqt de cretica heriſipila. Uel aliter ⁊ meliꝰ ꝙ malū eſt heriſipilā extra factā ꝯuerti ītus: q: ad ꝑtes valde ītrinſecas ⁊ nobiles ita ꝙ ex toto diliteat. i. non appeat vel ſe abſcōdat: tñ nō ē malū repellē māz q̄ fluebat ad heriſipilā.

Dubitatur vlterius vtrum ante ad uentū āpatis ꝯueniat recurſus? Et tenēdū eſt ꝙ ſic. naz ex tali recurſu ꝓhibet aduentus āpatis ⁊ maxime duz timemus āpa eſſe ventuꝝ in parte nobili.

Dubitatur utruz repercuſſio ſit fien da rōne māe fluxe actualr āpantis? Ad negatiuā arguitur aucte Gal. 3° tegni: vbi vult māz nō recurſuz hēre q: groſſa aut q: viſcoſa vel q: ī mēbri medias regiōes diſpſa: ergo cū mā ſit ī illas diſpſa regiōes nō pōt repcuti. ¶ Scḋo arguit aucte Aui. 3ª quarti. c. de cura flegmonis ad pricipiū: vbi vult q: cura āpatis īquātū āpa eſt fiēda ꝑ mollificātia ⁊ reſolutiua: ergo māe āpanti debet mollificatio ⁊ reſolutio ⁊ nō repcuſſio. ¶ Tertio arguit ad eādez ꝑtez: Si repcuſſio eſſet fiēda rōne māe fluxe actualr āpantis ſeq̄ret iſta ꝯclō ꝙ ꝑ ſola repcuſſiua poſſet āpa curari. Iſta ꝯclō ē ꝯtra cōez modū opandi. Tz ꝯña q: tūc poterit tota āpans repcuti mā. ¶ Oppoᵐ qōnis arguit ſic: Repcuſſio ē retro māe pulſio: ergo mā āpans poterit repcuti. Cōſeq̄ntia tz: q: ipſa poterit retro pelli potēte nā. ¶ Pro dubio teneant p° iſte ꝯclōnes. pª ꝯtigens eſt ⁊ nō neceſſariū ꝑtez ſubtilē āpatis repcuti. Cōclō ꝓbat: iſta ꝑs ſubtilis a venis pulſa ē ī medias regiōes: ergo añs ē notū ſcienti modū gñatōis āpatis. Et tz ꝯña: q: ſicut nā expulit māz a venis ad membroꝝ poroſitates: ita ecōtra ipſaz a poroſitatibꝰ ī venis poterit retropellere. Preterea arguit: poſſibile eſt āpa diliteſcere ꝑ repcuſſionez ſeu repcuſſiuoꝝ applicatōez: ergo ⁊c. Añs notū expiētia. Tz ꝯña q: talis diliteſcētia multotiēs p̄cedit āpatōez ī ꝑte īteriori. ¶ Scḋa ꝯclō: ꝓpter 2ᵐ argᵐ poſſibile eſt curari āpa per ſola repercuſſiua nullo alio applicato medicamīe exteriori. Cōclō pz ex 3° argumēto āte oppoſitū ⁊ ꝓbat. nā particulr repercuſſa mā natura poterit potēs fieri ſupra reſiduū vt nō egeat medicamīe exteriori. ¶ Tertia ꝯclō: principalis repcuſſio maxime ſit rōe māe fluētis nōdū diſperſe aut defluxe. Pz q: maxime ſit repcuſſio ad ꝓhibēdū aduētū āpatis qḋ ſit repellēdo materiā. ¶ Quarta cōclo: pricipalis mā exñte groſſa aut viſcoſa ī mēbri poroſitatibꝰ īcuniata nō ſit debita repcuſſio. Cōclō pz ꝓpter eiꝰ indiſpōnez ad recurſuz. ¶ Iſto ꝯcluſo pz ſolō ad primū obiectū ꝙ ꝓpter hanc triplicē cāz mā nō recurrit: nō tñ q̄ñcūqꝫ aliqua iſtarū cārū extitit ē repercuſſus īpoſſibilis. Ad ſcḋm dḋm ꝙ cura āpatis inquātuz āpa ſm plurimū ē ꝑ mollificātia ⁊ reſoluentia: q: vtplurimū māe āpantes nō ſunt retropellēde: ſed ꝑ eandē partez euari debēt: ad tertiū pz quid ſit dicēdū. ¶ Ulterius nota ꝙ ex parte cōcipit diuerſionē aliq̄ñ per euationē eē fiēdam: aliq̄ñ vero ꝑ quācūqꝫ aliā ꝑtē attrahētē ad oppoſitū ſeu diuertētē nō exñte repletiōe corpis. ¶ Ulteriꝰ nota ꝙ repcuſſiua approximāda ī principio āpatū calidorū debēt eē pure frigida vt repercutiāt ac etiā opponātur calide cōplōni humorū. ſed ſi āpa fuerit ex mā frigida dz eſſe calida ſicut ſquinātū qḋ ē ad modū palee: ⁊ vocat palea camelorū ſicut ē blacte bizantie q̄ ſūt ḋ genere oſtracoꝝ vngulis aialiū aſſimilate boni odoris ſm Auic. 2° cañ.

Cū aūt maturare volueris minues retētiuū ⁊ admiſcebis ei qḋ ſit reſolutiuū donec ad ſtatū ꝑueniat: tunc ei ipſa admiſcēda erit equalr. Cū aūt declinatio fuerit nō ſit ibi niſi qḋ reſoluat ⁊ laſſuz efficiat. Et oz quidē vt illud qḋ frida fluxa reſoluit ſit abſtergēs ⁊ exiccās: ⁊ hoc quidē plīmū iuenit ī calidis. Ea aūt q̄ ꝓpter cās accñt primitiuas vbi nō ē hūoꝝ repletio medicari debēt ī pricipio rei cū eis q̄ fluxa faciāt ⁊ reſoluāt: ⁊ ſi nō cū eo qḋ ſit ſicut illḋ quo primū medicatū fuit. Si vero mēbrum āpoſuz mēbri pricipalis euatoriū fuerit ſicut locaꝰ glandoſa ī collo q̄ ſunt ī circuitu auriū cerebri aut aſcelle cordis ⁊ īguina epatis: nullo mō erit ei applicāduz aliquid qḋ refrenet: nō iō ꝙ hoc nō ſit medicamētū āpatū eoꝝ: qm̄ hoc eſt ipſoꝝ medicamētū: ſꝫ q: nolumꝰ ipſoꝝ medicari āpata: īmo ſtudiū ad hoc īpēdere vt ea augmentemus ⁊ māz ad ipſa trahamꝰ: ⁊ nō curamꝰ ſi malitia ī mēbro augmētata fuerit: nō eiꝫ curamꝰ niſi de eo qḋ mēbro pricipali eſt meliꝰ. Et timemꝰ ꝙ ſi māz refrenauerimus redibit ad mēbrū pricipale ⁊ ꝑuenimꝰ īde ad illḋ qḋ emēdare nō poterimꝰ: quapropter volumꝰ vt malitiā in mēbrū cadat ignobile cū principali ꝯtulerit mēbro ita vt ſtudiuz īpendamꝰ in attrahēdo māz ad membruz ignobile ⁊ facere vt ipſuz āpetur. Et ſi nō: cū alijs ſaltē cū vētoſis ⁊ emplaſtris attractiuis acutis.

¶ Nunc ponit curā āpatū quātū ad augmētū ⁊ ſtatum dicēs ꝙ ſi volueris maturare debes minuere repcuſſiuū ⁊ augere reſolutiuū vſqꝫ ad ſtatū in quo repercuſſiuū ⁊ reſolutiuū ſunt equalr cōmiſcēda. ¶ Scḋo dicit ꝙ exiſtēte declinatiōe ſolū reſolutiuū laxuz faciēs ē applicandū ei: ⁊ certe oz. ſ. reſoluēs āpata frigida fluxa eē abſtergēs ⁊ exiccans qualia ſunt plurima calida. ¶ Tertio ponit curā apoſtematū ꝓueniētiū a cā primitiua dicēs ꝙ āpata ꝓueniētia a cāis primitiuis nō cōiuncta repletiōi corporis debēt curari a principio per reſoluentia ⁊ fluxa facientia: ſi vero iungant repletiōi corporis curari debēt vt primo. ¶ Ultimo ponit curā āpatū exñtiū ī emunctorijs dicēs: ſi membrū āpatū fuerit emūctoriū ſeu euatoriū mēbri principalis ſicut loca glandoſa circa aures exñtia ſunt emūctoria cerebri ⁊ aſcelle cordis ⁊ īguina epatis repercuſſiuū ſiue recurſiuū nullo mō ē applicādū: nō q: hec nō ſint medicamēta epatis: ſꝫ q: ñ volumꝰ āpata talia medicari: īmo ipa ſtudemus augmētare ⁊ ad ipa trahere mām nō curātes ſi ī mēbro augeat malitia: q: nō curamus de eo niſi qḋ meliꝰ eſt de membro pricipali timētes effrenatā mām ad principale redire: ⁊ timētes ēt ad nō emēdabile nocumentū ꝑuenire: iō volumꝰ malitiā ꝯtineri ī mēbro ignobili dū hoc ꝯtulerit mēbro pricipali ſtudiū īpendēdo vt mā trahat ad mēbruz ignobile qḋ ēt āpat: ⁊ ſi hec attractio nō fiet cuz alijs ſaltē fiet cū ventoſis ⁊ emplaſtris attractiuis acutis calidis.

Dubitatur an ī quolibet āpate cali do ꝯneniāt eque frida? Et ſine argumentis ꝯclō negatiua

UVA. BHSC. IyR_006_1

ſit iſta tenēda ꝙ nō ꝯpetunt eque frida. Conclo arguit̄ q:
fridiora ꝯueniunt corpi colerico a̅pato q̄ȝ ſanguineo:ergo
⁊c̄. Añs colligit̄ 3ª q̄rti.c.de heriſipila: Et ſic rōe ꝯfirmat̄
q: colera calidior eſt ſanguie:ergo fridiora ſunt adhibēda.
Añs eſt notū q: calidius qđ eſt i corpore ē colera: vt Gal.
vult i libro de malitia ꝯplonis diuerſe. Et tȝ ꝯña q: frida
applicāt̄ nō ſolū gr̄a recurſus ſȝ gratia refrigerāde mãe.
Propterea arguit̄ ſic:minꝰ recurribilis eſt ſanguie: ergo
ex hoc magis frida ꝯpetūt. pȝ aſſumptū q: ſubtilis valde.

Dubitatur ſecūdo an cuilibet a̅pati

ꝯueniāt eq̄ ſtiptica aut eque ſicca: Quātū ad hoc ēt ſit iſta
ꝯclo ꝙ non ⁊ arguit̄ ſic: Stipticiora ⁊ ſicciora conueniūt
a̅pati flegmatico ſanguieo: ergo ⁊c̄. imo ēt hūida ſaltē re/
frenātia aliqualr̄ colerā ꝯueniunt ēt melācolico a̅pati.

Dubitatur tertio cui apoſtemati in

pricipio ꝯueniāt magis ſtiptica ſeu ſicca an colerico a̅pati
vel ſanguineo. ¶ Pro quo dubio ſit iſta conclo: Sicciora
ſeu ſtipticiora ꝯueniunt a̅pati colerico q̄ȝ ſanguineo. Pro
bat̄ q: fridiora ꝯueniūt colerico a̅pati: ergo ſicciora aut ſti
pticiora. Añs iā dictū. Tȝ ꝯña q: ſtiptica aut ſicca q̄ appli
cant̄ i heriſipila q̄ſi ſunt ſuperātia frigus: vt ſumit̄ 3ª q̄rti
c. de cura heriſipile. ¶ Scđo ꝓbat̄ q: mēbrū a̅patuȝ cole
ra plus eget ſtipticitate q̄ȝ mēbrū a̅patū ſanguie: ergo ⁊c̄.
pȝ añs. Nā pº colera hȝ plus laxare ⁊ debilitare membrū
ſanguie:ergo mēbruȝ plus eget approximatōe ſtipticoꝝ ⁊
ꝯfortatōe. Itē colera plus eget vnione ⁊ igroſſatione ſan/
guine:iō plus diſponit̄ expulſioni ꝑ ſtipticuȝ q̄ȝ diſponat̄
ſanguis:imo ſanguis aliqualr̄ icuniat̄ ⁊ diſponit̄. 2ª ꝯclu
ſio:ſtiptica que applicāt̄ i pricipio a̅patis colerici plus de
bent hūiditati ꝯiungi q̄ȝ ea q̄ in prinº flegmonis applicāt̄.
Cōclo arguit̄ ſic q: hūidiora ꝯueniūt i colerico a̅pate q̄ȝ i
ſanguieo:ergo ⁊c̄. notū aſſūptū ex dictis. ꝯña eſt euidēs.
¶ Ad intelectū partis vltime notandū ꝙ notāter ē di/
ctū loca glādoſa q̄ ſūt i collo:eo ꝙ loca glādoſa ſūt mul/
tiplicia: q: quedā ſunt qbuſdā oꝑatōibꝰ deputata ⁊ ñ alijs
principalr̄ ſubordinata mēbris:ſicut caro glādoſa mãmil/
larū ſaltē mulierū gn̄atiōi lactis ē deputata. Sicut ēt ca/
ro glādoſa exñs in radice lingue ē deputata gn̄atiōi ſaliue
⁊ alijs oꝑatiōibꝰ que i p̄n̄ti omittant̄. Sicut ergo caro glā
doſa reꝑta in meſentereon humectatōi eſt deputata iteſti/
noꝝ. Sicut ēt teſticulorū caro glādoſa gn̄atōi ē ſpermatis
deputata. Notāter ēt dixit in collo: ad denotādū ꝙ loqt̄
de carnibus glādoſis que ſūt principaliū emūctoria. ¶ 2º
nota ꝙ aliqđ medicamē dicit̄ a̅patis inquātū a̅pa. Prīo
q: cōuenit a̅pati rōne mãe a̅pantis a quo totū a̅pa pēdet:
⁊ iſto mō reſolutiua ⁊ mollificatiua ſunt medicamē a̅patis
ꝓ quāto per ea intēditur remotio mãe a̅pantis a quo totū
a̅pa pendet: vt colligit̄ tertia quarti de cura flegmonis ad
principiū. 2º aliqđ dicit̄ medicamē a̅patis iquātū a̅pa: q:
cuilibet vtplurimū ꝯuenit a̅pati:nō rōne a̅pantis materie
principalr̄:ſed rōne cōtēti cōiter i quolibet a̅pate. Eſt eim̄
vtplurimū a pricipio cuiuſlibet a̅patis itentio ꝓhibere flu
xum ⁊ a̅patis augmētū: ⁊ iſto mō recurſiuū ē medicamen
a̅patis in pricipio ſm̄ quā intētionē loquit̄ Auic. in p̄ſenti.
¶ 3º nota ꝙ a̅pa emūctorij vel factū ē a cā primitiua vel fa
ctū ē ꝓpter ſuꝑfluitates aliūde:lȝ nō pricipali ſuꝑfluētes
vel defluētes:in quibꝰ caſibꝰ nō intēdimꝰ augmētū a̅pa/
tis:imo aut curamꝰ a̅pa ꝓhibendo eius augmentū: nō q/
dē faciēdo recurſuȝ ad repercuſſiua aut ſtiptica: ſȝ facien/
do tractū per diuertētia aut eūantia. Si vero a̅petur emū
ctoriū a pricipali ſuꝑfluitate in eo recepta ſi non cretice ſit
expulſa ſuꝑfluitas: tūc ēt eūando poſſumus recurrere. Et
ſic etiā de emunctorij curamus a̅pate. Si vero principale
pepulerit cretice mãm a̅pantē emūctoriū: de emūctorij nō
curamus a̅pate. Ad hūc intelligēdo ſenſuȝ ꝙ nō curamus
ſi primitꝰ augeat̄ a̅pa. Nā intendimꝰ augmētū a̅patis vt
ex hoc principale i creticando totā mãm expellat: quãuis
tandē q:.ſ.in ꝓceſſu curemꝰ de a̅pate reſoluēdo ⁊ quali/
tercūq; aliter oꝑando vt remoueat̄. Nō curamꝰ ergo ad
itellectū Aui. curā que adhiberi ſolet i pricipijs a̅patum.
Alia que in ꝑte ponūtur vt nota in p̄n̄ti relinquant̄.

Dubitatur an in augmento apoſte

matis ꝯueniat maturatio: Qđ nō arguit̄: q: in augmento
nō ꝯuenit ſaniatio:ergo nec maturatio. ꝯña tȝ: q: matura
tio a̅patis ñ ē aliud q̄ȝ ſaniatio. Aſſūptū pȝ: q: ſaniatio ſit
i ſtatu. naȝ tūc ſit ſaniatio qñ dolor auget̄ ⁊ febris 2º affo.
illo affo. Circa gn̄atiōnē ſaniei. ¶ 2º ſic ad idem: Reſolo ñ
ꝯuenit i augmento: ergo nec maturatio. ꝯn̄tia tȝ eo ꝙ hic
ꝑ maturationē itelligit reſolōnē. Añs ꝓbat̄: mã in augmē
to ē magis in fluxu q̄ȝ fuerit in pricipio: ergo reſolutiua in
augmēto nō couenīūt. Et pȝ ꝯn̄tia ex quo i pricipio nō cō
ueniebāt ꝓpter fluxū mãe. Añs pȝ ꝓpter augmētū dolo/
ris ⁊ caliditatis p̄ter nãm i augmēto: igit̄ ⁊c̄. Oppoſitū vr̄
eē ſn̄ia Aui. dū hāc maturationē in augmēto vult eē fien/
dā. ¶ Pro dubio nota ꝙ maturatio a̅patis prīo abſolu/
te ſm̄ cōem modū loquēdi ſumit̄ ꝓ ſaniatiōe. 2º ſumitur
maturatio ꝓ quacūq; p̄paratiōe mãe ad expulſionē: maxi
me tñ in ꝓpoſito ſumit̄ ꝓ p̄paratiōe mãe vt iſenſibilr̄ eua/
poret ſiue eūetur. ¶ Vlteriꝰ notādū ex dictis augmentū
duplr̄ poſſe diſtigui: qđ nō dicā gr̄a breuitatis. ¶ Iſto ha
bito ſit hec pr̄ia cōclo: Saniatio ē fiēda in ſtatu quo ad ac
cidētia: aut ēt aliter diſticto. Cōclo pȝ ex argumēto 2º āte
oppoſitū. Et ꝑſuadet̄ ſic. Mã tunc ē ſaniāda qñ eſt totalr̄
fluxa ergo ⁊c̄. Añs notū eo ꝙ tūc ſanianda ē qñ totalr̄ eſt i
cupū reducibilis: qđ nō niſi i ſtatu cōtingit ꝑ deſcriptōeȝ
ſtatꝰ. ¶ 2ª ꝯclo: maturatio 2º mō dicta eſt i augmēto par/
tialr̄ fiēda. hec ſit ad mentē Aui. i tex. ⁊ ꝑſuadet̄ ſic: Naȝ i
augmēto mã eſt notabilr̄ fluxa: ergo nō pure reꝑcuſſiua ſȝ
aliqualr̄ reſoluētia ꝯueniūt. Notuȝ eſt añs ꝑꝑ diffinitōeȝ
augmēti. Tȝ ꝯña: q: ex quo mã eſt notabilr̄ fluxa: ergo eſt
itentio ad p̄parāduȝ vt extrahat̄: ſȝ nō niſi ꝑ reſoluētia: er
go ⁊c̄. Ex hac 2ª ꝯclōne lȝ iferre iſtud correlarium: ergo re/
ſoluētia ſunt hoc mō maturātia. Hoc correlariū elicit̄ ex
ſcđe ꝯclōnis ꝓbatōe ⁊ euidēter ifert̄. ¶ 3ª ꝯclo: in aliquo
a̅pate q̄ȝtū ad augmētū nō ꝯpetit reſolo. Cōclo pōt ſic ꝓ/
bari: Aliqđ ē a̅pa qđ eſt nã remouibile ſine adiutorio me/
dici: ergo ⁊c̄. Cōſeq̄ntia euidēs eſt ex hoc q: vt dicit̄ iterio
rum pº nã nō idiget adiutorio medicaminū niſi dū morbo
magnificato nequerit dn̄ari. Añs notū eſt. ¶ Ad obiectuȝ
aūt añ oppoᵐ dicēduȝ ad punctū ꝙ lȝ mã ſit i fluxu ⁊ non
ꝯueniāt maturātia pº mō: tñ 2º mō ꝯueniunt q: mã fluxa
eſt. Et ad punctū mã plus eſt i fluxu i augmēto q̄ȝ in prici/
pio. Hic p̄n̄t due teneri vie. Vna dato ꝙ materia plus ſit
i fluxu i augmēto: q: tñ eſt magis fluxa: nos ēt attendē oȝ
ad materiā fluxā: iō nec pura reſolutiua nec pura reꝑcuſſi/
ua ꝯueniūt. Ex quo iferenduȝ ꝙ reſolutiua q̄ offerunt̄ in
augmēto nō ſolū applicant̄ ꝑꝑ remittere reꝑcuſſiua: ſȝ vt
circa materie fluxe ꝑteȝ efficiāt oꝑationeȝ. Ex quo ifert̄ ꝙ
reꝑcuſſiua ita remiſſa ſicut ſunt remiſſa ꝑ reſoluentia ſibi
ꝯmixta i augmēto non ꝯueniūt ita ſicut reſoluētia ꝯmixta
reꝑcuſſiuis. Cā eſt i ꝓmptu: q: nō efficerēt reſolōnis oꝑe/
ratōeȝ. Aut aliter rn̄dendo dicēduȝ ꝙ i prinº ſit maior flu
xus materie. Ad aliud auteȝ eſt rn̄ſum.

Cūq; ad collectionē peruenerit huiuſmodi apoſte/
mata aut reliqua ab eis qñq; aperient̄ per ſe aut matu/
rationis adiutorio: ⁊ qñq; indigēt maturatōe ⁊ ſectione
ſimul. Maturatio vero cōplet̄ ex eo in quo cum calore
exiſtit oppilatio ⁊ glutinatio vt per ipſuȝ calor retinea/
tur. Qui auteȝ maturationē efficit cuȝ aliquo qđ ſit ſicut
huiuſmodi maturatiuū attēdere debes vt ſi videris ca/
loreȝ innatū debilem ⁊ ꝙ membrū iam declinet ad hoc
vt corrūpatur remoueat ab eo glutinoſa ⁊ oppilatiua ⁊
ponat aperitiua ⁊ ſcarificationē faciat profundaȝ: deide
adhibeas medicinas in quibꝰ exiſtit reſolutio ⁊ deſicca/
tio ſicut de eis iueſtigabimꝰ in libris particularibꝰ. Mul
totiens preterea erit apoſtema ꝓfundū ⁊ erit nobis ne/
ceſſariuȝ trahere ipſuȝ ad partē cutis: ⁊ ſi non cum alio
ſalteȝ cum ventoſis ignitis.

¶ Supra tetigit curā a̅patū que ꝑ reſolutionē potuerūt
terminari: nunc exequit̄ ponēdo curā a̅patū terminādoꝝ
ad ſaniationē ⁊ aꝑtionē. Et diuidit̄ i tres. Prīo ponit mo
dū curatiōis taliū a̅patū. 2º oñdit ꝑ que aꝑtio ⁊ matura/
tio ꝯpleant̄ ⁊ curatio. 3º ponit duos cañ. euitatiōis erro/
ris. ibi 2ª: maturatio vero. ibi 3ª: q aūt maturatōȝ. ¶ Pri
mo dicit ꝙ cū talia a̅pata aut alia ab his ꝓueniūt ad col/
lectionē: qñq; ex ſe aꝑiūtur aut adiutorio maturatiōis: qñ/
q; ſimul egēt maturatiōe ⁊ ſectiōe ꝑ artē. ¶ Scđo dicit
ꝙ maturatio cōplet̄ cū re hn̄te calorē in qua oppilatio eſt
⁊ cōglutinatio quibꝰ calor mēbri retineat̄. ¶ Tertio dicit
ꝙ volēs maturare cū tali medicamīe dȝ attēdere vt ꝯpre/
henſo calore mēbri a̅pati debili: ⁊ qđ mēbrū iō declinat ad
corruptionē: ꝙ a mēbro a̅pato glutinoſa remoueat ⁊ oppi/
lantia: ⁊ ponat medicinas aꝑientes ⁊ faciat ꝓfundā ſcariſi
cationē adhibēdo poſt hoc medicinas reſoluētes ⁊ exiccan
tes ſicut in libris ꝑticularibꝰ dicemus de eis. ¶ Quarto
dicit ꝙ multotiēs a̅pa ē ꝓfundū: ⁊ neceſſariū ē ipm̄ attra
here ſaltē cū vētoſis. ¶ Pro ꝑte nota ꝙ collectio nō ſu/
mit̄ hic ꝓ quacūq; materie aggregatiōe replēte poroſita/
tes. Nā i quolibet a̅pate ē collectio i quocūq; extiterit tē/
pore. Sȝ ſumit̄ collectio ꝓ aggregatiōe materie i cōcaui/
tate mēbri vt cupū vnū faciat. vñ videmꝰ prīo materiā eē
diſꝑſam: ⁊ tādē mltotiēs in cupū quēdam eleuari. ¶ No
ta 2º hec noīa reꝑiri apđ modernos: a̅pa: adubellet: extitu
ra. A̅pa eīȝ ē terminꝰ cōis ad adubellet ⁊ exiturā. Adubel/
let aūt ē a̅pa collectū hoc mō 2º ſiue ſit de materia calida
ſiue frida ſaniāda ſiue nō. Exitura vero ē a̅pa collectū ma
xime de materia ſaniāda: vñ dicit̄ exitura quaſi aptū exire
ſubtilr̄: ⁊ iō oīs exitura eſt adubellet ⁊ non ecōuerſo. Per
collectionē ergo itelligit exiturā ⁊ adubellet. ¶ 3º nota ꝙ
ꝑ huiuſmodi a̅pata itelligit a̅pata facta a cā añte: ⁊ ꝑ reliq̄
ab eis itelligit a̅pata facta a cauſis priuatiuis. ¶ 4º no. ꝙ
a̅pata aut aꝑiūt̄ ꝑ ſe ſine auxilio medicamīs vel a natura:
aut cū medicia. A natura quidē tāquā ꝑ ſe maturāte ⁊ tā/
dē corrūpēte

UVA. BHSC. IyR_006_1

Aliter dicit Gentilis ꝙ medicamentū maturatiuū dꝫ eē calidū humidū ⁊ glutinatiuū. Calidū quidem vt reſoluat: humidum vt humectet exiccatā māꝫ vt melius reſoluat̄ ſine terreſtrificatōe: glutinatiuum vero vt ſeruet̄ virtꝰ vtriuſqꝫ. ſ. calidi ⁊ humidi ⁊c̄.

dē corrūpēte cutē vi materie: vt qñ multa materia itātum extēdit cutē vt frāgat. ¶ Ulteriꝰ nota ꝙ maturās medicina dꝫ eē calida vt caliditas iuuet ī ſupando materiaꝫ vt ēt materiā digerat cū maturatio fiat a calido 4º metheu. Dꝫ ēt eē cōglutinatiua ſeu oppilatiua vt cōſtringēdo ⁊ oppilādo poros caliditatē itrīſecā iterius retineat ⁊ ꝓhibeat euapoꝛare. ¶ Ulteriꝰ nota ꝙ per mēbrū hñs caliditatē debilē pº itelligere poſſumꝰ mēbrꝫ hñs paruū calorē itenſiue ⁊ extēſiue: q̄ cū nō ſit potens ſupra māꝫ maturādam nos oꝫ māꝫ ab ipſo remouere ſcarificādo pꝛofunde vt mā debite tranſpiret ⁊ euet̄: deinde ſi aliquātulꝫ remāſerit mãe talis ꝑ reſoluētia ⁊ exiccātia educat̄. 2º ꝑ mēbrū debilis caloꝛis pōt itelligi ⁊ meliꝰ mēbrꝫ debilitatū ꝑ viā aggrauatōis ⁊ multa debilitate ⁊ eiꝰ ſuffocatōe ſuffocāte calidꝫ ī quo caſu ꝓfunda conuenit ſcarificatio q̄ eſt multiplex: vt vndiqꝫ ēt poſſit expelli materia conuenit ēt ꝓfunda ꝓpter multā eſſe mām. ¶ Ultīo nota ꝙ multoties apa eſt ꝓfundū ita ꝙ virtꝰ medicamis non pōt ipꝫ attigere ſi etiā dꝫ aperiri ſecādo oꝫ nos valde ꝓfundā facere ſectioneꝫ ī quo caſu conueniūt attrahentia vt veneoſa ⁊ ſimilia magis ad exterioꝛa trahendo materiā.

In apate aūt duro qd̄ ſtatꝰ terminū ꝑtrāſiuit remediū ī eo ē vt mollificet qñqꝫ cū eo ī quo exiſtit caliditas ⁊ ſiccitas ꝑua: iō ne qd̄ ex eo ſpiſſuꝫ ē ꝓpter multā reſolutōeꝫ fiat lapis: imo totū ad reſolutōeꝫ pꝛeparet̄: poſtea ſuꝑ ipꝫ reſolutio foꝛtioꝛ fiat: deinde ſi timet̄ ex reſol'one eiꝰ qd̄ reſoluit̄ ne qd̄ remāſit lapis fiat: iteꝝ ad mollificādū ipꝫ ſcd̄o redeat ⁊ īceſſanter fiat hoc donec totū finiat̄ inter mollificādi ⁊ reſoluēdi vices aliter vires.

¶ Nūc ponit curā apatis duri: dicēs ꝙ regula eſt ī euacuādo duꝝ apa ꝑtrāſiens terminū ſtatꝰ vt mollificet̄ cūꝫ eo ī quo eſt ꝑua caliditas ⁊ ſiccitas ne ſpiſſuꝫ ꝑꝑ reſol'oneꝫ ī lapideꝫ ꝯuertat̄: imo totū diſponat̄ reſol'oni: deinde fiat reſol'o foꝛtioꝛ. Ex qua ſi timeat̄ ꝯuerſio ī lapidē iteꝝ tranſeat̄ ad mollificatōeꝫ: ⁊ fiat iſte modus ꝯtinue donec finiat̄ tota mā. ſ. nūc viribꝰ mollificādi nūc reſoluendi.

Inflata aūt apata curent̄ ex eo qd̄ calefacit ſubtilitate ſue ſubſtātie ꝓpterea vt vētoſitates reſoluat ⁊ poꝛos āplificet. nā cāꝫ ī apatibꝰ iflatis ē vētoſitatis groſſities ⁊ poꝛoꝝ clauſura. Studiū quoqꝫ eſt adhibēduꝫ in ꝓhibēdo mām ex qua ventoſus ꝓuenit vapoꝛ.

¶ Nunc tāgit curatōes apatuꝫ ventoſoꝝ: dicēs ꝙ inflata apata curant̄ ex re ſubtilis ſubſtātie calefactura aut calefaciente vt reſoluat ventoſitatē ⁊ ampliet poꝛos: q̄ eoruꝫ cā eſt groſſities vētoſitatis ⁊ clauſura poꝛoꝝ: ⁊ adhibendo ſtudiū ī ꝓhibendo ſeu reſoluēdo materiā ex qua vētoſus ꝓuenit vapoꝛ. ¶ Nota ꝑ parte ꝙ vētoſa apata vocant̄ iflata aut iflatiua: pº q̄ iter cetera ad maioꝛeꝫ peruenīūt iflationē: ſeu q̄ ex mā citiꝰ ꝓueniūt iflāte marie ēt extēdente cuteꝫ. ¶ Scd̄o nota ꝙ ex dictis duo ꝯpꝛehēdimꝰ medicamia applicāda. Unū eſt remotiuū mãe q̄ ventoſat̄ qd̄ pº dꝫ applicari. Nā pº eſt remouēda cā q̄ꝫ effectꝰ: deinde ſubtiliātia ⁊ reſoluentia q̄ cōiter carmīatiua vētoſitatis dicunt̄ applicāda ſūt. Et eſt pº cā huiꝰ. Nā ſi applicātur pº carmīnātia iſta cū ſint calida plus facient de vētoſitate ventoſando materiā q̄ꝫ reſoluendo adijciant.

Ex apoſtematibꝰ pꝛeterea ſunt que ſunt vlceroſa ſicut foꝛmica que ſunt ifrigidāda ſicut flegmon ſed nō ſūt mollificāda: ⁊ ſi ꝓpterea ꝙ ſunt apata ſūt mollificāda: imo ſunt ſiccāda: q̄m accidēs hoc iaꝫ ſuperauit cām: accidēs eiꝫ eſt vlceroſitas de qua timet̄ ꝙ accidat aut ꝙ iā acciderit. Et vlceroſitatis quidē medicamētū ē deſiccatio ⁊ res ei magis ꝯtraria eſt mollificatio.

¶ Nunc ponit curā apatuꝫ diuerſoꝝ alia diuerſitate: dicēs ꝙ apata vlceroſa vt foꝛmica ⁊ flegmon ſūt ifrīdāda ⁊ ñ mollificāda q̄uis ſꝫ ꝙ ſūt apata ſūt mollificāda. Siccāda tñ ſūt ꝑꝑ accñs vt ꝑꝑ vlceroſitatē ſuꝑantē: cuiꝰ medicatio ē deſiccatio: cui ēt mollificatio marie eſt ꝯtraria.

Dubitatur circa ꝑhabita an in ſtatu

apatis ſit faciēda equalis ꝑmixtio reſoluētiū ⁊ reꝑcutiētium. Qd̄ nō arguit̄: In ſtatu apatū mā nō ē in fluxu: ergo nō cōuenit reꝑcuſſio. Tenet ꝯñtia q̄ reꝑcuſſio nō cōuenit niſi ad ꝓhibēdū fluxū mãe. Añs ē notū: q̄ tūc nō eēt ſtatꝰ ſed augmētū ex quo mā ē ī augeri ⁊ fluere. ¶ 2º ſic: In pꝛīcipio ⁊ ī fine ſtatꝰ nō ē hoc remediū fiēduꝫ: ergo nec ī toto ſtatu. ꝯñtia nota: ⁊ pꝫ aſſumptū. Nā pꝛīo ſi ī medio ſtatus cōpeteret hoc medicamē: tūc in pꝛīcipio ſtatꝰ ī quo timemus plus fluxū mãe plus dꝫ poni de reꝑcuſſiuis: ⁊ in fine ſtatꝰ ī quo minꝰ timemꝰ fluxū mãe debemꝰ reꝑcuſſiuū minuere. ¶ 3º ſic: In declinatiōe cōuenit pura reſol'o: ergo in fine ſtatꝰ. Añs ponit̄ ī lr̄a. Tꝫ ꝯñtia q̄ finis ſtatꝰ aſſimilat̄ pꝛīcipio declinatiōis: ⁊ tꝫ ēt ꝯñtia q̄ in fine ſtatꝰ fluxa ē mā ⁊ nō āplius timemꝰ fluxū. ¶ Penultīo arguit̄ ſic: In ſtatu apatū aliquat̄r calidoꝝ cōpetit hoc medicamē: ergo ī ſtatu apatū valde calidoꝝ reꝑcuſſio dꝫ eſſe valde intēſioꝛ. Añs colligit̄ ex lr̄a. Tꝫ ꝯñtia q̄ plus ī ſtatu apatū calidoꝝ ꝓpter caliditatē mãe itēdimus reꝑcutere q̄ꝫ ī ſtatu alioꝛū apatū. ¶ Ultīo arguit̄ ſic: Huiuſmōi ꝯtrarioꝝ medicaminū ꝑmixtio ē inutilis: ergo nō eſt fienda. Nota ꝯñtia: ⁊ pꝫ aſſumptū q̄ vnū alteriꝰ īpedit oꝑatiōꝫ: ⁊ ſic nec fiet reꝑcuſſio nec reſol'o. In oppoſitū ē Aui. ¶ Pꝛo dubio nota ꝙ ſtatꝰ diuidit̄ in pꝛincipiū mediū ⁊ finē: que ī hoc differūt. Nā in pꝛīcipio ſtatꝰ maioꝛ timoꝛ ē de fluxu mãe coincidēte pꝛincipio ſtatꝰ fini augmēti. In fine aūt ſtatus de fluxu mãe ē minime timoꝛ fine ſtatꝰ declinatiōi appꝛopinquāte. Medij vero ſtatꝰ iudiciū ē mediū iter pꝛincipiū ⁊ finē ſtatus. ¶ Iſto notato ſit pꝛīa ꝓpō ad queſitū. Per auxiliū medicaminū aliqñ fit ſtatus: ſicut aliqñ mā ita ē fluxa ꝙ āpliꝰ nō ē ī fluxu: ergo ꝓpō vera. Pꝫ añs q̄ per recurſum facimus māꝫ nō āplius fluere. Tꝫ ꝯñtia: q̄ tota fluxa mā vt apa ad ſui terminū ꝑuenerit dicit̄ eē ſtatꝰ. ¶ Scd̄a ꝓpō: In ſtatu quo ad pꝛīcipiū vt ſit ſtatꝰ ꝯpetūt recurrētia. Pꝛopō arguit̄ ſic: Ut ſtatꝰ ſit ſtatꝰ ꝓhibēdū ē materiā fluere: ergo ꝓpō vera. Añs ē notū: q̄ mā nō ſtante ſiue fluente nō āpliꝰ ē ſtatꝰ. ¶ Tertia ꝓpō: Exñte ſtatu ⁊ ꝯpꝛehēſo nō āpliꝰ fluxurā eē māꝫ ī ſtatu nulla ꝯpetūt reꝑcuſſiua. Pꝛopō ꝓbat̄ q̄ tūc ſola habet̄ itētio ad mām fluxā: igit̄ ⁊c̄. Añs ē notuꝫ ex caſu: ⁊ tꝫ ꝯñtia: q̄ intētio que habet̄ ad mām fluxā ē ad reſoluēdū aut ad maturādū: nō aūt ad pꝛīcipaliter recurrēdū. ¶ Quarta ꝓpō iuxta cōem opinionē: In pꝛīcipio ſtatꝰ reꝑcuſſiua ſunt cōmiſcēda equal̄r reſolutiuis. Pꝫ ꝓpō ſic: Tāta itētio ē ad reſoluēdū quāta ē ad recurrēdū: ergo ⁊c̄. Nota ꝯña: ⁊ pꝫ añs timoꝛe noui fluxꝰ mãe ꝓpter doloꝛē caloꝛē aut aliā agitatiōꝫ factā ī membꝛo apato. ¶ Quinta ꝓpō: In medio ſtatꝰ reſolutiua debent ſuꝑare reꝑcuſſiua. Pꝛopō ꝑ tanto pꝫ: q̄ ī medio ſtatꝰ paucus timoꝛ ē de fluxu mãe: magna aūt ē intētio ad reſoluēdū māꝫ. ¶ Sexta ꝓpō: In fine ſtatꝰ reſoluētia debēt eſſe pura. Pꝛopō pꝫ ex aliqbꝰ obiectis āte oppoſitū: vt ſcd̄o ⁊ tertio: quā cōcl'onē ēt aſſerit Aui. 3ª quarti de cura flegmonis: vbi apud vltimitatē ſtatꝰ vult te facturū reſoluētia pura. ¶ Septima ꝓpō: Et ſi ī ſtatu nō ſit reſoluētiū ⁊ recurrentiū pūctualis equalitas: hoꝝ tñ equalitas pōt cōiecturari reſpectu eoꝝ medicaminū que ī alijs tꝑibꝰ apatū applicant̄. Cū eiꝫ applicāda ī pꝛīcipio ⁊ augmēto exceſſū habeant ex ꝑte reꝑcuſſiui: ī declinatiōe vero ſit puritas reſoluētiū: in ſtatu iter iſta mediū obtineret equalitas. ¶ Quibus ꝯcluſis pꝫ ſol'o quātū ad pꝛimū obiectū. Nā lꝫ in ſtatu nō fluat mā applicato medicamie: flueret tñ ſi nō fieret iſta applicatio ꝓpter qd̄ cōuenit illa applicatio. Ad quartā dicit̄ ꝙ lꝫ equal̄r reſoluētia ⁊ recurrētia nō cōueniant ī moꝛbo magis calido ⁊ minus calido: equalia tñ reſoluētia ſeu reꝑcuſſiua ſeu equal̄r ꝑmixta cōpetūt in mēbꝛo calido ⁊ eodē mō ꝓpoꝛtionato moꝛbo calido cōpetunt equal̄r ꝑmixta. Ad quintā rōeꝫ dicit̄ ꝙ reꝑcuſſiuū nō īpedit oꝑationē reſolutiui: nec ecōtra quāuis remittat. Quō aūt fiat hoc videbit̄ in lectione ſequenti.

Occultoꝛū auteꝫ apoſtematū materia minoꝛāda eſt flobothomia ⁊ ventris ſolutōe: ⁊ opꝫ vt ea habēs a balneo ⁊ vino ⁊ motibus coꝛpoꝛeis ⁊ animalibꝰ ſuperfluis ſicut ira ⁊ ſibi ſimilibꝰ caueat: poſtea in pꝛīcipio rei adhibeatur ei qd̄ abſqꝫ nimia ſuꝑfluitate repercutit ⁊ pꝛopꝛie ſi in mēbꝛo fuerit quod ſit ſicut ſtomacus aut epar. Cūqꝫ hoꝛa reſoluēdi affuerit nō debes dimittere quin ſtipticas medicinas bonū habentes odoꝛem admiſceas ſicut in pꝛecedētibus tibi narrauimus. Et epar quidem ⁊ ſtomacus plus indigēt hoc q̄ꝫ pulmo. Opꝫ p̄terea vt mollificātia ſubtilia que iſtis adhibent̄ ſint medicie ī quibus exiſtit maturatio ⁊ ſint apatibus ꝯferētes ſicut ſolatruꝫ ⁊ caſſia fiſtula. Solatrū nāqꝫ ꝓpꝛietatē hꝫ reſoluēdi apoſtemata calida que ſunt occulta.

¶ Supꝛa poſuit Aui. curā apatū exterioꝛū ⁊ manifeſtoꝛū: nūc ponit curā occultoꝝ apatū. Et pº facit hoc. 2º aliquos erroꝛes explicat cōtingētes ī medicatiōe ipoꝝ. ibi 2ª: ē p̄terea. Pꝛīa ī duas. Nā pꝛīo facit qd̄ dictū ē. 2º explicat difficultatē cure apatū iterioꝝ ad ſaniē terminādoꝝ. ibi 2ª: cū aūt. Pꝛīa ī duas. Nā pº ponit curā ex ꝑte euacuatōnꝫ ⁊ medicationū que applicant̄. 2º ex parte diete. ibi 2ª: ⁊ ea quidē. Pꝛīa ī duas. Pꝛīo ponit curā ꝑ reꝑcuſſiua. 2º ꝑ reſoluētia. ibi 2ª: cūqꝫ hoꝛa. Pꝛīa ī tres. Nā pº ponit curā ꝑ reꝑcuſſiua faciētia tractū. 2º a quibuſdā docet ifirmū p̄cauere. 3º ponit curā ꝑ recurſiua faciētia pulſum. ibi 2ª: ⁊ oꝫ. ibi 3ª: p̄terea in pꝛincipio rei. ¶ De pꝛima dicit ꝙ mā occultoꝝ apatū ſeu īterioꝛū ē minoꝛāda ꝑ flobothomiā ⁊ ſol'onē vētris. ¶ Scd̄o dicit ꝙ hñs apata īterioꝛa caueat ſibi a balneo vino motibꝰ coꝛpeis ⁊ aīalibus ſuꝑfluis vt ira ⁊ ſimilibꝰ. ¶ Tertio dicit ꝙ poſtea ſupple poſt minoꝛationē ī pꝛīcipio adhibeat̄ nō nimiū reꝑcutiēs: ⁊ ꝓpꝛie ſi ſit apa ſtomaci aut epatis. ¶ Quarto dicit ꝙ cū fuerit tēpus reſoluēdi debes admiſcere medicias ſtipticas

Scias ꝙ vinū nō ꝯpetit ⁊ maxime in pꝛīcipio q̄ ꝯmouet mās ⁊ nō educit eas: confert tñ aliqñ in declinatōe: ſomnus ēt aliqñ ꝯfert ⁊ aliqñ non: confert quidē rōne digōnis ⁊ non rōne fluxus matericī. hec Gentilis ⁊c̄.

UVA. BHSC. IyR_006_1

boni odoꝛis ſicut narratū ẽ ſupꝛa.c.p° huius ſen. Et dicit ꝙ his plus indigēt ſtomacꝰ ⁊ epar pulmone. Etiā opꝫ vt mollificātia ſubtilia ⁊ maturatiua ſint ꝯferētia apatibꝰ: ſicut ſolatrū ꝓpꝛietatē hn̄s reſoluēdi occulta apata. ¶ Pꝛo ꝑtibꝰ aliqua lr̄alia ſūt notāda. Pꝛio ꝙ per apata occulta maxime ītelligit apata mēbꝛoꝝ īterioꝝ vt viſcerū aut mēbꝛoꝝ nobiliū pꝛincipaliū qualia ſūt cōtenta in pectoꝛe aut ī vētre inferioꝛi. ¶ 2° nota ꝙ cū in pꝛīcipio mā ſit in fluxu ad locū apatū: iō fiēda eſt minoꝛatio ſaltē ſtāte replōne ad diuertēdū ⁊ attrahendū māꝫ: ⁊ hoc ꝑ flōmiā aut ſolōnem vētris aut vtrūqꝫ ſm ꝙ fuerit mā minoꝛāda. ¶ 3° nota ꝙ ab his q̄ ponunt in ꝑte cauēdū eſt vt ab agitātibꝰ ⁊ ī fluxu ponētibꝰ māꝫ vt eſt notuꝫ. ¶ 4° nota ꝙ foꝛtia repcuſſiua ſūt cauēda ī his apatibꝰ ne ītrīſecꝰ nimiā faciāt īfrīdatōeꝫ ⁊ ītrīſecā māꝫ crudioꝛeꝫ. ¶ 5° nota ꝙ hec ꝑs ⁊ ꝓpꝛie pōt dupl̇r exponi. Pꝛio ſic ꝙ repcuſſiua foꝛtia maxie ſūt cauēda ī ſtōaco ⁊ epate: q̄ expō hn̄s īſtātiā magnā pōt ſic ꝑſuaderi. Nā ſtomacꝰ ẽ mēbꝛū d̄ ꝑ ſe pauci caloꝛis maxie aptū debilitari ꝑ repcuſſiua. Epar ēt ẽ mēbꝛū multū molle modicū reſiſtēs actiōi aptū ꝑ ꝯn̄s valde debilitari ꝑ frīdum: Aut maxie iſta ſunt cauēda ī his mēbꝛis: qꝛ iſta mēbꝛa ſūt valde apta īdurari ꝑ frīda. Aut tenere poſſumus iſtā expoſitionē dicēdo ꝙ hec referimus maxime cōparādo ad alia nutriētia mēbꝛa. Aut ſcd̄o dicēdum ꝙ ꝓpꝛie. ſ. repcuſſiua applicāda ſūt ſtomaco vel epati ⁊ ſupple alijs mēbꝛis nutrimēti: nō ſic aūt mēbꝛis ſpūalibꝰ. In ꝓmptu ẽ cā d̄ quo tn̄ fiet qd̄. ¶ 6° nota ꝙ epar ⁊ ſtomacus tāquā mēbꝛa nobilioꝛa ⁊ plus egētia vnione ⁊ bona textura plus egent tali ſtiptico. Pulmo aūt cū ſit mēbꝛū valde raruꝫ qd̄ raritate ſua melius efficit oꝑationē nō ſic iſto cōfoꝛtatur ſtiptico. ¶ 7° nota ꝙ ſolatrū quāuis ponat frigidū aut frīde cōplexiōis: aliquas tn̄ partes hēre pōt reſoluentes apata calida: iō dici pōt hēre ꝓpꝛietatē: qꝛ īfrigidat mām calidā ꝑ dn̄ium ꝑtiū frigidaꝝ: ⁊ reſoluit ꝑ partes aliquas calidas. ¶ 8° nota ꝙ per ſolatrū etiā intelligere poſſumꝰ medicamen ꝯmixtū ex ſolatro ⁊ caſſia ſeu aliquo medicamie reſoluente: aut poſſumꝰ ītelligere ſolatrū ſilueſtre qd̄ vocatur chechengi cuius etiam reſoluere eſt aliquātulum.

Et ea quidē hn̄ti nō ẽ dādus cibꝰ niſi ſubtilis ⁊ nō ī hoꝛa paroxiſmi ſi ibi fuerit neqꝫ ī pꝛīcipio ſui niſi ꝓpter multā d̄bilitatē fiat. Cū aūt ſinthoma ſuperuenerit ꝑꝑ collectōeꝫ apatis īterioꝛis cū caſu virtutis ī itinere moꝛtis exiſtit qm̄ virtꝰ nō ſuſtētat niſi nutrimēto: ⁊ nutrimētū ẽ res magis timoꝛoſa: ergo ſi reſolutū fuerit valde bonū erit: ꝙ ſi apta fuerit dāda ſunt eis q̄ ea lauēt ſicut aq̄ mellis ⁊ aq̄ zuccari: poſtea dent eis q̄ ſuauiter maturent cū ſiccitate: poſtea in fine rei nō adhibeant niſi exiccatiua: ⁊ tu quidē ſcies hec ex libꝛo qui ꝑticulares egritudines colligit ſꝫ declaratiōeꝫ. Et ꝑterea cū ī apatibꝰ occultis que ſub vētre exiſtūt cōtingit erroꝛ: qm̄ qn̄ non ſunt apoſtemata ſꝫ rupture: erit ī perfoꝛādo ea timoꝛ. Et plerūqꝫ apoſtema occultū nō exiſtit in pāniculo ſed in ipſo inteſtino: ⁊ eſt in aperiēdo ipſuꝫ timoꝛ.

¶ Nunc tāgit curā per dietā: ⁊ dicit ꝙ nō ẽ dādus iſtis niſi cibꝰ ſubtilis: ⁊ nō ẽ dandus hoꝛa ꝑoxiſmi ſi ibi fuerit nec in pꝛincipio paroxiſmi niſi pꝛopter multam debilitatē. ¶ Dicit ſcd̄o ꝙ cū perueniat accidēs ꝑꝑ collectōꝫ apatis īterioꝛis cū cāu ſeu debilitate virtutis: tūc iſte ẽ ī via moꝛtis: qꝛ virtꝰ nō ſuſtētat niſi nutrimēto: ⁊ nutrimētuꝫ ẽ res magis timoꝛoſa: hoc iō apa termīnādū ꝑ reſolōnē ẽ valde bonū. Si tn̄ hec apata fuerīt apta dent aqua mellis ⁊ zuccari lauātia māꝫ: deinde dent maturātia aliqual̇r ſtiptica vel exiccātia. In fine aūt tantū exiccātia exhibeāt que cōpꝛehēdere poteris ex libꝛo particulares moꝛbos ꝯpꝛehendente. ¶ Ultimo dicit ꝙ erroꝛ cōtingit qꝛ aliqn̄ creditur apa eē in īterioꝛibꝰ ⁊ nō ſunt apata ſed rupture. Item apa aliqn̄ ẽ in īteſtino ⁊ nō ī pāniculo: ⁊ ẽ timoꝛ in apiendo tale apa. ¶ Pꝛo partis ītellectu nota pꝛio ꝙ notāter cōuenit cibꝰ ſubtilis ⁊ paucꝰ ne nā grauet in digerēdo ⁊ aggregatur multa ſuꝑfluitas ad locū trāſitura apatū. ¶ Scd̄o nota ꝙ ſi tale apa īteriꝰ rūpat ẽ magnꝰ timoꝛ| ne pꝛio ſanies trāſeat ad aliqd̄ mēbꝛū pꝛincipale: etiā ne multū debilitet virtus ex ruptura mēbꝛi īterioꝛis. nā tunc debilitati debemus ſuccurrere cū nutrimēto: qd̄ nō poſſumus facere ne grauemꝰ virtutē. ¶ Nota vlteriꝰ ꝙ facta ruptura ꝯpetūt lauātia ⁊ abſtergētia vt ẽ notū: deīde leuiter maturātia ⁊ exiccātia ſi aliqd māe remāſerit ad maturādū. In fine vero ſolū ꝯpetūt exiccātia vt d̄bite ſanemꝰ vlcus ⁊ totā abijciamꝰ māꝫ. ¶ Penultīo nota ꝙ aliqn̄ pāniculus ſiphac ẽ fractꝰ: vt heri vidi ī vna aſmatica in cuiꝰ vētre erat tumoꝛ ad modū apatis. Eſſet ergo tūc tibi timoꝛ ſeu erroꝛ apire: hūc aūt erroꝛē poteris ꝯphēdē ꝯpꝛimēdo tumoꝛē. nā cōit īteſtinū interiꝰ reuertet: qd̄ nō fieret exn̄te apate. ¶ Ultīo nota ꝙ aliqn̄ ēt errare ꝯtigit: qꝛ apa eſt in īteſtino ⁊ credit ꝙ ſit in pāniculo: qd̄ ēt cōpꝛehēdere poteris per ſigna denotātia moꝛbos inteſtinoꝝ ⁊ virtutis debilitateꝫ.

¶ Capituluꝫ vigeſimūſextuꝫ de ſectione.

q Ui plagā ſecare voluerit opoꝛtebit vt ſectio īcedat ſm rugaꝝ collectiōeꝫ q̄ ſūt interius ī illo mēbꝛo niſi fuerit tale qualis eſt frons: qm̄ ſi īciſio īcedet ſicut ꝓcedūt rugaꝝ ipſiꝰ collectōes īcidet muſculus frōtis ⁊ cadet ſuꝑciliū. Et ſil̇r ī mēbꝛis rugaꝝ q̄ruꝫ īceſſus diuerſificat ab īceſſu villoꝝ ſuoꝝ muſc̄loꝝ. Oꝫ ergo vt ſectoꝛ ex anothomia ſciat anothomiā neruoꝝ ⁊ venarū ⁊ artariaꝝ ne erroꝛe īcidat aliquid ex eis. Et oꝫ ēt vt ſecū deferat multas ex medicīs ſanguinē ꝯſtrīgētibꝰ ⁊ ēpl̄is doloꝛē ſedātibꝰ ⁊ īſtrumētis q̄ ad hoc ꝑtineāt. Hēat ergo ſecū qd̄ ſit ſicut medicina Gal. ⁊ ſicut pilus lepoꝛis ⁊ tela aranee ⁊ albumē oui ⁊ ferramēta quibꝰ adurit. Oia eiꝫ hec ſanguis fluxū ꝓhibēt ſiue ex erroꝛe ipſiꝰ pꝛoueniat ſiue neceſſario ⁊ vt medicīas deferat q̄ fluxa faciūt. Cūqꝫ exiturā ꝑfoꝛauerit ⁊ qd̄ ī ea ꝯtinet extraxerit nō debebit ei adhibere oleū neqꝫ aquā neqꝫ empl̄m ī quo ſit oleū neqꝫ ſepū ſuꝑabūdans ſicut baſilicon: īmo aliquid qd̄ ſit ſicut empl̄ꝫ ex calcanto qd̄ apponat cū eo īdigebit: ⁊ deſuꝑ īponat ſpongiā ī vino ſtiptico īfuſaꝫ.

¶ In. c. ꝑcedēti Auic. poſuit curā apatis ſeu apatū: nūc qꝛ apa multotiēs curat ꝑ ſectionē curā tāgit ⁊ modū ſecādi apa. Qꝛ ēt ad apa multotiēs ſequit coꝛꝛuptio mēbꝛi tāgit cān̄. circa coꝛꝛuptionē ⁊ remotionē coꝛꝛupti mēbꝛi. Et diuidit in duas. Nā pꝛio determiat de ſectiōe plage. 2° de remotiōe mēbꝛi coꝛꝛupti. 2ª ibi: cū mēbꝛū. Primū caᵐ ī tres diuidit ꝑtes. Pꝛio ponit cān̄. attēdēduꝫ ex ꝑte ſectiōis rōe ſitꝰ mēbꝛi. 2° ponit cān̄. attēdēdū rōe fluxꝰ ſanguis qui pōt ꝯtingere. 3° ponit remedia poſt ſectiōꝫ applicāda. ibi 2ª: ⁊ oꝫ. ibi 3ª: cūqꝫ exiturā. ¶ De pꝛia dicit: volēs ſecare plagā ſecet īpam ſꝫ īceſſuꝫ rugaꝝ mēbꝛi niſi in fronte: qꝛ ſi īcideret frōs ſꝫ īceſſuꝫ rugaꝝ frōtis: tūc incideret muſculus frōtis ſupple ex trāſuerſo ⁊ caderet ſuꝑciliū: ⁊ ſic ẽ ī alijs mēbꝛis quoꝝ villoꝝ īceſſus diuerſus ẽ ab īceſſu rugarū: iō ſectoꝛ ſciat ex anothomia īceſſuꝫ venarū ⁊ artariarū ne erret ī incidēdo aliqd̄ illoꝝ. ¶ Dicit 2° ꝙ oꝫ ſectoꝛē ſecū d̄ferre medicīas ſanguīs ꝯſtrictiuas ⁊ ēplaſtra ēt doloꝛē ſedātia ⁊ īſtr̄a etiā ad ſanguīs fluxū retinenduꝫ: vn̄ ſecuꝫ hēat medicamē Gal. pilos lepoꝛis: telā araneę: albumē oui ⁊ ferramēta quibꝰ fit aduſtio. Nā oia iſta ꝓhibebūt fluxū ſanguīs ſiue neceſſario cōtingētē q̄ꝫtūcū q̄ꝫ rōe oꝑet ſiue cōtingētē ex erroꝛe: ⁊ īpm oꝫ deferre medicinas ſedatiuas doloꝛis. ¶ 3° dicit ꝙ ꝑfoꝛata exitura ſiue apate ⁊ extracto ꝯtēto ī eo nō exhibeat oleū nec aquā nec ēplaſtrū ī quo ſit multū oleū aut ſepū ſicut ẽ baſilicon: īmo offerat ēplaſtrū factū ex calcāto ſeu ex alia re exiccāte ſi egebat tali: ⁊ ſupꝛa exiturā ⁊ ſolutā cōtinuitatē ponat ſpōgia īfuſa vino ſtiptico. ¶ Pꝛo ꝑte nota ꝙ ꝑ plagā intelligit apa vel exiturā ī qua ẽ plaga ꝑꝑ māꝫ ſaniatā ſoluētē cōtinuitatē. Qui ergo voluerit ſecare plagā ꝑꝑ māꝫ ſaniatā. i. exiturā vel apa plagatū: ſeu ſil̇r qui voluerit ſecare vel ſecādo plagaꝫ efficere ⁊c̄. ¶ 2° nota ꝙ ſicut cōiter villi neruoꝝ ī mēbꝛis īcedūt ſm īceſſuꝫ collectōis rugaꝝ: ita ēt apparet ī muſculis. Cōueniēs ẽ ergo īcidere ſꝫ īceſſum rugaꝝ: p° vt cicatrix pulchꝛioꝛ gn̄et q̄ſi rugis coopeꝛiētibꝰ cicatricē ⁊ occultātibꝰ eā. 2° ēt qꝛ tūc nō īcidit neruus aut muſculus ex trāſuerſo: ex quo īciſio ēt ſit faciliōris ꝯſolidatōis niſi ī frōte palpebꝛa ſuꝑioꝛi ⁊ vētre. Nā p° ī fronte muſculus tenēs ſuꝑciliū trāſit ſm longū frontis vbi ruge īcedūt ſm latū. Et ſi īciderent ſm inceſſuꝫ rugarū: tūc inciſo muſculo ſm trāſuerſuꝫ caderet ſuꝑciliū qd̄ tenebat muſculo. Eodē mō īcedit muſculus palpebꝛarum ſm lōgū faciei: vn̄ ſi fiat inciſio ſm inceſſum rugarum palpebꝛarū cadet palpebꝛa. Idem etiā apparet ī vētre in quo etiā ruge ſunt ſm trāſuerſuꝫ: ideo ſi fiat īciſio illo mō īciſo ēt muſculo ſm trāſuerſuꝫ ꝯſequit vehemēs leſio. ¶ Ulterius nota ꝙ aliqn̄ nos īcidimꝰ in frōte ſm inceſſuꝫ rugaꝝ maius euitādo nocumētū: qꝛ fiſtulatōeꝫ ⁊ vehemētē coꝛꝛuptōeꝫ vt fracto craneo īcidimus cutē in cruce excoꝛiādo ⁊ debite ꝓpter euitare fiſtulatōeꝫ ⁊ vehemētem coꝛꝛuptōeꝫ ⁊ apationē. ¶ Nota ēt ꝙ in ſecādo īquātū poſſumꝰ recedere debemꝰ a venis ⁊ artarijs ⁊ neruis: cā eſt in ꝓmptu. ¶ Nota vlteriꝰ vt colligit 3ª q̄rti. c. de regimie exituraꝝ: ꝙ in ſecādo debemꝰ īcidere locū maturioꝛē: locū ēt decliuioꝛē ſeu laſſioꝛē. Eſt aūt cā pꝛimi: qꝛ cutis ī loco maturioꝛi ẽ ſubtilioꝛ. Cā vero ſcd̄i eſt: qꝛ ad locū īferioꝛē meliꝰ trāſit ſanies q̄ꝫ ad ꝑteꝫ ſuꝑioꝛē. Si tn̄ ꝯtingat ita ꝯiungi ꝙ locus ſuꝑioꝛ ſit maturioꝛ: potiꝰ alia obſeruet ꝯditio ſecando in ꝑte īferioꝛi lꝫ nō maturioꝛi iuuamēto ſequēte maioꝛi ī illa ꝑte q̄ꝫ in ꝑte ſuꝑioꝛi maturioꝛi. Ea q̄ in 2ª ꝑte poſita ſūt nota vno excepto ꝙ per medicinas faciētes fluxa ītelligit medicinas ſedātes doloꝛē q̄ faciunt fluxū. i. faciunt molle apiendo poꝛos ⁊ māꝫ exitui diſponēdo: vt ēt colligit 5° de
ſimplici

Nota ꝙ lꝫ baſilicon ſit mūdificatiuū ſaniei ⁊ carnis regeneratiuū quibꝰ virtutibus opus ẽ in vlceribus exituraruꝫ: nihilominꝰ ipo n̄ debemus vti niſi ī paruis vlceribꝰ. In magnis vero exituralibꝰ non: qꝛ ipſa ſua pinguoſitate nimis ſoꝛdidat humefacit ⁊ ſanie replet ⁊c̄.

UVA. BHSC. IyR_006_1

ſimplici medicīa.c. de medicis ſedātib⁹ dolorē: q2 de rōne eaꝝ eſt vt apiant poros. ❡ Ulteri⁹ nota ꝙ apta exitura nō eſt multū oleū nec aqua nec multū ſepū apponēduꝫ: eo ꝙ tūc exitura ē facta vlcus cui vt īfra appebit nō ꝯuenit humectatio ſ3 exiccatio. Cū ergo iſte humectēt ⁊ putrefactōi diſponāt nō ſūt apponēda. Deīde ſi q̄rim⁹ exiccationē ſ3 aliquos apponem⁹ calcātū: qđ eſt es vſtū aut ſpēs vitrioli cui⁹ ē vehemēter exiccare. Uñ ſm expoſitōeꝫ tale medicamē eſt apponēduꝫ ī fine vbi q̄rim⁹ cicatrizare: vñ talis dꝫ eē ordo ī medicādo taleꝫ exiturā ꝙ p̄° ponanꝛ reſtrīgenda fluxū vt ponaꝛ tēta īfuſa albumini oui ⁊ aliqñ ſanguis draconis: ⁊ ī circuitu apponanꝛ repcuſſiua vt non trāſeat mā ad locū. Poſtq̄ꝫ aūt ſum⁹ ſecuri de fluxu ſanguīs nos bñ ꝯprimēdo cū manib⁹ expurgam⁹ ſaniē. Et ſi vlcus ē valde magnū ⁊ ſanies multa: nō tm̄ vna vice ſ3 plurib⁹ extrahim⁹: deīde ponim⁹ abſtergētia: deīde ſicciora aut ſtipticiora ad ꝯſolidādu3: deīde adhuc ſicciora ad cicatrizationeꝫ. Cuꝫ aūt cicatrizatio non ſit niſi tal'r ſignaꝛ taleꝫ generāda cuteꝫ. Cū ergo cutis ſit dura ⁊ tenax: iō fortiter exiccāteꝫ oꝫ applicare medicinā. Ad ītentionē ergo cicatrizādi docuit admiſtrare calcantū aut etiā ſpongiaꝫ.

❡ Caᵐ 27ᵐ de egritudib⁹ corruptōis mēbri ⁊ de īciſione.

Um mēbrū ꝑpter malā ꝯplonē3 cū mā aut ſine mā corrūpiꝛ ⁊ nō ꝓfecerit ei ſcarificatio neq3 epithimari ex eo ꝙ cōferre ꝯſueuit de eis que ī libris particularib⁹ dicta ſūt neceſſe eſt vt caro corrupta que eſt ſupra ipſum remoueaꝛ: ⁊ melius quidem erit vt ſit ſine ferro ſi poſſibile fuerit qm̄ ferrū plerūq3 īuenit tunicas muſculoꝝ ⁊ venaꝝ pulſantiuꝫ periculoſe.

❡ Ponit nūc cañ. attēdēdū circa corruptōe3 mēbri. Et ꝯtinet hec ps tres ptes. Prīo ponit cañ. ⁊ curā ex pte medicamīs cauſticātis. 2° ex pte īciſionis. 3° oſtēdit in quo caſu corruptōis mēbri curā euitare dbem⁹. ibi 2ª: ꝙ ſi hec vero. ibi 3ª: ⁊ ſi os fuerit. ❡ De p̄ª dicit ꝙ corrupto mēbro ꝑpter malā ꝯplōne3 cū mā aut ſine mā nec ꝯferēte ſcarificatōe nec epithimatiōe ex ꝯſuetis ꝯferre cnumeratis in libris pticularib⁹ neceſſe eſt carnē ſupra mēbrū exñtē corruptuꝫ remoueri. Et meli⁹ remoueꝛ ſine ferro ſi ſit poſſibile q̄ꝫ cū ferro: q2 cū ferro pluries īciduꝛ cū periculo tunice muſculoꝝ ⁊ artariaꝝ. ❡ Pro pte nota ꝙ mēbrū aliqñ eſt ī via ad corruptōe3: aut ꝑpter malā ꝯplōne3 in eo exñte3: aut ꝑpter oppilatōe3 vt dicā: ⁊ tūc vocaꝛ iſta diſpō cancrena mēbro adhuc hñte ſenſuꝫ. Aliqñ aūt hꝫ corruptū eē ablato ſenſu mēbro nō exñte ampli⁹ aīato: īmo iā fetente ⁊ putrido: ⁊ tūc diſpō talis gnāli noīe ſolita eſt vocari ſcachillos: aut ēt aliqñ vocaꝛ ſpāli nomīe herpeſtiomen⁹. Et differūt iſta duo ſpāliter noīando ſcachillos ⁊ herpeſtiomen⁹: q2 ſcachillos īportat mēbri corruptōe3 dato ꝙ ñ īcedat āplius aliā corrūpēdo pte3. Herpeſtiomen⁹ aūt denotat ipſaꝫ paſſionē ampli⁹ īcedere corrūpendo pte3 ſicut pꝫ multotiēs ī mēbris diſpoſitis corruptōi ſiue putrefactiōi: vt p̄putio ⁊ ſimilib⁹: vt aliqñ q̄ſi ſubito oporteat eū incidi. ❡ Ulteri⁹ nota vt colligiꝛ 3ª q̄rti all'ato loco: ꝙ talis corruptio ꝯtigit aut ꝑpter malā ꝯplōne3 corrūpēte3 ſpūꝫ ⁊ aīaꝫ mēbri: aut ꝑpter oppilatōem factā a cā īteriori aut primitiua ꝑpter quā ꝓhibeꝛ delatio ſpūs vitalis in mēbro aīaꝫ ꝯſeruātis. Qūocūq3 tñ ſit mala ꝯplō ꝯiungiꝛ mēbro: ideo hāc explicuit ꝯplōne3 oppilatōe3 tāgendo. ❡ Ulteri⁹ nota ꝙ q̄ꝫuis mala ꝯplō ſine mā poſſit eſſe cā principalis corruptōis mēbri. Huic tñ corruptōi ſemꝑ annectiꝛ mala ꝯplō pēdens ab hūiditate corrupta. ❡ Ulteri⁹ nota ꝙ lꝫ q̄libet mala ꝯplō exceſſiua poſſit corrūpe mēbrū ſuā aīaꝫ corrūpēdo: ꝯplō tñ maxīe corruptiua aut ē mala ꝯplō calida humiditati ꝯiūcta putrefaciens mēbrū: aut frīditas mortificās mēbrū: vt pꝫ in iter agentib⁹ q ꝯgelanꝛ ⁊ corrūpunꝛ aliqñ amittētes pedem aut naſuꝫ aut p̄puciū. ❡ Ulteri⁹ nota ꝙ meli⁹ ē remouē ptē corruptā ſine ferro. p̄° ꝑpter multos abhorrētes ferꝝ. 2° ꝑpter violētā ⁊ ſubitaꝫ īpreſſionē ferri ꝑpter timorē etiā ne vrendo tunice muſculoꝝ īcidanꝛ. Aut ēt ne incidanꝛ vene vel artarie: ⁊ vt ſi approximemus cauſticū nō faciat ita ſubitā ⁊ forte3 īpreſſione3.

Quattuor modis ſunt quib⁹ a cancrenis auferri pōt caro corrupta. Un⁹ eſt per corroſiua. ſecūdus p cauteria potentialia. tertius eſt cuꝫ cauterio actuali ⁊c.

Qđ ſi hoc nō ꝯtulerit ⁊ corruptio iaꝫ in carne ꝓceſſerit neceſſe erit vt ipſa incidaꝛ ⁊ vt locus inciſiōis oleo feruente aduraꝛ. Ex hoc eniꝫ ꝓuenit ſecuritas ab acuitate malitie ipſi⁹ ⁊ reſtringiꝛ ſanguinis exitus ⁊ naſcunꝛ ſuper īciſionis locū caro ⁊ cutis extranea nō ꝓportionalis ſed res que magis carni ſimilis exiſtit ꝑpter ſui duritieꝫ. Cūq3 īcidēdi volūtas affuerit tēta prius erit īmittenda in circuitu oſſis voluēdo donec qđ ſane teneaꝛ reperiat: ⁊ vbi dolor ſit fortior cū tenta ibi īnitiꝛ qm̄ eſt terminus ſanitatis: ⁊ vbicūq3 inueneris laſſitatē ⁊ retētionis debilitatē totuꝫ erit ex collectōe eius qđ eſt incidenduꝫ. Cūq3 autē perforaꝛ illud qđ circūdat os qđ vis incidere ita ꝙ foramina circūdent ipſuꝫ: ergo rumpeꝛ per ipſuꝫ ⁊ incideꝛ ⁊ qñq3 ſerraꝛ. Cūq3 hoc facere volueris ſepara inter īcidentē ⁊ perforantē ⁊ inter carne3 vt non redeat. Si ergo ipſuꝫ os qđ eſt neceſſe īcidere fuerit fruſtuꝫ eminēs qđ nō poſſit aptari ita vt debet: neq3 ſit in eius rectificatōe fiducia ⁊ timeaꝛ ne corrūpaꝛ ⁊ corrūpat illđ qđ eſt corā ipſo ſubleuabim⁹ carnē ab eo aut ſcindēdo: deinde ligādo ⁊ ad diuerſitatē partis illius extēdendo aut alijs īgenijs que ſenſus demōſtrat ⁊ ſeparabim⁹ inter ipſuꝫ ⁊ mēbruꝫ nobile ſi ibi affuerit cū pannis qui ipſuꝫ ab eo elōgabunt ⁊ poſtea īcidemus.

❡ Nūc tāgit curā ꝑ īciſiōe3: dicēs ꝙ ſi talis cura nō cōtulerit: īmo iā corruptio ꝓceſſerit ī carne ſupple vlcerādo neceſſe ē īcidere carnē ⁊ aduertere locū ī quo ē facta īciſio oleo feruēte. Nā dicit Aui. ex tali oleo feruēte ſum⁹ ſecuri ab acuitate malitie. i. ſum⁹ ſecuri ne mala mā trāſeat vlterius eo qđ per aduſtionē talis cōſumiꝛ mā. Itē reſtrīgiꝛ flux⁹ ſanguis cū ꝑ aduſtionē fiat cruſta ſupra orificiū vene vel artarie. Et notāter cū oleo ē hoc fiēdū vt cū domeſticiori cauſtico cū ēt oleū ſit penetratiuū valde: ⁊ ꝑ cōſeq̄ns adurēs ꝓfunde ſm ꝙ ē debitū. Et dicit Auic. ꝙ naſcūtur ſupra locū inciſiōis caro ⁊ cutis extranea. nā cū mēbrū ſit cōfortatū ⁊ ſint remote carnes corrupte caro poterit debite gnāri. Itē gnābiꝛ cutis extranea: q2 nō talis ſicut prīa ⁊ nō ꝓportiōalis prīe ꝓportionalitate ſimilitudīs ſ3 ſimilis ī duritie. Nā cū cutis ſit mēbrū ſpermaticū nō regeneraꝛ ſ3 loco ei⁹ gnāꝛ aliqđ vt caro ſicut por⁹ ſarcoydes ſeu caro dura cutis. ❡ Scđo ponit cañ. ī incidēdo attēdendos dicēs cū voluerit incidere medic⁹ p̄° īponēda ē tēta ⁊ voluenda circa os vſquequo īueniat ptē ſanā quā cōprehēdet ꝑ fortē dolorē pceptū īmiſſa tenta. nā pars corrupta ñ dolet. Ubicūq3 ergo īueniat laſſitatē ⁊ dbilitatē retētiōis ſcias ꝙ illud ē ꝑpter corruptiō3 ⁊ putrefactionē ⁊ totū erit īcidēdū: hoc totū ē notū. ❡ Ulteri⁹ dicit Aui. ꝙ qñq3 pforatur os circūdans quod tu vis remouere: ita vt foramīa ſint circa os: dū ergo hoc vis facere ſepa īter īcidentē ⁊ pforantē. i. aliqñ opare īcidēdo aliqñ pforādo: ſepa ēt inter carnē vt non redeat circa os. Ecce modus opatōis. Aliqs vult foramē rotūdū facē ī aſſe: tūc pforat cū terebello ⁊ factis ꝯplete foraminib⁹ circūquaq3 āmoueat illud qđ ī medio dimiſit īter foramē: ⁊ foramē vt tādē mediū remoueatur. Sic ēt fit in oſſe remouēdo ⁊ maxīe dū os ē rotūdum cui nō pōt aliqua ſectio applicari quale ē craneū. ❡ Ulterius dicit Aui. Si fuerit fruſtū oſſis remouēdū eminēs ñ aptū aptari cui⁹ timeaꝛ corruptio īmo ⁊ exñtis ꝓpe īpm: tūc ab eo ē remouēda caro ⁊ dꝫ os trahi ad partē oppoſitā ⁊ remoueri a mēbro nobili inquātuꝫ poſſumus: deinde dꝫ incidi. Et iſta eſt ſententia totius partis.

Et ſi os fuerit tale quale eſt os coxe ⁊ fuerit magnū ⁊ neruis ⁊ artarijs ⁊ venis ꝓpinquū ⁊ fuerit eius corruptio multa debet medicus ab eo fugere.

❡ Nūc oñdit cāum ī quo nos oꝫ oſſis corrupti curā euitare: dicēs ꝙ ſi os fuerit os coxe ⁊ fuerit os magnū ꝓpinquū neruis venis ⁊ artarijs multa exñte corruptiōe debet medicus fugere ab īpo iuxta dictū Meſue ī ſuo de appropriatis ad pricipiū. Noli prauaꝝ egritudinū curā aſſumē vel cure on⁹ ſuſcipe ne nomē mali medici ſubeas. Et notāter ē vitāda cura: q2 ſi accedat ad curādū cū ñ poſſit curari niſi ꝑ inciſionē occidet hoīe3 exñte ita magno membro.

Dubitatur propter vnum tactuꝫ ſupra: Utrū medicinaꝝ cōtrariaꝝ cōmixtio ſit cōueniens ꝓ cura apatū? Qđ nō arguiꝛ ꝑ rōe3 tactā: q2 vna īpedit alterā ſiue alterius opatiōe3. ❡ 2° ſic: Medicia ꝯtraria opabiꝛ circa mām circa quā nō debēt opari: ergo. Nota ꝯña: ⁊ pꝫ aſſumptū. nā permixta medicia repcuſſiua reſolutiue cuꝫ māe repcutiēde appliceꝛ reſolutiua īpa reſoluet mām quā nō ītēdim⁹ reſoluere. ❡ 3° ſic: Nā nō hꝫ mētē vt ſcrutetur de meliori: ergo ꝯtraria nō ſūt applicāda. Añs pꝫ 4° regimīs acutoꝝ ꝯmēto p̄°. Tꝫ ꝯñtia: q2 illa ꝯtraria nō applicanꝛ niſi vt eis vtaꝛ nā qñ oꝫ ⁊ vbi ⁊ ī quo oꝫ. ❡ Ad oppoſitū ē Aui. ❡ Pro dubio p̄mittēdo p̄° ꝙ medicinaꝝ cōtrariaꝝ cōmixtio pōt dupl'r intelligi. Uno mō vt denoteꝛ ſimultas tpis. 2° mō vt denoteꝛ eas ſic adinuicē applicari: vt plurimū vnius cōtingat plurimū alterius. ❡ 2° nota ꝙ hec medicie pñt dupl'r ītelligi ꝯmiſceri. Prīo mō vt ex eis tm̄ vna media opatio conſequaꝛ ⁊ pducaꝛ. 2° vt ꝑ eas ꝓducāꝛ due opatiōes ꝯtrarie ⁊ remiſce. ❡ Quib⁹ notatis ſit prīa ꝯcl'o: Medicie repcuſſiua ⁊ reſolutiua ſimul tēpore ſūt cōmiſcēde vel applicāde. Concl'o ſic pſuadeꝛ: q2 ꝑ totū augmētū ſunt applicāde: ergo ⁊c. ꝯñtia nota: ⁊ colligiꝛ aſſumptū ex tex. ❡ 2ª cōcl'o: Medicina repcuſſiua prīcipal'r ē applicāda alteri pti a pte cui ē applicāda reſolutiua. Pꝫ ex hoc cōcl'o. Nā repcuſſiua ē applicāda ad ꝓhibēdū fluxū: reſolutiua vo pp mām fluxā: ergo añs ē notū.

UVA. BHSC. IyR_006_1

Et tʒ ex eo ꝯñtia: q꞉ applicãdo repcutiẽs ĩ circuitu fluxum ꝓhibem⁹ mãe. Applicãdo vero reſolutiuũ ſupra tumoreʒ nos reſoluim⁹ fluxã mãʒ. ¶ 3ª ꝯclõ: Cõmixtio haꝝ medicinaꝝ marie dʒ ĩtelligi ſimul: q꞉ ĩ eodẽ tpe fiat applicatio eaꝝ. Cõclõ pſuadet̃ ſic: Iſtaꝝ talis dʒ eẽ pmixtio p quaʒ grãdi⁹ ſequit̃ iuuamẽtũ: ergo añs ẽ notũ ⁊ tʒ ꝯñtia: q꞉ ſic applicãdo medicias ⁊ diſtictis ptib⁹: vt ex 2ª ꝯclõne ſumit̃ ſequũt̃ grãdiora iuuamẽta. ¶ 4ª cõclõ: Haꝝ medicinarũ vera cõmixtio aliqñ ꝯueniẽs ẽ. Pʒ cõclõ ꝓ quãto he medicine adinuicẽ refrãgunt̃ in opando: vñ ſubſequit̃ media opatio. ¶ Iſtis quattuor cõcluſis pʒ ſolõ ad obiecta. Ad primũ dicẽdũ q̄ vna nõ impedit opationẽ alteri⁹ cũ diſtictis ptibus applicẽt̃. Uel 2º dicit̃ q̄ vna ĩpedit opationẽ alteri⁹ extremã q̄ʒuis iuuet illã aliã vt mediã pducat opationẽ. Ad aliud per idẽ pʒ ſolõ. Ad tertiũ dicit̃ q̄ nõ applicant̃ he medicĩe: q꞉ nã hẽat mẽtẽ in regulãdo eas: ſʒ regulant̃ ab ĩtelligẽtia nõ errãte 12º meta. cõmẽto 18º. Si ergo diſticte he medicie applicãt̃ ptib⁹ pʒ rõeʒ ñ ꝯcludere. Si võ applicet̃ pti eidẽ quãuis pti mãe ĩferat̃ nocumẽtũ: applicatio tñ eligẽda ẽ maiori ſequẽte iuuamẽto.

¶ Caᵐ 28m de medicatõib⁹ ſolõni ꝯtinuitatis ipſoꝝ vlceꝝ.

ſ Olutio ꝯtinuitatis ĩ magnis mẽbris medicat̃ equatõe ⁊ ligatura ꝯueniẽte q̃ ĩ doctrina reſtauratõis dicta ẽ: ⁊ tibi in ſuo loco poſtea veniet cũ quiete ⁊ comeſtiõe cibi ꝯglutinatiui in quo habet̃ fiducia q̄ ex ipſo nutrimẽtũ generet̃ cartilaginoſuʒ qõ labia fracture claudat ⁊ ĩ vnũ ꝯducat ſicut cib⁹ qui fit de extremitatib⁹ aialiuʒ. Impoſſibile eiʒ eſt vt os reſtauret̃ ⁊ ꝓprie ĩ corporib⁹ ꝯſiſtentiũ niſi ſm hunc moduʒ: qm̃ nullo modo redibit ad ꝯtinuitatẽ: ⁊ nos quideʒ de reſtauratiõe ſermonẽ exquiſitũ loq̃mur in libris particularib⁹.

¶ In caplĩs p̃cedẽtib⁹ determiauit de cura morbi cõplõnalis ⁊ ꝯpõnalis: nunc exequit̃ ponẽdo curaʒ morborũ vnitatis. Et diuidit̃ ĩ duas. Prĩo facit hoc qõ dictũ eſt. 2º q꞉ multotiẽs fit ſolõ ꝯtinuitatis cũ cauterio: ⁊ q꞉ ẽt de ipſo ꝓ pte mentionẽ fecerat in caº de cura corruptõis mẽbri: iõ determiauit 2º de cauterizatõe. ibi 2ª: cauterizatio. Caᵐ pᵐ diuidit̃ ĩ duas ptes. Nã pº facit qõ dictuʒ ẽ. 2º ꝓ quorũdaʒ dictoꝝ declaratõe nos ad alia loca remittit. ibi 2ª: ſermonẽ aũt. Pria ĩ duas. Nã pº ponit curã ſolute ꝯtinuitatis ĩ exteriorib⁹ magis facte. 2º magis facte in ĩteriorib⁹ a cãis primitiuis. ibi 2ª: in his q̃ ſũt. Pria ĩ duas. Naʒ pº ponit curã ſolute ꝯtinuitatis facte ĩ ꝯſimilib⁹. 2º magis facte ĩ organicis. ibi 2ª: in ꝯtorſione. Pria ĩ duas. Nã pº mẽbroꝝ duroꝝ ponit curã. 2º molliũ ſolutoꝝ. ibi 2ª: ĩtentio aũt. ¶ Prĩo dicit q̄ ſolõ ꝯtinuitatis facta ĩ mẽbris duris curat̃ equãdo ⁊ ꝯueniẽter ligãdo ſicut dictũ ẽ ĩ libro docẽte reſtauratõeʒ: q꞉ in q̃rto. Curat̃ ẽt quieſcẽte corpe ⁊ cibũ comedẽdo glutinoſuʒ exquo ꝯfidim⁹ nutrimẽtuʒ gñari cartilaginoſuʒ labia claudẽs fracture ĩ vnũ ⁊ ſolutas adducẽs extremitates: vt ẽ cib⁹ ex aialiuʒ extremitatib⁹ fact⁹. Nã ĩpoſſibile ẽ vt os ĩ etate ꝯſiſtẽtie alio mõ reſtauret̃: cũ hoc nullaten⁹ ad verã ꝯtinuitatẽ põt puenire. Et certe dicit Aui. nos ſermonẽ exq̃ſitũ faciem⁹ dũ ĩ locis pticularib⁹ loq̃mur de p̃nti mã: q꞉ 5ª q̃rti. ¶ Pro pte ſũt notãda aliq̃ litteralia. pº q̄ ſolõ cõtinuitatis ⁊ ſolõ vnitatis ⁊ ſolõ nãe cõis idẽ apud medicos ĩportãt cũ vnitas cõtinuitas ⁊ nã cõis ſint ideʒ. ¶ Scdõ nota q̄ p magna mẽbra dura ĩtelligit Aui. oſſa: q̃ tanq̄ʒ toti⁹ corpis fundamẽta magna fuerũt ſeu magne q̄ʒtitatis ⁊ numeri. Et intelligãt̃ p ipſa ẽt alia mẽbra dura vt cartilagĩes. ¶ Tertio nota q̄ p equatõeʒ ĩtelligit Aui. equã ⁊ debitã plaſmationẽ ſeu ꝯpõneʒ mẽbri: vt cũ p ſolõnẽ vna ps alteri emineat vltra nãe debitũ ad ſuũ debitũ ſituʒ equet̃. Que aũt ſit ꝯueniẽs ligatura: inferi⁹ dicet̃. Itẽ ꝯuenit ad curã quies. Sicut eiʒ corpis ⁊ mẽbri mot⁹ diſtractiõeʒ facit ĩ partib⁹: ita quies ad coniunctionẽ iuuat ⁊ vnionẽ. ¶ Itẽ nota q̄ cum os nõ reſtauret̃ nec ꝯtinuet̃ ſm viã prime ĩtentõis q̃ ẽ facẽ ipm vere vnũ ⁊ ꝯtinuuʒ nullo alteri⁹ rõnis cadente medio pp aſſignatã cãʒ pª primi. Reſtaurat̃ tñ ſʒ viã ſcdẽ ĩtentõis ipʒ vnificãdo ſʒ q̄ eſt poſſibile nobis ⁊ aliqd ponẽdo loco depditi: ⁊ cũ ad hãc opatõeʒ faciẽdã glutinoſuʒ faciat nutrimẽtũ: ideo co ꝓ cibo egemus.

Licet hoc ſit veruʒ in etate ꝯſiſtentie vel vltra q̄ os nõ poſſit vere vniri vera vnione cuʒ ſit duruʒ ⁊ per ꝯñs male inuiſcabile: tamẽ in etate puericie ⁊ in ꝯplexione calida ⁊ humida bene ⁊ vere põt vniri ꝓpter mollitiẽ ꝯplexiõis ⁊ etatis: ſed vnione nõ vera poſſunt vniri per parũ ſarcoidẽ ſicut ligna vniũtur p collaʒ: quare ⁊c.

Intẽtio aũt ĩ medicãdo ſolõnẽ ꝯtinuitatis q̃ in mẽbris accidit mollib⁹ ẽ triũ pricipioꝝ curã habere. Primũ eoꝝ eſt qm̃ ſi cã fuerit fixa min⁹ q̄ʒ opʒ eſt retinere illud qõ fluit ⁊ ꝯſtrigere eius mãʒ ſi ipſa fuerit currẽs. Et ſecunduʒ eſt fixurã ꝯſolidare cũ medicinis ⁊ cibis ꝯueniẽtib⁹. Et tertiũ ẽ putrefactiõeʒ ꝓhibere quãtoplus fuerit poſſibile. Cũq̄ʒ ab vno triũ te excuſaueris redi ad cogitãduʒ de duob⁹ remanẽtib⁹. Tu vero iaʒ ſcis quõ illud qõ fluit retineat̃: ſed conſolidatio fit adiũgendo labia ſi adiunguntur ⁊ exiccãdo ⁊ comedẽdo glutinatiua.

¶ Nũc ponit curã ſolute ꝯtinuitatis facte ĩ mẽbris mollib⁹. Et pº facit hoc ĩ gnãli. 2º magis ĩ ſpãli. ibi 2ª: ⁊ dicem⁹. Pria ĩ duas. pº facit qõ dictũ ẽ. 2º ponit curã ſolute ꝯtinuitat̃ cui ꝯiũgit̃ ſanies. ibi 2ª: ⁊ ſcito q̄ ĩtẽtio. ¶ Prio dicit q̄ nos ĩtẽdimus curare ſolutã cõtinuitatẽ mẽbroruʒ molliũ triũ pricipioꝝ hñdo curã. pº retinẽdo mãʒ fluẽtẽ ſi nõ fuerit valde fixa. 2º cõſolidãdo fixurã cũ medicis ⁊ cibis cõueniẽtibus. 3º ꝓhibẽdo putrefactõeʒ quãtũ ẽ poſſibile magis. Et te expedito ab vno iſtoꝝ triuʒ redi ad expediẽdũ alia duo. Scis eiʒ quõ mã fluẽs retinet̃: ꝯſolidatio vero cõplet̃ iũgẽdo labia ſi iũgi pñt ⁊ exiccãdo ⁊ ꝯglutinãtia comedẽdo. ¶ Pro pte nota pº q̄ facta ſoluta cõtinuitate: tũ pp doloreʒ: tũ pp debilitatẽ ſolute ptis ⁊ venaꝝ aptionẽ: aut artariarũ hũores currũt ad locũ ſolutũ: iõ prio debem⁹ repcutere mãʒ. 2º q꞉ ꝯtinuitati ſolute putredo cõiũgit̃ aliqñ: iõ putrefactionẽ remouẽtia applicare debem⁹. 3º q꞉ oĩs ſoluta cõtinuitas reduci dʒ ſi põt fieri ad vnionẽ: iõ cõſolidãtib⁹ ⁊ exiccãtib⁹ leuiter ⁊ glutinãtibus egem⁹: ⁊ aliqñ oib⁹ iſtis: ⁊ aliqñ vno tm̃: hoc ẽt verũ ẽ ſoluta ꝯtinuitate nõ exiſtente praua vt poſſit a nã curari. ¶ Ulteri⁹ nota q̄ exñte putrefactiõe ĩ ſoluta cõtinuitate: pº debem⁹ putrefactionẽ ãmouere q̄ʒ cõſolidare: q꞉ tñ remotio putrefactiõis nõ cõuenit niſi in ſoluta cõtinuitate q̃ ẽ vlcus. Cõſolidatio vero cõuenit in qualibet que nõ põt a natura curari: iõ ſcdam expreſſit intẽtionẽ ⁊ cõiorem.

Et ſcito q̄ ĩtẽtio ĩ medicãdo vlcera ẽ exiccatio: qõ ergo ex eis mũdũ fuerit tm̃ exiccet̃: ⁊ ĩ illud qõ ex eis putridũ fuerit medicĩe acute corroſiue mittant̃ ſicut calcãtũ ⁊ alzegi ⁊ arſenicũ ⁊ calx: que ſi nõ cõtulerit neceſſari⁹ eſt ignis. Et medicĩa q̃ ẽ ꝯpoſita ex flore eris ⁊ cera ⁊ oleo qm̃ ipſa flore eris mũdificat ⁊ ꝓhibet morſiõis ſupfluitatẽ oleo ⁊ cera: ipſa ergo ĩ hac re medicia exiſtit tpata.

¶ Supra poſuit curã ſolute cõtinuitatis facte ĩ mẽbris mollib⁹ expediẽdo q̃dã pricipia: nũc exeq̄t̃ ponẽdo curã vlceꝝ ſeu 3m expediẽdo pricipiũ: dicẽs te ſcituꝝ exiccatiõʒ eẽ ĩtentionẽ q̃ medicant̃ vlcera: vñ vlcus mũdũ dʒ exiccari. In vlcere aũt putrido ponãt̃ medicine corroſiue acute ſicut calcãtũ qõ ẽ ſpẽs vitrioli aut cholcotar qõ ẽ attramẽtũ rubeũ ſeu vitriolũ: ⁊ alzegi qõ ẽt ẽ aliud attramẽtũ ⁊ arſenicũ ⁊ calx quib⁹ nõ cõferẽtib⁹ ſupple pp magnã putrefactionẽ neceſſari⁹ eſt ignis ⁊ medicia ꝯpoſita ex flore eris cera ⁊ oleo. Nã p florẽ eris mũdificat vulnus ⁊ ꝓhibet: p cerã ⁊ oleũ ſupfluitatẽ talis corroſiõis: talis ergo medicia ẽ equata ⁊ ꝓportiõata tali morbo. ¶ Ulteri⁹ nota q̄ vlc⁹ prĩo põt ſumi cõiter: ⁊ ſic vuln⁹ ⁊ vlcus cõuertunt̃. 2º ſumit̃ ꝓ ſolõne cõtinui cũ qua ẽ ſanies vt pʒ 2ª primi. c. de ſoluta cõtinuitate. Ad ꝓpoſituʒ hic ſumit̃ vlcus mõ prĩo. nã vlc⁹ mundũ ſiue ſolõnẽ ꝯtinui mundã vocat vlc⁹. ¶ 2º nota vt colligit̃ 3º de ĩgenio ſanitatis: q̄ ĩ mẽbro ſoluto ſaltẽ notabilr̃ duplex vltra debitũ ſupfluitas multiplicat̃ q̃dã ſubtilis egẽs exiccatiõe ⁊ aliq̃ groſſa egẽs abſterſiõe: ⁊ hoc ẽ pp ptẽ factã eẽ debiliorẽ p ſolõnẽ nõ potẽtẽ reſoluẽ has ſupfluitates. Intẽtio ergo ĩ medicãdo oẽ vlc⁹ eſt exiccatio ſaltẽ illaꝝ ſupfluitatũ q̃ mltiplicant̃ pp cãm aſſignatã. De abſterſiõe tñ Aui. nõ fecit mẽtiõeʒ dãs ipaʒ ĩtelligẽ p exiccatõeʒ vel explicauit exiccatiõeʒ vt cõiorẽ. Ipa eniʒ ꝯpetit ĩ quolibet vlcẽ ſupplẽs aliqñ opatiõʒ abſterſiue medicine: q꞉ exiccãs ⁊ ꝯſumẽs groſſaʒ mãʒ. ¶ Ulteri⁹ nota q̄ illud vlc⁹ vocat̃ mũdũ cui nõ ẽ cõiũcta ſanies aut putredo dato q̄ illa duplex ſupfluitas coniũgat̃ cui ſola ꝯuenit exiccatio. Illud qõ ponit̃ d̃ vlcẽ putrido ẽ notũ: q꞉ vbi ſit vehemẽs putrefactio he acute ⁊ corroſiue ꝯueniũt medicĩe.

Et dicem⁹ q̄ oĩa vlcera aut ſũt ſimplicia aut ꝯpoſita. Et ſimplicia quidẽ cũ fuerit parua ⁊ nil ex eoꝝ humiditate corrodet̃: tũc ꝯiũgẽda erũt ipſoꝝ labia ⁊ liganda cuſtodiẽdo ne inter ipſa aliquid olei aut pulueris cadat qm̃ conſolidabunt̃. Et ſimilr̃ magnũ de cuius ſubſtãtia nil perditũ fuerit ⁊ cuius vna pars alij applicari poteſt. Magni vero cuius partes applicari nõ poſſunt ſiue ſit fixura ſiue ꝯcauitas vel ſpaciũ plena ſaniei: ⁊ iã aliquid ex ſubſtãtia mẽbri pditũ ẽ: curatio ẽ exiccatio. Si ergo illud qõ pditũ ẽ tãtũ fuerit cutis ⁊ neceſſe erit vt cicatriceʒ ĩducat: ⁊ hoc quidẽ per eſſentiã cũ ſtipticis ⁊ per accidẽs quidẽ cũ calidis cuʒ ex eis paꝝ qõ ſit aduſtũ ſuperponet̃ ſicut alzegi ⁊ calcãtuʒ quoniã magis iuuãt in exiccãdo ⁊ magis perducũt cruſtã. nã ſi multuʒ fuerit corrodet ⁊ in vlcerib⁹ augmẽtuʒ faciet. Si auteʒ illud qõ perditũ fuit fuerint caro ſicut eſt ĩ vlcerib⁹ profundis nõ erit feſtinãduʒ in cicatrizãdo ea: ĩmo primo erit ſtudenduʒ vt caro in eis naſcat̃. Et caro quidẽ nõ generat̃ niſi ex eo cuius ſiccitas nõ multũ graduʒ primuʒ trãſcendit.

¶ Nũc exeq̄t̃ magis ĩ ſpãli ponẽdo curã ſolute cõtinuitatis

UVA. BHSC. IyR_006_1

tatis mẽbꝛoꝝ molliũ. Et cõtinet hec ꝑs quattuoꝛ ꝑtes. pᵒ
determiat de ſoluta ꝯtinuitate pauci numeri manifeſta.
2ᵒ determiat de cõtuſiõe ſeu attritiõe. 3ᵒ de excoꝛiatiõe.
4ᵒ vero de pũctura. ibi 2ª: ꝛ ſi pus. ibi 3ª: ꝛ ſi alfaſe. ibi 4ª:
ꝛ alfaſe. Pꝛia i duas. Nã pꝛio poſita diſtinctõe vlceꝝ po
nit curã ſimpliciũ. 2ᵒ ꝯpoſitoꝝ. ibi 2ª: ꝛ ſcito. Pꝛia i du/
as. Nã pᵒ Aui. pmittit curã. 2ᵒ ponit aliquas ꝯditiões ꝛ
cañ. attẽdẽdos. ibi 2ª: verũtñ. ¶ Pꝛio dicit ſe dictuꝝ qꝫ
vlcera aut ſunt ſimplicia: aut ſũt ꝯpoſita. Simplicia vero
ſũt vlcera ꝑua quoꝝ hũiditas nõ ẽ coꝛrupta: ꝛ curanꝭ cõ/
iungẽdo labia ꝛ ligãdo ꝛ ꝓhibẽdo ne iter labia cadat ali/
quid vt oleũ aut puluis. nã iſta ꝓhiberẽt ꝯſolidatiõȝ. Ma
gna aũt ꝛ ſine deꝑditiõe ſubſtãtie carnis cũ qua ꝑtes ad/
inuicẽ pñt applicari curanꝭ ſupple vt dictũ ẽ. Sȝ vbi eius
ꝑtes nõ pñt adinuicẽ cõplicari ſiue ſit fixura ſiue ꝯcauitas
plena ſanie cura ẽ ꝑ exiccãtia. Deꝑdita ergo cute neceſſe ẽ
facere cicatricẽ quã ꝑ ſe efficit ſtipticũ: ꝑ accidẽs vero ca/
lidũ: ſicut alȝegi ꝛ calcãtũ aliq̃lr vſtũ. Nã hec iuuãt exic/
cãdo ꝛ faciẽdo cruſtã. Et ſi eẽnt i quãtitate multa augerẽt
vlcꝰ coꝛrodẽdo. ¶ Ulteriꝰ dicit qꝫ nõ ẽ feſtinãdũ i cicatri
ȝando ꝓfunda vlcera: imo pꝛio ſtudẽdũ vt naſcaꝭ caro q̃
nõ generaꝭ niſi ex modicũ exiccãtibꝰ nõ trãſcẽdẽtibꝰ gra/
dũ pꝛimũ. ¶ Pꝛo ꝑte pñti memoꝛãdũ pᵒ ſumi vlcꝰ i pꝛi/
cipio ꝑtis: vt ꝑhabitũ ẽ i ꝑte ꝑhabita. ¶ Scᵒdo nota qꝫ ali
qua ſolᵒ ꝯtinuitatis põt dici ſimplex aut cõpoſita multis
modis. Pꝛio põt dici ſimplex qꝛ i iꝑa ſolũ vna habeꝭ itẽ/
tio curatiua que ẽ vnio: vt habeꝭ i ſolᵒne cõtinuitatis mũ
da cũ qua nõ ẽ deꝑditio ꝑtis: ꝛ i qua nõ ẽ alia intẽtio cu/
ratiua. 2ᵒ aliq̃ ſolᵒ dicitꝭ ſimplex: qꝛ nõ eſt cõiuncta alteri
moꝛbo ꝛc̃. E cõtra illa vocaꝭ ꝯpoſita q̃ cõiungiꝭ alteri moꝛ
bo: ſicut ſi in ꝑte ſoluta eẽt mala cõplo ipediẽs vnionẽ. Ad
ꝓpoſitũ ſolᵒ ꝯtinuitatis ſimplex ſumiꝭ mõ 2ᵒ cũ ſolᵒnẽ cõ
tinuitatis cũ deꝑditiõe ꝑtis ſimplicẽ eẽ velit. ¶ Ulterius
nota qꝫ ex ꝑte cõcipiꝭ quotuplexˢ ſit hũda intẽtio i cura ſo/
lutiõis cõtinuitatis ſimplicis. pª ẽ cõiungẽ labia diſtãtia
q̃ ꝯpꝛehẽdiꝭ ꝑ illã ꝑtẽ cõiungẽda eẽnt. 2ª ẽ tenere ea firma
i cõiunctiõe qᵒ fit ꝑ ligationẽ q̃ tãgiꝭ i illa ꝑte ligãda. 3ª ẽ
ꝓuidere ne aliquid cadat i medio vulneris quã tãgit ibi cu
ſtodia. 4ᵒ ẽ cõſeruare ꝑtẽ ſanã quã nõ poſuit Aui. ſȝ de/
dit itelligere. ¶ Ulteriꝰ nota qꝫ inter labia vulneris nihil
coꝛpulentũ dȝ cadere diſpoſitũ putrefactõi: aut ſua coꝛpu
lentia ipediẽs vnionẽ: ſicut ẽ oleũ aut puluis: tñ pulueres
ꝯſolidãtes pñt cadere. Sȝ ꝭȝ expoſitoꝛes nõ dȝ poni i fun
do ſȝ i ſupficie labioꝝ: iõ ꝓuidẽduȝ ẽ ne aliquid cadat. ſ. in
fundo. ¶ Ulteriꝰ nota qꝫ deꝑdita ꝑte ꝓpter cãȝ aſſigna/
tã neceſſe ẽ exiccare: deide gñãre carnẽ ꝛ ꝯſolidare: dein/
de cauteriȝate: hoc ẽ notũ. Nota tñ qꝫ ſtiptica de ꝑ ſe cica
triȝãt: ſȝ qꝛ calida nõ faciũt hoc niſi exiccãdo ꝛ adurẽdo:
iõ opaꝭ ꝑ accidẽs: qꝛ mediãte alio vt exiccãte ꝛ adurente.

Scias ꝓ tãto me dicinã carnis generatiuã debere eẽ i pꝛio gradu nõ nimis exiccatiuaȝ ne exiccaret humiditatẽ ſupfluaȝ ꝛ ſanguinem ex quo dȝ generari caro: ſed ꝯſolidatiua debet eẽ plus ſicca: qꝛ cũ ꝯſolidamus nõ generamus carnẽ: quare nõ timemus de exiccatõe multi ſanguinis. Cicatriȝatiua aũt dȝ eẽ plus ſicca vt hẽat indurare ꝛ generare carneȝ calloſaȝ vt cicatrix: quare ꝛc̃. hec Gẽtilis ꝯ mẽte Gal. tertio de igenio ꝛc̃.

Unde Gal. tertio de ingenio: ſola qdẽ eſſe vulnera dico cũ nullus moꝛbꝰ nec accidens vel cauſa cuȝ eis eſt.

¶ Ulteriꝰ nota qꝫ gñatio carnis fit a leuiter exiccãtibꝰ i/
telligẽdo ꝑ gñationẽ carnis vnã diſpõeȝ i ſanguie ꝛ humi
ditatibꝰ qua mediãte virtꝰ hũiditates mutat i carnẽ. Nã
diſpõ vt generaꝭ caro mediata exñs põt eẽ ex mltis ſiccã/
tibꝰ. Exẽpli cã vulnere exñte multũ humido foꝛtis ꝯpetit
exiccatio. Limitauit aũt gradũ huiꝰ exiccatiõis ad gradũ
pꝛimũ reſpectu ꝯplᵒnis nãlis ſolute ꝑtis: non aũt reſpectu
coꝛꝑis tẽꝑati foꝛet humidũ reſpectu ſiccoꝛũ gradu pꝛimo.
De iſto tamen fiet queſtio ſpecialis.

Uerũtamen hic conditiões attẽdunꝭ de quibus cu/
ra eſt habẽda. E ex eis eſt ꝯſideratio diſpõnis comple/
xionis mẽbꝛi pꝛincipalis ꝛ cõplexionis vlceris: quoniaȝ
ſi mẽbꝛuȝ in ſui ꝯplexione fuerit multe humiditatis ꝛ vl
cus nõ fuerit multe humiditatis ſufficiet ſiccitas pauca i
pꝛimo gradu: quoniã egritudo non multuȝ fuit elõga/
ta a natura mẽbꝛi: ſed ſi membꝛuȝ fuerit ſiccum ꝛ vlcus
humiditatis multe: erit neceſſariũ illud qᵒ exiccet in ſe/
cundo gradu ꝛ tertio vt reducat ipſuȝ ad ſuam natura/
lem complexioneȝ: ꝛ in tẽperatis quidem diſpoſitio erit
equanda.

Diſpõ ꝯplexiõis nãlis mẽbꝛi ſoluti attẽditur penes intẽſionem vel remiſſioneȝ gradualeȝ humiditatis ꝛ ſiccitatis.

¶ Nũc ponit quaſdã cõditiões ſeu cañ. attẽdendos i cu
ra. Et diuidiꝭ i tres. Pꝛio ponit cañ. attẽdendũ rõne cõ/
plexionis nãlis aut accidẽtalis mẽbꝛi ſoluti. 2ᵒ rõe ꝯplᵒo/
nis totius. 3ᵒ ponit cañ. diuerſitatis medicinaꝝ exiccãtiũ
rõne effectuũ ꝓducẽdoꝝ. ibi 2ª: ꝛ ex eis. ibi 3ª: ꝛ ex eis eſt
cõſideratio virtutis. ¶ Pꝛio dicit qꝫ i tali cura aliq̃ ꝯdi/
tiones attẽdanꝭ: circa quas aduertere debes. pª ẽ cõſide/
rare ꝯplᵒnẽ mẽbꝛi nãlẽ ꝛ pꝛĩcipalẽ. Nã ſi mẽbꝛũ nãliter eſt
humidũ ꝛ vlcꝰ ẽ modice hũidũ: ſufficiet ꝑua exiccatio vt i
gradu pꝛĩo. Cãm tãgit Aui. qꝛ egritudo ẽ modicũ elõgata
a nã mẽbꝛi. ¶ 2ª cõditio quã ponit ẽ: qꝫ ſi mẽbꝛũ ſupple na
turalr fuerit ſiccũ: ꝛ hũiditatis multe ſit vlcus: neceſſe eſt
applicare deſiccans i gradu 2ᵒ aut 3ᵒ: vt ad pꝛiſtinã cõple/
xionẽ deducaꝭ. ¶ 3ª cõditio qꝫ in tẽꝑatis. ſ. coꝛꝑibꝰ: hoc
ẽ qꝫ i hñtibꝰ mẽbꝛa tẽꝑata: quoꝝ. ſ. vlcera ſint tẽꝑate hu/
miditatis: qꝛ medie inter multã humiditatẽ vlceris mẽbꝛi
ſicci ꝛ paucã vlceris mẽbꝛi humidi fiẽda ẽ equatio ex par/
te ſiccoꝛuȝ: qꝛ non ꝯueniunt ita ſicca ſicut in vlcere pauce
humiditatis mẽbꝛi humidi. ¶ Pꝛo parte nota pꝛimo qꝫ
mẽbꝛo exñte hũido reſpectu tẽꝑati quãuis ꝑ reducẽdo
iꝑm ad ſuã naturã cõpetat debilis medicina in exiccãdo.
Pꝛo reducẽdo tamẽ ipſuȝ ad tẽperamẽtuȝ foꝛtis cõpete/
ret exiccatio: ſed Aui. intelligit de pꝛima reductõe. ¶ Se/
cũdo nota qꝫ notãter eſt dictũ pauce humiditatis: qꝛ poſſi
bile eſt vlcus mẽbꝛi humidi eſſe tãte humiditatis: vt etiaȝ
ampliori egeat exiccatiõe vlcere mẽbꝛi ſicci. Si tamen ad
equaleȝ hũiditateȝ perueniãt mẽbꝛuȝ ſiccuȝ ꝛ membꝛum
humidũ cuȝ ſit maioꝛ elõgatio a ꝯplexione nãli mẽbꝛi ſicci
q̃ȝ humidi: ideo vt membꝛuȝ ſiccũ reducatur ad ſui natu/
raȝ foꝛtioꝛi eget exiccatiõe.

Et ex eis ẽ conſideratio cõplexionis totiꝰ coꝛpoꝛis.
nam cuȝ coꝛpus fuerit multe ſiccitatis ꝛ membꝛum aug/
mẽtatuȝ in humiditate fuerit tẽperatuȝ ꝭm coꝛpꝰ equa/
le ex tẽperamento erit exiccãduȝ: ꝛ ſimiliter ſi coꝛpꝰ fue/
rit in humiditate augmẽtatuȝ ꝛ mẽbꝛuȝ in ſiccitate. Et
ſi ambo ad augmẽtuȝ deueniunt: tunc ſi egreſſus fuerit
ad humiditateȝ amplioꝛi exiccablꝭ ſiccitate: ꝛ ſi fuerit ad
ſiccitatẽ minoꝛi exiccabiꝭ ſiccitate. Et ex eis eſt ꝯſidera/
tio virtutis ſiccãtiuȝ: quoniã licet ex ſiccãtibꝰ carneȝ na/
ſci facientibus exiccatio foꝛtis non queraꝭ: ſed exiccatio
que ſit talis qualis ẽ illa que ꝓhibet materiã que deſcẽ/
dit ad mẽbꝛuȝ qᵒ ſit aptum ad hoc vt carnis generatio
ſit ex ea multũ: tamẽ ea queriꝭ in ſiccitatibꝰ que nõ ſunt
ad hoc vt caro per ipſam generaꝭ ſed vt cicatriȝatio fiat
per ea. ex eis eniȝ queriꝭ vt ſint plus abſtergẽtia ꝛ ma/
gis lauãtia pluſq̃ȝ ſiccãtia ex quibus non queriꝭ niſi cica
triȝatio ꝛ ꝯſolidatio ꝛ continuatio. Et omẽs quidẽ me
dicie que ſine moꝛdicatõe deſiccãt ſunt igrediẽtes in ge/
nus earuȝ que carnẽ naſci faciũt. Omne preterea vlcus
qᵒ in loco exiſtit non carnoſo eſt iobediẽs ad hoc vt ci/
to mediceꝭ ꝛ ſimilr rotũdum. Medicis aũt ſiccãtibus ꝛ
ſtipticis que in vlceribꝰ occultis adhibenꝭ ſunt medicine
mũdificãtes ſicut mel: ꝛ medicine loco ꝓpꝛie ſicut diureti
ca medicis vlcera iſtrumẽtoꝝ vrine curantibꝰ. Cũq̃ȝ ci/
catriȝare voluerimꝰ ponemus medicinas cuȝ ſtipticitate
ſua viſcoſas ſicut terra ſigillata.

¶ Nũc ponit ſcᵒdaȝ ꝯditioneȝ: dicens qꝫ in iſtis ꝯditio/
nibꝰ eſt ꝯſideratio ꝯplexionis totius. Coꝛpoꝛe nãq̃ȝ exiſtẽ/
te multũ ſicco ꝛ mẽbꝛo aucto ꝛ parato in humiditate: tunc
erit ex tẽperato applicãduȝ equale. ¶ Scᵒdo dicit qꝫ eodẽ
modo fienduȝ eſt ſi coꝛpus fuerit auctuȝ in ſiccitate ꝛ mẽ/
bꝛuȝ in humiditate. ¶ 3ᵒ dicit qꝫ ſi ambo labanꝭ ad eun/
deȝ lapſuȝ ſcȝ ad humiditatẽ foꝛtioꝛi egẽt exiccatõe. ¶ Se
cundo pꝛĩcipaliter Aui. ponit cañ. ex parte diuerſitatis me
dicinarũ: dicens qꝫ etiã eſt conſiderãda virtus medicina/
rum exiccantiuȝ. Nam nõ foꝛtis exiccatio queriꝭ per me/
dicinas generãtes carneȝ: ſed talis que pꝛohibeat deſcen/
dere materiã ad mẽbꝛuȝ pꝛohibenteȝ generare carnẽ. In
cicatriȝãdo vero maioꝛ requiriꝭ exiccatio: vnde ſufficit ꝓ
generatione carnis abſtergẽtia ꝛ lauantia applicare plus
q̃ȝ ſiccantia. Naȝ ex foꝛtiter ſiccãtibus non queritur niſi
cicatriȝatio cõſolidatio ꝛ cõtinuatio: ꝛ certe omnes medi/
cine exiccãtes ſine moꝛdificatiõe ſunt de genere faciẽtium
naſci carnẽ. ¶ Penultimo dicit qꝫ omne vlcus qᵒ nõ eſt
in parte carnoſa iobediẽs eſt cite medicatõi: ꝛ ſimilr rotũ/
duȝ eſt inobediẽs. ¶ Ultĩo dicit qꝫ medicis exiccãtibus
ꝛ ſtipticis applicãdis occultis vlceribꝰ miſceanꝭ mũdificã
tes medicine vt mel. Itẽ miſceãꝭ medicie appꝛopꝛiate mẽ/
bꝛis vlceratis: vt diuretica vlceribꝰ vꝛine: cum nõ volu/
mus cicatriȝare ſumemꝰ medicĩas ſtipticas ꝛ viſcoſas: vt
eſt terra ſigil. ¶ Pꝛo itellectu partis nota qꝫ coꝛpoꝛe ſic/
co exiſtẽte reſpectu coꝛpoꝛis tẽperati: mẽbꝛo aũt vlcerato
exienſtte humido eſt cõſiderandum ex ſiccitate coꝛpoꝛis in
mẽbꝛo humiditatis fieri remiſſionẽ: ideo cõſiderãdum eſt
equale eſſe applicandũ ex mẽbꝛo. i. ꝓpter membꝛũ tẽpera
tuȝ eſſe ꝭm coꝛpus: qꝛ pꝛopter coꝛpus facta eſt: aut ſit con/
temperãtia mẽbꝛi: ideo equalis ſeu remiſſa medicĩa com/
petit in ſiccitate. ¶ Conſimilr etiã cogitãdum ſi membꝛũ
fuerit ſiccum ꝛ coꝛpus humidũ: qꝛ ꝓpter cõplexionẽ coꝛ/
poꝛis contẽperantem cõplexioneȝ membꝛi medicina tem/
perate ſicca cõueniret. ¶ Nota vlterius qꝫ coꝛpoꝛe ꝛ mẽ/
bꝛo lapſo ad humiditatẽ ſi ſupple membꝛũ debeat dedu/
ci ad tẽꝑamẽtuȝ: aut ſi lapſus ſit pꝛeter naturã: cũ ex hoc
in membꝛo nimia cõſequaꝭ humiditas foꝛtia cõpetũt exic
cantia. Sed membꝛo exiſtẽte naturaliter humido eius vl/
ceri ſi ad pꝛiſtinã debeat duci naturam debilis conuenit
exiccatio cum lapſus paruus denoteꝭ. Iteȝ ſi lapſus mẽ/
bꝛi ꝛ coꝛpoꝛis fuerit ad ſiccuȝ cũ pꝛobabiliter ſit modicus
lapſus ad humiditatẽ pauca egebit exiccatione. Si tamẽ
coꝛpoꝛi ꝛ membꝛo ſiccis naturaliter exiſtẽtibus equalis la
pſus in humiditate fuerit ſicut in humidis ꝛ tẽperatis foꝛ/

Põt aũt mẽbꝛuȝ vlceratũ auctũ eſſe in ſiccitate vel ex nã vel ex ſicco humoꝛe ibibito in ipſuȝ vel ex medicaĩe ſuperflue ſicco ſibi adhibito.

tioꝛa cōpetunt exiccantia. ¶ Ulterius nota ꝙ generātia carnem modice debent eſſe exiccatiōis. Pꝛīo quia nō ita ſicca vt moꝛdeāt ⁊ nutrimentū conſumāt tranſmutāduʒ ī carneʒ. Debēt tamē tante ſiccitatis exiſtere vt conſumant ſuperfluenteʒ materiā que deſcendit ad vulnus. ¶ Ulterius nota ꝙ vulnus in membꝛo nō carnoſo quia ī mēbꝛo ſpermatico factū eſt difficilis cōſolidationis. Pꝛīo ꝓpter debilitatē virtutis ⁊ caloꝛis naturalis membꝛi in reſtaurādo deperditū: aut debite vniēdo. Itē membꝛi durities īpedit debitā vnionē. Rotundū auteʒ vulnus difficulter ſanaṫ ꝓpter figurā rotundam eſſe capaciſſimā ꝓpter ipſam nō eſſe angulataʒ ⁊ partes partibus nō debite poſſint applicari. ¶ Ulterius nota ꝙ notabiliter in vlcerib⁹ occultis admiſcende ſunt ſtipticis medicinis medicine mundificantes. Naʒ cū ſint occulta ⁊ per manualē operatiōeʒ non debite poſſint expurgari mundificātia admiſcēda ſūt ſeu etiam abſtergentia. ¶ Nota vlterius ꝙ cū membꝛis occultis medicine nō īmediate poſſint applicari: notabilr aliqua digerētia medicinā ad mēbꝛa appꝛopꝛiata ſunt applicanda ſicut diuretica in pꝛouocatiōe vꝛine: ⁊ ſic de alijs cōſimiliter operāduʒ. ¶ Ultimo nota ꝙ notanter ſtipticum qd̄ applicaṫ ꝓ cicatrizatiōe dʒ eſſe viſcoſum vt carnem generet loco cutis durā calloſaʒ ⁊ viſcoſam.

Et ſcito ꝙ quedā ſunt vlceris ſanitateʒ pꝛohibētia ex quibus eſt malicia cōplexionis mēbꝛi quare ſtudere debes vt ipſuʒ rectifices: ⁊ malitia cōplexionis ſanguinis qui ad ipſuʒ aduenit quare ſuccurrere debes cuʒ generatiōe boni chimi: ⁊ multitudo ſanguis qui ad ipſum fluit ⁊ humectat ipſuʒ cui ſuccurrere debes cuʒ euacuatione ⁊ ſubtiliatōe cibi ⁊ faciēdo vt exercitetur ſi poſſibile fuerit ⁊ oſſis coꝛꝛuptio qd̄ eſt ſub eo ⁊ qd̄ ei trāſmittit ſanieʒ. Et huiuſmodi quidē curatio nō eſt niſi oſſis illius melioꝛatio ⁊ ipſius fricatio: ſi fricatio totaʒ ipſius coꝛꝛuptionē remouere poterit ⁊ accipere ipſuʒ ⁊ incidere. Multotiēs pꝛeterea eſt neceſſariū medicanti vlcera vt ſecuʒ deferat emplaſtra attractiua vt eis fruſta oſſiuʒ ⁊ res extranee carni infixe euellātur ⁊ ſi nō pꝛohibebūt vlcus melioꝛari. Ulcera quoqʒ nutrimēto indigēt pꝛopterea vt cōfoꝛtatio fiat ⁊ minoꝛatione nutrimēti pꝛopterea vt ſaniei materia reſtringaṫ. Et inter hec duo cōtraria exiſtit diuerſitas: quoniā ſanies debilitat quare cōfoꝛtare neceſſe eſt: ⁊ multiplicaṫ quare neceſſe eſt nutrimētuʒ pꝛohibere. Medicus ergo de hoc ſollicit⁹ eſſe debet. Cūqʒ vlcus in pꝛīcipio fuerit nō debet eger balneuʒ ingredi neqʒ ipſuʒ aqua tāgere calida quoniā attrahet ad ipſum qd̄ in apoſtemate augmētuʒ faciet: ſed cū vlcus quieuerit ⁊ ſanieʒ fecerit foꝛtaſſe tūc facile fiet ei. Omne pꝛeterea vlcus qd̄ cito reuertiṫ poſtquā carne repletuʒ eſt ⁊ cōſolidari debet eſt ī ſemita perueniēdi ad fiſtulaʒ: debes ergo ſemper intueri coloꝛē ſaniei ⁊ coloꝛem labioꝛuʒ vlceris.

¶ Nunc ponit curam vulnerū cōpoſitoꝛū ad ſenſuʒ datum ſumendo compōnem. Et poteſt diuidi in tot partes quot ponit cañ. Pꝛimo vbi nocumento docet ſuccurrere ⁊ cauere aliqua impedientia curaʒ vlcerum. 2° docet alteri ſuccurrere nocumento. 3° oſtendit ꝓpter quid medicus in medicādo debet eſſe ſollicitus: oſtendēs etiā quid ī pꝛincipio vlcerum eſt vitanduʒ. 4° ⁊ vltimo ponit ſigna quedaʒ fiſtulationis. ibi 2ª: multotiens pꝛopterea. ibi 3ª: vlcera quoqʒ. ibi 4ª: omne pꝛopterea vlcus. ¶ De pꝛima dicit ꝙ tu debes ſcire quedam pꝛohibere curā vlceris ſicut eſt mala cōplexio membꝛi quare ſtude in rectificādo ipſam. Secūda cauſa curaʒ pꝛohibēs eſt malitia ſanguinis decurrētis ad vulnus: quare ſtude etiā bonū generare ſanguineʒ. Tertia cauſa eſt nimia quātitas ſanguinis humectantis nimiū vulnus cui debes ſuccurrere ſubtiliādo cibuʒ ⁊ faciēdo ipſum exercitari ſi fuerit poſſibile. Quarta cauſa eſt coꝛꝛuptio oſſis ſub carne exiſtētis ⁊ tranſmittētis ſanguinē mēbꝛo: cuius cura eſt melioꝛare os fricādo ⁊ coꝛruptioneʒ remouēdo ⁊ incidēdo ipſum. ¶ Secūdo dicit ꝙ multotiēs eſt neceſſariū curanti vlcera vt ſecum poꝛtet emplaſtra extractiua reruʒ extranearū ⁊ infixarū: vt ſunt fruſta oſſiuʒ ⁊ ſpine ⁊ ſimilia: quibus nō amotis pꝛohibebūt vulnus melioꝛari. ¶ Tertio dicit ꝙ vulnera egēt nutrimento vt cōfoꝛtetur mēbꝛuʒ: ⁊ egent minoꝛatōe nutrimenti vt ſanies minuaṫ: inter que duo cōtraria exiſtit diuerſitas. Naʒ ſanies debilitat membꝛū: ideo neceſſe ē ipſum cōfoꝛtare ⁊ ſupple copioſe exhibere nutrimētum quo ſupple virtus cōfoꝛtetur ⁊ ſanies ex copioſo nutrimento multiplicetṫ: ideo neceſſe eſt paucificare ſeu pꝛohibere nutrimentuʒ: de quo ergo perplexo ſollicitus debet eſſe medicus. ¶ Ulterius dicit ꝙ vlcere exiſtēte in pꝛincipio nō debet infirmus ingredi balneū nec ipſum tāgere aqua calida: q2 augebiṫ apoſtema: ſʒ quietato vlcere ⁊ nō ampli⁹ fluēte mā duʒ ſaniē fecerit foꝛtaſſis conferret. ¶ Ultimo dicit ꝙ oē vlcus qd̄ cito reuertiṫ poſtq̄ʒ eſt repletū carne poſtq̄ʒ etiaʒ eſt ꝯſolidatū eſt ī via vt fiat fiſtula: opoꝛtet ergo te intueri coloꝛeʒ ſaniei ſi ſupple eſt alba ⁊ coloꝛeʒ labioꝛum vlcerum: ⁊ ſi pus multiplicatur ſine multiplicatione nutrimenti eſt ibi alfaſe. ¶ Pꝛo parte nota ꝙ coꝛuʒ que cōiunguntur vulneri ſine quoꝛuʒ curatiōe vulnus curari nō poteſt: quedā curari poſſunt vnuʒ applicando medicamentum: quedā auteʒ diuerſoꝛū medicaminū applicationem requirunt. Exempluʒ pꝛimi eſt ſicut mala complexio frigida mēbꝛi vlcerati que curari poteſt per medicinā calefacientē ⁊ exiccantē. Exemplū ſecūdi eſt ſicut coꝛꝛuptio oſſis. Ad pꝛopoſituʒ hoc 2m Aui. tetigit in parte. ¶ Scd̄o nota ꝙ cū virtus opereṫ mediante complexiōe vt inſtrumento notanter mala membꝛi cōplexio coꝛꝛigi debet: vt īconueniēs inſtrumentū ad operandū. Similiter ſi ad vulneratam partē malus aliunde perueniat ſanguis: ipſe coꝛrigendus eſt vt impeditiuus operatiōis nature. Sanguīe etiam exiſtente āpliori paucificandus eſt cibus ⁊ exercitiū exhibenduʒ quo fit ſuperfluitatū reſolutio. Uel ſalteʒ fricatio eſt adhibenda caliduʒ naturale foꝛtificās: iuuās etiā ad reſolutionē ſuperfluitatū. ¶ Ulterius nota ꝙ merito emplaſtra attractiua ſunt deferenda vt ſpina aut oſſe infixo carni fiat attractio eoꝛum qualia partim tanguṅṫ 5° de ſimplici medicina. ¶ Ulterius nota ꝙ ſanies vt quid pꝛeter naturā habet debilitare virtutem ſua mala cōplexiōe: ſua etiaʒ caliditate membꝛi humidū cōſumendo. Iteʒ ad euacuationē ſaniei ꝯſequitur iuuatiui eductio: ideo ꝑ eius eductionē conſequitur debilitas. Cuʒ igitur virtus foueatur cibo ⁊ potu ⁊ requie: ideo eſt adhibendum nutrimētū: quia vero ſanies ē multa: nutrimentū eſſet paucificandū: ⁊ hoc ne graueṫ natura in digerendo ipſuʒ: ne etiaʒ nutrimento in maioꝛi quātitate decurſo amplioꝛ fiat ſanies. In quibus contrarijs indicationib⁹ debet eſſe ſollicitus medicus ⁊ attendere ad pꝛepotentē non ſpernēdo aliā: vt colligitur 8° terapētice ad finem. Si eniʒ videat virtuteʒ deficere ⁊ ſanieʒ eſſe multaʒ plus attendat virtuti adhibendo nutrimētum. Et ſi econtra videat ſanie exiſtēte multa conſtare virtutē parum exhibeat nutrimēti. Equis vero exiſtētibus indicatiōibus mediuʒ inter vtrūqʒ teneat. nā nec nimis multiplicet nec paucificet nutrimētum: ſed potius ipſum mediet. ¶ Ulterius nota ꝙ balneū aque calide dulcis in pꝛīcipio non cōuenit ſua caliditate attrahēdo humoꝛes: ⁊ ſic augēdo apoſtema: ſua etiaʒ caliditate rarificando poꝛos ⁊ vias per quas materie tranſire poſſint ad locū vlceratuʒ. ſed exiſtente quieta materia: quia materia nō amplius exiſtēte in fluxu facta etiā ſanie ſi fuerit expediens balneuʒ ꝓpter aliam cauſā: tunc facile fiat iuuans balneū: hunc tamen ſeruādo moduʒ vt locus vlceris pānno cooperiaṫ ne humectetur per aquaʒ. nam humectatio opponiṫ vlceri cum intentio in ea ſit exiccare: vel foꝛte cōuenit balneuʒ quādo vlcus eſt in via ſaniatiōis. nam tale calidum iuuat ad maturandū ⁊ ſanianduʒ. Si tamē ꝑ balneum intelligatis balneū aque actualiter calide ſtiptice: tamen reſolutiue ⁊ exiccatiue: tunc in vlcere pōt tale balneū cōpetere. In pꝛomptu eſt cauſa. ¶ Ulterius nota ꝙ fiſtula nō eſt aliud q̄ʒ vlcus cauernoſum in quo eſt putrefactio ⁊ coꝛꝛuptio: ſicut enim in fiſtula eſt pars ſtricta que poniṫ oꝛi: ⁊ alia pars eſt pars valde lata: ita etiaʒ in tali vlcere ē interius cauerna oꝛificio manifeſto paruo exiſtēte. ¶ Ulterius nota ꝙ ex parte cōpꝛehēduntur ſigna fiſtule. Nam pꝛimo poſtquā vlcus eſt repletū carne ⁊ cōſolidatuʒ ⁊ iterato reuertiṫ ſignuʒ eſt putrefactionē ⁊ coꝛꝛuptionē interius latitare. 2m ſignū ſumitur a caloꝛe ſaniei ſi ſanies fuerit alba ⁊ debiti caloꝛis ⁊ bꝛeuiter habuerit debitas cōditiones ſaniei: tūc ē ſignuʒ potētie virtutis ſupꝛa materiā: ⁊ ꝙ mala putrefactio ſeu coꝛꝛuptio nō lateat interius. Si vero coloꝛ fuerit malus: q2 niger aut liuidus cū ex hoc mala cōpꝛehēdaṫ putrefactio malū eſt: ſimilr cū cōpꝛehendiṫ virulētia: que virulētia nō eſt aliud q̄ʒ ſanies inequalis ex parte ſuperfluitatis ſubtilitatis ⁊ groſſitudinis in qua apparet vehemēs putrefactio. Item vlterius conſpiciaṫ ad coloꝛem labioꝛum vlceruʒ ſi labia fuerint rubea ſeu liuida ⁊ nigra: nam ex ruboꝛe compꝛehēdimus bonitateʒ. Ex liuiditate auteʒ ⁊ nigredine cōpꝛehendimus oppoſitū: quia vehementem putrefactioneʒ.

Et ſi pus multiplicabiṫ ſine multiplicatiōe nutrimēti eſt ibi alfaſe. Loquemur ergo nunc de curatiōe alfaſe: ⁊ dicamus quoniā pꝛopterea ꝙ alfaſe eſt cōtinuitatis ſolutio aut infra cutem pꝛofundā: ⁊ manifeſtū eſt ꝙ opoꝛtet vt eius medicamīa ſint foꝛtioꝛa q̄ʒ eius qd̄ diſcoopertuʒ eſt: ⁊ pꝛopterea ꝙ multū ſanguinis ad ipſuʒ fluit eſt neceſſariū illud qd̄ illuʒ reſoluat: verūtamē opʒ vt eius reſolutio ſit cuʒ multa ſiccitate vt nō reſoluat qd̄ ibi ſubtile eſt ⁊ faciat lapideʒ qd̄ ibi ſpiſſuʒ eſt. Cūqʒ ex reſolutione perfecerimus illud qd̄ nobis neceſſe eſt: debemus

apponere

Iuxta illud Gal. ſi calida fuerit caro refrigereṫ non tñ ſuꝑ vlc⁹ q2 vlcerib⁹ frigiduʒ moꝛdax. ſi frigida calefiat quoꝝ vniuſcuiuſqʒ noticia ex caloꝛe perpendiṫ.

Iuxta illud pꝛīcipis ſcd̄a ꝑmi doctrina ſcd̄a ſūma pꝛima c.xix. in balneo pꝛeterea cū multis eius iuuamētis aſſūt nocumēta: facit eīm ſuperfluitates ad membꝛa d̄bilia penetrare

Coloꝛ tñ ſaniei dʒ a medico aduerti: ſanies eniʒ neruoꝝ ē ſubtilis ⁊ tenuis humiditas: vt īquit Auic. quarta quarti tractatu tertio. c. vj.

UVA. BHSC. IyR_006_1

apponere cõſolidatiuũ qḋ ſit deſiccatiuũ ne ſit ſanies in
cõcauitate que exire nõ valeat ⁊ fiat lapis: ⁊ poſtea qua/
libet cauſa putrefiat aut eradicet̃ ⁊ redeat cõtinuitati ſo/
lutio. Cũqȝ aũt alfaſe fuerit ꝓfundioꝛ ſcarificabit̃ locus
vt medicamẽ magis penetret. Jn medicãdo aũt alfaſe
⁊ ꝯtuſionẽ leuẽ foꝛtaſſe ſufficiet flõmia: ꝙ ſi alfaſe fue/
rit ĩ pꝛimis cũ ꝑcuſſiõe medicet̃ pꝛius ꝑcuſſio medicami
nib⁹ ꝑcuſſioni aptis donec ſit poſſibile medicari alfaſe: ⁊
alfaſe quidẽ ſi magna fuerit medicabit̃ cuȝ ſiccãtib⁹: ⁊ ſi
fuerit parua vt pũctura acus dimittat̃ eſſe ei⁹ ipſi nãe ſi
nõ fuerit venenoſa pẽdens: aut fuerit foꝛtis doloꝛis: aut
ſi tetigerit neruũ ⁊ timeat̃ inde aþatis generatio ⁊ pul/
ſatio. Jn ꝯtoꝛſiõe aũt ſufficit mollis ligatura nõ doloꝛo
ſa: ⁊ vt ſuꝑ ipſaȝ ponant̃ medicamia ꝯtoꝛſiõi apta. Jn
his aũt q̃ ſunt ſicut caſus ⁊ ꝑcuſſio neceſſaria eſt flõmia
ex ꝑte diuerſa ⁊ ſubtiliãdũ ẽ nutriẽs ⁊ dimittẽda ẽ caro
⁊ q̃ ſunt ſicut ipſa. Et regẽdus eſt ex apoȝimatib⁹ ⁊ po/
tionib⁹ ſcriptis ad hoc ĩ libꝛis particularib⁹. Sermoneȝ
aũt in ſolutiõib⁹ ꝯtinuitatis factis in neruis ⁊ oſſib⁹ re/
ſeruabim⁹ poſterius ad libꝛos particulares.

¶ Jn p̃cedẽtib⁹ poſuit curã ſolute ꝯtinuitatis pauci nu
meri: nũc ponit curã ſolute ꝯtinuitatis multi numeri q̃ eſt
occulta: ⁊ vocat̃ cõi noĩe cõtuſio ſeu attritio. Et dicit ꝙ ſi
multiplicet̃ ſanies nõ multiplicato nutrimẽto: tũc ẽ alfaſe
ſeu cõtuſio aut attritio cuius nũc ponem⁹ curã: dicẽdo ꝙ
qꝛ alfaſe ẽ ſol'o cõtinuitatis ꝓfunda. i. ĩter cutẽ foꝛtioꝛa ſi/
bi ꝯpetũt medicamia q̃ȝ vulneri diſcooꝑto. Et qꝛ multus
ſanguis fluxit ad ipaȝ alfaſe: iõ ẽ neceſſe apponere reſolu/
tiuum nõ vehemẽter ſiccum ne ſubtile reſoluat̃ ⁊ ſpiſſum
conuertatur in lapidẽ. Et facta per nos reſolutiõe debita
apponatur cõſolidatiuũ deſiccans niſi ſanies ſit in cõca/
uitate exire non potens que per deſiccationeȝ ⁊ reſolutio/
nem ſupple conuertatur in lapidem: aut per aliquam cau/
ſam putrefiat vel eradicet̃. i. extra radicem ponat̃ ⁊ ꝑ mẽ/
bꝛũ diſpergat̃ ſoluẽdo ipm ⁊ reuertatur ſol'o ꝯtinuitatis.
Si vero alfaſe fuerit ꝓfundioꝛ ſcarificet̃ locus vt medica/
men penetret magis: ſi vero cõtuſio fuerit leuis foꝛte ſuffi/
ciet flobothomia. ¶ Deĩde ponit curaȝ ſolute cõtinuitatis
magis interioꝛis dicẽs ꝙ ſi alfaſe fuerit pꝛĩo cũ percuſſio/
ne medicet̃ percuſſio medicamine debito percuſſiõi: dein/
de medicet̃ alfaſe ſeu locus: vel ponit curam excoꝛiatiõis.

¶ Ulterius ponit curaȝ puncture dicẽs ꝙ magna alfaſe
curabit̃ medicinis exiccãtibus: ꝑua vero vt pũctura acus
non perdens: nec venenoſa nec doloꝛis foꝛtis qui nõ teti/
gerit neruũ: ⁊ ex qua non timeat̃ generatio aþatis ⁊ pulſa/
tio ẽ dimittẽda nature. ¶ Ulterius ponit curaȝ ſolute cõ/
tinuitatis in membꝛo oꝛganico facte dicens ꝙ in cõtoꝛſio/
ne molli ⁊ nõ doloꝛoſa ſufficit ligatura: ⁊ apponãtur ꝯtoꝛ/
ſioni medicamina debita ſibi. ¶ Penultimo ſm verioꝛẽ
ſententiã ponit Auic. curam ſolute cõtinuitatis magis fa/
cte in interioꝛibus: dicẽs ꝙ in caſu ⁊ percuſſiõe neceſſe eſt
flobothomare ex parte oppoſita ⁊ ſubtiliare dietã ⁊ dimit
tere carnes ⁊ ſimilia carnibus. Et infirmus regendus eſt
apoȝimatibus ⁊ potionibus: de quibus dictuȝ eſt in locis
particularibus. ¶ Ultimo dicit ꝙ reſeruabit ĩ locis par/
ticularibus poſterioꝛibus ſermonẽ ſolute cõtinuitatis fa/
cte in neruis ⁊ oſſibus. ¶ Pro partibus nota bꝛeuiter ꝙ
cõtuſio non ẽ aliud q̃ȝ ſolutio cõtinuitatis nõ manifeſta. ſ.
multotiẽs multi numeri quia plures partes ſub cute ſunt
fracte. ¶ Scḋo nota ꝙ cũ in tali contuſiõe multe partes
ſub cute exiſtentes ſint fracte: aperta ſint etiaȝ multarum
venaꝝ oꝛificia aut ipe vene ſint fracte: ideo non ẽ ibi mul/
tiplicatio nutrimẽti. i. ſanguis: quia ſanguis non valde flu
it cum multe partes ſint rupte: nec etiã cauſatur tumoꝛ ſtã
te ruptura harũ multarum partiuȝ: non tamẽ ꝙ ibi nulla/
tenus ſit fluxus. ¶ Tertio nota vt ex dictis habitũ ẽ pꝛo/
pter pꝛofunditatem loci opȝ augere medicamen: ideo ĩ tali
alfaſe foꝛtioꝛa medicamia ſunt neceſſaria. ¶ Ulteri⁹ nota
ꝙ quia in alfaſe materia fluxa ẽ: caro eſt etiã contuſa: ideo
modicũ curando de fluxu a pꝛĩcipio reſoluẽtia ſunt appli/
canda quãuis leuia ⁊ in circuitu aliquod applicando reper
cuſſiuũ. ¶ Ulterius nota ꝙ tale nõ debet eẽ exceſſiuũ val
de: ſi etiã ſit applicatũ in ꝓceſſu: aut etiã in alio tẽpoꝛe ꝓ/
pter cauſaȝ aſſignatã. ¶ Ulterius nota ꝙ ſanie exñte ꝓ/
funda ⁊ alfaſe nõ debem⁹ cõſolidare ſed attendere vt de/
bite ſanies educatur. Jn alfaſe aũt ꝓfunda ſcarificare de/
bemus ṗ° vt expiret materia. 2° vt medicamẽ pꝛofundius
operetur. ¶ Ulterius nota ꝙ cõtuſione exiſtẽte leui quia
ſuperficiali ſatis modica flobothomia faciẽs tractuȝ cõue
nit multotiẽs: ⁊ ſufficit natura ſupꝛa materiã ꝯtuſiõis mo
dicam potẽte. ¶ Ulterius nota ꝙ alfaſe ſi cõiungat̃ per/
cuſſioni ſupple excoꝛiãti debȝ medicari: vt tactũ ẽ generã
do cutem. ¶ Ulterius nota ꝙ alfaſe vt pũctura acus ſi nõ
fuerit facta a re venenoſa dimittat̃ nature: qꝛ facta a re ve
nenoſa debet medicari cũ rebus attrahẽtibus ⁊ pꝛincipa/
lia cõfoꝛtantibus. Jtẽ illa que eſt foꝛtis doloꝛis etiã curã/
da ẽ mitigando doloꝛẽ. Que etiã tetigerit neruũ curanda
ẽ per aperitiua ⁊ ꝓhibentia ne virtus retineat̃ ĩ neruo. Jl/
la etiam ex qua timet̃ apoſtematis generatio curãda ẽ eua
cuatio ⁊ recurrẽdo vt in cura aþatis dictũ ẽ. Jlla etiã ex
qua timet̃ pulſatio retẽta materia putrida nõ ẽ nature cõ/
mittẽda. Jtẽ illa ex qua timet̃ pulſatio qꝛ ſpaſmatio ĩ qua
ẽ ſicut mot⁹ pulſus nõ ẽ nature penitus cõmittenda. Alia
vero parua potẽs a virtute ſuperari dimittẽda eſt ſibi: di/
cẽte Gal. pꝛimo ĩterioꝝ: nã nõ ĩdiget auxilio medicaminũ
niſi dũ moꝛbo magnificato nequiuerit domĩari. ¶ Ulte/
rius nota ꝙ differẽtia ẽ ĩter diſlocatiõeȝ ⁊ cõtoꝛſiõeȝ: qꝛ
diſlocatio ẽ ſol'o cõtinuitatis ĩ mẽbꝛo oꝛganico hñte iũctu
rã dũ mẽbꝛũ exit ex toto ſitu ſuũ locũ. Cõtoꝛſio vero ẽ ſo
lutio cõtinuitatis in qua mẽbꝛũ nõ ẽ debite ſituatũ q̃ȝuis
nõ mutauerit ſuũ locũ: ⁊ dicit̃ contoꝛſio quaſi mẽbꝛi obli/
gatio a ſuo ſitu. Quare vero ligatura debeat eẽ leuis ⁊ nõ
doloꝛoſa: ĩ ꝓmotu ẽ cã ne fiat aþatio ꝑꝑ doloꝛẽ fluẽte mã.

Unde Aui. quarta q̃rti: diſlocatio ẽ egreſſio oſſis de loco ſuo ⁊ ſitu ſuo integra: ſi aũt nõ ĩtegre egreditur noĩatur ſeparatio iũcture ad partẽ ꝓfundaȝ ⁊ p̃cedẽteȝ que ſenſu ꝑcipit̃.

¶ Ulterius nota ꝙ ĩ cãu ⁊ ꝑcuſſiõe ſeu offenſiõe ſupꝛa ali
quid: qꝛ in offenſiõe ſtomaci a lapide dũ cecidit foꝛtis flo/
bothomia ex ꝑte diuerſa ẽ fiẽda ꝓpter ꝓhibere fluxum ⁊
aþationẽ ĩtrinſecus. Jtẽ ẽ ſubtilianda dieta volendo etiaȝ
aþa intrinſecũ euitare. ¶ Ulteri⁹ nota ꝙ ſermonẽ ſolute
cõtinuitatis oſſiũ que vocat̃ fixura: item etiaȝ ſoloneȝ que
fit in membꝛo oꝛganico ratione oſſiuȝ: ⁊ vocat̃ diſlocatio:
reſeruabit ad libꝛos particulares poſterioꝛes.

¶ Caplm 29m de cauterizatione.

Cauterizatio eſt medicamẽ valde vtile iu/
uans ad pꝛohibẽdum ne coꝛꝛuptio ſpar/
gatur ⁊ ad cõfoꝛtãduȝ mẽbꝛũ: cuius ꝯple
xionẽ volum⁹ rectificare ⁊ ad reſoluẽduȝ
materias coꝛꝛuptas in mẽbꝛo retentas ⁊
ad reſtringẽdum ſanguinis fluxum.

¶ Jn p̃cedenti. c. Aui. poſuit curam ſolute cõtinuitatis:
nunc in iſto. c. qꝛ quarũdã ſupꝛapoſitarũ cura cauteriȝã/
do cõplet̃ determĩat de cauteriȝatiõe. Et diuidit̃ ĩ duas.
Nã ṗ° facit hoc: ⁊ ponit operatiões ⁊ iuuamẽta cauteriza
tionis. 2° circa ipam exercẽdã ponit cañ. ibi 2ª: res vero.
¶ Pꝛimo dicit ꝙ cauteriȝatio ſiue cauteriũ ẽ valde vti/
le iuuãs ꝓhibẽdo ne coꝛꝛuptio diſꝑgat̃ ⁊ ꝓcedat ĩ mẽbꝛo:
iuuãs ẽt cõfoꝛtãdo mẽbꝛi ꝯpl'onẽ: iuuãs etiã mẽbꝛi coꝛꝛu/
ptionẽ reſoluẽdo mãs: iuuãs etiã ad ꝓhibendũ fluxũ ſan/
guinis. ¶ Pro ꝑte nota ꝙ cauteriȝatio que nõ ẽ aliud q̃ȝ
vehemẽtia calidi ẽ duplex: quedaȝ fit ex cauterio actuali:
quedã potẽtiali. Exẽplũ pꝛimi vt ferrũ ignituȝ ſeu aurum
ignitũ. Exẽplũ ſcḋi vt calx aut ſapo. Quãuis ergo ḋ vtra/
q̃ȝ cauteriȝatiõe poſſit text⁹ ĩtelligi. De actuali tñ maxime
veritatẽ tȝ. ¶ Scḋo nota ꝙ cauteriũ actuale ꝓbabil'r me
lius ẽ potẽtiali. Nã pꝛĩo vbi q̃rim⁹ remotionẽ coꝛꝛuptõis
hoc actuale meli⁹ oꝑat̃ nõ relinquẽs ĩ ꝑte malitiã ꝯpl'onis
aut venenoſitatẽ qḋ efficit potẽtiale vehemẽter calefacien
do ⁊ exiccãdo. Jtẽ etiã meli⁹ poſſum⁹ actuale regulare po
tẽtiali. Jtẽ etiã potẽtiale plus debilitat cũ opoꝛteat natu/
rã ipm actuare: in aliquib⁹ tñ caſib⁹ ẽ tutius applicare po
tentiale vbi eẽnt multi nerui: ⁊ cãus qui ſumit̃ ex. c. ḋ cu/
ra coꝛꝛuptiõis mẽbꝛi: vbi etiã infirm⁹ abhoꝛꝛet ferrũ ẽ tu/
tius applicare potẽtiale. ¶ Ulteri⁹ nota ꝙ tp̃s magis cõ/
ueniẽs applicatiõi cauterij ẽ ver cũ ſit tp̃s maxie tꝑatum:
deinde autũn⁹: deĩde hyems: minime vero eſtas: ſaltẽ re/
gulariter operãdo: tum ꝓpter debilitatẽ virtutis: tũ etiã
ꝑꝑ magnã eſtatis caliditatẽ. ¶ Ulteri⁹ nota ꝙ cauteriza/
tio ꝓhibet coꝛꝛuptõeȝ ĩcedere remouẽdo reȝ coꝛꝛuptã vi/
goꝛãdo etiã ꝯpl'oneȝ ſiue virtuteȝ. Propter qḋ vlteri⁹ no
ta ꝙ ꝯplexio q̃ vigoꝛat̃ per cauteriũ maxie eſt frigida ꝯple
xio ⁊ humida mãlis cuȝ cauteriũ ſui caloꝛe ⁊ ſiccitate op/
ponat̃ illi male ꝯplexioni cuȝ etiã reſoluẽdo abijciat illam
materiã. Jn mala auteȝ cõplexione frĩda ⁊ hũida per quã
mẽbꝛi timeret̃ coꝛꝛuptio ñ ẽ ĩcõueniẽs applicare cauteriũ.
Cõuenit ẽt ĩ mala ꝯpl'one calida ⁊ hũida maxie mãli oppo/
nẽdo humiditati ⁊ remouẽdo mãȝ putridã. Jn calida autẽ
⁊ ſicca ꝯpl'one nõ ꝯuenit. cã ẽ in ꝓmptu: maxie ſi hec ſit ĩ/
mãlis. Si vero ſit mãlis ꝯuenit maius offerẽdo iuuamẽtũ
ex parte reſol'onis mãe q̃ȝ ſit nocumẽtũ ex ꝑte calefactiõis
⁊ exiccatiõis: valet etiaȝ ad remouẽdũ coꝛꝛuptas mãs ip/
ſas in fumũ cõuertendo: valet etiã ad ꝯſtringẽdũ ſangui/
nis fluxuȝ generando cruſtã ſupꝛa oꝛificium ſeu viam per
quam ſolitus eſt exire ſanguis.

Sciaſ ꝙ cauteriuȝ reſoluit mãm ⁊ ſic reſoluẽdo ꝯfoꝛtat mẽbꝛuȝ debilitatũ ⁊ oppilãdo viaȝ partes ſane preſeruãt a coꝛꝛuptione: ⁊ faciendo eſcarã ꝓhibet fluxũ: ſed cum talis eſcara diu ꝓſeruari dȝ fit cũ medicĩa cauſtica vt ſupꝛa dictũ eſt: quare ⁊c̃.

Res vero qua cauteriũ fit meli⁹ ẽ aux: ⁊ locus qui/
dẽ qui cauteriȝat̃ aut ẽ manifeſtus ⁊ ponit̃ cauteriũ ſuꝑ
ipȝ ſenſibil'r: aut ẽ ꝓfundus ĩterius ĩ mẽbꝛo ſicut ĩ naſo
aut oꝛe aut ĩ ano. Et huiuſmodi quidẽ foꝛma ĩdiget ſuꝑ
quã ponat̃ ꝙ ſit ſicut tale: aut magra in aceto ĩfuſa: po/
ſtea ponant̃ ſuꝑ ipſaȝ pãni aq̃ roſacea vehemẽter ĩfrigi
dati aut ſuccis aliquib⁹: ⁊ mittat̃ ĩ cãnaleȝ ita vt loc⁹ cau/

Ut videri põt facillime ĩ colligẽtib⁹ vepꝛes ⁊ ſpinas: qꝛ ſola nã poteſt reſoluere ſanguinẽ coagulatũ: ⁊ ĩtelligas ſi tãtum ſit in carne: qꝛ ſi neruũ offenderit aliter eſt curãdum.

UVA. BHSC. IyR_006_1

teriʒādus eiꝰ bucella fiat: deide īmittaꝛ cauteriuʒ ꝓpterea vt ad locū perueniat ⁊ ī circuitu nō īpediat ⁊ ꝓprie cūʒ cauteriū ſubtiliꝰ fuerit q̄ʒ forme vacuitas ne lateribꝰ forme obuiet. Cauterizator ꝓterea ſibi cauere dʒ ne fortitudo cauterizatōis ipſiꝰ ad neruos perueniat neqʒ ad cordas neqʒ ad ligamēta: ꝙ ſi ꝓpter ſanguinē qui fluit cauterizauerit oportebit vt cauterizatio ſit fortis: ideo vt cruſta groſſitiē habeat ⁊ ſpiſſitudinē ne cito cadat: quoniā ex caſu cruſte cauterizatiōis facte ꝓpterea vt carneʒ corruptā proijcias ⁊ vt ſanguis fluxus ꝓhibeaꝛ perueni tur ad maluʒ deteriꝰ eo qđ erat. Cūqʒ cauterizaueris ꝓpterea vt carnem corruptā ꝓijcias ⁊ terminū ſani ſcire volueris erit vbi dolet. Et fortaſſe neceſſariuʒ erit tibi cū carne cauterizare os qđ ē ſub ea ⁊ ſupra ipſuʒ morari donec tota ipſius deſtruaꝛ corruptio. Cuʒ ergo fuerit qđ ſit ſicut craneū ſubtiliter ipſaʒ operare ita vt cerebrū nō ebulliat neqʒ ipſius pāniculi corrugenꝛ ⁊ in alio oſſe ab ipſo nō cures perquirere.

¶ Nūc exequiꝛ ponēdo cañ. ⁊ prīo ꝓmittit mām meliorē cū qua fit cauterizatio. 2° ponit cañ. attēdendū rōne loci cauterizādi. 3° ponit cañ. quedā errorē euitare docentē. 4° oſtēdit quale dʒ eē cauteriuʒ ad reſtringēdū fluxū ſanguinis. 5° docet terminū cauterizādi. 6° ponit cañ. attēdendū ī cauterizatiōe cranei. ibi 2ª: ⁊ locus. ibi 3ª: cauterizator. ibi 4ª: quid ſi ꝓpter. ibi 5ª: cūqʒ cauteriū. ibi 6ª: ⁊ fortaſſe. ¶ Primo dicit ꝙ melior res qua cauterizaꝛ eſt aurū. Deīde dicit ꝙ locꝰ cauterizādus ſi ē manifeſtus: tūc ſenſibilr ei applicaꝛ cauteriū. Si vero ē ꝓfundus: vt ī naſo aut ī ore aut ī ano ⁊ ſilibꝰ: tūc eget q̄dā forma ſupra quā ponaꝛ ſeu ītra quā que ſūt ſicut tale aut magra īfuſa aceto ⁊ ſūt ſpēs terre: ſicut ē terra qua carpētarij ſignāt aſſides: deinde īponanꝛ pāni īfrīdati vehemēter aq̄ roſata: aut īfrigidati alijs ſuccis. ſ. fridis: ⁊ mittaꝛ cauteriū ī cānale: aut mittaꝛ pānus īfrigidatꝰ ī cānali ita ꝙ locꝰ cauterizādus ſit vt bucella cānalis: deide mittaꝛ per cānale cauteriū vt nō īpediat partē circūſtātēʒ: ⁊ ꝓprie ſupple nō īpediat cauterio exñte ſubtili ⁊ ſubtiliori q̄ʒ ſit vacuitas forme ne obuiet lateribꝰ. ¶ 3° dicit ꝙ cauterizator ſibi caueat ne fortiter cauterizādo perueniat ad neruos cordas ⁊ ligamenta. ¶ 4° dicit ꝙ cauterizās ꝓpter reſtrīgere ſanguinē fortiter cauterizet ⁊ faciāt cruſtā forteʒ groſſaʒ ⁊ nō cito cadēteʒ: q꞉ ex caſu cruſte facte dū ītendis ꝯſtrīgere ⁊ remouere corruptōeʒ ꝯſequiꝛ malū peius p̄exñte. ¶ Penultīo dicit ꝙ cū tu cauterizas ꝓpter obijcere carnē corruptā ſane ꝑtis terminū ſcire volēs ex loco doloris ꝯphēdes. ¶ Ultimo dicit ꝙ forte erit neceſſariū tibi cauterizare carnē ⁊ os exñs ſub ipſa ⁊ tm̄ aſpectare in cauterizādo os quouſqʒ tota corruptio deſtruaꝛ. Si ergo tale os fuerit craneū dbes ſubtilr oꝑari vt nō ebulliat cerebrum ⁊ ne pāniculi exñtes ſub eo corrugenꝛ. In alio aūt oſſe nō cures hoc ꝑquirere. Et iſtū cañ. ignorauit q̄dā ruſticus de galzignano: fuit eiʒ percuſſus vt fracto craneo appareret pāniculi. Alius medicus ruſticus poſuit oleū vehemēter calidūʒ ⁊ cerebrū fecit ebullire: deinde mortuus eſt. ¶ Pro parte nota ꝙ cauteriuʒ ex auro debite ignitū in ſui ignitōe q꞉ ſit debite calefactū ⁊ non liquatū meliꝰ ē ꝓpter aurū eē tēperatiꝰ ceteris metallis: ꝓpter ēt nō eē valde durū: iō ſua cauterizatio eſt valde mitis. Poniꝛ ēt cordiale in libro de viribus cordis: quia tamē non omēs medici ſciunt ipſum debite moderare nec ſic haberi pōt: ideo ferruʒ eſt cōmuniꝰ. ¶ Nota circa partē ꝙ ſi pars cauterizāda ē manifeſta ſubtiliter pōt apponi cauteriū: q꞉ cū videamꝰ partē cauterizādā: ēt pōt viſibilr cauteriū applicari. Sed ſi pars ſit ꝓfunda q꞉ nō pōt ita metiri quin ledanꝛ ꝑtes circūſtantes: ideo circa hoc ponit Aui. ꝙ ſumaꝛ terra aut creta: ⁊ ponanꝛ ēt pāni īfuſi in aqua ro. deinde ſumaꝛ cānula de ferro que capiat ꝑtē cauterizandā ſicut bolū: deinde ꝑ cānulā ponaꝛ cauteriū vt nō ledat partes circūſtātes ꝓpter terrā aut cretā: ⁊ ꝓpter cānulā ⁊ aquā ro. hoc ē notū. ¶ Ulteriꝰ nota ꝙ cauterizator dʒ cauere ne tāgat neruos. Cā eſt in ꝓmptu ne ꝓpter nimiā ſenſationē incurrat ſpaſmuʒ. Ne etiā deſtructis neruis ligamētis ⁊ cordis ſenſus amittaꝛ ⁊ motꝰ. Et hoc ē verū niſi in neruis ligamētis ⁊ cordis magna adeſſet putrefactio. Nā ſi eēt putrefactio ⁊ corruptio cōueniret cauteriū ad ipſaʒ remouēdaʒ. Qđ poniꝛ de cruſta forti notuʒ ē. Nā notū ē ꝙ ſi cruſta caderet orificiū remaneret latius: ⁊ ſic plus poſſet fluere ſanguis. Qđ poniꝛ ꝙ locus doloris eſt terminꝰ ꝑtis ſane ē dictū. c. de corruptiōe mēbri. ¶ Ulteriꝰ nota ꝙ exñte corruptiōe nō ſolū in carne ſʒ in oſſe oʒ īmorari ī cauterizādo. In craneo tñ vt tāgit ipſe debemꝰ ſubtilr oꝑari: q꞉ facere cauteriū eſſe minus calidū ⁊ paulatine cauterizare: quia eſt malū cerebrū ebullire: cā eſt q꞉ tunc diſſoluiꝛ ⁊ corrumpiꝛ: quare etiaʒ ſit malū eius pāniculos corrugari notū eſt: cum tunc cerebruʒ nimis cōſtringatur nō debite defendatur.

Et id obſeruādūʒ ē nō ſoluʒ in actualibꝰ ſed etiā potētialibus cauterijs ꝙ ſpiſſaʒ ⁊ groſſam generēt eſcarā iuxta Gal. quīto đ īgenio. c. iiij. Medicamē inquit qđ ſit ex calce viua fortius ceteris eſt ⁊c̄.

Nota: de neruis magnis ē ītelligēdū: ſi eiʒ capillares erūt nō ꝓpter id ab opere deſiſtat cauterizator: ligamētū a combuſtione remoueatur ne poſt mēbruʒ torquereꝛ.

¶ Capituluʒ trigeſimū de ſedatiōe doloris.

Iam ſciuiſti dolorū cauſas in duarū ꝯprehēdi diuiſionibꝰ. ſ. mutatōe ꝯplōnis ſubito ⁊ ſolōne ꝯtinuitatis: poſtea ſciuiſti ꝙ poſtremū diuiſiōis earū peruenit ad malitiā ꝯplōnis cal'e aut frīde aut hūide aut ſicce abſqʒ mā aut cū mā chimoſa aut ad vētoſitatē aut apa

¶ In. c. precedenti determiauit de cauterizatiōe: nunc cuiuſdā accidētis curā explicat q̄n̄qʒ ad ſe curā vertentis. Et diuidiꝛ in duas. Nā prīo facit hoc ī gnāli. 2° in ſpāli. ibi 2ª: ⁊ ex doloribꝰ. Itē duo facit. Prīo ex habitis dolorū memorat cās. 2° exequiꝛ explicādo curā. ibi 2ª: doloris igiꝛ ſedatio. ¶ Primo dicit te iā ſciuiſſe cās doloruʒ duplici mēbro diuiſiōis forte cōprehēſas. ſ. cōplōne mutata ſubito ⁊ ſolōne cōtinuitatis. Sciuiſti ēt ꝙ mutatio ī cōplexiōe: aut ē ad calidū: aut ad frigidū: aut ad hūidū: aut ad ſiccū. Itē aut ē cū mā: aut ſine mā: aut ēt eſt mutatio ad vētoſitatē: aut ad apa: hec eſt ſnīa partis. ¶ Pro ꝑte nota ex 2ª primi dolorē eē triſtē ſenſationē: maxime ī ſenſu tactus cōtingentē: vt colligiꝛ 4° de accidēti ⁊ morbo: ⁊ ꝑtiʒ 2ª primi. c. de cāis doloruʒ. Ex quo inferūtur duo. pᵐ ꝙ mala cōplō cū ſit obiectū cōtriſtās ⁊ īproportionatū īſtrumētū virtutis: iō pōt cāre dolorē cū virtꝰ ex tali īproportione hēat cōtriſtari: maxime ſi obiectū ſubito ⁊ cito īprimat. Ex paulatina eiʒ īpreſſiōe quaſi cōſuetudinaria facta nō dolet virtꝰ nec cōtriſtaꝛ. Hoc ſemꝑ memorato ꝙ non nimis cita extet ſeu remoueaꝛ īpreſſio obiecti īprimentis. Cū eniʒ cōtriſtatio ſeu putrefactio requirat aliquā tēporis morā: oʒ ēt obiectū aliquā īprimere morā. Ad actionē eīm requiriꝛ tp̄s vt colligiꝛ 2° de accidēti ad' pricipiū. 2ᵐ īferꝛ ꝙ cū ſoluēs cōtinuū vnitatē remoueat nālē qua mēbrū ſuas ꝑficit oꝑatiōes: iō cōtriſtata virtꝰ ex hac dolet īpreſſiōe. ¶ Ulteriꝰ nota ꝙ lʒ mēbrū 2ᵐ quadruplicē poſſet labi cōplōnē: ceteris tñ in efficiēdo dolorē vehemētiora ſunt caliditas ⁊ frigiditas vt citiꝰ īpreſſiue. ¶ Nota tñ ꝙ vt īfra apparebit ꝙ lʒ frigꝰ ſub aliquo gradu doloris ſit effectiuū: vt notat expiētia: ſub gradu tñ valde ītēſo virtutē ebetando ſenſibilē ē doloris ſedatiuū aut remotiuū. De ſiccitate vero ⁊ hūiditate dicēdū ꝙ ſiccitas pōt eē cā doloris ſoluēdo cōtinuū: aut humiditas cū mā mēbrū extendēdo ſenſibile: ex qua ſenſibilitate virtus pōt contriſtari.

¶ Ulteriꝰ nota ꝙ ex ꝑte hac colligiꝛ diſtictio cōplōnuʒ. Cōplō eniʒ aut ē pēdēs a mā humorali: aut a vētoſitate. Itē aut depēdet a mā apante aut nō apante. ¶ Ulterius nota ꝙ lʒ ab accidēte vt accidēs ē: nō ſumaꝛ indicatio curatiua ꝓ quāto eiꝰ eē cōſequiꝛ morbū: ꝓ quāto ēt nō hʒ rōeʒ ꝑ ſe exñtis ſʒ ꝯñtis: vt i2° terapē. c. prīo ē dictum. Ab accidēte tñ ⁊ ſpālr ꝓſternēte virtutē ⁊ tenēdo viā quā puto veriorē ab accidēte vt ē morbꝰ pōt ſumi īdicatio curatiua accidētis: ergo poſuit Aui. curā ſcđo mō cōſiderati: ⁊ potiſſime explicat curā huiꝰ accidētis. ſ. doloris vt pluries cōtingētis: ⁊ pluribꝰ cōicabilis partibus.

Doloris ergo ſedatio ex ꝯtrarietate harū cāruʒ erit: ⁊ iaʒ ſciuiſti qualr vniuſcuiuſqʒ earū ꝯtrariū ſit: ⁊ ſciuiſti q̄uo malitia ꝯplōnis ⁊ apa ⁊ ventoſitas medicētur. Et oīs quideʒ dolor qui fit fortior īterficit: qm̄ ex eo in primis accidit frigiditas corporis ⁊ tremor: poſtea fit pulſus paruus: deinde deſtruiꝛ ⁊ poſtea moritur.

¶ Nūc exequiꝛ doloris ponēdo curā. Et pᵒ facit hoc. 2° explicat aliquos cañ. correctiuos erroris. ibi 2ª: in doloribꝰ. Prīa ī duas. Nā pᵒ in ſūma tāgit modū doloris curatiuū. 2° hunc ſūmādo modū declarat dicta ſua. ibi 2ª: ⁊ ad ſūmuʒ. Prīa ī duas. Nā pᵒ facit qđ dictū eſt. 2° doloris fortis tāgit effectꝰ. ibi 2ª: ⁊ oīs quideʒ dolor. ¶ Primo dicit ꝙ curatio doloris fit applicādo ꝯ̄ria cauſis doloris. Q̄uo aūt applicenꝛ ꝯ̄ria ⁊ q̄uo cureꝛ mala cōplō apa ⁊ ventoſitas carmineꝛ dictū eſt. ¶ Scđo dicit ꝙ dolor fortis factus īterficiet ex ipſo ꝓueniente pᵒ frigore ⁊ tremore cordis: poſtea paucificato pulſu: deīde deſtructo: vltīo ſequiꝛ mors. ¶ Pro parte nota ꝙ ſedatio doloris quedā ē ꝓpria que nō eſt aliud q̄ʒ doloris remotio ſuuʒ applicādo ꝯriuʒ: q꞉ delicias. Quedā īpropria ⁊ mendoſa q̄ fit nō remouēdo cauſam ſʒ ſtupefaciēdo. Ad propoſituʒ applicando hic ſumitur ſedatio doloris primo modo q꞉ remotiua cauſaruʒ dolorū non ſunt ſemper cōtraria dolori. ¶ Ulterius nota ꝙ licet dolor in ſui pricipio agitādo ⁊ cōmouēdo vt expellatur nociuū habeat calefacere ⁊ velocitare pulſum: factus tamē fortis ⁊ vehemēs vehemēter reſoluens ſpirituʒ infrigidat: ⁊ virtute debilitata carētia inſtrumēti tremit corpus: non potēte ipſa ſuſtentare ipſuʒ paruificatur pulſus: cauſa nota eſt.

Et ad ſūmuʒ id qđ dolores ſedat eſt: aut id qđ ꝯplexionē mutat: aut qđ reſoluit mām: aut qđ ſtupefacit. Et ſtupefaciens quidē remouet dolorem: qm̄ deſtruit ſenſuʒ mēbri. Eius vero ſenſuʒ nō aufert niſi ꝓpter vnaʒ duaruʒ

Hic ſcias ꝙ dolor ⁊ caliditas ſunt aliq̄n ſibi īuicē cāe ita vt caliditas ſit aliq̄n̄ cā doloris ⁊ dolor caliditatis: ⁊ ſic dolor eſt cā doloris per accidēs: tñ ſentētia ſcđi ſic verificaꝛ. naʒ cū dolor ē in aliquo mēbro: tūc talis triſtis ſēſatio excitat actuʒ virtutis expulſiue illiꝰ mēbri ex eo ꝙ ſit res nociua: iō incitās nāʒ ad expulſionē cū expulſio fiat caliduʒ: ideo dolor multiplicat caliditatem: vel aliter vt dicit Gal. nono de ingenio. Nā dolor exiſtens in mēbro ꝯmunicat mēbris ſanis: ⁊ tunc membra ſana ſentiētia mouētur ad expellēdū nocumentuʒ ⁊ mittunt de ſanguine ⁊ ſpiritu ad locuʒ dolētē ⁊ cauſant caliditatē: ⁊ ſic ſe dolor augeꝛ: quare ⁊c̄.

UVA. BHSC. IyR_006_1

duaꝝ cāꝝ: aut ꝑꝑ multā īfrīdatōez: aut ꝑꝑ multā vene noſitatē q̄ ē i ipō ꝯria vtuti illi⁹ mēbꝛi. Ea quoqꝫ q̄ flu/xa faciūt ſūt ex ſūma eoꝝ q̄ mollit̄ reſoluūt: q̄lia ſūt anetū ⁊ ſemē lini ⁊ mellilotū ⁊ camomilla ⁊ ſeīa apij ⁊ amigdale amare ⁊ oīs res in p° gradu cal'a ⁊ ꝓpꝛie qn̄ fuerit cū ea glutinādi potētia ſicut gūmi pꝛunoꝝ ⁊ amilū ⁊ ce/ruſa ⁊ croc⁹ ⁊ laudanū ⁊ altea ⁊ amomū ⁊ caules ⁊ napi ⁊ apozima eoꝝ ⁊ adipes ⁊ iſop⁹ cerat⁹ ⁊ olera ſicut dice/m⁹ i ātidotario ⁊ vētrē ſoluētia ⁊ eūantia: quocūqꝫ mō fuerit ſūt iſtiuſmodi. Et fluxa quidē faciētia ſūt dāda ꝑ⁹ eūantia ſi neceſſariū fuerit eūare donec māꝫ reſtrigas q̄ ad mēbꝛū deſcendit: ⁊ ēt illud totū qđ apā maturat aut qđ ea apit. Oib⁹ aūt ſtupefaciētib⁹ foꝛti⁹ eſt opiū. Et ex eis ſūt poma mādragoꝛe ⁊ ei⁹ ſemē ⁊ coꝛtices radicis ip ſi⁹ ⁊ papauer ⁊ bengi ⁊ iuſquiamū ⁊ ſolatrū ſtupefaciēs ⁊ ſemē lactucaꝝ: ⁊ ex eis ſunt nix aut aqua frigida.

¶ Nunc ſūmat ſedātia doloꝛē dicta ſua declarādo. Et diuidit̄ i q̄ttuoꝛ. Nā p° ponit iſtā ſūmaꝫ. 2° declarat quō ſtupefaciēs medicina doloꝛē remoueat. 3° oſtēdit quō re/ſoluētia remoueāt doloꝛē enumerādo plura. 4° quedā oꝛ/dinē ponit ⁊ ꝯparatōez īter ſtupefaciētia. 2ª ibi: ⁊ ſtupefaci/ens. 3ª ibi: ea quoqꝫ. 4ª ibi: oībus aūt. ¶ Pꝛīo dicit in ſū/ma: ſedās doloꝛez aut ſedat mutādo ꝯplōnez: aut reſoluē do mām a qua pēdet doloꝛ: aut ſtupefaciēdo. ¶ Scđo di/cit ꝙ ſtupefaciens remouet doloꝛē deſtruēdo ſenſuꝫ mē/bꝛi: vel ꝓpter īfrigidatōez multā: aut ꝓpter venenoſitatē ꝯriaꝫ virtuti ſenſibili illi⁹ mēbꝛi. ¶ Tertio dicit ꝙ facien/tia fluxū ſunt ex ſūma leuiter reſoluentiū. hec ſūt anetum ſe. lini: mellilotū: camomilla: apij ſemē: amigdale amare: ⁊ oēs res calide i pꝛīo gradu pꝛīcipalr̄ i quib⁹ eſt virt⁹ glu/tinādi ſicut gūmi pꝛunoꝝ aut ēt piroꝝ ⁊ amidum: ceruſa: crocus: laudanū: altea: amomuꝫ: caules: napi: ēt apozima iſtaꝝ reꝝ ⁊ adipes ⁊ iſopus ⁊ olera ⁊ cerota: de quib⁹ dice mus i antidotario. ¶ Ulteri⁹ dicit ꝙ ſoluētia vētrē ⁊ eua cuātia quocūqꝫ opent̄ ſunt modi iſti⁹ q dict⁹ eſt. ¶ Ulte rius dicit ꝙ ſi neceſſariū eūare fuerit vt reſtrigat̄ mā flu/ens ad mebꝛū: poſt eūantia ſunt adhibēda facienª fluxa: ⁊ ſilr̄ maturātia ⁊ apientia apā. ¶ Dicit vlterius ꝙ ceteris ſtupefacientib⁹ foꝛti⁹ eſt opiū: poma mādragoꝛe ſtupefaci/unt ⁊ ſuū ſemē ⁊ coꝛtices ⁊ papauer ⁊ been: ⁊ quid ſit hoc dicā: ⁊ iuſquiam⁹ ⁊ ſolatrū ſtupefaciēs ⁊ ſemen lactucaꝝ. Ex ſtupefaciētib⁹ ēt ſūt nix ⁊ aq̄ frīda. ¶ Pꝛo partib⁹ no/ta p° ꝙ cū curet̄ doloꝛ per remotōez cāe curat̄ ēt ꝑ obtū/dentia ſenſuꝫ: ⁊ 3° per ea q̄ ꝯriant̄ doloꝛi: ideo i ſūma ſunt iſta tria in lr̄a explicata. Nā p° per mutās ꝯplōnem ītelli/git oē illud qđ eſt remotiuū cāe doloꝛis de ꝯplōne magis faciēs mentōez vt de cōioꝛi ⁊ magis ꝯtingēte. Per reſol uens vero māꝫ ītelligit anodinū ſeu vere ſedatiuuꝫ dolo/ris: cui⁹ eſt leuiter reſoluere māꝫ vt īfra dicet̄. Per ſtupe faciēs vero ītelligit illud ſedatiuū doloꝛis qđ opponit̄ do loꝛi falſe ſedādo doloꝛez ⁊ īducendo nocumentū i ſenſuꝫ. ¶ Ulteri⁹ nota ꝙ cū ſtupoꝛ ſit diminutio ſeu ablatio ſen/ſus: iō ſtupefaciēs remittēdo ſenſuꝫ aut auferēdo doloꝛez ſedat. ¶ Ulteri⁹ nota ꝙ ex lr̄a ꝯpꝛehendit̄ ſtupefaciēs hoc facere duplr̄. p° multa frīditate remittēdo ſeu coꝛrūpēdo ſenſuꝫ ſeu virtutē ſenſibilez. 2° per multā venenoſitatez occultā ⁊ a foꝛma ſpecifica ꝓcedentē: cui⁹ nā eſt ꝯriari vir tuti ſenſibili: ſicut pꝫ ī opio: qđ exn̄s tepidū ſtupefacit per ſuā venenoſitatē occultā: lꝫ ēt opet̄ infrigidādo. ¶ Ulte/rius nota ꝙ cū in doloꝛe vtplurimū ſit quedā mēbꝛi ten/ſio: aut qꝛ mālis ē: vel qꝛ vētoſus ē: vel ꝓpter māe curſum ad locū dolētē: iō medicina vere ſedatiua doloꝛis aliquas debuit hēre cōditiōes. Nā pꝛīo debuit facere fluxū: qꝛ fa cere mēbꝛū laxū leuiter reſoluēdo reſpectu tēſi mēbꝛi. Itē talia faciūt fluxū: qꝛ diſponūt mām fluxui ꝑ ſuā caliditatē ſubtiliādo. Debēt etiā eē aliqualr̄ apitiua vt poſſint ſe me lius in mēbꝛo ꝓfundare vt apiendo poꝛos mām diſponāt exitui. Debēt ēt eē tēpati caloꝛis ⁊ aliqualr̄ intēſioꝛa: vt ī ipſis tāquā obiectis ꝓpoꝛtionatis cōgaudeat virtus ſen/ſitiua: que eīm appꝛopinquāt nr̄e caliditati vt obiecta ꝓ/poꝛtionata ⁊ ſibi ſimilia cōfoꝛtāt ipām: vn̄ vola man⁹ appo ſita doloꝛi calido ⁊ frigido cōfert. Unde talia anodina de/bēt hēre virtutē actualē cōglutinādi vt vniāt ⁊ cōfoꝛtent caliditatē dolētis mēbꝛi quāuis ſm virtutē ſint laſſatiua ⁊ mitigatiua doloꝛis ⁊ aperitiua poꝛoꝛū. Et multa enume rant̄ in lr̄a quoꝛū virtutes cōpꝛehendūtur ex 2° cañ. Et ī/ter iſta aliqua ſunt ꝓpꝛie anodina vt anetū mellilotuꝫ ſe/mē lini. Camomilla vero cū ſit aliq̄lr̄ ſtiptica nō ē ita q̄ꝫtū ad hoc anodina ſicut anetū lꝫ ſit tēpatioꝛ ī caliditate ane/to. Reſoluit eīꝫ ſine attractōe vt pꝫ 2° cañ. c. đ camomil/la. Quid aūt ſit amidū ſiue amilū ſatis ē notū. Eſt eīꝫ oꝛ/deū ſiue frumētū qđ ſumit̄ dū ē in lacte ⁊ maturat̄ dū eſt aliqualr̄ ēt in aqua: deinde aliqualr̄ vſtulat̄ vt fabellando coꝛtex abijciat̄. Tale amidū hꝫ virtutē cōglutinatiuā ⁊ eſt doloꝛis ſedatiuū. ¶ Ulterius nota ꝙ hec littera ſūt iſti⁹ modi: pōt duplr̄ ītelligi. Uno mō ⁊ leuiter ꝙ ſūt iſtiuſmo/di qꝛ ſunt ſedātia doloꝛē lꝫ ſedēt vt cōtraria cāe: qꝛ eūan/do ⁊ remouēdo eā. 2° pōt exponi ꝙ ſunt iſtiuſmodi: quia ſūt vere ſedātia doloꝛē ⁊ remittētia triſtē doloꝛē ⁊ ſenſa/tionē: qꝛ diuertēdo māꝫ a loco dolēte remittit̄ doloꝛ. Te/neat̄ pª qꝛ 2ª pateret̄ inſtātiā. ¶ Ulteri⁹ nota ꝙ regulari/ter opando iſta vere ſedatiua doloꝛis debēt dari poſt eua cuationē ⁊ recurſuꝫ māe: ⁊ qn̄ nō ē āplius in fluxu. Cuius cā ē ne ꝑꝑ eoꝝ caliditatē aliqualē mā que ē ī fluxu nō ꝓhi beat̄ a fluxu: īmo ēt augmētet̄ flux⁹. Coacte tn̄ nos oꝫ iſta applicare vbi vehemētia doloꝛis ponit in fluxu materiaꝫ.

¶ Ulteri⁹ nota ꝙ opiū ceteris ſtupefaciētib⁹ ē foꝛti⁹ non neceſſario qꝛ citi⁹: ſꝫ qꝛ foꝛtioꝛē ſtupefactionē facit qđ pꝛi/mo cōpꝛehēdit̄ ad expiētiā. Actualr̄ cōpꝛehēdit̄ ēt qꝛ ſtu/pefacit ꝑ ſuā vehemētē frigiditatē: vt ſit magnū periculū ī applicando ipꝫ. Poma vero mādragoꝛe ⁊ ſemē ⁊ coꝛtex ⁊ radices n̄ ſūt mlt̄e ſtupefactōis q̄ꝫuis ī his duob⁹ modis offerant̄. Papauer vero albū ē ſtupefactiuū domeſticuꝫ ſua frigiditate hoc faciens. nigrum vero aliqualr̄ partici/pat venenoſitate. Been vero ē vna ſpēs iuſqami q iuſqa/mus dict⁹ ē dens caballin⁹: ⁊ apud nos pintega: hꝫ potiſ/ſime ſtupefacere ſuo frigoꝛe. Solatrū ēt ꝙ ſub ſe hꝫ mlt̄as ſpēs nō ē tanti vigoꝛis vt opiū. Semē lactucarū ē etiā ſtu pidū ſatis domeſticū ſua frigiditate: īmo in hoc opat̄ ſuc/cus lactucaꝝ. Nix aūt ⁊ aqua frigida ſolū infrigidādo ſtu pefaciūt. Et notabilr̄ ſtupefaciētiū gradū explicuit Aui. ꝑꝑ timoꝛē applicatiōis reddēs nos ſollicitos circa hoc.

In doloꝛib⁹ pꝛeterea multotiēs accidit erroꝛ: quo/niaꝫ eoꝝ eauſe erūt extrinſece ſicut caloꝛ: aut frigus: aut ceruicalis eminētia: aut loci coꝛruptio: aut caſus qui fit in ebꝛietate: aut alia ab his: ⁊ q̄runt̄ eoꝝ cāe ī coꝛpoꝛe ⁊ ꝓuenit erroꝛ: quapꝛopter ſcire debes hoc ⁊ cognoſcere ſi ē ibi repletio aut nō. Et ſi ſūt ibi cāe repletionis note qn̄qꝫ ēt cā aduenit exteri⁹: deīde īterius fit māſiua ſicut cū aliquis bibit aquā frīdā ⁊ accidit ei foꝛtis doloꝛ in ꝑte ſtomaci ⁊ epatis. Et multotiēs quidē nō eſt multū ne/ceſſaria eūatio ⁊ ſibi ſilr̄a: qm̄ ſepe ſufficit ſibi balneuꝫ ⁊ foꝛtis ſomn⁹ ī eo. Et ſicut qui comedit rē calidā ⁊ īfert ei foꝛtē capitis doloꝛē: ⁊ ſufficit ei aquā īfrīdatā bibere.

¶ Tāgit aliquos cañ. erroꝛis coꝛrectiuos. Et pꝛīo p̄mit/tit aliquos. 2° ſpālr̄ docet euitare erroꝛē circa vſum ſtupe faciētiū. ibi 2ª: ⁊ qn̄qꝫ res ē. Pꝛia ī tres ſm tres cañ. quos ponit. ibi 2ª: cūqꝫ etiā. ibi 3ª: ⁊ multotiēs quidē. ¶ Pꝛimo dicit ꝙ in curando doloꝛes multotiēs errat̄ ⁊ cognoſcēdo cās a quib⁹ depēdēt. Nā cāe doloꝛū aliqn̄ ſūt extrinſece vt caliditas aut frīditas exterioꝛ ⁊ eminētia ceruicalis aut mala diſpō loci aut qꝛ ꝓpter ebꝛietatē iſte cecidit aut alia exterioꝛa qꝛ querūt̄ ⁊ reputāt̄ ꝙ ſint ſicut cāe interioꝛes: debes ergo ſcire ⁊ videre vtrū ibi ſit repletio ⁊ ſint ſigna repletiōis vel nō. ¶ Scđo dicit ꝙ qn̄qꝫ cā doloꝛis ē ex/terioꝛ: deinde fit māſiua ſicut aliquo bibēte aquā frigidā doloꝛ foꝛtis ī parte ſtomaci cātur ⁊ epatis. ¶ Tertio dicit ꝙ multotiēs pꝛo ſedādo doloꝛe nō ē eūatio multū neceſſa ria: īmo ſufficit ſomn⁹ aut balneū vt ī comedēte rē calidā foꝛtē capiti īferentē doloꝛē: ſufficit eīꝫ aquā potare frīdā.

¶ Pꝛo ꝑte nota ꝙ cā exn̄te exterioꝛi ſi reputet̄ īterioꝛ er/rat̄ multotiēs qꝛ tēdum⁹ eūare ipām lꝫ nō ſit eūatio fiēda.

¶ 2° nota ꝙ cā exterioꝛ fit aliqn̄ māſiua ſm modū expoſi toꝛū dū cā pꝛimitiua mouet añcedētē vt ſit cā doloꝛis aut ꝯiuncta. nā cā intrīſeca ē māſiua reſpectu exterioꝛis. ¶ 3° nota ꝙ cā exterioꝛ pōt dici fixa qn̄ ſuū figit effectū intrin ſecus: oꝫ ergo nos hoc cōpꝛehendere. Nā ſi cā pꝛimitiua mouet aut mouerit coꝛpalē: nos oꝫ ſolū intēdere ad remo tionē effect⁹ pꝛimitiui īmo ad cām coꝛpalē a qua dicit̄ effe ctus dependere. ſ. doloꝛ. ¶ Ulterius nota ꝙ doloꝛ mul/totiens nō eget eūatiōe īmo ꝓpter ſui facilitatē: ⁊ qꝛ pen/det a cā pꝛimitiua remouet̄ citiſſime.

Et qn̄qꝫ ē res ī qua fiducia ē ꝙ doloꝛ ea remoueat̄ aut tarde operās ita ꝙ doloꝛ ille vſqꝫ ad hoꝛā illā tolle/rari nō pōt: ſicut eūatio materiei doloꝛem faciētis colice retēte ī villis ītestinoꝛū aut cito opans eſt: ſꝫ ex ea timet̄ finis vehemēter malus ſicut ſtupefactio mēbꝛi dolētis ī colica cuꝫ medicis q̄ hoc opari ſolēt: ⁊ ſit medicus in hoc ambigu⁹. Oꝫ ergo bone mēſuratōis foꝛtitudinē hēre vt ſciat qđ duoꝝ tēpoꝝ ſit lōgius aut tp̄s fixionis virtutis aut tp̄s doloꝛis: ⁊ etiā que duaꝝ reꝝ ſit ei đterioꝛ an do loꝛ an malus finis qui ex ſtupidatōe timet̄ vt eligat ſtu/diū ei īpēdere qđ magis ē īpediens: foꝛtaſſe eīꝫ ſi doloꝛ remāſerit foꝛtitudīe ſui ⁊ magnitudine īterficiet. Et ſtu pidatio foꝛſitā nō īterficiet lꝫ ex alia parte īpediat: cuius īpedimētū foꝛtaſſe coꝛrigere poteris ⁊ redibit foꝛſitan ⁊ tu redibis medicina cōueniente.

¶ Nūc ponit euidēter erroꝛē ⁊ pꝛīo oñdit quō medicus ī opando aliqn̄ ē ꝑplexus. 2° circa ſtupefaciēs ponit cañ. ibi

2ª: ⁊ in hoc. ¶ Primo dicit ꝙ qñ res ſedatiua doloris ē ope
rans tarde ita ꝙ timet̃ ꝙ virtꝰ nō poterit ſtare vſqꝫ ad il-
lam horā ſicut euātio ī colica aut res ē cito opans ⁊ ē mul-
tū mala ſicut ē res ſtupefaciēs ex qua magnū poſtea ſequa
tur nocumētū: in hoc ergo medicus ē dubius: iō dꝫ ī hoc
fortiter mēſurare vt ſciat qđ iſtoꝝ ſit eligēdū: ⁊ an ſit peiꝰ
expectare ⁊ euāre: aut ſit peius applicare ſtupidū qđ in p-
ſenti ledit vidēdo vtrū poſſimꝰ eius corrigere nocumētū.
¶ Pro ptis ītellectu notādū ⁊ aduertēdū ꝙ bonitas cōie-
cture ⁊ mēſure medici ſumit̃ pͦ ex nāli ingenio: ingeniuꝫ
nāle iuuat artē. Joānes damaſcenꝰ in ſuis affoꝛiſmis: Su
mitur ēt ex longa medici expientia ⁊ forti etiā ſtudio ⁊ cō-
iectura. 2° videt̃ cōcipiēdū ꝙ illud circa qđ cadit cōiectu
ra ē hoc: aliquis patit̃ colicā: nūc ē videndū an tp̄s perſi-
xiōis virtutis ſit tantū quātum ſit tp̄s doloris aut nō. Et
hoc ē dicere an virtꝰ tāto tp̄e maneat fixa q̄zto tēpore do
loꝛ pōt remoueri vera remotiōe: aut ēt ſit apta ampliori tē
pore remanere: ⁊ in illo cāu per euantia medicādū eſt. Si
vero ſit ecōuerſo ꝙ tp̄s doloris ſit āpliꝰ tp̄e fixiōis virtu-
tis qꝛ doloꝛ ſit aptus lōgiori tp̄e remanere q̄ꝫ ſit virtꝰ re-
manere fixa. Et ē dicere ꝙ remanēte dolore ꝓſternat̃ vir
tus ⁊ nō ſuſtineat dolorē: tūc ſtupida ſūt applicāda maius
ſperādo iuuamētū ex remotiōe doloris q̄ꝫ ſit nocumentuꝫ
ex pte ſtupidi cuius nocumētū poteris corrigere. Et ſi do
loꝛ iteꝝ reuertat̃ āplius refecta virtute ꝯueniēs poterit ap
plicari medicina ꝓ vera doloris remotione.

Et pter hoc totū ſtupefaciētis ꝯplōnē ꝯſiderare de
bes ⁊ ipſiꝰ q̄litatē: ⁊ vt qđ ex eo eſt faciliꝰ dones ⁊ vt tri-
buas id qđ ē cū ſuis tyriacis ꝯpoſitū niſi res fuerit ma-
xia q̄ forti idigeat ſtupefactiōe. Sūt pterea mēbra đ qui
bꝰ ñ curamꝰ: ⁊ ſi eis ſupponas narcotica qm̄ nō ide ad
vehemēter malū finē ꝑueniūt ſicut dētes cū ei apponit̃
ſtupefactiuū. Et fortaſſe quidē bibē ēt erit meliꝰ ī huiuſ-
modi ſicut bibē qđ ſtupefaciat ꝑꝑ dolorē ocłi: qm̄ ex hoc
minoꝛ malitia ꝓuenit oculo q̄ꝫ vt īteriꝰ ponat̃. Et for-
taſſe facile erit corrigē malitiā q̄ ex potu alijs accidit mē
bris: ī eo aūt qđ ē ſicut colica magnificat̃ malus finis qm̄
māꝫ augmētat frigus ⁊ ꝯgelatōeꝫ ⁊ clauſurā. Amplius
ſtupefaciētia plerūqꝫ ſedāt doloreꝫ ꝓpterea ꝙ dormire
faciūt: qm̄ ſomnꝰ eſt vna ex cāis ipſiꝰ ſedatōis doloris ⁊
ꝓprie qñ cū eo fcā fuerit fames ⁊ ī dolore māli. Et ſtu-
pefacientia quidē ꝯpoſita quoꝝ fortitudies alie đbilitāt
medicie ſicut tyriaca ſūt magis ſecura quēadmodū filo-
niū ⁊ trociſci: quibꝰ nomē ponit̃ ternarij: ſꝫ eoꝝ ſtupefa
ctio ē đbilioꝛ: qđ aūt ex eis ē recēs maioris ē ſtupefactio-
nis. Et ī ātiquo fere nulla ē ſtupefactio ⁊ qđ eſt mediū.

¶ Nūc exequit̃ ponēdo cañ. circa ſtupidoꝝ applicatōeꝫ
attēdēdū. Et ꝯtinet hec pars partes tres. Primo facit hoc.
2° ponit modum quo ſtupidū dolorem ſedat. 3° inter ſtu-
pidorum virtutes cōparationeꝫ ponit. ibi 2ª: amplius ſtu-
pefactiua. ibi 3ª: ⁊ ſtupefacientia quidem. Prima in tres.
Primo ponit cañ. attēdēdū circa applicationē ſtupidorū.
2° ponit cañ. circa applicationē ſtupidoꝝ rōne membroꝝ
quibꝰ ſtupida ſunt applicāda. 3° oñdit in qua diſpōne ſtu
pida valde nocēt. ibi 2ª: ſunt preterea. ibi 3ª: in eo aūt qđ ē
ſicut colica. ¶ Primo dicit ꝙ etiā vltra illud qđ dictū ē
tu debes cōſiderare cōpōnē. Alia littera hꝫ cōplōnē ⁊ q̄li-
tatē ſtupefaciētis: vt tu tribuas faciliꝰ ſtupefaciēs ⁊ corre-
ctū cū alijs medicinis tyriacalibus niſi forti eges ſtupefa-
ctiōe. ¶ Scđo dicit ꝙ quedā ſūt mēbra quibꝰ nō curamꝰ
ſtupefaciētia apponere: qꝛ inde nō malus toti cōſequeret̃
finis ſicut dētes. Aliqñ forte meliꝰ ē ſtupidū bibere q̄ꝫ mē
bro applicare. Nā ex hoc minꝰ malū oculo cōſequit̃: ⁊ for
te erit facile corrigere nocumētū alijs cōtingēs mēbris ex
potu ſtupidi. ¶ Ulteriꝰ dicit ꝙ malus finis ex ſtupido au-
getur ī colica: qꝛ medicia augmētat frigꝰ ꝯgelationē ⁊ clau
ſurā ſeu cōſtrictiōꝫ faciēteꝫ ſupple ne mā egrediat̃. ¶ Pe
nultimo dicit ꝙ ſtupefaciētia pluries ſedāt dolores ꝓuo-
cando ſomnū qui ē ex ſedātibꝰ dolorē potiſſimū qñ ꝓuo-
cato ſomno ē fames ſeu qñ dū ꝓuocat̃ ē fames: ⁊ etiā hoc
ꝯtinet verū in dolore māli. ¶ Ultimo dicit ꝙ ſtupefaciē-
tia cōpoſita correcta ⁊ debilitata a ſtupefactōe ꝑ alias me-
dicinas ſūt magis ſecura ſimplicibꝰ qualia ſunt tyriaca fi-
loniū ⁊ trociſci dicti ternarij: quoꝝ ſtupefactio ē đbilioꝛ ſtu
pefactiōe tyriace vel filonij. Stupefaciēs vero recēs ē ma-
ioris ſtupefactiōis antiquo ī quo fere ē nulla ſtupefactio: ī
medio vero īter antiquū ⁊ recēs ē media virtꝰ ī ſtupefaciē
do. ¶ Pro ptibꝰ nota ꝙ inuenit̃ vna lr̃a dicēs cōpōnē: ⁊
ē ſenſus ꝙ tu debes ſcire cōpōnē ſtupidi. ſ. cōpoſiti vt tu
ſcias quāte virtutis ſit in ſtupefaciēdo ⁊ quāte nō: qui cō-
prehēdere poteris ex refrenātibꝰ ſtupefactionē. Alia lr̃a di
cit ꝯplōnē ⁊ ē ſenſus ꝙ tu debes cōplōnē ſcire. i. gradum
ꝯplōnis ⁊ qualitatē. i. modū ſtupidi. ſ. an hoc fiat per frigi
ditatē an ꝑ nām venenoſaꝫ. Nā primo dꝫ hoc cōſiderare vt
ſciat faciliꝰ eligere. 2° dꝫ cōſiderare ꝯpōem vt ſciat illud

Contra: qꝛ nocumētuꝫ
narcotici potus eſt multo
peius q̄ꝫ ipſiꝰ admiſtrati
de foris: qꝛ intus acceptuꝫ
nocet oībus mēbris: extra
vero vni ſolo. dicendū ꝙ
intra acceptū cū modera-
mine ſepe reprimit̃ vi di-
geſtiua ⁊ calore inato qui
miniſtrat ei: vnde nō per-
uenit eius violētia ad pri-
cipalia pura ⁊ icorrecta:
nō ſic eſt in exteriori mē-
bro in quo caloꝛ eſt debi-
lis quale potiſſimū ē ocu
lus frigide ꝯplōnis exñs.

qđ ē correctū per medicias tyriacales ⁊ cordiales: ⁊ hoc eſt
neceſſariū: qꝛ ſupple faciliꝰ ē ad exhibēdū niſi fortis extite
rit ſtupefaciēdi neceſſitas: tūc eiꝫ forti eges ſtupido. ¶ Ul
terius nota ꝙ dētibꝰ ſecuriꝰ pōt applicari ſtupidū: qꝛ ſunt
oſſa ſeu đ nā oſſiū nō ſentiētes aut valde obtuſe ſentiētes:
vnde de virtute etiā eoꝝ ſenſibili nō curamꝰ: aut ſaltē qꝛ
duri ſūt ⁊ nō multū intrinſeci corpori ⁊ nō multū perfecte
opatiōis ꝓductiui: iō de eoꝝ ſtupidatiōe nō multū cura-
mus. ¶ Ulteriꝰ nota ꝙ oculus ē membꝛū valde nobile ī
operando multū requirēs ſpūm: ⁊ etiā mēbꝛū valde mol-
le ⁊ leue aptū facilr̃ ledi ⁊ valde per applicatiōꝫ ſtupidi. Et
iō forte meliꝰ ē bibere ſtupidū valde leue q̄ꝫ oculo applica-
re ꝓpter cām in littera tactā. ¶ Nota vlterius ꝙ in colica
ꝓueniente a mā flegmatica vitrea lꝫ nos aliquādo in caſu
deſperato oporteat applicare ſtupida: ex ipis tñ grādia ſe-
quūtur nocumēta qꝛ incuniatio māe ⁊ ꝯgelatio ⁊ incruda-
tio ⁊ etiā clauſura. ¶ Ulteriꝰ nota ꝙ in dolore māli valde
cōfert ſomnꝰ maxie dū ē inanitio ⁊ nō repletio cibi aut po
tus: qꝛ ītrinſecꝰ reuocato calore nā fit potēs ſupꝛa abijciē-
dam mām: ⁊ ſupꝛa ipam digerēdam ⁊ reſoluēdā. In dolo
re aūt nō materiali nō tantū ꝯfert ſomnꝰ ſupꝛa famē. Stu
pida etiā alijs modis dolorē ſedant: de quibꝰ ē dictuꝫ ſu-
pra. ¶ Ulteriꝰ nota ꝙ ſtupida cōpoſita ſunt ſecuriora ſim
plicibus cōſimilis gradus in ſtupefaciēdo. Nā lꝫ nā cete-
ris paribus minus valeat cōpoſitū ⁊ diuerſuꝫ regulare q̄ꝫ
ſimplex: qꝛ tñ ī tali ꝯpoſito ſūt aliqua tyriacalia que oppo-
nunt̃ venenoſitati ſtupidi: iō adhuc ſtupidum cōpoſitū ſe-
curius. Dat exēplū de tyriaca ſupple noua ⁊ filonio quo-
rum deſcriptōes habetis 5° cañ. facit ēt mētionē de qui-
buſdā trociſcis: de qbꝰ ibi ſcribit̃. ¶ Ulteriꝰ nota ꝙ ī ſtu-
pido recēte nō refrenato ꝑ calida ⁊ exñte dēſo fit ſtupida-
tionis opatio. Poſt aūt fermētationē ⁊ reductiōꝫ ad vnā
formā calidis ſtupidū ſuperātibꝰ: vt ī tyriaca nō fit ſtupe-
factio: imo calefactio ⁊ reſolutio.

Et ex doloribꝰ quidē qui ſūt mlr̃e fortitudis ⁊ ſūt ad
medicādū faciles ī quibuſdā horis ſicut dolores vētoſi.

¶ Nunc tāgit curā doloꝝ in ſpāli: qꝛ doloꝝ vētoſoꝝ.
Et diuidit̃ ī duas. Nā pͦ pmittit qualr̃ ſe hēant ad curā
hi dolores. 2° exequit̃ curā ponēdo. ibi 2ª: qm̄ qñqꝫ ſedat̃.
Primo dicit ꝙ qdā dolores ſunt valde fortes: faciles tñ ad
remouēdū: vt ventoſi. ¶ Pro parte nota ꝙ dolores ven-
toſi ſunt fortes vētoſitate valde potente in extēdendo ⁊ ſol
uendo continuū: faciles tamē ad remouendū cuꝫ ſubtilia-
ta vētoſitate ſedent̃: que ventoſitas eſt apta ſubtiliatōi cū
ad aeris naturā accedat. Notāter dictuꝫ eſt in quibuſdā
horis: qꝛ ſtātibus que dicētur infra.

Qm̄ qñqꝫ ſedant̃ ⁊ ſufficit vt ſuper eos aqua calida
euet̃: verūtñ in hoc timoꝛ exiſtit vñ ab eo tibi cauere de-
bes: qm̄ plerūqꝫ cā erit ap̄a ⁊ exiſtimabit̃ ꝙ ſit ventoſi-
tas. Et ſi fortaſſe factū fuerit ei embroca ex aq̄ cal'a ⁊ pci
pue ī ſui pricipio ei affert magnū malū. Et pter hoc qñ-
qꝫ īpedimētū vētoſe efficit cū ventoſitatē reſoluere nō
poterit ⁊ ī quātitate ipſiꝰ ſpacij augmētū faciet: ⁊ vapo
ratōes etiā ſūt ex medicatōibus ventoſitatū. Et ex eis
quidē melioꝛ ē cū qua ē id qđ exiccat ſicut miliū niſi ī mē
bro fuerit qđ illud tollerare nō valet ſicut oculus: fiat er
go tunc vaporatio cū pānis. Ex vaporatōibus ēt ſunt q̄
cū oleo calefacto fiūt: ⁊ ex vaporatōibus quidē fortibꝰ ē
vt oroboꝝ farina cum aceto coquat̃ ⁊ poſtea ſiccet̃: ⁊ fiat
ex eo vaporatio: ⁊ minoꝛ cā ea eſt vt furfur coquat̃ ſicut
hoc. Salis aūt vapoꝛ eſt pungitiuꝰ: ſꝫ milij eſt melioꝛ ⁊
debilioꝛ: ⁊ plerūqꝫ etiā fit vaporatio ex aqua in vaſe po
ſita que eſt icolumis ⁊ leuis: ſꝫ operatōeꝫ efficiet quā no
minauimꝰ ſi illud nō fuerit obſeruatū. Uentoſe ēt cum
igne ſūt iſtiuſmodi ⁊ ſūt fortes in ſedādo dolorem vēto-
ſuꝫ: ⁊ ſi eas iteꝝ adhibueris doloꝛ penitꝰ deſtruet̃: verū
tñ plerūqꝫ ex eis accidit illđ qđ ꝓuenit ex eo qđ diximꝰ.
Ex ſedantibꝰ preterea dolorē eſt molliter lōgo tp̄e īce-
dere ꝓpter illud qđ ī ipſo exiſtit ex virtute faciēdi fluxa:
⁊ ſilr̃ adipes ſubtiles noti ⁊ olea que noīauimus ⁊ dul-
cis cantilena ⁊ ꝓprie cū ex ea ꝓuocat̃ ſomnꝰ: ⁊ occupari
in eo qđ gaudiū efficit doloris vehemētiaꝫ ſedat.

Nunc exequit̃ ponēdo curaꝫ nō aliter diuidēdo: dicēs
ꝙ dolores vētoſi qñqꝫ ſedant̃ aqua calida ſparſa ſuper lo-
cuꝫ doloris: tñ tibi caue qꝛ multotiēs cā doloris eſt ap̄a ⁊
credit̃ eſſe vētoſitas: vñ facta embrocatōe ī prinͦ ap̄atis au
get̃ ap̄a. Itē hec aqua qñqꝫ dilatat ventoſitatē ⁊ nō reſol
uit: vñ grāde ꝯſeqt̃ nocumentū. ¶ Deīde Aui. ponit 2m me
dicamē: dicens ꝙ vaporatōes ſunt medicia ventoſitatuꝫ.
Et melioꝛ vaporatio ē illa que eſt facta ex re exiccāte: ſicut
multo milio niſi mēbꝛū nō voluerit ſuſtinere hāc euapora
tionē vt oculus cui fiat vaporatio cū pānis calidis. Item
fiat euaporatio ex oleo calefacto: fortis tamē euaporatio ē
cocta

UVA. BHSC. IyR_006_1

cocta farina ordei cū aceto: deinde ſiccata fiat vaporatio.
Minor aūt vaporatio ē ex furfure cocto ſicut de farina eſt
dictuz. Salis vero vapor eſt magis pūgitiu⁹. Dict⁹ vero
miliȷ vapor eſt illo ſatis debilior. Jtez ēt pluries fit euapo
ratio ex aqua poſita ī vaſe: q̄ euaporatio ē leuis. Efficit tñ
dicta operatio nocumētū nō obſeruato eo q̄ꝺ dictū eſt: qꝛ
ſupple applicata in prin° apātis vbi putes ventoſitatē eſſe
cām augebit nocumētū: ⁊ aliqñ augendo ſeu dilatādo vē/
toſitatez accidit nocumētū. ¶ 3m remediū dolori vētoſo ē

Hoc intellige de
dolore mālı: nō eniz
conuenit talis inceſ-
ſus in ſpaſmo ⁊ teta
no de ſiccitate cū for
ti dolore neqꝫ in do-
lore capitis ex fame:
qꝛ vbi indigētia non
oz laborare affoꝛiſ-
moꝝ ſcda.

hoc: Vētoſe applicate cū igne fortes ſunt ī ſedādo dolorez
vētoſuz: quib⁹ adhibitis forte totalr̄ dolor deſtruet. Ex ip
ſis tñ adhibitis pluries ꝓuenit q̄ꝺ dictuz eſt ſupra de no/
cumēto. ¶ 4° dicit q̄ ex ſedātib⁹ dolorē eſt leuiter longo
tpe īre eo q̄ in tali īceſſu eſt virt⁹ faciēdi fluxū qꝛ mēbrum
laſſuz ⁊ nō tēſuz ⁊ breuiter eſt virt⁹ reſolutiua vētoſitatis.
¶ Dicit 5° q̄ ad ipes ſubtiles qꝛ ſubtiliatiui cogniti cōiter
⁊ olea etiā noīata ſupple ſunt ex ſedātib⁹ dolorez. ¶ 6° di
cit q̄ dulcis cātilena qua ꝓuocat̄ ſomn⁹ ēt eſt ex ſedātib⁹
dolorez. ¶ 7° dicit ⁊ vltio q̄ occupari in eo q̄ꝺ facit gau/
dere ſedat fortitudinē doloris. ¶ Pro partiū ītellectu no
ta q̄ apud medicos reperiunt̄ iſti termini: vaporatoriū: ca
lefactoriū: epithima ⁊ fomētatio q̄ idez īportāt. Pro nūc
tñ ſunt duo noīa exponēda dicēdo calefactoriū eſſe dictū:
qꝛ actualr̄ calefaciēdo operat̄. Vocat̄ aūt vaporatoriū: qꝛ
vaporādo ſiue mēbro mittēdo vaporez ſuā perficit opera/
tōez. Scd̄o nota q̄ vaporatoria ſeu calefactoria multiplr̄
diuerſificant̄. p° rōne qualitatis paſſiue: ⁊ hoc duplr̄: qꝛ
quedā humida actualr̄: quedā ſicca. Exm ſcd̄i: miliū torre/
factū aliquātuluz ī lebete ignito nō appoſito liquore eſt ca
lefactoriū ſiccū vt notū eſt. Exm primi: vt aq̄ calida a qua
eleuant̄ vapores: lz ēt diuerſitas hec eſſe poſſet quātū ad
q̄litates actiuas potētiales vt dicā quoddā calefactoriū ca
lidū quoddā frigidū: qꝛ tñ per calefactoria cōiter reſolutio
q̄rit̄ ⁊ calefactio aliqualis: iō cōiter oīa calefactoria dicū/
tur calida. 2° recipiūt diuerſitatē ex parte potētie. Aliqua
eīz ſūt potētiora in operādo eo q̄ a reb⁹ fortiorib⁹ euapo/
rāt: ſm etiā q̄ euaporātia ſunt hūida aut ſicca: vapor eniz
humidus maior ē ſicco vapore: vt colligit̄ ex pa affo. ꝯmē/
to 14°. Jtē diuerſificant̄: qꝛ quoddā eſt vaporatoriū mor/
dicatiuū: quoddā vero nō. Jllud eīz ſalis ē mordicatiuū.
Jtez ēt ſm diſtinctōez mēbroꝝ alia opz approximare cale
factoria. Oculo eīz leue ꝯuenit calefactoriū ꝓpter ei⁹ vehe
mentē ſenſibilitatē. Ad ꝓpoſitū has diuerſitates explicat
Aui. in tex. p° eīz tangit aquā calidā: ⁊ ſic humidi⁹ euapo
ratiuū ſua caliditate reſoluēs ventoſitatem aperiendo po/
ros: ⁊ tale euaporatoriū humidū maxīe ꝯuenit ventoſitati
eleuate ab humore ſicco opponēdo ſe humori. ¶ Vlterius
nota q̄ aqua calida pōt applicari ꝓ ventoſitatib⁹ duplr̄.
Vno mō q̄ ſpargat̄ ſupra mēbrū: ⁊ iſto mō nō erit vapora
toriū. 2° mō vt mēbruz recipiat aq̄ vaporatōez: ⁊ iſto mō
pōt dici vaporatoriū. ¶ Vlteri⁹ nota q̄ ī applicatōe talis
aque duo īpedimēta ſūt euitāda. Primū vt ſciam⁹ māꝫ
eſſe ventoſaz: qꝛ ſi fuerit apā: nocumēta que in parte ponū
tur ſequunt̄. 2m eſt ne tale vaporatoriū dilatādo ventoſi/
tatez ⁊ amplius ventoſando materiā grādius nocumētuz
inducat: ⁊ euitat̄ eūando corpus ⁊ remouendo māz a qua
pepēdit vētoſitas. ¶ Hic tñ notetis q̄ valde īſtāte dolore
⁊ ſi corp⁹ ſit plenū: tñ carminātia vētoſitatē applicam⁹ ꝓ/
pter aliqualē doloris ſedationē. ¶ Vlteri⁹ nota q̄ vapora
toriū ſiccū ⁊ exiccatiuū ē meli⁹ humido: ſicut vaporatoriū
factū ex milio eo q̄ talis euaporatio ē potētior in reſoluē/
do ventoſitatē niſi magna fuerit ſenſibilitas mēbri vt ocu
lus. Pro iſto tñ nota q̄ vaporatio cū milio. ſ. ſicca ē oculo
nociua. Applicatio tñ pānoꝝ īfuſoꝝ in decoctiōe miliȷ pōt
cōpetere in obtalmia vētoſa: vt pz 3a tertiȷ: cū iſta etiaz ſit
mitior ⁊ magis neceſſaria vaporatiōe ſicca. ¶ Vlteri⁹ no/
ta q̄ vaporatio facta ex orobo cocto in aceto ⁊ poſtea exic/
cato eſt valde fortis rōne orobi: rōne etiā aceti valde mor/
dicantis ⁊ valde penetrātis: debilior tñ ē facta ex furfure. ſ.
frumēti cū nō faciat tātam calefactionē vt orobū. ¶ No
ta etiā q̄ vaporatio facta cuz aqua poſita in vaſe ē leuis ⁊
ſana cū mittat vapores leues. Sana etiā qꝛ ſufficiēter fa/
ciēs reſolōnē ⁊ reſoluēs vētoſitatē faciēs corpus in ſua ſa
nitate permanere: duob⁹ tñ euitatis vt q̄ non ſit dolor q
ꝓueniat ab apāte: ⁊ etiā q̄ corpus nō ſit valde repletum.
¶ Vlteri⁹ nota q̄ vētoſe cū igne ſunt fortes in ſedādo do
lorē vētoſuz: qꝛ ꝓpter igneū calorē valde reſoluūt pꝫ etiā
vehemētē caliditatē valde attrahūt vētoſitatē verſus ex/
teriora: ⁊ maxime ſi ſint ſine ſcarificatiōe: qꝛ facte cū ſcari
ficatione eūando ſanguinē ⁊ ſpūm nālez calorē debilitādo
ſūt cā vt vētoſitas magis ī mēbro īmoret̄. Ex illis autē q̄
ſunt ſine ſcarificatiōe frequēter applicatis ꝓpter eaꝝ potē
tiam dolor ex toto remouet̄: iō ventoſaz magnā applicatā
vmblico valde cōmēdat Aui. 13a tertiȷ de cura doloris ſto/
maci. Euitētur tamē illi duo dolores quos repetere poti⁹
eſſet faſtidiū q̄z iuuamentū. ¶ Vlteri⁹ nota q̄ lōgus mo/
tus ⁊ paulatinū exercitiū hz corp⁹ laxare ⁊ mēbrū: poros
rarificādo ⁊ faciēdo fluxū. i. laxū: ⁊ ſua caliditate ēt reſol/
uēdo ſedat vētoſuz dolorē ſi ñ fuerit mot⁹ fortis: qꝛ tūc p°
nimiū agitādo hūores eſt cā nimie vētoſitatis: ⁊ vehemē/
ter exiccādo ē cā quaſi corrugatōis ⁊ inſpiſſatōis cutis: iō
detinerent̄ vētoſitates. ¶ Vlteri⁹ nota q̄ p adipes ſubti/
les primo ītelligere poſſum⁹ ſubtiliantes ⁊ poros apientes
ſeu ſubtiles qꝛ leuis caloris. Nā ſi eēnt nimis calidi corru
garent cutē traherēt ēt ad ptes mās āpliores. ¶ Vlteri⁹
nota q̄ dulcis cātilena primo ſomnū ꝓuocādo ē cā ſeda/
tiōis doloris. Jtē eius virtus ꝓpter eius amenitatē ⁊ dul
cem eufoniā diſtrahit a triſti mō ſentiēdi obiectū. Prouo
catur aūt ex ipā ſomn⁹. p° qꝛ per eius amenitatē virt⁹ īte/
rior attēta ad cātilenā diſtrahit virtutes exteriores a ſuis
operationibus vt inde retractio ſpūuz ⁊ ſomn⁹ cōſequā/
tur. ¶ Vlterius nota q̄ opari in gaudio ſedat dolorē. p°
ex eo q̄ virtus ex gaudio cōfortet̄: ſe etiā ꝯformet gaudiū
faciētibus ad illā attrahēdo diſtrahit a triſti ſenſatiōe.

¶ Capitulū 3m in quo p̄cipit̄ a qb⁹ curatiōib⁹ īcipiam⁹.

Cum multe coniungunt̄ egritudines ab ea
incipere debemus in qua vna horaꝝ trium
c proprietatū exiſtit.

¶ Jn iſto. c. huius fen. 4. primi cañ. Auic.
determinat de cura morboꝝ adinuicē cōiun
ctorū oſtēdendo a quoꝝ cura ē primo inchoandū. Et diui
ditur capitulū in duas ptes. Nā prīo facit q̄ꝺ dictū ē. 2°
toti libro ponit epilogū ſeu finē gratias agēdo ſupne potē
tie. ibi 2a: ⁊ ſit quātitas huius noſtri. Prīa in duas. Naz
primo ponit numerū coꝝ que ī tali cura obſeruāda ſūt. 2°
de illis exequit̄. ibi 2a: vna earū ē. ¶ Prīo dicit q̄ multis
morbis ꝯiunctis adinuicē ab illius cura eſt incipiēdū ⁊ in/
choandū in quo vna triuz dicendarū exiſtit ꝓprietatum.
¶ Pro pte nota ex prehabitis q̄ cura morbi cōpoſiti qui
vocatur morbus vnus nō dependet ex curis ſimplicium:
īmo hz vt morb⁹ vnus ⁊ diſtinct⁹ ꝓpriā curā: vt de apāte
dictū eſt. Cura vero morborū cōplicatorū nota eſt ēt ex cu
ris ſimpliciū: aut ſcita cura morbi calidi ⁊ humidi ſi adin/
uicē ꝯiungant̄. Scit̄ etiā cura horū cōiunctoꝝ: ⁊ maxime
ſi hi morbi nō egeāt cōtrarȷs medicinis. vbi eīz cōtrarȷs
medicinis egeam⁹ nō bene ex cura ſimpliciū noſcit̄ cōpoſi
torū cura. Jtē ex cura ſimpliciū nō habetur etiam modus
approximādi ⁊ ordo. Et dato q̄ ſciā qualiter vlcus eſt cu/
rādum ⁊ qualiter apā: tamē nō ſcio a quo curā debeā in/
choare. Jō Aui. preſens cōpilauit cam vt oñderet a quib⁹
curā debem⁹ inchoare: vt etiā explicat̄ ī rubrica capituli.
¶ Scd̄o nota hic p morbū ītelligi quācūqꝫ rē p̄ter nām
ſiue hec ſit morb⁹ ſiue cā morbi ſiue accidēs. Erit ergo ſen
ſus q̄ cū cōiungūt̄ multe egritudies. i. multe diſpōnes p̄/
ter nām ſiue ſit morb⁹ ſiue cā morbi: qꝛ cā cuz cā: morbus
cū morbo: vel accidēs cū accidēte: vel cā cum morbo: vel
accidēs cū cā: vel morb⁹ cum cā ⁊c. qꝛ tñ egritudo magis
abſolute dicit̄ p̄ter nām: ipām poti⁹ explicuit in pñti parte
cū inferi⁹ ēt ponat accidētis cū morbo cōplicationē.

Vna earum eſt q̄ alia ſanari nō poteſt anteq̄z ipſa
ſanet̄ ſicut apoſtema ⁊ vlcus cuz ꝯiungunt̄. medicamur
enim apoſtema donec cōplexionis malitia que cū eo ve/
nit remoueat̄ abſqꝫ cuius ſanatiōe vlcus ſanari nō po/
teſt: poſtea medicamur vlcus. Et ſecūda earū eſt cū vna
egritudo cauſa fuerit alteri⁹ ſicut cuz accidit oppilatio ⁊
febris: medicamur eniz oppilatiōez prius: deinde febrē.
Et ſi nobis neceſſariū fuerit oppilatōez aperire cuz eo
ī quo aliqua exiſtit caliditas nō curabim⁹ de febre: ⁊ me/
dicamur quidē pulmonis apā cū deſiccatiuis ⁊ nō cura/
bimus de febre: quoniā poſſibile eſt vt febris remoueat̄
cauſa ipſius remanēte. Et cauſe quidē eius ſanatio eſt
exiccatio que febri nocumētuz facit.

¶ Nūc exequit̄ de illis. Et diuidit̄ in tres. ibi 2a: ⁊ ſcd̄a.
ibi 2a: tertia vero. ¶ Prima dicit q̄ vna ꝓprietatū eſt qñ
due egritudines ſic cōiungūtur q̄ vna nō pōt ſanari ſine
alia quāuis ecōtra ſicut vlc⁹ ⁊ apā. Nā nos primo debe/
mus curare morbum ſine quo alter curari nō pōt: vñ nos
nō medicamur apā vſqucquo remoueam⁹ malitiaz cōple/
xionis cum ipſo venientem: ſine cuius cōplexionis ſana/
tiōe nō poteſt vlcus ſanari. ¶ Dicit 2° q̄ 2a ꝓprietas eſt
cū vna egritudo ē alteri⁹ cā. nā tunc ſupple debem⁹ primā
curare: ſicut cōiunctis oppilatiōe ⁊ febre. p° medicamur
oppilatiōi deinde febri. Et ſi neceſſariū fuerit aperire nos
applicamus calida nō curātes de febre. Jtē cōiūctis apā/
te pulmonis ⁊ febre cū apā tale ſit cā febris: a tali apāte in/
choamus curā deſiccādo ⁊ nō curādo de febre: qꝛ īpoſſi/
bile ē curari febrē ſua cā remanēte. Cuius cā ē qꝛ apātis ſa
natio ē exiccatio febri faciēs nocumētū. ¶ Pro partium
ītellectu nota aliqua p° q̄ prīa ꝓprietas ē ſumpta ab ori/
gine diſpoſitionū vt ſciat̄ quid ſit applicāduz ante ⁊ quid
poſt: ⁊ attendat̄ maxime iſta ꝓprietas cōiūctis diſpoſitio/
nibus que per vnū medicamē nō poſſunt medicari ſz per
cōtraria: vt vlcere cōiuncto cum apāte. naz apāti cōueni/
unt mollificātia: vlceri vero exiccatio. ¶ Scd̄o nota q̄ nō

UVA. BHSC. IyR_006_1

ſolū iſta proprietas intelligit̄ in tali cōiunctione morborū: imo etiā in alijs cōiunctōibus de quibus eſt dictū. ¶ Ulterius nota ꝙ cū virtꝰ operet̄ vnionē ⁊ cōſolidationē mediante cōplōne vt debito īſtrumēto ſi mala cōplō nō fuerit amota non poterit vlcus vniri ⁊ cōſolidari. Jō merito premittēda eſt cura apātis q̄d curari pōt ſine cura vlceris cū curetur apā tā obijciēdo mām. ¶ Ulterius nota ꝙ ēt ſolutio cōtinuitatis ī apāte reperta prīo abijciēda ē tāquā veram ipediens vnionē ⁊ cōſolidationē quā ex dictis itellexit. ¶ Ulteriꝰ nota ꝙ iſta 2ª ꝓprietas ſumpta ē ex caliditate: vt pꝫ 7° terapen. ¶ Nota quātū ſpectat ad ꝓpoſitum ꝙ aliqua egritudo pōt eē cā ad mentē medicoꝝ a qua alia egritudo dependet ſicut dicimus oppilationē efficere febrē: ⁊ caliditatē ſtomaci efficere caliditatē preter naturā in epate. 2° pōt dici cā augens vt ſi epar ſit calidū caliditas ſtomaci augēs illā caliditatē dicit̄ eſſe cā. 3° dicit̄ cā cōſeruans ⁊ fouēs ſicut ſtomaco patiēte etiā malā ꝯplōnē cām cōfirmataꝫ calidā: humores calidi ſtomaci illā cōfortare ⁊ cōſeruare dicūtur. Ad ꝓpoſitū applicādo qūocūqꝫ ſumitur cā pars cōtinet veritatē. ¶ Sexto nota ꝙ nos curamus cām qn̄qꝫ nō attēdentes ad effectū: aliqn̄ etiā attēdentes. Nā primo ſi ſit oppilatio ⁊ febris ītenſa attēdimꝰ oppilationi nō negligēdo febrē vt hic. Si vero febris ſit ītenſa nō ē incōueniēs coacte inchoare curā a febre ſeu ſaltē medicādo oppilatiōi nos oportebit attēdere febri. Hoc ergo q̄d ponit̄ in parte ē veꝝ de cura regulari ⁊ ordinata.

¶ Ulteriꝰ nota ꝙ per vlcꝰ pulmonis. A. intelligit cāꝫ cōſeruantē ⁊ fouētem. nā vlcus pulmonis fouet febrē ethicā ſine cuius vlceris ſanatione febris ethica nō poteſt ſanari: q̄d vlcus dedit intelligere duꝫ dixit apā: q̄d patet ex hoc: quia dixit ſibi cōpetere exiccationē que cōuenit vlceri inquātum vlcus eſt.

Tertia vero cuꝫ fuerit vna eaꝝ ea de qua maior ſollicitudo ſit habēda ſicut ſi coniūgatur ſinochus ⁊ paralyſis: medicamur eniꝫ ſinochuꝫ extinguēdo ⁊ flobothomādo ⁊ de paralyſi non curabimus.

¶ In partibꝰ enumerauit duas ꝓprietates ꝓpter quas ab vna diſpoſitōe inchoandū eſt: nunc enumerat tertiaꝫ. Et diuidit̄ in duas. Prīo facit q̄d dictū eſt. 2° cuꝫ accidens ꝯiungit̄ cuꝫ morbo oſtēdit etiā a quo ſit inchoāduꝫ. ibi 2ª: cuꝫ autē egritudo. ¶ Prīo dicit ꝙ tertia ꝓprietas eſt quādo vnus morbꝰ eſt maioris ſollicitudīs altero. Nā ab eo qui eſt maioris ſollicitudīs eſt īchoandū ſicut cōiunctis in ſinocha ⁊ paralyſi attendimꝰ extinguere ſinochaꝫ flobothomādo nō curādo de paralyſi. ¶ Pro parte nota p° ꝙ ille morbꝰ eſt maioris ſollicitudīs qui plus debilitat virtutē ⁊ ad queꝫ mors aptius pōt cōſequi: ergo cuꝫ intētio medici ſit cōſeruare vitā ⁊ prohibere mortē: ideo a morbo in quo ē maior ſollicitudo eſt inchoāduꝫ: ⁊ iſta proprietas eſt ſumpta a magnitudine morbi. Propter q̄d 2° nota ꝙ morbꝰ dicit̄ magnus: vt colligit̄ 7° terapen. aut ratōe dignitatis actiōis leſe: qꝛ ledit operationē valde neceſſariā ⁊ perfectiorē ⁊ toti corpori magis neceſſariā aut pti. Scd̄o morbꝰ dicit̄ magnus reſpectu ſui ratōe ꝓprie eſſentie: qꝛ ratōe gradualis eſſentie ſiue lapſus a tēperamēto vt mala ꝯplexio calā ī hoc. 2° mō dicit̄ mala cōplexio calida vt duo maior ꝯplexione calida vt vnū. 3° modo morbꝰ dicit̄ magnus ratōe virtutis diſpēſantis noſtrū corpꝰ vt ille morbꝰ ad quē conſequit̄ ſincopis dicit̄ eſſe magnꝰ. Applicādo ad propoſitū iſta ꝓprietas antecedit alias duas ꝓprietates: qꝛ potiꝰ inchoāduꝫ eſt a morbo maiori q̄ꝫ a morbo ſine quo alter nō poteſt curari ꝓpter cauſaꝫ ī prīo notato aſſignatā: prius etiaꝫ a tali inchoanduꝫ q̄ꝫ a morbo q eſt cauſa ꝓpter ꝯſimilē cauſaꝫ. ¶ Itē nota ꝙ a morbo magno 3° mō prius eſt īchoāduꝫ q̄ꝫ a morbo qui ē cauſa. Cōſimiliter etiā a morbo magno modo primo potiꝰ eſt īchoāduꝫ q̄ꝫ a magno ſcd̄o°. Cōſimilr pꝫ cauſa alioꝝ ſemper paritate ſuppoſita: vt ꝙ quilibet in ſuo gradu ſit cōſimiliter magnus. ¶ Tertio nota ꝙ licet ſinocha īportet febrē de ſanguine putrefacto hic tamē per ſynochā ſynochā ītelligit inflatiuā in qua potiſſimū cōuenit flobothomia vt ſanguis debite eūetur: īmo cōuenit vſqꝫ ad ſincopim 9° terapeū. Per paralyſiꝫ aūt ītelligit mollificatōeꝫ a frigida mā ꝓcedentē. Qꝛ ergo maior eſt timor ex inflatiōe ⁊ putrefactione ſanguinis q̄ꝫ ſit ex mollificatiōe: ideo eligimꝰ flobothomare non curantes principaliter de paralyſi.

Aduerte tn̄ cuꝫ modeſtia eſſe flobothomādū in caſu nō obſtāte ꝙ dicitur a magiſtro hic: mortificaretur eim īnatus calor qui iaꝫ eſt debilitatꝰ ꝓpter paralyſiꝫ ⁊ illi auferremꝰ theſauruꝫ. Nicolaus ſcyllacius vidit ſocium quēdaꝫ qui peccauit ī hoc ⁊ infirmus perijt in manibꝰ ſuis.

Cuꝫ auteꝫ egritudo ⁊ accidēs cōiungunt̄: a ſanatōe egritudinis incipiemꝰ. ⁊ ſi accidēs ſuperauerit: tunc accidētis curaꝫ habebimus ⁊ egritudinē non ꝯſiderabimꝰ ſicut in colica damus ſtupefaciētia propterea vt doloris fortitudo remoueat̄: licet ipſi colice impedimētuꝫ faciat. Et cū hoc quādoqꝫ tardamꝰ q̄d facere d̄bebamꝰ ꝓpter ſtomaci debilitateꝫ: aut ꝓpter vētris fluxuꝫ qui preceſſit: aut ꝓpter preſentē nauſeaꝫ. Et quādoqꝫ nō tardamus ſed operamur ⁊ nō totaꝫ remouemꝰ cauſaꝫ ſicut ī egritudīe ſpaſmi: nō eniꝫ totum expellimꝰ humorē: imo ex eo aliquid dimittimꝰ vt ipſum ſpaſmoſus remoueat motus ne humoreꝫ reſoluat naturaleꝫ.

¶ Nūc oñdit qūo inchoādū ſit ſi egritudo cōiūgat̄ accidenti. Primo ponēs ꝓpoſitiōeꝫ iſtā: ꝙ cōiunctis morbo ⁊ accidente a ſanatiōe morbi ē inchoādum. Abbreuiando hoc ē verum regulariter accidēte nō ſuꝑante morbū vt dicet̄ ſtatim: eo q̄d egritudo ē ſicut cā ad cuius remotionē accidētis remotio cōſequet̄. ¶ Scd̄a ꝓpō ē: ſi accidēs ſuperauerit in malitia ⁊ magnitudine: tūc accidenti attendimus de egritudine nō curādo. ſ. notabilr ſicut ē in colica: qꝛ in morbo inteſtini colon ad quē cōſequit̄ fortitudo doloris damus ſtupefaciētia attendendo: dolori nō curādo de colica ſupple notabilr. ¶ Tertia ꝓpō ſit hec: ꝙ qn̄qꝫ tardamꝰ facere debitū morbo qꝛ alterare aut eūare ꝑꝑ debilitatem ſtomaci aut fluxū vētris ꝑcedentē aut ꝑꝑ preſentem nauſeā: ⁊ tūc plus attēdimus accidēti ⁊ debilitati ſtomaci q̄ꝫ morbo. ¶ Quarta ꝓpō ē hec: ꝙ qn̄qꝫ non tardamus ī curando. ſ. morbum: ſed operamur. ſ. curādo: nō tn̄ remouendo totā cām: īmo expectādo vt ipā per accidēs morbi remoueat̄: ſicut ē in egritudine ſpaſmi: qꝛ in repletiōe aut alio morbo ad quē cōſequit̄ ꝯtractio ⁊ ſpaſmoſus motus: nō enim totū eūamus humorē ſꝫ aliquid dimittimꝰ motu ſpaſmoſo reſoluēdū ne hic cōcuſſiuus motꝰ nō exn̄te hoc humore etiā ꝑter nām ſupra nālē cōuerſus ipm cōſumat.

¶ Pro intellectu ꝑtis duo notāda ſunt: ⁊ primo ꝙ accidens q̄d cōiungit̄ morbo pōt eē accidens ꝓprium ⁊ cōe. Exēpli cā: ad morbū ꝓpriū de ꝑſe ꝯſequitur actio ſeu operatio leſa: aut etiā qualitas mutata: aut etiā exiēs mutatū. Exēplū ſcd̄i vt debilitas ſtomaci febri. Applicādo ad ꝓpoſitū regulariter a morbo prius inchoandū ē q̄ꝫ a ꝓprio accidente: Aliquādo tn̄ eſt a ꝓprio accidente prius inchoādū ipō exn̄te maiori mō 3° ex dictis. Aut aliqualr cōtradicēdo expoſitori ipō exiſtente vt cā ſaltē fouēs morbū. Nā ſi a mala cōplōne calida fiat dolor: cōtingēs ē dolorē attrahendo ſuū fouere morbū: vt dolor ſit illud ſine quo morbus bene curari nō pōt. Si vero ſit accidens cōe ab ipſo aliqn̄ inchoandū ē a cura ⁊ aliquādo non vt notum eſt.

¶ Operatiōis ſigillatio ⁊ gratiarum actio.

ſ

Jt quātitas huius noſtri ſermonis cōpēdioſi de principijs vniuerſalibꝰ doctrine medicinalis ſufficiēs. Deinceps auteꝫ laboremus vt de ſimplicibꝰ medicinis librū ꝯponamus ſi deus voluerit. Et ipſe quidem nos iuuabit: cui ſint grates ſecūduꝫ ſui īnumerabiles miſericordias.

¶ In parte preſenti Auic. dictis ſuis finē imponit ad ſequētia tranſiturꝰ: ſuꝑneqꝫ potētie referēdo gratias breuiter dicēs ꝙ hec ſit ſufficiēs quātitas ſermonis cōpēdioſi de principijs vniuerſalibꝰ medicine. Deinde vero valde laboremus vt faciamus librū de ſimplicibus medicinis deo volente qui nos certe iuuabit cui ſint grates ſꝫ ipſius innumerabiles miſericordias. Illum vero inuocemus vt etiā fecit magiſter Marſilius qui in eius laudem ⁊ glorīā aliqua ꝯpoſuit carmina qui viuit benedictꝰ ī ſecula ſeculoꝝ.

¶ Expliciūt dicta Ugonis ſenēſis ſuꝑ quarta fen primi canonis vſqꝫ ad illum paragraphū poſituꝫ in ca° de enemate: forma vero. Deinceps vero dicta Marſilij vſqꝫ ad fineꝫ cū annotatōibus Jacobi de partibꝰ ⁊ aliorū clariſſimoruꝫ medicoruꝫ. Additūꝫ eſt eniꝫ capitulū de flobothomia ſm expoſitioneꝫ Ugonis nuper inuentuꝫ.

¶ Per frāciſcuꝫ gyrardēguꝫ. 1496. die. 29. Januarij.

Papie.

UVA. BHSC. IyR_006_1

¶ Tabula titulorum queſtionum huius operis.

¶ Tituli queſtionū primi capituli.

Utrum deterius ſit declinare ad latus diete groſſioris q̄z oz: an ad latus diete ſubtilioris q̄z oz. j.
Utrū humoribꝰ crudis exñtibꝰ in venis cum forti fame ſit dandus cibus multus ⁊ pauci nutrimēti. ij.
Utrum in debita adminiſtratiōe medicinaꝝ tantū tres regule ſint attendende. iij.
Utrū colerico ⁊ flegmatico equalr̄ febriētibꝰ frigidiora cō ueniant colerico q̄z flegmatico. iiij.
Utrum materia fluente ſit attractio fienda ad partem diuerſam. v.
Utrum ante diuerſionē materie mēbro dolente ſit dolor ſedandus. vj.
Utrum medico liceat diuertēdo ſuper mēbro principali facere tranſitum. vj.

¶ Tituli queſtionū ſcdi capituli.

Utrū tēpus calefaciēdi ⁊ infrigidādi ſit minus tēpore humectandi ſtante ⁊c̄. ix.
Utrū tēpora calefaciēdi ⁊ infrigidādi ſint equalia. ix.
Utrū ſit maius piculū ī ifrigidādo q̄z calefaciēdo. ix.
Utrū tp̄s humectatiōis ſit maius tp̄e exiccatiōis. ix.
Utrū ſit timor equalis ī hūectādo ⁊ ī exiccādo. ix.
Utrum vinū ſit humidum vel ſiccum. x.
Utrum decrepito ⁊ iuueni equalr̄ febriētibꝰ quo ad tactū maiori ifrigidatōe idigeāt decrepiti q̄z iuuenes. xj.

¶ Tituli queſtionū tertij capituli.

Utrū materia ſit euacuāda ī morbis ante digeſtiōem materie completam. xiiij.
Utrum ī trahēdo ad longinquū ſit faciēda ꝓlongatio ſm duas dyametros. xv.
Utrū ī aliquo cāu ſit eūandum artificialr̄ a medico vſq̄z ad ſincopim. xvj.

¶ Tituli qōnū quarti capituli.

Utrum exiſtēte neceſſitate flobothomie ⁊ farmacie ſit ſemper preponēda flobothomia. xvij.
Utrū melius ſit ī habente febrē ſoluere ventrē vniuerſalr̄ q̄z vomitum prouocare. xix.
Utrum vomitus cōueniat patiēti liēteriā. xx.
Utrū medicina ſolutiua vel vomitiua cōuertat̄ ad humorem quoniā habet eūare. xxj.
Utrū dū medicina ſolutiua trahit humorē: remaneat ī ſtomaco vel in inteſtinis. xxij.
Utrū medicīa ſolutiua vadat ad hūorē attrahēdū. xxij.

¶ Tituli queſtionū quinti capituli.

Utrū qn̄ medicina dat̄ in nimia quātitate vel quouis alio mō ſuꝑflue euacuat euacuato ⁊c̄. xxvj.
Utrū ſūpto farmaco ſolutiuo balneū ꝯpetat die 2ª. xxvij.

¶ Tituli queſtionū ſexti capituli.

Utrū ſitis ſit ſignū ſufficiētis eūationis. xxviij.

¶ Tituli qōnum. xxij. capl'i ſm Marſilium.

Utrū quis ſit flobothomādus qui nō ſit flobothomādus ꝓpter multum ſanguinē ⁊ malum. xxxvij.
Utrum habētes debilitatē ī mēbris interioribꝰ cū ꝯplexiōe calida ſint flobothomādi. xxxvij.
Utrum flobothomia ſit magis fienda ante aduentū morbi q̄z qn̄ aduenerūt morbi. xxxvij.
Utrū in pn̄cipio morbi ꝯueniat flōmia. xxxvij.
Utrum flōmia ſit fienda poſt ſtatum. xxxvij.
Utrū in die motus egritudinis ſit eūandum. xxxviij.
Utrum dies criſis ſit dies querēdi ſomnum. xxxviij.
Utrum flobothomia ꝯſtringat ventrem. xxxviij.
Utrum ſtricta flōmia ſit magis ꝯſeruatiua āpla. xxxix.
Utrum in febribus vehemētis calefactōis ⁊c̄. ſit cauendum a minutōe in principio ⁊c̄. xxxix.
Utrum in pn̄cipio febris ſanguinis fiēda ſit maior euacuatio q̄z in proceſſu. xxxix.
Utrum ſtomaco repleto cibo ⁊ flobothomia facta mā indigeſta trahatur ad venas. xl.
Utrū in habente faſtidiū ſit expectandum quouſq̄z digeratur faſtidium. xl.
Utrū flōmia cū non ē neceſſaria faciat ⁊c̄. xlj.
Utrū poſt flōmiā ꝯpetat caro aſſata vel elixata. xlj.
Utrū habēti ſuꝑabūdantiā humorū a ſanguine cōueniat frequens flobothomia. xlij.
Utrum artaria manus ⁊c̄. conferat antiquis doloribus epatis ⁊c̄. xliiij.

¶ Tituli queſtionū. xxiij. capituli.

Utrū eūatio que ſit gratia retētiōis debeat augeri aut vigorari ꝑ medicinas attrahētes a forma ſpecifica. l.
Utrum ī quolibet fluxu māli ſeu ꝓueniēte ꝑꝑ malā ꝯplexionē cū mā ſit neceſſariū euacuare. l.
Utrum calx extincta ſit ſtiptica. lj.

¶ Tituli queſtionū. xxiiij. capl'i.

Utrum euacuatio ⁊ icīſiua reſolutiua habeāt remouere oppilationem. lj.
Utrū medicina īcīſiua ſit danda pro remotōe oppilatiōis ab humore viſcoſo. lj.
Utrum materie minus groſſe cōueniat fortior reſolutio q̄z groſſiori. lj.
Utrum oppilatōes neruoꝝ ſint peiores. lj.

¶ Tituli qōnum. xxv. capituli.

Utrū prius Aui. habuit determīare de mala ꝯpl'one ⁊ de mala compōne q̄z de apoſtematibꝰ. lij.
Utrum reſolutiua ſint in principio apoſtematis approximanda. lij.
Utrum in pn̄cipio āpatis cōueniat repercuſſio. liij.
Utrum ante aduentum āpatis cōueniat recurſus. liij.
Utrum repercuſſio ſit fienda ratione materie fluxe actualiter apoſtemātis. liij.
Utrum ī quolibet āpate calido ꝯueniāt eque frigida. liij.
Utrum cuilibet apoſtemati conueniant eque ſtiptica aut eque ſicca. liij.
Utrum apoſtemati colerico vel ſanguineo conueniāt magis ſtiptica ſeu ſicca. liij.
Utrum in augmēto āpatis ꝯueniat maturatio liij.
Utrum in ſtatu āpatis ſit facienda equalis permixtio reſoluentium ⁊ repercutientium. liiij.

¶ Tituli qōnum. xxvij. capituli.

Utrum medicinarum ꝯtrariarum permixtio ſit conueniens pro cura apoſtematum. lv.

¶ Uiri excellētes quoꝝ dicta ī hoc voluīe ſūt annotata.

Hypocrates
Galienus
Raſis
Auicenna
Auenzoar
Meſue
Auerois
Serapio
Symon Januēſis
Gentilis de fulgineo
Jacobus de partibus.

UVA. BHSC. IyR_006_1

UVA. BHSC. IyR_006_1

UVA. BHSC. IyR_006_1

UVA. BHSC. IyR_006_1